



ساقلىق ساقلاش

保健事业

医学类省级核心期刊

ئۆلكە دەرىجىلىك نۇقتىلىق تېببىي ژۇرنال 59 - يىل نەشرى ئومۇمى 225 - سان

为“健康新疆—全民健康素养促进行动”加油！

《سانلام شىنجاڭ - ئومۇمى خەلق ساغلاملىق سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش ھەرىكىتى》نى تۈپتىن ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ !



يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى ۋە ئۇنىڭ پىسخىك پەرۋىشى

كۆز پەسلىدىكى كۈتۈنۈشتە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار

بالىلار چىشىنىڭ رەتسىز ئۆسۈپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئامىللار قايسىلار؟

2016.9 (ئالدىنقى سان)

CN 65-1113/R
ISSN 1002-9478



پارچە باھاسى 8.00 يۈەن



ئېلزاد ئابدۇلھەق، مۇ -
ئاۋېن مۇدىر ۋىراج، ئىشلەپ
تۈرۈپ ئاسپىرانتلىقتا ئو -
قۇش تارىخىغا ئىگە، شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتى -
تىنىڭ تېرە كېسەللىكلىرى
ئىلمى بويىچە تەكلىپلىك
ئوقۇتقۇچىسى، جۇڭخۇا
تېببىي ئىلىم جەمئىيىتى -
نىڭ ئەزاسى، جۇڭخۇا بېي -
جىي ئىلىم جەمئىيىتى تېرە
تاشقى كېسەللىكلىرى ۋە لازېر نۇرىدا داۋالاش شۆبە
جەمئىيىتىنىڭ دائىمىي ئەزاسى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپ -
تونۇم رايونىنىڭ كەسپىي كېسەللىكلەر مۇتەخەس -
سىسلەر ئامبىرىغا كىرگۈزۈلگەن تېرە - جىنسىي
كېسەللىكلەر مۇتەخەسسىسى، دۆلەتلىك تېببىي
ھۆسن تۈزەش كەسپىي ۋىراجلىق سالاھىيىتىگە، دو -
لەتلىك ئەيدىز ۋىرۇسىغا قارشى تۇرغۇچى دورىلار بى -
لەن داۋالاش كەسپىي ۋىراجلىق سالاھىيىتىگە ئىگە،
«ئېلزاد دوختۇر تېرە كېسەللىكلىرى مەخسۇس ئام -
بۇلاتورىيەسى» نىڭ باشلىقى.

ئۇ، 1993-يىلى شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتىدە -
نىڭ داۋالاش كەسپىگە قوبۇل قىلىنغان، 1996-يىلى
ياپونىيە توكيو ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ «ئەنئەنىۋى تېبا -
بەتتە ئاقكېسەلنى داۋالاش تەتقىقاتىنىڭ ئۇيغۇر تېبا -
بىتى بويىچە داۋالاش تەتقىقات تۈرى» نىڭ ماتېرىيال
يىغىش خىزمىتىگە مەسئۇل بولۇپ، شىنجاڭنىڭ ھەر
قايسى جايلىرىدىكى ئاتاقلىق تېۋىپلارنىڭ سىناقىتىن
ئۆتكەن، ئۇنىۋېرسىتېتتىكى رېتسېپلىرىنى يىغىپ، رەتلەپ
ئاقكېسەلنى ئۇنىۋېرسىتېتتىكى داۋالاشتىكى بىرىنچى قول ما -
تېرىيالغا ئىگە بولغان. بۇ ئاساستا يېتەكچى ئوقۇتقۇ -
چىسى بىلەن بىرلىشىپ يازغان «ئۇيغۇر تېبابىتىدە
ئاقكېسەلنى داۋالاش» ناملىق ماقالىسى 1998-يىلى يا -
پونىيە «ئەنئەنىۋى تېبابەتچىلىك» ژۇرنىلىدا ئېلان
قىلىنىپ، خەلقئارا ئەنئەنىۋى تېبابەتچىلىك ساھەسىدە -
نىڭ ئۇيغۇر تېبابىتىدە ئاقكېسەلنى داۋالاشنى تونۇ -
شىدىكى دەسلەپكى ماتېرىيال دەپ قارىلىپ زور تە -
سىر قوزغىغان. 2003-يىللىق «ئۇيغۇر تېبابىتى ئىل -
مى مۇھاكىمە يىغىنى» دا مۇنەۋۋەر ئىلمىي ماقالا مۇ -
كاپاتىغا ئېرىشكەن.
ئۇ، 1999-يىلى ئەلانەتجە بىلەن ئوقۇش پۈتكۈ -

زۇپ ئاپتونۇم رايونلۇق خەلق دوختۇرخانىسىغا تەۋ -
سىم قىلىنىپ، تېرە-جىنسىي كېسەللىكلەر بۆلۈمىگە
خىزمەتكە چۈشكەن. 2003-يىلى شەنشى ئۆلكىلىك 2
-دوختۇرخانىدا جىنسىي كېسەللىك ۋە ئەيدىزنى دا -
ۋالاش بويىچە بىلىم ئاشۇرۇپ قايتىپ كېلىپ، ئاپتو -
نۇم رايونىمىز بويىچە تۇنجى قېتىم تېرە كېسەللىك -
لىرىدىن ئايرىپ چىقىلغان «جىنسىي كېسەللىكلەر
مەخسۇس ئامبۇلاتورىيەسى» نى ئاچقان. 2005-يى -
لى «شىنجاڭ قىزىل لېنتا تورى - شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپ -
تونۇم رايونىنىڭ ئەيدىز-جىنسىي كېسەللىكلەر ئۇ -
چۇر مەنبە تورى» نى قۇرۇپ، رايونىمىزدىكى بوش -
لۇقنى تولدۇرغان. 2006-يىلى ئاپتونۇم رايونلۇق
خەلق دوختۇرخانىسى تېرە-جىنسىي كېسەللىكلەر
بۆلۈمىدە «تېرە كېسەللىكلىرى تاشقى بۆلۈمى»
مەركىزىنى قۇرۇپ چىقىپ، تېرە كېسەللىكلىرىنى
تاشقى بۆلۈم شارائىتىدا داۋالاشنى تۇنجى بولۇپ
شىنجاڭدا يولغا قويغان ۋە ئومۇملاشتۇرغان. 2006
-يىلى دۆلەتلىك تېببىي ھۆسن تۈزەش كەسپى ۋىراج -
لىق سالاھىيىتىگە ئىگە بولغان.

2014-يىلى 1-ئايدا ئۆز ئالدىغا «ئېلزاد دوختۇر
تېرە كېسەللىكلىرى مەخسۇس ئامبۇلاتورىيەسى» نى
قۇرۇپ، 3-ئايدا ئۆز ئىگىلىكىدىكى «شىنجاڭ تېۋىپ
خەلقئارا سودا چەكلىك شىركىتى»، «شىنجاڭ تېۋىپ
يېمەكلىك زاۋۇدى» «ئۈرۈمچى شەھەرلىك تېۋىپ
كەسپىي تېخنىكا تەربىيەلەش مەكتىپى» «شىنجاڭ
تېۋىپ ژۇرنىلى» قاتارلىق ئاپپاراتلارنى بىرلەشتۈ -
رۇپ «ئېلزاد دوختۇر ئاقكېسەل يۈرۈشلۈك شىپالىق -
لىرى، تەڭگە تەمرەتكە شىپالىقلىرى قاتارلىق 17 خىل
مەھسۇلاتنى ئۆز ئالدىغا تەتقىق قىلىپ، ئۆلچەملىك
ئىشلەپچىقىرىپ بازارغا سېلىپ، كىلىنىكىلىق دا -
ۋالاش، كىلىنىكىلىق ئوقۇتۇش، كىلىنىكىلىق مەھ -
سۇلات ياساش بازىسى، كىلىنىكىلىق تەشۋىقات ۋاس -
تىسى قاتارلىقلار ئورگانىك بىرلەشتۈرۈلگەن، غەرب
تېبابىتى، ئۇيغۇر تېبابىتى، جۇڭگو تېبابىتىنىڭ ئەڭ
ئۇنىۋېرسىتېت داۋالاش ئارتۇقچىلىقلىرى قوللىنىلغان، دا -
ۋالاش مۇددىتى قىسقارتىلغان، داۋالاش ئۈنۈمى زور دە -
رىجىدە ئۆستۈرۈلگەن، رايونىمىزدىكى خۇسۇسىي
ئىگىلىكتىكى تۇنجى سىستېمىلاشقان، تېرە كېسەل -
لىكلىرىگە ئۆلچەملىك دىئاگنوز قويۇش-داۋالاش
سىستېمىسىنى قۇرۇپ چىقتى.

ساغلاملىق زور بايلىق

ماركس ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇۋاتقان چاغدا دادىسى يازغان مۇنداق بىر خەت - نى تاپشۇرۇپ ئالدى.

«...سالامەت بولغىن، مول ۋە مەزمۇنلۇق بىلىملەر ئارقىلىق ئەقىل - ئىدراكىڭنى تولۇقلاۋاتقان چېغىڭدا، شۇ نەرسە ئېسىڭدە بولسۇنكى، ساغلام بەدەن ئەقىل - پاراسەتنىڭ مەڭگۈلۈك ھەمراھى، ھەممە ئىشنىڭ ياخشى - يامان بولۇشى ئۇنىڭغا باغلىق. بەدىنى ئاجىز، كېسەلچان ئادەم دۇنيادىكى ئەڭ بەختسىز ئادەمدۇر. شۇڭا، ھەرقانداق ئىشنى سالامەتلىكنىڭ يار بەرگۈدەك ھالەتتە قىل - غىن. ئۇنىڭدىن باشقا، ھەركۈنى بەدەن چېنىقتۇرغىن، تۇرمۇشۇڭدا چەكلىمە بولسۇن، مەن ھەردائىم سېنىڭ ساغلام يۈرۈۋاتقانلىقىڭنى كۆرۈشنى ئارزۇ قىل - لمەن.»

ھېكمەت. ساغلام بەدەن بەختلىك تۇرمۇشنىڭ ئاساسى، شۇنداقلا مۇۋەپپەقىيەت قازىنىشنىڭ ئاساسى، بىراق رېئال تۇرمۇشتا، بەزىلەر ساغلاملىققا ئەھمىيەت بەرمەي، سالامەتلىكنى قۇربان قىلىش بەدىلىگە پۇل ۋە مال - دۈن - ياغا ئېرىشمەكچى بولىدۇ. بۇ ھەقىقەتەن كەم ئەقىل ئادەملەرنىڭ قىلىدىغان ئىشى. بەزىلەر ياش چېغىدا سالامەتلىكنى قۇربان قىلىش بەدىلىگە مال - دۇنيا تاپىدۇ. قېرىغاندا بولسا، پۇل خەجلەپ سالامەتلىككە ئېرىشمەكچى بولىدۇ. ئەمما بۇ مۇمكىن بولمايدىغان ئىش. بىر ئادەم ساغلاملىق ئۈچۈن بەلگىلىك ۋاقىت ئاجراتمىسا، ۋاقىت ئاتا قىلىدىغان خۇشاللىقتىن بەھرە ئالالمايدۇ.

«ھېكمەتلىك ھېكايەتلەر» دىن ئېلىندى

مۇندەرجە


تېببىي ئۇچۇرلار

(4) ساغلاملىق ئۇچۇرلىرى

كىلىنىكىلىق دوكلات

- ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنى ئۇزاق مۇددەت ئىچكەندە نېمىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك..... ھۆرىيەت مەمەت ، ئايخان قۇربان (6) مېڭىگە قان چۈشۈش ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش توغرىسىدا..... ئابلاسىدەخمەت (8) ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. خان ئامىللار ۋە ئۇنى داۋالاش..... پەرھات مامۇت (10) 28 نەپەر بالىياتقۇ بويىنى شەلۋەرگەن بىمارنى ئۇيغۇر تېبابىتىدە ئوزۇن گا. زىدا بۇسلاپ داۋالاشتىن خۇلاسىە ئوغلەم توختى (11) 43 نەپەر بىماردىكى ئۆپكە ياللۇغىنى داۋالاشتىن دوكلات ئابدۇقەيىم مۇسا (13) ئاساسىي قاتلام دوختۇرخانىلىرىنىڭ سوزۇلما سوقۇر ئۈچەي ياللۇغى بىمار. لىرىغا قارىتا قورساق ئىچكى بوشلۇقى ئىچكى بىلەن ۋە قورساقنى ئېچىپ ئوپىراتسىيە قىلىپ داۋالاشنىڭ سېلىشتۇرمىسى نەبىجان تۇرسۇن، مۇتەللىپ ئەخمەت (15) بالىياتقۇ چىقىپ قېلىشنىڭ سەۋەبلىرى ۋە ئۇنى بىر تەرەپ قىلىش مۇنەۋۋەر ئابدۇرېھىم (17) ياشانغان ئاياللار دىكى جىنسىي يول ياللۇغى ۋە ئۇنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سە. ۋەبلەر ئايىمنىسا توختى (19) دورىلىق ئۆسۈملۈكلەرنىڭ سۈپىتى ۋە كىلىنىكىدىكى مۇۋاپىق ئىشلىتىلىش مىقدارى ھەققىدە بۇخەلچەم بارات، ئۆمەر ئابلىز (21) شەرىپىتى كاكىنەچنىڭ ياللۇغلىنىش خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرگە كۆرسە. تىدىغان داۋالاش تەسىرى توغرىسىدا شىرئەلى نۇرمەمەت، زورگۈل مەمتىمىن (23) جىگەرنى زەخمىلەندۈرىدىغان بەزى ئۆسۈملۈك دورىلار ھەققىدە ئۆمەر ئابلىز، بۇخەلچەم بارات (25) يۆتەلنى داۋالاشنىڭ كىلىنىك ئەمەلىيىتىنى كىلاسسىك ئەسەرلەرگە بىر. لەشتۈرۈپ مۇلاھىزە قىلىش ئايگۈل توختى، ھەبىبە ئەكرەم (27) مۇرەككەپ ئەرەقنىڭ سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىش خاراكتېرلىك تېرە كې. سەللىكىنى داۋالاش ئۇنۇمىنى كۆزىتىش تۇرسۇنگۈل ئىلياس، مۇتەللىپ پولات (31) ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىلىرى خام دورىخانىلىرىدا ساقلىنىۋاتقان مەسە. لىلەر توغرىسىدا روشەنگۈل رىشىت، دىلنۇر ئىبراھىم (33) قۇرسى سۆرۈنجاننىڭ ئۈنۈملۈك مۇددىتىنى دەلىللەشتىن خۇلاسىە دىلنۇر ئىبراھىم، ئابدۇۋەز ئابلىخ (36)

ساقلىق ساقلاش



保健 事业

2016 - يىللىق 9 - سان

(ئومۇمىي 225 - سان)

تەھرىر ھەيئەت مۇدىرى

لى شىنخۇا

تەھرىر ھەيئەت مۇئاۋىن مۇدىرلىرى

خالمۇرات غوپۇر، پەرھات كېرەم، يېڭى يۇڭ، ئەر شىدىن مەمەت، تۇرغۇن ئە. مەر، ئىساق ئەخمەتجان، جىياڭ بو، فۇلد. پىن، مامىنخۇي، ئايشەم يۇنۇس، دور. جى، دىلشات ياقۇپ، جۈرئەت كېرەم، تالڭ پېيزو، لىۋ ۋېنشىڭ، ئىسراپىل ئە. بەي، بولات، ئابدۇقەيىم سەمەت، قەي. سەر ئابدۇكېرەم، مۇختەر ئابلىمىت، رەنا قاسىم، ۋېن جېچى، بەي شيا

دائىمىي تەھرىر ھەيئەت ئەزالىرى

مىردان ئابدۇراخمان، ئابدۇرېھىم قادىر، قەلبىنۇر مەمەت، ئايشەم ئاقنىياز، كېرەم ئابدۇرېھىم، پەرھاد بەختى، ئادالەت قا. سىم، ئەبىدۇللا روزى، ئېھسان ئىمىن، سېرىك دۈيسەنباي، مۇختەر خوجا، تۇر. سۇنجان مەمتىمىن، يۇلتۇز قەيۇم، دولقۇن مەمتىمىن، دىلمۇرات سىراجىدىن، ئابلىمىت ئابدۇللا، ئىلىيار شەخىدىن، ھامۇت ئىسمائىل، باتۇر تۇردى، نەبىجان مەھمۇد، مىجىت سايىت

باشقۇرغۇچى ئورۇن
شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى
مەسئۇل ئورۇن
شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى
تەھرىر ھەيئىتى
شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى «ساق»
لىق ساقلاش» ژۇرنىلى بۆلۈمى
باش مۇھەررىر
يىن يۈلىن
مەمەت ياسىن
مەسئۇل مۇھەررىر
يالقۇن ئابدۇسالام
تېلېفون: 2827598 - 0991
مۇئاۋىن مەسئۇل مۇھەررىر
قۇربانجان قادىر، ئىركىن ئالىم
تېلېفون: 2840546 - 0991
جاۋابكار مۇھەررىرى
مەرھابا غاپپار
جاۋابكار كوررېكتورى
چولپان تۇرسۇن
مۇقاۋا لايىھەلىگۈچى
ئىسمايىلجان مۇھەممەت
مۇھەررىرلەر
قۇربانجان قادىر، ئىركىن ئالىم
مەرھابا غاپپار، راھىلە روزى
ئادرېسى: ئۈرۈمچى شەھىرى بۇلاقبېشى
كوچىسى 196 - قورۇ
پوچتا نومۇرى: 830001
ئېلخەت: bjshy@aliyun.com
ئېلان ئىجازەتنامە نومۇرى
6501004000052
شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى
«ساقلىق ساقلاش» ژۇرنىلى بۆلۈمى چى-
قىرىدىغان ئۆلكە دەرىجىلىك نۇقتىلىق
تېببىي ژۇرنال
شىنجاڭ خۇڭتۇ مەتبەئەتچىلىك چەكلىك
مەسئۇلىيەت شىركىتىدە بېسىلدى
جايلاردىكى پوچتخانىلار مۇستەرى
قوبۇل قىلىدۇ
ھەر ئاينىڭ 1 - كۈنى نەشرىدىن چىقىدۇ

دوختۇرخانىنىڭ دورا بۆلۈمىنى باشقۇرۇشتا ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر ۋە
قارشى تەدبىرلەر ئاسىمگۈل ساۋۇت (38)
بالىلار گۈرەن بېزى ياللىغىغا مېڭە پەردە ياللىغى ئەگىشىپ كەلگەندە
..... تۇرسۇن گۈل توختى (41)
ئۆتتە تاش كېسەللىكىنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى ئامىللار
..... غاپپار غۇجىئەخمەت (42)
يۇقىرى قان بېسىم كېسەللىكىنىڭ ئالامەتلىرى ۋە بىمارلار دىققەت قىلىشقا تې-
گىشلىك نۇقتىلار ئابلەت پەتتار (44)
پىلانلىق تۇغۇت تەشۋىق - تەربىيە خىزمىتىنىڭ مۇھىملىقى ۋە ساقلىنىۋاتقان
مەسىلىلەر ئايخان قۇربان، ھۆرىيەت مەمەت (46)

كىلىنىكىلىق پەرۋىش

سەككىگە بىمارلىرىنىڭ ئائىلىدىكى مەشىقى ۋە پەرۋىشى ئۇسۇلى توغرىسىدا
..... مەرھابا ئابدۇقەيۇم (48)
يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى ۋە ئۇنىڭ پىسخىك پەرۋىشى
..... گۈزەلنۇر ئىبراھىم (50)
ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىدە باش يىرىڭلىق تەمرەتكە كېسەللىكىنى پەرۋىش قىلىش
توغرىسىدا رىزۋانگۈل ئابباس (51)
بېھجەت ئۇنىۋېرسال كېسەللىكى بىمارلىرىنى ئۇيغۇر تېبابىتىدە مەخسۇس بۆ-
لۈملۈك پەرۋىش قىلىش تەدبىرلىرى توغرىسىدا ... رەيھانگۈل تۇرسۇن (54)

جىنسىي كېسەللىكلەر ۋە ئەيدىز

ئەيدىزگە مۇناسىۋەتلىك ئون ئاساسىي بىلىم ۋە ئون ئالاقىدار
ئۇچۇر (57)

قان مېيى، بېسىمى، شېكىرى يۇقىرىلار

يۇقىرى ياغلىق قان كېسەللىكىنىڭ كىلىنىكىلىق ئىپادىسى قانداق بولىدۇ؟ ...
..... (60)
قان بېسىم دورىسىنى ئازايتىپ توختىتىشتا ئېھتىيات قىلىش كېرەك (61)
دىيابېتتا يۇقۇملانغان قايىسى ئەزالاردا ئاسان كۆرۈلىدۇ (52)

پەسىل ۋە كۈتۈنۈش

كۈز پەسىلىدىكى كۈتۈنۈشتە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار (63)

ئانا - بالىلار ساقلىقى

چوڭ ياشتا ئىككىنچى بالىسىنى تۇغقانلار ئوزۇقلۇققا دىققەت قىلىشى كېرەك
..... (65)
ئوخشىمىغان ياش قاتلامدىكى بالىلارنىڭ زۇكامداپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئې-
لىش ئۇسۇلىمۇ ئوخشىمايدۇ (66)
بالىلار چىشىنىڭ رەتسىز ئۆسۈپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئامىللار
قايسىلار؟ (67)

كۆكنۈر سەيناسى

شىنجاڭ كۆكنۈر يۇقىرى تېخنىكا ئېچىش ھەمسىدارلىق شىركىتى
..... (68)

ساغلاملىق ئۇچۇرلىرى

چە، گەرچە بۇنىڭ ئىچىدىكى بەزى تاللاشلار پەقەت ئىقتىسادىي شارائىتى ياخشى كىشىلەرگىلا ماس كەلسىمۇ، ئەمما، نا- ھايىتى كىچىك ئىشلار ئارقىلىقمۇ تۇرمۇشتا زور ئۆزگىرىش ياسىغىلى بولىدىكەن، كۆپرەك دەم ئېلىش ۋاقتىنىڭ بولۇشى كۆپ پۇلى بولۇشقا قارىغاندا كىشىنى بەكرەك خۇشال قىلىشى مۇمكىن ئىكەن.

ۋىتامىن D قانچە كۆپ بولسا شۇنچە ياخشىمۇ؟
شۈبھىتسىزلىرىنىڭ بىر تۈرلۈك تەتقىقاتىدا كۆرسىتىلگەن شىچە، ۋىتامىن D نى زىيادە مىقداردا قوبۇل قىلسا، ئىككى پۈتۈنلۈك ئىقتىدارىنى ئۈزۈكسىز كۈچەيتىمەي، ئەكسىچە يا- شانغانلار كېسەللىكنىڭ پەيدا بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن ئىكەن.

تەتقىقاتچىلار يېقىنقى بىر يىلدىن بۇيان ئاز دېگەندە بىر قېتىم جاراھەتسىز كېسەللىككە گىرىپتار بولۇپ باققان 70 ياش ئەتراپىدىكى ئەر ۋە ئاياللارنى ئىختىيارىي تەكشۈرۈپ، ئۇلارنىڭ ھەر ئايدىكى ۋىتامىن D نى قوبۇل قىلىش مىقدارىنىڭ نورمال مىقداردىن ئىككى ھەسسە ئارتۇق ئىكەنلىكىنى بايقىغان. بۇنىڭ ئىچىدە ۋىتامىن D نى سۈمۈرۈش مىقدارى بىر قەدەر يۇقىرى بولغان كىشىلەرنىڭ پۇتلىرىنىڭ كۈچى كۆرۈنەرلىك ئاشمىغان، ئەمما كېسەل بولۇش نىسبىتى كۆ- رۈنەرلىك يۇقىرىلىغان.

تەتقىقاتچىلارنىڭ ئېيتىشىچە، بۇ ۋىتامىن D نىڭ سۈمۈ- رۈلۈشى قانچە كۆپ بولسا شۇنچە ياخشى بولمايدىغانلىقىنى چۈشەندۈرىدىكەن، تەتقىقات سانلىق مەلۇماتلىرىدىن قارىغاندا، ھەر ئايدا 24000 مىقداردىكى ۋىتامىن D سۈمۈرۈلسە، ياشانغانلار ئۈچۈن ئەڭ مۇۋاپىق ئىكەن. ئەلۋەتتە، ۋىتامىن D نىڭ سۈمۈرۈلۈشىنى قارىغۇلارچە ئازايتىشقا بولمايدۇ. تەك- شۈرۈشكە ئاساسلانغاندا، ياشانغانلار ئىچىدە ۋىتامىن D نىڭ سۈمۈرۈلۈش مىقدارى ئۆلچەمگە يەتمەيدىغانلارمۇ يېرىمىنى ئىگىلەيدىكەن.

بېسىم- دىيابېت بىمارلىرىنىڭ يۈرەك- قان تومۇر كې-

بەخت تۇيغۇسى مال- دۇنيادىن كەلمەيدۇ
يېقىنقى بىر تۈرلۈك پىسخولوگىيەلىك تەتقىقاتتىن ئىسپاتلىنىشىچە، ۋاقىتنى قەدىرلەش، مال- دۇنياغا بەك ئەھمىيەت بېرىپ كەتمەسلىك كىشىلەرنىڭ بەخت تۇيغۇسى- نى كۈچەيتىدىكەن.

تەتقىقاتچىلار قۇرامىغا يەتكەن بىر قىسىم كىشىلەرنى تەكشۈرگەن بولۇپ، بەزى تەكشۈرۈشلەردە رېئال دۇنيادا دۇچ كېلىش مۇمكىنچىلىكى بولغان مەسىلىلەرنى قوللانغان، مە- سىلەن: قاتناشقۇچىدىن باھاسى ناھايىتى يۇقىرى ئەمما خىزمەت ئورنىغا يېقىن تۇرالغۇ سېتىۋېلىشنى ياكى باھاسى تۆۋەن، ئەمما خىزمەت ئورنىغا يىراق تۇرالغۇ سېتىۋېلىشنى خالايدىغانلىقى، خىزمەت ۋاقتى ئۇزۇن، ئەمما مائاشى يۇقىرى خىزمەتنى تاللايدىغانلىقى ياكى خىزمەت ۋاقتى قىسقا ئەمما مائاشى تۆۋەن خىزمەتنى تاللايدىغانلىقى سورالغان. تەتقىقات نەتىجىسىدىن كۆرسىتىلىشىچە، ۋاقىت ۋە مال- دۇنياغا ئەھ- مىيەت بېرىدىغان كىشىلەرنىڭ سانى ئاساسەن دېگۈدەك ئوخشاش بولۇپ، ۋاقىتقا بەكرەك ئەھمىيەت بېرىدىغانلار سەل كۆپرەككەن. ياشلارغا سېلىشتۇرغاندا، بىر قەدەر چوڭراق ياشتىكىلەر ۋاقىتقا بەكرەك ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن. كىشىلەرنىڭ ۋاقىتنى قەدىرلەش ۋە تېخىمۇ كۆپ پۇل تېپىشتىن ئىبارەت بۇ ئىككى ئىشقا نىسبەتەن بىر قەدەر تۇراقلىق مايىللىقى بار بولۇپ، تەتقىقات نەتىجىسىدىن بايقى- لمىشىچە، ۋاقىتنى بەكرەك قەدىرلەيدىغان كىشىلەر تېخىمۇ بەختلىك بولىدىكەن.

ئەگەر كىشىلەر زېھنىنى پۇل تېپىشقا ئەمەس، بەلكى ۋا- قىتنى قانداق قىلىپ قەدىرلەشكە تېخىمۇ بەك سەرپ قىل- ماقچى بولسا، ئۇلار بەزى تەدبىرلەرنى قوللىنىپ بەزى ئۆزگىرىشلەرنى ياسايدۇ، مەسىلەن: خىزمەت ۋاقتىنى سەل- پەل قىسقارتىش، ئائىلە مۇلازىمىتى ئورۇنلىرىغا پۇل تۆلەپ ئۆيىنى تازىلىتىش ياكى ساخاۋەت ئورۇنلىرىغا بېرىپ پىدا- ئىي بولۇش قاتارلىق. تەتقىقاتچى خادىملارنىڭ كۆرسىتىشىدە-

سەللىكى خەۋپنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ

يېقىندا ئامېرىكا تەتقىقاتچىلىرىنىڭ بايقىشىچە، دىيابېت بىمارلىرى باشقا كىشىلەرگە قارىغاندا بېسىمنىڭ ھەتتا ئەسەيلىشىش كېسىلىنىڭ دەخلىسىگە تېخىمۇ ئاسان ئۇچرايدىكەن، بۇ روھىي ساغلاملىق مەسىلىلىرى بولسا ئۇلاردىكى يۈرەك-قان تومۇر كېسەللىكلىرى خەۋپنىڭ ئېشىشىغا مۇناسىۋەتلىك ئىكەن. ئازادە، خۇش كەيپ يۈرىدىغان كىشىلەرگە سېلىشتۇرغاندا، بېسىم ۋە ئەسەيلىشىش كېسىلىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان دىيابېت بىمارلىرىنىڭ يۈرەك كېسىلى بىلەن ئۆلۈش خەۋپى ھەسسىلەپ ئاشىدىكەن.

روھىي ساغلاملىق مەسىلىلىرىنىڭ دىيابېت بىمارلىرىغا كەلتۈرىدىغان تەسىرىنى كۆزىتىش ئۈچۈن، تەتقىقات ئەترىتى 22000 نەپەر قۇرامىغا يەتكەن كىشىنىڭ سانلىق مەلۇماتلىرىنى تاللىغان بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە 4100 نەپەر دىيابېت بىمارى بار. بۇ قاتناشقۇچىلارنىڭ ئوتتۇرىچە يېشى 64 ياش، ئاياللار 60%. ئانالىز نەتىجىسىدىن كۆرسىتىلەنچە، روھىي ساغلاملىق مەسىلىسى مەۋجۇت بولمىغان دىيابېت بىمارلىرىغا سېلىشتۇرغاندا، بېسىمى زىيادە يۇقىرى ياكى ئەسەيلىشىش كېسىلى بار دىيابېت بىمارلىرىنىڭ يۈرەك-قان تومۇر كېسەللىكى سەۋەبىدىن ئۆلۈش خەۋپى 53% يۇقىرى بولىدىكەن، ھەر ئىككىسى تەڭ مەۋجۇت بولغان دىيابېت بىمارلىرىنىڭ بۇ خىل خەۋپى بولسا ھەسسىلەپ ئاشىدىكەن. دىيابېت كېسىلى بولمىغان بىمارلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، ئۇلار زور بېسىمغا ئۇچرىغان ياكى ئەسەيلىشىش كېسىلىگە گىرىپتار بولغان ۋاقىتتىمۇ يۈرەك-قان تومۇر كېسەللىكىنىڭ خەۋپى ئوخشاشلا يۇقىرىلايدۇ.

تەتقىقاتچى خادىملارنىڭ قارىشىچە، دىيابېت بىمارلىرى قان شېكېرىنى كۆزەتكەندىن باشقا، ۋاقىتتا دورا يەپ، قان بېسىمى، خولېستېرىن، پۇت يارىسى ۋە بۆرەك ئىقتىدارى قاتارلىق جەھەتلەرگە ئەھمىيەت بېرىشى، شۇنداقلا يەنە بېسىم ۋە ئەسەيلىشىش دەرىجىسىگە قارىتا شاللاپ تەكشۈرۈش قىلىپ تۇرۇشى لازىم، چۈنكى بۇ يۈرەك كېسىلىنىڭ قوزغىلىشىدىكى مۇستەقىل تەسىرچان ئامىل بولۇشى مۇمكىن.

ئەمگەك ۋە ئارام ۋاقتى ساغلاملىقنى بەلگىلەيدۇ

كورېيە ئالىملىرىنىڭ تەتقىقاتىدىن ئىسپاتلىنىشىچە، ئادەمنىڭ تاشقى قىياپىتى ۋە ساغلاملىق ئەھۋالى ئۇنىڭ ئەمگەك ۋە ئارام ۋاقتى تەرىپىدىن بەلگىلىنىدىكەن.

تەتقىقاتچىلار 1600 نەپەر پىدائىيىنى تەتقىقاتقا قاتنىشىشقا تەكلىپ قىلغان بولۇپ، ئۇلارنىڭ يېشى 47 ياشتىن 59 ياش ئارىلىقىدا. تەتقىقاتچىلار ئەمگەك ۋە ئارام ۋاقتىغا

ئاساسەن، پىدائىيلارنى 3 گۇرۇپپىغا بۆلگەن، يەنى كەچ ئۇخلاپ، ۋاقىت تۇرىدىغان «كېچە مۇشۇكى» گۇرۇپپىسى، بالادۇر ئۇخلاپ، بالدۇر تۇرىدىغان «سەھەرچىلەر» گۇرۇپپىسى ۋە مۇقىم ئەمگەك ۋە ئارام ۋاقتى بېكىتىلمىگەن گۇرۇپپا قاتارلىقلار. نەتىجىدىن بايقىلىشىچە، «كېچە مۇشۇكى» گۇرۇپپىسىدىكىلەردە دىيابېت بىمارلىرى كۆپرەك كۆرۈلگەن يەنە كېلىپ ئۇلار مۇسكۇل ئازىيىش كېسىلىگە تېخىمۇ ئاسان گىرىپتار بولىدىكەن. گەرچە ئۇلارنىڭ ئەمگەك ۋە ئارام ۋاقتىنى ساغلام دېگىلى بولمىسىمۇ، ئەمما سىرتقى قىياپىتى «سەھەرچىلەر» دىن ياخشىراق كۆرۈنىدىكەن. «سەھەرچىلەر» گۇرۇپپىسىدا بولسا، ئاياللارنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇش جەريانى ئاسانلا بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرايدىكەن، ئۇلار يۈرەك-مېڭە قان تومۇر كېسەللىكىگە تېخىمۇ ئاسان گىرىپتار بولىدىكەن.

كەلگۈسىدە، ئالىملار ئادەمنىڭ ساغلاملىقى بىلەن ئەمگەك ۋە ئارام ۋاقتىنىڭ مۇناسىۋىتىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ تەتقىق قىلىدىكەن.

قالقانبەز سېلىنغان ئەڭ ئامراق ئەزا

سېلىن ئادەم تېنى ئېھتىياجلىق بولغان بىر خىل مىكرورېئېلېمېنت بولۇپ، ئەركىن رادىكاللارنى تازىلاپ، ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇپ، بەدەننىڭ مېتابولىزىمنى تەنشىدۇ، زەھەرلىك ماددىلارغا تاقابىل تۇرىدۇ ۋە كۆپىيىش ئىقتىدارىنى ياخشىلايدۇ. قالقانبەز ئادەم تېنىدىكى سېلىن مىقدارى ئەڭ يۇقىرى توقۇلما. ئادەم تېنىدىكى قالقانبەز ھورمۇنىنىڭ بىرىكىشى ۋە رولىنى جارى قىلدۇرۇشى سېلىن ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدۇ، سېلىن يەنە قالقانبەز ئىچكى ھۈجەيرە پەردىسىنىڭ مۇكەممەللىكىنى ساقلايدۇ، ئۇ خۇددى يودقا ئوخشاشلا مۇھىم. يود بولمىسا قالقانبەز ھورمۇنى بىرىكمەيدۇ؛ سېلىن بولمىسا، گەرچە قالقانبەز ھورمۇنى بىرىككەن تەقدىردىمۇ، ئەمما ھورمۇننىڭ بىرىكىش سۈرئىتى ۋە قۇرۇلما مىقدارى بەزى ئۆزگىرىشلەر بولۇپ، ئۇنىڭ رولىغا تەسىر يەتتىدۇ. نۆۋەتتىكى ئىلىم ساھەسىنىڭ تەتقىقاتىغا ئاساسلانغاندا، سېلىن قالقانبەز كېسەللىكلىرى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىكەن، بولۇپمۇ ئۆز بەدەن ئىممۇنىتېتى خاراكتېرلىك قالقانبەز كېسەللىكلىرى تېخىمۇ شۇنداق. مەيلى ھامىلىدارلار بولسۇن ياكى ئادەتتىكى كىشىلەر بولسۇن، سېلىن كەم بولسا قالقانبەز ئۆز بەدەن ئىممۇنىتېتى خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولۇش نىسبىتى يۇقىرى بولىدۇ.

راھىلە روزى تەرجىمىسى

ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنى ئۇزاق مۇددەت ئىچكەندە

نېمىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك

ھۆرىيەت مەمەت ، ئايخان قۇربان (839000)

(قومۇل شەھەرلىك پىلانلىق توغۇت تەشۋىقات پۈنكىتى)

(قومۇل شەھەرلىك تەڭرىتاغ يېزا پىلانلىق توغۇت ئىشخانىسى)

ساغلام، ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنى ئىچىپ، ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىشنى خالايدىغانلىكى ئاياللار، جۈملىدىن يېڭى توي قىلغان، بوغۇش ئوپىراتسىيىسى، ئۈزۈك سالدۇرۇش مۇۋاپىق كەلمەيدىغان ياكى باشقا ئۇسۇللار ئارقىلىق ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىشنى مەغلۇپ بولغان ئاياللارغا مۇۋاپىق كېلىدۇ.

2. ئىچىلىدىغان ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرى مۇۋاپىق كەلمەيدىغان كىشىلەر

تۆۋەندىكى ئەھۋالدىكىلەر ئىشلەتمەسلىك ياكى ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش كېرەك: ① ئۆتكۈر ۋە سوزۇلما خاراكتېرلىك جىگەر ياللۇغى، بۆرەك ياللۇغى، قان تومۇر نۆكچە تىقىلمىسى شەكىللەنگەن تومۇر ياللۇغى بارلار ئىشلەتمەسلىك كېرەك؛ ② يۈرەك كېسىلى، قان تولۇش خاراكتېرلىك يۈرەك ئىقتىدارى زەئىپلىشىش كېسىلى تارىخى بارلار ئىشلەتمەسلىك كېرەك؛ ③ بىرلەمچى خاراكتېرلىك يۇقىرى قان بېسىمى بارلار دوختۇرنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئىشلىتىش، دورا ئىچىۋاتقان مەزگىلدە قان بېسىمى يۇقىرىلاپ كەتسە، دورىنى توختىتىپ كۆزىتىش كېرەك؛ ④ ئىچكى ئاجراتما كېسەللىكى، مەسىلەن: دىئابېت كېسىلى، قانقانبەز ئىقتىدارى كۈچىيىپ كېتىش كېسىلى بارلار ۋاقىتنىچە ئىشلەتمىگەن مۇۋاپىق؛ ⑤ دورا ئىشلىتىۋاتقاندا باشنىڭ بىر تەرىپى ئاغرىسا ياكى باش سىجىل ئاغرىسا، دورىنى توختىتىپ كۆزىتىش كېرەك؛ ⑥ بالىياتقۇ مۇسكۇل ئۆسمەسى، يامان سۈپەتلىك ئۆسمە ياكى رايونالدىنقى ئۆزگىرىش بارلار ئىشلەتمەسلىك كېرەك؛ ⑦ ئۆپكە تۈپىر كۈليوز كېسەلى بارلار ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش كېرەك؛ ⑧ بالا ئېمىتىۋاتقانلار ئىشلەتمەسلىك كېرەك؛ ⑨ روھىي كېسىلى بارلار ياكى نېرۋىدىن ئاداشقانلار دورا ئىشلىتىش ۋاقتى ۋە مىقدار

پىلانلىق توغۇت ئۈچۈن، سۈپەتلىك مۇلازىمەت قىلىش خىزمىتى بىلەن جىنسىي ساغلاملىق مۇلازىمىتىنىڭ چوڭقۇر قانات يايدۇرۇلۇشىغا ئەگىشىپ، پىلانلىق توغۇت دورا - سايمانلىرى خەلق تۇرمۇشىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈشتە كەم بولسا بولمايدىغان بولۇپ قالدى. بۇ ماقالىدە ئاساسلىق ئاياللار ئىشلىتىدىغان ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرى ئىچىدىكى ئۇزاق ئۈنۈملۈك ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرى سۆزلىنىدۇ.

ئاياللار ئىشلىتىدىغان ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرى ئاساسەن سۈنئىي بىرىكتۈرۈلگەن ئانلىق ھورمون ۋە ھامىلىدارلىق ھورموني، يەنى سىتېروئىدلىق ھورموندىن ياسالغان بولۇپ، ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش رولىغا ئىگە. يەنى: ① تۇخۇمداننىڭ تۇخۇم ئىشلەپچىقىرىشىنى تۈرمۇزلايدۇ؛ ② بالىياتقۇ ئىچكى پەردىسىنىڭ قېلىنلىشىغا ۋە ئاجزالما ئاجرىتىشىغا تەسىر كۆرسىتىپ، ئۇرۇقلانغان تۇخۇمنىڭ ئورۇنلىشىشىنى چەكلەيدۇ؛ ③ بالىياتقۇ بويىنى شىللىق سۇيۇقلۇقنىڭ خاراكتېرىنى ئۆزگەرتىپ، ئۇرۇقنىڭ ئۆتۈشىنى توسايدۇ؛ ④ تۇخۇم ئۆتكۈزۈش نەيچىسىنىڭ لۆمۈلدىشىگە توسقۇنلۇق قىلىپ، ئۇرۇقلانغان تۇخۇمنىڭ ئورۇنلىشىشىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ؛ ⑤ ئۇرۇقنىڭ قۇۋۋەتكە ئىگە بولۇشىنى تۈرمۇزلايدۇ؛ ⑥ سېرىق تەن ھورموني نىڭ بىرىكىشىنى تۈرمۇزلايدۇ؛ ⑦ ئۇرۇقنى ئۆلتۈرۈپ، تۇخۇمنىڭ ئۇرۇقلىنىشىنى توسايدۇ.

1. ئىچىلىدىغان ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنىڭ ئارتۇقچىلىقى ۋە مۇۋاپىق كېلىدىغان كىشىلەر

ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنىڭ ئۈنۈمى ئىشەنچلىك، ناچار تەسىرى ئاز، جىنسىي تۇرمۇشقا ۋە تۇغۇت ئىقتىدارىغا تەسىر يەتكۈزۈلمەيدىغان بولۇپ، بەدىنى

ياللار ئۈچۈن ئېيتقاندا، ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنىڭ تەركىبىدىكى ھورمون مىقدارىنىڭ كۆپ بولۇپ كېتىشى ياكى ئاز بولۇپ قېلىشى سەۋەبىدىن مۇناسىپ ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. ئۇلار تۆۋەندىكىچە:

(1) ھامىلىدارلىقنىڭ دەسلەپتىكى ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ. مەسىلەن: كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىشتىھاسى تۈتۈلۈش، باش قېيىش، ماغدۇر سىزلىنىش، ئۇيقۇسىراش قاتارلىقلار. بۇنداق ئالامەتلەر ئادەتتە دورا ئىشلىتىپ 12 سائەتتىن كېيىن كۆرۈلىدۇ.

بىر تەرەپ قىلىش ئۇسۇلى: ① ناچار تەسىرىنى تور-مۇزلاش تابلېتىنى ھەر قېتىمدا بىر تابلېتتىن، كۈنىگە ئۈچ قېتىم، ئۇدانە چىچە كۈن ئىچىدە، بۇنداق ئالامەتلەر يېنىكلەيدۇ ياكى يوقىلىدۇ؛ ② ۋىتامىن B₆، ۋىتامىن C، ياستى تابلېتى (酵母片) قاتارلىقلارنى ئىچىش كېرەك.

(2) ھەيز توختاش: ئۇزاق ئۈنۈملۈك ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىسىنى ئىچىۋاتقان مەزگىلدە ھەيز توختاپ قالسا، دوختۇرغا تەكشۈرۈپ بويىدا قالمىغانلىقى ئىسپاتلانغاندىن كېيىن، داۋاملىق ئىچىش كېرەك. ئەگەر ھەيز توختاپ قېلىش ۋاقتى بەك ئۇزۇرپ كەتسە ياكى باشقا كېسەللىكلەر قوشۇلۇپ كەلسە، دورىنى توختىتىش ھەم باشقا ئۇسۇللار ئارقىلىق، ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش ھەيزنىڭ ئەسلىگە كېلىشىنى كۈتۈش، ئەگەر ئۈچ ئايغىچە ئەسلىگە كەلمىسە دوختۇرغا كۆرۈنۈش كېرەك.

(3) ئاق خۇن كۆپىيىپ كېتىش: ئائىلىق ھورموننىڭ ئېشىپ كېتىشى بايياتقۇ بويىنى شىللىق سۇيۇقلۇقنىڭ ئاجرىلىشىنى كۆپەيتىۋېتىدۇ. ئاق خۇن توختىتىش تابلېتى ئىچىش ئارقىلىق ئائىلىق ھورموننىڭ ئىشلىنىش مىقدارىنى ئازايتىش كېرەك.

(4) ئەمچەك چىڭقىلىپ ئاغرىش ۋە ئەمچەكتە مونەك پەيدا بولۇش: بەدەن ئېغىرلىقى روشەن ھالدا ئۆزۈلۈكسىز ئېشىپ كەتكەنلەر دورىنى توختىتىپ، باشقا ئۇسۇللار ئارقىلىق ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش ھەم داۋاملىق كۆزىتىشى كېرەك.

(5) بەدەن ئېغىرلىقى ئېشىپ كېتىش: بەدەن ئېغىرلىقى زىيادە ئېشىپ كەتكەنلەر دورىنى توختىتىپ، باشقا ئۇسۇللار ئارقىلىق ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش كېرەك.

رىنى ئىگىلىيەلمەيدىغانلىقى ئۈچۈن، ئىچىلىدىغان ئۇزاق ئۈنۈملۈك ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنى يولدىشى ئىچكۈزۈپ قويۇش ياكى ئۇزاق ئۈنۈملۈك ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش ئوكۇلىنى ئۇرغۇزۇپ قويۇش كېرەك.

3. ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنى ئۇزاق مۇددەت ئىچكەندە نېمىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك

(1) ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنى ئۇزاق مۇددەت ئىچكەندە، ئاز ساندىكى ئاياللارنىڭ قان بېسىمىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇڭا، ئۇنى بالدۇر بايقاش ئۈچۈن، دورا ئىچىشتىن ئىلگىرى قان بېسىمىنى ئۆلچىتىش، دورا ئىچىۋاتقان مەزگىلدە قەرەللىك تەكشۈرۈپ تۇرۇش لازىم.

(2) دىئابېت كېسەلى ئائىلە تارىخى بارلار ئەڭ ياخشىسى دورا ئىچىشتىن ئىلگىرى ياكى دورا ئىچىپ ئۈچ ئايدىن كېيىن، بىر قېتىم گىلوگوزغا چىدامچانلىقىنى ئۆلچەش سىنىقى ئىشلىتىش، دورا ئىچىۋاتقان مەزگىلدە يىلدا بىر قېتىم تەكشۈرۈپ تۇرۇش لازىم.

(3) ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىسىنى ئۇزاق مۇددەت ئىچىدىغان ئاياللار ئەڭ ياخشىسى تاماكا چەكمەسلىكى لازىم. چۈنكى مەلۇماتلاردىن قارىغاندا، تاماكا چېكىدىغان ئاياللار ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنى ئىچسە، قان ئۆكچىسى پەيدا بولۇش نىسبىتىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. كەن.

(4) ئۇزاق مۇددەت دورا ئىچىشنىڭ تۇخۇمدان ئىقتىدارىنى بالدۇر زەئىپلەشتۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، 45 ياشتىن ئاشقان ئاياللار ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىسى ئىچمەسلىكى كېرەك.

(5) تۇغماقچى بولغاندا، ئەڭ ياخشىسى دورىنى توختىتىپ يېرىم يىلدىن كېيىن ھامىلىدار بولۇش، دورا ئىچىشنى توختاتقان مەزگىلدە ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىشنىڭ باشقا تەدبىرلىرىنى قوللىنىش لازىم. ئۇنىڭدىن باشقا، ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنى ياخشى ساقلاش، نەملىشىپ پارچىلىنىپ كېتىشتىن ۋە بالىلار يەپ سېلىپ، تاسادىپىيلىقلارنىڭ يۈز بېرىشىدىن ساقلىنىش لازىم.

4. ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنى ئىشلەتكەندە كۆرۈلىدىغان ناچار تەسىرلەر ۋە بىر تەرەپ قىلىش ئۇسۇلى

ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرىنىڭ ناچار تەسىرلىرى ئادەتتە كۆرۈنەرلىك بولمايدۇ. ئەمما، بەزى ئا-

مېڭىگە قان چۈشۈش ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش توغرىسىدا

ئابلاسىدىنئەخمەت (845100)

(گوما ناھىيەلىك خەلق دوختۇرخانىسى تاشقى كېسەللىكلەر 1-بۆلۈمى)

خيالىي ھەۋەسلىرى كۆپ، مۇزىكىدىن ھۇزۇرلىنىشنى بىل-
مەيدىغان ياكى خالىمايدىغان، جاھىل، بەك ئىچىمچەز، ئا-
سان قېيىدىغان، تۇرمۇشى تەرتىپسىز، كۈتۈنۈشى ناچار،
قالايمىقان دورا يەيدىغان، تاماقنى جىق يەيدىغان، ئالدىراڭ-
غۇ، تېز ھەم ئوڭاي ئاچچىقلىنىدىغان، جىدەلخور، خامۇش،
جىمغۇر، مىسكىن يۈرۈيدىغان، ئىجتىمائىي ماسلىشىشچان-
لىقى ۋە روھىي تەڭپۇڭلۇقى تۆۋەن، باردى - كەلدىسى بەك
كۆپ ياكى بەك ئاز، ئۇنىڭ - بۇنىڭدىن، ۋەزىيەتتىن قېي-
داش، ئاغرىنىشى ئېغىر ۋە ھەرىكەتنى ئانچە خالىمايدىغان
ئادەملەردە يۇقىرى قان بېسىمى ۋە مېڭىگە قان چۈشۈش
نەسبىتى، ھەتتا ئۆسمە كېسەللىكلەرمۇ بىر قەدەر يۇقىرى بو-
لىدۇ. مېڭىگە قان تومۇرلىرىنىڭ يېرىلىشى يەنە يۈرەك، ئۆپكە،
بۆرەك، تال قاتارلىق ئەزالىرى ئاجىزلاشقانلاردا، دىئابىت
كېسىلى بارلار، بويۇن - بەل ئومۇر تەقىسىدا ئۆسمە بارلاردا
كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. ئاياللارغا قارىغاندا ئەرلەردە كۆپ بولىدۇ.

2. مېڭىگە قان چۈشۈشنىڭ ئۆتكۈر ياكى ئاسان يۈز
بېرىش پەيتلىرى: ئەتىياز پەسلىدە تېمپېراتۇرا ئۆرلەش، ھا-
ۋا قۇرغاقلىشىش، بەدەن سۇسىزلىنىپ ماغدۇر سىزلىنىشتىن
قان قويۇلۇپ، مېڭىگە قان چۈشۈش كۆپرەك يۈز بېرىدۇ.
يەنە زىيادە جىددىي ھەرىكەت قىلغاندا، زىيادە چارچىغاندا،
كەيپىيات جىددىيەلەشكەندە، ھاراقىتىن مەست بولغاندا،
ئۇخلىغاندا، بەدەنگە سوغۇق تېگىپ قالغاندا ياكى چۈشى
بۇزۇلغاندا، تولا تەشۋىشلەنگەن ۋە ئۈمىدسىزلەنگەندە، قات-
تىق يۆتەلگەندە، بىردىنلا تېز، كۈچلۈك ھەرىكەت قىلغان
چاغلاردا مېڭىگە قان چۈشۈش ئاسان يۈز بېرىدۇ.

3. مېڭىگە قان چۈشۈشنىڭ بېشارەتلىرى: ئىنكاسى
ئاستىلاش، ھېسابلاش ۋە ھۆكۈم قىلىش ئىقتىدارى تۆۋەن-

مېڭىگە قان تومۇرلىرىنىڭ يېرىلىپ، مېڭىگە توقۇلمىلى-
رىغا قان چۈشۈش مېڭىگە قان چۈشۈش دەپ قارىلىدۇ.
كىلىنىكىدا ئىچكى خالتىغا قان چۈشۈش، چوڭ مېڭى ئىچكى
نېرۋا تۈگۈنى قاناش، مېڭى غولى قاناش، مېڭى قېرىنچىسى
قاناش، كىچىك مېڭىگە قان چۈشۈش، چوڭ مېڭى پېشانە
بۆلىكى قاناشلار نەسبەتەن كۆپ كۆرۈلىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە
تەسەرەك ئەسلىگە كېلىدىغان ھەم خەتەرى چوڭراق بولغىنى
مېڭى غولى قاناش، ئىچكى خالتىغا قان چۈشۈش، مېڭى قې-
رىنچىسىغا قان چۈشۈشتىن ئىبارەت.

1. مېڭىگە قان چۈشۈش ئېھتىماللىقى يۇقىرى كىشە-
لەر: بالىلارنىڭ قان تومۇرلىرىنىڭ ئېلاستىكىلىقى ئالاھىدە
ياخشى بولغاچقا، بېسىمغا ئۇچرىسا مېڭى قىل قان تومۇرلىرى
دەر ھال كېڭىيىپ ئاسانلىقچە يېرىلىمايدۇ. ياشلارنىڭ قان
تومۇرلىرى يېرىلىپ قاناش ھادىسىسى يۈز بەرسىمۇ، قاناش
مىقدارى ئاز، قاننىڭ سۈمۈرۈلۈشى تېز بولغانلىقتىن، كۆ-
پىنچە خەتەرى چوڭ بولمايدۇ. ئەمما ياشنىڭ چوڭىيىشىغا
ئەگىشىپ قان تومۇرلىرىنىڭ كېڭىيىشچانلىقى ئاجىزلاپ،
بەدەننىڭ قارشىلىق كۈچى تۆۋەنلەيدىغان بولغاچقا، مېڭى
قان تومۇرلىرىنىڭ قاناش تەكرارلىقى يۇقىرى، چىققان قان-
نىڭ سۈمۈرۈلۈشى ئاستا بولغانلىقتىن، مېڭى قان تومۇرلىرى
قاناشنىڭ خەتەرى چوڭ بولىدۇ.

سېمىز كىشىلەردە ئاساسلىقى ياغ كۆپ بولۇش، نە-
پەس راۋان بولماسلىقتىن، زىيادە ئورۇق كىشىلەردە قان تو-
مۇرلارغا ئوزۇقلۇق ئاقسىلى ۋە خولېستېرىن يېتىشمىگەنلىك-
تىنمۇ قان تومۇرلىرىنىڭ كېڭىيىشچانلىقى ياخشى بولماي قان
بېسىمى ئۆرلەپ كېتىدۇ. شۇڭا، خولېستېرىن ئېھتىياجىدىن
ئېشىپ كەتسە ياكى كەملەپ كەتسىمۇ، ئوخشاشلا يۇقىرى
قان بېسىمىنى پەيدا قىلىدۇ. ئۇنىڭدىن سىرت، زىددىيەتلىك

ھاۋاسى ياخشى بولماسلىق سەۋەبىدىن بۇرۇن بوشلۇقى بىلەن مېڭە بوشلۇقىنىڭ ھاۋا ئالماشتۇرۇشى توسقۇنلۇققا ئۇچراپ، مېڭە ئىچكى بېسىمى ئېشىپ كېتىش، روھىي زەربە قاتارلىقلارنىڭ تەسىرىدىنمۇ مېڭە قىل قان تومۇرلىرى ئوخشىمىغان دەرىجىدە يېرىلىپ، مېڭىگە قان چۈشىدۇ ۋە ئېغىرلىشىدۇ.

5. مېڭىگە قان چۈشۈشنىڭ ئالدىنى ئېلىش:

(1) ناچار ئادەتلەرنى ئۆزگەرتىش، زىيادە چارچاشنى ساقلىنىش، كۆڭۈلنى بىئارام قىلىدىغان ئىشلارنى ئىمكانىيەتنىڭ بارىچە ئويلىماسلىق ۋە ئىچىگە ئېلىپ كەتمەسلىك، قېنىپ ئۇخلاشقا ئادەتلىنىش، يېڭىلىققا ئىنتىلىپ قىزىقىشنى ۋە مەنىۋى تۇرمۇشنى موللاشتۇرۇش، مېڭىنى جىقراق ئىشلىتىش، ئۈمىدۋار، كەڭ قورساق بولۇپ، ئىرادىسىنى چىڭىتىش، مۇمكىنقەدەر خۇشال، كۆتۈرەڭگۈ، تەرتىپلىك ياشاش، ھەرىكەت مىقدارىنى كۆپەيتىپ چىدامچانلىقنى، ئىشەنچنى ئاشۇرۇش، قەتئىي، جۈرئەتلىك، ھەرىكەتچان بولۇش قاتارلىقلار مېڭە قاناش ۋە قان تومۇر توسقۇنلۇقىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنىڭ ئالدىنقى شەرتى ھېسابلىنىدۇ.

(2) ئوزۇقلىنىش جەھەتتە تاماق تاللىماسلىق، ئاز - ئازدىن يېيىش، كەچتە يەڭگىل، ئاز غىزالىنىش لازىم. ھەر خىل تاماقلارنى بىللە ئارىلاشتۇرۇپ كۆپ يەۋېلىش ۋە ئۈستىلەپ ھاراق ئىچىشتەك ناچار ئادەتلەرنى قەتئىي ئازايتىش كېرەك. تاماقنىڭ تۈزىنى ۋە يېغىنى تۈۋەنرەك قىلىش؛ بېلىق، ئۆي قۇشلىرى، توشقان گۆشى؛ كۆممىقوناق، ئارپا قاتارلىق قارا - يىرىك ئاشلىقنى؛ ئاچچىقسۇغا چىلانغان خاسىگىنى، پىياز، غولپىياز، چامغۇر، كەرەپشە (چىڭسەي)، كۈدە، پالەك، قېرىنقۇلاق (مۇر)، بەرەڭگە (ياڭيۇ)، يەرلىك كاۋا، تاۋۇز، قاپاق، بېدە، خەيدەي قاتارلىق ئوتياشلارنى، ئالما، چىلان، ئانار، قارىئۆرۈك، ئەينۇلا، بادام، ياڭاق، ئاق ئۈجمە، بانان، ئاپپىلىسىن، ماندارىن دېگەندەك مېۋە - چېۋىلەرنى، پۇرچاق ئۇيۇتمىسى (دۇفۇ)، لەڭگۈڭ قاتارلىق پۇرچاق يېمەكلىكلەرنى، سۇيۇق - سەلەڭ ۋە يېغى ئاز ياكى قورۇلمىغان تاماقلارنى كۆپرەك يېيىش لازىم. قان بېسىمى يۇقىرىلاپ قالغاندا قېنىق چىچىكى (قېنىق يۈزىدىكى چېچەكسىمان پەردە) نى ياكى قوناق ساقلىنى دەملەپ ئىچىپ بېرىش كېرەك، بولۇپمۇ تۇغما ياكى ئېغىر يۇقىرى قان بېسىمى، دىئابېت كېسەلى، يۈرەك ۋە بۆرەك كېسەلى بارلار قان بېسىمىغا نىسبەتەن تېخىمۇ دىققەت قىلىش لازىم.

لەش، خام خىيالغا بېرىلىش، يالغۇز لۇقنى خالاش، مېڭە ئىشلىتىشكە ئېرىنىدىغان، تولا ھەم ئاسان مۇگدەيدىغان بولۇپ قېلىش، باش ۋە كۆز تېڭى بىئارام قىلغۇدەك ئاغرىش، بويۇن بىلەن مۇرە قېتىشىپ سىر قىراپ ئاغرىش، پۇت - قول ئۇيۇشۇش، سېزىمى، ئېڭى ۋە تىلى كالۋالىشىپ (ئەس - ھوشى خىرەلىشىپ) بىر ھازا سۆزلىيەلمەسلىك، ھەرىكەت قىلالىشىش، ئېغىزى مايماقلىشىش، يۇتۇش قىيىنلىشىش، كۆزى تورلىشىش، قۇلغى غوڭغۇلداش، بېشى چىڭقىلىش، بارماقلىرى ئىختىيارسىز تىترەش، چوڭا تۇتالمايلىق، سىزىقنى تۈز سىزىماسلىق، بېشى قېيىپ ھۆ بولۇش، ھېق تۇتۇش، قۇسۇش، ھوشىدىن كېتىش، ئاسان تەرلەپ بىئارام بولۇش، چوڭ - كىچىك تەرىتىنى تۇتالمايلىق، خورەك پەيدا بولۇش ياكى كۈچىيىش، بەدىنىنىڭ يېرىمى پالەچلىنىش، كۈچسىزلىنىش، تۈز ماڭالماسلىق دەلدەڭشىش، خەت يۇقىرى - تۆۋەن سەكرەۋاتقاندا كۆرۈنۈش، دائىم پەردە - شان بولۇش، جىددىيلىشىش، تارتىشىپ قېلىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

مېڭە قان ئۆكچىسى كەپلىشىشىنىڭمۇ بەزى ئالامەتلىرى مېڭىگە قان چۈشۈشكە ئوخشايدۇ. ئەمما ئۇنىڭ قان يېغى كۆپىيىش، قاننىڭ يېپىشقاقلىقى ئېشىش، مېڭىگە قان يېتىشمەسلىك، مېڭە ئارتېرىيىسىنىڭ بوتقىسىمان قېتىشىدىن ياكى توسقۇنلىشىدىن بولىدىغان يۇقىرى قان بېسىمى، قول - پۇت تۇيۇقسىز ئۇيۇشۇش ياكى كۈچسىزلىنىش، ئۇشتۇمۇت ئېنىق كۆرۈلمەسلىك، سۆزلىشىش قىيىنلىشىش، تىنچلىنالماسلىق، دىققەتنى يىغالماسلىق، ئۇنتۇغاقلىق، پىكىر قىلىش تەسلىشىشتەك ئالامەتلىرى بولۇپ، ۋاقتىدا داۋالانمىسا ئاخىرىدا مېڭىگە قان چۈشۈشكە تەرەققىي قىلىدۇ.

4. مېڭىگە قان چۈشۈشنىڭ سەۋەبلىرى: مېڭىگە قان چۈشۈشنىڭ كۆپ ئۇچرايدىغان سەۋەبلىرىنىڭ بىرى يۇقىرى قان بېسىم كېسەلى بولۇپ، مېڭىسىگە قان چۈشكەن 80% بىمارلارنىڭ يۇقىرى قان بېسىم كېسەلى تارىخى بولىدۇ. ياشانغانلاردىكى كەيپىيات جىددىيلىكى، ھاراقنى كۆپ ئىچىش، تېلېۋىزورنى ئۇزۇن كۆرۈش ياكى كومپيۇتېر ئالدىدا ئۇزۇن ئولتۇرۇش، مېڭىنى مۇۋاپىق ئىشلەتمەسلىك، قەۋزىيەت بولۇپ كۈچەپ چوڭ تەرەت قىلىشقا مەجبۇر بولۇشلار مۇ مېڭىگە قان چۈشۈشنى پەيدا قىلغۇچى ياكى تېز - لەتكۈچى ئامىللاردۇر. مېڭە سىلىكىنىش، بۇرۇن ياللۇغى ياكى بۇرۇن پۇتۇش، تاماقتىن كېيىنلا ئۇخلاش، مۇھىتنىڭ

ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئامىللار ۋە ئۇنى داۋالاش

پەرھات مامۇت (845300)

(قىزىلسۇقەرغىز ئاپتونوم ئوبلاستلىق خەلق دوختۇرخانىسى جىددى قۇتقۇزۇش مەركىزى)

قازان ئاستى بېزى غىدىقلىنىپ، ئاشقازان ئاستى بېزى سۇيۇقلۇقى كۆپ مىقداردا ئاجرىلىپ چىقىدۇ، ئاشقازان ئاستى بېزى نەيچىسىدە قىسمەن توسۇلۇش بولغاندا، ئۆت-كۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ. قىش پەسلىدە ھاۋا قۇرغاق بولغاچقا، سۇ كۆپ يوقىلىدۇ، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئەتىياز پەسلىدە كوللېكتىپ بىرگە تاماق يەيدىغان پۇرسەت كۆپ بولغاچقا، كۆپ ساندىكى كىشىلەردە زىيادە تويۇنۇپ غىزالىنىش سەۋەبىدىن ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغى كۆرۈلىدۇ.

(4) سىرتتىن زەخمىلىنىش ۋە ئوپىراتسىيە: ئاشقازان، ئۆت يولى ئوپىراتسىيىسى ياكى ئاشقازان ئاستى بېزى سىرتتىن زەخمىلىنىشتىن ئاشقازان ئاستى بېزى نەيچىسىدىكى يېرىلىشى كېلىپ چىققاندا، ئاشقازان ئاستى بېزى سۇيۇقلۇقى سىرتقا سىرغىپ چىقىدۇ. بۇنىڭغا قان ئايلىنىش توسقۇنلۇققا ئۇچراش ۋە يۇقۇملانۇش قاتارلىقلار قوشۇلۇپ، ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ. (5) ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ قان ئايلىنىشى توسقۇنلۇققا ئۇچراش: تۆۋەن قان بېسىم، ئارتېرىيە كەپلەشمىسى، قان تومۇر ياللۇغى ۋە قاننىڭ يېپىشقاقلىق دەرىجىسى يۇقىرى بولۇش قاتارلىق ئامىللارنىڭ ھەممىسى ئاشقازان ئاستى بېزى قان ئايلىنىشىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغىنى پەيدا قىلىدۇ.

(6) بەزى دورىلار: سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورىلار، ئائىلىق ھورمون، ئىندومېتاتسىن (消炎痛)، ئازاتىئوپرىن (硫唑嘌呤)، كورتىكوستېرون (皮质激素) قاتارلىق دورىلار ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغىنى قوزغىشى مۇمكىن. ھامىلدارلىق مەزگىلىدە مېتابولىزم،

1. ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغىنى پەيدا قىلىدىغان ئىچكى - تاشقى ئامىللار
ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئامىللار ناھايىتى كۆپ بولۇپ، چوڭ جەھەتتىن تۆۋەندىكىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ: (1) توسۇلۇش: بۇ ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغىنىڭ ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغان قوزغاتقۇچى ئامىلى بولۇپ، توسۇلۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان كۆپ ئۇچرايدىغان سەۋەبلەر بولسا، ئۆت غول نەيچە تۆۋەنكى بۆلىكىدە تاش پەيدا بولۇش، ئۆت يولىدا پارازىت قۇرت بولۇش، ئون ئىككى بارماق ئۈچەي ئەمچە كىسمان ئۆسۈكچە سۇلۇق ئىششىش، Oddi قورغۇچى مۇسكۇلى تارىيىش قاتارلىق ئۆت يولى كېسەللىكلىرىدۇر.

(2) ئىسپىرتتىن زەھەرلىنىش: ئىسپىرت ئاشقازاننى غىدىقلاپ، ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ئاجرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئاشقازان كىسلاتاسى يەنە ئون ئىككى بارماق ئۈچەينىمۇ غىدىقلاپ، ئاشقازان ئاستى بېزى سۇيۇقلۇقى ۋە ئۆت خالتىسىنى قىسقارتقۇچى ماددىلارنىڭ ئاجرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاشقازان ئاستى بېزى سۇيۇقلۇقىنىڭ ئاجرىلىشىنى تېزلىتىدۇ. ئىسپىرت يەنە Oddi قورغۇچى مۇسكۇلىنىڭ سىيازىلىنىشىنى، ئىششىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئاشقازان ئاستى بېزى كانالىچىسىنىڭ ئاققۇزۇشى راۋان بولماسلىقىنى پەيدا قىلىپ، ئاشقازان ئاستى بېزى نەيچىسىنىڭ بېسىمىنى ئۆرلىتىپ، ئاشقازان ئاستى بېزى پۈۋەكچىلىرىنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىدۇ. ئۇندىن باشقا، ئىسپىرتنىڭ يەنە ئاشقازان ئاستى بېزىنى بىۋاسىتە زەھەرلەشتەك تەسىرىمۇ بار.

(3) تويۇنۇپ غىزالىنىش: يۇقىرى ئاقسىللىق، يۇقىرى مايلىق يېمەكلىكلەرنى زىيادە ئىستېمال قىلغاندا، ئاش-

ياكى ھاراق ئىچكەندىن كېيىن، قورساقنىڭ يۇقىرىقى قىسمى تۇيۇقسىزلا قاتتىق ئاغرىسا، ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغنى بولۇش مۇمكىنچىلىكىنى ئويلىشىش لازىم. بۇنداق ئەھۋالدا ئۆز ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈش، كېسەللىك ئەھۋالىنى يوشۇرۇپ، دىئاگنوز قويۇش، داۋالاشنىڭ كېچىكىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ھەرگىز ئاغرىق توختاتقۇچى دورىلارنى قارد-غۇلارچە ئىشلەتمەسلىك لازىم. ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغىنى داۋالاش بىرقەدەر مۇرەككەپ، ئېغىر دەرىجىدىكى ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغىنىڭ ئاقىۋىتى خەتەرلىك بولغانلىقتىن، كېسەللىك ئەھۋالى يەنىمۇ ئېغىرلاشسا، ئۆز ۋاقتىدا ئوپىراتسىيە قىلىپ داۋالاشقا قۇلايلىق بولسۇن ئۈچۈن، بىمار ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ئەڭ ياخشى تاشقى بۆلۈمدە داۋالىنىشنى تاللىشى كېرەك.

ئىچكى ئاجراتمىلاردا ئۆزگىرىش كۆرۈلگەنلىكتىن، ئاسانلا ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغىنى قوزغايىدۇ.

2. قورساقنىڭ يۇقىرىقى قىسمى قاتتىق ئاغرىغاندا، ئاغرىق توختاتقۇچى دورىلارنى قالايمىقان ئىشلەتمەسلىك قورساقنىڭ يۇقىرىقى قىسمى تۇيۇقسىز قاتتىق ئاغرىش ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغىنىڭ ئاساسلىق ئالامىتى بولۇپ، كۆپىنچە قورساقنىڭ ئوتتۇرا يۇقىرىقى قىسمى، يەنى قورساقنىڭ سەل سول تەرەپ يۇقىرىسى، قورساقنىڭ ئوڭ تەرەپ يۇقىرىسى ياكى كىندىك قىسمى ئاغرىيدۇ، ئاغرىق يەنە سول مۇرە ۋە بەل، دۈمبە قىسمىغا تارلىنىدۇ؛ كۆپىنچە قورساق كۆپۈش، كۆ-گۈل ئىلىشىش، قۇسۇش ئەگىشىپ كېلىدۇ، قۇسقاندىن كېيىن قورساق ئاغرىش يېنىكلىمەيدۇ. ئۆت تاش كېسەلى، سوزۇلما خاراكتېرلىك ئۆت خالتا ياللۇغى ۋە مەدە قۇرت كېسەللىك تارىخى بارلار تاماق يېگەندىن كېيىن

28 نەپەر بالىياتقۇ بويىنى شەلۋەرگەن بىمارنى ئۇيغۇر

تېبابىتىدە ئوزۇن گازىدا بۇسلاپ داۋالاشتىن خۇلاسى

ئوغلەم توختى (842100)

(توقسۇ ناھىيەلىك ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسى)

1. كىلىنىكىلىق ماتېرىيال

(1) ئادەتتىكى ماتېرىيال: 28 نەپەر بىمار ئىچىدە يېشى ئەڭ كىچىكى 19 ياش، چوڭى 47 ياش، ئوتتۇرىچە يېشى 33 ياش، كېسەللىك سەۋەبى غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىدىن بولغانلار 65% نى ئىگىلەيدۇ، غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خىلىتىدىن بولغانلار 35% نى ئىگىلەيدۇ.

(2) دىئاگنوزى: كېسەللىك تارىخى، كىلىنىكىلىق

ئاچقۇچلۇق سۆز: بالىياتقۇ بويىنى شەلۋەرەش؛

ئوزۇن گازى؛ بۇسلاپ داۋالاش

بۆلىمىمىز 2016-يىلى 1-ئايدىن 4-ئايغىچە بولغان 3 ئاي جەريانىدا، بالىياتقۇ بويىنى شەلۋەرگەن 28 نەپەر بىمارنى ئۇيغۇر تېبابىتى دورىلىرىدىن شام-چە سېلىپ داۋالاش بىلەن بىرگە ئوزۇن گازىدا بۇسلاپ داۋالاپ كۆرۈنەرلىك نەتىجىگە ئېرىشتۇق. داۋالاش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچە:

يۇق، ۋەزىن جەھەتتىن نىسبەتەن ئېغىر، كەيپىيات جەھەتتىن قۇرۇق سوغۇق بولۇپ، داس بوشلۇقىدىكى ھەرقايسى ئەزا (بالياتقۇ، بالياتقۇ قوشۇمچىلىرى) توقۇلمىلارغا تەسىر قىلغاندا ئۆزىنىڭ قۇرۇق سوغۇق-لۇق كەيپىياتى بىلەن بالياتقۇنىڭ ئەسلىي مىزاجىدا بۇزۇلۇش پەيدا قىلىدۇ، ھەمدە ئارتۇق ھۆللۈكنىڭ ۋاقتىدا سىرتقا چىقىرىلىشىنى توسقۇنلۇققا ئۇچرىد-تىپ، يەرلىك ئورۇننىڭ نورمال ماددا ئالماشتۇرۇشى-نى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىپ، روھ-قۇۋۋەتنى ئاجىزلاشتۇرۇش نەتىجىسىدە، يۇقىرىقىدەك شەكىل بۇزۇلۇش خاراكتېرلىك كېسەللىك ئۆزگىرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كىلىنىكىدا بەل-توققۇز كۆز ساھەسى تېلىپ ئاغرىش، تۆۋەنكى قورساق ساھەسى چىڭقىلىپ ئاغرىش، سارغۇچ پۇراقلىق ئاق خۇن كۆپ كېلىش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. ۋاقتىدا داۋالانمىسا بالياتقۇ بويىنى راكى كېلىپچىقىدۇ. داۋالاشتا ئالدى بىلەن مىزاج ئايرىپ مۇنزىج - مۇسھىل بېرىپ، مە-زاجنى تەڭشىگەندىن كېيىن، ياللۇغ قايتۇرۇش، داس بوشلۇقىدىكى ئەزالارنىڭ ماددا ئالماشتۇرۇشنى ياخ-شلاپ، ياللۇغنىڭ سۈمۈرۈلۈشىنى تېزلىتىش مەق-سىتىدە: سىرتتىن ھۆقنە قىلىش، زىمات تېڭىپ، شور تۈز قۇيۇپ، مىكرو دولقۇنلۇق داۋالاپ ۋە تۆۋەنكى مۈچىنى پاشويە قىلىش بىلەن بىرگە، مىكروب ئۆلتۈ-رۈپ، ياللۇغ قايتۇرۇش مەقسىتىدە: جىنسىي يول، با-ليياتقۇ بويىنىنى ئوزۇن گازىدا بۇسلاپ داۋالغاندا، دا-ۋالاش ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك ياخشى بولىدۇ.

پايدىلانغان ماتېرىياللار: «ئۇيغۇر تېبابىتى تۈ-غۇت-ئاياللار كېسەللىكلىرى ئىلمى» شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى

ئالامەتلىرى، B تىپلىق ئولترا ئاۋاز دولقۇنىدا تەكشۈ-رۈش، جىنسىي يول ئەينىكىدە تەكشۈرۈش ۋە مەخسۇس بۆلۈملۈك تەكشۈرۈش نەتىجىسىگە ئاساسەن دىياگنوز قويۇلدى.

(3) داۋالاش ئۇسۇلى: داۋالاشتا ئالدى بىلەن بە-مارغا روھىي جەھەتتىن داۋالاش ئېلىپ بېرىلدى، زە-يادە قۇرۇق سوغۇق تەبىئەتلىك، يەللىك، غىدىقلىغۇ-چى يېمەك-ئىچمەكلەردىن پەرھىز قىلىنىپ، لە-تىق-سىڭىشلىك تاماق بىلەن ئوزۇقلىنىشقا بۇيرۇل-دى. ياللۇغ قايتۇرۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، يەرلىك ئورۇننىڭ ماددا ئالماشتۇرۇشنى ياخشىلاش، ياللۇغنىڭ سۈمۈرۈلۈشىنى تېزلىتىش، توسالغۇلارنى ئېچىش مەقسىتىدە ئىچى-سىرتتىن بىرلەشتۈرۈپ داۋالاش بىلەن بىرگە بالياتقۇ بويىنىنى ئوزۇن گازىدا بۇسلاپ داۋالاشنى بىرلەشتۈرگەندە داۋالاش ئۈنۈمى كۆرۈنەر-لىك ياخشى بولدى. بالياتقۇ بويىنىدىكى ئىششىق، كۆكىرىش ياخشىلىنىپ، شەلۋەرەش دائىرىسى كۆرۈ-نەرلىك كىچىكلىدى.

28 نەپەر بىمار ئىچىدە ساقايغانلار 20 نەپەر، 71% نى؛ ياخشىلانغانلار 4 نەپەر، 14% نى؛ ئۈنۈمى بول-مىغانلار 4 نەپەر، 14% نى ئىگىلەپ، داۋالاشنىڭ ئومۇ-مىي ئۈنۈم بېرىش نىسبىتى 85% بولدى.

2. مۇھاكىمە

بالياتقۇ بويىنى شەلۋەرەش — بىمارنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك تۇرمۇش ئادىتى ۋە يېمەك-ئىچمەك ئادىتى-گە دىققەت قىلماسلىق سەۋەبىدىن، قۇرۇق سوغۇق مە-زاج بەدەندىكى نورمال خىلىتقا تەسىر قىلغاندا، بەلغەم خىلىتى سان ۋە سۈپەت جەھەتتىن غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىپ موزا تەملىك بەلغەم خىلىتى شەكىللەندۈ-رىدۇ، بۇ خىل خىلىت قىيام جەھەتتىن نىسبەتەن قو-

43 نەپەر بىماردىكى ئۆپكە ياللۇغىنى داۋالاشتىن دوكلات

ئابدۇقەيىم مۇسا (844300)

(پەيزاۋات ناھىيەلىك ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسى ئىچكى كېسەللىكلەر بۆلۈمى)

كەلتۈردۇق. كۈتۈش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، زۇ-
كام تېگىپ قېلىش، ئۆپكە ساھەسىنىڭ غىدىقلىنىپ
قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالدۇق. بىمارلارنى داۋالاشنىڭ
پۈتۈن جەريانىدا غىدىقلاش، يەل پەيدا قىلىش تەسىرى
بولغان، تەستە ھەزىم بولىدىغان يېمەك-ئىچمەكلەردىن،
پەرھىز قىلدۇرۇپ، سىڭىشى ئاسان، يەڭگىل، قۇۋۋەت-
تى ئوتتۇرا ھال بولغان يېمەكلىكلەرگە سەۋزە مۇراب-
باسى ياكى گۈلقەنت بىرلەشتۈرۈپ ئىستېمال قىل-
دۇردۇق.

دورا ئارقىلىق داۋالاشتا، ئالدى بىلەن مىزاجىنى
تەڭشەش مەقسىتىدە مۇناسىپ مۇنزىج ۋە مۇسھىللارنى
بەرگەندىن كېيىن نەزلە سۇيۇقلۇقىنىڭ داۋاملىق يۈ-
قىرىقى نەپەس يوللىرىغا قۇيۇلۇشىنىڭ ئالدىنى
ئېلىش ئۈچۈن ھەربىر بىمارغا خەشخاش ئۇرۇقى،
خەشخاش پوستىنىڭ ھەربىرىدىن 11 گىرامدىن، ئاق
لەيلى، ھەمىشباھار ئۇرۇقى، بېھى ئۇرۇقى، نېلۇپەر-
نىڭ ھەربىرىدىن 10 گىرامدىن، چىلان، ئەنجۈر موند-
كى، سەرپىستانلارنىڭ ھەربىرىدىن 21 گىرامدىن ئې-
لىپ، نېلۇپەردىن باشقا دورىلارنى چالا سوقۇپ 1.5
لىتىر سۇغا ئالتە سائەت چىلاپ يېنىك ئوت بىلەن
قاينىتىپ 750ml شەربەت ئېلىپ، كۈندە ئۈچ قېتىم،
ھەر قېتىمدا 100—150 مىللىلىتىرغىچە تاماقتىن

ئۆپكە ياللۇغى قىش پەسلىدە كۆپ يۈز بېرىدىغان،
باشلىنىشى تېز، جەريانى ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ دەم سىقىد-
لىپ يۆتىلىش، ھاسىراش، گال قۇرۇش، كۆكرەك سا-
ھەسى كۆيۈشكەندەك ئاغرىش، ئىككى تاغاق سۆڭەك
ئوتتۇرىسى يېقىمىسىز ئاغرىش بىلەن ئىپادىلىنىدىغان
يۇقىرىقى نەپەس يوللىرىنىڭ ياللۇغلۇق كېسەللىكى
بۇلۇپ، ئۈچ يىل ئىچىدە مەزكۇر كېسەللىك بىلەن
ئاغرىغان 43 نەپەر بىمارنى داۋالاپ كۆرۈنەرلىك ئۈ-
نۈمگە ئېرىشتى، تۆۋەندە بۇ بىمارلارنى داۋالاش نەتى-
جىسىنى دوكلات قىلىپ ئۆتىمەن.

ماتېرىيال ۋە ئۇسۇل:

43 نەپەر بىمار ئىچىدە ئەرلەر 27 نەپەر بولۇپ،
67.4% نى، ئاياللار 14 نەپەر بولۇپ، 32.6% نى ئىگى-
لەيدۇ، يېشى ئەڭ كىچىكى 16 ياش، ئەڭ چوڭى 58 ياش
بولۇپ، ئوتتۇرىچە يېشى 37 ياش، كېسەللىك تارىخى
ئەڭ ئۇزۇنلىرىنىڭ بەش يىل، ئەڭ قىسقىلىرىنىڭ
بىر ھەپتە، بۇ كېسەللىكنى داۋالاشتا، پەرۋىش ئارقى-
لىق داۋالاش بىلەن دورا ئارقىلىق داۋالاشنى ماسلاش-
تۇرۇپ داۋالاش ئېلىپ باردۇق. پەرۋىش ئارقىلىق دا-
ۋالاشتا، ھەربىر بىمارنىڭ تەبئىي مىزاجى، ياش پەر-
قى ۋە جىنسىي پەرق ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن روھىي
داۋالاشنى تۇتقا قىلىش ئارقىلىق ئۇلارنىڭ داۋالاشقا
بولغان ئىشەنچىسى ۋە ماسلىشىشچانلىقىنى قولغا

بۇ 43 نەپەر بىماردىكى ئۆپكە ياللۇغىنى يۇقىرىقى ئۇسۇل بويىچە داۋالاپ، داۋالاشنىڭ ئاخىرقى نەتىجىسىنى كۆزىتىپ كۆرگىنىمىزدە، بۇ بىمارلاردىن تولۇق ساقايغانلار 37 نەپەر بولۇپ، %86.1 نى، داۋالاش ئۈنۈمى بولغانلار 5 نەپەر بولۇپ، %11.6 نى، ئۈنۈمى بولمىغانلار 1 نەپەر بولۇپ %2.3 نى ئىگىلەپ، داۋالاشنىڭ ئومۇمىي ئۈنۈم بېرىش نىسبىتى %97.7 كە يەتتى.

مۇھاكىمە:

1. ئۆپكە ياللۇغى خىلىتلار تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇپ بەدەندە مىزاج بۇزۇلۇش يۈز بەرگەندە ھاسىل بولغان نەزلە سۇيۇقلۇقىنىڭ يۇقىرىقى نەپەس يوللىرىغا سىرغىپ كىرىپ، نەپەس يوللىرى شىللىق پەردىلىرىنى كۈچلۈك غىدىقلاش نەتىجىسىدە كېلىپچىقىدىغان كېسەللىك بولۇپ، داۋالاشتا نەزلە پەيدا قىلغان خىلىت ۋە مىزاجغا ئاساسەن داۋالغاندىن كېيىن ياللۇغ قايتۇرۇش تەدبىرلىرىنى پەرۋىش ئۇسۇلى بىلەن ماسلاش. تۇرۇپ ئېلىپ بارغاندا ناھايىتى ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

2. بۇ كېسەللىكنى داۋالغاندا ئالدى بىلەن مىزاجنى تەڭشەپ نەزلىنى پەسەيتكەندىن كېيىن، يۇقىرىقى نەپەس يوللىرىنىڭ ياللۇغىنى قايتۇرغۇچى دورىلارنى ئىشلەتكەندە ياخشى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

3. كېسەللىك ئالامىتى يوقىغان ياكى ئاساسىي جەھەتتىن يوقالغاندىن كېيىن، نەپەس يوللىرىنى ئاسراپ، نەپەس يولى شىللىق پەردىلىرىنىڭ مۇداپىئە ئىقتىدارىنى كۈچەيتكۈچى دورىلارنى بىر مەزگىل ئىشلەتكەندە بىر تەرەپتىن بىمارنىڭ بەدەن قۇۋۋىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرگىلى، يەنە بىر تەرەپتىن كېسەللىكنىڭ قايتا قوزغىلىشىنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

كېيىن ئىستېمال قىلىشقا بېرىلدى، ياللۇغى قايتۇرۇش مەقسىتىدە ئىچىدىن ئەنسىلدىن 15 گىرام، زۇپادىن 12 گىرام، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، بەدىيان يىلتىزى، بىخ كەبىرلەرنىڭ ھەربىرىسىدىن 21 گىرام، چىلاندىن 20 گىرام، سەرپىستاندىن 11 گىرامدىن، ئاق لەيلى ئۇرۇقى، نېلۇپەر، بىنەپشە، گاۋزىبانلارنىڭ ھەربىرىدىن 9 گىرام، رۇمبەدىيان، كۈدە ئۇرۇقىنىڭ ھەربىرىدىن 5 گىرامدىن ئېلىپ، سەرپىستان، ئەزىز جۈر مۈنىكى قاتارلىق دورىلارنى چالا سوقۇپ، 2000 مىللىلىتىر سۇغا ئالتە سائەت ئەتراپىدا چىلاپ، يېنىك ئوتتا قاينىتىپ 1000 مىللىلىتىر شەربەت ئېلىپ، كۈندە ئۈچ قېتىم تاماقتىن كېيىن 100 مىللىلىتىر ئىستېمال قىلىشقا بېرىلدى. بۇ دورىلارنى كېسەل ئەھۋالىنىڭ ئېغىر - يېنىكلىكىگە قاراپ 6 — 9 كۈنگىچە ئىشلەتكەندىن كېيىن بىماردا ئۆپكە ياللۇغىغا ئالاقىدار ئالامەتلەر ئاساسىي جەھەتتىن يوقىدى.

داۋالاش ئۈنۈمىنى باھالاش ئۆلچىمى:

تولۇق ساقىيىش: بەدەندىكى بۇ كېسەللىك بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان ئىپادىلەر يوقالغان بولۇش، بىمار بارلىق پەرھىزلەرنى بۇزۇپ كېسەللىكنىڭ قايتا قوزغىلىشىغا سەۋەب بولغۇچى ئامىللار بىلەن تەكرار ئۇچراشسىمۇ قايتا قوزغالماستىن. ياخشىلىنىش: تەپىك كىلىنىكىلىق ئالامەتلەر يوقىلىش، بەدەن بەلگىلىرى ئاساسىي جەھەتتىن نورمال ھالەتكە كېلىش، ئەمما قان تەكشۈرۈش ۋە رېنتگېندە تەكشۈرگەندە پۈتۈنلەي ئەسلىگە كېلىپ بولالماسلىق ياكى پەرھىزگە دىققەت قىلمىسا قايتا قوزغىلىش ئىمكانىيىتى بولۇش. ئۈنۈمى بولماسلىق: كېسەللىك ئالامەتلىرى، بەدەن بەلگىلىرى، داۋالاشتىن بۇرۇنقى ھالەت بىلەن تامامەن ئوخشاش بولۇش ياكى كۆپ پەرقلىنمەسلىك.

نەتىجە:

ئاساسىي قاتلام دوختۇرخانىلىرىنىڭ سوزۇلما سوقۇرئۈچەي ياللۇغى بىمارلىرىغا قارىتا قورساق ئىچكى بوشلۇقى ئەينىكى بىلەن ۋە قورساقنى ئېچىپ ئوپىراتسىيە قىلىپ داۋالاشنىڭ سېلىشتۇرما مەسىلىسى

نەبىجان تۇرسۇن، مۇتەللىپ ئەخمەت (843400)

(ئۈچتۈرپان ناھىيەلىك خەلق دوختۇرخانىسى)

لىرى كۆپ.

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: سوزۇلما سوقۇرئۈچەي يال-
لۇغى، لاپراسكوپ، قورساقنى يېرىپ ئوپىراتسىيە قى-
لىش.

سوزۇلما سوقۇرئۈچەي ياللۇغى بولسا ئۆتكۈر
سوقۇرئۈچەي ياللۇغى كېسەللىك ئالامەتلىرى يوقد-
غاندىن كېيىن، قېپقالغان كېسەللىك ئاسارەتلىرىدىن
قايتا پەيدا بولغان ياللۇغ كېسەللىك ئۆزگىرىشىنى
كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن: سوقۇرئۈچەي ئەتراپىدىكى
توقۇلمىلاردا كۆرۈلىدىغان چاپلىشىپ قېلىش ۋە نەيچە
بوشلۇقى تارىيىۋېلىش، سوقۇرئۈچەي تولغىشىپ قې-
لىش قاتارلىقلار. سوزۇلما سوقۇرئۈچەي ياللۇغى
ئادەتتە بىرلەمچى ۋە ئىككىلەمچى خاراكتېرلىك دەپ
ئىككى خىلغا ئايرىلىدىغان بولۇپ، بىرلەمچى سوزۇلما
سوقۇرئۈچەي ياللۇغىنىڭ قوزغىلىشى يوشۇرۇن، كې-
سەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلۈشى بىر قەدەر ئاستا ۋە
ئارىلاپ قوزغىلىدىغان بولۇپ، كېسەللىك جەريانى بىر
قەدەر ئۇزۇن بولىدۇ. ئىككىلەمچى سوزۇلما سوقۇر-
ئۈچەي ياللۇغى بولسا ئادەتتە تۇنجى قوزغالغان سو-
زۇلما سوقۇرئۈچەي ياللۇغىدىن كېيىن قايتا پەيدا
بولغان كېسەللىك ئالامەتلىرى بولۇپ، ئوپىراتسىيە
قىلماي داۋالغاندا بۇ خىل كېسەلنىڭ ساقىيىشى
ئاستا بولۇپ، ئاسان كېسەللىك ئاسارىتى قالىدۇ.

1. ماتېرىيال ۋە ئۇسۇلى

(1) كىلىنىكىلىق ماتېرىيال: 2014 - يىلى 1 -
ئايدىن 2015 - يىلى 7 - ئاي جەريانىدا دوختۇرخانىد-

قىسقىچە بايان: مەقسەت: سوزۇلما سوقۇرئۈچەي
ياللۇغى بىمارلىرىغا قارىتا لاپراسكوپ بىلەن ۋە قور-
ساقنى يېرىپ ئوپىراتسىيە قىلىپ داۋالاشنىڭ ئۈنۈمى
توغرىسىدا مۇلاھىزە يۈرگۈزۈش. ئۇسۇلى: 2014 -
يىلى 1 - ئايدىن 2015 - يىلى 7 - ئايغىچە دوختۇرخا-
نىمىزدا يېتىپ داۋالانغان 50 نەپەر بىمارنى تاللاپ
ئېلىپ، خالىغان 2 گۈرۈپپىغا بۆلۈپ، 25 نەپىرى
تەجرىبە گۈرۈپپىسى، قالغان 25 نەپىرى سېلىشتۇرما
گۈرۈپپا قىلىندى، سېلىشتۇرما گۈرۈپپىدىكى 25 نە-
پەر بىمارغا قورساقنى يېرىش ئوپىراتسىيە ئۇسۇلى
قوللىنىلىدۇ، تەجرىبە گۈرۈپپىسىدىكى بىمارلارغا
لاپراسكوپ ئارقىلىق ئوپىراتسىيە قىلىش ئۇسۇلى
قوللىنىلىدۇ، ئاخىردا بۇ ئىككى گۈرۈپپا بىمارلارنىڭ
داۋالاش ئۈنۈمى سېلىشتۇرۇلىدۇ. نەتىجىسى: (1)
بالىنىستتا يېتىش ۋاقتى جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا،
سېلىشتۇرما گۈرۈپپىدىكى بىمارلارنىڭ بىر قەدەر
ئۇزۇن بولغان. (2) ئوپىراتسىيە ۋاقتى جەھەتتىن ئې-
لىپ ئېيتقاندا، سېلىشتۇرما گۈرۈپپىدىكى بىمارلارنىڭ
بىر قەدەر ئۇزۇن بولغان. (3) ئوپىراتسىيە جەريانىدىكى
قان چىقىش ئەھۋاللىرى جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا،
سېلىشتۇرما گۈرۈپپىدىكى بىمارلاردا كۆپ كۆرۈل-
گەن.

خۇلاسە: سوزۇلما سوقۇرئۈچەي ياللۇغى بىمار-

لىرىغا لاپراسكوپ بىلەن ئوپىراتسىيە قىلىنغاندا، دا-
ۋالاش ئۈنۈمى يۇقىرى دەرىجىدە كۆتۈرۈلىدۇ، قورساق-
نى يېرىپ ئوپىراتسىيە قىلغانغا قارىغاندا ئالاھىدىلىك-

مىزدا يېتىپ داۋالانغان 50 نەپەر بىمارنىڭ ئىچىدە 27 نەپەر ئەر، 23 نەپەر ئايال بار بولۇپ، ياش چەكلىمىسى 15 — 74 ياشقىچە، ئوتتۇرىچە يېشى 8.6 — 36 ياش بولغان. بارلىق بىمارلار سوزۇلما سوقۇر ئۈچەي ياللۇغى دىياگنوز ئۆلچىمىگە ماس كەلگەن: (1) بىمارلاردا ئوڭ تەرەپ ئاستىنقى قورساق ئاغرىشتەك ئەھۋاللار كۆرۈلگەن. (2) ئوڭ تەرەپ ئاستىنقى قورساق ئاغرىق يوق بىمارلاردا ئوڭ تەرەپ ئاستىنقى قورساققا مۇقىم ھالەتتىكى ئاغرىش نۇقتىسى پەيدا بولغان (3) ئۆتكۈر سوقۇر ئۈچەي ياللۇغى قوزغىلىش تارىخى ئېنىقلانغانلار. يۇقىرىقى ئىككى گۇرۇپپا بىمارلار ئىچىدە جىنسى، يېشى، كېسەللىك تارىخى جەھەتلەردە پەرق يوق بولۇپ، تىپىك بولغان سېلىشتۇرۇشچانلىققا ئىگە، ئىستاتىستىكىلىق ئەھمىيىتى يوق.

(2) ئۇسۇلى: سېلىشتۇرما گۇرۇپپىدىكى 25 نەپەر بىمارغا قورساقنى يېرىش ئوپىراتسىيە ئۇسۇلى قوللىنىلغان، تەجرىبە گۇرۇپپىسىدىكى بىمارلارغا بولسا لاپراسكوپ ئارقىلىق ئوپىراتسىيە قىلىش ئۇسۇلى قوللىنىلغان، ئوپىراتسىيە جەريانى تۆۋەندىكىچە: لاپراسكوپ ئوپىراتسىيەسى: كانايغا نەچچە كىرگۈزۈپ پۈتۈن بەدەننى ناركوزلاش ئۇسۇلى قوللىنىلغان. ناركوز قىلىنغاندىن كېيىن بىمارنىڭ كىندىك ئۈستىنى بويلاپ بىر سانتىمېتىر چوڭلۇقتا ئەگمە ھالەتتە كېسىپ، ئارقىدىن بۇ تۆشۈكتىن يەل قورساق يىغىنىسىنى كىرگۈزۈپ، سۈنئىي ئۇسۇلدا يەل قورساق شەكىللەندۈرۈلگەن، گاز بېسىمى ئادەتتە 1.0 — 1.4 كىلوپاسكال ھالەتتە ساقلىنىدۇ. كىندىك بىلەن داس سۆڭىكىنى تۇتاشتۇرۇش سىزىقىنىڭ ئوتتۇرا نۇقتىسىدىن دىيامېتىرى 0.5 سانتىمېتىر چوڭلۇقتا تۆشۈك تېشىپ، ئارقىدىن بىر سانتىمېتىر چوڭلۇقتا يەنە بىر تۆشۈك تېشىپ، ئارقىدىن سوقۇر ئۈچەي ئەتراپىدىكى چاپلىشىپ قالغان توقۇلما-ئەزالارنى ئايرىغاندىن كېيىن، سوقۇر ئۈچەي يىلتىز قىسمى 4 - نۆمۇرلۇق ئىنچىكە يىپ بىلەن بوغۇۋېتىلىدۇ، سوقۇر ئۈچەي ئۈستۈنكى پەردىسى تىتان قىسقۇچى بىلەن بوغۇۋېتىلگەندىن كېيىن، ئۇلترا ئاۋازلىق پىچاق بىلەن سوقۇر ئۈچەي يىلتىز قىسمى كېسىپ ئېلىۋېتىلىپ، توكۇلۇق داغمال بىلەن سوقۇر ئۈچەي شىللىق پەردىسى

داغماللىنىپ بىر تەرەپ قىلىنغاندىن كېيىن، كېسىپ ئېلىنغان سوقۇر ئۈچەي ئەۋرىشكە خالتىسىغا سېلىنىپ تۆشۈكتىن تارتىپ چىقىرىۋېلىنغان.

قورساقنى يېرىپ ئوپىراتسىيە قىلىش: ئادەتتە بەل ئارقىلىق يېرىم بەدەننى ناركوزلاش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ. بىمارنىڭ ئوڭ تەرەپ ئاستىنقى قورساق قىسمىدىن بەش سانتىمېتىر چوڭلۇقتا يارا ئېغىزى ئېچىلغاندىن كېيىن، تېرە، تېرە ئاستى توقۇلمىلىرى ۋە قورساق سىرتقى يانتۇ مۇسكۇلى پەردىسى ئېھتىياتچانلىق بىلەن كېسىلىپ، قورساق تۈز مۇسكۇلى ۋە قورساق ئىچكى مۇسكۇلى ئايرىلىدۇ، ئاندىن كېيىن قورساق پەردىسىنى ئېچىپ قورساق بوشلۇقىغا كىرىدۇ. كېيىنكى قەدەمدە قورساق بوشلۇقىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىلىپ، قورساق دىۋارىنى بويلاپ ئاستىنقى يۆنىلىشتە سوقۇر ئۈچەي ئىزدىلىدۇ. ئارقىدىن سوقۇر ئۈچەي قىسقۇچى بىلەن سوقۇر ئۈچەي قىسىلىپ، باشقا قان تومۇرلارمۇ قىسىلغاندىن كېيىن، بوغۇۋېتىلگەن جايدىن 0.5 سانتىمېتىر ئورۇندا سوقۇر ئۈچەي كېسىپ ئېلىنىدۇ. ئاخىرىدا قان چىقىش ئەھۋاللىرى بايقالمىغاندىن كېيىن يارا ئېغىزى تىكىۋېتىلىدۇ.

2. نەتىجىسى

ئوپىراتسىيە ئاخىرلاشقاندىن كېيىن، ئىككى گۇرۇپپا بىمارنىڭ كىسەللىك ئەھۋالى كۆزىتىلىدۇ ۋە ئانالىز يۈرگۈزۈلىدۇ. ئوپىراتسىيەدىن كېيىن بالانىستىت يېتىش ۋاقتى جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، سېلىشتۇرما گۇرۇپپىدىكى بىمارلارنىڭ بىر قەدەر ئۇزۇن بولغان، ئوپىراتسىيە قىلىش ۋاقتى جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، سېلىشتۇرما گۇرۇپپىدىكى بىمارلارنىڭ بىر قەدەر ئۇزۇن بولغان، ئوپىراتسىيە جەريانىدىكى قان چىقىش ئەھۋاللىرى جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا، سېلىشتۇرما گۇرۇپپىدىكى بىمارلاردا كۆپ كۆرۈلگەن.

3. مۇھاكىمە

ھازىرغا كەلگىچە، مەيلى ئۆتكۈر سوقۇر ئۈچەي ياللۇغى بىمارلىرى بولسۇن، مەيلى سوزۇلما سوقۇر ئۈچەي ياللۇغى بىمارلىرى بولسۇن، ئوپىراتسىيە قىلىش

مارلىرىنى ئوپىراتسىيە قىلىشنىڭ نۇرغۇن ئالاھىدىلىكلىرى بار،

1. زەخمىسى يېنىك، ئاغرىشى يەڭگىل
 2. قورساقنىڭ ئىچكى قىسمىنى ئۈنۈملۈك كۆزىتىپ، دىياگنوز ئېنىق بولماسلىقىنىڭ ساقلاغىلى بولىدۇ.
 3. قورساقنىڭ ئىچكى قىسمىغا ئۈنۈملۈك تازىلاش ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ.
 4. يۇقۇملىنىشنى ئازىلتىپ، ئەگەشمە كېسەللەرنىڭ پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.
- يۇقىرىقىلارغا ئاساسەن لاپراسكوپ ئارقىلىق سوزۇلما سوقۇر ئۈچەي ياللۇغىنى داۋالاش ئۇسۇلىنى ئاساسىي قاتلام دوختۇرخانىلىرىدا كەڭ تۈردە قانات يايدۇرۇشقا بولىدۇ، دەپ قارايمىز.

لىپ داۋالاش ئەڭ ياخشى داۋالاش ئۇسۇلى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بىراق كونا ئۇسۇلدىكى ئوپىراتسىيە قىلىپ داۋالاش ئوپىراتسىيە جەريانىدا ئوپىراتسىيە يارا ئېغىزى ۋە ئۈزۈنلۈقنى كونترول قىلىش ناھايىتى مۇشكۈل، شۇنىڭ بىلەن بىرگە قورساق بوشلۇقىنى كۆزىتىش تولۇق بولماسلىقتىن كېلىپچىققان دىياگنوز ئېنىق بولماسلىق، ۋە ياكى قورساق بوشلۇقىغا يىغىلىۋالغان سۇيۇقلۇقلارنىڭ پاكىز تازىلىنىپ چىقىرىۋېتىلمەسلىكتەك ئەھۋاللار كۆپ كۆرۈلىدۇ.

لاپراسكوپ ئوپىراتسىيەسى بولسا لاپراسكوپ بىلەن باشقا مۇناسىۋەتلىك ئەسۋاب ئۈسكۈنىلەرنى ئوپىراتسىيە جەريانىدا تەڭ قوللىنىشقا بولىدۇ، سوغۇق نۇرمەنبەسى ئارقىلىق يورۇتۇشقا بولىدۇ. يۇقىرىقى سېلىشتۇرما ئارقىلىق شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، لاپراسكوپ بىلەن سوزۇلما سوقۇر ئۈچەي ياللۇغى بىد-

بالياتقۇ چىقىپ قېلىشنىڭ سەۋەبلىرى ۋە ئۇنى بىر تەرەپ قىلىش

مۇنەۋۋەر ئابدۇرېھىم (844000)

(خوتەن ۋىلايەتلىك لوپ ناھىيەلىك خەلق دوختۇرخانىسى ئاياللار بۆلۈمى)

خىمىيە بولغاندىن كېيىن ئوڭدىسىغا ئۇزاق يېتىش قاتارلىقلاردا بالىياتقۇ ئاسانلا ئارقىغا ئورۇنلىشىپ، بالىياتقۇ ئوقى بىلەن جىنسىي يول ئوقىنىڭ يۆنىلىشى ئۆزگىرىپ، بالىياتقۇ ئوڭايلا جىنسىي يولنى بويلاپ تۆۋەنلەيدۇ. تۇغۇتتىن كېيىن بەك بالدۇر ئورۇندىن تۇرۇپ ئېغىر جىسمانىي ئەمگەك قىلغاندىمۇ بالىياتقۇ ئوڭايلا سىرتقا چىقىپ قالىدۇ.

2. بالىياتقۇ تېگى توقۇلمىسى ۋە تارمۇشلىرى بوشاپ كېتىش: يېشى چوڭىيىپ قالغان، ئۇزاق بالا ئەمگۈزگەن، بەك كۆپ تۇغقان، تېنى ئاجىز، پۈتۈن بەدەن مۇسكۇللىرىنىڭ تەرەڭلىكى بوشاپ كەتكەن ياكى داس سۆڭەك بوشلۇقىدىكى توقۇلمىلارنىڭ يېتىلىشىدىكى تۇغما كەمتۈكلۈك قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى داس تېگى توقۇلمىلىرى ۋە بالىياتقۇ تارمۇشلىرىنى بوشتىتىپ، بالىياتقۇ چىقىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىدۇ.

بالياتقۇ ئۆز ئەتراپىدىكى مۇسكۇل بىلەن تارمۇشقا تايىنىپ داس بوشلۇقىدا مۇھىم ھالەتتە تۇرىدۇ. ناۋادا تارمۇش، مۇسكۇل كۈچى بالىياتقۇنى كۆتۈرۈشكە بەرداشلىق بېرەلمەسە، ئۇ ھالدا بالىياتقۇ جىنسىي يولنى بويلاپ تۆۋەنگە ساڭگىلايدۇ، ھەتتا جىنسىي يول ئېغىزى سىرتقا چىقىپ قالىدۇ، مانا بۇ بالىياتقۇ چىقىپ قېلىش دېيىلىدۇ. ئادەتتە بالىياتقۇ چىقىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەبلەر ناھايىتى كۆپ بولسىمۇ كۆپىنچە تۆۋەندىكى ئامىللاردىن كېلىپچىقىدۇ:

1. تۇغۇت جەريانىدىكى زەخمىلىنىش: تۇغۇت جەريانىدا يۇمشاق تۇغۇت يولىنىڭ زىيادە سوزۇلۇشى، بالىياتقۇ ئېغىزى تولۇق ئېچىلماي تۇرۇپلا كۈچەپ ئىنجىقلاش، داس تېگى توقۇلمىلىرى زەخمىلەنگەندە ۋاقتىدا بىر تەرەپ قىلماسلىق، تۇغۇتلۇق ئايال بوشدۇ.

رىدۇ.

3. تۇغۇت قوبۇل قىلىش تېخنىكىسى تۆۋەن بو-
لۇش: بۇ خىل ئەھۋال يېڭىچە تۇغۇت قوبۇل قىلىش
تېخنىكىسى ئومۇملاشمىغان رايونلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ.
ھامىلە تۇغۇت يولىدىن ئۆتكەندە، جىنسىي يول مۇس-
كۇلى ۋە سېرىقئەت يىرتىلىدۇ، بۇنداق ۋاقىتتا توغرا
بىر تەرەپ قىلىمىغاندا، داس سۆڭەك ئاستىدىكى مۇس-
كۇللارنىڭ بالىياتقۇنى تىرەپ تۇرۇش كۈچى
ئاجىزلاپ، نەتىجىدە بالىياتقۇ تەدرىجىي سىرتقا چىقىپ
قالىدۇ.

4. قورساق بېسىمى ئېشىپ كېتىش: ئۇزاق مەز-
گىل كۈچەپ يۆتىلىش، ئادەتلەنگەن قەۋزىيەت ياكى
ئۇزاق زوڭزىيىپ ئولتۇرۇش، ئۇزاق ئۆرە تۇرۇپ خىز-
مەت قىلىش قاتارلىقلاردا بالىياتقۇ مۇسكۇلى بىلەن
بالىياتقۇنى تىرىگۈچى مۇسكۇللىرى ھامىلىدارلىقتىن
كېيىن بوشىشىپ كېتىپ، تېخى تولۇق ئەسلىگە كەل-
مىگەن ئەھۋالدا قورساق بېسىمىنى ئاشۇرۇپ بالىياتقۇ
چىقىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ تۆۋەندىكى
ئۈچ دەرىجىگە بۆلۈنىدۇ:

I دەرىجە: بۇنىڭدا بالىياتقۇ ئەسلىدىكى نورمال
ئورنىدىن تۆۋەن بولىدۇ، بەزىدە جىنسىي يول ئېغىزى-
دىن تۇتقىلى بولىدۇ، ئەمما جىنسىي ئەزا سىرتىغا
چىقمايدۇ؛

II دەرىجە: بۇنىڭدا بالىياتقۇ بويىنى ياكى قىسمەن
بالىياتقۇ تېنى جىنسىي يول ئېغىزىغا چىقىپ قالىدۇ؛
III دەرىجە: بۇنىڭدا بالىياتقۇ بويىنى بىلەن بالىياتقۇ
تېنى پۈتۈنلەي جىنسىي ئەزا سىرتىغا چىقىپ قالىدۇ.

بىر تەرەپ قىلىش چارىلىرى: بالىياتقۇ يېنىك
دەرىجىدە چىقىپ قالسا، ئادەتتە بىمار ئوڭدىسىغا يې-
تىپ ياخشى ئارام ئالسا ئۆزۈڭىدىن ئەسلىگە قايتىدۇ.
ئەمما ۋاقىتنىڭ ئۆزىرىشىغا ئەگىشىپ چىققان قىسم
تېخىمۇ چوڭايغاندا ئەسلىگە قايتالمايدۇ. بۇ خىل ئەھ-
ۋالدا پەقەت قول ئارقىلىق ئىتتىرىپ كىرگۈزۈشكە
توغرا كېلىدۇ. ئېغىرلاشقاندا جىنسىي ئەزا سىرتىغا
چىقىپ قالغان بالىياتقۇدا قان ئايلىنىش راۋان بول-
ماسلىق سەۋەبىدىن، تەدرىجىي سۇلۇق ئىشىشىپ يوغ-
ناش يۈز بېرىدۇ، بۇ خىل ئەھۋالدا قولدا ئىتتىرىپ
كىرگۈزۈشۈمۇ قىيىنغا توختايدۇ. ئېغىر دەرىجىدىكى
بالىياتقۇ چىقىپ قېلىشنى بىمارنىڭ كېسەللىك ئەھ-
ۋالىغا ئاساسەن ئوپېراتسىيە ئارقىلىق داۋالاشقا بول-
دۇ. نۆۋەتتە جىنسىي يولى ئارقىلىق بالىياتقۇنى پۈ-

تۈنلەي كېسىپ ئېلىۋېتىش ياكى جىنسىي يولىنىڭ
ئالدى ئارقا دىۋارىنى، داس سۆڭىكىنىڭ ئاستى قىس-
مىدىكى مۇسكۇللارنى ياماشتىن ئىبارەت ئوپېراتسىيە
ئۇسۇلى قوللىنىلماقتا. تۇغۇت يېشىدىكى ئاياللارغا
قارىتا تۇغۇت ئىقتىدارىنى ساقلاپ قېلىشقا توغرا
كەلگەندە، پەقەت جىنسىي يولىنىڭ ئالدى ئارقا دىۋار-
نى ياماپ، بالىياتقۇ بويىنىنىڭ بىر قىسمىنى كېسىپ
ئېلىۋېتىش ئوپېراتسىيەسى ئىشلىنىلىدۇ.

ئالدىنى ئېلىش ۋە بالدۇر داۋالاش بالىياتقۇ چى-
قىپ قېلىشتىن ساقلىنىشتىكى ئاچقۇچ. پىلانلىق
تۇغۇتنى ئاكتىپ يولغا قويۇش، يېڭىچە ئۇسۇلدا تۇغۇت
قوبۇل قىلىش تېخنىكىسىنى ئومۇملاشتۇرۇش، سو-
زۇلما كاناي ياللۇغى ۋە قەۋزىيەتنىڭ ئالدىنى ئېلىش
ھەم ئاكتىپ داۋالاشنى، قورساق بېسىمىنى زىيادە
ئاشۇرىدىغان ھەرىكەت ۋە ئېغىر جىسمانىي ئەمگەك-
لەرنى قىلىشتىن ساقلىنىش قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى
بالىياتقۇ چىقىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى
ئۈنۈملۈك تەدبىر. بۇ خىل كېسەللىكنىڭ ئىپادىلىرى
كۆرۈلسىلا ھەرگىز بېپەرۋالىق قىلماي، ۋاقىتدا داۋا-
لىتىش. I دەرىجىدە ۋە II دەرىجىدىكى بالىياتقۇ چى-
قىپ قېلىشتا، بالىياتقۇغا تىرەك قويۇپ داۋالاپ كۆ-
ڭۈلدىكىدەك نەتىجىگە ئېرىشكىلى بولىدۇ. نۆۋەتتە
ھەشقىپچەك شەكىللىك، ھالقا شەكىللىك، شار شە-
كىللىكتىن ئىبارەت تىرەك قويۇش ئۇسۇللىرى قول-
لىنىلماقتا. لېكىن بۇ خىل مەشغۇلاتنى چوقۇم مۇن-
تىزىم تەربىيەلەنگەن ئاكشورلار ئىشلىشى ھەمدە بى-
مارنى ئۆزى ئېلىپ سالالايدىغان قىلىپ تەربىيەلىشى
كېرەك. تىرەكنىڭ چوڭ - كىچىكلىكىنى مۇۋاپىق
تاللاش، بۇنىڭدا ھەم چىقىپ قالماسلىق ھەم يېقىم-
سىزلىق ھېس قىلماسلىقنى شەرت قىلىش، تىرەك
قويۇلغاندىن كېيىن ھەر كۈنى ئاخشىمى بىمار تىرەك-
نى ئۆزى چىقىرىپ، پاكىز يۇيۇپ، ئەتىسى ئەتىگەندە
يەنە سېلىۋېلىشى كېرەك. ئەگەر سېلىپ قويۇپ ئۇزۇن
مەزگىلگىچە ئالمىغاندا جىنسىي يول تىرەكنىڭ سۈر-
كىلىشىگە ئۇچرايدۇ ياكى بېسىلىشتىن شەلۋەرەپ زە-
خىملىنىشى، يۇقۇملىنىشى ھەتتا سۈيدۈك يولى ياكى
ئۈچەينى تېشىپ سۈيدۈك ئاقىمىسى، چوڭ تەرەت ئاق-
مىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. بۇ خىل ئەھ-
ۋاللار كىلىنىكىدا كۆپ ئۇچرىغاچقا بۇنىڭغا ئالاھىدە
دېققەت قىلىش لازىم.

ياشانغان ئاياللار دىكى جىنسىي يول ياللۇغى ۋە ئۇنى

كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەبلەر

(تايىمىنسا توختى (844200)

(قەشقەر يېڭىشەھەر ناھىيەلىك خەلق دوختۇرخانىسى)

رولى دەپ ئاتىلىدۇ.

جىنسىي يول ئۇچۇق ئەزا بولۇپ، نورمال ئەھۋالدا ھەيز ئېقىپ چىققاندىن سىرت، جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈلىدۇ، بەزىدە يەنە بىر قىسىم تەكشۈرۈش ۋە ئوپىراتسىيەلەر مۇئەللىمىدۇ. شۇڭا جىنسىي يولنىڭ ئۆزىدە ئەسلىدىنلا كۆپ خىل مىكرو جانلىقلار بولىدۇ، لېكىن ساغلام ئاياللارنىڭ جىنسىي يولىدىكى مىكرو جانلىقلار ئادەتتە تىنچ ھالەتتە تۇرۇپ كېسەل پەيدا قىلمايدۇ. نورمال بولغان جىنسىي يولنىڭ سىرتقى مۇھىتتىن كەلگەن مىكرو جانلىقلارغا تاقابىل تۇرۇش ئىقتىدارى بولغانلىقتىن، ئوڭايلىقچە يۇقۇملانمايدۇ.

ئەگەر يۇقىرىقى تەبىئىي توساقلار بۇزۇلسا، مەسىلەن: جىنسىي مۇناسىۋەتنى كۆپ قىلىش ۋە جىنسىي يولنى يۇيۇپ، ئۇنىڭ كىسلاتالىق مۇھىتىنى ئۆزگەرتىۋەتسە ياكى كەڭ تەسىرلىك ئانتىبىيوتىكلار (谱抗菌素) نى ئۇزاق مۇددەت ئىشلەتكەندە ياكى بولمىسا ئائىلىق ھورمون تۈۋەنلەپ، جىنسىي يولنىڭ مۇداپىئەلىنىش ئىقتىدارى ئاجىزلاپ كەتكەندە، سىرتقى مۇھىتتىكى كېسەل قوزغاتقۇچى باكتېرىيەلەر جىنسىي يولغا تاجاۋۇز قىلىپ ياكى جىنسىي يولدىكى باشقا كېسەل قوزغاتقۇچى باكتېرىيەلەر كۆپىيىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، جىنسىي يول ياللۇغىنى پەيدا قىلىدۇ.

ياشانغان ئاياللارنىڭ جىنسىي يول ياللۇغىغا گىرىپتار بولۇشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب شۇكى، ئائىلىق ھورمون تۈۋەنلەپ، جىنسىي يولنىڭ باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش كۈچى ئاجىزلاشتىن ئىبارەت. ياشانغان ئاياللاردا ھەيز توختىغاندىن كېيىن، ئائىلىق ھورمون كۆرۈنەرلىك تۈۋەنلەيدۇ. بۇنىڭ بىلەن چوڭ - كىچىك جىنسىي لەۋ يىگىلەپ نېپىزلىگەنلىكتىن يېپىلماس بولىدۇ ھەمدە جىنسىي يول دىۋا - رېمۇ يىگىلەپ، شىللىق پەردىلەر نېپىزىلەپ، كىسلاتالىق مۇھىتمۇ بۇزۇلغانلىقتىن، كېسەل قوزغاتقۇچى باكتېرىيەلەر ئوڭايلا جىنسىي يولغا تاجاۋۇز قىلىپ ياكى جىنسىي يولدىكى

ياشانغان ئاياللار دىكى جىنسىي يول ياللۇغى ياشانغان ئاياللارنىڭ تۇخۇمدان ئىقتىدارى چېكىنىپ ئائىلىق ھورمون ئازىيىپ كېتىش، جىنسىي يول شىللىق پەردىسى نېپىزىلەش ۋە يەرلىك ئورۇننىڭ باكتېرىيەگە قارشى تۇرۇش كۈچى ئاجىزلاشتىن كېلىپ چىققان جىنسىي يولنىڭ ياللۇغلىنىشىنى كۆرسىتىدۇ. ئەگەر داۋالاشنى ئۈزۈل - كېسىل بولمىسا ياكى تۇرمۇشتا دىققەت قىلىنمىسا، ياشانغانلار دىكى جىنسىي يول ياللۇغىنىڭ تەكرار قوزغىلىش ۋە قايتا يۇقۇملىنىش نىسبىتى بىر قەدەر يۇقىرى بولىدۇ. نېمە ئۈچۈن شۇنداق بولىدۇ؟ بۇ مەسىلىگە جاۋاب بېرىشتە، ئالدى بىلەن ئاياللارنىڭ جىنسىي يولنىڭ تەبىئىي مۇداپىئەلىنىش ئىقتىدارىنى چۈشىنىشكە توغرا كېلىدۇ.

ئاياللار ياش ۋاقتىدا تۇخۇمدان ئاجرىتىپ چىقارغان ئائىلىق ھورموننىڭ تەسىرىدە، جىنسىي يول ئىنتايىن كۈچ - لۈك مۇداپىئەلىنىش ئىقتىدارىغا ئىگە بولىدۇ. بۇ تۈۋەندىكىلەر ئۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ:

1. چوڭ - كىچىك جىنسىي لەۋ تولغان بولۇپ، ئۆز - لۈكىدىن يېپىلىپ تۇرىدۇ ھەمدە جىنسىي يول ۋە سۈيدۈك يول ئېغىزىنى سىرتقى مۇھىتتىكى باكتېرىيەلەرنىڭ تاجاۋۇزىدىن ساقلايدۇ.

2. جىنسىي يولنىڭ ئالدى - كەينى دىۋارى چىڭ چاپلىشىپ، باكتېرىيەلەرنىڭ تاجاۋۇزىنى ئازايتىدۇ.

3. جىنسىي يولدىكى ئاجىزلىما ماددىلارنىڭ بىر خىل «يېپىشقاق ئاقسىل» تەركىبى بولۇپ، ئۇ تور سىمان قىزىك - لىق توسۇق ھاسىل قىلىپ، باكتېرىيەلەرنىڭ جىنسىي يول ئېپىتېلىيىسىنى زەخمىلەندۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ.

4. جىنسىي يولدا سۈت كىسلاتا باكتېرىيىسى بولۇپ، ئۇ جىنسىي يولدىكى گىلۇكوگېننى سۈت كىسلاتاسىغا پارچىلاپ، جىنسىي يولنى كىسلاتالىق مۇھىتقا ئۆزگەرتىپ، باشقا كېسەل قوزغاتقۇچىلارنىڭ ئۆسۈشىنى تورمۇزلايدۇ، مېدىتسىنادا بۇ جىنسىي يولنىڭ «ئۆزىنى ئۆزى تازىلاش»

باكتېرىيىلەر ئۆز لۈكىدىن كۆپىيىپ، ياللۇغلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ياشانغان ئاياللارنىڭ جىنسىي يولىنىڭ مۇداپىئەلىنىش ئىقتىدارى چېكىنگەنلىكتىن، جىنسىي تۇرمۇش بولمىسىمۇ، ئەگەر ئىچكىم پاكىز بولمىسا، تازىلىق قەغەزىنىڭ سۈپىتى ناچار بولسا، چوڭ تەرەتتىن كېيىن قەغەز ئىشلىتىش ياكى يۇيۇش ئۇسۇلى توغرا بولمىسا، شۇنداقلا ھەرقانداق بىر خىل يېنىك دەرەجىدىكى بۇلغىنىشلار دىنمۇ باكتېرىيىلەر جىنسىي يولغا تاجاۋۇز قىلىپ، جىنسىي يول ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئېھتىمال بۇ ئامىللار ياش ۋاقتىدا كېسەللىك پەيدا قىلغۇچى ئامىل بولماسلىقى مۇمكىن. پەقەت ئاندىنلىق ھورمون تۆۋەنلەش ياشانغان ئاياللارنىڭ جىنسىي يولىدىكى بىر تۈرلۈك فىزىئولوگىيىلىك ھالەت بولۇپ، تازىلىققا ئازراقلا دىققەت قىلمىغاندا جىنسىي يول ياللۇغى تەكرار قوزغىلىدۇ.

ئۇنداقتا، ياشانغانلاردىكى جىنسىي يول ياللۇغىنىڭ تىپىك بولغان كېسەللىك ئالامەتلىرى قانداق بولىدۇ؟ ئۇنىڭ ئاساسلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى بولسا، جىنسىي يولدا ئاجىز-رالما ماددىلار كۆپىيىش، كۆيگەندەك سېزىم پەيدا بولۇش، سىرتقى جىنسىي ئەزا قىچىشىش، جىنسىي يول ئاجىز-مالما-دېلىرى سۇيۇقلىشىش، رەڭگى سۇس سېرىق رەڭدە كېلىش، ئېغىر بولغانلاردا يىرىڭلىق ئاق خۇن كېلىش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت. ئۇنىڭدىن باشقا، جىنسىي يول دېۋارى يىگىلىگەنلىكتىن، جىنسىي مۇناسىۋەت قىلغاندا ئاغرىيدۇ. ئاياللار بۆلۈمىدە تەكشۈرۈلگەندە جىنسىي يول شىللىق پەردەسىگە قان تۇلۇش ۋە ئۇششاق قاناش توچكىلىرى پەيدا بولغان ئەھۋاللار بايقىلىدۇ. بەزىلەردە بولسا جىنسىي يولنى چاپلاش-تۇرۇپ، ئېغىر بولغاندا جىنسىي يول تارىيىش، ھەتتا جىنسىي يول ئېتىلىپ قېلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، بۇنىڭ بىلەن جىنسىي يولدىكى ياللۇغلىق ئاجىز-مىللار سىرتقا چىقالماي، جىنسىي يولدا، ھەتتا بالىياتقۇ بوشلۇقىدا يىرىڭ يىغىلىپ قالىدۇ.

ياشانغانلاردىكى جىنسىي يول ياللۇغىنى داۋالاش پرىنسىپى ئىككى خىل، يەنى باكتېرىيىنىڭ ئۆسۈشىنى تورمۇزلاش ۋە جىنسىي يولنىڭ قارشىلىق كۈچىنى ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت.

1. باكتېرىيىنىڭ ئۆسۈشىنى تورمۇزلاش: جىنسىي يول ياللۇغى قوزغالغاندا، 1% لىك سۈت كىسلاتاسى بىلەن جىنسىي يولنى كۈندە بىر قېتىم يۇيۇپ، جىنسىي يولنىڭ

كىسلاتالىق دەرىجىسىنى ئاشۇرغاندا، باكتېرىيىنىڭ ئۆسۈپ كۆپىيىشىنى تورمۇزلىغىلى بولىدۇ. جىنسىي يولنى يۇيۇپ بولغاندىن كېيىن، ئانتىبىيوتىك دورىلار ئىشلىتىلىدۇ، مەسىلەن: مېتروندازول (甲硝唑) تابلېتىدىن 200mg ياكى مۇرەككەپ مېتروندازول كەپلىمە دورىسى (甲硝唑 复方)، جىنسىي يولنىڭ چوڭقۇر يېرىگە كۈندە بىر قېتىم سېلىنىدۇ، 7~10 كۈن بىر داۋالاش كۇرسى قىلىنىدۇ.

2. جىنسىي يولنىڭ قارشىلىق كۈچىنى ئاشۇرۇش: ياشانغانلاردىكى جىنسىي يول ياللۇغىنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى ئائىلىق ھورمون تۆۋەنلەپ، جىنسىي يولنىڭ يەرلىك قارشىلىق كۈچى تۆۋەنلىگەنلىكتىن بولغاچقا، جىنسىي يول ياللۇغى تەكرار قوزغىلىدىغان بىمارلار كېسەللىك ئالامىتى ياخشىلانغاندا ئائىلىق ھورمون تولۇقلاپ، جىنسىي يول ياللۇغى قايتا قوزغىلىشنىڭ ئالدىنى ئالسا بولىدۇ. تېببىي تەتقىقاتلار ئىسپاتلىدىكى، جىنسىي ھورمون تولۇقلاپ داۋالاشنىڭ ياخشىلانغانلاردىكى جىنسىي يول ياللۇغى، سۈيىدۈك يول ياللۇغى، جىنسىي يول يىگىلەش، قۇرغاقلىشىش ۋە ئاغرىشلارغا بولغان ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك ياخشى بولىدۇ. ئادەتتە 2~3 ئاي دورا ئىشلەتكەندىن كېيىن، دورا مىقدارىنى ئازايتىپ ئۇزاق مەزگىلگىچە مۇستەھكەملەپ داۋالاشقا توغرا كېلىدۇ. ئەگەر پەقەت جىنسىي يول ياللۇغىنىڭ ئالامىتى كۆرۈلسە، پەقەت يەرلىك ئورۇنغا ئائىلىق ھورمون دورا مەلھىمى سۈركەپ بەرسىلا بولىدۇ، ئۇزاق مەزگىل ئىشلەتسىمۇ بىخەتەر بولۇپ، ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ؛ ئەگەر جىنسىي يول ياللۇغى تەكرار قوزغالسا، شۇنداقلا يەنە باشقا كىلىماكتېرىيە دەۋرىدىكى كېسەللىك ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كەلسە، مەسىلەن: قىزىپ تەرلەش، ئۇيقۇسى كەلمەسلىك، يۈرەك سېلىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلسە، ئەڭ ياخشىسى پۈتۈن بەدەننىڭ داۋالاش لازىم. كونكرېت داۋالاش ئۇسۇلى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە بولىدۇ.

كىلىنىكىدا يەنە بىر قىسىم دائىم ئىشلىتىلىدىغان جۇڭگىيە دورىلار بار بولۇپ، جىنسىي يول ياللۇغىنى داۋالاشتا ئۈنۈمى خېلىلا ياخشى، مەسىلەن: جىنسىي يولغا سېلىنىدىغان باۋفۇكاڭ كەپلىمىسى (保妇康阴道栓)، كاڭ-فۇتې كەپلىمىسى (康妇特阴道栓) ۋە جىنسىي يولنى سىرت-تىن يۇيۇشقا ئىشلىتىلىدىغان يۇيۇش سۇيۇقلۇقى قاتارلىقلار.

دورلىق ئۆسۈملۈكلەرنىڭ سۈپىتى ۋە كىلىنىكىدىكى

مۇۋاپىق ئىشلىتىلىش مىقدارى ھەققىدە

بۇخەلچەم بارات، ئۆمەر ئابلىز (830000)

(شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسى)

بولۇپ، بۇنداق قىلغاندا، ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ كىلىنىكىدا ئىشلىتىلىش مىقدارىنىڭ مۇۋاپىقلىقىنى ئۈنۈملۈك كۈچەيتكىلى، زور مىقداردىكى دورىلىق ئۆسۈملۈك مەنبەسىنى تېجەپ قالغىلى، شۇنداقلا بىر-مارىنىڭ داۋالاش ئۈنۈمىنىمۇ مەلۇم دەرىجىدە يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ، شۇڭا كىلىنىكا ئەمەلىيىتى جەريانىدا ئۈلگە قىلىشقا ۋە كېڭەيتىشكە ئەرزىيدۇ.

ئاچقۇچ سۆز: ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ سۈپىتى؛ دورا ئىشلىتىش مىقدارى؛ مۇۋاپىقلىقى؛ كىلىنىكىلىق ئەھمىيىتى

ئالاقىدار كىلىنىكىلىق ماتېرىياللاردىن كۆر-سىتىلىشىچە، ئۆسۈملۈك دورىلارنى يىغىش ۋە ياساش جەريانى بىرقەدەر مۇرەككەپ بولىدۇ، ھەمدە ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ سۈپىتى بىلەن ئىشلىتىلىش مىقدارى شۇنداقلا داۋالاش ئۈنۈمى زىچ مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. شۇڭا، ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ سۈپىتىنى ياخشى باش-قۇرۇپ، دورا ئىشلىتىش مىقدارىنىڭ نامۇۋاپىقلىقىنى ئازايتىش لازىم. مەزكۇر تەتقىقاتتا، 2013-يىلى-دىن 2014-يىلىغىچە دوختۇرخانىمىزدا داۋالانغان 50 نەپەر بىمار تەتقىقات ئوبيېكتى قىلىندى، ئالاقىدار دوكلات تۆۋەندىكىچە:

1. ماتېرىيال ۋە ئۇسۇل

(1) ئادەتتىكى ماتېرىيال: 2013-يىلىدىن 2014-يىلىغىچە دوختۇرخانىمىزدا داۋالانغان 50 نە-پەر بىمار تەتقىقات ئوبيېكتى قىلىنىپ، ئىختىيارىي

مۇھىم نۇقتا: مەقسەت: دورىلىق ئۆسۈملۈكلەرنىڭ سۈپىتى جەھەتتىن، ئۇلارنىڭ كىلىنىكىدىكى ئىشلە-تىش مىقدارىنىڭ مۇۋاپىقلىقى مۇلاھىزە قىلىنىدۇ. ئۇسۇل: 2013-يىلىدىن 2014-يىلىغىچە دوختۇرخانىمىزدا داۋالانغان 50 نەپەر بىمار تەتقىقات ئوبيېكتى قىلىنىپ، ئىختىيارىي ھالدا تەجرىبە گۇ-رۇپپىسى ۋە سېلىشتۇرما گۇرۇپپىسىغا ئايرىلدى، ھەر گۇرۇپپىدا 25 تىن بىمار بار بولۇپ، تەجرىبە گۇ-رۇپپىسى بىمارلىرىغا دورا ئىشلىتىش جەريانىدا، ئۆسۈملۈك دورىلار سۈپەت جەھەتتىن باشقۇرۇلدى، سېلىشتۇرما گۇرۇپپىدىكىلەرگە دورا ئىشلىتىش جەريانىدا ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ سۈپىتىنى باشقۇرۇش يولغا قويۇلدى، بىر ئايدىن كېيىن، ئىككى گۇرۇپ-پىدىكى بىمارلارنىڭ دورا ئىشلىتىش مىقدارىنىڭ مۇ-ۋاپىقلىقى ئانالىز قىلىندى ۋە سېلىشتۇرۇلدى. نە-تىجىدە، تەجرىبە گۇرۇپپىسىدىكى بىمارلارنىڭ دورا ئىشلىتىش مىقدارىنىڭ مۇۋاپىق بولۇش نىسبىتى 80%، سېلىشتۇرما گۇرۇپپىسىدىكى بىمارلارنىڭ دو-را ئىشلىتىش مىقدارىنىڭ مۇۋاپىق بولۇش نىسبىتى 70%، ($P < 0.05$) بولۇپ، پەرقى ئىستاتىستىكىلىق ئەھمىيەتكە ئىگە.

خۇلاسە: ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ سۈپىتىگە قارىتا ئۈنۈملۈك كىلىنىكىلىق باشقۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللە-نىشنىڭ كۆرۈنەرلىك كىلىنىكىلىق ئەھمىيىتى بار

دورا مىقدارىنىڭ زىيادە ئاز بولۇش نىسبىتى قاتار -
لىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

(4) سانلىق ماتېرىياللارنى بىر تەرەپ قىلىش
مەزكۇر تەتقىقاتتىكى بارلىق سانلىق ماتېرىياللار
SPSS17.0 يۇمشاق دېتالى ئارقىلىق ئىستاتىستىكىلىق
بىر تەرەپ قىلىندى.

2. نەتىجە

تەجرىبە گۇرۇپپىسى بىلەن سېلىشتۇرما گۇرۇپپىسىدىكىلەرنى سېلىشتۇرغاندا، تەجرىبە گۇرۇپپىسىدىكىلەرنىڭ دورا ئىشلىتىش مىقدارىنىڭ مۇۋاپىقلىقى سېلىشتۇرما گۇرۇپپىسىدىكىلەرنىڭكىدىن ياخشى بولۇپ، تەجرىبە گۇرۇپپىسىدىكىلەرنىڭ دورا ئىشلىتىش مىقدارىنىڭ مۇۋاپىقلىق نىسبىتى 80% ، سېلىشتۇرما گۇرۇپپىسىدىكىلەرنىڭ بولسا 70% ، ($P < 0.05$) ، پەرقى ئىستاتىستىكىلىق ئەھمىيەتكە ئىگە.

3. مۇھاكىمە

مەزكۇر تەتقىقاتتىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ سۈپىتى باشقۇرۇلغان تەجرىبە گۇرۇپپىسىدىكى بىمارلارنىڭ كىلىنىكىلىق دورا ئىشلىتىش مىقدارىنىڭ مۇۋاپىقلىقى، ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ سۈپىتى باشقۇرۇلمىغان سېلىشتۇرما گۇرۇپپىسىدىكى بىمارلارنىڭكىدىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولغان، دېمەك، ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ سۈپىتىگە قارىتا ئۆسۈملۈك كىلىنىكىلىق باشقۇرۇشنى يولغا قويۇش - كۆرۈنەرلىك كىلىنىكىلىق ئەھمىيەتكە ئىگە بولۇپ، كىلىنىكىلىق دورا ئىشلىتىش مىقدارىنىڭ مۇۋاپىقلىقىنى ئۆسۈملۈك يۇقىرى كۆتۈرگىلى، زور مىقداردىكى دورا ماتېرىياللىرى مەنبەسىنى تېجەپ قالغىلى، ھەمدە بىمارلارنىڭ داۋالاش ئۈنۈمىنىمۇ مەلۇم دەرىجىدە يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ، شۇڭا، كىلىنىكا ئەمەلىيىتى جەريانىدا، زور كۈچ بىلەن تەتبىقلاشقا ۋە كېڭەيتىشكە ئەرزىيدۇ.

ھالدا تەجرىبە گۇرۇپپىسى ۋە سېلىشتۇرما گۇرۇپپىسىغا ئايرىلىپ، ئانالىز ۋە سېلىشتۇرما قىلىندى. تەجرىبە گۇرۇپپىسىدا، ئەرلەر 13 نەپەر، ئاياللار 12 نەپەر بولۇپ، ئوتتۇرىچە يېشى 45 ياش؛ سېلىشتۇرما گۇرۇپپىسىدا، ئەرلەر 14 نەپەر، ئاياللار 11 نەپەر بولۇپ، ئوتتۇرىچە يېشى 47 ياش. بۇ قېتىملىق تەتقىقاتقا قاتناشقان بارلىق بىمارلاردا بىردەك يۈرەك، جىگەر، بۆرەك ئىقتىدار ئېغىر زەخمىلەنگەن ۋە ئۆسۈملۈك دورا ئىشلىتىش چەكلەنگەن ئەھۋاللار يوق بولۇپ، بۇ قېتىملىق تەتقىقاتنىڭ ئاساسىي شەرتىگە ئۇيغۇن كېلىدۇ، تەتقىقات نەتىجىسىگە تەسىر يەتكۈزمەيدۇ.

(2) ئۇسۇل: تەجرىبە گۇرۇپپىسىدىكى بىمارلارغا دورا بېرىش جەريانىدا ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ سۈپىتى باشقۇرۇلدى، كونكرېت مەشغۇلات تۆۋەندىكىچە: دوختۇرخانىدىكى ئالاقىدار تارماقلار دورىگەرلىك تەتقىقاتىنى كۈچەيتىپ، ئۆسۈملۈك دورا كەسپىي خادىملەرنىڭ سەۋىيەسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، كۆپ ئۇچرايدىغان ۋە تىپىك ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ ئالاھىدىلىكى، مۇرەككەپلىكى ۋە رولىنى چوڭقۇر تەتقىق قىلدى. كۆپ خىل تەكشۈرۈش ئۇسۇللىرى ئارقىلىق، ئۆسۈملۈك دورىلارنى ئىنچىكە پەرقلەندۈرۈپ، شۇ ئارقىلىق، ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ سۈپىتىنى كونترول قىلىشنى كۈچەيتىپ، ھەرقايسى ھالقىلارنىڭ سۈپەت ئۆتكىلىنى چىڭ تۇتتى. ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ سۈپىتىنى باشقۇرۇپ ۋە كونترول قىلغاندىن كېيىن، كەسپىي خادىملار دورا مىقدارىنىڭ مۇۋاپىقلىقىنى ئانالىز ۋە مۇھاكىمە قىلىپ، خاتىرە قالدۇرۇپ، يىغىنچاقلاپ، جەدۋەللەشتۈردى.

(3) كۆزىتىش كۆرسەتكۈچى

سۈپەت باشقۇرۇش ئاياغلاشقاندىن كېيىن، ئىككى گۇرۇپپىدىكى بىمارلارنىڭ دورا ئىشلىتىش مىقدارىنىڭ مۇۋاپىقلىقى كۆزىتىلدى، كونكرېت كۆزىتىش كۆرسەتكۈچى، دورا مىقدارىنىڭ مۇۋاپىقلىق نىسبىتى، دورا مىقدارىنىڭ زىيادە كۆپ بولۇش نىسبىتى،

شەرىپىتى كاكىنە چىنىڭ ياللۇغلىنىش خاراكتېرلىك كېسەللىكلەرگە

كۆرسىتىدىغان داۋالاش تەسىرى توغرىسىدا

شرئەلى نۇرمەمەت، زورىگۈل مەمتىمىن (848000)

(خوتەن ناھىيەلىك ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسى)

تۆۋەندە شەرىپىتى كاكىنە چىنىڭ داۋالاش تەسىرىنى
ئۇنىڭ رېتسېپ تەركىبىدىكى يەككە دورىلارنىڭ خۇ-
سۇسىيىتىگە ئاساسەن يېشىپ ئۆتىمىز.

شەرىپىتى كاكىنە چىنىڭ رېتسېپ تەركىبى: ئىت-
ئۈزۈمى، چىلان، كاكىنە چ 14g دىن، ئۆشپە 7g، چۆپ-
چىن، بىنەپشە، تەرخەمەك ئۇرۇقى قاتارلىقلارنىڭ ھەر
بىرىدىن 5g دىن، شېكەر مۇۋاپىق مىقداردا.

شەرىپىتى كاكىنە چىنىڭ تەركىبىدىكى ئاساسلىق
دورا بولغان ئىتۈزۈمىنىڭ تەبىئىتى 2 - دەرىجىدە
قۇرۇق سوغۇق بولۇپ، ئىتۈزۈمى سوغۇقلۇق كەيپ-
ياتى ئارقىلىق قان ۋە سەپرا خىلىتىنىڭ ئۆتكۈرلۈ-
كىنى پەسەيتىپ، كېسەللەنگەن ئورۇننىڭ ھارارىتىنى
تۆۋەنلىتىپ، كېسەل پەيدا قىلغۇچى مىكرو ئورگا-
نىزملارنىڭ ياشاش مۇھىتىنى ئۆزگەرتىپ، يەرلىك
ئورۇندا كېسەل ئوچىقى پەيدا قىلىشنىڭ ئالدىنى
ئالىدۇ؛ يۇمشىتىش خۇسۇسىيىتى ئارقىلىق قان تو-
مۇر، ئەزا توقۇلمىلاردىكى بۇزۇق ماددىلارنى يۇمش-
تىپ، بەدەن سىرتىغا چىقىپ كېتىش سالاھىيىتىگە
ئىگە قىلىدۇ؛ توسالغۇلارنى ئېچىش، ئىششىق ياندۇ-
رۇش خۇسۇسىيىتى ئارقىلىق توسالغۇلارنى ئېچىپ،
ماددىلارنى تارقىتىپ، ئىششىق ياندۇرىدۇ؛ ياللۇغ قا-
تۇرۇش خۇسۇسىيىتى ئارقىلىق ھەرقايسى ئەزالاردى-
كى ياللۇغلارنى قايتۇرىدۇ.

كاكىنە چىنىڭ تەبىئىتى 2 - دەرىجىدە قۇرۇق
سوغۇق بولۇپ، سوغۇقلۇق كەيپىياتى ئارقىلىق قان

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: شەرىپىتى كاكىنە چ، ياللۇغ.

لىنىش خاراكتېرلىك كېسەللىكلەر

تەسىرى: شەرىپىتى كاكىنە چ ئۇيغۇر تېبابەتچىلى-
كىدە ياللۇغ قايتۇرۇش، قان تازىلاش، ئىششىق ياندۇ-
رۇش مەقسىتىدە بىر قەدەر كۆپ ئىشلىتىلىدىغان
پىششىق دورا ياسالغۇلارنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ
يۇقىرىقى تەسىرلىرىدىن پايدىلىنىپ، كىلىنىكىدا
ئاساسلىقى قان ۋە سەپرا خىلىتىدىن بولغان ئاشقا-
زان، جىگەر، ئۆت خالىتىسى، ئۇچەي ياللۇغى، قان تو-
لۇش خاراكتېرلىك تېرە كېسەللىكلىرى، ئەرلەر كې-
سەللىكلىرى ۋە ئاياللار كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلى-
دۇ.

شەرىپىتى كاكىنە چىنىڭ ياللۇغلىنىش خاراكتېر-
لىك كېسەللىكلەرگە بولغان داۋالاش تەسىرى بىر قە-
دەر ياخشى بولۇپ، ياللۇغ قايتۇرۇش، توسالغۇلارنى
ئېچىپ، قاننى تازىلاش، قان تومۇرلارنى راۋانلاشتۇ-
رۇش، قان تومۇرلارنىڭ ئېلاستىكىلىقىنى ئاشۇرۇپ،
قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاش، ھارارەتنى پەسەيتىش،
سۈيىدۈك ھەيدەش قاتارلىق تەسىرلىرى ئارقىلىق، بە-
دەندىكى ياللۇغ پەيدا قىلغۇچى كېرەكسىز ماددىلارنى
سۈيىدۈك ئارقىلىق ھەيدەپ چىقىرىپ، ئەزا توقۇلمىلار-
نىڭ خىزمىتىنى ياخشىلاش ئارقىلىق قان ۋە سەپرا
خىلىتىدىن پەيدا بولغان ئاشقازان، جىگەر، ئۆت خال-
تىسى ۋە ئۇچەي ياللۇغلىرى، قان بۇزۇلۇش خاراكت-
تېرلىك تېرە كېسەللىكلىرى قاتارلىق كېسەللىك-
لەرگە نىسبەتەن ياخشى داۋالاش ئۈنۈمىنى كۆرسىتى-
دۇ.

ھەم قان ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئارقىلىق، بۇ رەكتىن ئۆتىدىغان قاننىڭ مىقدارىنى كۆپەيتىپ، سۈيىدۈك مىقدارىنى كۆپەيتىش ئارقىلىق قاننى تازىلايدۇ. ياللۇغ قايتۇرۇش، يۇمشىتىش رولى ئارقىلىق، ياللۇغ پەيدا قىلغۇچى ماددىلارنى يۇمشىتىپ ۋە تارقىتىپ، سۈيىدۈك ئارقىلىق بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ تاشلايدۇ.

تەرخەمەك ئۇرۇقىنىڭ تەبىئىي ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق بولۇپ، ھۆل سوغۇقلۇقى ئارقىلىق قان ۋە سەپرا خىلىتىنىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىپ، ئەتراپ قان ئايلىنىشىنى ئاستىلىتىپ، سۈيىدۈك مىقدارىنى ئاشۇرۇپ، قان بۇزۇلۇشقا سەۋەبچى بولىدۇ. خان ھەر خىل مىكرو ئورگانىزملارنىڭ سۈيىدۈك بىلەن بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ تاشلىنىشىنى تېزلىتىدۇ.

دېمەك، شەرىپىتى كاكىنەچنىڭ تەبىئىي ھۆل سوغۇق بولۇپ، ئۇنىڭ تەركىبىدىكى دورىلار يۇقىرىقى تەسىرلىرى ئارقىلىق قاننى تازىلاپ، كېسەل پەيدا قىلغۇچى بۇزۇق ماددىلارنى چىقىرىپ تاشلاپ، قان ۋە سەپرا خىلىتلىرىنىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىش ئارقىلىق، ھەر خىل يۇقۇملانغان كېسەللىكلەر بىلەن بۇزۇلۇشتىن بولغان كېسەللىكلەر، ھەر خىل ئىش-شىقلار، جۈملىدىن قان ۋە سەپرا خىلىتلىرىنىڭ غەيرىي تەبىئىي ئۆزگىرىشىدىن پەيدا بولغان تۈرلۈك كېسەللىكلەرگە ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.

پايدىلانغان ماتېرىياللار:

1. «ئۇيغۇر تېبابىتى خام دورىلار ئىلمى»، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك ئالىي تېخنىكومى دەرسلىكى، شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى. 2006 - يىل 3 - ئاي 1 - نەشرى.
2. «ئۇيغۇر تېبابىتى مۇرەككەپ دورىلار ئىلمى»، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك ئالىي تېخنىكومى دەرسلىكى، شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشرىياتى، 2005 - يىل 8 - ئاي 1 - نەشرى.

ۋە سەپرا خىلىتىنىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىپ، ھارا رەتنى تۆۋەنلىتىپ، قان ۋە سەپرا خىلىتلىرىنىڭ كۆيۈپ، ئەزا توقۇلمىلاردا زەخمىلىنىش، ياللۇغلىنىش پەيدا قىلىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. توسالغۇلارنى ئېچىپ، سۈيىدۈك ھەيدەپ، كېسەللىك ماددىسىنى بەدەن سىرتىغا ھەيدەپ چىقىرىدۇ.

چۆپچىن مۇرەككەپ تەبىئەتلىك دورا بولۇپ، يۇمشىتىش خۇسۇسىيىتى ئارقىلىق ئەزا توقۇلمىلاردا تۇرۇپ قېتىپ قالغان ماددىلارنى يۇمشىتىدۇ. توسالغۇلارنى ئېچىش، ئارتۇق ماددىلارنى تارقىتىش خۇسۇسىيىتى ئارقىلىق ئەزا توقۇلمىلاردىكى كېسەل پەيدا قىلغۇچى بۇزۇق ماددىلارنى تارقىتىپ، سۈيىدۈك مىقدارىنى كۆپەيتىش ئارقىلىق كېسەللىك ماددىسىنى بەدەندىن چىقىرىپ تاشلايدۇ. چۆپچىن يەنە قان تازىلاش خۇسۇسىيىتى ئارقىلىق قان خىلىتى تەركىبىدىكى بۇزۇق ماددىلارنى ھەر خىل يوللار ئارقىلىق بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ تاشلاپ، قاننىڭ ساپلىقىنى ئاشۇرىدۇ.

چىلاننىڭ تەبىئىي ھۆللۈككە مايىل مۆتىدىل بولۇپ، ماددىلارنى يۇمشىتىش، پىشۇرۇش، ھارارەت پەسەيتىش. قەۋزىيەتنى يۇمشىتىش رولى ئارقىلىق يەرلىك ئورۇندىكى كېسەل پەيدا قىلغۇچى قويۇق خىلىتلارنى تارقىتىدۇ. قاندىكى بۇزۇق ماددىلارنى چىقىرىپ تاشلاپ، قاننى ساپلاشتۇرىدۇ. سوغۇقلۇقى ئارقىلىق قىزىتما قايتۇرۇپ، قان ۋە سەپرا خىلىتىنىڭ ئۆتكۈرلۈكىنى پەسەيتىدۇ. ھۆللۈكى ۋە قاننى سۈيۈلدۈرۈش رولى ئارقىلىق قاننى سۈيۈلدۈرۈپ، قان ئايلىنىشىنى ياخشىلاپ، ماددا ئالماشتۇرۇش ئىلگىرى سۈرىدۇ.

ئۆشپىنىڭ تەبىئىي ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق ئىسسىقلىق ئارقىلىق قان ئايلىنىشىنى جانلاندۇرۇپ، ماددا ئالماشتۇرۇش ۋە زەخمىلەندۈرگەن توقۇلمىلارنىڭ ئەسلىگە كېلىشىنى تېزلىتىدۇ.

جىگەرنى زەخمىلەندۈرىدىغان بەزى ئۆسۈملۈك دورىلار ھەققىدە

ئۆمەر ئابلىز، بۇخەلچەم بارات (830000)

(شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسى)

مۇھىم نۇقتا: مەقسەت: كۆپ قىسىم كىشىلەر، ئۆسۈملۈك دورىلار ياخشى داۋالاش ئۈنۈمىگە ئىگە بو-
لۇپلا قالماستىن بەلكى يەنە بەلگىلىك بىخەتەرلىككە
ئىگە، دەپ قارايدۇ، شۇڭا ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ بە-
دەنگە، جىگەرگە بولغان زەخمىسىگە سەل قارىلىدۇ.
مەزكۇر ماقالىدە ئاساسلىقى ئۆسۈملۈك دورىلار ۋە يا-
سالىملارنىڭ تۈرلىرى، جىگەرنى زەخمىلەندۈرۈش
مېخانىزمى شۇنداقلا كېسەللىك ئالاھىدىلىكى قاتارلىق
جەھەتلەردىن تەتقىق قىلىندى ھەمدە كەلگۈسىدىكى
تەرەققىياتى قىسقىچە بايان قىلىندى. ئالاقىدار دوكلات
تۆۋەندىكىچە:

ئاچقۇچلۇق سۆز: ئۆسۈملۈك دورىلار؛ ئۆسۈملۈك
دورىلارنىڭ ياسالىملىرى؛ جىگەر زەخمىسى؛ قىسقىد-
چە بايان

ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ دورىلىق رولى بولۇپلا
قالماستىن، بىرلا ۋاقىتتا يەنە ئوخشىمىغان دەرىجىدە
زەھەرلىك رولىمۇ بار، تېبابەت نۇقتىسىدىن قارىغان-
دا، ئۆسۈملۈك دورىلار ۋە ياسالىملار جىگەرنىڭ زە-
خمىلىنىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەبىنىڭ بىرى، دەپ قا-
رىلىدۇ. مەزكۇر ماقالىدە ئەمەلىي كىلىنىكىلىق تەت-
قىقات ئارقىلىق، بۇ جەھەتتىن مۇلاھىزە قىلىنىدۇ.

1. جىگەرنىڭ زەخمىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىد-
رىدىغان ئۆسۈملۈك دورىلار ۋە ياسالما
دورىلارنىڭ تۈرلىرى

(1) ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ ياسالىملىرى: جۇخار
گۈل ئائىلىسىدىن روشەنگۈل، بۇدۇشقا ئۇرۇقى يەنە
گىنۇرا قاتارلىقلار بار؛ پۇرچاق ئائىلىسىدىن ياۋا
گۈلسامساق، سانا يەنە ئاچچىق پۇرچاق قاتارلىقلار بار؛
جىن چاتقىلى ئائىلىسىدىن كۈنمىڭ تاغ تاشئالمىسى،
چايانئوت ئائىلىسىدىن تاش ئېگىر قاتارلىقلار بار؛ سۇ

قامچىئوتى ئائىلىسىدىن كۆپ گۈللۈك قامچىئوت،
يۇمىلاق زىراۋەندە يەنە قىرىققۇلاق، سەرخىس قاتار-
لىقلار بار؛ زەھەرلىك مىنىپال ماددىلاردىن مەرگىد-
مۇش، سىننابار يەنە مىس يېشىلى قاتارلىقلار بار.
(2) ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ مۇرەككەپ ياسالىملىرى:
دىڭىزىيا زەھەر قايتۇرۇش كۈمىلىچى، كېيىن كۈمىد-
لىچى، گاستروسىدىيە ئوتى كۈمىلىچى، پوپىرارىيە يىل-
تىزى ماددىسى ئوكۇلى، گۈشىيەن تابلىتى، بۆرەكنى
قۇۋۋەتلەپ، چاچنى قارايتىش كاپسۇلى يەنە جاھىل
تەمرەتكە كاپسۇلى قاتارلىقلار.

2. ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ جىگەرنى زەخمىلەندۈ-
رۈش مېخانىزمى

نۆۋەتتىكى كىلىنىكىلىق تەتقىقاتتا، ئۆسۈملۈك
دورىلاردىن كېلىپچىققان جىگەر زەخمىلىنىش ئىككى
خىل تىپقا ئايرىلىدۇ، بىرى، جىگەر ئاساسىي ماددىسى
خاراكتېرلىك زەخمىلىنىش، بۇ يەنە دورا خاراكتېر-
لىك ئۆتكۈر، سوزۇلما جىگەر ياللۇغى ۋە دورا خارا-
كتېرلىك سۇس ئۆتكۈر جىگەر ياللۇغىنى ئۆز ئىچىگە
ئالىدۇ؛ يەنە بىرى، جىگەر قان تومۇرلىرى خاراكتېر-
لىك زەخمىلىنىش، بۇنىڭ ئىچىدىكى جىگەر ۋېنا قان
نۆكچىسى مۇشۇ خىل زەخمىلىنىش تىپىغا كىرىدۇ.
جىگەر ئاساسىي ماددىسى خاراكتېرلىك زەخمىلىنىش
يەنە دورا خاراكتېرلىك جىگەر ياللۇغىمۇ دېيىلىدۇ،
بۇنىڭدا ئاساسلىقى بىمارنىڭ ھۈجەيرىسىدىكى ئەركىن
رادىكالىلار ياكى مېتابولىزم ۋاسىتىسى ئارقىلىق، ھۈ-
جەيرە پەردىسى ياغسىمان تەنچىسىنىڭ پېروكسىدلى-
شىش رېئاكسىيەسى تاماملىنىپ، ھۈجەيرىنىڭ ئىچىد-
ىكى مولېكۇلا قۇرۇلمىسىدا ئۆزگىرىش بولغاندىن
كېيىن، ئاكتىپلاشتۇرۇش، زور مىقداردا ئازايتىش قا-
تارلىق شەكىللەر ئارقىلىق غول ھۈجەيرىنىڭ زەخمى-

خاتىرە قالدۇرۇش، ئىشلىتىشتىن بۇرۇن بىمارغا مەۋجۇت بولۇش مۇمكىنچىلىكى بولغان خەۋپ ياكى ئەكس تەسىر ئەھۋاللىرىنى بىلدۈرۈش ئارقىلىق، بىمارنىڭ جىگەر زەخمىلىنىش دەرىجىسىنى يەنىمۇ تۈۋەنلىتىش لازىم.

(2) ئۆسۈملۈك دورىلارنى مۇۋاپىق ئىشلىتىش. ئوخشىمىغان دورىلار ياكى مۇرەككەپ رېتسېپلىق ياكى سالىملارنى بىللە ئىشلەتكەندە مەلۇم دەرىجىدە ئۆزئارا تەسىر شەكىللىنىشى مۇمكىن، مانا شۇنىڭدىن، دورا خاراكتېرلىك جىگەر زەخمىلىنىش مۇمكىنچىلىكى ئاشىدۇ، شۇڭا، بىمارنى داۋالاش جەريانىدا، ھەر خىل ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ دورىلىق رولىنى ئوبدان چۈشىنىپ، دورىنى مۇۋاپىق ئىشلىتىشنى بىلىش لازىم. (3) دورا ئىشلەتكەن بىمارلارنى تەكشۈرۈش سالاھىيىتىنى زورايتىش. قىسمەن بىمارلارغا ئۆسۈملۈك دورىلارنى ئىشلىتىش جەريانىدا، كۆپ خىل ناچار تەسىرلەر كۆرۈلىدۇ، مەسىلەن: پۈتۈن بەدىنى ماغدۇرسىزلىنىش، سۈيدۈكنىڭ رەڭگى قېنىقلاش، ئەسۋە چىقىش ياكى قىزىش قاتارلىقلار، شۇڭا، بىمارلارنىڭ تۈرلۈك بەدەن ئالامەتلىرىنى ۋاقتىدا تەكشۈرۈپ، تەكشۈرۈش نەتىجىسىگە ئاساسەن بالدۇر مۇداخىلە قىلىپ، بالدۇر ئالدىنى ئېلىپ، بىماردا جىگەر زەخمىلىنىش كېلىپچىقىش مۇمكىنچىلىكىنى تولۇق ئازايتىش لازىم.

(4) ئوخشىمىغان ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ جىگەرنى زەخمىلەندۈرۈش مېخانىزمى، كىلىنكىلىق تىپى شۇنداقلا داۋالاش ئۇسۇللىرى قاتارلىقلارنى تولۇق ئۆگىنىپ ۋە چۈشىنىپ، شۇ تۈردىكى بىمارلارنىڭ كىلىنكىلىق داۋالاش ئۇنۈمىنى يەنىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈش. بىمارلارنى داۋالاش جەريانىدا، داۋالاش خادىملىرى قەرەلسىز ھالدا بىمارلار بىلەن پىكىر ئالماشتۇرۇپ، بىمارلارغا جىگەر زەخمىلىنىشنى پەيدا قىلىدىغان ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ تىپىنى تونۇشتۇرۇپ، بىمارلارنىڭ تەبىئىي تونۇشىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشى لازىم. ئۇنىڭدىن باشقا، ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ زەھەرلىك خۇسۇسىيىتىنى ياخشى ئىگىلەپ، دورىلارنىڭ كىلىنكىلىق ئىشلىتىلىش ئۇنۈمىنى يەنىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈش، دورىلارنىڭ تەبىئىي خەۋپىنى ۋاقتىدا بايقاپ، زۆرۈرىيەتسىز زىياننى يېنىكلىتىش لازىم.

لىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، دورىلارنىڭ ئۆزىدەكى زەھەرلىك خۇسۇسىيەت مۆلچەرلىگىلى بولۇش خاراكتېرىگە ئىگە بولغانلىقتىن، مەلۇم قانۇنىيەت مەۋجۇت بولىدۇ، مىقدارى قانچە كۆپ بولسا، زەھەرلىكلىكى شۇنچە كۈچلۈك بولىدۇ، يوشۇرۇن مەزگىلى بىر قەدەر قىسقا بولىدۇ. مۆلچەرلىگىلى بولمايدىغان دورا خاراكتېرلىك جىگەر زەخمىلىنىش بولسا، ئاساسلىقى مۇنداق ئىككى جەھەتتىن ئىپادىلىنىدۇ، بىرى، مېتا-بولىزمى ئالاھىدە بولغان بەدەن، جىگەر زەخمىلىنىش كېلىپچىقىشىدىكى سەۋەب، ھۈجەيرە خىرومى P450 نىڭ ئۆزىدىكى كۆپ ھالەتلىك خاراكتېرنى ئىرسىيەت قالدۇرۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك؛ يەنە بىرى، زىيادە سېزىمچانلىقى ئالاھىدە بەدەن، جىگەر زەخمىلىنىش ئاساسلىقى ئىممۇنىتېت ئارلىق ۋاسىتىسىدا ئىپادىلىنىدۇ، يىڭى ئانتىگېن شەكىللىنىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، يەنە ئوخشىمىغان دەرىجىدىكى زىيادە سەزگۈرلۈك رېئاكسىيەسى بولىدۇ. شۇڭا، جىگەر زەخمىلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش ئالاھىدىلىكى ئاساسلىقى: مۆلچەرلىگىلى بولمايدىغان ئەھۋالنىڭ مەۋجۇتلۇقى؛ دائىرىلىك يۈز بېرىش، يەنى قىسمەن كىشىلەر توپى ياكى جەمئىيەت مەركەزلىك مەۋجۇت بولۇش؛ بىمارنىڭ ئۆزىدىكى دورا ئىچىش مىقدارى يەنە داۋالاش باسقۇچى بىلەن مۇقەررەر باغلىنىشى يوق؛ جىگەرنىڭ زەخمىلىنىش ئەھۋالىنى ھايۋانات مودېلىدا گەۋدىلەندۈرگىلى بولمايدۇ؛ ئىممۇنىتېتتىكى بىنورمال ئالاھىدىلىكتە جىگەرنىڭ تاشقى توقۇلما ئەزالىرىدىكى پاتولوگىيەلىك ئۆزگىرىش كۆرۈنەرلىك مەۋجۇت بولىدۇ.

3. خۇلاسە

نۆۋەتتە، ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ جىگەر زەخمىلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىش سەۋەبى، مېخانىزمى شۇنداقلا ئاساسلىق كېسەللىك ئالامەتلىرى ۋە داۋالاش ئۇسۇلى قاتارلىق جەھەتلەردىكى تەتقىقاتلار تەدرىجىي چوڭقۇرلىماقتا، شۇڭا، داۋالاش خادىملىرى بولۇش سۈپىتىمىز بىلەن كەلگۈسىدىكى خىزمەت جەريانىدا، تۆۋەندىكى بىرقانچە جەھەتتىن مۇكەممەللەشتۈرۈشكە تىرىشىشىمىز لازىم:

(1) ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ زەھەرلىكلىكىگە بولغان تونۇشنى ئۆستۈرۈش. جىگەر زەخمىلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئۆسۈملۈك دورىلارنىڭ تىپى ۋە ئالاھىدىلىكىنى چۈشىنىش، ھەمدە مۇناسىۋەتلىك

يۆتەلنى داۋالاشنىڭ كىلىنىك ئەمەلىيىتىنى كىلاسسىك ئەسەرلەرگە بىرلەشتۈرۈپ مۇلاھىزە قىلىش

ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسى ئۆپكە كېسەللىكلىرى بۆلۈمى (835000)

(ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسى ئۆپكە كېسەللىكلىرى بۆلۈمى)

ماددىلار كۆپىيىپ يەرلىك ئورۇننى تەكرار غىدىقلاپ يالغۇغلاندىرۇش، تەبىئەت كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ، روھىي نەپسانىي ۋە قۇۋۋىتى نەپسانىيىنىڭ تۈرتكىسىدە يات ماددىنى رېفلىكسىلىق تازىلاش خاراكتېرلىك يۆتەلنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

(2) يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى سەۋەبىدىن: يەنى ئىككى قاپقالىق كىلاپان تارىيىش، ئۆپكە ئارتىپ-رىيە بېسىمى يۇقىرىلاش، سول يۈرەك زەئىپلىكى، ئۆپكە تىقىلمىسى، ئۆپكە رايى قاتارلىق كېسەللىرىدە كاناي ۋېنا دىۋارى تومۇرى ئۇزۇن يىل كېڭىيىش، كانايچە دىۋارىدىكى شىللىق پەردىلەردە قان ئۇيۇش، كانايچىلار يالغۇغلىنىش، سول يۈرەك دالانچىسى چوڭىيىپ، سول غول شاخچە كايىچىنى بېسىش. ئۆسمە كانايچىنى تارايىتىش قاتارلىقلاردىن كېلىپچىقىدۇ.

(3) مەركىزىي نېرۋا ئامىلى: غىدىقلىغۇچى يېمەكلىك يېيىش، كۆشلۈك پۇراقلىق نەرسىلەر، خىمە-يەلىك دورا، بۇلغانغان ھاۋا قاتارلىقلارنىڭ غىدىقلاش تەسىرىدىن نېرۋا خاراكتېرلىك يۆتەلىش پەيدا بولىدۇ. ئالامەتلىرى: يۆتەلنىڭ خاراكتېرى: يۆتەل بولۇپ بەلغەم بولمىسا قۇرۇق يۆتەل دەپ ئاتىلىدۇ. كۆپىنچە سوزۇلما يۇتقۇنچاق يالغۇغى، كېكرەك رايى، ئۆتكۈر كانەي شاخچە يالغۇغىنىڭ دەسلەپكى دەۋرى، كانايچە بېسىلىش، كاناي شاخچىسىدىكى يات ماددا ۋە ئۆسمە، كۆكرەك پەردە كېسەللىكلىرى، بىرلەمچى ئۆپكە ئارتىرىيە بېسىمى يۇقىرىلاش ۋە ئىككى قاپقالىق كىلاپان تارىيىش قاتارلىقلار. يۆتەلگە بەلغەم قوشۇلسا ھۆل بەلغەم بولۇپ، سوزۇلما كاناي شاخچە يالغۇغى، كانايچە كېڭىيىش، ئۆپكە يالغۇغى، ئۆپكە يىرىڭلىق ئىششىقى ۋە ئۆپكە تۈپىر كۈليۈزى (تېشىلىش خاراكتېرلىك) قاتارلىقلاردا كۆپ كۆرۈلىدۇ.

ئاساسىي مەزمۇن: كىلىنىكا ئەمەلىيىتىدىكى يۆتەلنىڭ سەۋەب، ئالامەت، داۋالاش ئۇسۇللىرىنى تو-نۇشتۇرۇش بىلەن كىلاسسىك ئەسەرلەرنىڭ يۆتەلگە قارىتا تونۇشى، داۋالاشتىكى مۇجەرەپ رېتسىپلىرى، دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار توغرىسىدا مۇلا-ھىزە قىلىندۇ.

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: يۆتەل، كىلاسسىك ئەسەرلەر-دىكى رېتسىپلار؛ داۋالاشتىكى مۇھىم نۇقتا. يۆتەل كىلىنىكىدا كۆپ ئۇچرايدىغان قوغدىنىش خاراكتېرلىك رېفلىكسىلىق ھەرىكەت. يۆتەل ئارقى-لىقلا نەپەس يولىدىكى ئاجىزلىق ماددىلار ۋە يات ماد-دىلارنى تازىلىغىلى بولىدۇ. بىراق يۆتەل زىيادە كۆپ-يىپ كەتسە ئەكسىچە كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلاپ، نەپەس يول شىللىق پەردىلەردە زەخىملىنىش، قاناش، ئۆزلۈكىدىن پەيدا بولىدىغان ھاۋالىق كۆكرەك قاتار-لىق بىر قاتار كېسەللىك ئۆزگىرىشلىرىنى پەيدا قى-لىپ، جىسمانىي ۋە روھىي جەھەتلەردىن ئاجىزلاشتۇ-رۇپ، كۈندىلىك تۇرمۇشقا، خىزمەتلەردىن قولايىسىز-لىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تۆۋەندە مەن يۆتەلنىڭ سەۋەب، ئالامەت، داۋالاشلىرىنى مۇلاھىزە قىلىش ئار-قىلىق كىلاسسىك ئەسەرلەردىكى يۆتەلنى داۋالاش جەريانىدا ئۇنۈمى كۆرۈنەرلىك بولغان مۇجەرەپ رېت-سىپلىرىدىن بىر قانچىنى تونۇشتۇرۇپ تەھلىل يۈرگۈ-زىمەن.

سەۋەبى:

(1) ھەر خىل ئىچكى-تاشقى سەۋەبلەردىن نەپەس يول ئەزالىرى مىزاجىنىڭ ماددىلىق ۋە ماددىسىز غەيرىي تەبىئىتىگە ئۆزگىرىپ، يەرلىك ئورۇندا ماددا ئالمىشىش قالايمىقانلىشىش، غەيرىي تەبىئىي چۆكمە

ۋە تۆۋەنكى نەپەس يولى ياللۇغى، ئۆپكە تۈبېركۇلىيۇ-
زى، كۆكرەك پەردە ياللۇغىدا كۆرۈلىدۇ.

2. يۆتەل بىلەن كۆكرەك ئاغرىش: كۆپىنچە ئۆپكە
ياللۇغى، كۆكرەك پەردە ياللۇغى، كانايچە ئۆپكە راكى،
ئۆپكە تىقىلمىسى ۋە ئۆزلۈكىدىن بولغان ھاۋالىق
كۆكرەك قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ.

3. يۆتەل بىلەن نەپەس قىيىنلىشىش: كۆپىنچە
كېكرەك سۇلۇق ئىششىقى، كېكرەك راكى، كانەي-
چە زىققىسى، سوزۇلما توسۇلۇش خاراكتېرلىك ئۆپكە
كېسىلى، ئۆپكەگە كۆپ مىقداردا سۇ يىغىلىش، ھاۋا-
لىق كۆكرەك، ئۆپكەگە قان قېيىش، ئۆپكە سۇلۇق
ئىششىقى ۋە كانەيچە يات ماددا بولۇشتا كۆرۈلىدۇ.

4. يۆتەل بىلەن قان تۈكۈرۈش: كۆپىنچە كانەيچە
كېڭىيىش، ئۆپكە تۈبېركۇلىيۇزى، ئۆپكە يىرىڭلىق
ئىششىقى، كانايچە - ئۆپكە راكى، ئىككى قايىقلىق
كىلاپان تارىيىش، كانەيچە تاش پەيدا بولۇش، ئۆپكە-
گە تومۇر قان سېرىق فېرمنت ئولتۇرۇش قاتار-
لىقلاردا كۆرۈلىدۇ.

5. يۆتەل بىلەن كۆپ مىقداردا يىرىڭ بەلغەم كې-
لىش: كۆپىنچە كانايچىلار كېڭىيىش، ئۆپكە يىرىڭلىق
ئىششىقى، ئۆپكە خالتىلىق ئىششىقى يۇقۇملىنىش،
كانەيچە - كۆكرەك پەردە ئاقىمىسى قاتارلىقلاردا كۆرۈ-
لىدۇ.

6. يۆتەل بىلەن ئىسقىرتقان تاۋۇش چىقىش: كۆ-
پىنچە كانەيچە زىققىسى، سوزۇلما ھاسىراش تىپلىق
كاناي شاخچە ياللۇغى، يۈرەك مەنبەلىك زىققە، كانەي-
چىلەرگە يات ماددا تۇرۇۋېلىش قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ.

7. يۆتەل دەۋرى ئۇزۇن بولۇش: كۆپىنچە كاناي-
چىلار كېڭىيىش، سوزۇلما ئۆپكە يىرىڭلىق ئىششىقى،
كانەيچە - ئۆپكە راكى ۋە يىرىڭلىق كۆكرەكتە كۆپ
كۆرۈلىدۇ.

ئۇيغۇر تېبابەت كىلاسسىك ئەسەرلىرىدە: داۋالاش
جەريانىدا ئەزالارنىڭ مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇش ئالاھىد-
لىكىگە ئاساسەن ماددىسىز مىزاج بۇزۇلۇشنى تەڭ-
شەش، ماددىلىق مىزاج بۇزۇلۇشنى مۇنزىج، مۇسھىل
بېرىپ ماددا تەڭپۇڭلۇقىنى تەڭشەش بىلەن بىرگە يۆ-
تەلنى پەسەيتىپ بەلغەم بوشاتقۇچى، ياللۇغ قايتۇرۇپ،
تىنچلاندۇرغۇچى، ئىششىق قايتۇرۇپ، نەپەس يوللى-
رىنى تازىلىغۇچى رېئاكسىيەچانلىقنى تۆۋەنلەشتۈر-

(2) يۆتەلنىڭ ۋاقتى ۋە تەرتىپى: تۇيۇقسىز يۆتەل
غىدىقلىغۇچى يات ماددا ۋە گاز سۈمۈرۈۋېلىشتىن،
لىمفا تۈگۈنى ۋە ئۆسمە كانەيچىنى بېسىشتىن بولىدۇ.
تەكرار يۆتەلىش كۆكىۋتەل، كانەيچە ئىچكى پەردە تۈ-
بېركۇلىيۇزى، كانەيچە زىققىسىدا كۆرۈلىدۇ. ئۇزاق
مۇددەت يۆتەلىش كۆپرەك سوزۇلما كاناي شاخچە يال-
لۇغى، كانەيچە كېڭىيىش، ئۆپكە يىرىڭلىق ئىششىقى
ۋە ئۆپكە تۈبېركۇلىيۇزىدا كۆرۈلىدۇ. كېچىسى كۆپ يۆ-
تەلىش سول يۈرەك زەئىپلىكى ۋە ئۆپكە تۈبېركۇلىيۇ-
زىدا كۆرۈلىدۇ. سەۋەبى ئۆپكەدە قان قېيىش ئېغىرلاش
سىمپاتىك نېرپىلارنىڭ قوزغىلىشى كۈچىيىش بىلەن
مۇناسىۋەتلىك.

(3) يۆتەلنىڭ ئاۋازى: ① يۆتەل ئاۋازى بوغۇق بولسا
كۆپىنچە ئاۋاز پەردە ياللۇغى ۋە ئۆسمە كېكرەك قا-
تىش نېرۋىسىنى باسقاندىن بولىدۇ. ② خوراز چىلىد-
غاندەك يۆتەل، ئۇزۇقسىز تۇتاقلىق يۆتەل ۋە يۇقىرى
ئاۋازدا نەپەس ئېلىشلار، كۆكىۋتەل، كېكرەك قى-
سمىدىكى كېسەللىكلەر كانەيچىنى بېسىش قاتار-
لىقلاردا كۆرۈلىدۇ. ③ مېتال ئاۋازىدەك يۆتەل كۆپىنچە
دىياپراگما ئۆسمىسى، ئائورتا ئۆسمىسى ۋە كانەيچە
راكى كانايچىلارنى بېسىشتىن كېلىپچىقىدۇ. ④ يۆتەل
پەس ئاۋازدا كۈچسىز بولسا، ئېغىر دەرىجىدىكى ئۆپكە
ھاۋالىق ئىششىقى، ئاۋاز پەردىسى پارالىچلىنىش ۋە
ئادەتتىن تاشقىرى ئاجىزلاردا كۆرۈلىدۇ.

(4) بەلغەم خاراكتېرى ۋە مىقدارى: بەلغەم چاپلى-
شاڭغۇ بەلغەم، جاڭيۇسىمان بەلغەم، يىرىڭلىق بەلغەم،
قانلىق بەلغەم قاتارلىقلارغا بۆلۈنىدۇ. چاپلاشقان بەل-
غەم كۆپىنچە ئۆتكۈر كاناي شاخچە ياللۇغى، كانەيچە
زىققىسى ۋە چوڭ بۆلەكلىك ئۆپكە ياللۇغىنىڭ دەس-
لەپكى دەۋرىدە ۋە سوزۇلما كاناي شاخچە ياللۇغى، ئۆپ-
كە تۈبېركۇلىيۇزىدا كۆپ كۆرۈلىدۇ. جاڭيۇسىمان بەل-
غەم كۆپىنچە ئۆپكە سۇلۇق ئىششىقىدا كۆرۈلىدۇ. يى-
رىڭلىق بەلغەم يىرىڭلىق مىكروبتىن بولغان تۆۋەنكى
نەپەس يولى يۇقۇملىنىشتا كۆرۈلىدۇ. قانلىق بەلغەم
نەپەس يولى شىللىق پەردىلەر زەخمىلىنىش، ئۇششاق
قان تومۇرلار ۋە قان سۇيۇقلۇقى ئۆپكە پۈۋەكچىسىگە
سىڭىپ كىرىش قاتارلىقلاردا كۆرۈلىدۇ.

ئەگەشمە ئالامەتلەر:

1. يۆتەل بىلەن قىزىش كۆپىنچە ئۆتكۈر يۇقىرى

سەن يېغى، نەركەس يېغى سۈركەپ بېرىلسە، تامىقىغا ئارپا سۈيى، بىنەپشە مۇرابباسى، ناۋات قوشۇپ بېرىلە. سە تېز ساقىيىپ كېتىدۇ. دورىلارنىڭ تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق ۋە قۇرۇقتىن بولسا: بىنەپشە، نېلۇپەرنى قاينىتىپ، خۇنسىياۋشان، قەنت، بادام يېغى قوشۇپ ياكى كۆكنار شەربىتى، چىلان، سەرپىستان، بىنەپشە قاينىتىپ بېرىلىدۇ. كېسەلنىڭ تامىقىغا ئارپا سۈيىگە ئاق كۆكنار ئۇرۇقى، شېكەر قوشۇپ بېرىلىدۇ. بىنەپشە شە يېغى ئاق موم بىلەن كۆكرىكى ياغلاپ بېرىلىدۇ. دورىلارنىڭ تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق. ئۇيغۇر تېبابىتى داۋالاش دەستۇرى 357 - بەتتە: قۇرۇقتىن بولغان يو - تەلنىڭ داۋاسى:

1. ھەر كۈنى ئەتىگەندە - كەچتە ياڭاق مېغىزى بىلەن زەنجىۋىلىنى مۇۋاپىق مىقداردا چاپناپ بەرسە بو - لىدۇ. دورىنىڭ تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق
2. 250 گىرام كۈدە يىلتىزى بىلەن 250 گىرام چىلاننى قاينىتىپ، يىلتىزنى ئېلىۋېتىپ قايناتمىنى ئىچىپ، چىلاننى يەپ بەرسە كاناي ياللۇغى، يۆتەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ. دورىنىڭ تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق
3. ئاق تۇرۇپنى 200 گىرام نېپىز ئاقلاپ كۈ - رۇشكىغا سېلىپ ئۈستىگە چىلاشقۇدەك ھەسەل قۇيۇپ 3 سائەتتىن كېيىن ئېغىزنى ئېچىپ ھەر قېتىمدا بىر قوشۇقتىن يېسە بولىدۇ. دورىنىڭ تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق

4. جۈزە پوستى، خام زەنجىۋىل، بالەنگو 6 گى - رامدىن مۇۋاپىق مىقداردا سۇ بىلەن قاينىتىپ دو - رىلارنىڭ تەمى چىققاندىن كېيىن ئۈستىگە ئازراق ھەسەل ئارىلاشتۇرۇپ، ھەر قېتىمدا مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال قىلىدۇ. دورىنىڭ تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق
5. سوزۇلما يۆتەل بولسا مۇۋاپىق مىقداردىكى ئۆ - رۇك مېغىزغا ئازراق ناۋات ئارىلاشتۇرۇپ سوقۇپ، كۈندە ئەتىگەن ئاشتىدا 9 گىرامدىن 10 كۈن ئىستېمال قىلىدۇ. دورىنىڭ تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق
6. سامساقنى چاۋا ياغ بىلەن پىشۇرۇپ 7 كۈن يېسە ساقايىمغان يۆتەلگە مەنپەئەت قىلىدۇ. دورىنىڭ تەبى - ئىتى: ئىسسىق

7. رەيھان ئۇرۇقى، بېھى ئۇرۇقى، بىنەپشەنىڭ ھەر بىرىدىن 6 گىرامدىن، ئەنجۈر قېقىدىن 15 گىرام ئېلىپ، 200 مىللىلىتىر قايناق سۇ بىلەن دەملەپ 30 گىرام ھەسەل قوشۇپ ئىچسە نەپەسنى راۋانلاشتۇرۇپ

گۈچى قاتارلىق دورىلار بىلەن داۋالاش ئېلىپ بارغان ھەم داۋالاش جەريانىدا كېسەللەنگەن ئەزالارنىڭ مە - زاجى بىلەن دورىلارنىڭ تەبىئىتىنىڭ ماسلىشىشچان - لىقىغا (ھۆللۈكتىن، قۇرۇقتىن، ئىسسىقتىن، سو - غۇقتىن، قۇرۇق ئىسسىق، ھۆل ئىسسىق، ھۆل سو - غۇق، قۇرۇق سوغۇقتىن) بولغانلىرىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىپ، دورىلارنىڭ تەبىئىتىنىمۇ ئەزالارنىڭ مزاج ئۆزگىرىشى بويىچە ماسلاشتۇرۇپ ئايرىپ داۋالاش قى - لىپ كەلگەن. يېقىنقى بىر قانچە يىللاردىن بېرى يو - تەلنى داۋالاش جەريانىدا سەۋەبى، ئالامىتى، داۋالاش ئۈنۈمى جەھەتتە ئىزدىنىش ۋە كۆزىتىشىمىزگە قار - دىغاندا دورىلارنىڭ خۇسۇسىيىتىگە كۆپرەك ئەھمىيەت بېرىلىپ تەبىئىتىگە سەل قارالسا كېسەللىكنىڭ دا - ۋالاش ئۈنۈمىگە تەسىرى بولغانلىقى، كېسەللىك مە - زاجى بىلەن دورىلارنىڭ تەبىئىتى ماس كەلگەندە دا - ۋالاش ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك ياخشى بولىدىغانلىقىنى ھېس قىلدۇق.

تۆۋەندە داۋالاش ئەمەلىيىتى جەريانىدا ئەمەلىيەت - تىن ئۆتكۈزگەن ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولغان قەدىم - قى كىلاسسىك ئەسەرلەردىكى پېشۋالىرىمىزنىڭ يو - تەلنى شەرھىلىشى داۋالىغۇچى مۇجەررەپ رېتسېپلىرى - دىن بىر قانچىنى تونۇشتۇرۇپ ئۆتەيمەن.

يۈسۈپ ھاجىنىڭ [قانۇنچە] كىتابىدا 1975 - يىلى 2 - ئاي 1 - نەشرىدە 81 - 82 بەتتە: يۆتەل ئۆپكە ۋە كۆكرەكنىڭ ھەرىكىتىدىن بارلىققا كېلىدۇ. يۆتەل ھۆلدىنمۇ ياكى قۇرۇقتىنمۇ بولۇشى مۇمكىن

ھۆلدىن بولغاننىڭ ئالامىتى: كېسەل ئۈسسماي - دۇ، بەلغەمدىن بولسا تولا ئۈسسمايدۇ. قۇرۇقتىن بولسا: كۆپ ئۈسسمايدۇ، سوغۇق شامالدىن راھەتلىنىدۇ، نەپەس قىستايىدۇ، بەدەن ئورۇق بولىدۇ، بەلغەم بولمايدۇ. تو - مۇر تېز، ئارقىمۇ ئارقا سالىدۇ. زاتىلجەنبە كېسەللى - كىدىن بولغان يۆتەلدە ئېغىزدىن سېسىق بەلغەم كې - لىدۇ، بەلغەمنى ئوتقا سالسا كۆيگەن سۆڭەك ياكى كۆيگەن يۇڭدەك پۇرايدۇ، سۇغا سالسا چۆكىدۇ. ھۆلدىن بولسا: داۋالاش: گىل ئەرمىنى، ئەرەب يېلىمى، كەتىرا ھەربىرى 3 مىسقال پۇڭ (10 گىرام)، پىرسىياۋشان 6 مىسقال، زۇپا، يالپۇز، ھاشا، دارچىن ھەر بىرى 1 مىس - قال 2 پۇڭدىن (4 گىرام) ئېلىپ سوقۇپ تاسقاپ، ھەسەل بىلەن خېمىر قىلىپ يېگۈزۈلسە، گال قىسمىغا سەۋ -

تاباشىرنى ئارىلاشتۇرۇپ يېگۈزۈش. تەبىئىتى: ھۆل
سوغۇق.

ھەرقانداق يۆتەلگە: چىلان 10 گىرام، بىخسۇس
10 گىرام، گاۋزىبان 3 گىرام، پىرسىياۋشان 3 گى-
رام، كاشىكاپ قىلىپ ئۇسسۇلۇق ئورنىدا ئىچىلىدۇ.
قارىمۇچ، پىلىپىل، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، قىزىلگۈل 3
گىرامدىن، خەشخاش 2 گىرامدىن ئېلىپ زەنجۈبىل
سۈيىدە يۇغۇرۇپ قارىمۇچ چوڭلۇقىدا ھەب تەييارلاپ
كۈندە كەچتە شۈمۈشكە بېرىلىدۇ. دورىنىڭ تەبىئىتى:
مۆتىدىل

پىششىق دورىلار خەزىنىسى: قۇرۇق يۆتەلگە پايدى-
دىلىق غار-غار، مارجان شوخلا، ئانار گۈل، رۇبىي
سۇس، يۇمىغاقسۇت ئۇرۇقى، خىيار شەنبەر 15 گىرام-
دىن، خەشخاش ئۇرۇقى 18 گىرام، بىخسۇس، گۈلبىد-
نەپشە، قىزىلگۈللەردىن 15 گىرامدىن ئېلىپ دورىلار-
دىن كاشىكاپ تەييارلاپ غار-غار قىلىندۇ. دورىنىڭ تەبى-
ئىتى: ھۆل سوغۇق.

تېببىي ئەكبەردە -311-309-308: بەتتە: ئىسسىق
ۋە قۇرۇقتىن بولغان يۆتەلنى داۋالاش: ئىسپىغۇل،
ئارپا ئېشى، بىنەپشە مۇرابباسى ۋە شۇلارغا ئوخشاش
سوغۇق نەرسىلەرنى يېيىش، سەندەل، كافۇر، كاۋا قىر-
مىقى قاتارلىقلارنى يۇمىغاقسۇت سۈيى، ئوسۇڭ سۇ-
يى، گۈلابلار بىلەن قوشۇپ ئېزىپ كۆكرەككە چېپىش
لازىم. دورىنىڭ تەبىئىتى: ھۆل سوغۇق. ئۆپكەنىڭ مە-
زاجى ساددا سوغۇققا ئۆزگەرگەن سەۋەبتىن يۆتەل
بولسا: مەجۈنى قەبىزى تەييارلاپ بېرىلىدۇ. تەركىبى:
ئۇرۇقى ئېلىنغان ۋاسالغۇ 70 گىرام، زەپە، سۈمبۇل،
سەلىخە، قوۋزاقدارچىن ھەر بىرى 3.5 گىرام، قەسبۇ
زەررە، ئىزخىر، مۇقەل 70 گىرامدىن، ساپ قىلىنغان
مور 140 گىرام، ھەسەللەردىن مۇۋاپىق ئېلىپ مەجۈن
تەييارلىنىدۇ. تەبىئىتى: قۇرۇق ئىسسىق

دېمەك ھەر خىل سەۋەبتىن بولغان يۆتەلنى دا-
ۋالاشتا: مزاج تەڭشەپ سەۋەب ئالامىتىگە ئېتىبار
بېرىشتىن باشقا كېسەللىك مزاجى بىلەن دورىلارنىڭ
تەبىئىتىنى ماسلاشتۇرۇشىمىز زۆرۈر بولۇپ بۇ ئار-
قىلىق ئەزالارنىڭ مزاجىنى تەڭشەش، خىلىتلار تەڭ-
پۇڭلۇقىنى ساقلاش، كېسەللىك ئالامىتىنى تېزىدىن
كونترول قىلىش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ.

يۆتەلنى توختىتىدۇ. دورىنىڭ تەبىئىتى: مۆتىدىل
8. خەشخاشتىن 50 گىرام، ئاق لەيلى ئۇرۇقى،
تەرخەمەك ئۇرۇقى، بېھى ئۇرۇقىنىڭ ھەربىرسى 10
گىرام، تازىلانغان چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 30 گىرام،
ئىسپىغۇل 10 گىرام، مۇۋاپىق مىقداردىكى سۇدا چىلاپ
قاينىتىپ يېرىمى قالغاندا سۈزۈپ 500 گىرام نا-
ۋات 250 گىرام ھەسەل قوشۇپ قىيام قىلىپ بولغان-
دىن كېيىن چۈچۈكبۇيا يىلتىزى جەۋھىرى، سەمغى
ئەرەبى، كەتىرا، شېكەر ھەر بىرىنى 4 گىرامدىن
ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ تاسقاپ يۇقىرىقى قىيامغا
قوشۇپ، كۈندە 7 گىرام ئىستېمال قىلىدۇ. دورىنىڭ
تەبىئىتى: ھۆل ئىسسىق

9. كۆكنار ئۇرۇقىدىن 8 گىرام، كۆكنار پوستى-
دىن 6 گىرام، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قىيامىدىن 5 گى-
رام، قاق ئۇرۇقى مېغىزىدىن 5 گىرام، ئەنجۈر قېقىدىن
4 دانە، شېكەردىن 30 گىرام ئېلىپ سوقۇپ تاسقاپ،
سۇفۇپ تەييارلاپ كۈندە مۇۋاپىق مىقداردا ئىستېمال
قىلسا، زۇكام ۋە زۇكامدىن بولغان يۆتەلگە مەنپەئەت
قىلىدۇ. دورىنىڭ تەبىئىتى: قۇرۇق سوغۇق

10. ماشىنى ھەسەل بىلەن يەپ بەرسە يۆتەل پە-
سىيدۇ. ئىچىنى بوشتىدۇ. دورىنىڭ تەبىئىتى: ھۆل
ئىسسىق

11. نېلۇپەر، خەشخاش 9 گىرامدىن، چىلان ھە-
مىشباھار 6 گىرامدىن، بېھى ئۇرۇقى 3 گى-
رام، شۇمشا ئۇرۇقى 5 گىرام، مۇۋاپىق مىقداردىكى
ھەسەل بىلەن شەرىپەت تەييارلاپ مۇۋاپىق مىقداردا
ئىستېمال قىلىدۇ. دورىنىڭ تەبىئىتى: مۆتىدىل.

تۈردى مەمەت (ئۇيغۇر تېبابەت قوللانمىسى)دىن
يۆتەل ماددىسىز ئىسسىقتىن بولغاندا: ئىسپىغۇل
لوئابى بېرىلىپ، ئاق سەندەل، كافۇر، يۇمىغاقسۇت، قا-
پاق لېشىنى بىرلەشتۈرۈپ كۆكرەككە قويۇلىدۇ. لوئو-
قى سەرپىستان بېرىلىدۇ. دورىنىڭ تەبىئىتى: ھۆل
سوغۇق. ماددىسىز سوغۇقتىن بولغاندا: ئالدى بىلەن
سوغۇق شارائىتىنى يوقىتىپ لوئوقى ئەنجۈر ۋە باشقا
ئىسسىقلىق شىرنىلىك دورىلار بېرىلىدۇ. دورىنىڭ تە-
بىئىتى: ئىسسىق.

ئىككىرى ئەزەمدە: قۇرۇق ئىسسىقتىن بولغان يۆ-
تەلگە: ياخشى قايماق بىلەن قەنتنى مۇۋاپىق مىقداردا
ئارىلاشتۇرۇپ يېگۈزۈش، ئۆچكە سۈتى بىلەن 3 گىرام

مۇرەككەپ ئەرەقنىڭ سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىش خاراكتېرلىك

تېرە كېسەللىكىنى داۋالاش ئۈنۈمىنى كۆزىتىش

تۇرسۇنغۈل ئىلياس ، مۇتەللىپ پولات (843000)

(ئاقسۇ ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسى)

ۋىلىك يەلتاشما، ھۆل تەمرە تەكسىمان تېرە ياللىق. غى، ئالاھىدە رېئاكسىيە چان تېرە ياللىق، يەلتاش. ما، بوۋاقلار ھۆل تەمرە تەكسى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ ماقالىدە يۈز قىسمىدىكى تېرە سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىش كېسەلى ئۈستىدە توختىلىمىز.

1. ماتېرىيال ۋە ئۇسۇل

(1) ئادەتتىكى ماتېرىيال: 56 نەپەر بىمارلار ئىچىدە ئەرلەر 11 نەپەر بولۇپ، %19.6 نى، ئاياللار 45 نەپەر بولۇپ، %80.3 نى ئىگىلەيدۇ، يېشى ئەڭ چوڭى 62 ياش، ئەڭ كىچىكى 24 ياش بولۇپ، ئوتتۇرىچە يېشى 43 ياش، كېسەللىك تارىخى ئەڭ ئۇزۇن بولغىنىغا 8 يىل، ئەڭ قىسقىسىغا 2 ھەپتە بولغان، خىلىت ئايرىمىسى جەھەتتىن غەيرىي تەبىئىي سەپرادىن بولغىنى 30 نەپەر بولۇپ %53.6 نى، غەيرىي تەبىئىي بەلغەمدىن بولغىنى 18 نەپەر بولۇپ %32.1 نى، قاننىڭ ئوفۇنەتلىنىشىدىن بولغىنى 8 نەپەر بولۇپ، %14.2 نى ئىگىلەيدۇ.

(2) دىياگنوز ئۆلچىمى: بىمارنىڭ كېسەللىك تارىخى، تىپىك كىلىنىكىلىق ئىپادىسى، بەدەن - بەلگەسى تېرە زەخمىلىرىنىڭ ئالاھىدىلىكى، قوشۇمچە تەكشۈرۈش نەتىجىلىرىگە ئاساسەن دىياگنوز قويۇلدى.

1.3 داۋالاش ئۇسۇلى

(1) ئالدى بىلەن بىمارغا كېسەللىك ئەھۋالى، داۋالاش ئۇسۇلى، دىققەت قىلىدىغان ئىشلار تەپسىلىي

قىسقىچە مەزمۇنى: مەقسەت: مۇرەككەپ ئەرەقنىڭ سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىش خاراكتېرلىك تېرە كېسەلىگە بولغان داۋالاش ئۈنۈمىنى كۆزىتىش. ئۇسۇل: مۇرەككەپ ئەرەقنى يەرلىك ئورۇن تېرە زەخمىسىگە ھۆل كامپۇرۇس قىلىپ داۋالاش.

نەتىجە: 56 نەپەر بىمار ئىچىدە ساقايغانلار 32 نەپەر بولۇپ %57.4 نى، ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولغانلار 12 نەپەر بولۇپ %21.4 نى، ئۈنۈمى بولغانلار 8 نەپەر بولۇپ %14.2 نى، ئۈنۈمى بولمىغانلار 4 نەپەر بولۇپ %7 نى ئىگىلەپ، ئومۇمىي ئۈنۈم بېرىش نىسبىتى %93 بولدى.

يەكۈن: مۇرەككەپ ئەرەقنى يەرلىك ئورۇن تېرە زەخمىسىگە ھۆل كامپۇرۇس قىلغاندا، يەرلىك ئورۇن تېرىسىنىڭ قىچىشىنى پەسەيتىش، قىزىلىقنى يوقىتىش، تېرە سەزگۈرلۈكىنى تۆۋەنلىتىش، ھارارەت پەسەيتىش قاتارلىق ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر:

سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىش خاراكتېرلىك تېرە كېسەلى، مۇرەككەپ ئەرەق: داۋالاش تېرە سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىش خاراكتېرلىك تېرە كېسەللىكلىرى - تېرە سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىشتىن بولغان نۇرغۇن كېسەللەرنى كۆرسىتىدۇ. ئۇلارنىڭ كۆپ ئۇچرايدىغانلىرىدىن ھۆل تەمرە تەك، يولۇقۇش خاراكتېرلىك تېرە ياللىق، ئەسە.

چۈشەندۈرۈلۈپ، داۋالاشقا بولغان ماسلىشىشچانلىق قولغا كەلتۈرۈلۈپ، روھىي جەھەتتىن خاتىرجەم قىلد. نىپ، ساقىيىشقا بولغان ئىشەنچىسى تۇرغۇزۇلدى.

(2) بىمارغا يەللىك، غىدىقلىغۇچى يېمەك - ئىچ - مەكتىن پەرھىز قىلىنىپ، ئاسان سىڭىدىغان لەتىق غىزالار بىلەن ئوزۇقلىنىش لازىملىقى تەكىتلىنىپ، تېرىنىڭ سەزگۈرلۈكىنى ئاشۇرۇۋېتىدىغان، رېئاك - سىيە قىلىدىغان ماددىلار بىلەن ئۇچراشماستىن، قوزغاتقۇچى ئامىللارغا يولۇقماستىن تاپىلدى.

(3) داۋالاشتا روھىي داۋالاش بىلەن دورا ئارقىلىق داۋالاشنى زىچ بىرلەشتۈرۈپ، تېرە پەرۋىشىنى ماسلاش - تۇرۇپ، كېسەل پەيدا قىلغۇچى غەيرىي تەبىئىي خە - لىمىتقا قارىتا كېسەللىك ماددىسىنى پىشۇرۇش مەق - سىتىدە مۇنزىج بېرىش بىلەن بىرگە، قان تازىلاش، يال - لۇغ قايتۇرۇش، ھارارەت پەسەيتىش ئۈچۈن دىنار شە - رى، كاسىنە جەۋھىرى، قۇرسى ئىتتىرىغىل سانا، ئەرقى شاھتەررە، ئىتتىرىغىل شاھتەررە قاتارلىق دو - رىلار مىزاجىغا ئاساسەن تاللاپ بېرىلدى، كېسەللىك ماددىسى پىشقانلىق ئالامىتى كۆرۈلگەندىن كېيىن، ماس ھالدىكى مۇسەھىل بېرىش بىلەن بىرگە مەتبۇخ ھېلىلە، مەتبۇخ شاھتەررە تاللاپ بېرىلدى. كېسەللىك ماددىسى بەدەندىن تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، قان تازىلاش، ياللۇغ قايتۇرۇش، جىگەرنىڭ تەبىئىي خىلىت ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش مەق - سىتىدە قۇرسى شاھتەررە، ئۆشپە شەرىپىتى، ئەرقى شاھتەررە، دىنار شەرىپىتى قاتارلىق دورىلار تاللاپ ئى - چىشكە بېرىلدى. ياللۇغ قايتۇرۇش، قىچىشىنى پە - سەيتىش، قىزىللىقنى يوقىتىش، تېرە سەزگۈرلۈكىنى تۆۋەنلىتىش مەقسىتىدە مۇرەككەپ ئەرەق (چۆپچىن، كاسىنە، شاھتەررە قاتارلىق دورىلارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ تەييارلىغان ئەرەقنى كۆرسىتىدۇ) نى يۈز قە - سىم تېرە زەخمىسىگە كۈنىگە 2 قېتىم 30 مىنۇتتىن ھۆل كامپۇرۇس قىلىندى. ئەرقى گۈل بىلەن كۈندە 2 ۋاق 20 مىنۇت يۈز قىسمى سوغۇق ھوردىتىلدى. يۈز

قۇرتى تەكشۈرۈلۈپ، يۈز قۇرتى (-) چىقسا، كۈندە بىر ۋاق 15 مىنۇت قىزىل نۇردا داۋالاندى، يۈز قۇرتى (+) چىقسا، قىزىل نۇردا داۋالاش ئېلىپ بارماي، يۈز قىس - مىدىكى قىزىللىق سەل يېنىپ، كېسەللىك ئەھۋالى تۇراقلاشقاندا قۇرت ئۆلتۈرۈش مەقسىتىدە 3% لىك مەلھىمى كىبرىت 2 كۈندە بىر ۋاق مايلاندى ھەمدە ھەببى كىبرىت يېيىشكە بېرىلدى.

2. نەتىجە

2.1. 56 نەپەر بىمار ئىچىدە ساقايغانلار 32 نەپەر بولۇپ %57.4 نى، ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولغانلار 12 نە - پەر بولۇپ %21.4 نى، ئۈنۈمى بولمىغانلار 8 نەپەر بولۇپ %14.2 نى، ئۈنۈمى بولمىغانلار 4 نەپەر بولۇپ %7 نى ئىگىلەپ، ئومۇمىي ئۈنۈم بېرىش نىسبىتى %93 بول - دى.

3. مۇھاكىمە

چۆپچىن: تەبىئىي ھۆل ئىسسىق بولۇپ، قان تا - زىلاش، ياللۇغ قايتۇرۇش، جاراسىملارغا قارشى تۈ - رۇش، ئىششىق ياندۇرۇش، زەھەر قايتۇرۇش، خۇشلۇق كەلتۈرۈش قاتارلىق رولى بار. كاسىنە چۆپى: تەبىئىي ھۆل سوغۇق بولۇپ، ئىششىق ياندۇرۇش، ياللۇغ قايتۇ - رۇش، توسالغۇ ئېچىش، قان ۋە سەپرا خىلىتىنىڭ ئۆت - كۈرلۈكىنى پەسەيتىش قاتارلىق رولى بار. شاھتەررە: تەبىئىي قۇرۇق سوغۇق بولۇپ، غەيرىي تەبىئىي ۋە سەپرا خىلىتىنى تازىلاش، ياللۇغ قايتۇرۇش، قىزىتما قايتۇرۇش، قان تازىلاش رولى بار. يۇقىرىقى دورىلارنىڭ ھۆللۈك ۋە سوغۇقلۇققا مايىللىقى بىر قەدەر كۈچلۈك بولۇپ، بىرلەشتۈرۈپ ئىشلەتكەندە تېرە ئەسۋىسىگە قارىتا قىچىشىنى پەسەيتىش، قىزىللىقنى يوقى - تىش، قىزىشنى تۈگىتىش، ھارارەت پەسەيتىش، تېرە - نىڭ سەزگۈرلۈكىنى تۆۋەنلىتىش رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، يۈز قىسمىدىكى سەزگۈرلۈكى ئېشىپ كېتىش خاراكتېرلىك تېرە كېسەللىكىنىڭ داۋالاش ئۈ - نۈمى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈرۈلگىلى بولىدۇ.

ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىلىرى خام دورىخانىلىرىدا

ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر توغرىسىدا

روشنەنگۈل رىشت، دىلنۇر ئىبراھىم (830049)

(شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابىتى دوختۇرخانىسى)

قىسقىچە مەزمۇنى: يېقىنقى يىللاردىن بېرى، ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىلىرى خام دورىخانىلىرىدىكى دورىگەرلەر، خام دورا نەقلەنمىلىرى سۈپىتى، مەش-خۇلات قائىدىسى، دورا تارقىتىش ھالقىلىرى ۋە مەسلىھەت بېرىش قاتارلىق جەھەتلەردە ھەر خىل مەسىلىلەر كۆرۈلمەكتە. بۇ ماقالىدە بۇ مەسىلىلەر ئۈستىدە تەھلىل يۈرگۈزۈلۈپ، بىر قانچە تۈرلۈك مەسلىھەت بېرىلىدۇ.

ئاچقۇچلۇق سۆز: ئۇيغۇر تېبابەت خام دورىخانىلىرى، كۆرۈلگەن مەسىلىلەر، تەھلىل ۋە تەكلىپ. ئۇيغۇر تېبابەت دورىخانىلىرى خام دورىخانىلىرىنىڭ رېتسىپ بويىچە دورا تەييارلاش خىزمىتىنىڭ ئۆزگىچە ئالاھىدىلىكى بار. گەرچە ئۇيغۇر تېبابەت خام دورىخانىلىرى غەرب تېبابەت دورىخانىلىرىغا ئوخشاش ئىككىنچى دەرىجىدىكى دورا بۆلۈمى بولسىمۇ، لېكىن خىزمەت مەزمۇنى ۋە خىزمەت قىلىش ئۇسۇلى جەھەتتە چوڭ پەرق قىلىدۇ. ئۇيغۇر تېبابەت خام دورىخانىلىرى خىزمىتىگە ئۇزۇن مەزگىل سىستېمىلىق تەتقىقات تونۇشى ۋە ئىلمىي باشقۇرۇش كەمچىل بولغاچقا، كىشىلەرنىڭ بۇ جەھەتتە تونۇشى ئېنىق بولماي كەلدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر تېبابەت خام دورىخانىلىرىنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ بىر قاتار يېڭى مەسىلىلەر كۆرۈلۈشكە باشلىدى. شۇڭا ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىلىرى خام دورىخانىلىرى خىزمىتىنىڭ تېخىمۇ ياخشى ئىشلىنىپ تەرەققىي قىلىشى ئۈچۈن كۆرۈلگەن مەسىلىلەرنى تۆۋەندىكى نەچچە تۈرگە يىغىنچاقلىدىم ھەمدە پايدىلىنىش ئۈچۈن

تەكلىپ پىكىرلەرنى ئوتتۇرىغا قويدۇم.

1. خام دورىخانا خىزمەتچىلىرىنىڭ سەپلىنىش

مەسىلىسى

ھەرقانداق خىزمەتنىڭ ئەڭ ئاساسلىق ۋە تۈپكى شەرتى ئادەم ھېسابلىنىدۇ. ئۇيغۇر تېبابەت دورىگەرلىك كەسپىدە سىستېمىلىق تەربىيەلەنگەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ يىلدىن-يىلغا كۆپلەپ پۈتكۈزۈپ چىقىشىغا ئەگىشىپ، ئۇيغۇر تېبابەت دورىگەرلىرىنىڭ كەسپىي ساپاسى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى. لېكىن دورىگەرلەر توپى قۇرۇلۇشى يەنىلا كۆڭۈلدىكىدەك ئەمەس. خام دورىخانىنىڭ مۇھىتى ناچار، چاڭ-توزان كۆپ، دورا پۇراقلىرى كۈچلۈك، خىزمەت ۋەزىپىسى ئېغىر ھەم مۇرەككەپ، جىسمانىي ئەمگەك ئېغىر بولۇشتەك ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلى، نۇرغۇن دورىگەرلەرنىڭ خىزمىتىگە بولغان قىزغىنلىقى سۇسلىماقتا. ھازىر دو-رىگەرلىك كەسپىنىڭ تەرەققىيات كەلگۈسى ۋە مائاش تەمىناتى نۇرغۇن يېڭى مەكتەپنى پۈتكۈزگەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئېھتىياجىنى قامدىيالماي، دورىگەرلىك كەسپىي ساھەسىدە بىر خىل غەيرىي ئەھۋاللار كۆرۈل-مەكتە: يەنى نۇرغۇن ئۇيغۇر تېبابەت دورىگەرلىرى كەسپىنى قىلماي، خىزمەت ئالمىشىپ كېتىپ، دورىگەرلىك خىزمىتىنى ئىشلەۋاتقان خادىملار دورىگەرلىك كەسپىدە تەربىيەلەنمىگەن. خام دورىخانىدا قالغان كەسپىي دورىگەرلەر بولسا ئۆرلەپ ئوقۇش، ئۇنۋاننى ئۆرلىتىش قاتارلىق ھەر خىل ئۇسۇللار ئارقىلىق دو-رىگەرلىك خىزمىتىدىن ئۆزىنى قاچۇرماقتا. بۇ ئەھ-ۋاللارغا قارىتا، دوختۇرخانا خىزمەت مىقدارىغا قاراپ

ئىلمىي مۇۋاپىق ھالدا دورىگەرلەرنىڭ سانىنى تەڭ - شىشى كېرەك. خىزمەتكە يېڭى قاتناشقان خادىملارنىڭ ئىدىيەۋى قارىشى توغرا، ئۇيغۇر تېبابەت كەسپىنى سۆيىدىغان بولۇشى كېرەك. نەزەرىيەۋى بىلىمى پۇختا بولۇپلا قالماستىن، جاپاغا چىداش روھى بولۇشى، بە - دەن ساپاسى ياخشى بولۇپ، ئېغىر خىزمەتلەرنىڭ زىم - مىسىدىن چىقالشى كېرەك.

2. ئۇيغۇر تېبابەت نەقلەنمىلىرىنىڭ سۈپەت مە - سىلىسى

ئۇيغۇر تېبابەت نەقلەنمىلىرىنىڭ سۈپەت مە - سىلىسى كىلىنىكىلىق داۋالاش ئۈنۈمى بىلەن بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ساختا تۆۋەن سۈپەتلىك دورا نەقلەنمىلەر داۋالاش ئۈنۈمىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ، ھەت - تا ئۈنۈمى بولماسلىق، ئەكس تەسىر بېرىش قاتارلىق يامان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىدۇ. شۇڭا بۇ مە - سەللىككە ھەرگىز سەل قارىغىلى بولمايدۇ. ئىقتىسادىي مەنپەئەتنى قوغلىشىش، دورا نەقلەنمىلىرىنىڭ سىرت - قى ئورنىلىشى، بىر قىسىم دورىگەرلەرنىڭ تەجرىبە - سىنىڭ كەمچىللىكىدىن دورىلارنى پەرق ئېتەلمەسلىك قاتارلىق سەۋەبلەردىن نۇرغۇن ئۇيغۇر تېبابەت دوخ - تۇرخانىلىرىنىڭ دورىخانىلىرىدا ساختا تۆۋەن سۈپەت - لىك خام دورا نەقلەنمىلىرى مەۋجۇت بولۇپ تۇرماقتا. بولۇپمۇ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دورا نەقلەنمىلىرى - نىڭ سۈپىتىنىڭ ياخشى بولماسلىق ئەھۋاللىرى ئۈي - غۇر تېبابەت دوختۇرخانىلىرىنىڭ داۋالاش ئۈنۈمىگە تەسىر كۆرسىتىپ كەلمەكتە. بۇ مەسىلىنى يوقىتىش ئۈچۈن دۆلەتلىك مۇناسىۋەتلىك ئورۇنلار خام دورىلار - نىڭ سۈپەت ئۆلچىمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، نازارەتنى كۈچەيتىپ، ساختا ناچار خام دورا ساتقان ئورۇنلارغا قاتتىق زەربە بەردى. شۇنداقىمۇ دوختۇرخانىلار خام دورا كىرگۈزگەندە سۈپەت ئۆلچىمىنى يۇقىرى ئورۇن - غا قويۇپ، نازارەتنى كۈچەيتىشى كېرەك. دوختۇرخانا سۈپەت باشقۇرۇش بۆلىملىرى سۈپەت تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىپ، قەرەللىك ئۇيغۇر تېبابەت نەقلەنمىلىرى - نىڭ سۈپىتىنى تەكشۈرۈش دەرىجىسىنى ئۆيۈشتۈ - رۇپ، دورا مۇتەخەسسسلەرنى تەكلىپ قىلىپ دەرس ئۆتۈش ياكى باشقا ئىلغار ئورۇنلارغا بېرىپ بىلىم ئا - شۇرۇش ئارقىلىق دورا سۈپەت باشقۇرغۇچى خادىملار -

نىڭ كەسپىي ساپاسىنى ئاشۇرۇشى كېرەك. شۇنداق قىلغاندىلا ئۇيغۇر تېبابەت دورا نەقلەنمىلىرىنىڭ سۈ - پىتىگە شۇنداقلا كىلىنىكىلىق داۋالاشنىڭ ئۈنۈمىگە كاپالەتلىك قىلغىلى بولىدۇ.

3. دورا تەكشۈش مەشغۇلاتىنى ئۆلچەملەشتۈرۈش مەسىلىسى

مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن، دورا تەكشۈشكەندە «تەڭ مىقداردا بۆلۈش» پىرىنسىپى بويىچە دورا تەكشۈلىدۇ. لېكىن، دورا تەننەرخى ۋە ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلى ئەمەلىي خىزمەت جەريانىدا «تەڭ مىقداردا بۆلۈش» پىرىنسىپى بويىچە مەشغۇلات ئېلىپ بېرىلماي، دورا نەقلەنمىلىرىنىڭ تەكشۈلۈش سۈپىتى بىردەك بولماسلىق ئەھۋاللىرى كۆرۈلمەكتە.

ئەمەلىيەتتە «تەڭ مىقداردا بۆلۈش» پىرىنسىپى چوقۇم ئەمەل قىلىشقا تېگىشلىك ئاساسىي پىرىن - سىپ. يېڭى خىزمەتكە چۈشۈپ 5 يىل بولمىغان دورى - گەرلەر ۋە پىراكتىكانتلار بۇ پىرىنسىپقا چوقۇم قات - تىق ئەمەل قىلىشى كېرەك. خىزمەت تەجرىبىسى يۈ - قىرى بولغان 10 يىلدىن ئاشقان دورىگەرلەرنىڭ بولسا بۇ جەھەتتىكى «قول سېزىمى» خېلى توغرا بولىدۇ. يۇقىرى تەجرىبىگە ئىگە بولغان دورىگەرلەرنىڭ دورى - غا، مىقدارغا بولغان سېزىمى خېلى توغرا، ئەمما دورا رېتسېپلىرىنىڭ تەركىبىدە قىممەت، زەھەرلىك، ئۆت - كۈر، ناركوز دورىلىرى بولغاندا يەنىلا «تەڭ مىقداردا بۆلۈش» پىرىنسىپىغا قاتتىق رىئايە قىلىشى كېرەك.

4. دورا تارقىتىش ۋە مەسلىھەت بېرىش ھالقى - سىدىكى مەسىلىلەر

دورا تارقىتىش ۋە مەسلىھەت بېرىش خىزمىتىگە دوختۇرخانا باشقۇرغۇچىلار ۋە دورىگەرلەر ئەزەلدىن تولۇق ئەھمىيەت بېرىپ كەلمىگەن. شۇنى كۆرۈۋې - لىشقا بولىدۇكى، بىمارلارنىڭ دورىنى توغرا ئىشلى - تىش بىلىملىرى يەنىلا كەمچىل بولۇپ كەلمەكتە. بە - زى بىمارلار مۇنزىج دورىلارنى مىزاجىغا قاراپ تولۇق ئىچمەيدۇ؛ بەزى بىمارلار قۇۋۋەتلىگۈچى دورىلارنىلا ئىچىپ، كېسەلنى يىلتىزىدىن ساقايتالمايدۇ؛ بەزى بىمارلار دورىنىڭ مىقدارى بويىچە يېمەيدۇ؛ يەنە بەزى بىمارلار دورا ئىچىش مەزگىلىدە پەرھىزگە دىققەت قىلمايدۇ. بۇلارنىڭ ھەممىسى ئاخىرى بېرىپ داۋالاش

ئۈنۈمنىڭ تۆۋەن بولۇپ قېلىشىغا سەۋەب بولۇپ قالايدۇ. دورىگەرلەر بىر تەرەپتىن ئېغىر ھەم مۇرەككەپ خىزمەت ۋە زىيىسى سەۋەبىدىن بىمارلارغا دورىلارنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇللىرى، پەرھىزلىرىنى تولۇق چۈشەندۈرۈپ بېرەلمەيدۇ؛ يەنە بىر تەرەپتىن نۇرغۇن دورىگەرلەرنىڭ كىلىنىكىلىق دورا ئىشلىتىش بىلىملىرى ۋە كېسەلگە بولغان تونۇشى ناھايىتى چەكلىك بولغانلىقى ئۈچۈن، بىمارلارنىڭ سورىغان سوئاللىرىغا جايدا توغرا جاۋاب بېرەلمەيدۇ.

دورا تارقىتىش ۋە دورا ئىشلىتىشتىن مەسلىھەت بېرىش خىزمىتىنى مەسئۇل دورىگەردىن يۇقىرى بولغان كەسپىي خادىملار ئىشلىشى كېرەك، ئەگەر شارائىت يار بەرمىگەن ۋاقىتتا بولمىدى دېگەندە تەجرىبىلىك دورىگەرلىك ئۇنۋانغا ئىگە بولغان دورىگەر ئىشلىشى كېرەك. دورىگەرلەرنىڭ مەكتەپتىكى ئۆگەنگەن كەسپىي بىلىملىرى كۆپىنچە خىمىيەلىك ئانالىز ۋە دورىگەرلىك بىلىملىرى بولۇپ، كىلىنىكىلىق كەسپىي بىلىملەرنىڭ قوبۇل قىلىنىشى ئومۇميۈزلۈك يېتەرلىك بولمىغان. شۇڭا دورا ئىشلىتىشتىن مەسلىھەت بېرىش خىزمىتىنى قىلغان دورىگەر چوقۇم بۇ جەھەتتىكى بىلىملىرىنى تولۇقلىۋېلىشى كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن دورىگەر خادىم ئۆز ئالدىغا كىتاب - ماتېرىياللارنى ئاقتۇرۇپ ھەر خىل كېسەللەر بىلەن تونۇشۇپ چىقىپ، دورا ئىشلىتىش بىلىملىرىنى پۇختا ئىگىلىشى، شۇنداقلا ھەرقايسى كىلىنىكا بۆلۈملىرىدە گە كىرىپ دوختۇرلاردىن مەسلىھەت ئېلىش، بىمارلار بىلەن بىۋاسىتە ئۇچرىشىش قاتارلىق ھەر خىل ئۇسۇللار ئارقىلىق تېخىمۇ كۆنكرېت بىلىملەرنى ئۆگەنىشى كېرەك. بۇنداق قىلغاندا دورىگەرلەرنىڭ بىلىم قۇرۇلمىسى كېڭىيىپ دورا ئىشلىتىش توغرىسىدا بىمارلارغا توغرا مەسلىھەت بېرەلەيدۇ، شۇنداقلا دورىگەرلەرنىڭ خىزمەت ۋە ئۆگىنىش قىزغىنلىقىنى قوزغاپ، دورىگەرلەرنىڭ ئۇزۇن مەزگىل دورا تەڭشەش دورا تارقىتىشلا خىزمىتىنى قىلىپ شەكىللىنىپ قالغان «كۈن ئۆتسىلا بولدى» دېگەن خىزمەت پوزىتسىيەسىنى ئۆزگەرتكىلى بولىدۇ.

5. دورىگەرلەرنىڭ كەسپىي ساپاسى ۋە مەدەنىي

ساپاسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش مەسلىسى ئۇيغۇر تېبابەت دورىگەرلىرى ئالدى بىلەن ئۇيغۇر تېبابىتىگە ناھايىتى ئەستايىدىل پوزىتسىيەدە بولۇشى، ئادەم ھاياتىغا ھۆرمەت نەزىرىدە قارىشى ھەمدە ئۇيغۇر تېبابەت دورىگەرلىك خىزمىتىگە يۇقىرى دەرىجىدە مەسئۇلىيەتچانلىق تۇيغۇسىدا بولۇشى كېرەك. ئۇيغۇر تېبابەت دورىگەرلىك خىزمىتىنىڭ ئىنسان تېنىنى ساغلاملاشتۇرۇپ، ھاياتىنى قۇتقۇزۇشتەك مۇقەددەس كەسپىنىڭ كەم بولسا بولمايدىغان مۇھىم ھالقىسى ئىكەنلىكىنى تونۇپ يېتىش كېرەك. خىزمەتتە ئەستايىدىل، ئىنچىكە بولۇشى كېرەك. تىرىشىپ كەسپىي بىلىمنى ئاشۇرۇپ، قېتىرقىنىپ تەتقىق قىلىپ، ئۆزىنىڭ كەسپىي بىلىمى ۋە تېخنىكىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشى كېرەك. شۇنداقلا خىزمەتتە سەۋر - چان بولۇشى كېرەك. دورىگەرلىك كىلىنىكىلىق داۋالاش جەريانىدىكى ئېغىر خىزمەتلەرنىڭ بىرى. دورىگەرلەر بىمارلارغا قىزغىن مۇلازىمەت قىلالىشى، سەۋرچان، ئىنچىكە بولالىشى كېرەك. گەرچە «زېرەك كىشىلىك» خىزمەت بولسىمۇ، دورىگەرلەردە ئۆزىنى بېغىشلان روھى بولۇشى، شەخسىي پايدا - زىياننى يۇقىرى ئورۇنغا قويۇۋالماستىلىقى، مەنپەئەت قوغلاشماستىلىقى كېرەك. دورىگەرلەر ئۇيغۇر تېبابەت كىلاسسىك ئەسەرلىرىنى كۆپ ئوقۇش ئارقىلىق ئەجدادلىرىمىزنىڭ ھاياتلىققا بولغان تونۇشلىرىنى ئۆرنەك ئېلىپ ئۆگەنسە بولىدۇ.

6. خۇلاسە

ئۇيغۇر تېبابەت دورىگەرلىك خىزمىتى بولسا كىلىنىكىلىق داۋالاشتىكى ئەڭ ئاخىرقى مۇھىم ھالقى بولۇپ، مەيلى دوختۇرخانا باشقۇرغۇچىلىرى بولسۇن ياكى مۇناسىۋەتلىك خىزمەتلىرى بىلەن شۇغۇللانغۇچىلار بولسۇن چوقۇم چوڭقۇر ئەھمىيەت بېرىشى كېرەك. خىزمەت جەريانىدا كۆرۈلگەن يېڭى ئەھۋاللار ۋە مەسلىھەتلىرىنى ۋاقىتتا بايقاپ، ئاكتىپ ھەل قىلىش چارىلىرىنى ئىزدەش كېرەك. شۇنداق قىلغاندا ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ توختاۋسىز تەرەققىي قىلىشىنى قولغا كەلتۈرۈپ، كىشىلەرنىڭ ساقلىقىنى ساقلاش ئىشلىرى ئۈچۈن تۆھپە قوشقىلى بولىدۇ.

قۇرسى سۆرۈنجاننىڭ ئۈنۈملۈك مۇددىتىنى

دەلىللەشتىن خۇلاسە

دىنلۇر ئىبراھىم، ئابدۇۋەز ئابلەخ (830049)

(شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تېبابىتى دوختۇرخانىسى دورا ياساش مەركىزى)

ھەبىۋىلىل، غارقۇن، رۇمبەدىيان، كەرەپشە ئۇرۇقى، مۇقەل، مەستىكى قاتارلىق 9 خىل ئۇيغۇر تېبابەت خام دورىلىرىدىن پايدىلىنىپ ياساپ چىقىلغان بو-لۇپ، كىلىنىكىدا كۆپ ئىشلىتىلىدىغان پىششىق دورا بولغاچقا، بۇ دورىنى بىخەتەر ئىشلىتىشكە كاپا-لەتلىك قىلىش ئۈچۈن، مەزكۇر دورىنىڭ تۇراقلىقلىق-قىنى دەلىللەش ئۈچۈن ئەۋرىشكە ئېلىپ تەجرىبە قى-لىندى.

ئەۋرىشكە:

قۇرسى سۆرۈنجان بۇ دورا نېپىز قەۋەتكە قاپلان-غان سارغۇچ جىگەر رەڭلىك تابلەت. 0.52 گرام تەمى ئاچچىق، تۈركۈم نومۇرى: 20120119، 20130115، 20130228 (ياسالمنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم را-يونلۇق ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسى تەمىنلىگەن).

ئۈسكۈنە ۋە تەكشۈرۈش ئۇسۇلى:

1. نازۇك ئېلىپكىتىرونلۇق تارازا: بېيجىڭ سېتە-روس ئەسۋاب سىستېمىسى چەكلىك شىركىتى ئىش-لەپچىقارغان، تىپى BS-224S:

2. ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنى بىر تەرەپ قىلىش ماشى-نىسى: شاڭخەي ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنى چەكلىك شىر-كىتى ئىشلەپچىقارغان. تىپى (sk8210HP)

3. ئۇلترا بىنەپشە نۇر: بېيجىڭ شەھىرى لىيۇ يى-ئەسۋاب ئۈسكۈنىلىرى زاۋۇتى ئىشلەپچىقارغان. تىپى. (wp-9403D):

4. زەمبۇرۇغ ئۆستۈرۈش ساندۇقى: شاڭخەي بو-شۇن داۋالاش ئۈسكۈنىلىرى زاۋۇتى ئىشلەپچىقارغان. تىپى (MJX-160B-2):

5. پارچىلىنىش دەرىجىسىنى ئۆلچەيدىغان ئەس-ۋاب: تىيەندا تىيەنفا پەن - تېخنىكا چەكلىك شىركىتى

قىسقىچە مەزمۇنى: مەقسەت: قۇرسى سۆرۈنجاننى بىخەتەر ئىشلىتىشكە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن مەز-كۇر دورىنىڭ ئۈنۈمىنى دەلىللەش. تەجرىبە ئۇسۇلى: قۇرسى سۆرۈنجاننىڭ تۇراقلىق-قىنى ئېنىقلاش؛ نورمال تېمپېراتۇرا.

($25 \pm 2^{\circ}\text{C}$) شارائىتتا ئەۋرىشكە قالدۇرۇپ، ئايرىم-ئايرىم 0 ئاي، 3 ئاي، 6 ئاي، 9 ئاي، 12 ئاي، 18 ئاي، 24 ئاي، 36 ئاي كۆزىتىپ، مەزكۇر دورىنىڭ سىرتقى شەكلى، سېلىشتۇرما ئېغىرلىقى، پارچىلىش دەرى-جىسى، باكتېرىيە سانى، تەركىب نۇقتىلىرىنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق مەزكۇر دورىنىڭ تۇراقلىق خۇ-سۇسىيىتىنىڭ ياخشى، ئىشلىتىش بىخەتەر ئىكەنلى-كىگە ھۆكۈم قىلىندى. يەكۈن: قۇرسى سۆرۈنجاننىڭ خۇسۇسىيىتىنىڭ تۇراقلىق، ئىشلىتىش بىخەتەر بو-لۇپ، ئۈنۈم بېرىش مۇددىتى 3 يىل ئىكەنلىكى دەلىل-لەندى.

ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: قۇرسى سۆرۈنجان، ئىشلى-تىش ئۈنۈم مۇددىتى.

قۇرسى سۆرۈنجان رايونىمىزدىكى ئۇيغۇر تېبابەت داۋالاش ئاپپاراتلىرىدا دائىم ئىشلىتىلىدىغان ياسالما بولۇپ، ئۇ ئاساسلىق بوغۇملار ئاغرىش ۋە رېماتىزم كېسەللىكلىرىنى داۋالاش مەقسىتىدە ئىشلىتىلىدۇ. ئادەتتە غەيرىي تەبىئىي بەلغەمنى سۈرۈپ چىقىرىش يەل ھەيدەپ توسالغۇلارنى ئېچىش، ئاغرىق پەسەي-تىش، غەيرىي تەبىئىي بەلغەمدىن بولغان بوغۇملار ئاغرىش، قۇيۇمۇچ نېرۋا ئاغرىقى، رېماتىزم، ساختا رېماتىزم قاتارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاش ئۈچۈن كۆپ ئىشلىتىلىدۇ.

قۇرسى سۆرۈنجان تۈرۈت، سۆرۈنجان، سەبەر،

ئىشلەپچىقارغان. تىپى ZB-1D:

6. بىيوخىمىيە ئۆستۈرۈش ساندۇقى: نەنجىڭ خېڭيۇ ئەسۋاب ئۈسكۈنىلىرى چەكلىك شىركىتى ئىشلەپچىقارغان. تىپى (SP-250AT): پەرقلەندۈرۈش:

قۇرسى سۆرۈنچاندىن 10 تالنى ئېلىپ، ئېزىپ مېتانولدىن 20 مىللىلىتىر قوشۇپ، ئۇلترا ئاۋاز دولقۇندا 20 مىنۇت بىر تەرەپ قىلىپ، سۈزۈپ، سۈز-ۋالغان سۈيۈقلۈكنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقىغا 1 مىللىلىتىر مېتانولدىن قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق ئېرىتمىسى تەييارلىنىدۇ.

ئالوي گىلىكوزىد سېلىشتۇرما دورىسىدىن بەش مىللىگىرام ئېلىپ، 1 مىللىلىتىر مېتانول قوشۇپ سېلىشتۇرما ئېرىتمىسى تەييارلىنىدۇ، نېپىز قەۋەت-لىك رەڭ ئىسپىكتىر ئۇسۇلى («جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى دورا قامۇسى» 2010 - يىلى بىرىنچى بۆلۈم-قوشۇمچە (VIB) سىنىقى تەجرىبىسىگە ئاساسەن سىناق قىلىنىغۇچى ئېرىتمە ۋە سېلىشتۇرما دورا ئېرىتمىسىدىن 2ml سۈمۈرۈپ ئېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سىلىكاگېل G لىق تاختا ئۈستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىپ ئېتىل ئاتىستات-مېتانول-سۇ (1:2:10) نى يېيىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇغاندىن كېيىن، 365nm ئۇلترا بىنەپشە نۇردا كۆرگەندە، سىناق قىلىنىغۇچى دورىنىڭ رەڭ ئىسپىكتىرىدا ھەم سېلىشتۇرۇلدىغان دورىنىڭ رەڭ ئىسپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاش رەڭلىك داغ توچكىلىرى كۆرۈلىدۇ.

سېلىشتۇرما ئېغىرلىقى: جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى دورا قامۇسىدا تابلەت دورىلىرىنىڭ سېلىشتۇرما ئېغىرلىقىنى تەكشۈرۈش ئۇسۇلى ۋە ئۆلچىمى بويىچە تەكشۈرۈلدى. بۇنىڭدا بەلگىلەنگەن ئۇسۇل: 20 دانە تابلەت ئېلىپ، نازۇك تارازا ئارقىلىق ئومۇمىي مىقدارى ئۆلچەپ چىقىلىدۇ، ئوتتۇرىچە تابلەت ئېغىرلىقىنى ھېسابلىغاندىن كېيىن، ھەربىر تابلەتنىڭ ئېغىرلىقى ئايرىم-ئايرىم ئۆلچەپ چىقىلىدۇ، ھەربىر تابلەت ئېغىرلىقى بىلەن ئوتتۇرىچە تابلەت ئېغىرلىقىنى سېلىشتۇرغاندا، پەرق چەكلىمىسى +5% دىن ئېشىپ كەتكەنلىرى 2 تابلەتتىن ئاشماسلىقى، چەك-

لىمىدىن 1 ھەسسە ئاشقان تابلەت بولماسلىقى كېرەك دەپ بەلگىلىگەن.

پارچىلىنىش دەرىجىسىنى تەكشۈرۈش: جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى دورا قامۇسى تابلەت دورىلىرىنىڭ پارچىلىنىش دەرىجىسىنى تەكشۈرۈش ئۇسۇلى ۋە ئۆلچىمى بويىچە تەكشۈرۈلدى. ئۇنىڭدا 6 دانە تابلەت ئېلىپ، ئۇنى پارچىلىنىش دەرىجىسىنى تەكشۈرۈش ئەسۋابىدىكى ئەينەك نەچچە سېلىپ، سۇ تېمپېراتۇرىسىنى 36% — 37% كىچە تەڭشەپ، بەلگىلەنگەن سۈرئەتتە ھەرىكەتلەندۈرۈپ ئېرىش دەرىجىسى تەكشۈرۈلدى. پارچىلىنىش دەرىجىسى ئادەتتىكى تابلەتلارنىڭ 30 — 60 مىنۇت بولۇشى كېرەك دەپ بەلگىلىگەن.

مىكروپ تەكشۈرۈش:

جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى دورا قامۇسى تابلەت دورىلىرىنىڭ مىكروپ تەكشۈرۈش ئۇسۇلى بويىچە تەكشۈرۈلدى، بۇنىڭدا ئېغىزدىن ئىستېمال قىلىنىدىغان تەركىبىدە ئەسلىي دورا تالقىنى بار بولغان ياسال-مىلارنىڭ ھەربىر گىرامدا باكتېرىيە سانى 10000 دىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك، زەمبۇرۇغ سانى ھەربىر گىرامدا 100 دىن ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك دەپ بەلگىلىگەن.

تۇراقلىقلىقىنى تەكشۈرۈش:

نورمال تېمپېراتۇرا ($25 \pm 2^\circ\text{C}$) بۇ دورىنى 0، 3، 6، 9، 12، 18، 24، 36 ئاي ساقلاپ قەرەللىك ھالدا دورىنىڭ سىرتقى شەكلى، سېلىشتۇرما ئېغىرلىقى، پارچىلىنىش دەرىجىسى، باكتېرىيە ۋە زەمبۇرۇغ سانى، تەركىب نۇقتىلىرىدا ئۆزگىرىش بولغان - بولمىغانلىقى تەكشۈرۈلدى.

يەكۈن: قۇرسى سۆرۈنچان ياسالما مىسنىڭ سىرتقى شەكلى، سېلىشتۇرما ئېغىرلىقى، پارچىلىنىش دەرىجىسى، مىكروپ سانى، پەرقلەندۈرۈش تۈرلىرىدە ھېچقانداق ناچار ئۆزگىرىشلەر بولمىغان بولۇپ بەلگىلىگەن ئۆلچەمگە مۇۋاپىق. ئىشلىتىش بىخەتەر بولۇپ، ئۈنۈم بېرىش مۇددىتى 3 يىل ئىكەنلىكى دەلىللەندى.

دوختۇرخانىنىڭ دورا بۆلۈمىنى باشقۇرۇشتا ساقلىنىۋاتقان

مەسىلىلەر ۋە قارشى تەدبىرلەر

ئاسمىگۈل ساۋۇت (830049)

(شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئۇيغۇر تىبابەت دوختۇرخانىسى دورا ياساش مەركىزىدىن)

نۆۋەتتە بىر قىسىم دوختۇرخانىلارنىڭ دورا بۆلۈملىرىدە، دورىلارنى قېلىپلاشتۇرۇپ باشقۇرۇش ئېڭى بىر قەدەر تۆۋەن. مەسىلەن: دورىلارنىڭ رولىغا ئاساسەن تۈرلەرگە ئايرىپ تىزىش تەرتىپى قېلىپلاش. ماسلىق؛ ناركوز دورىلىرى، روھىي كېسەللىكلەر دورىلىرى، زەھەرلىك خاراكتېرگە ئىگە دورىلار قاتار. لىق رېتسېپ مىقدارى چەكلىنىدىغان دورىلارنى دۆ. لەتنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمىلىرىگە ئاساسەن تەرتىپ بويىچە قويماسلىق؛ ساقلىنىدىغان دورىلارنى تۈرى، سۈپىتى، مىقدارى ۋە ئۈنۈملۈك مۇددىتى بويىچە تۈرلەرگە ئايرىش تەرتىپىگە رىئايە قىلماسلىق، دورىلارنىڭ بىخەتەر ساقلىنىش تەرتىپىگە ئەمەل قىل. ماسلىق. ھەتتا دوختۇرخانا دورا بۆلۈمىدىكى توڭلاتقۇ. غايىمەكلىك ساقلاش قاتارلىق نامۇۋاپىق مەسىلىلەر مەۋجۇت.

2. دورىلارنىڭ كىرگۈزۈلۈش يوللىرى قېلىپلاشماسلىق مەسىلىلىرى سەۋەبلىك، دورىلارنىڭ سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلالماسلىق. دورا سۈپىتىنىڭ ياخشى-يامان بولۇشى داۋالاش ئۈنۈمىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدىغان بولۇپ، بىمارنىڭ ھاياتىي بىخەتەرلىكىگە مۇناسىۋەتلىك مۇھىم ھالقا. نۆۋەتتە، ئېلىمىزنىڭ دورا مەھسۇلاتلىرىنىڭ

دورخانىنى باشقۇرۇش دوختۇرخانىنى تەشكىلىي باشقۇرۇشتىكى بىر مۇھىم ھالقا، دورخانىنىڭ مۇلازىمەت ساپاسى ۋە باشقۇرۇش سەۋىيەسى بىمارلارنىڭ دورىنى ئۈنۈملۈك ئىشلىتىشى، دورىنىڭ داۋالاش ئۈنۈمىگە، بىخەتەرلىكىگە ئىشەنچ باغلىشىدا بىۋاسىتە رول ئوينايدۇ. دورا بۆلۈمى دوختۇرخانىنىڭ ئوبرازى ۋە قىياپىتىنى بىۋاسىتە ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرىدىغان مۇھىم كۆز نەكلەرنىڭ بىرى. مەزكۇر ماقالىدا نۆۋەتتە دورا بۆلۈمىنى باشقۇرۇشتىكى ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر، يېتەرسىز نۇقتىلار ئانالىز قىلىنىپ، مۇناسىپ تەدبىرلەر ئۈستىدە تەتقىقات ۋە ئانالىز ئېلىپ بېرىلدى. ھەمدە دوختۇرخانا دورا بۆلۈمىنىڭ بىر پۈتۈن باشقۇرۇش سەۋىيەسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇش ئۈستىدە مۇناسىپ تەدبىرلەر ئوتتۇرىغا قويۇلدى.

بىرىنچى، ساقلىغان مەسىلىلەر

1. دوختۇرخانىنىڭ دورا بۆلۈملىرىدە كەسپىي خادىملارنىڭ دورىلارنى قېلىپلاشتۇرۇپ باشقۇرۇش ئېڭى بىر قەدەر تۆۋەن بولۇپ، دورا بۆلۈمىنى قېلىپلاشتۇرۇپ باشقۇرۇش تۈزۈمىنىڭ سىجىل ئەمەلىيلىشىشىگە مەلۇم دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىپ كېلىۋاتىدۇ.

دا ئالاقە كاپالەتكە ئىگە بولالماي، بىمارلارنى دورا بۆلۈمى بىلەن دوختۇر ئوتتۇرىسىدا تەكرار قاتناشقا مەجبۇر قىلىپ قويۇپ، داۋالاش مۇلازىمىتىنىڭ راۋانلىقىغا تەسىر يەتكۈزۈپ كېلىۋاتىدۇ.

4. دورىگەرلەرنىڭ كەسپىي ساپاسى ۋە تېخنىكىلىق سەۋىيەسىنىڭ يۇقىرى-تۆۋەن بولۇشى سەۋەبلىك بىمارلارنىڭ دورا ئىشلىتىش ئۈنۈمى ۋە بىخەتەرلىكى كاپالەتكە تولۇق ئېرىشەلمەسلىك مەسىلىلىرى يەنىلا مەۋجۇت بولۇپ، دورا بۆلۈمى مۇلازىمىتىنى باشقۇرۇش سۈپىتى ۋە سەۋىيەسىگە تەسىر يەتكۈزۈپ كېلىۋاتىدۇ. بۆلۈمۈ دوختۇرخانىنىڭ دورا بۆلۈملىرىدە ۋاقتىلىق ئىشلىتىلىدىغان خادىملار بىر قەدەر كۆپ بولۇپ، ئۇلارنىڭ مەسئۇلىيەت ئېغىرى ۋە كەسپىي سەۋىيەسى بىر قەدەر تۆۋەن بولغاچقا، بىمارلارغا دورا بەرگەندە تولۇق چۈشەندۈرۈشكە ئەھمىيەت بەرمەي، بىمارلارنىڭ دورا ئىچىش تەرتىپى، مىقدارى، مۇددىتىگە چۈشەنچە ئېنىق بولماسلىق مەسىلىلىرى مەۋجۇت.

5. دورا بۆلۈمىدىكى خادىملارنىڭ مۇلازىمەت سۈپىتى يېتەرلىك بولماسلىق

دورا بۆلۈمىدىكى خادىملار بۆلۈمۈ كۆزەتكەن تۈرىدىن مۇلازىمەتچى خادىملار، پۇختا بولغان كەسپىي بىلىم سەۋىيەسىنى ھازىرلاشتىن سىرت، تېخىمۇ مۇھىم بولغىنى كەسپىي ئەخلاق ساپاسىنى ھازىرلىشى زۆرۈر بولۇپ، بىمارلارغا قىزغىن مۇئامىلە قىلىش، ھېسداشلىق قىلىشنى بىلىش ۋە مەسئۇلىيەتچان بولۇپ، بىمارلار سورىغان ھەرقانداق سوئالغا ئەستايىدىللىق، كەمتەرلىك بىلەن جاۋاب بېرىپ، بىمارلار بىلەن دوستانە ئالاقە ئورنىتىشقا ماھىر بولۇشى كېرەك. ئەمما دورا بۆلۈمىدىكى خادىملار ئارىسىدا بەزى ماركىلار سورىغان سوئاللارغا ئەستايىدىللىق بىلەن جاۋاب بېرىشنى ئېغىر كۆرۈش ئەھۋاللىرى مەۋجۇت بولۇپ، داۋاملىق تېببىي خادىملار بىلەن بىمارلار ئوتتۇرىسىدا ماجىرا پەيدا قىلىپ قويىدۇ. ئىككىنچى، دوختۇرخانىنىڭ دورا بۆلۈمىنى باش-

بازارلىشىشى ئېھتىياجىدىن ئېشىپ كېتىۋاتقان بولۇپ، دورا كىرگۈزۈش يوللىرىدا رىقابەت ئىنتايىن كۈچلۈك. ئۇنىڭ ئۈستىگە دوختۇرخانىلارنىڭ تولۇقلىما مېخانىزمى قاتارلىق جەھەتلەردىكى مۇكەممەل سىزلىك سەۋەبلىك داۋالاش چىقىمىنى دورا ئارقىلىق تولۇقلاش 1 مەسىلىسى يەنىلا ساقلىنىپ كەلمەكتە، بەزى ۋاقىتلاردا بىر قىسىم باھاسى تۆۋەن دورىلارنى ئىشلەپچىقىرىش زاۋۇتلىرىدىن دورا كىرگۈزۈش سەۋەبلىك، دورا كىرگۈزۈش يوللىرىنىڭ قائىدىلىك مۇكەممەللىك، نازارەتلىك باشقۇرۇش ھالقىلىرىغا ئەمەل قىلماي، باھا قوغلاپ دورا كىرگۈزۈش ھادىسىلىرى دائىم يۈز بېرىپ، سۈپەت كونتروللىقىغا سەل قارىلىپ قېلىپ، سۈپەتسىز دورىلارنىڭ دوختۇرخانىنىڭ دورا بۆلۈملىرىگە كىرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، كىلىنىكىلىق داۋالاش ئۈنۈمىگە ۋە بىمارنىڭ ھاياتىي بىخەتەرلىكىگە ئېغىر تەسىر كۆرسىتىپ، ئاقىۋەت نەتىجىسىدە دوختۇرخانىنىڭ جەمئىيەتتىكى ئابروىسى ۋە ئوبرازىغا مەلۇم دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىپ كەلمەكتە.

3. دورىخانىنى ئۇچۇرلاشتۇرۇپ باشقۇرۇش سەۋىيەسى بىر قەدەر تۆۋەن بولۇش
دوختۇرخانىنىڭ دورا بۆلۈمى مۇلازىمىتى شەكىلىدە كۆپ ھاللاردا كۆزەتكەن مۇلازىمىتىنى ئاساس قىلىدۇ، بۇ دوختۇر بىلەن بىمار ئوتتۇرىسىدىكى ئۇچۇر ئالماشتۇرۇشنىڭ راۋان بولۇشىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ. نۆۋەتتە، دوختۇرخانىلاردا دوختۇرخانىنىڭ ئېلېكترونلۇق رېتسېپ يېزىش شەكلىنى گەرچە كەڭ يولغا قويۇش تەلپ قىلىنىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن بىر قىسىم دوختۇرخانىلاردا يەنىلا ئەمەلىيلەشمەي كېلىۋاتىدۇ، بەزى دوختۇرخانىلاردا گەرچە ئەمەلىيلەشكەن بولسىمۇ، لېكىن كىلىنىك دوختۇرخانىنىڭ ئەمەل قىلماستىن، كومپيۇتېر ئىقتىدارىنىڭ راۋان بولماسلىقى، تور سىستېمىسىنىڭ نورمال بولماسلىقى قاتارلىق سەۋەبلەردىن، دورا بۆلۈمى بىلەن دوختۇر ئوتتۇرىسىدە

قۇرۇش سەۋىيەسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشتىكى تەدبىر -
لەر

1. دورىلارنى باشقۇرۇش تۈزۈمى. بۇ دورا كىرگۈ-
زۇشنى تەكشۈرۈپ تەستىقلاش تۈزۈمى، نېرۋا كېسەل-
لىك دورىلىرىنى، ناركوز دورىلىرىنى باشقۇرۇش تۈ-
زۈمى، دورىلارنى تەڭشەش تۈزۈمى، تېز ئۈنۈملۈك دو-
رىلارنى باشقۇرۇش تۈزۈمى. دورىلارنى قايتۇرۇۋېتىش
تۈزۈمى ۋە دورىلارنىڭ ئەكس تەسىرىنى ئېلان قىلىش
تۈزۈمى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

2. خادىملارنى باشقۇرۇش تۈزۈمى. بۇ ئىش ئورنى
مەسئۇلىيەت تۈزۈمى، خىزمەت كۈن تەرتىپى، تېخنى-
كىلىق مەشغۇلات ئۆلچىمى، ئىسمىنا ئۆتكۈزۈش ۋە
ئۆتكۈزۈۋېلىش تۈزۈمى، مۇلازىمەت ئۆلچىمى، مەسئۇ-
لىيەت تۈزۈمى، باھالاش ۋە تەستىقلاش تۈزۈمى، مۇكا-
پاتلاش ۋە چارە كۆرۈش تۈزۈمى قاتارلىقلارنى ئۆز
ئىچىگە ئالىدۇ.

3. نازارەت قىلىش ۋە تىزگىنلەش تۈزۈمى. بۇ-
نىڭدا دورىخانىنىڭ تۈزۈم-قائىدىلىرىنىڭ ئىجرا قى-
لىنىش تەرتىپى، سالمىقى ۋە سىجىللىقنى نازارەت
قىلىپ باشقۇرۇش مەقسەت قىلىنىپ، دورىخانىنىڭ
باشقۇرۇش تۈزۈلمىسىنى ئىلمىيلاشتۇرۇشقا، قې-
لىپلاشتۇرۇشقا، خادىملارنىڭ ئىقتىدارىنى تولۇق جا-
رى قىلدۇرۇشقا يېتەكلەيدۇ.

4. دورا بۆلۈملىرى مال كىرگۈزۈش سۈپەت ئۆت-
كىلىنى چىڭ تۇتۇپ، دورا كىرگۈزۈشنىڭ يوللىرى ۋە
تەرتىپىنى قېلىپلاشتۇرۇش، ھەربىر تۈركۈمدىكى دو-
رىلارنىڭ ئىسمى، سانى، ئۆلچىمى، ئورالمىسى، تەس-
تىق نومۇرى، زاۋۇت ئادرېسى، ئۈنۈملۈك ۋاقتى قاتار-
لىقلارنى قاتتىق تەكشۈرۈپ، دورىلارنىڭ سۈپىتىنىڭ
لاياقەتلىكلىكىنى كاپالەتكە ئېرىشتۈرۈش بىلەن بىر
ۋاقىتتا تۈرگە ئايرىش، ساقلاش بىخەتەرلىكىگە كاپا-
لەتلىك قىلىش.

5. دورىخانىنى ئۇچۇرلاشتۇرۇپ باشقۇرۇش قۇرۇ-

لۇشىنى كۈچەيتىش. ئىجتىمائىي تەرەققىيات ۋە دوخ-
تۇرخانا قۇرۇلۇشىنىڭ تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ، باش-
قۇرۇش سىستېمىسىنى تورلاشتۇرۇشۇمۇ دورىخانىنىڭ
تەرەققىيات يۆنىلىشى بولۇپ قالدى. شۇنىڭ ئۈچۈن،
دوختۇرخانىلار ئەسلىدە بار بولغان ئاساسىغا ئاسا-
سەن، دورىخانا باشقۇرۇش سىستېمىسىنى ئۇچۇرلاش-
تۇرۇش خىزمىتىنى مۇھىم باشقۇرۇش تەرتىپىگە
كىرگۈزمەكتە. تور سىستېمىسىنى قوللىنىش دورى-
خانا بىلەن داۋالاش بۆلۈملىرىنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ،
تېببىي خادىملار بىلەن بىمارلارنى ھەر ۋاقىت دو-
رىلارنىڭ يېڭى تۈرى بىلەن تونۇشتۇرۇشتا كۆۋرۈك-
لۈك رولىنى ئوينايدۇ. شۇڭا دورا بۆلۈمىدىكى خا-
دىملار تورلاشقان ئۇچۇر مۇلازىمەت تېخنىكىسى ۋە
مەشغۇلات تېخنىكىسىنى پۇختا ئىگىلىشى زۆرۈر.

6. دورا بۆلۈمىدىكى خادىملارغا ئۇنىۋېرسال ساپا
تەربىيەسىنى كۈچەيتىش. دوختۇرخانا دورا بۆلۈمىدە-
كى خادىملارنىڭ ئۇنىۋېرسال ساپاسىنى يۇقىرى كۆ-
تۈرۈش بويىچە تەربىيەلەشنى كۈچەيتىپ، قەرەللىك
ھالدا لېكسىيە سۆزلەش، تەربىيەلەش ۋە ئىلمىي تېخ-
نىكا ئالماشتۇرۇش، بىلىم ئاشۇرۇش قاتارلىق پائال-
يەتلەرنى پۇختا قەدەمدە قانات يايدۇرۇپ، كەسپىي خا-
دىملارنىڭ كەسپىي ساپاسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش بىلەن
بىر ۋاقىتتا، ئەخلاق ساپاسى، مۇلازىمەت ساپاسى قا-
تارلىق ئۇنىۋېرسال ساپاسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە
ئەھمىيەت بېرىشى.

ئومۇمەن، دورا بۆلۈمى خىزمىتى بىر مۇھىم
بولغان ھەمدە مەسئۇلىيەتچانلىقى كۈچلۈك بولغان
مۇرەككەپ خىزمەت بولۇپ، بىمارلارنىڭ ھاياتىي بىخە-
تەرلىكىگە ۋە كىلىنىكىلىق داۋالاش ئۈنۈمىگە بىۋا-
سىتە تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇڭا ساقلانغان مەسىلە-
لەرنى قاراشلىق ھالدا تۈزىتىپ، ماس ھالدا باشقۇ-
رۇش تەدبىرلىرىنى تۈزۈپ چىقىش، ئەمەلىيلەشتۈرۈش
ۋە ئۈزۈكسىز كۈچەيتىش كېرەك.

باللار گۈرەن بېزى ياللۇغىغا مېڭە پەردە ياللۇغى

ئەگىشىپ كەلگەندە

تۇرسۇنكۈل توختى (841600)

(بۈگۈر ناھىيەلىك ئانا-باللار ساقلىقنى ساقلاش دوختۇرخانىسى)

ئاساسىي ساننى ئىگىلەيدۇ. ئاقسىل ماددىسى بىر ئاز ئۆرلەپ، قەنت ۋە خىلورلۇق ماددىسى ئاساسەن نورمال بولىدۇ. يۈلۈن سۇيۇقلۇقىدىن مىكروب ئۆسۈپ چىقىدۇ. يۈلۈن سۇيۇقلۇقىدىن گۈرەن بېزى ياللۇغى ۋە روسىنى ئايرىپ چىقىلى بولىدۇ.

دىئاگنوزى: باللاردا تارقىلىشچان گۈرەن بېزى ياللۇغى بىلەن ئاغرىغان كېسەللەر بىلەن ئۇچراشقاندا، لىق تارىخى بار-يوقلۇقى، كېسەلنىڭ قوزغىلىش مەزگىلى، گۈرەن بېزى ياللۇغى بىلەن ئاغرىغان-ئاغ-رىمىغانلىقى ھەمدە قىزىش، باش ئاغرىش، قۇسۇش، ئوخشىمىغان دەرىجىدە نېرۋا سىستېمىسى ئالامەتلىرى (مۈگدەش، تىنچسىزلىنىش، خۇددى بىلمەسلىك، ئېغىرلىرىدا تارتىش) ھەمدە گەجگىسى قېتىشىش قاتارلىق كىلىنىكىلىق ئالامەتلەرگە قان ۋە يۈلۈن سۇيۇقلۇقىنى تەكشۈرۈش نەتىجىسىنى بىرلەشتۈرۈپ تەھلىل قىلغاندا، ئەگەشمە مېڭە پەردە ياللۇغىغا دە-ياگنوز قويغىلى بولىدۇ.

داۋاسى: بۇ كېسەللىكنى داۋالاشتا ۋىرۇسقا قارشى دورىلاردىن ۋىرازول ئوكۇلىنى (病毒唑)، 10% گىلوكوزا سۇيۇقلۇقىدىن 150 — 200 غا قوشۇپ ۋېنا-دىن ئوكۇل قىلىنىدۇ. پولىنوزىك-پولىستىمىدىلىك (转移因子) ياكى يۆتكىگۈچى ئامىل (转移因子) ئوكۇلىنى سېلىپ كېسەلنىڭ ۋىرۇسقا بولغان قارشى-لىق كۈچىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ. مۇۋاپىق مىقداردىكى پېنسىلىننى مۇسكۇل ياكى ۋېنادىن ئوكۇل قىلىپ يۇقۇملىنىشقا قارشى تۇرۇلىدۇ. كېسەلنىڭ مېڭە بې-

تارقىلىشچان گۈرەن بېزى ياللۇغى، ئاساسەن گۈرەن بېزى ياللۇغى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان نەپەس يولى ئۆتكۈر يۇقۇملۇق كېسەللىكى بولۇپ، بۇ كېسەل-لىككە مېڭە پەردە ياللۇغى ئەگىشىپ كېلىپ كىلىنىدۇ. كىدا نىسبەتەن كۆپ ئۇچرايدۇ. بۇ كېسەللىك ئادەتتە ئەتىياز، كۈز ۋە قىش پەسلى، باللار گۈرەن بېزى ياللۇغى تارقىلىش مەزگىلىدە گۈرەن بېزى ياللۇغى بىلەن بىر ۋاقىتتا ياكى 3 — 7 كۈن كېيىن قوزغىلىدۇ. 4 ياشتىن 9 ياشقىچە بولغان باللاردا نىسبەتەن كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

كىلىنىكىلىق ئىپادىسى: قىزىش (بەدەن تېمپېراتۇرىسى 39 ئەتراپىدا بولۇپ ئوتتۇرا ھېساب بىلەن 5 كۈن داۋاملىشىدۇ)، قۇسۇش (كۈندە 4 — 5 قېتىم، ئاز بولغاندا 1 — 2 قېتىم بولۇپ 1 — 3 كۈنگىچە داۋاملىشىدۇ)، باش ئاغرىش (بىر ئاز قاتتىق بولۇپ 4 — 5 كۈن داۋاملىشىدۇ) ۋە نېرۋا سىستېمىسىدا ئۆزگە-رىش بولۇپ مۈگدەش، بىئارام بولۇش، ئەس-ھوشى ئوچۇق بولماسلىق، ئېغىرلىرىدا ھوشىنى يوقىتىش، تارتىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

قوشۇمچە تەكشۈرۈش: قاننى كومپيۇتېردا تەھلىل قىلغاندا ئاق قان دانچىسى نورمال ياكى بىر ئاز ئۆرلەيدۇ. لىمفا ھۈجەيرىسى سانىنى ئىگە-لەيدۇ، يۈلۈن سۇيۇقلۇقىنى تەكشۈرگەندە، سىرتقى كۆرۈنۈشى سۈزۈك ياكى بىر ئاز دۇغسىمان بولۇپ، بېسىمى بىر ئاز يۇقىرى بولىدۇ، ھۈجەيرە سانى بىر ئاز يۇقىرىلايدۇ. لىمفا ھۈجەيرىسىنىڭ كۆپىيىشى

تۈنلەي ساقىيدۇ. كىلىنىكىلىق ساقىيىش ئۆلچىمى:
1. كىلىنىكىلىق ئالامەتلەر پۈتۈنلەي تۈگەيدۇ؛ 2. يۈ-
لۇن سۈيۈقلۈقىنى قايتا تەكشۈرگەندە پۈتۈنلەي نورمال
بولىدۇ. ئالدىنى ئېلىش: ئاساسلىقى گۈرەن بېزى يال-
لۇغى تارقالغان مەزگىلدە كېسەل بالىلارنى يەسلى ياكى
مەكتەپلەرگە ئەۋەتمەي ئايرىم ئۆيدە گۈرەن بېزى يال-
لۇغى پۈتۈنلەي يانغىچە كۈتۈش، كېسەل بالىلار بىلەن
ئۇچراشقان بالىلارنى ھەر كۈنى كۆزىتىپ تۇرۇش كې-
رەك. گامما شار ئاقسىلى (丙种球蛋白) ئوكۇلىنى
مۈسكۇلدىن سالغاندىمۇ ئالدىنى ئېلىش ئۈنۈمىگە
ئېرىشكىلى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا شەخسىي تازىلى-
قنى ياخشىلاش، بەدەن چېنىقتۇرۇشنى كۈچەيتىش،
بەدەن ساغلاملىقىنى ئاشۇرۇش، مۇۋاپىق ئوزۇقلۇقنى
ئارقىلىقمۇ كېسەللىككە قارشى قۇۋۋەتنى ئاشۇرغىلى،
كېسەلنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

سىمىنى تۆۋەنلىتىپ، مېڭە سۇلۇق ئىششىقنى يې-
نىكىلىتىش ئۈچۈن سۇسىزلاندۇرۇش دورىلىرىدىن
20% لىك مانىستول (甘露醇) ۋە دېكسامېتازون (米松)
نى 5 — 7 كۈنگىچە ۋېنادىن ئوكۇل قىلىنىدۇ.
ئۇنىڭدىن باشقا سۇ ۋە ئېلېكتىرولېتلارنىڭ تەڭپۇڭ-
لۇقى ساقلاش ئۈچۈن يېتەرلىك سۈيۈقلۈك بېرىلىدۇ.
تارتىشىش ئالامىتى كۆرۈلسە ئوكسىگېن پۇرىتىش،
نەپەس يوللىرىنىڭ راۋان بولۇشىغا دىققەت قىلىش،
تىنچلاندۇرۇش دورىلىرى بېرىلىدۇ. ئېغىر كېسەللەر-
نى پەرۋىش قىلىش مۇھىم بولۇپ، كېسەللىك ئۆزگە-
رىشىنى ئىنچىكە كۆزىتىش، تېرە تازىلىقىنى ئاس-
راش، ياتاق يارىسى ۋە باشقا يۇقۇملۇقلىقلارنىڭ ئالدى-
نى ئېلىش لازىم. ئەسلىگە كېلىش مەزگىلىدە كېسەل-
لىك ئاسارەتلىرى كېلىپچىقسا قائىدىلىك ئۇۋۇلاش،
قۇرۇق يىڭنە سانجىپ داۋالاش، سىستېمىلىق چېنىق-
تۇرۇپ داۋالغاندا، بۇ كېسەللىك 2 — 3 ھەپتىدە پۈ-

ئۆتتە تاش كېسەللىكىنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى ئامىللار

غاپپار غۇجىئەخمەت (838000)

(تۇرپان شەھەر ئىدىقۇت رايونى چاتقال يېزىلىق شىپاخانا)

بىر-بىرىنىڭ سەۋەبچىسى، دەپ قارايدۇ. شۇڭا بەزىلەر
بۇ ئىككى كېسەلنى «قوش گېزەك» دەپ ئاتىشىدۇ. ئۆت
ۋە ئۆت يوللىرى يۇقۇملانسا ئۆت سۈيۈقلۈقىنىڭ تەر-
كىبىدە ئۆزگىرىش پەيدا قىلىدۇ. خولېستېرىننىڭ
ئاجرىلىپ چىقىشى كۆپىيىدۇ، ئۆت كىسلاتا تۈزلىرى
لىتسىستىنلار ئازلاپ، «تاشسىمان سۈيۈقلۈك» شە-
كىللىنىدۇ. شۇنداقلا ياللۇغلىنىش خاراكتېرلىك
ھۈجەيرىلەر بىلەن ئۆت خالتىسى دىۋارىدىن تۆكۈلۈپ
چۈشكەن ئۈستۈنكى تېرە ھۈجەيرىلىرى شىللىق سۇ-
يۇقلۇق بىلەن قوشۇلۇپ ئۆت تاش يادروسىنىڭ بىر
قىسمىنى شەكىللەندۈرىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا، ياللۇغ-
نىڭ ئۆت غول نەيچىسىنى ئىسپازملىنىش، ئۆت سۇ-
يۇقلۇقىنىڭ يىغىلىپ قېلىشى، ئۆتكە تاش چۈشۈشكە

نۆۋەتتە ئۆتتە تاش ئۇيۇش كېسەلىگە دۇچار بول-
ماقتانلار كۈندىن-كۈنگە كۆپەيمەكتە. ئەمما ئۆتتە تاش
ئۇيۇشنىڭ سەۋەبى تېخىچە تەلتۈكۈس ئېنىقلانمىدى.
ئەمما تېببىي پەن ئالىملىرىنىڭ كۆز قارىشى ئۆتتە
تاش ئۇيۇشنى قوزغىتىدىغان تۆۋەندىكى 8 ئامىلغا يە-
غىنچاقلىنىپ قالدى. بۇ ئامىللارنى ئوبدان بىلىۋې-
لىپ، ساقلىنىشقا تېگىشلىكلىرىدىن ھەزەر ئەيلىسەك
ئۆتتە تاش ئۇيۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا بولىدۇ، دېگەن
مەقسەتتە بۇ ئامىللارنى ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن:
ئۆتتە تاش ئۇيۇشنى قوزغاتقۇچى ئامىللار تۆۋەن-
دىكىچە:

1. ئۆت يوللىرىنىڭ يۇقۇملۇقلىشى: تېببىي پەن
ئالىملىرى ئۆت ياللۇغى ۋە ئۆتكە تاش ئۇيۇش ئۆزئارا

تۈرتكىلىك تەسىر كۆرسىتىدۇ.

2. بەزى كېسەللەر، مەسىلەن: قەنت سىيىش كېسەللىكى، بۆرەك ياللۇغى، قالقانبەز ئىقتىدارىنىڭ تۆۋەن بولۇشى قاتارلىق كېسەللەكلەر بىلەن ئاغرىغاندا قاندا خولېستېرىننىڭ مىقدارى كۆپىيىش بىلەن ئۆتتىكى خولېستېرىن چىقىرىش مىقدارىمۇ مۇناسىپ ھالدا كۆپىيىدۇ. قان ئېرىش خاراكتېرلىك كېسەللىكلەردە قاندىكى بىلىرۇبىن كۆپىيىش بىلەن ئۆتتىكى بىلىرۇبىنلارمۇ ئارتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئاسانلا خولېستېرىنلىق تاش ۋە ئۆت بويىقلىرى مەنبەلىك تاش ھاسىل بولىدۇ. ئۆت پارازىت قۇرت كېسىلى (سازالڭ) مەدەدە كېسىلى بىلەن ئاغرىغاندا سازالڭ مەدەسى چوڭ ئۈچەي تاياقچە مىكروبلارنى ئۆت يوللىرىدا يۇقۇملىق نىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ (ئۆتتە تاشنى شەكىللەندۈرىدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا ئۆت يوللىرىدىكى جىگەر شو-رىغۇچ قۇرتىمۇ ئۆتتە تاش شەكىللىنىشكە سەۋەب بولىدىغان ئامىلدۇر.

3. بەزى دورىلار: ئاترومىدىن (安妥明) نى قاندىكى ماي ماددىسىنى تۆۋەنلىتىش مەقسىتىدە ئۇزۇن مەزگىل ئىشلەتسە، ئۇ دورا ئۆتتىكى خولېستېرىننىڭ چىقىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ ھەم ئۆت كىسلاتا-سىنىڭ بىرىكىشىنى تورمۇزلاپ، ئۆتتە تاش ھاسىل بولۇپ قالمايدۇ. نىكوتىن (烟酸) نى ئۇزۇن مەزگىل ئىشلەتسىمۇ ئۆت يوللىرىدا تاش ھاسىل بولۇپ قالمايدۇ. ئانىلىق ھورمۇن (雌激素) نى ئاياللار ھەيز كېلىش دەۋرىدىن كېيىن ئىشلەتسە ۋە بەزى كېسەللەك سەۋەب بىلەن ئەرلەر ئىشلەتسىمۇ خولېستېرىنلىق تاش ھاسىل بولۇش خەۋپى بار، شۇنداقلا تۇغۇت يېشىدىكى ئاياللار ئانىلىق ھورمۇن تىپىدىكى تۇغۇت چەكلەش دورىسىنى ئۇزۇن مەزگىل ئىشلەتسىمۇ ئۆتتە ئاسان تاش پەيدا بولۇپ قالمايدۇ. چۈنكى ئانىلىق ھورمۇن بولسا جىگەردىكى فېرېمېنت سىستېمىسىغا بىۋاسىتە تەسىر قىلىپ، نەتىجىدە ئۆت كىسلاتاسىنىڭ بىرىكىشىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ ھەم خولېستېرىننىڭ ئاجىزلىق چىقىرىلىش مىقدارىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. نەتىجىدە ئۆت سۇيۇقلۇقى يىغىلىپ قېلىپ، تاشنىڭ پەيدا بولۇشى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ.

4. يېمەك-ئىچمەك ئامىللىرى: يۇقىرى قەنتلىك، يۇقىرى خولېستېرىنلىق، تۆۋەن ماي كىسلاتالىق يېمەكلىكلەر ئۆتكە تاش ئۇيۇشىنى قوزغىتىدىغان ئامىللاردۇر. تەتقىقاتچىلارنىڭ تەكشۈرۈپ ئىسپاتلىشىچە، يۇقىرى كالورىيەلىك يېمەكلىكلەر قەنت نىسبىتىنىڭ يۇقىرى بولۇپ كېتىشى جىگەردىن چىققان ئۆت كىسلاتا تۈزلىرىنى تورمۇزلاش نەتىجىسىدە، خولېستېرىن ئۆت كىسلاتا تۈزلىرى ۋە فوسفاتىد (磷脂) تىن ئىبارەت بۇ ئۈچ ماددىنىڭ نىسبىتى بۇزۇلۇش نەتىجىسىدە ئۆتتە خولېستېرىن كۆپىيىپ خولېستېرىنلىق تاش شەكىللىنىدۇ.

5. سېمىزلىك: سېمىز كىشىلەردە خولېستېرىننىڭ ئالمىشىش نىسبىتى بەدەن ئېغىرلىقى نورمال كىشىلەرگە قارىغاندا يۇقىرى بولىدۇ. ئۆتتە خولېستېرىننىڭ چىقىرىلىش مىقدارى ئارتىپ، ئاسان تاش ھاسىل بولىدۇ. مۆلچەرلىنىشىچە بەدەن ئېغىرلىقى ئۆلچەملىك، بەدەن ئېغىرلىقىدىن 15% يۇقىرى بولغاندا ئۆتتە تاش ھاسىل بولۇش نىسبىتى يۇقىرى بولىدىكەن.

6. جىسمانىي ھەرىكەت قىلماسلىق: ئۇزاق مۇددەت جىسمانىي ئەمگەك قىلمىسا ئاسان تاش ھاسىل بولىدۇ. چۈنكى ھەرىكەت قىلمىسا قورساق دىۋارى بوشاپ، ئىچكى ئەزا تۆۋەنلەپ ئۆت خالتا مۇسكۇللىرىنىڭ كېسىلىش كۈچى ئاجىزلايدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئۆت سۇيۇقلۇقى يىغىلىپ تاش ھاسىل بولىدۇ.

7. روھىي ھالەت: ئۇزاق مۇددەت روھىي ھالىتى تۆۋەن بولۇش، جىددىيلىشىش قاتارلىقلار ئىچكى ئەزالاردىكى ۋېگېتاتىپ نېرۋىلارنىڭ رولىنى قالايمەن قانلاشتۇرۇش نەتىجىسىدە، بۇ ئەھۋال ئۆتنىڭ رولىغا تەسىر قىلىپ ھەمدە ئۆت سۇيۇقلۇقىنىڭ يىغىلىۋېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئۆتتە تاش ھاسىل قىلىدۇ.

8. ئىرسىيەت: تەكشۈرۈپ ئىسپاتلىنىشىچە بىر قىسىم ئىرسىيەت خاراكتېرلىك ئۆتكە تاش ئۇيۇغۇچىلارنىڭ ئۆت سۇيۇقلۇقىدا تۇغما خاراكتېرلىك ئۆت كىسلاتا تۈزلىرى بولۇپ، بۇنىڭ مىقدارى تۆۋەن بولغاچقا، خولېستېرىن ناھايىتى ئاسان تويۇنۇپ تاش ھاسىل بولىدىكەن. ئۆتكە تاش ئۇيۇشنىڭ ئالدىنى

ئېلىشتىكى ئۈنۈملۈك تەدبىرلەر:

(1) روھىي كەيپىياتنى خۇشال ئۆتكۈزۈش، بىھۇ دە ئاچچىقلانماسلىق لازىم.

(2) بالىلىق ۋە ياشلىق ۋاقىتلىرىدىن تارتىپ سا- زاك مەدەدە كېسىلىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ئەگەر سازاك مەدەدە كېسىلى بىلەن ئاغرىغان بولسا، ۋاقتىدا داۋال- نىش، شۇنداقلا ئۆت ياللۇغى، قەنت سىيىش كېسىلى، بۆرەك ياللۇغى قاتارلىق كېسەللەر بىلەن ئاغرىغان بولسا ئاكتىپ داۋالنىش لازىم.

(3) ئوتتۇرا ياش ۋاقتىدىن باشلاپ سېمىزلىكنىڭ ئالدىنى ئېلىش، مۇۋاپىق جىسمانىي ئەمگەك بىلەن

شۇغۇللىنىش كېرەك.

(4) ھەر كۈنلۈك تاماقتا قەنت ۋە مايلىرىنىڭ مىقدار- رى مۇۋاپىق بولۇش، سۇ ماينى ئاساس قىلىپ ئوزۇق- لىنىش، قەنت ۋە ماي تەركىبى يۇقىرى تاماقلارنى يې- مەسلىك كېرەك.

(5) قاندىكى خولېستېرىننى تۆۋەنلىتىدىغان ئاد- رومىدىن قاتارلىق دورىلارنى ۋە ھورمۇنلۇق دورىلارنى ئىشلىتىشتە دورىنىڭ ئىشلىتىش ۋاقتى بەك ئۇزۇن بولۇپ كەتمەسلىكى ياكى بۇ دورىلارنى ئىشلىتىشكە مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەرنى ياخشى تاللاش كېرەك.

يۇقىرى قان بېسىم كېسىلىنىڭ ئالامەتلىرى ۋە بىمارلار

دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك نۇقتىلار

ئابلەت پەتتار (838000)

(تۇرپان شەھەر ئىندىقۇت رايونى ئاستانە يېزىلىق شىپاخانا)

نېكرولىنىدۇ، بۇ كېسەللىك پەيدا بولغان دەسلەپكى بىر سائەتتە يۈرەك مۇسكۇل توقۇلمىلىرىنىڭ نېك- روزلىنىش سۈرئىتى نىسبەتەن ئاستىراق بولىدۇ. ئەگەر بۇ ۋاقىتنى قولدىن بېرىپ قويغاندا كېسەللىك تېز سۈرئەتتە ئېغىرلىشىدۇ. كېسەللىكنىڭ ئاخىر- قى 4 - سائىتىگە بارغاندا يۈرەك مۇسكۇل توقۇلمىلىرى پۈتۈنلەي نېكرولىنىدۇ. ئەگەر كېسەللىك يېڭى باشلانغان 1 - سائەتتە ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ، جىددىي داۋالانسا ۋە قۇتقۇزۇلسا، كېسەلنىڭ ھاياتىنى قۇتۇل- دۇرۇپ قالغىلى بولىدۇ.

نۇرغۇنلىغان قان بېسىم بىمارلىرى ئۆزىنىڭ كېسەللىگە بولغان تونۇشى، چۈشىنىشى يېتەرلىك بولمىغاچقا، نۇرغۇنلىغان خاتا تونۇشلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇشتۇمتۇت ئېغىر ئاقىۋەت- لەر كېلىپچىقىپ، ئۆزى ۋە ئائىلىسىدىكىلەرنى ئېغىر ئازاب- ئوقۇبەتلەرگە سېلىپ قويىدۇ. بۇ خاتا تونۇش ۋە كەيپىياتنى تۆت تۈرلۈك ئەھۋالغا يىغىنچاقلاشقا بول- دۇ.

يۇقىرى قان بېسىم كېسىلىگە گىرىپتار بولغان كىشىلەر ئاسانلا تاجىسمان ئارتېرىيەلىك يۈرەك كې- سىلىگە گىرىپتار بولىدۇ ياكى يۈرەك مۇسكۇلىغا قان يېتىشمەسلىك ئېغىرلىشىپ، يۈرەك مۇسكۇل تىقىل- مىسىنى پەيدا قىلىدۇ. ھەرخىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن كېلىپچىقىدىغان تاجىسمان ئارتېرىيەنىڭ بوتقىسىمان قېتىش جەريانىدا ئارتېرىيە دىۋارىغا تەركىبى ياغ ۋە تالالىق قوشقۇچى توقۇلمىلاردىن تەركىب تاپقان بىر خىل مۇرەككەپ بىرىكمىلەر ۋە قان پىلاستىنكىلىرى چاپلىشىۋېلىپ، ئارتېرىيەنى تارايىتىۋېتىدۇ - دە، يۈ- رەكنى قان بىلەن تەمىنلەيدىغان تاجىسمان ئارتېرىيە ئىنچىكىلەپ، قاننىڭ ئېقىش سۈرئىتى ئاستىلىشىد- دۇ. قان ۋە قان پىلاستىنكىلىرى يىرىكلىشىپ، قان تومۇر دىۋارىدا قېتىشمىلار داۋاملىق كۆپىيىپ، ۋاقىت ئۇزارغانسېرى قان تومۇرلاردا توسۇلۇشنى پەيدا قىل- دۇ، شۇ سەۋەبتىن قان ئايلىنىش توختاپ قېلىپ بىر نەچچە مىنۇت ئىچىدىلا يۈرەك مۇسكۇل توقۇلمىلىرى

دۇ.

1. ئۆزى بىلگەنچە دورا ئىچىشنى توختىتىش

بۇ تۈردىكى كىشىلەر ئۆزى خالىغان دورىلارنى خىيالىغا كەلگەن چاغلاردا ئىشلىتىدۇ. دورىنى ئۈزۈكسىز ئىچىشنى ئاۋارە كۆرۈپ ياكى بولمىسا، داۋاملىق دورا ئىچكەندە دورىنىڭ ئەكس تەسىرى بولۇپ قالارمىكىن، دەپ قاراپ، پەقەت بېشى قېيىش، بېشى ئاغرىش ئالامەتلىرى كۆرۈلگەندىلا دورا ئىچىپ، ئالا-مىتى ياخشىلانغاندىن كېيىنلا دورا ئىچىشنى ئۆزى خالىغانچە توختىتىپ قويىدۇ. دە، ئۈزۈكسىز دورا ئىچىشنى داۋاملاشتۇرالمىدۇ. بۇنداق بولغاندا قان بېسىمىنى سىجىل تىزگىنلىيەلمەيدۇ. دە، كەيپىياتىدا ئۈشتۈمتۈت ئۆزگىرىش بولغان ئەھۋاللاردا، ئېغىر ئەھۋالنىڭ كېلىپچىقىش ئېھتىمالى زور بولىدۇ. مەسىلەن: 50 ياش ئەتراپىدىكى بىر ئايال قان بېسىمى يۇقىرى بولۇپ، بىر كۈنى يىراقتىكى بىر تۇغقىنىدىن كەلگەن تېلېفوننى ئېلىپ بەك خۇشال بولغانلىقىدىن ھاياجانلىنىپ كەتكەچكە بىرەر ئېغىز گەپ قىلالمايلا تېلېفون تۈيۈقسىزلا قولىدىن يەرگە چۈشۈپ كېتىپ، بەدىنىنىڭ ئوڭ تەرىپىنى باشقۇرالمى يىقىلىپ چۈشكەن، بۇ بىمارنى تەكشۈرۈش ئارقىلىق مېڭىگە قان چۈشكەن دەپ دىياگنوز قويۇلغان.

2. قان بېسىمى تۇرۇپ داۋالانماسلىق

بۇ تۈردىكى كىشىلەر ئۆزىدە قان بېسىمى بار ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ. لېكىن روشەن ئالامەتلەر كۆرۈلمىگەنلىكتىن ئېرەنشەي يۈرۈپرىدۇ. مەسىلەن: 60 ياشلارغا كىرگەن بىر سېمىز ئەر كىشى ئادەتتە ئۆزىنىڭ قان بېسىمى ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ، لېكىن ھېچقانداق ئالامەتتى كۆرۈلمىگەندىن كېيىن تاماكا چېكىش، ھاراق ئىچىشنى توختاتماي ئېرەنشەي يۈرۈپرىدۇ. ھەتتا دەم ئېلىش ۋاقتىغا دىققەت قىلماي كېچىلىرى قارتا ئويناپمۇ خېلى كەچكىچە ئۇخلىمايدۇ. بىر كۈنى قارتا ئوينىۋېتىپ كۆپ قېتىم ئۇتۇۋالدى. خۇشاللىقىدىن ھاياجانلانغان بۇ كىشى ئۈشتۈمتۈت

ئۈستەلگە دۈم چۈشۈپ، پۈتۈن بەدىنى تارتىشىپ قالدۇ، دەرھال دوختۇرخانىغا ئېلىپ تەكشۈرتسە، زور كۆلەملىك مېڭە تىقىلمىسىغا گىرىپتار بولغان، دەپ دىياگنوز قويۇلىدۇ.

3. قالايىمقان دورا ئىچىش

بۇ تۈردىكى كىشىلەر قان بېسىمىنى تىزگىنلىمەش ئۈنۈمى ياخشى ياكى يامان بولغان دورىلارنىڭ مىقدارىنى خالىغانچە ئۆزگەرتىپ ئىچىدۇ، ياكى بولمىسا ئالامەتتى ياخشىلىنىپ قالسىلا دورا ئىشلىتىشنى ئۆزلۈكىدىن توختىتىپ قويىدۇ. مەسىلەن: بىر موماي، بېشى ئاغرىش، قۇلىقى غوغۇلداش ئالامەتتى سەۋەبلىك دوختۇرخانىغا بارىدۇ، تەكشۈرۈش نەتىجىسىدە قان بېسىمى، دەپ دىياگنوز قويۇلىدۇ، موماينىڭ خاراكتېرى بىر قەدەر ئىتتىك بولۇپ، داۋاملىق كەيپىياتى جىددىيلىشىپ تۇرىدۇ. ئۇ دورىنى ئىككى كۈن ئىچىپ بېقىپ، ئۈنۈمى ياخشى بولمىغانسېرى جىددىيلىشىپ، ئۆزىدە بار بولغان ئۈچ خىل قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش دورىسىنى بىرلا ۋاقىتتا ئىچىۋالىدۇ، شۇنىڭ بىلەن قان بېسىمى دەرھال چۈشىدۇ. لېكىن، ئۇزۇن ئۆتمەيلا بېشى قېيىپ، كۆڭلى ئىلىشىپ، يول ماڭسا دەلدەرەپ قالىدۇ. ئادەتتە بۇ خىل ئەھۋاللار ئاياللاردا كۆپرەك كۆرۈلىدۇ.

4. دورا قانچە قىممەت بولسا شۇنچە ياخشى دەپ

قاراش

بۇ خىل كىشىلەر دورا قىممەت بولسا مەيلى، جان مۇھىم، پۇل دېگەننى تېپىۋالسىمىز دەپ، بايلىقىنى كۆز-كۆز قىلىپ قايسى دورا قىممەت بولسا شۇ دورىنى سېتىۋېلىپ ئىچىدۇ. ئەمەلىيەتتە ئۈنۈمى كۆڭۈلدىكىدەك بولۇشى ناتايىن. مەسىلەن: بىر بوۋاي ناھايىتى باي بولۇپ، بالىلىرىنىڭ ھەممىسى كاتتا بايلاردىن بولۇپ قالىدۇ. بىر كۈنى بوۋايغا يۇقىرى قان بېسىمى دەپ دىياگنوز قويۇلىدۇ. بوۋاينىڭ بالىلىرى داۋىسىغا بەس-بەستە قىممەت باھالىق دورىلارنى ئەكىپ-لىپ بېرىدۇ. ئەمما ئۈنۈمى كۆڭۈلدىكىدەك بولمايدۇ.

لەشتۈرۈپ، قان بېسىمىنى يۇقىرىلىتىۋېتىدىغان ھەر قانداق ئامىللارنى تۈگىتىشكە تىرىشىش، ئۆزىنىڭ بارلىق پائالىيىتىنى قېلىپلاشتۇرۇش، تەرتىپلىك، ئۈزۈكسىز تەدبىر قوللىنىشقا ئادەتلىنىش كېرەك. يۇقىرى قان بېسىمى بىر خىل سوزۇلما خا- راكىتىرلىك كېسەللىك بولۇپ، ئۇزاق مۇددەت دورا ئىچىشنى تەلەپ قىلىدۇ. قان بېسىمىنىڭ يۇقىرى ئۆر- لىشى كۆپ ھاللاردا پەسىل، ھاۋا كىلىماتى قاتار- لىقلارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. مەسىلەن: ياز پەسلىدە كۈن بەك ئىسسىپ كەتكەن چاغلاردا، قان تومۇرلار كېڭىيىدۇ، بۇ چاغلاردا قان بېسىمى بىر قەدەر تۆۋەن بولىدۇ، قىش پەسلىلىرىدە بولسا قان بېسىمى سىجىل يۇقىرى ھالەتتە تۇرىدۇ، ئۇندىن باشقا، قان بېسىمىنى چۈشۈرىدىغان دورىلارنىڭ مىقدارى ۋە تۈرى قان بې- سىمىنىڭ يۇقىرىلىق دەرىجىسىدىن بەلگىلىنىدۇ. شۇڭا، دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە دورا ئىچىش، ھەرگىزمۇ دورىنى قانداق ۋاقىتلاردا، قانداق مىقداردا ئىچىشكەلا ئۆزى بىلگەنچە قارار چىقارماسلىق كېرەك.

يۇقىرى قان بېسىمى كېسەللىنى تىزگىنلەش ئۈچۈن، ئۆزى خالىغانچە دورا ئىشلىتىش، يۇقىرى قان بېسىمىغا كۆڭۈل بۆلمەسلىك، بالدۇر بايقىيالماسلىق، ئۆزىنىڭ قان بېسىمى ئىكەنلىكىنى بىلمەسلىك، بىلىشمۇ ئېرەنشمەسلىك، دورىنىڭ ئەكس تەسىرىد- نىڭ كۆرۈلۈپ قېلىپ دورا ئىچمەسلىك قاتارلىقلار- نىڭ ھەممىسى كۈتۈلمىگەن ئاقىۋەتلەرنىڭ كېلىپچە- قىشىغا سەۋەبچى بولىدۇ. يۇقىرىدا دېيىلگەن ئەمەلىي مىساللار تۇرمۇشىمىزدا ناھايىتى كۆپ ئۇچراپ تۇرد- دۇ. شۇڭا، يامان ئاقىۋەتلەر كېلىپچىقىشتىن ساقلى- نىش ئۈچۈن كىشىلەر ئۆزىنىڭ قان بېسىمى ئەھۋالىنى داۋاملىق تەكشۈرتۈپ تۇرۇشى، قان بېسىمى دەپ د- ياگنوز قويۇلغاندىن كېيىن، تۇرمۇش، خىزمەت، ھە- رىكەت، يېمەك- ئىچمەك، دورا ئىشلىتىش قاتارلىقلار- نىڭ ھەممىسىنى تەرتىپلىك، رىتىملىق ئورۇنلاشتۇ- رۇپ، ئۆزىنىڭ كەيپىياتىنى تەڭشەپ ۋە ئىدىيەسىنى ئادىتىنى قان بېسىمىنى تىزگىنلەپ تۇرۇش، ھەر ۋا- قت كۆزىتىپ تۇرۇش، تەكشۈرتۈپ تۇرۇشقا مەركەز-

پىلانلىق تۇغۇت تەشۋىق - تەربىيە خىزمىتىنىڭ مۇھىملىقى ۋە ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر

ئاپخانى قۇربان، ھۆرىيەت مەمەت (839000)

(قومۇل شەھەرلىك تەڭرىتاغ يېزا پىلانلىق تۇغۇت ئىشخانىسى)

(قومۇل شەھەرلىك پىلانلىق تۇغۇت تەشۋىقات پۈنكىتى)

پىلانلىق تۇغۇت خىزمىتىدىكى تۈرلۈك مەسئۇلىيەت ۋە ۋە- زىپىلەرنى دادىللىق بىلەن ئىسلاھ قىلىشقا ۋە يېڭىلىق يار- تىشقا توغرا كېلىدۇ. دۆلىتىمىزنىڭ تۆۋەن تۇغۇت سەۋىيىسىگە كىرىش- تىن بۇرۇنقى نوپۇس ۋە پىلانلىق تۇغۇت خىزمىتىنىڭ ئا- ساسلىق مۇھىم ۋەزىپىسى، نوپۇسنىڭ زىيادە تېز كۆپىيى- شىنى تىزگىنلەپ، تەشۋىق - تەربىيە ئەندىزىسىنىڭ ئالا- ھىدىلىكلىرىنى كەڭ تەشۋىق قىلىش ئىدى. «چ ك پ

1. نوپۇس ۋە پىلانلىق تۇغۇت تەشۋىق - تەربىيە- سىنى ئىسلاھ قىلىش ۋە يېڭىلىق يارىتىشنىڭ زۆرۈرلۈكى ئوخشىمىغان دەۋرلەردىكى خىزمەت نىشانى، ۋەزى- پىسى تەشۋىق - تەربىيە مەزمۇنى ۋە ئوخشىمىغان دەۋرلەر- دىكى ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي مۇھىتقا قارىتا، ھامىلىدارلىق مەزگىلى ئوخشاش بولمىغان تەشۋىق - تەربىيە ئەندىزىسى- گە ئېھتىياجلىق بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن، نوپۇس ۋە پىلان- لىق تۇغۇت خىزمىتىدە ھازىرقى بېكىتمىلىك ھالەتنى،

ۋە يېڭىلىق يارىتىش، تەشۋىق - تەربىيە خىزمىتىدە دۇچ كېلىۋاتقان مۇھىم تېمىلارنىڭ بىرى بولۇپ قالدى. جەمئىيەتنىڭ ئىلگىرلىشى، مەدەنىي ئىشلارنىڭ تەرەققىي قىلىشىغا ئەگىشىپ، تەشۋىقات ۋاسىتىلىرى بارغانسېرى زامانىۋىيلاشتى. شىشقا قاراپ يۈزلەندى. رادىئو - تېلېۋىزىيە، گېزىت - ژۇرنال، كومپيۇتېر تورى ۋە كۆپ ۋاسىتىلىك تېخنىكىلار بارغانسېرى ئومۇملىشىشقا باشلىدى. شۇڭا، پىلانلىق تۇغۇت تەشۋىق - تەربىيە خىزمىتىنىڭ ئۈنۈمىنى ھەقىقىي ئاشۇرۇشتا زامانىۋىي ئاخبارات ۋاسىتىلىرىغا ۋە ئۇچۇر تارقىتىش ۋاسىتىلىرىغا تايىنىپ، پىلانلىق تۇغۇت تەشۋىق - تەربىيە خىزمىتىنىڭ ئىسلاھات قەدىمىنى تېخىمۇ كۈچەيتىشكە توغرا كېلىدۇ.

نۆۋەتتە پىلانلىق تۇغۇت تەشۋىق - تەربىيە خىزمىتىدە ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر: (1) تەشۋىقات ئۇسۇلىدىن قارىغاندا، قارائىملىقى كۈچلۈك ئەمەس، يۈزەكىلىك ئەھۋال بىرقەدەر كۆپ. ھازىر ئېلىپ بېرىلىۋاتقان تەشۋىقات شەكلى ئانچە جانلىق ئەمەس، پەقەت يىغىنلار دىلا تەشۋىق قىلىپ قويۇش، زۆرۈر بولغاندا سۆزلەپ قويۇش، تەشۋىقات ۋەزىقى تارقىتىش، ئانچە - مۇنچە خاتىرىلەپ قويۇش، باشلىقنىڭ دوكلاتى كۆپ بولۇش، ھەدىسە يىغىۋېلىپ يىغىن ئېچىش بىلەنلا چەكلىنىپ، ئاممىلەن ئۆزئارا پىكىر ئالماشتۇرۇش، ئاممىنىڭ ھالىغا يېتىش بەك ئاز بولۇۋاتىدۇ. (2) تەشۋىقات مەزمۇنىدىن قارىغاندا، دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەشتەك دەۋر روھىي تولۇق گەۋدىلەندۈرۈلمىدى. نوپۇس ۋە پىلانلىق تۇغۇت ئاساسىي بىلىملىرى تەشۋىقات - تەربىيىسىدە ھەممە ئادەمنىڭ بىلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇش، ھەممە ئادەمنى خەۋەرلەندۈرۈش تەلەپ قىلىنىدۇ. ئەمەلىيەتتە، بۇ نۇقتىغا تېخى تولۇق يېتىلمىدى. تەشۋىق - تەربىيە مەزمۇنىدا يۈزەكى تەشۋىق قىلىش كۆپرەك بولۇپ، دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەش روھىي كەمچىل، ھەدىسلا سىياسەت، بەلگىلىمىلەر كۆپلەپ تەشۋىق قىلىنىپ، ئاز تۇغۇش، ساز تۇغۇش، سۈپەتلىك تەربىيەلەش، ئەر - ئايال باراۋەر بولۇش، گۈزەل، بەختلىك ئائىلە قۇرۇش، ئىناق جەمئىيەت بەرپا قىلىش، پىلانلىق تۇغۇتتىكى ئېتىبار بېرىش سىياسەتلىرىنى تەشۋىق قىلىش، پىلانلىق تۇغۇتنى يولغا قويغان ئائىلىلەرنى تۈرلۈك ئېتىبار بېرىش سىياسەتلىرىدىن بەھرىمەن قىلىش.

مەركىزىي كومىتېتى گۇۋۇيۈەن تۆۋەن تۇغۇت سەۋىيىسىنى مۇقىملاشتۇرۇش توغرىسىدىكى قارار «نىيىسىپ تارقاق» قاندىن كېيىن، نوپۇس ۋە پىلانلىق تۇغۇت خىزمىتىنىڭ مۇھىم ۋەزىپىسى نوپۇس سانىنى تىزگىنلەشنىڭ ئالدىنقى شەرتى ئاساسىدا، ئاھالە ساپاسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە قاراپ يۈزلەندى. دېمەك، بۇندىن بۇرۇنقى نوپۇس ۋە پىلانلىق تۇغۇت تەشۋىقات - تەربىيىسىدە قوللىنىلىپ كېلىۋاتقان بىر قاتار ئۇسۇل - چارلەر ھازىرقى ۋەزىيەتكە دېگەندەك ماسلىشىلماي قالدى.

نۆۋەتتە پىلانلىق تۇغۇت تەشۋىق - تەربىيە خىزمىتىدە ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر ئىسلاھ قىلىنىشقا ۋە يېڭىلىق يارىتىلىشقا موھتاج. بىرىنچىدىن، نۆۋەتتە پىلانلىق تۇغۇت تەشۋىق - تەربىيە خىزمىتىگە بولغان تونۇش تېخى دېگەندەك يېتەرلىك بولمايۋاتىدۇ. ئېنىقراق قىلىپ ئېيتقاندا، ئېغىزدا ئىنتايىن مۇھىم دەيمىز - يۈ، ئەمەلىيەتتە ئېغىزدا دېگەندەك كۆڭۈل بۆلۈنمەيۋاتىدۇ؛ ئىككىنچىدىن، خىراجەتكە كاپالەتلىك قىلىش سەل قىيىن بولۇۋاتىدۇ. تەشۋىق - تەربىيە خىزمىتى كەينىدىن كەلگەن بولغان جايلارنىڭ ئاساسلىق سەۋەبى خىراجەتنىڭ كاپالەتكە ئىگە بولالمايۋاتقانلىقىدا. خىراجەتكە كاپالەتلىك قىلىنىمىغاچقا، دائىملىق تەشۋىق - تەربىيە خىزمىتىنى قانات يايدۇرۇش ۋە تەشۋىق - تەربىيە خىزمىتىنىڭ سۈپىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش قىيىن مەسىلەگە ئايلىنىپ قېلىۋاتىدۇ.

ھازىرقى تۇغۇت يېشىدىكى ئاممىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى 70 - يىللاردا تۇغۇلغان بولغاچقا، ئۇلارنىڭ مەدەنىيەت ساپاسى بىرقەدەر يۇقىرى، ئۇلار ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىپ، تۇغۇت چەكلەشكە كۆڭۈل بۆلۈپلا قالماي، بەلكى سۈپەتلىك تۇغۇپ، سۈپەتلىك تەربىيەلەش ۋە ساغلام - ياش قاتارلىق جەھەتلەرگىمۇ ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلىدۇ. شۇنداقلا ئەر - خوتۇنچىلىقتا ئىناق مۇھەببەتنىڭ خاسلىقىدىن غىلا ئەھمىيەت بېرىپ قالماي، مەدەنىيەتلىك، بەختلىك، روھىي كەيپىياتىنىڭ خۇشال - خۇرام بولۇشىغىمۇ ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلىدىغان بولدى. شۇڭا، ئەنئەنىۋى تەشۋىق - تەربىيە مەزمۇنى ۋە شەكلى ئاممىنىڭ كۆپ قاتلاملىق تۇغۇتقا ۋە تۇرمۇش ئېھتىياجىغا ماسلىشىلمايدىغان بولۇپ قالدى. شۇڭلاشقا، دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلىشى، ئىسلاھ قىلىش

تەشۋىق - تەربىيە ئەندىزىسىنى ئۆزگەرتىپ، ئىلمىي باشقۇرۇش، ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت قىلىش، بولۇپمۇ تېخنىكىلىق مۇلازىمەت قىلىش بىلەن زىچ بىرلەشتۈرۈش كېرەك. شۇڭا، پارتىيە ۋە ھۆكۈمەتنىڭ رەھبەرلىكىدە داۋاملىق چىڭ تۇرۇپ، جەمئىيەتكە، ئاساسىي قاتلاملارغا، ئائىلىلەرگە ۋە ئاممىغا چوڭقۇر چۆكۈپ، ئالاقىدار تارماقلارنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئايدىڭلاشتۇرۇپ، شىتات ۋە خىراجەتكە كاپالەتلىك قىلىش لازىم. شۇنداقلا يۇقىرى ساپالىق پىلانلىق تۇغۇت كادىرلار قوشۇنىنى تەربىيەلەش خىزمىتىگە ئالاھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ، پىلانلىق تۇغۇت خىزمىتىنىڭ سىجىل تەرەققىي قىلىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك.

تەك ئاممىباب تەشۋىقات ئۇسۇلى ۋە خەلقنى ھەقىقىي نەپكە ئېرىشتۈرۈشكە ئائىت پايدىلىق بولغان تەشۋىقات ئۇسۇللىرى يېتەرلىك بولمايۋاتىدۇ. ئاممىغا نىسبەتەن پىلانلىق تۇغۇت توغرىسىدا تەلەپ كۆپ، ئۇلارغا مۇلازىمەت قىلىش ئاز بولىدۇ.

دېمەك، پىلانلىق تۇغۇت تەشۋىق - تەربىيە خىزمىتىدە ئىسلاھات ئېلىپ بېرىش ۋە يېڭىلىق يارىتىش لازىم. دۆلەت ئەھۋالى، دۆلەت سىياسىتى، نوپۇس ۋەزىيىتىنى داۋاملىق تەشۋىق قىلىش بىلەن بىللە ئائىلىلەرگە يۈزلىنىپ، ئادەمنى ئاساس قىلىپ، تۇغۇت يېشىدىكى ئاممىنىڭ تۈرلۈك قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىش كېرەك. بۇندىن بۇرۇنقى كونا

سەكتىگە بىمارلىرىنىڭ ئائىلىدىكى مەشىقى ۋە پەرۋىشى ئۇسۇلى توغرىسىدا

مەرھابا ئابدۇقېيۇم (844000)

(قەشقەر ۋىلايەتلىك 1-خەلق دوختۇرخانىسى كادىرلار ئۇنىۋېرسال بۆلۈمى)

دەسلەپكى دەۋرىلىك مەشىق چوقۇم كېسەللىك ئەھۋالى تۇراقلاشقاندىن كېيىن ئىشلىنىشى كېرەك. مەسىلەن: قان يېتىشمەسلىكتىن بولغان مېڭە قان تومۇر كېسەللىكى كېسەللىك باشلىنىپ بىر ھەپتىدىن كېيىن، قاناش خاراكتېرلىك مېڭە قان تومۇر كېسەللىكى كېسەللىك باشلىنىپ 2~3 ھەپتىدىن كېيىن، كېسەللىك ئەھۋالى تۇراقلىشىشقا قاراپ يۈزلىنىدۇ، ئاندىن ئىقتىدارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشىقىنى باشلىسا بولىدۇ. ئىلگىرى بەزىلەر مۇشۇ مەسىلە توغرىسىدا كېسەللىك تارىخى ئۈچ ئايدىن ئاشقان، ھەمدە دەسلەپكى دەۋرىلىك ئىقتىدارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشىقى ئىشلەش ياخشى بولمىغان 20 نەپەر بىمارنى ئىز قوغلاپ كۆزەتكەن، نەتىجىدە ئۇلارنىڭ 18 نەپىرى ھاسىلغا چۈشۈپ قېلىپ نورمال مېڭىش ئىقتىدارىنى يوقاتقان، پەقەت 2 نەپىرىلا نورمال ماڭالغان. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئەگەر دەسلەپكى دەۋرىدە ئىقتىدار مەشىقى قىلىنسا، پۇت - قولنىڭ ئىقتىدارى تولۇق ئەسلىگە كېلىش ئاسان ئەمەس.

2. ئىقتىدارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشىقىنى

سەكتىگە گىرىپتار بولغانلارنى دوختۇرخانىدا داۋالاپ قۇتقۇزۇۋالغاندىن كېيىن، ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ سەكتە بىمارلىرىنىڭ سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشىقى ئىشلەش بىلىملىرى كەمچىل بولسا، بىمارنى قانداق مەشىق قىلدۇرۇش ۋە قانداق پەرۋىش قىلىشنى بىلمەي، گاڭگىراپ قالىدۇ. شۇڭا، تۆۋەندە ئائىلىدىكىلەر بۇنداق بىمارلارنى قاچاندىن باشلاپ، قانداق مەشىق قىلدۇرۇش كېرەكلىكى توغرىسىدا توختىلىپ ئۆتىمەن:

1. قاچاندىن باشلاپ سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشىقى ئىشلەش كېرەك

تېببىي تەتقىقات ماتېرىياللىرىدا، مېڭە سەكتىسىگە گىرىپتار بولۇپ يارتا پالەچلەنگەن بىمارلار، كېسەللىكنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە ئىقتىدارنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشىقى ئىشلىگەن ياخشى دېيىلگەن. دەسلەپكى دەۋرىدە مەشىق قىلدۇرغاندا ھەرىكەت ئىقتىدارىنىڭ ئەسلىگە كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولۇپلا قالماي، يەنە ئەسلىگە كېلىش ۋاقتىنى قىسقارتىپ، ھەر خىل ئەگەشمە كېسەللىكلەرنىڭ پەيدا بولۇشىدىن ساقلاشنى بولىدۇ. لېكىن

قانداق ئىشلەش كېرەك

بۇ يەردە مەن سەكتە بىمارلىرىنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا ئاددىي بولغان دەسلەپكى دەۋرىلىك سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋاستىسىنى تونۇشتۇرۇپ، شۇ ئارقىلىق بىمارنىڭ مېيىپ بولۇش نىسبىتىنى تۆۋەنلىتىشنى، بىمارنىڭ ئازابىنى ئازايتىشنى، ئائىلە ۋە جەمئىيەتنىڭ يۈزىنى يەڭگىلەتتىشىنى ئۈمۈد قىلىمەن.

(1) دەسلەپكى دەۋرىدىلا بەدەننىڭ يېتىش ھالىتى توغرا بولسا، كېيىنكى كۈنلەردە قول ۋە پۇتلىرىدا كېسەللىك ئاسارىتى قېلىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. ئائىلە تاۋابىئاتلىرى بىمارنىڭ كېسەللەنگەن مۇرىسىنىڭ ئاستىغا بىر كىچىك كۆرپىنى قىستۇرۇپ، مۇرىسىنىڭ ئارقىغا غا-دىيىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. بېغىشنىڭ تۆۋەنگە ساڭگىلاپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن، بىمارنىڭ بىلىكىنى كەڭ سوزۇلغان ھالەتتە ئېچىپ، قولغا لۆڭگە تۇتقۇزۇپ قويۇش، تىزنى سەل ئەگكەن ھالەتتە ياتقۇزۇپ، پۇت دۈمبىسى كارىۋات يۈزىگە تىك قويۇ-لۇشى لازىم.

(2) پاسسىپ ھەرىكەت قىلدۇرۇش: ئائىلە تاۋابىئاتلىرى بىمارنىڭ پۇت ۋە قوللىرىنىڭ ھەرقايسى بوغۇملىرىنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ، بىمارنىڭ پۇت - قوللىرىدىكى بوغۇملارنىڭ ھەرىكەت دەرىجىسىنىڭ چەكلىمىگە ئۇچرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك. لېكىن ھەرىكەت يېنىك بولۇشى، بۇلۇڭ چېكى ئەڭ چوڭ دائىرىگە يەتكۈزۈلۈشى كېرەك.

(3) دەسلەپكى مەزگىلدە توك بىلەن داۋالاپ پالەچلەنگەن پۇت - قوللارنىڭ نېرۋا ۋە مۇسكۇللىرىنى غىدىقلاپ، قان بىلەن تەمىنلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك.

(4) ئەس - ھوشى نورمال بىمارلارغا ساق قولى بىلەن كېسەللەنگەن قولىنى ھەرىكەتلەندۈرۈشنى ئۈگىتىش لازىم. مەسىلەن: ئىككى قول بارماقلىرىنى كىرىشتۈرۈپ جۈپلەش، جەينەك بوغۇمىنى سوزۇش، ئىككى قولىنى ئاستا - ئاستا باشتىن ئېگىز قىلىپ كۆتۈرۈش قاتارلىق ھەرىكەتلەرنى تەكرار ئىشلىتىش، ئاندىن كېيىن جەينەك-نى ئاستا - ئاستا ئېگىش ۋە سوزۇش ھەرىكىتىنىمۇ تەكرار ئىشلىتىش، ئىككى قولىنىڭ بېغىش بوغۇمىنى ئايلاندۇرۇش قاتارلىقلار. ئەگەر بىمار ھەرىكەتلەندۈرەلمەيدىغان

بىلىكىنى كۆتۈرەلسە، ئۇ چاغدا بىمارنىڭ بۇندىن كېيىنكى داۋالاشقا بولغان قىزىقىشى ئېشىپ، ئاكتىپ چېنىقىدۇغان بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن داۋالاش ئۈنۈمى ئاشىدۇ.

(5) كۆۋرۈكسىمان ھەرىكەت قىلىش. بىمار يېتىپ تۇرۇپ ئىككى بىلىكىنى بەدىنىنىڭ ئىككى تەرىپىگە قوياپ، تىزنى يىغىپ كارىۋاتنى دەسسەش، ئاندىن ساغرىنى كۆتۈرۈپ كارىۋاتتىن ئايرىلىش لازىم. بۇ خىل ھەرىكەت كېيىنچە بىمارنىڭ يەرگە چۈشۈشىگە تەييارلىق بولىدۇ.

(6) پسخىكىسىنى تەڭشەش: سەكتە بولغاندىن كېيىن، بىماردا ئاسانلا ئەندىشە قىلىش ۋە بىزار بولۇش كەيپىياتى شەكىللىنىدۇ. پۇت - قولى ساق ئادەمنىڭ بىردىنلا بىر تەرەپ پۇت - قولى ھەرىكەتلەنمىسە، كەيپىياتى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ، ئەلۋەتتە. شۇڭا، ئائىلە تاۋابىئاتلىرى بىمارنىڭ بۇ ۋاقىتتىكى روھىي ھالىتىنى چۈشىنىپ، كۆپرەك غەمخورلۇق قىلىش، بىمارنىڭ بۇ خىل كېسەللىكىنى چۈشىنىشىگە، شۇنداقلا داۋالاشقا ئاكتىپ ماسلىشىشىغا ئىلھام بېرىش كېرەك. داۋالاشتا دورا ئارقىلىق داۋالاش بىلەن بىللە، ساغلاملىقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشىقىنى ئىشلەش ئىنتايىن مۇھىم. مۇبادا بىمار ئۆزىنىڭ تىرىشچانلىقى ئاستىدا، پۇت - قوللىرى ئەسلىگە كېلىۋاتقانلىقىنى كۆرسە، چېنىقىشقا بولغان ئىشەنچىسى ئاشىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ئۆز ۋاقتىدا بىمارغا ئىلھام بېرىشى كېرەك.

كېسەللىك قوزغالغاندىن كېيىنكى ئۈچ ئاي ئىقتىدارى ئەسلىگە كېلىدىغان ئەڭ ياخشى مەزگىل، شۇڭا بۇ پەيتنى چىڭ تۇتۇش، ھەرگىزمۇ قولدىن بېرىپ قويماسلىق كېرەك. بىمارنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى بىمار داۋالانغان دوختۇرخانىنىڭ سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش بۆلۈمىدىن مەسلىھەت سوراش ياكى بىمارنى بىللە ئېلىپ كىرىپ، دوختۇرخانىدىن كۆرسەتمە ئېلىش لازىم. شۇنداق قىلغاندىلا دوختۇرخانىنىڭ ئوخشاش بولمىغان كېسەللىك باسقۇچىغا ئاساسەن ۋە بىمارنىڭ كېسەللىك ئەھۋالىنى مۆلچەرلەش ئارقىلىق، بىمارغا ماس كېلىدىغان قىسقا مەزگىللىك ياكى ئۇزۇن مەزگىللىك ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشىقى لايىھىسىنى تۈزۈپ چىقىدۇ. بۇ بىمارنىڭ كېيىنكى سالامەتلىكىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش مەشىقى يېتەكچىسى قىلىنىدۇ.

يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى ۋە ئۇنىڭ پىسخىك پەرۋىشى

گۈزەلنۇر ئىبراھىم (841000)

(كورلا شەھەرلىك ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسى)

مۇھىم ئورۇندا تۇرسىمۇ پىسخىك پەرۋىشى بىللە ئېلىپ بېرىش ئىنتايىن مۇھىم.

1. جىددىيلىشىش پىسخىك ئامىللىرىنى تىز-گىنلەش. جىددىيلىشىش پىسخىكىسىنىڭ يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىگە نىسبەتەن خەۋپى چوڭراق بولۇپ، جىددىيلىشىش يېنىكلەردە كېسەل ئەھۋالى ئېغىرلىشىدۇ، ئېغىرلاردا ئۆشتۈمۈت ئۆلۈپ كېتىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. شۇڭلاشقا پەرۋىشتە ياخشى مۇھىم ۋە ياخشى كەيپىيات بىلەن كېسەلنىڭ پىسخىك ئېھتىياجىنى چىقىش قىلىپ، جىددىيلىشىش مەنبەلىرىنى ئازايتىش كېرەك. بۇ ھەقتىكى تەلەپلەر تۆۋەندىكىچە: ① ياخشى داۋالاش ۋە پەرۋىش قىلىش مۇھىتى بولۇش، كېسەلخانىلارنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش، نەرسە-كېرەكلەرنى رەتلىك قويۇش كېسەللەرنىڭ رو-ھىي ھالىتىنى ياخشىلاش لازىم؛ ② تېببىي خادىملار بىمارلارغا تەشەببۇسكارلىق بىلەن يېقىنلىشىشى، ئىش كىيىمنى رەتلىك كىيىش، ھەرىكەتتە قوپال بولماسلىق لازىم؛ ③ كېسەللەرنىڭ ئالدىدا مەزكۇر كېسەلگە مۇناسىۋەتلىك بولغان ئىشلارنى سۆزلىمەسلىكى، بولۇپمۇ كېسەلنىڭ پىسخىك ھالىتىگە زىيانلىق بولغان، ئائىلىسى، ئىدارىسى ۋە خىزمىتىدىكى يامان خەۋەرلەرنى سۆزلەپ يۈرمەسلىكى كېرەك.

2. كېسەلنىڭ پىسخىك تەڭپۇڭلۇقىنى تەڭشەپ، ناچار ئىنكاسلارنىڭ ھاسىل بولۇشىدىن ساقلىنىش لازىم. مەسىلەن: ئائىلە ئىقتىسادى، خىزمەت ئىشلىرى، كېسەللىك ئەھۋالى قاتارلىقلار. پەرۋىش خىزمىتىدە ئانالىز قىلىش، تەتقىق قىلىش ئىشلىرىنى ئەستايىدىل ئىشلەپ، پىسخىك مەسلىھەت سوراش، پىسخىك پەرۋىشلەرنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. كېسەللىك ئەھۋالى پىسخىك رېئاكسىيەلەرنى كەلتۈرۈپ چىقار-

ئىقتىسادنىڭ تەرەققىي قىلىشى، كىشىلەر تۇرمۇش سەۋىيەسىنىڭ يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشى، يېمەك-ئىچمەك قۇرۇلمىسىنىڭ ئۆزگىرىشى، ئىجتىمائىي رېتىمنىڭ تېزلىشىشى ۋە ئەتراپتىكى مۇھىت قاتارلىق ئامىللارنىڭ تەسىرىدە، ھەر قايسى دۆلەت ۋە رايونلاردا يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ قوزغىلىش نىسبىتى كۆرۈنەرلىك دەرىجىدە يۇقىرى بولماقتا.

مەملىكىتىمىز مۇ يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ قوزغىلىش نىسبىتى بىر قەدەر يۇقىرى دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولۇپ، كىشىلەرنىڭ سالامەتلىكىگە، بولۇپمۇ ئوتتۇرا ياش ۋە ياشانغانلارنىڭ سالامەتلىكىگە ئېغىر تەھدىت سالماقتا.

كۆزىتىشلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، يۈرەك سانجىقى، يۈرەك مۇسكۇلى تىقىلمىسى، يۈرەك رېتىمى تەرتىپسىزلىشىش قاتارلىق ئۆزگىرىشلەر ئوتتۇرا ياش ۋە ياشانغانلاردا كۆپ كۆرۈلۈپ، يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ ئاساسىي قوزغىلىش مەنبەسى بولغان ئارتېرىيەنىڭ بوتقىسىمان قېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، بۇ ئۆزگىرىش ئادەمنىڭ ياشلىق دەۋرىدىلا باشلىنىدۇ. مەسىلەن: بەزى بوۋاقلارنىڭ تۇغۇلغاندىن كېيىن قان تومۇر دىۋارلىرىدا ياغ داغلىرى پەيدا بولىدۇ، ياشلىق دەۋرىگە بارغاندا، بۇ خىل ئۆزگىرىش ناھايىتى تېز تەرەققىي قىلىپ، ئارتېرىيەنىڭ بوتقىسىمان قېتىشىنىڭ ئالدىنقى شەرتىنى ھازىرلايدۇ. مۇشۇنداق بولغاندا، ئادەم ئوتتۇرا ياشقا بارغاندا يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرلىرىنى قوللىنىپ تۇرغان بولسىمۇ بەزىدە يەنىلا بۇ خىل كېسەللىك خەۋپىگە دۇچار بولىدىغان ئەھۋاللار كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ. شۇڭا بۇ خىل كېسەللىكلەردە ئالدىنى ئېلىش

لىدۇ. ئومۇمەن، كېسەلنىڭ پىسخىك ئۆزگىرىشىنى ئەستايىدىل ئىگىلەپ، پەرۋىش خاتىرىسىنى يېزىپ، دوختۇرغا ۋاقىتىدا خەۋەر قىلىپ داۋالاشتا پىسخىك ئامىللارنىڭ تەسىرىدىن تۇيۇقسىز ئۆلۈپ كېتىشىدىن ساقلىنىش لازىم.

4. دورىنىڭ پىسخىك ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش. كېسەلگە دورا بېرىش پەرۋىش خىزمىتىدىكى مەزمۇنلارنىڭ بىرى. دورا بېرىش جەريانىدىكى پىسخىك خىك پەرۋىش دورىلارنىڭ كېسەللەرگە بولغان پىسخىك ئۈنۈمى ئارقىلىق داۋالاش مەقسىتىگە يېتىشتىن ئىبارەت. بەزىلەر يۇقىرى قان بېسىم كېسىلى بارلارغا دورا ئىچۈرۈپ ئىمتىھانغا قاتناشتۇرۇشنى سىناق قىلغاندا يۈرەك ھەرىكىتى مىنۇتغا 12 قېتىم ئارتقا. لىقىنى، قان بېسىمى بۇرۇنقىدىن $Kpa\ 2.5$ ئۆرلىگەنلىكىنى سەزگەن، دورا ئىچۈرۈشكە پىسخىك داۋالاشنى بىرلەشتۈرگەندىن قان بېسىمى $Kpa\ 2.5$ چۈشكەن. تو-مۇر سوقۇشى مىنۇتغا 8 قېتىم ئازايغان، شۇڭلاشقا دورا ئىچۈرۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا پىسخىك داۋالاشنى ماسلاشتۇرۇپ ئېلىپ بېرىش پەرۋىش خىزمىتىدىكى مۇھىم ھالقا ھېسابلىنىدۇ.

غاچقا، كېسەللەرگە پىسخىكىلىق ئۆزگىرىش، فېزى-يولوگىيەلىك ئۆزگىرىش ۋە كېسەللىك ئەھۋاللىرى-نىڭ ئۆزئارا بىر-بىرىگە تەسىر كۆرسىتىشى قاتار-لىقلارنى تەشۋىق قىلىپ، كېسەللىك ئۈستىدىن غەلبە قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈش ۋە كېسەلگە توغرا مۇئامىلە قىلىش، تېببىي ئىلىمگە بولغان ئىشەنچنى ئاشۇرۇش كېرەك. پەقەت تېببىي خادىملارغا ئىشەنگەندىلا پىسخىك تەڭپۇڭلۇقنى تۇراقلاشتۇرغىلى بولىدىغانلىقىدىن چۈشەندۈرۈش، كۆڭۈل قويۇپ نەسىھەت قىلىش ئارقىلىق، ئائىلە ۋە خىزمەت سەۋەبىدىن بولغان پىسخىك بېسىمدىن خالاس قىلىش كېرەك.

3. ئۇچۇرلارنىڭ تەتۈر باغلىنىشلىقىنى ۋە كېسەللەرنىڭ پىسخىك ھالىتىنى ئىگىلەش لازىم. يۈرەك قان تومۇر كېسەللىرىنى كىلىنىكىدا ياخشى كۆزدە تىپ، ئورگانىزم ئىپادىلىرىگە دىققەت قىلىپلا قالماي، پىسخىك ھالىتىگىمۇ دىققەت قىلىش، چىراي ئىپادىلىرىنىمۇ ئىگىلەش لازىم. بەزى كىشىلەرنىڭ پىسخىك ھالىتىنى ئىگىلەش تەس بولغاچقا، ئەتراپتىكى كېسەللەردىن ئىگىلىشىمىزگە ۋە كېسەلنىڭ كېسەللىك ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن ئانالىز قىلىپ، بىمارنىڭ ئىچكى دۇنياسىنى ئىگىلىشىمىزگە توغرا كە-

ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىدە باش يىرىڭلىق تەمرەتكە

كېسىلىنى پەرۋىش قىلىش توغرىسىدا

رىزۋانگۈل ئابباس (843000)

(ئاقسۇ ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسى)

مىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ. ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: باش يىرىڭلىق تەمرەتكىسى، ئۇيغۇر تېبابىتى، پەرۋىش. تونۇش: باش يىرىڭلىق تەمرەتكىسى باش تېرىسى تۈك خالتىسىنىڭ يۇقۇملىنىشىدىن يەرلىك ئورۇندا يىرىڭلىق قاپارتمىلار پەيدا بولۇپ، سېرىق قەقەچ باغلاش، ئاجىزلىقلار چاشقان سۈيىدۈكىدەك پۇراش،

قىسقىچە مەزمۇنى: ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىدە باش يىرىڭلىق تەمرەتكىسىنى داۋالاش ۋە پەرۋىش قىلىشتا بىر قەدەر يۇقىرى ئەۋزەللىككە ئىگە بولۇپ، بۇ خىل كېسەللىكنى داۋالاشتا ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى بويىچە پىسخىكا، يېمەك-ئىچمەك، تازىلىق، دورا ئىشلىتىش، تۇرمۇش ئادىتى قاتارلىق جەھەتلەردىكى پەرۋىش ئۇسۇللىرى زىچ بىرلەشتۈرگەندە داۋالاش ئۈنۈ-

باش يىرىغلىق تەمرە تەكىسى بىمارلىرىغا پىسخىكا پەرۋىشى ئېلىپ بېرىشتىن بۇرۇن چوقۇم مەسئۇل سېستىرا بىمارنىڭ يېشى، كەسپى، جىنسىي مەدەنىيەت سەۋىيەسى قاتارلىقلارنى ئىگىلەش بىلەن بىرگە مىزاج خىلىت ئايرىمىسىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. يەنى بىماردىكى يەرلىك ئورۇننىڭ ئۆتكۈر قىچىشى، يىرىغداپ سۇ چىقىش، قەقەچ باغلاش قاتارلىق ئالاھىدە-لەر بولسا بىمارلاردا ئاسان بىئارام بولۇش، ئۇخلىيال-ماسلىق، ئاچچىقلىنىش، جىددىيلىشىش قاتارلىق پىسخىكىلىق توسالغۇلارنى پەيدا قىلىدۇ. مەسئۇل سېستىرا چوقۇم بىمارنىڭ مىجەز - خاراكتېرى، خە-لىت ئايرىمىسىغا ئاساسەن پىسخىكىلىق پەرۋىش ئېلىپ بېرىش، بىمارغا قارىتا خۇشال-خۇرام تۇتۇشنى تەكىتلەش، بىمار بىلەن كۆپرەك سىردىشىپ بېرىپ كۆپرەك كۆيۈنۈپ قىيىنچىلىق ۋە ئەندىشىلەرنى تۈ-گىتىشكە ياردەم بېرىش، يېتەرلىك ئۇخلاشقا كاپالەت-لىك قىلىشنى تەكىتلەش كېرەك. شۇنداقلا داۋالاش ئۈنۈمى ياخشى بولغان بىمارلارنى ئۈلگە قىلىپ كۆر-سىتىپ سۆزلەپ بېرىشنى، ياخشى بولغان كەيپىياتنىڭ داۋالاش ئۈنۈمىگە بىۋاسىتە تەسىر كۆرسىتىدىغانلى-قىنى ئېنىق چۈشەندۈرۈپ بىماردىكى روھىي جىددىي-لىكنى، ئەنسىرەش ھېسسىياتىنى تۈگىتىپ ئۆزگە-سىلى ئۈستىدىن غالىب كېلىش ئىشەنچىسى تۇرغۇ-زۇپ، ياخشى بولغان پىسخىكا ھالىتىنى شەكىللەندۈ-رۈپ ياخشى روھىي ھالەت بىلەن داۋالاشقا ماشلىشىش-نى قولغا كەلتۈرۈش كېرەك.

2. شەخسىي تازىلىق پەرۋىشى:

شەخسىي تازىلىق پەرۋىشى باش يىرىغلىق تەمرە-كىسىنى داۋالاشتا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدۇ. شۇڭا مەسئۇل سېستىرا بىمارنىڭ ياتقان ئۆيىنىڭ تىنچ، پاكىز بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش. بىمارنىڭ تىرىقچىنى ۋاقتىدا ئېلىپ تۇرۇش. باش قىسمىدىكى تەمرە تەكە بار ئورۇننى تاتىلاپ يۇقۇملىنىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش. بېشىنى كۈندە قەرەللىك ئىلما-دا ۋە دورا سۈيىدە يۇيۇپ بېرىپ قان ئايلىنىشىنى يا-شىلاش. باشنىڭ قۇرغاقلىقىنى ساقلاش، باش كىي-مە-نى باشقىلار بىلەن ئورتاق كىيىمەسلىك، قەرەللىك يۇ-يۇپ قايناق سۇغا سېلىپ دېزىنفېكسىيەلەش، باشنى سويۇن سۈيى بىلەن يۇيۇشتىن ساقلىنىش كېرەك-لىك.

قاتتىق قىچىشىش، زەمبۇرۇغ تەكشۈرگەندە مۇسپىي بولۇش، ساقايغاندىن كېيىن يىگىلەش خاراكتېرلىك تا-تۇق قېلىش، قەقەچ ئوتتۇرىسىدا چاچ ئۈنۈپ چىقىش قاتارلىق ئالاھىدەلەر بىلەن ئىپادىلىنىدىغان كېسەل-لىكتىن ئىبارەت.

ماتېرىيال: ئۆتكەن بىرىيل ئىچىدە بالىسىستاي-تېپ داۋالانغان باش تەمرە تەكىسى بىمارلىرى 31 نەپەر بولۇپ داۋالاش ۋە پەرۋىشنى ماسلاشتۇرۇپ كۆزەتكەندە ساقايغىنى 26 نەپەر 84% نى ئىگىلەيدۇ. ئۈنۈم بولغۇ-نى 4 نەپەر 12% نى ئىگىلەيدۇ. ئۈنۈم بولمىغىنى 1 نە-پەر 4% نى ئىگىلەيدۇ. ئومۇمىي ئۈنۈم بېرىش نىسبىتى 96% بولغان.

باش يىرىغلىق تەمرە تەكىسىدە يىرىغداش، ئۆتكۈر قىچىشىش، سۈيى چىقىش ئالامىتى تىپىك بولۇپ، يەرلىك ئورۇننىڭ سۈيى چىقىشنى توختىتىش، يى-رىغنى تۈگىتىش ئۈچۈن مامىرانچىن يۇيۇلمىسى بى-لەن ئىرقى چۆچىگەندە قۇبائى سۈكۈپ قىلسا ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ.

مىكروب ئۆلتۈرۈش، قاننى جانلاندۇرۇش مەقسە-تىدە يەرلىك ئورۇننى توكقا قاقلاپ داۋالاش ئېلىپ بارسا ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. يەنى باش يىرىغلىق تە-رە تەكىسى بار ئورۇننى قىزىل نۇردا قاقلاپ داۋالاش ئېلىپ بارغاندا تېرە زەخمىسىنىڭ ئەسلىگە كېلىش-نى تېزلىتىش، ھۆللۈكنى تېخىمۇ ياخشى قۇرۇتۇپ، سۈيىنى تېخىمۇ ياخشى سىڭدۈرگىلى بولىدۇ. ئادەتتە باش يىرىغلىق تەمرە تەكىسى كىچىك بالىلار يەنى ئۆس-مۈرلەردە كۆرۈلىدۇ. بۈكپەلگە ئۇيغۇر تېبابىتى بو-يىچە پەرۋىش قىلىشتا كېسەلگە سەۋەب قىلغۇچى خە-لىتلەر ئايرىمىسى بويىچە پەرۋىش ئېلىپ بارغاندا يۇ-قىرىقى بولغان داۋالاش ئۈنۈمىنى قولغا كەلتۈرۈشتە تېخىمۇ تۈرتكىلىك رول ئوينايدۇ. كەسپىي پەرۋىش ئىلمىدا داۋالاش مۇلازىمىتى بىلەن پەرۋىش ماسلاش-تۇرۇش ئېلىپ بارغاندا ئۈچ ئۇلۇش داۋالاش، يەتتە ئۇ-لۇش پەرۋىش دەپ بېكىتكەن بولۇپ ئۇيغۇر تېبابەت داۋالاش ئىلمىدىن پەرۋىش ئومۇمىي داۋالاشنىڭ 80% دىن كۆپ بولۇشنى تەلەپ قىلغان.

پەرۋىش قىلىش:

1. پىسخىكا پەرۋىشى

دىقلاپ بۇ كېسەلنى ئېغىرلاشتۇرۇۋېتىدۇ. شۇڭا مەس-
ئۇل سېسترا يۇقىرىقى ئادەتلەرنىڭ ئۆزىگە نىسبەتەن
ناچار تەسىرىنى بىمارغا تەپسىلىي چۈشەندۈرۈپ ياخ-
شى بولغان تۇرمۇش ئادىتىگە بىمارنى يېتەكلەش
شۇنداقلا يېتىلدۈرۈشكە دەۋەت قىلىش لازىم. كىچىك
بالىلار يەنى ئۆسمۈرلەرگە بولسا چوقۇم مەسئۇل
سېسترا بىمار ۋە بىمار ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا كېسەل-
لىكنىڭ پەيدا بولۇش، تەرەققىي قىلىش شۇنداقلا باش-
قا جەھەتلەردە دىققەت قىلىشنى تولۇق چۈشەندۈرۈپ
دەسلەپكى مەزگىلدىن باشلاپ بالىلاردا ياخشى بولغان
تۇرمۇش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش، تېرە تازىلىقىغا ئالا-
ھىدە ئەھمىيەت بېرىش. تىرىقلىرىنى ۋاقتىدا ئېلىپ
تۇرۇش، يەرلىك ئورۇننى تاتلاپ يۇقۇملاندۇرۇپ قو-
يۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش. باش قىسمى باشقا نەرسىلەر
بىلەن سۈركىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش قاتارلىق جە-
ھەتلەردىكى مەزمۇنلارنى تەپسىلىي چۈشەندۈرۈش
لازم. ئوتتۇرا ياش ۋە ئۆسمۈرلەرگە ئورتاق يەرلىك
ئورۇن ياكى باش يىرىڭلىق تەمرەتكىسى بار ئورۇننى
سويۇن سۈيى ۋە قىزىق سۇدا يۇماسلىق، ھەرىكەتچان
دەۋردە چوقۇم ئارام ئېلىشقا دىققەت قىلىش لازىم.
زۇكامداپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش. باش كىيىمى
كىيمەسلىك. باش كىيىم كىيگەندىمۇ چوقۇم پاختا
رەختتىن تىكىلگەن باش كىيىمنى كىيىش، چاڭ-تو-
زان بار جايغا بارماسلىق، يۇقۇملىنىپ قېلىشنىڭ
ئالدىنى ئېلىش، يىرىڭ بار جاينى ئۆزىمىلچە تاتلاپ
بۇزۇۋەتمەسلىك قاتارلىق جەھەتتىكى ئىشلارنى تولۇق
چۈشەندۈرۈش لازىم.

5. دورا ئىشلىتىش پەرۋىشى:

دەسلەپكى مەزگىلدە مەسئۇل سېسترا بىمارلارنىڭ
دورا ئىچىشىگە سىرتىدىن دورا ئىشلىتىش ئەھۋالىغا
قارىتا يېتەكچىلىكنى كۈچەيتىش لازىم. دورىنى
ئىچىۋاتقان مەزگىلدە تېرىنى غىدىقلايدىغان نەرسە-
لەردىن، يېمەك-ئىچمەكلەردىن پەرھىز قىلىش، دو-
رىلارنى مىقدارى بويىچە ئىچىشكە دەۋەت قىلىش. بى-
مارلار دورىلارنى ئىچىپ بولغاندىن كېيىن ئەكس تەس-
رى بار - يوقلۇقى ۋە ئۈنۈمىگە دىققەت قىلىش بىلەن
بىرگە مەسئۇل سېسترا بىمارلارنىڭ ھەرتۈرلۈك
كۆرسەتكۈچلىرىنى قەرەللىك تەكشۈرۈپ تۇرۇش كې-
رەك. ئۇنىڭدىن باشقا سىرتىدىن ئىشلىتىدىغان دو-

كىنى تاپىلاش. ياتاقنىڭ ھاۋاسىنى قەرەللىك ئالماش-
تۇرۇپ تۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىش، كارىۋات كىرلە-
كىنى كۈندە ئىككى قېتىم دېزىنڧىكسىيەلەش سۈيۈق-
لۇقى چىلانغان لۆڭگە بىلەن سۈرتۈپ تۇرۇش، كارىۋات
كىرلىكلىرىنى قەرەللىك ئالماشتۇرۇپ پاكىز، يۈم-
شاق، قۇرغاق بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىپ بۇلغىنىپ
كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

3. يېمەك-ئىچمەك پەرۋىشى:

بۇ جەھەتتە پەرۋىش خادىملىرى بىمارغا ئوزۇقلە-
نىش بىلەن بىرگە كېسەللىك ئوتتۇرىسىدىكى مۇنا-
سەتتىن توغرا چۈشەندۈرۈش بولۇپمۇ پەرھىزگە
ئەھمىيەت بېرىش. داۋالاش ۋە پەرھىزگە ئەھمىيەت
بەرگەندە كېسەللىكنىڭ تېز ساقىيىدىغانلىقىنى،
ئەكسىچە بولغاندا كېسەللىكنىڭ ئېغىرلىشىپ كېت-
دىغانلىقىنى ئۇقتۇرۇپ قويۇش لازىم. بىمارنى
ئوزۇقلاندۇرۇشتا خىلىت ئالاھىدىلىكى مىزاجى ۋە
كېسەللىك ئەھۋالىغا ئاساسەن ئوزۇقلاندۇرىدۇ. يەنى
يېمەكلەردىن يەللىك غىدىقلىغۇچى، ئىسسىق تەبىئەت-
لىك خۇرۇچلار سېلىنىمىغان قوي گۆشى شورپىسى،
پۇلۇ، پېتىرمانتا قاتارلىق يېمەكلىكلەرنى مۇۋاپىق
مىقداردا ئىستېمال قىلىش پايدىلىق. ھۆل مېۋىلەردىن
كۆك ئۈزۈم، تاتلىق بۆلجۈرگەن، نەشپۈت، تاۋۇز،
سەيلەردىن بەسەي، سەۋزە، موگو، مور قاتارلىقلار مۇ-
ۋاپىق ئىستېمال قىلىسا بولىدۇ.

كالا گۆشى، ئۆچكە گۆشى، تۈزلانغان گۆش، تۈ-
خۇم، ئۇچار قۇشلارنىڭ گۆشلىرى، كاۋاپلىرى، پىياز،
سامساق، كۈدە، لەڭپۇڭ، لازىلىق يېمەكلەردىن پەر-
ھىز تۇتۇش كېرەك.

4. تۇرمۇش ئادىتى پەرۋىشى:

باش يىرىڭلىق كېسەللى بىمارلىرىغا تۇرمۇش پەر-
ۋىشى ئېلىپ بېرىشتا ئاۋۋال چوقۇم يېشى، كەسپى قا-
تارلىققا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. ئوتتۇرا
ياشلاردا بۇ كېسەل يۈز بەرگەندە چوقۇم ئاۋۋال ياخشى
بولغان تۇرمۇش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈش لازىم. تاماكا
چېكىشتىن، ھاراق ئىچىشتىن، قېنىق دەملەنگەن چاي
قاتارلىقلارنى قەتئىي ئىستېمال قىلماسلىق كېرەك.
چۈنكى يۇقىرىقى نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلغاندا باش-
نىڭ تېرە توقۇلمىسىغا تەسىر قىلىپ تېرىلەرنى غى-

دىن، قاپارتمىلارنى بۇزۇپ چۈشۈرۈۋېتىشىدىن ساق-
لىنىش كېرەك. يەرلىك ئورۇننى زۆرۈر تېپىلغاندا
ماس بولغان مەلھەملەرنى سۈرتۈپ بىنت بىلەن ئوراپ
قويۇش كېرەك. بۇنداق بولغاندا يىرىغداپ قالغان ئو-
رۇننىڭ تازىلىقىنى ياخشى ساقلاپلا قالماي، يۇقۇملۇ-
نىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. يەرلىك ئو-
رۇننى تازىلاپ دورا ئالماشتۇرۇشتىن بۇرۇن يىرىغنى
تولۇق سىقىپ چىقىرىۋېتىپ ئاندىن تازىلاپ دورا ئال-
ماشتۇرۇش ئېلىپ بېرىش كېرەك. بۇنداق بولغاندا
تەمرەتكە بار ئورۇننىڭ ئىچكىرىلەپ يىرىغداپ، دائى-
رىسىنىڭ كېڭىيىپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بو-
لىدۇ. يەرلىك ئورۇننى قۇبائى سۈكۈپ قىلغاندا دو-
رىلارنىڭ مىقدارىنى ۋە تېمپېراتۇرىسىنى مۇۋاپىق
تەڭشەش. (35℃-45℃) ئەسۋە بار ئورۇننى كۆيدۈرۈپ
قويۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. مايلاپ توكقا قاقلاش
ئېلىپ بارغاندا مىكروپىسز مەشغۇلات قائىدىسىگە
رىئايە قىلغان ئاساستا مايلاش ئېلىپ بېرىش، توكقا
قاقلاش ئېلىپ بارغاندا ۋاقتى ۋە ھارارىتىنى مۇۋاپىق
تەڭشەپ كۆيدۈرۈپ قويۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كې-
رەك. ئامال بار تېرىلەرنىڭ سۈركىلىشىدىن ساقلى-
نىش لازىم.

رىلارنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن چوقۇم باشنىڭ تېرە تا-
زىلىقىنى تەكشۈرۈش، تازىلاپ پاكىز بولغاندىن كېيىن
ئاندىن دورا سۈرتۈش ئېلىپ بېرىش، كېيىنكى قېتىم
باشقا دورىلار بىلەن يەرلىك ئورۇننى دورا سۈرتۈشتىن
بۇرۇن سۈرتۈلگەن دورىلارنىڭ قالدۇقىنى پاكىز سۈر-
تۈپ چىقىرىش ياكى فىزىيولوگىيەلىك تۈز سۈيى بى-
لەن تازىلاپ چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن ئاندىن مايلاش،
دورا سۈرتۈش ئېلىپ بېرىش لازىم. بۇنداق قىلغاندا
يەرلىك ئورۇن پاكىزلىقىنى ساقلىغىلى بولىدىغانلىقى-
نى، سۈرتكەن دورىنىڭ ئۈنۈمىنىڭ تېخىمۇ ياخشى
بولدىغانلىقىنى مەسئۇل سېسترا بىمارغا تەپسىلىي
چۈشەندۈرۈش لازىم. يەرلىك ئورۇننى قۇبائى سۈكۈپ
قىلىش، مايلاپ توكقا قاقلاش، نۇر بىلەن داۋالاش،
شۇنداقلا قەرەللىك دورا ئالماشتۇرۇش قاتارلىق دا-
ۋالاش ئۇسۇللىرىنىڭ ئۈنۈمى، تەسىرى ۋە ئەۋزەللى-
كىنىڭ خاسلىقى بىمارغا چۈشەندۈرۈپ داۋالاشقا بول-
غان ماسلىشىنى قولغا كەلتۈرۈش لازىم.

6. داۋالاش جەريانىدىكى دىققەت قىلىدىغان ئىشلار:
بۇ جەھەتتىكى يەنى باش يىرىغلىق تەمرەتكىسىنىڭ
دائىرىسىنى ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىپ يەرلىك
ئورۇننى تازىلاش ئېلىپ بارغاندا قاتتىق بېسىۋېتىش-

بېھچەت ئۇنىۋېرسال كېسەلى بىمارلىرىنى ئۇيغۇر تېبابىتىدە مەخسۇس بۆلۈملۈك پەرۋىش قىلىش تەدبىرلىرى توغرىسىدا

رەبھانگۈل تۇرسۇن (843000)

(ئاقسۇ ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تېبابەت دوختۇرخانىسى)

تېبابىتىدە پەرۋىش قىلىش
بېھچەت كېسەلى قان تومۇر ياللۇغىنىڭ بىر تۈ-
رىگە تەۋە كېسەللىك بولۇپ، ئېغىز بوشلۇقى، ئەۋرەت
قىسمىغا تەكرار جاراھەت چىقىش، تېرە ئەسۋىسى پەيدا
بولۇش، مۇچىلەردە تۈگۈنلۈك قىزىل داغ پەيدا بو-
لۇش، كۆز رەڭدار پەردە ياللۇغى، قىزىلئۆڭگەچكە جارا-
ھەت چىقىش، كىچىك ئۇچەي بوغماق ئۇچەي يار-
سى، بوغۇملار ئىششىش، سىيىش قىيىنلىشىش قاتار-

قىسقىچە مەزمۇنى: بېھچەت ئۇنىۋېرسال كېسەلى
يەنە بېھچەت كېسەلى دەپمۇ ئاتىلىدۇ، ئۇ بىر خىل پۈ-
تۈن بەدەن خاراكتېرلىك ئىممۇنىتېت سىستېما ئۈند-
ۋېرسال كېسەللىكى بولۇپ، ھەرقايسى سىستېمىلار-
دىكى كېسەللىك ئۆزگىرىشىگە ئاساسەن بېھچەت كې-
سەلىنى پەرۋىش قىلىشتىكى بايانلار كىلىنىكىلىق
تەجىربىلەر ئارقىلىق مۇھاكىمە قىلىنىدۇ.
ئاچقۇچلۇق سۆزلەر: بېھچەت كېسەللىكى، ئۇيغۇر

كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

پەرۋىش: پەرۋىش خادىملىرى بۇ خىل دىياگ-
نوزدىكى بىمارلارغا قارىتا پەرۋىش ئېلىپ بارغاندا تۆ-
ۋەندىكى پەرۋىش مۇھىم نۇقتىلىرىغا ئالاھىدە ئەھمى-
يەت بېرىش كېرەك، شۇنداق بولغاندا دوختۇر بىمار
ئوتتۇرىسىدا كۆۋرۈكلۈك رول ئوينىغىلى، بىمارنىڭ
كېسەللىك ئازابىنى يېنىكلىتىش، ياخشى بولغاندا -
ۋالاش ئۈنۈمىنى قولغا كەلتۈرگىلى بولىدۇ. پەرۋىش
ئالاھىدىلىكى، خاسلىقىنى گەۋدىلەندۈرگىلى بولىدۇ.

1. ياتاق مۇھىتى پاكىز، تىنچ، تېمپېراتۇرىسى مۇ-
ۋاپىق بولۇش، كۈندە 2 ۋاق ياتاق ئىچىنى دېزىنڧېكسىيە
قىلىش، ھاۋا ئالماشتۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىش.

2. يېمەك-ئىچمەك، يۈرۈش-تۇرۇشتا تەرتىپلىك
بولۇش، ناچار تۇرمۇش ئادەتلىرىدىن ساقلىنىش، ئىس-
مېنا قوشۇپ ئىشلەش، ھەتتا كېچىدە ئۇخلىماي تالڭ
ئاتقۇزۇشتىن ساقلىنىش، ھېرىپ چارچاشتىن ساق-
لىنىش، روھىي كەيپىياتىنى تەڭشەش، ئاسان ھەزىم
بولدىغان يېرىم سۇيۇق، قەنت مىقدارى تۆۋەن، يۇقىرى
ئاقسىللىق، يۇقىرى ۋىتامىنلىق يېمەكلىكلەرنى كۆپ-
رەك ئىستېمال قىلىشقا بۇيرۇش، يەنى پۇرچاق ئائى-
لىسىدىكى يېمەكلىكلەر، يېڭى كۆكتاتلار، مېۋە-چىۋە-
لەردىن (ئالۇچا، مايۇن شاپتۇل، قوغۇن، لىمون) قاتار-
لىقلاردىن باشقا مېۋە - چىۋىلەرنى ئىستېمال قىلىشقا
بۇيرۇش، غىدىقلىغۇچى يېمەكلىكلەر، چىڭسىي، مو-
گۇ، زەنجىۋىل، پىياز، لازا، جۈسەي، قوغۇن، خوگو تۈرد-
دىكى يېمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىش، مايلىق تا-
ماقلار، سېمىز گۆش، ھاراق-تاماك، قېنىق دەملەنگەن
چاي قاتارلىقلاردىن پەرھىز قىلدۇرۇش. زۇكامداپ قې-
لىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش.

3. مەخسۇس بۆلۈملۈك پەرۋىشنى كۈچەيتىش،
يەنى تېرە پەرۋىشى، ئېغىز بوشلۇقى پەرۋىشى، ئەۋرەت
پەرۋىشى، دورا ئىشلىتىش جەريانىدىكى پەرۋىش، يې-
مەك-ئىچمەك پەرۋىشى، تۇرمۇش پەرۋىشى، پىسخولو-
گىيە پەرۋىشىنى كۈچەيتىش.

4. كېسەللىك ئۆزگىرىشىنى ئىنچىكىلىك بىلەن
كۆزىتىش، يېڭىدىن ئەسۋىلەر چىقىۋاتامدۇ - يوق، تېرە

لىق ئالامەتلەر بىلەن ئىپادىلىنىدىغان كېسەل-
لىك، ئاساسلىقى بۇ ئادەم بەدىنىدىكى كۆپ ئەزالارغا
تەسىر قىلىدۇ، يەنى ئېغىز بوشلۇقى، تېرە، بو-
غۇم، مۈسكۈل، كۆز، قان تومۇر، يۈرەك، ئۆپكە، ھەزىم
سىستېمىسى، نېرۋا سىستېمىسى قاتارلىقلارغا تەسىر
قىلىدۇ. ئېغىز بوشلۇقى جاراھىتىدە تىل، كال-
چۈك، ئۈستۈنكى تاڭلاي، يۇتقۇنچاق قاتارلىق ئورۇنلارغا
كۆپ جاراھەت چىقىدۇ، لېكىن ئۆزلۈكىدىن ياخشىلى-
نىدۇ، تەكرار قوزغىلىدۇ، ئاغرىق بەك كۈچلۈك بو-
لۇپ، تاماق يېيىشكە تەسىر كۆرسىتىپ، بىمارنى قىي-
نايدۇ.

كۆرۈش سىستېمىسىغا تەسىر قىلغاندا كۆزدە
قىزىرىش، ئاغرىش، كۆرۈش ئىقتىدارى ئاجىزلاش،
كۆز چارچىغاندەك سېزىم بولۇش قاتارلىك ئالامەتلەر
كۆرۈلىدۇ. ھەزىم سىستېمىسىغا تەسىر قىلغاندا يۈ-
تۈش قىيىنلىشىش، يۇتقاندا كۆكرەك ئاغرىش، ياندۇ-
رۇش، قورساق ئاغرىش، ئىچى سۈرۈش، چوڭ تەرەتتە
يىرىك ياكى قان كۆرۈلۈش، بەدەن ئىممۇنىتېتى تۆۋەن-
لەش، ئورۇقلاش، ئىشتىھاسىزلىق ئالامەتلىرى كۆرۈ-
لىدۇ.

قان تومۇرلاردا ئۆزگىرىش كۆرۈلگەندە، نۆكچە
خاراكتېرلىك ۋېنا ياللۇغى، چوڭقۇر ۋېنالىرىدا نۆكچە -
پەيدا بولۇش، ئېغىرلاشقاندا ئۆپكە قان تومۇر كەپلەش-
مىسى، ھەرىكەتتىن كېيىن دەم سىقىلىش، نەپەس قى-
يىنلىشىش، كۆكرەك ئاغرىش، باش قېيىش، ئارتېرىيە
ئۆسمىسى، قان ئازلىق كۆرۈلىدۇ، ئارتېرىيە ئۆسمىسى-
دە يېرىلىش بولسا كۆپ قاناش يۈز بېرىپ، ھەتتا ھايا-
تىغا خەۋپ يېتىشى مۇمكىن. نېرۋا سىستېمىسىغا تە-
سىر قىلغاندا باش ئاغرىش، باش قېيىش، كۆڭلى ئې-
لىشىشى، قۇسۇش، قول پۇت قولاشقاندا سېزىم بو-
لۇش، ئاغرىش، كۈچسىزلىنىش، بىر تەرەپ قول - پۇت
پالەچلىنىش، ئېغىر بولغاندا تارتىشىش قاتارلىق ئالا-
مەتلەر بىۋاسىتە نېرۋا سىستېمىسىغا تەسىر كۆرسىد-
تىپ، چوڭ مېڭە، كىچىك مېڭە، مېڭە غولى، مېڭە يۇلۇن
پەردىسى قاتارلىقلارغا تەسىر قىلىپ، مېڭە يىگىلەشنى

شىللىق پەردىلەردە ئالامەتسىز زەخمىلىنىش بارمۇ - يوق، بەدەن تېرىسىدە تۈگۈنلۈك قىزىل داغ زەخمىسى، تۈك خالتا ياللۇغى زەخمىسى، كۆكرەك تۆت مۇچە تېرە زەخمىسى، يىرىڭلىق قاپارتقۇ ۋە باشقا قوشۇمچە بەدەن ئالامىتى بارمۇ - يوق ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىش ئېلىپ بېرىش كېرەك. بىمارنىڭ ئېغىز بوشلۇقىدا، ئەۋرەت قىسمىدا جاراھەت پەيدا بولدىمۇ - يوق، كۆز ئەتراپىدا ئۆزگىرىش بولدىمۇ - يوق، كۆرۈش ئىقتىدارىدا، بوغۇملاردا ئۆزگىرىش بولدىمۇ - يوق، يۈرەك قان تومۇرلاردا، ھەزىم سىستېمىسىدا، نېرۋا سىستېمىسىدا زەخمىلىنىش بولدىمۇ - يوق، ئۆپكەدە زەخمىلىنىش قان تۈكۈرۈش بولدىمۇ - يوق، ئىنچىكەلىك بىلەن كۆزىتىش ئېلىپ بېرىش كېرەك.

5. بىمارغا تېرىنىڭ پاكىزلىقىنى ساقلاش توغرىدا سىدا تەربىيەنى كۈچەيتىش، سۈنئىي تالالىق كىيىملەرنى كىيىمەسلىك، ساپ پاختا رەختتىن تىكىلگەن ئىچ كىيىملەرنى كىيىش، ئىلمان سۇ بىلەن يۇيۇش، نۇش، سۇ بىلەن ئۇچرىشىش ۋاقتى ئۇزۇن بولماسلىق، يۇيۇنغاندا تېرىنى غىدىقلايدىغان يۇيۇش سۇيۇقلۇقلىرىنى ئىشلەتمەسلىك، ئەسۋە چىققاندا سىقىۋەتمەسلىك، يەرلىك ئورۇننى 0.5% لىك يود بىلەن دېزىد-فېكسىيە قىلىش. بىمارنى چوقۇم ياتقۇزۇپ ئارام ئال-دۇرۇش، يېتىش ھالىتىنى قەرەللىك ئۆزگەرتىپ تۇرۇش، تېرىلەرنىڭ سۈركىلىشىدىن ساقلىنىش.

6. 70% - 90% بىمارلاردا كۆزگە تەسىر قىلىش كۆرۈلىدۇ، چوقۇم كۆزنىڭ پاكىزلىقىنى ساقلاش، دورا تېمىتىشتىن بۇرۇن دېزىنڧېكسىيە قىلىنغان پاختا پىلتىكۈچ بىلەن كۆزدىكى ئاجىزلىقلارنى سۈرتۈپ، 0.9% لىك تۈز سۈيى ئېرىتمىسى بىلەن يۇيۇش، مەش-غۇلات جەريانىدا چوقۇم قولىنىڭ پاكىزلىقىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش، چوقۇم كۆز بۆلۈم دوختۇرلىرىنىڭ كۆرسەتمىسى ئاستىدا دورا ئىشلىتىش.

7. ئېغىز يارىسىدىكى ئاغرىش ئېغىر بولسا، بۇ خىل كېسەلدە كۆپ ئۇچرايدىغان ئالامەتلەر بولۇپ، 85% بىماردا بۇ خىل ئالامەت كۆرۈلىدۇ، كۆرسەتمە بۇ-يېچە ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلارنى ئىشلىتىش، ئۈچ

ۋاق تاماقتىن كېيىن چوقۇم ياللۇغ قايتۇرغۇچى، جاراھەت پۈتتۈرگۈچى دورىلاردىن ياسالغان ئېغىز چاپ-قاش سۇيۇقلۇقى بىلەن ئېغىزنى چاپقاش، (يەنى شىپا-يى غار - غار سۈيى....) جاراھەت ئورنىغا مەلھەم سۈر-تۈش ياكى موزا تالقىنى سېپىش، ئېغىز چوتكىسى ئىشلەتمەسلىك، ئېغىز بوشلۇقى شىللىق پەردىلىرىنى زەخمىلەندۈرۈپ قويۇشتىن، يۇقۇملىنىشتىن ساقلىنىش. بىمارغا كۆپ گەپ قىلىشتىن ساقلىنىش، ئېغىز ئىچى جاراھىتىنىڭ ئېغىرلاپ كېتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، بۇنداق بولغاندا جاراھەت يۈزىنىڭ ساقلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرگىلى بولىدىغانلىقىنى بىمارغا ئۇقتۇرۇش.

8. بوغۇملاردا كۆرۈلگەندە ئاساسلىقى تىز، ئو-شۇق، جەينەك بوغۇملىرىدا كۆپ كۆرۈلىدۇ، شۇڭا بۇ مەزگىلدە بىمار چوقۇم يېتىپ ئارام ئېلىشى، ئاغرىغان ئورۇننى ئېگىز قىلىش، ھەرىكەتتىن ساقلىنىش، ئەھ-ۋالى تۇراقلىشىپ ئاغرىش پەسەيگەندە يەڭگىل ھەرد-كەت قىلسا بولىدۇ.

9. ئەۋرەت قىسمىغا جاراھەت چىقسا چوقۇم يەر-لىك ئورۇننىڭ پاكىز قۇرغاق بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش، ھەر كۈنى سوۋۇتۇلغان قايناق سۇ بىلەن يەر-لىك ئورۇننى يۇيۇش، جىنسىي مۇناسىۋەتتىن ساقلىنىش، ۋېلىسپىت مىنمەسلىك، ساپ پاختا ئىچ كىيىم كىيىشنى تەكىتلەش. كۆرسەتمە بويىچە سىرتتىن يال-لۇغ قايتۇرغۇچى دورىلار بىلەن ھۆل تېڭىق قىلىش شۇنداقلا جاراھەت يۈزىدىكى ئاجىزلىق ماددىلارنى تازىلاش.

10. سىيىش قىيىنلىشىش ئەھۋالى كۆرۈلگەندە كۆرسەتمە بويىچە ياللۇغ قايتۇرغۇچى دورىلار بىلەن ۋاننىدا ئولتۇرغۇزۇش، (ۋاقتى 20 مىنۇت بولۇش). تاش-قى جىنسىي ئەزانىڭ پاكىزلىقىغا دىققەت قىلىش، چوڭ-كىچىك تەرەتتىن كېيىن چوقۇم يەرلىك ئورۇننى ئەۋرەت يۇيۇش سۇيۇقلۇقى بىلەن يۇيۇش، ئاز-دىن يەرلىك ئورۇنغا موزا تالقىنى سېپىش كېرەك.


11. بىمارغا قارىتا مىزاج خىلىت ئايرىمىسىغا ئاساسەن پىسخولوگىيە پەرۋىشىنى كۈچەيتىش، بۇ خىل بىمارلارنىڭ كېسەللىك جەريانى ئۇزۇن، ئاسان

13. بىمارلارغا قارىتا قەرەللىك قان رايى، جىگەر بۆرەك ئىقتىدارى ئېلىمېنتلار ۋە ئىممۇنىتېت ئىقتىدارىنى تەكشۈرۈپ تۇرۇش شۇنداقلا قەرەللىك تەكشۈرۈشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئۇقتۇرۇش.

14. بىمارغا بالىسىتىن چىقىش ئالدىدىكى يېتەكچىلىكنى ياخشى ئىشلەش، بۇ خىل كېسەللىك پۈتۈن بەدەنلىك ئىممۇنىتېتنىڭ ئاجىزلىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان بولغاچقا، بىمارلارنى بالىسىتىن چىقىش قاندىن كېيىنمۇ ئۆزىنى ئىسسىق ساقلاش، شامالداپ سوغۇق ئۆتكۈزۈۋېلىشتىن ساقلىنىش، ئېغىز بوشلۇقى، تېرە جىنسىي ئەزا ۋە مەقئەتنىڭ تازىلىقىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش، يۇقۇملاندىن ساقلىنىش، بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا كېلىپ قايتا تەكشۈرۈش، ھەمدە مۇۋاپىق بەدەن چېنىقتۇرۇش، ئىممۇنىتېت كۈچىنى ئاشۇرۇشقا ئەھمىيەت بېرىش توغرىسىدا تەشۋىق قاتنى كۈچەيتىش.

قوزغىلىدىغان بولغاچقا، بىمارلاردا كۆپىنچە ئۆزىگە بولغان ئىشەنچىسى سۇسلاپ، روھىي كەيپىياتى ناچار. لىشىپ كېتىدۇ، بۇ ۋاقىتتا سېستىرالار بىمارلارغا كۆپرەك كۆڭۈل بۆلۈش، ئائىلە تاۋابىئاتلىرىنىڭ قوللىشىنى، بولۇپمۇ ھەمراھىنىڭ ماسلىشىشىنى قولغا كەلتۈرۈش، غەم - ئەندىشىسىنى تۈگىتىشكە ياردەم بېرىش. ھەر خىل بېسىمدىن خالىي بولۇش، سەيلە - ساياھەت قىلىشقا دەۋەت قىلىش، كەيپىيات تۇراقلىقىدىن ساقلاش، بىخەتەرلىك تەربىيەسىنى كۈچەيتىش.

12. بىمارغا دورىنى ئۆلچەملىك ئىشلىتىش، داۋالاش تۈرلىرى، داۋالاش جەريانىنى تولۇق تاماملاشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى ئۇقتۇرۇپ، ماسلىشىشىنى قولغا كەلتۈرۈش. دورا بىلەن داۋالاش جەريانىدىكى ئۈنۈم ۋە ئەكس تەسىرىنى ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىش، نورمالسىزلىق كۆرۈلگەندە ۋاقىتتا دوختۇرغا ئۇقتۇرۇپ، قايتىدىن دىياگنوز قويۇشقا ئاساس ئۇچۇر بىلەن تەمىنلەش.



ئەيدىزگە مۇناسىۋەتلىك ئون ئاساسىي

بىلىم ۋە ئون ئالاقىدار ئۇچۇر

* كوندومنىڭ ئەيدىز ۋە جىنسىي كېسەللىكلەر - نىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈنۈمى ھەرگىزمۇ 100% ئەمەس، ئەمما يەنىلا ئىشلەتمىگەندىن كۆپ ياخشى.

* كوندومنى توغرا ئىشلىتىشتىن باشقا ھامىلدارلىقتىن ساقلىنىش ئۇسۇللىرىدا ئەيدىز ۋە جىنسىي كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولمايدۇ.

* ئەر يۇقۇملانغۇچىلارنىڭ ئەيدىزنى ئاياللارغا يۇقتۇرۇش خەۋپى ئاياللارنىڭ ئەرلەرگە يۇقتۇرۇش خەۋپىدىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولىدۇ. ئايال ئەرنىڭ جىنسىي ئالاقىدە كوندوم ئىشلىتىشىنى تەشەببۇسكارلىق بىلەن تەلپ قىلىشقا ھوقۇقلۇق.

6. جىنسىي كېسەللىكنى قانچە بالدۇر داۋالاتسا

(بېشى ئالدىنقى ساندا)

5. كوندومنى توغرا ئىشلىتىش ئارقىلىق ھامىلدارلىقتىن ساقلىنىش بولۇپلا قالماستىن، بەلكى يەنە ئەيدىز ۋە جىنسىي كېسەللىكلەردىن يۇقۇملانۇش خەۋپىنى ئازايتقىلى بولىدۇ.

* سۈپىتى لايىقەتلىك بولغان كوندومنى توغرا ئىشلىتىپ، ھامىلدارلىقتىن ساغلاملىق بولۇپلا قالماستىن، بەلكى يەنە ئەيدىز ۋە جىنسىي كېسەللىكلەردىن يۇقۇملانۇش خەۋپىنىمۇ ئۈنۈملۈك ئازايتقىلى بولىدۇ. ھەر قېتىملىق جىنسىي ئالاقىدە كوندوم ئىشلىتىش زۆرۈر.

ئەيدىز دىن يۇقۇملىنىش خەۋپىنى شۇنچە يېنىكلەتكەنلىكى بولدى.

* جىنسىي كېسەللىك بارلار، جىنسىي كېسەللىك يوقلارغا قارىغاندا ئەيدىز دىن ئاسان يۇقۇملىنىدۇ. كۆپىنچە ئەزاسىدا يىرىڭلىق چۇقۇق، جاراھەت، ياللۇغ بارلار ئەيدىز دىن تېخىمۇ ئاسان يۇقۇملىنىدۇ، ھەمدە ۋىرۇسنى باشقىلارغىمۇ ئاسان يۇقتۇرىدۇ. شۇڭا، تۈر-لۈك كۆپىيىش ئەزاسى ياللۇغلىرىنى تېزلىكتە ساقايەتلىش ئارقىلىقىمۇ ئەيدىز دىن يۇقۇملىنىش ۋە يۇقۇملاندۇرۇش نىسبىتىنى ئازايتقىلى بولىدۇ.

* ناۋادا ئۆزىدە جىنسىي كېسەللىك ياكى كۆپىيىش ئەزاسى ياللۇغى بارلىقىدىن گۇمان قىلسا، ۋاقىتتا ئىناۋەتلىك دوختۇرخانىلارغا ياكى جىنسىي كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاش ئورۇنلىرىغا بېرىپ تەكشۈرتۈش، مەسلىھەت سوراش ۋە داۋالاش لازىم، شۇنداقلا يەنە ئۆزى بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەن كىشىنىمۇ تەكشۈرتۈشكە سەپەرۋەر قىلىش كېرەك.

* قىسمەن ئاياللار جىنسىي كېسەللىك بىلەن يۇقۇملانغاندىن كېيىن روشەن ئالامەت كۆرۈلمەيدۇ، ئاسان بايقىغىلى بولمايدۇ، شۇڭا ئەگەر خەۋپلىك جىنسىي ئالاقىدە بولغان بولسا، ۋاقتىدا دوختۇرخانىغا بېرىپ تەكشۈرتۈش ۋە داۋالاش لازىم.

* ئىشەنچلىك دوختۇرخانىلار رەسمىي، مەخپىيەتلىكنى ساقلىغان ئاساستا تەكشۈرۈش، دىياگنوز قويۇش، داۋالاش ۋە مەسلىھەت بېرىش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەيدۇ. ھەرگىزمۇ سەييارە دورىپۇرۇشلاردا داۋالانماستىن، شۇنداقلا ئۆزى دورا سېتىۋېلىپ، ئىشلەتمەسلىك كېرەك، بولمىسا خاتا دىياگنوز قويۇلۇش، خاتا داۋالاشنىڭ ساقلىنىشى بولمايدۇ، كېسەللىك دەۋرى ئۆزى بىلەن كېتىپ، ئەيدىز دىن يۇقۇملىنىش پۇرسىتى ئېشىپ كېتىدۇ.

* ئۆزىنىڭ ئەيدىز ۋىرۇسىدىن يۇقۇملانغانلىقىدىن گۇمان قىلغاندا، شارائىتى تولۇق داۋالاش ئورۇندىلىرىغا بېرىپ، ئەيدىز ۋىرۇسى ئانتىتېلاسىنى تەكشۈرتۈش ۋە مەسلىھەت سوراش لازىم.

7. ئىشپىرىسىنى ئورتاق ئىشلىتىپ زەھەر چېكىش ئەيدىزنىڭ تارقىلىشىدىكى مۇھىم يول، شۇڭا زەھەر چېكىمەسلىك، ھاياتلىقنى قەدىرلەش لازىم. * زەھەر چېكىش-قانۇنسىز قىلىش، ئۇ زەھەر

چەككۈچىلەرنىڭ ساغلاملىقى ۋە ھاياتىغا ئېغىر زىيان يەتكۈزۈپلا قالماستىن، ئائىلە ۋە جەمئىيەتكىمۇ زىيان ئېلىپ كېلىدۇ.

* زەھەردىن يىراق تۇرغاندا، زەھەر چېكىش سەۋەبىدىن ئەيدىز بىلەن يۇقۇملىنىپ قېلىشتىن زور دەرىجىدە ساقلىنىش بولىدۇ.

* باشقىلار بىلەن ئىشپىرىسىنى ئورتاق ئىشلەتكۈچىلەرنىڭ ئەيدىز بىلەن يۇقۇملىنىش خەۋپى ناھايىتى زور.

* ئىشپىرىسىنى ئورتاق ئىشلەتمەسلىك، پاكىز ياكى دېزىنېفېكسىيە قىلىنغان ئىشپىرىسىنى ئىشلەتمەسلىك، زەھەر چېكىپ ئەيدىز يۇقتۇرۇۋېلىش خەۋپىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ.

* زەھەرنى ئۆكۈل قىلغان كىشى بىلەن جىنسىي ئالاقىدە بولغاندا ئەيدىز ئاسانلا يۇقىدۇ.

8. زۆرۈرىيەتسىز قان سېلىش ۋە ئۆكۈل ئىشلەتمەسلىك ساقلىنىش، ئەيدىز ۋىرۇسى ئانتىتېلاسى تەكشۈرۈشىدىن ئۆتكەن قان ۋە قان مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلىتىش لازىم.

* قانۇن بويىچە ھەقسىز قان تەقدىم قىلىش، قان ھاياتىكەشلىكى ۋە قان سېتىشنى توسۇش، قان تەكشۈرۈشنى كۈچەيتىش-قان ئىشلىتىش بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشنىڭ مۇھىم تەدبىرلىرى.

* قان ۋە قان مەھسۇلاتلىرىنى ئەيدىز ۋىرۇسى ئانتىتېلاسى بويىچە قاتتىق تەكشۈرۈپ، قان ئىشلەتمەسلىك بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش-ئەيدىزنىڭ قان ئېلىش، قان بېرىش يولى ئارقىلىق تارقىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى ئاچقۇچلۇق تەدبىر.

* زۆرۈرىيەتسىز قان سېلىش ۋە ئۆكۈل ئورۇش-تىن ئىمكان بار ساقلىنىپ، قان پىلازمىسى سەپلىمە بۇيۇملىرى ۋە ئۆز بەدەن قېنىنى ئىشلىتىش-بىخەتەر قان ئىشلىتىشتىكى مۇھىم تەدبىرلەرنىڭ بىرى.

* چوقۇم قان سېلىش زۆرۈر بولغاندا، ئەيدىز ۋىرۇسى ئانتىتېلاسى تەكشۈرۈشىدىن ئۆتكەن قان ۋە بىر قېتىملا ئىشلىتىلىدىغان ياكى قاتتىق دېزىنېفېكسىيەلەشتۈرۈلگەن قان سېلىش ئەسۋابلىرىنى ئىشلىتىش لازىم.

* دېزىنېفېكسىيەلەشكە مۇناسىۋەتلىك تۈرلۈك قائىدە-تۈزۈملەرنى قاتتىق ئىجرا قىلىش-ئەيدىزنىڭ قان ئارقىلىق تارقىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىكى

ۋاقتان دۆلەتلەردە تېز سۈرئەتتە يامرىماقتا. مەملىكەت تىمىز دە ئەيدىزنىڭ تارقىلىشى تېز سۈرئەتتە ئۇزاق مۇددەت ئېشىش باسقۇچىغا كىردى.

* ناۋادا ئەيدىزنىڭ تارقىلىشىنى ۋاقتىدا، ئۈنۈم-لىك تىزگىنلەپ قالالمىساق، دۆلەتنىڭ ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا ئېغىر تەسىر يەتكۈزىدۇ.

* ھۆكۈمەت رەھبەرلىكىدىكى، كۆپ تارماقلار ھەمكارلاشقان ۋە پۈتۈن جەمئىيەت ئورتاق قاتناشقان ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە تىزگىنلەش سىستېمىسىنى تۇرغۇزۇپ، ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش، داۋالاش-قا پايدىلىق ئىجتىمائىي مۇھىت شەكىللەندۈرۈش-ئەيدىزنىڭ تارقىلىشىنى تىزگىنلەشتىكى مۇھىم ئۇتۇقلۇق تەجرىبە ھېسابلىنىدۇ.

* مەملىكىتىمىزنىڭ ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش سىياسىتى ئالدىنى ئېلىش ۋە تەشۋىقات-تەربىيەنى ئاساس قىلىدۇ، پۈتۈن جەمئىيەتنى قاتنىشىشقا سەپەرۋەر قىلىپ، ئۈنۈپرسال باش-قۇرۇش، تۈزەشنى ئەمەلىيلەشتۈرىدۇ.

* تەشۋىقات-تەربىيە ۋە خەۋەرلىك قىلمىشلارنى ئۆزگەرتىشتىن ئىبارەت ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش تەدبىرىنىڭ ئۈنۈملۈك ئىكەنلىكى ئىسپاتلاندى.

* ھەربىر ئادەم ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئاساسىي بىلىملىرىنى ئىگىلەپ، خەۋەرلىك قىلمىشلاردىن ساقلىنىپ، ئۆز-ئۆزىنى قوغداش ئېڭىنى كۈچەيتىش-كە ھوقۇقلۇق.

* ھەربىر ئادەم ئۆزى بىلىدىغان ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش بىلىملىرىنى باشقىلارغا سۆزلەپ بېرىشى لازىم.

* ياش-ئۆسمۈرلەرگە ئەيدىز ۋە جىنسىي كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش بىلىملىرىنى تەشۋىق قىلىش، مەكتەپلەردە جىنسىي تەربىيەنى قانات يايدۇرۇش، ياش-ئۆسمۈرلەرنى ئەيدىز، جىنسىي كېسەللىكلەرنىڭ خەۋىرىدىن ساقلاش-ھەربىر ئائىلە، ھەر-بىر مەكتەپ، ھەربىر رايون، شۇنداقلا پۈتۈن جەمئىيەتنىڭ ئورتاق مەسئۇلىيىتى.

ئاپتونوم رايونلۇق ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئىشخانىسى تەمىنلىگەن ماقالە.

راھىلە روزى تەرجىمىسى

مۇھىم ھالقا. بالىلارغا ئالدىنى ئېلىش ۋاكسىنىسى ئەمەلىيەتتە بىر قىتىملا ئىشلىتىلىدىغان ئىشپىرىس ئىشلىتىش. ئەگەر شارائىت يار بەرمىسە، چوقۇم بىر ئادەمگە بىر يىغىنە، بىر نەچچە ئىشلىتىش، ئىشلەتكەن ھامان دېزىنڧىكسىيە قىلىش لازىم.

* داۋالاش خادىملىرى ۋە تۈرلۈك كەسپلەر(رېس-تۇران، مېھمانخانا، مۇنچا، ساتىراچخانا، پەردازخانا، پۇت يۇيۇش ئۆيى قاتارلىق) دىكى مۇلازىمەتچى خادىملار ئىشلەتكەن پىچاق، يىغىنە ۋە تېرىنى ئاسان تېشىدىغان ياكى سۈرۈۋېتىدىغان باشقا ئەسۋابلارنى چوقۇم قاتتىق دېزىنڧىكسىيەلەش لازىم.

9. ئەيدىز بىمارلىرى ۋە ئەيدىز ۋىرۇسىدىن يۇقۇملانغۇچىلارغا غەمخورلۇق قىلىش، ياردەم بېرىش ۋە ئۇلارنى كەمسىتمەسلىك-ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە تىزگىنلەشنىڭ مۇھىم بىر تەرىپى ھېسابلىنىدۇ.

* ئەيدىز بىمارلىرى ۋە يۇقۇملانغۇچىلارنى قاتناشتۇرۇش ۋە ھەمكارلاشتۇرۇش-ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە تىزگىنلەش خىزمىتىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى.

* ئەيدىز بىمارلىرى ۋە يۇقۇملانغۇچىلارنى كەمسىتىش-ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە تىزگىنلەشكە پايدىسىز بولۇپلا قالماستىن، بەلكى يەنە جەمئىيەتتە مۇقىمسىز ئامىللارنى پەيدا قىلىدۇ.

* ئەيدىز ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغۇچىلار كېسەللىكتىن زىيانلانغۇچىلاردۇر، ئۇلار ئىنسانپەرۋەرلەرچە غەمخورلۇق ۋە ياردەمگە ئېرىشىشى لازىم.

* ئائىلە ۋە مەھەللىلەرنىڭ ئەيدىز بىمارلىرى شۇنداقلا يۇقۇملانغۇچىلارغا دوستانە، چۈشىنىش ئاساسىدىكى ساغلام تۇرمۇش ۋە خىزمەت مۇھىتى يارىتىپ بېرىشى، ئۇلارنى ئاكتىپ تۇرمۇش پوزىتسىيىسى تىكلەپ، خەۋەرلىك قىلمىشلىرىنى تۈزىتىشكە ۋە داۋالاشقا ماسلىشىشقا ئىلھاملاندۇرۇشى-بىمارلار ۋە يۇقۇملانغۇچىلارنىڭ ھايات سۈپىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش، ھاياتىنى ئۇزارتىشقا پايدىلىق، شۇنداقلا يەنە ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە تىزگىنلەش خىزمىتى ۋە جەمئىيەتنىڭ مۇقىملىقىنى قوغداشقا پايدىلىق.

10. ئەيدىز ھەربىر كىشى ۋە ھەربىر ئائىلىگە تەھدىت سالماقتا، ئەيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش پۈتۈن جەمئىيەتنىڭ ئورتاق مەسئۇلىيىتى.

* ئەيدىز پۈتۈن دۇنيادا بولۇپمۇ تەرەققىي قىلىدۇ.

يۇقىرى ياغلىق قان كېسىلىنىڭ كىلىنىكىلىق ئىپادىسى قانداق بولىدۇ؟

قاندىكى تىرى گىلىتسىپىرىد ۋە خولېستېرىن مىقدارىمۇ ئاشىدۇ. بىمارنىڭ كۆز قاپقىدا بىر خىل سېرىق رەڭلىك تۈگۈنچە ھاسىل بولىدۇ ياكى قولىنىڭ جەينىكى، پۇت ئۆكچىسىنىڭ يېنى قاتارلىق جايلىرى پۇلتىيىپ چىقىپ قالىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تىز، جەينەك بوغۇمى، كاسا قاتارلىق ئاسان بېسىلىدىغان جايلىرىدا تۈگۈنچىسىمان سېرىق رەڭلىك ئۆسمە پەيدا بولىدۇ. بۇ تىپتىكى بىمارلاردا ئارتېرىيەنىڭ بوتقىسىمان قېتىشى بالدۇرلا كۆرۈلۈپ قالماستىن، يەنە بەزىلىرىنىڭ كۆزىدىمۇ كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

(3) III تىپلىق يۇقىرى ياغلىق قان كېسىلىنىڭ ئالامىتى: بۇ β ياغ ئاقسىللىق قان كېسىلى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. بىمارنىڭ قان شىرىسىدا ئوتتۇرا ھال زىچلىقتىكى ياغ ئاقسىلى بىلەن خىلوس مىكرو دانچىلىرىنىڭ مىقدارى كۆپىيىپ، تىرى گىلىتسىپىرىد بىلەن خولېستېرىن مىقدارى كۆرۈنەرلىك ئاشىدۇ. بىمارلار كۆپ ھاللاردا 30 — 40 ياشلاردا بولۇپ، قولىنىڭ ئاللىقىنى، بارماقلىرىنىڭ قاتلاشقان پۇرمىسىدە يېنىك دەرىجىدىكى بىر خىل سىزىقسىمان ئاپپىلىسىن رەڭلىك دۆڭچە پۇلتىيىپ چىقىدۇ. جەينەك، پۇت، قول، كاسا قىسمىدا بىر خىل ئەسۋىسىمان سېرىق ئۆسمە تۈگۈنچىلىرى بولىدۇ. بىمارلارنىڭ كۆپىنچىسى سېمىز بولۇپ، تاجسىمان ئارتېرىيە ۋە باشقا ئارتېرىيە كېسەللىكلىرى بىرقەدەر بالدۇر كۆرۈلىدۇ.

(4) IV تىپلىق يۇقىرى ياغلىق قان كېسىلىنىڭ كىلىنىكىلىق ئالامىتى: بۇ خىل تىپتىكى بىمارلارنىڭ

يۇقىرى ياغلىق قان كېسىلىنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەبلىرىگە ئاساسەن، ئۇنى بىرلەمچى خاراكتېرلىك ۋە ئىككىلەمچى خاراكتېرلىك دەپ ئايرىيمىز. ئادەتتە بۇ خىل كېسەللىك بەش خىل تىپقا بۆلۈنىدۇ.

(1) I تىپلىق يۇقىرى ياغلىق قان كېسىلىنىڭ كىلىنىكىلىق ئالامىتى: بۇ ئىرسىيەت خاراكتېرلىك بولۇپ، ئاساسەن قان پىلازمىسىدا خىلوس مىكرو دانچىلىرىنىڭ كۆپىيىپ قېتىشى پەيدا قىلىپ، قان مېيىدىكى تىرى گىلىتسىپىرىدنىڭ مىقدارى ئېشىپ كېتىدۇ، خولېستېرىن مىقدارى نورمال ياكى ئازراق ئۆرلەيدۇ. بىمارنىڭ جەينەك، دۈمبە، ساغرا قىسمىغا ئاپپىلىسىن رەڭ ياكى قوڭۇر رەڭدە يىڭنە بېشىدەك ياكى سەرەڭگە ئۈچىدەك چوڭلۇقتىكى دۆڭچە ئەسۋە پەيدا بولۇپ، بۇ ئەسۋىسىمان سېرىق ئۆسمە دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن جىگەر، تال چوڭىيىپ، قورساق ئاغرىيدۇ، ئېغىر بولغاندا كۆرۈش تور پەردىسىدە كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ، ھەتتا ئەمەلىي كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

(2) II تىپلىق يۇقىرى ياغلىق قان كېسىلىنىڭ كىلىنىكىلىق ئالامىتى: بۇ جەمەت خاراكتېرلىك يۇقىرى خولېستېرىنلىق قان كېسىلى بولۇپ، ئىرسىيەت خاراكتېرلىك كېسەللىككە كىرىدۇ. بۇ كېسەللىك II a تىپلىق II b تىپلىق دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. II a تىپلىق بىمارنىڭ قان شىرىسىدا تۆۋەن زىچلىقتىكى قان مېيى كۆپىيىپ، خولېستېرىن مىقدارى ئۆرلەيدۇ، تىرى گىلىتسىپىرىد مىقدارى نورمال ھالەتتە تۇرىدۇ. II b تىپلىق بىمارنىڭ قان شىرىسىدا تۆۋەن زىچلىقتىكى قان مېيى كۆپىيىپ،

كىلىنىكىلىق ئالامىتى: قان شىرىسىدا خىلوس مىكرو دانچىلىرى ۋە ئىنتايىن تۆۋەن زىچلىقتىكى ياغ ئاقسىلىنىڭ مىقدارى ۋە خولېستېرىن بىلەن تىرى گىلىتسېرىدىنڭ مىقدارىمۇ ئېشىپ كېتىدۇ. بۇ تىپتىكى يۇقىرى ياغلىق قان كېسىلى يۇقىرىدا بايان قىلغان Ⅶ تىپلىق، Ⅳ تىپلىقنىڭ ئالامەتلىرىمۇ ھازىرلانغان بولىدۇ. بۇ كېسەللىك كۆپىنچە 20 ياشتىن كېيىن كۆرۈلۈپ، بىمارنىڭ جىگەر، تال قاتارلىق ئەزالىرى چوڭىيىپ قورسىقى ئاغرىيدۇ، بۇنىڭغا ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغنىڭ كىلىنىكىلىق ئالامەتلىرىمۇ قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

قان شىرىسىدا ئوتتۇرا ھال زىچلىقتىكى ياغ ئاقسىلىنىڭ مىقدارى كۆپ بولىدۇ. تىرى گىلىتسېرىدىن مىقدارىمۇ كۆرۈنەرلىك ئاشىدۇ، خولېستېرىن نورمال ياكى ئازراق يۇقىرى بولىدۇ. بىمارنىڭ مۇسكۇل، پەيلىرىدە سېرىق ئۆسمە، تۈگۈنچىسىمان سېرىق ئۆسمە، ئەسە-ۋىسىمان سېرىق ئۆسمە، شۇنىڭدەك قاپاق، يۈز قىسىمدا سېرىق ئۆسمە پەيدا بولىدۇ. كۆرۈش تور پەردىسىدە ئاسانلا كېسەللىك ئۆزگىرىشى كۆرۈلۈپ، تەرەققىياتى بىر قەدەر تېز بولغان ئارتېرىيەنىڭ بوتقىسىدە مان قېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا، بۇ تىپتىكى كېسەللىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغى قاتارلىق كېسەللىكلەرنىمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. Ⅶ تىپلىك يۇقىرى ياغلىق قان كېسەللىكىنىڭ

قان بېسىم دورىسىنى ئازايتىپ توختىتىشتا

ئېھتىيات قىلىش كېرەك

تىشقا بولمايدۇ. ئەگەر كېسەللىك ئەھۋالىدا ئۆزگىرىش بولسا دوختۇر، دورىگەرنىڭ يېتەكچىلىكى ئاستىدا دورىنى ئالماشتۇرۇش لازىم. ئەگەر دورىنى تۈيۈقسىز توختاتقاندا ئۇنىڭ ئالامەتلىرى رېزىنكە توپقا ئوخشاش قاڭقىپ ئەسلىگە كېلىدۇ. بۇنىڭ ئاقىۋىتى ھەتتا دورا ئىچىشتىن ئىلگىرىكىدىنمۇ يامان بولىدۇ، ئېغىر بولغاندا ھاياتقا خەۋپ يېتىدۇ.

قايسى خىل يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرى دو-رىنى ئازايتسا، توختاتسا بولىدۇ مېدىتسىنادا نوپۇزلۇق تارماقلار دورىنى توختىتىش ياكى ئازايتىشقا شارائىتى يار بەرگەن بىمارلارنىڭ تۆۋەندىكى شارائىتلارغا ماس كېلىشى كېرەكلىكىنى ئەسكەرتتى:

● داۋالاش ئارقىلىق قان بېسىمنىڭ تىزگىنلىنىشى كۆڭۈلدىكىدەك بولغان، شۇنداقلا داۋالاش ۋاقتى بىر قەدەر قىسقا بولغانلار (بەش يىل ئىچىدە) دورىنى تەدرىجىي ئازايتىش ياكى توختىتىشنى ئويلاشقا بولىدۇ. ئەگەر دورىنى توختىتىپ بىر يىل ئىچىدە كېسەللىك قايتا قوزغالسا، دورىنى توختىتىشقا بولىدۇ. دورىنى توختىتىش مەزگىلىدە قان بې-

ئادەتتە قان بېسىم بىمارلىرى « ھاۋا ئىسسىغان-دىن كېيىن قان بېسىم دورىلىرىنى ئىچسەم كېسىلىم ياخشى بولۇپ قالغاندەك ھېس قىلىۋاتىمەن، دورىنى توختاتسام بولارمۇ؟ بۇ دورىلارنى قانچىلىك ۋاقىت ئىچسە بىر داۋالاش كۈرسى ھېسابلىنىدۇ؟ دورىنى قانداق ئالماشتۇرۇش كېرەك؟ » دېگەندەك سوئاللارنى سورايدۇ.

نۇرغۇنلىغان كېسەللىكلەر يەنى يۇقىرى قان بېسىم، دىيابېت، يۈرەك رېتىمىسىزلىشىش ۋە روھىي كېسەللىكلەر، شۇنداقلا ئەزا كۆچۈرگەندىن كېيىن يەكلەش رېئاكسىيەسىگە قارشى نۆۋەتتە ھېچقانداق ئالاھىدە ئۈنۈملۈك دورا يوق، پەقەت دورا ئارقىلىق كېسەللىك ئەھۋالىنى كونترول قىلىدۇ، ئۇنى پەقەت يۈزەكى داۋالايدۇ، ھەرگىزمۇ يىلتىزىدىن داۋالمايدۇ. دورا ئىشلەتكەندە ئالامەتلىرىنى يېنىكلىتىدۇ، دورىنى توختاتقان ھامانلا كېسەللىك تەكرار قوزغىلىپ، ئالا-مەتلىرى ئېغىرلىشىدۇ. بۇ تۈردىكى كېسەللىكلەرگە ئۇزاق ۋاقىت دورا ئىچىش، ھەتتا بىر ئۆمۈر دورا ئىچىشكە توغرا كېلىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى ياخشىلانغان بولسىمۇ، ئەمما ئۆز مەيلىچە دورىنى توختى-

رىلار ئازايتىپ توختىتىلىدۇ

ئادەتتىكىچە قىلىپ ئېيتقاندا، قان بېسىمى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلارنىڭ «مىقدارىنى ئازايتىش» تارىدە ئايە قىلىشقا تېگىشلىك ئەڭ ئاساسىي پىرىنسىپ بولسا: «ياش باسقۇچى» غا ئاساسەن، قان بېسىمى ئاز دېگەندە 2 يىلدىن ئارتۇق ۋاقىت بىر مۇۋاپىق سەۋىيەدە ساقلاش، شۇنداقلا تۈزىنى ئاز ئىستېمال قىلىش، تاماكا چەكمەسلىك، ھاراقنى ئاز ئىچىش، چېچەك ئىقىش ۋە بەدەن ئېغىرلىقىنى تىزگىنلەش قاتارلىق تەدبىرلەرنى قوللىنىش. بۇ پىرىنسىپ ئاساسىدا، ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئەھۋالغا قاراپ قان بېسىمىنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلارنىڭ تۈرى ۋە مىقدارىنى ئازايتىش كېرەك. دورا مىقدارى بىر قەدەر كۆپ بولغانلار دورا ئىچكەندىن كېيىن قان بېسىمى نورمال دائىرىگە چۈشكەندە، دورا ئىچىشنى تۈيۈقسىز توختىتىۋەتسە، يۈرەك ھەرىكىتى تېزلىشىپ كېتىش ۋە قاڭقىش خاراكتېرلىك يۇقىرى قان بېسىمى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، قان بېسىمى قىسقا مەزگىل ئىچىدە كەڭ دائىرىدە ئۆرلەيدۇ، ھەتتا داۋالاشتىن ئىلگىرىكى قان بېسىمى سەۋىيەسىدىنمۇ ئېشىپ كېتىدۇ، شۇنداقلا ئۇيۇقسىزلىق، باش قېيىش، باش ئاغرىش، تىترەش، كۆرۈش قۇۋۋىتى غۇۋالىشىش، يۈزى قىزىرىش قاتارلىق ئالاھىدە مەتلەر كۆرۈلىدۇ، ئېغىر بولغاندا مېڭە قان تومۇرلىرى يېرىلىشتىن ئۆلۈش كېلىپچىقىدۇ. شۇڭا، دورا مىقدارىنى «پەلەمپەيسىمان شەكىل» دە تەدرىجىي ئازايتىپ، دورىنى تۈيۈقسىز توختىتىشتىن كېلىپچىقىدەيدىغان قان بېسىمىنىڭ «قاڭقىش» ۋە «دورنى توختىتىش يىغىندى كېسەللىك ئالامىتى» نىڭ كۆرۈلۈشى، خەتەرنىڭ يۈز بېرىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. دورىنى مۇۋاپىق توختىتىشتىكى «پەلەمپەيسىمان شەكىلدە مىقدارىنى ئازايتىش» ئۇسۇلى: دەسلەپتە دورىنىڭ 1/4 قىسمىنى بىر ھەپتە ئىچىش، ئاندىن يەنە 1/4 قىسمىنى بىر ھەپتە ئىچىش؛ ئۈچىنچى قېتىم يەنە 1/4 قىسمىنى بىر ھەپتە ئىچىش؛ ئاخىرىدا 1/4 قىسمىنى 1/2 ھەپتە ئىچىش، ئۆزىنىڭ كونكرېت ئەھۋالىغا ئاساسەن، دورىنى توختىتىش-توختاتماسلىقىنى قارار قىلىش لازىم.

مەرھابا غاپپار تەرجىمىسى

سىمىنى قەرەللىك ھالدا ھەر كۈنى ئىككى ۋاقىت ئۆلچەش، ئەگەر قان بېسىمى سەۋەبسىزلا ئۆزگەرسە، دورىنى داۋاملىق ئىچىش، ئەگەر شىددەت بىلەن ئۆرلىسە، دوختۇرخانىغا ئاپىرىپ داۋالاش كېرەك.

● ئەگەشمە كېسەللىكى بولمىغان يۇقىرى قان بېسىمى بىمارلىرى بىلەن چەكلىنىدۇ. ئەگەشمە كېسەللىك بولسا بۆرەك ئىقتىدارى زەخمىلىنىش، يۈرەك سول دالانچىسى يوغىناش ياكى كۆرۈش تور پەردىسى پاتولوگىيەلىك ئۆزگىرىش قاتارلىقلار.

● يۈرەك قان تومۇر پاتولوگىيەلىك ئۆزگىرىشەننى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئاساسلىق سەۋەبلەر بولمىغان، مەسىلەن: يۈرەك مۇسكۇل تەقلىمىسى، ئەتراپ قان تومۇر كېسەللىكى، دىيابېت ۋە جەمەت خاراكتېرلىك قاندا ماي يۇقىرىلاش كېسەللىكى قاتارلىقلار.

● يۇقىرى قان بېسىمى ئۇزاق ۋاقىت نورمال دالانچىسى (85/135) دە تىزگىنلەنگەن، تاجسىمان ئارتېرىيەلىك يۈرەك كېسەللىكى، بۆرەك كېسەللىكى ۋە دىيابېت بولمىغان يۇقىرى قان بېسىمى بىمارلىرى شۇنداقلا بىر خىللا قان بېسىمىنى چۈشۈرۈش دورىسىنى ئىچكۈچەلەر دورىنى توختىتىپ، تۇرمۇش ئۇسۇلى مۇداخىلەسىنى ئۆزگەرتىپ قان بېسىمىنى تىزگىنلىسە بولىدۇ. تۇرمۇش ئۇسۇلى مۇداخىلەسى تۈزىنىڭ قوبۇل قىلىنىش مىقدارىنى قاتتىق تىزگىنلەش (ھەر كۈنى 6 گىرامدىن تۆۋەن)، ھەر كۈنى ئوكسىگېنلىق ھەرىكەتنى 45 مىنۇت ئىشلەش (ئاستا يۈگۈرۈش، توپ تۈرى ياكى سۇ ئۈزۈش)، شۇنداقلا تاماكا تاشلاش، ھاراق ئىچىشنى تىزگىنلەش قاتارلىقلارنى كۆرسىتىدۇ.

● دورا توختىتىشتىن ئىلگىرى ئۆلتىرا ئاۋازلىق دولقۇندا يۈرەكنى تەكشۈرۈپ، يۈرەكنىڭ ئۆزىدە ھېچقانداق زەخمىلىنىش يوقلۇقى ئېنىقلانغانلار (مەسىلەن: يۈرەك دالانچىسى يوغىناش، يۈرەك قېرىنچە دىۋارى قېلىنلاش قاتارلىقلار).

● «كېسەللىك يىلتىزى» نىڭ كېسەللىك ئالامىتى خاراكتېرلىك يۇقىرى قان بېسىمى ئىكەنلىكى ئېنىقلانغان، ھازىر كېسەللىك يىلتىزى يوقىتىلىپ قان بېسىمى نورماللاشقانلار. مەسىلەن: بۆرەك ئارتېرىيەسى تارىيىش، قالقانبەز ئىقتىدارى كۈچىيىش ۋە ئاشقازان ئاستى بېزى ئارالچە ئۆسمىسىگە گىرىپتار بولغان بىمارلار بىرلەمچى كېسەللىكى ساقايغاندىن كېيىن قان بېسىمى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلارنى توختاتسا بولىدۇ.

قانداق ئەھۋالدا قان بېسىمى تۆۋەنلەتكۈچى دورا

كۈز پەسلدىكى كۈتۈنۈشتە دىققەت قىلىشقا

تېگىشلىك ئىشلار

ئۇخلاپ، سەھەر تۇرۇش، سەھەردە ئورنىدىن تۇرغاندىن كېيىن، تەنھەرىكەت بىلەن شۇغۇللىنىپ بەدەن چېرىنىقتۇرۇش لازىم.

كۈز پەسلدە ھاۋا قۇرغاق، ئەتىگەن ۋە كەچتىكى تېمپېراتۇرا پەرقى بىر قەدەر چوڭ بولۇپ، بىر قىسىم باكتېرىيە، ۋىرۇسلارنىڭ كۆپىيىشى ۋە تارقىلىشىغا پايدىلىق شارائىت ھازىرلىنىدۇ، قۇرغاق چاڭ-توزان، بەزى باكتېرىيە، ۋىرۇسلارنىڭ ھاۋادا ئۇچۇپ يۈرۈشى بىلەن دائىم نەپەس يولى كېسەللىكلىرى تارقىلىدۇ، كۈز پەسل سوزۇلما خاراكتېرلىك كانايچە ياللۇغى ۋە زىققە كېسەلى كۆپ قوزغىلىدىغان مەزگىل، شۇڭا بۇ لۇپمۇ ياشانغانلار بەدەن چېنىقتۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۆزىنى ئىسسىق ساقلاشقا ئەھمىيەت بېرىشى ۋە ئالدىنى ئېلىش خىزمەتلىرىنى ياخشى ئىشلىشى لازىم.

3. كۆڭۈللۈك كەيپىياتنى ساقلاپ، روھىي ھالەتتىكى ئازادە، تىنچ تۇتۇش.

كۈز پەسل بارلىق مەۋجۇداتلار پىشپى يېتىلىدۇ. غان، مول ھوسۇل پەسل؛ ئەمما كۈز پەسل يەنە بارلىق مەۋجۇداتلار بارا-بارا سولۇشقا باشلاپ، خارابىلىشىش ھالىتى كۆرۈلىدىغان پەسل. بۇ مەزگىلدە بولۇپمۇ ياشانغانلارنىڭ كۆڭلىدە ئاسانلا ئاجىز، چۈشكۈن كەيىيات پەيدا بولىدۇ، شۇڭا، روھىي ھالەتنى تەڭشەشكە دىققەت قىلىش، ئۆزىنى بۇ پەسلگە ماسلاشتۇرۇش، كۆڭۈللۈك كەيپىياتنى ساقلاپ، روھىي ھالەتنى ئازادە، تىنچ تۇتۇشقا تىرىشىش لازىم، كېچىلىك ئۇيقۇنىڭ ۋاقتىنى مۇۋاپىق ئۇزارتىش كېرەك؛ دائىم ئائىلىسىدە

تومۇز ئىسسىق ياز پەسلى كېتىپ، سالقىن كۈز پەسلى باشلىنىشى بىلەن تەڭ، كىشىلەرنىڭ ئىشتە-ھاسى، ئۇيقۇسى ۋە روھىي ھالىتىمۇ ياخشىلىنىپ قالىدۇ. ئەمما سالقىن، قۇرغاق كۈز پەسلدە يەنە ھەر قايسى جەھەتلەردىكى كۈتۈنۈشكە ئەھمىيەت بەرمىسەك ئوخشاشلا نۇرغۇن ئاۋارىچىلىكلەرگە دۇچار بولىشىمىز مۇمكىن.

كۈز پەسلدە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار
1. مۇۋاپىق غىزالىنىش، قۇرغاقلىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، مۇئەننەسنى ئاسراش، مۇزەككەرنى قۇۋۋەتلىپ ئۆپكىنى ياشارتىشنى ئاساس قىلىش.

كۈز پەسل ھاۋا سالقىن ھەم قۇرغاق بولغاچقا ئۆپكىگە ئاسان زەرەر يېتىدۇ، شۇڭا، كۈز پەسلدە سۇ-يۇق-سەلەڭ غىزالىنىش، قورۇغان يېمەكلىكلەرنى ئاز ئىستېمال قىلىش، يېڭى مېۋە، كۆكتاتلارنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىپ بېرىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا يېمەكلىك تازىلىقغىمۇ ئالاھىدە ئىتىۋار بېرىپ، تال ۋە ئاشقازاننى ئاسراش، ئىسسىق يېمەكلىكلەرنى كۆپىدە رەك ئىستېمال قىلىپ، سوغۇق يېمەكلىك، سوغۇق ئىچىملىكلەردىن پەرھىز قىلىپ، ئۇچەي ياللۇغى، تولغاق قاتارلىق كېسەللىكلەردىن ساقلىنىش لازىم.

2. ئاكتىپ بەدەن چېنىقتۇرۇپ، بەدەننى كۈچەيتىپ، ساغلاملىقنى ئاسراش.

سالقىن كۈز پەسل دالا تەنھەرىكىتىنىڭ ئالتۇن پەسلى. بۇ مەزگىلدە ياشانغانلارمۇ چوقۇم بەدەن چېرىنىقتۇرۇشنى كۈچەيتىشى لازىم، بۇ كۈز پەسلدە كۈتۈنۈشنىڭ ئەڭ ئاكتىپ ئۇسۇلى. كۈز پەسلدە بالدۇر

مۇھىم ئەزا، ئۇ قان سۇيۇقلۇقىدىكى توكسىننى ۋە ئاقسىل پارچىلانغاندىن كېيىن پەيدا بولىدىغان كېرەكسىز ماددىلارنى سىنتېزلىيىدۇ ھەمدە سۈيىدۈك ئار-قىلىق بەدەننىڭ سىرتىغا چىقىرىدۇ. تەرخىمەك، گىلاس قاتارلىق مېۋە-كۆكتاتلار بۆرەكنىڭ توكسىن ھەيدىشىگە پايدىلىق؛ ئۈچىنچىدىن، ئۈچەينى سىلىقلاپ توكسىن ھەيدەش؛ ئۈچەي تېز سۈرئەتتە توكسىننى ھەيدەپ چىقىرالايدۇ، ئەمما ناۋادا ھەزىم ياخشى بولمىسا، توكسىننىڭ ئۈچەي يولىدا تۇرۇپ قېلىپ، قايتىدىن سۈمۈرۈلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ۋە سالامەتلىككە ئېغىر زىيان ئېلىپ كېلىدۇ، جىن بەرەڭگىسى، قارا مور، لامنارىيە، ئالما، بۆلجۈرگەن، ھەسەل، توپاز-لىق گۈرۈچ (يىرىك گۈرۈچ) قاتارلىق كۆپلىگەن كۆك-تات-مېۋىلەر ھەزىم سىستېمىسىنىڭ توكسىن ھەيدىشىگە ياردەم بېرىدۇ.

ھەرىكەت ئارقىلىق توكسىن ھەيدەش: مۇۋاپىق ھەرىكەت ئادەم بەدنىنىڭ مېتابولىزىمنى تېزلىتىپ، تېرە ۋە ئۆپكەننىڭ توكسىن ھەيدىشىگە ياردەم بېرىدۇ. بىرىنچى پىيادە مېڭىش: بىز ھەركۈنى يول ماڭىمىز، پەقەت يول ماڭغاندا سۈرئەتنى تېزلىتىپ، ئامال بار چوڭ قەدەملەپ، قول سېلىپ ماڭساقلا، مانا مۇشۇنىڭ ئۆزى ئەڭ ئاددىي توكسىن ھەيدەش ھەرىكىتى بولالايدۇ، بۇ ئارقىلىق لىمفانى غىدىقلاپ، خولېستېرول مىقدارىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. ئىككىنچى چېنە-قىش: يۇڭا مەشقى ئالىي دەرىجىلىك توكسىن ھەيدەش ھەرىكىتى بولۇپ، قاننىڭ ئايلىنىشىغا ياردەم بېرىدۇ، بوغۇملارنى سىلىقلايدۇ، بېسىمنى بەدەننىڭ ھەرقايسى ئەزالىرى ۋە مۇسكۇللارغا چىقىرىش ئارقىلىق، بەدەننى ئىچكى، تاشقى جەھەتتىن تەڭشەپ، توكسىن ھەيدەش ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرىدۇ. ئۈچىنچى سەك-رەش: سەكرەش ئارقىلىق لىمفا سىستېمىسىنى غىدىقلاپ توكسىن ھەيدىگىلى، جىددىي كەپپىياتنى بو-شاشتۇرغىلى، خولېستېرولنى تۆۋەنلەتكىلى، قان ئاي-لىنىش ۋە نەپەسنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ، ھەتتا ئادەم بەدنىدىكى جانغا زامىن ھەرەكەتنى توقۇلما ياللۇ-غىنى يوقاتقىلى بولىدۇ.

تەييارلىغۇچى: راھىلە روزى

دىكىلەر ۋە باشقىلار بىلەن پاراڭلىشىپ تۇرۇش ياكى باغچىلاردا سەيلە قىلىش، مۇۋاپىق ھالدا كىنو، تېلې-ۋىزور كۆرۈش ياكى گۈل بېقىش، بېلىق تۇتۇش قاتار-لىق پائالىيەتلەرمۇ تىت-تەتلىقنى تۈگىتىپ، ياخشى روھىي ھالەتنى ساقلاشقا پايدىلىق.

4. مۇۋاپىق كىيىنىش، سوغۇق تەڭگۈزۈۋېلىش-تىن ساقلىنىش.

كۈز پەسلىدە تېمپېراتۇرا تۆۋەنلەپ، ئەتىگەن بىلەن كەچنىڭ تېمپېراتۇرا پەرقى زور بولىدۇ؛ بۇ پەسلەدە بولۇپمۇ ياشانغانلار ئۆزىنى ئىسسىق تۇتۇپ، سوغۇق تەڭگۈزۈۋېلىشتىن ساقلىنىشى لازىم، لېكىن بەك بالا-دۇرلا قېلىن كىيىملەرنى كىيىۋېلىشقا بولمايدۇ، ھاۋانىڭ ئۆزگىرىشىگە قاراپ، پەسلىگە مۇۋاپىق كىيىنىش كېرەك؛

5. كۈز پەسلىدىكى چۈشلۈك ئۇيقۇ ئىلمىي بولۇ-شى كېرەك

ئادەتتە كۈز پەسلى كىرىشى بىلەنلا كىشىنى ئا-سان مۈگدەك باسىدۇ، ئۇخلىغان ۋاقىت ئاز بولمىسە-مۇ، ئەمما كۈندۈزى دائىم ئەسەك تۇتۇپ، كىشىنىڭ ئۇيقۇسى كېلىپلا تۇرىدۇ. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ پىكىر-رىچە، كۈز كىرگەندىمۇ مۇۋاپىق چۈشلۈك ئۇيقۇ بو-لۇشى كېرەككەن، چۈشلۈك ئۇيقۇ يۈرەك-قان تومۇر سىستېمىسىنى راۋانلاشتۇرۇپ، كىشىنىڭ جىددىيلىك دەرىجىسىنى تۆۋەنلىتىشكەن.

6. توكسىن ھەيدەشكە ئەھمىيەت بېرىش
كۈز پەسلىدە كۈتۈنۈشتە چوقۇم توكسىن ھەيدەشكە ئەھمىيەت بېرىش لازىم، توكسىن ھەيدەشنىڭ مۇنداق ئىككى خىل ئۇسۇلى بار.

يېمەكلىك ئارقىلىق توكسىن ھەيدەش: مۇۋاپىق يېمەكلىكلەر ئارقىلىق بەدەندىكى زەھەرلىك ماددىلارنى چىقىرىپ تاشلاش. بىرىنچىدىن، جىگەر ئارقىلىق توكسىننى ھەيدەش: جىگەر ئادەم بەدنىدىكى مۇھىم زەھەر قايتۇرغۇچى ئەزا، بىز كۈندىلىك يېمەك-ئىچ-مىكىمىزدە سەۋزە، سامساق، ئۈزۈم، ئەنجۈر قاتارلىق كۆكتات ۋە مېۋىلەرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش ئار-قىلىق بۆرەكنىڭ توكسىن ھەيدىشىگە ياردەم بېرەلەي-مىز؛ ئىككىنچىدىن، بۆرەكمۇ توكسىن ھەيدەشتىكى

چوڭ ياشتا ئىككىنچى بالىسىنى تۇغقانلار

ئوزۇقلۇققا دىققەت قىلىشى كېرەك

قىزنىڭ ئۆلچەمدىن ئېشىپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بوشلۇق قىسقىراپ، بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ تىزگىنلىنىشىمۇ تەس بولىدۇ، شۇنداقلا ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىكى ئەگەشمە كېسەللىكلەر ۋە ھامىلىدارلىقنى ئاخىرلاشتۇرۇش مۇمكىنچىلىكى كېلىپچىقىدۇ. شۇڭا، ھامىلىدار بولۇشقا تەييارلىق قىلىشتىن بۇرۇن ئوزۇقلۇق مەسىلىسىگە دىققەت قىلىش، بەدەن ئېغىرلىقى ئېشىپ كەتكەنلەر ئوزۇقلۇقنى مۇۋاپىق تىزگىنلەپ ئۆلچەملىك بەدەن ئېغىرلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش، ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ئېشىشى ئۈچۈن يېتەرلىك بوشلۇق قالدۇرۇشى كېرەك.

دۆلىتىمىزدە نۆۋەتتە ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىكى بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ئېشىشىنى تەۋسىيە قىلىش ئۆلچىمى يوق، ئامېرىكىنىڭ ھامىلىدارلىقتىن ئىلگىرىكى بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ كۆرسەتكۈچ ئۆلچىمى (2009-يىللىق نەشرى) دە، ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىكى بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ئېشىش دائىرىسى 12.5-18 كىلوگرام دەپ كۆرسىتىلگەن. ھامىلىدارلىقنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ئارتۇقچە ئېنېرگىيە قوبۇل قىلىشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق؛ شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە دىيابت بار ھامىلىدارلارنىڭ ئوزۇقلۇقتىن قوبۇل قىلىدىغان ئېنېرگىيەسىگە قاتتىق چەك قويۇلىدۇ. كالتسىي ھامىلىدار-تۇغۇتلۇق ئاياللار ئەڭ ئېھتىياجلىق بولىدىغان ئوزۇقلۇق ماددىسى بىرى بولۇپ، ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە كالتسىي تولۇقلىغاندا، ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىكى

دۆلىتىمىز ئىككىنچى بالىنى تۇغۇش سىياسىتىنى قويۇۋەتكەندىن كېيىن، 70 — 80 يىللاردىن كېيىن تۇغۇلغان ئەر-ئاياللاردا ئىككىنچى بالىنى تۇغۇش قىزغىنلىقى كۈچەيدى. بۇلارنىڭ تۇغۇت يېشى بىر ئاز چوڭ بولۇپ، كىلىنىكىدا چوڭ ياشلىق ھامىلىدارلار كۆپىيىپ كەتتى.

چوڭ ياشتىكى ھامىلىدارلار ھەر خىل مەسىلەلەرگە دۇچ كېلىدۇ، مەسىلەن: جىسمانىي كۈچى تۆۋەنلەش، تۇخۇمنىڭ سۈپىتى تۆۋەنلەش، ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىكى تاسادىپىيلىقلارنىڭ كۆپىيىشى شۇنداقلا تۇغۇت جەريانىدىكى ئۆتكەلەر قاتارلىقلار. شۇڭا، ھامىلىدارلىقتىن ئىلگىرىكى تەييارلىقلارنى مۇددەتتىن بۇرۇن قىلىش، ھامىلىدارلىقتىن ئىلگىرىكى ۋە ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىكى بەدەن تەكشۈرۈشكە دىققەت قىلىش، مۇۋاپىق بولغان تۇغۇت لايىھەسىنى تاللاشقا توغرا كېلىدۇ، ئەمما سەل قاراشقا بولمايدىغانى يەنىلا ھامىلىدارلىق مەزگىلىدىكى ئوزۇقلۇق مەسىلىسى.

بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ئۆزگىرىشى ئوزۇقلۇق ئەھۋالىنىڭ ئىپادىلىنىشىدىكى ئەڭ ئاددىي، بىۋاسىتە كۆرسەتكۈچلەرنىڭ بىرى. چۈنكى ئالدىنقى قېتىملىق ھامىلىدارلىقتا بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ تىزگىنلىنىشىنىڭ كۆڭۈلدىكىدەك بولماسلىقى، تۇغۇتتىن كېيىن بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ شۇ پېتى توختاپ قېلىشى ياكى ئىككى قېتىملىق تۇغۇت ئارىلىقىنىڭ قىسقا بولۇشى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسى ئاياللارنىڭ ئىككىنچى قېتىم ھامىلىدار بولۇشتىن ئىلگىرى بەدەن ئېغىرلىقى

دىغان بولغاچقا، ئاز-ئازدىن كۆپ قېتىم ئوزۇقلۇق-نىش، قەرەللىك ۋاقىتتا بەلگىلىك مىقداردا ئوزۇقلۇق-نىش ۋە ماس كېلىدىغان ئوزۇقلۇقلارنى تاللاش ئاساسىي تەلەپ قىلىنىدۇ.

يۇقىرىقىلارنى يىغىنچاقلىغاندا، چوڭ ياشتىكى ھامىلىدارلارمۇ «ئۆلگە قايتىش» پىسخىك ھالىتىنى ھازىرلاپ، دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەپ، دوختۇرخانا بېكىتكەن تۇغۇت تەكشۈرۈش پىلانغا ئاساسەن ھامىلىدارلىقنىڭ ئالدى-كەينىدە ساقلىق ساقلاشقا ئەھمىيەت بېرىشى، ئۆزىگە تەمىنەنە قويۇپ ئۆزىنىڭ تەجرىبىسىگە ئاساسلىنىپ ئىش كۆرمەسلىك لازىم، ئەگەر دوختۇرخانىڭ پىكىرىگە قۇلاق سالمايدىغاندا ئۆزىنىڭ بەدىنىگە ئېلىپ كېلىدىغان خەۋپ ھەتتا «چوڭ ياش+ئىككىنچى بالا» دىنىمۇ چوڭ بولىدۇ.

مەرھابا غاپپار تەرجىمىسى

قىسقىراش بېسىمى، كېڭىيىش بېسىمى ۋە تۇتقاقلىق-نىڭ يۈز بېرىش نىسبىتىنى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلەتكۈچى بولىدۇ. كالتسىي تولۇقلاشتا ئاساسلىق سۈت مەھسۇلاتلىرىدىن قوبۇل قىلىش، زۆرۈر بولغاندا مۇۋاپىق مىقداردا كالتسىي ياسالمايلىرىنى ئىچىش، تۆمۈر كەملىكتىن بولغان قان ئازلىقىنىڭ ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە قوزغىلىش نىسبىتى ئىزچىل يۇقىرى بولسا، بۇنىڭغا تۆمۈرنى مىقداردىن ئاشۇرۇپ تولۇقلۇق ماسلىق، ئوزۇقلۇق ئارقىلىق تولۇقلاشنى ئاساس قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. يېمەكلىكلەردىكى يوپۇرماق كىسلاتاسىنىڭ پايدىلىنىش نىسبىتى بىر قەدەر تۆۋەن بولۇپ، ھامىلىدارلىقتىن ئىلگىرى ۋە ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە ھەر كۈنى 400 مىللىگرام تولۇقلىغاندا، نېرۋا كانىلى كەمتۈكلۈكنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ياردەم بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، ھامىلىدارلاردا ئاسانلا «تېز سۈرئەتتە قورسقى ئېچىش» ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ.

ئوخشىمىغان ياش قاتلامدىكى بالىلارنىڭ

زۇكامداپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش

ئۇسۇلىمۇ ئوخشىمايدۇ

قېلىشى مۇمكىن. ئۈچ ئايلىقتىن چوڭ بالىلارغا قوشۇمچە يېمەكلىكلەرنى بېرىش كېرەك. ئەمچەكتىن ئايرىلمىغان ئەھۋالدا زۇكام بولۇپ قالسا، ۋاقىتنىچە ئازراق ئەمدۈرۈش، سۇيۇق ياكى يۇمشاق يېمەكلىكلەر-نى كۆپرەك بېرىپ، كېسەلگە قارشى كۈچىنى ئاشۇرۇش كېرەك.

ئىككى ياشتىن ئۈچ ياشقىچە بولغان بالىلارغا قايناق سۈنى كۆپرەك ئىچۈرۈش، ئۆينىڭ ھاۋاسىنى ئالماشتۇرۇپ تۇرۇش كېرەك. بۇ ياشتىكى بالىلارنىڭ كۆپىنچىسى ۋىرۇسلۇق زۇكام بولىدۇ. شۇڭا بالا زۇكام بولۇپ قالارمىكەن دەپ ئىشىك-دەرىزىلەرنى ئاچمى-

تېببىي مۇتەخەسسسلەرنىڭ كۆرسىتىشىچە، ئوخشىمىغان ياش قاتلامدىكى بالىلارنىڭ زۇكامداپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۇسۇلىمۇ ئوخشىمايدۇ.

ئۆل ياشتىن بىر ياشقىچە بولغان بالىلارغا سۇيۇق ۋە يۇمشاق يېمەكلىكلەرنى بېرىش كېرەك. چۈنكى بۇ ۋاقلارنىڭ يۇقىرىقى نەپەس يولى تولۇق يېتىلىپ بولالمىغاچقا، ئىممۇنىتېت كۈچىمۇ ئاجىز بولىدۇ. ئەگەر بالىنىڭ ھالىدىن ياخشى خەۋەر ئېلىنمىسا ياكى كىلىمات ئۆزگىرىشنىڭ ۋە ناچار مۇھىتنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىسا، يۇقىرىقى نەپەس يولى ياللۇغلىنىپ

بولغاچقا، ئاسان تەرلەيدۇ. يېمەك - ئىچمەك جەھەتتە قايىناق سۇنى كۆپرەك بەرگەندىن سىرت، سوغۇق يېمەك - ئىچمەكلىكلەرنى بەرمەسلىك، كۆكتات قاتارلىق يې - مەكلىكلەرنى كۆپرەك يېگۈزۈپ ئوزۇقلۇق تولۇقلاش كېرەك. قىزىتمىسى ئۆرلەپ قالغاندا ياتقۇزۇپ ئارام ئالدۇرۇش، ئىسسىقراق ساقلاش كېرەك.

بۇنىڭدىن سىرت، يەسلىگە، ئوقۇشقا كىرگەن بالىلاردا بىر - بىرىدىن يۇقۇملىنىش ئەھۋالى كۆپرەك كۆرۈلىدۇ، شۇڭا سىنىپنىڭ ھاۋاسىنى كۆپرەك ئال - ماستۇرۇپ، ھاۋانى ساپلاشتۇرۇش كېرەك.

غاندا، ۋىرۇس تېخىمۇ كۆپىيىپ، بالا ئاسان زۇكام بو - لۇپ قالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ھەرىكەتنى ئازايتىش كېرەك، تېنى ئاجىزراق بالىلارنى شۇ مەز - گىلدە ھاۋاسى ئالماشمايدىغان ئاممىۋى سورۇنلار (تاللا بازىرى، سودا سارىيى، كىنو - تىياتىر دېگەندەك) غا ئازراق ئاپىرىش، ئاپارغان تەقدىردىمۇ قايتىپ كې - لىپلا قوللىنىپ پاكىز يۇيۇش، زۇكام بولۇپ قالغانلار بى - لەن ئۇچراشتۇرماستىن كېرەك.

ئۈچ ياشتىن يەتتە ياشقىچە بولغان بالىلارغا كۆپ - رەك كۆكتات يېگۈزۈش ۋە مۇۋاپىق كىيىندۈرۈش كې - رەك. بۇ ياشتىكى بالىلارنىڭ ئادەتتە ھەرىكىتى كۆپ

بالىلار چىشىنىڭ رەتسىز ئۆسۈپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ

چىقىرىدىغان ئامىللار قايسىلار؟

رەتلىك ئۆسۈشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ.

3. ئاستىنقى كالىپۇكىنى چىشلەش. ئادەتتە 5 - 6

ياشتىن ئاشقاندىن كېيىن، بالىلارنىڭ كەيپىياتى دا - ئىم ياخشى بولماسلىق، تەشۋىشلىنىش سەۋەبىدىن كالىپۇكىنى چىشلەش ھالىتى ئارقىلىق، غەمكىنلىك - نى ئىپادىلەيدۇ. بۇ خىل مۇۋاپىق بولمىغان كالىپۇك چىشلەش چىشىنىڭ كۆركەملىكىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ ھەم ئاستىنقى كالىپۇكتا ھۆل تەمرەتكە پەيدا قىلىدۇ.

4. نەرسىلەرنى قالايمىقان چىشلەش ئادىتى. چىش

چىقىش مەزگىلىدە بالىلاردا دائىم ھېس - تۇيغۇ بول - دۇ. شۇنىڭ بىلەن سوسكىسىنىڭ ئۈچىنى چىشلەش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ. چوڭراق ياشتىكى بالىلاردا يوتقان، ياستۇقلارنىڭ بۇرجەكلىرىنى، بىگىز بارمىقىنى چىش - لەيدىغان، مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان بالىلاردا قېرىنداش، سىزغۇچىلارنى چىشلەيدىغان ئەھۋال كۆپ كۆرۈلىدۇ. بۇ ئامىللار ئۇزاق مۇددەت داۋاملاشسا، چىشىنىڭ رە - تلىك ئۆسۈشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ.

بىر قىسىم ئاتا - ئانىلار بالىلىرىنىڭ چىشىنىڭ رەتسىز ئۆسۈۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، بۇنىڭ بالىلارنىڭ چىرايى شەكلىگە تەسىر يەتكۈزۈشىدىن ئەنسىرەيدۇ ھەمدە بۇنىڭ سەۋەبىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلىشكە قىزىقىدۇ. ئۇنداقتا بالىلارنىڭ چىشىنىڭ رەتسىز ئۆسۈشىگە قايسى ئامىللار تەسىر يەتكۈزىدۇ؟

1. بارمىقىنى شۇراش. بەزى بوۋاقلار تۇغۇلۇپ ئۇزاق ئۆتمەيلا بارمىقىنى شۇرايدۇ. بۇ ئۈستۈنكى چى - شنىڭ سىرتقا قاراپ يۆتكىلىشى، ئاستىنقى چىش - نىڭ ئىچىگە قاراپ يۆتكىلىشىنى پەيدا قىلىپ، چىش - نىڭ رەتسىز بولۇپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

2. تىلىنى ئويناش. سۈت چىشى بىلەن ئۆمۈرلۈك چىشى ئالمىشىدىغان مەزگىلدە سۈت چىشىنىڭ بو - شاپ، ئۆمۈرلۈك چىشىنىڭ چىقىشى ياكى قالدۇق يى - تىزىنىڭ ساقلىنىپ قېلىشى سەۋەبلىك بالىلاردا ھە - دىدىن زىيادە سەزگۈرلۈك پەيدا بولۇپ، دائىم تىلى بى - لەن چىشى چىقىدىغان ئورۇننى يالايدۇ. ۋاقىت ئۇزار - غانسېرى تىل ئويناش ئادىتى شەكىللىنىپ، چىشىنىڭ

شىنجاڭ كۆكنۇر يۇقىرى تېخنىكا ئېچىش ھەسسىدارلىق شىركىتى

سۇلات ئىشلەپچىقىرىش يولىنى تۇتۇپ، ھەر يىلى ئىككىدىن تۆتكىچە يېڭى مەھسۇلاتنى بازارغا سالدى. يۇقىرى پەن - تېخنىكىدىن پايدىلىنىپ، ئىلغار مەدەنىي مىراسلىرىمىزنى ئېچىپ ۋە تەرەققىي قىلدۇرۇپ، بازار ئىگىلىكى شارائىتىدا ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت مىراسلىرىمىزنىڭ ھاياتىي كۈچىنى ئاشۇرۇشنى ئۆزىگە مىزان قىلدى. ئىلغار پەن - تېخنىكا ۋە باشقۇرۇش ئۇسۇللىرىنى قوللىنىپ، مەھسۇلاتنى سان ۋە سۈپەت جەھەتتىن تېخىمۇ ياخشىلاشقا قان - تەرەققىي قىلدۇردى. مىللىي مەدەنىيەتنى تاۋارلاشتۇرۇش، ئۇيغۇر تېبابەت دورا - دەرەخلىرىنى پائال ئېچىش ۋە زامانىۋىلاشتۇرۇش، يېمەكلىك، دورا، تۇرمۇش بۇيۇملىرى، ئىچىملىكلىرىنى تەتقىق قىلىپ ئىشلەپ، يەرلىك مەھسۇلاتلار ئەۋزەللىكىنى زامانىۋى تېخنىكا بىلەن بىرلەشتۈرۈش ئارقىلىق رىقابەت كۈچىنى كۈچەيتىپ، بۈگۈنكى كۈندە مۇنتىزىم، سىستېمىلاشقان، بەلگىلىك ئىختىساسلىقلار قوشۇنغا ئىگە، ياسالما تەجرىبىخانىسى، دورا شەكلى تەجرىبىخانىسى، كىلىنىكا تەجرىبىخانىسى قاتارلىق ئون نەچچە تۈرلۈك تەجرىبىخانىسى، ھەم كارلاشقۇچى تەجرىبىخانىسى بولغان زامانىۋى كارخاناغا ئايلاندى. نۆۋەتتە، شىركەت ئىشلەپچىقىرىپ با-زارغا سالغان ئۇيغۇر تېبابەت مەھسۇلاتلىرى 40 خىلدىن ئېشىپ، ئىستېمالچىلارنىڭ ياقتۇرۇپ ئىستېمال قىلىشىغا مۇيەسسەر بولۇپ كەلمەكتە.

شىنجاڭ كۆكنۇر يۇقىرى تېخنىكا ئېچىش ھەسسىدارلىق شىركىتى ئىلغار تېخنىكىلارنى كىرگۈزۈش، ئېچىش ۋە بۇ تېخنىكىلارنىڭ ياردىمىدە ئىشلەپچىقىرىلغان ئەلا مەھسۇلاتلارنى تاۋارلاشتۇرۇش؛ ھاياتىي كۈچكە ئىگە يەرلىك مەھسۇلاتلارنى، ئېسىل مەدەنىيەت ئەنئەنىلىرىمىزنى زامانىۋى سۈپەتكە ئىگە قىلىش؛ مىللىي قىممەت قاراشلىرىمىزنى ئىلغار تېخنىكا بىلەن ئىسمى - جىسمىغا لايىق ھەققىي مەھسۇلاتقا ئايلاندۇرۇش ئارقىلىق بەلگىلىك ئىقتىسادىي ئۈنۈم يارىتىشنى مەقسەت قىلغان شەخسلەر ئىگەلىكىدىكى ئىقتىسادىي كارخانا.

شىركىتىمىز دەسلەپتە ئۇيغۇر تېبابىتىنى تۇتقا قىلىش ۋە ئۇيغۇر تېبابەت مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلغان تەتقىقاتلار جەريانىدا ئۇزاق مۇددەتلىك جاپالىق تەييارلىق جەريانىمىزنى بېسىپ ئۆتۈپ، 2005 - يىلى نورۇزدا رەسمىي قۇرۇلدى ۋە شۇ يىلى 8 - ئاينىڭ ئاخىرى دورىگەرلىك ساھەسىدە 1995 - يىلىدىن بۇيان قوللىنىپ كېلىۋاتقان كۆپۈكلەنمە تابىلىت تېخنىكىسىنى قوللىنىپ، ئۇيغۇر تېبابەت دورا ئۆسۈملۈكلىرى ئاساسىدا ئۇيغۇر تېبابەت دورىگەرلىكىنىڭ تۈنجى كۆپۈكلەنمە تابىلىتى - جانلا - لە ياللۇغ قايتۇرۇش تابىلىتىنى بازارغا سالدى.

يۇقىرى تېخنىكا شىركىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن شىركەت تەتقىقات سېلىنىمىنى ئۈزۈكسىز ئاشۇرۇپ، ئىزچىل ھالدا مۇستەقىل ۋە خاس بولغان مەھ-

كۆرۈشىدۇ.

مەلۇمكى، خەلقىمىز چارۋىچىلىق ۋە يېرىم چار-
ۋىچىلىق ھاياتلىرىدا، ئوۋچىلىق قانۇنىيەتلىرىنى
ئىگىلەش جەريانلىرىدا تۈرلۈك جانىۋارلارنىڭ يەملى-
رى، ئىسسىق، سوغۇق، ھۆل، قۇرۇق كەيپىياتلارنىڭ
ھاياتلىققا كۆرسىتىدىغان تەسىرلىرىنى ئىگىلەپلا
قالماي، بەلكى ھاياتلىق مېخانىزىملىرى ۋە جانلىقلار
ئۆزۈقلىرىنىڭ ھاياتلىققا بولغان تەسىرلىرىنى بايقاپ
خاتىرىلىدى ۋە ئۇنى كىشىلىك ساقلىقنى قولغا كەل-
تۈرۈشكە تەتبىقلىدى. دۇنياۋى بۈيۈك ئالىملىرىمىز -
دىن فارابى، ئىبن سىنا، مەنسۇر بىننى مۇھەممەد بىن -
نى ئەھمەد، ئىساق ئوغلى مۇرات، ھاجى پاشا، ھەكىم
سۇلتان ئېلى، پولاتبېك ئىبنى مۇراتبېك ئوغلى،
ئەجمەلخان قاتارلىقلارنىڭ قولىدا تېخىمۇ يۈكسەك دە -
رىجىگە كۆتۈرۈلۈپ ۋە بېيىپ، 81 - ئەسىرگىچە دۇنيا
تېبابەت ساھەسىدە يۈكسەك ئۈستۈنلۈكنى ئىگىلەپ
كەلدى.


شىركەت نۆۋەتتە تەتقىقات بىلەن مائارىپنى
ماسلاشتۇرۇش، ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ نەزەرىيەۋى
مۇستەقىللىقىنى ساقلاش، ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ زامان -
نىۋىلىق بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ياخشى بىر تەرەپ
قىلىش ئۈستىدە پائال ئىزدىنىش بىلەن بىللە، سىس -
تېمىلاشقان ئۇيغۇر تېبابىتى دوختۇرخانىسى قۇرۇپ،
ئۇيغۇر تېبابىتىنىڭ زامانىۋىلىشىشى، ساغلام تەرەق -
قى قىلىشى ئۈچۈن ئاكتىپ تۆھپىلەرنى قوشۇپ،
بەلگىلەنگەن پىلان ۋە لايىھەلەر بويىچە ئۆز فۇنكسىيە -
سىنى جارى قىلدۇرۇۋاتىدۇ. كىشىلىرىمىزنىڭ جىس -
مانىي ساغلاملىقىغا كۆڭۈل بۆلۈشنى ئۆزىنىڭ تۈپ
مىزانى قىلغان شىنجاڭ كۆكنۇر يۇقىرى تېخنىكا
ئېچىش ھەسسىدارلىق شىركىتى مەنئى ساغلاملىققا
كۆڭۈل بۆلۈشنىمۇ ئۆزىنىڭ بىر تۈرلۈك مۇھىم بۇر -
چى دەپ بىلىپ، خەلقىمىزنىڭ مەنئىيىتىنى يورۇت -
قۇچى چىراغ بولالايدىغان، تەپەككۈرنى ئاچالايدىغان
بىر تۈركۈم دۇنياۋى پەلسەپە، پىسخولوگىيە، تېبابەت
ئەسەرلىرىنىڭ ئۇيغۇر تىلىدىكى تەرجىمىسىنى روياپ -
قا چىقىرىشنى شىركەتنىڭ پىلانغا كىرگۈزۈپ، بۇ
ھەقتىكى ئالاقىدار خىزمەتلەرنى ئىشلىمەكتە.

شىنجاڭ كۆكنۇر يۇقىرى تېخنىكا ئېچىش ھەس -
سىدارلىق شىركىتى سەرخىل ئىختىساسلىقلار قوشۇ -
نىنىڭ رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، ئۇيغۇر تېبا -
بىتىنىڭ ماددىي مىراسلىرى ۋە جەۋھەرلىرىنى تەرەق -
قى قىلدۇرۇش بىلەنلا توختاپ قالماي، ئۇيغۇر تېبا -
بىتىنىڭ مەنئى مىراسلىرىنى يورۇقلۇققا چىقىرىش -
نىمۇ شىركەت خىزمىتىنىڭ مۇھىم بىر كۈنتەرتىپىدە -
گە كىرگۈزۈپ، بۇ جەھەتتە بىر قاتار ئەمەلىي خىزمەت -
لەرنى ئىشلىدى.

شىركەتتىكى ئىختىساسلىقلار قوشۇنىنىڭ ئور -
تاق كۈچ چىقىرىشى ۋە تىرىشچانلىقى، شىركەتنىڭ
ئىقتىسادىي جەھەتتە مەبلەغ سېلىشى بىلەن ئۇيغۇر
تېبابىتىنىڭ نەزەرىيەۋى ئاساسى ۋە داۋالاش ئۇسۇل -
لىرىنىڭ تۈرگۈزۈلۈشى ئۈچۈن زور تەسىر كۆرسەتكەن
دۇنياغا داڭلىق ھەكىم، پەيلاسوپ، ئالىم ئەبۇ ئەلى
ئىبن سىنانىڭ «تېبابەت قانۇنى» ناملىق زور ھەجىم -
لىك ۋەكىللىك ئەسىرىنىڭ ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تى -
لىدىكى تەرجىمىسىنى شىنجاڭ خەلق سەھىيە نەشىرد -
ياتى تەرىپىدىن نەشر قىلىپ تارقاتتى. شىركەت خا -
دىملىرىنىڭ تەتقىقات نەتىجىلىرىنىڭ مېۋىسى بولغان
«ئۇيغۇر تېبابىتى پەلسەپەسى» ناملىق چوڭ ھەجىملىك
ئەسەر شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تېبا -
بەت كەسپى تولۇق كۇرس ئوقۇغۇچىلىرى ئۈچۈن
مەخسۇس دەرسلىك قىلىپ ئىشلىتىلىش ئالدىدا تۈر -
ماقتا ھەم بۇ ئەسەر پات يېقىندا نەشىردىن چىقىپ، كەڭ
جامائەتچىلىك بىلەن يۈز كۆرۈشكۈسى.

شىركەت خادىملىرى يەنە ھازىرغىچە يورۇقلۇققا
چىقىمىغان كىلاسسىك ئەسەرلەرنى يورۇقلۇققا چىقىد -
رىش خىزمىتىنىمۇ يۇقىرىقى ئىلمىي خىزمەتلەرگە
ماسلاشتۇرغان ھالدا ئىشلەپ، 61، -، 71 - ئەسىرلەردە
قەشقەردە ياشاپ ئۆتكەن، ھازىرغىچە نام - شەرىپى ۋە
ئەسەرلىرى بىزگە تېخى نامەلۇم بولغان بۈيۈك ئالىم
ئەلى بەگ مۇراتبەگ ئوغلىنىڭ «تېببىي ئەغراز» نام -
لىق ئىلمىي ئەسىرىنى نەشىرگە تەييارلىدى. بۇ كىتاب -
مۇ يېقىندا نەشر قىلىنىپ، جامائەتچىلىك بىلەن يۈز


تەپتى جۇشنىڭ بۇيرۇلۇشى



بۇ مەھسۇلات تەبىئىي ئاجىز كىشىنىڭ بۇلجۇڭ گۆشلىرىنى ئاغرىتىپ بوزەك قىلىۋالغاچقا، ئۇنى يې-
يىشتىن بۇرۇن 51 كۈن ئەتراپىدا كالتىسى تابلېتى
يەپ بەدەننىڭ تەبىئىي كۆتۈرۈپ، ئاندىن بۇ مە-
سۇلاتنى ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ناۋادا بۇنداق
قىلماي بۇلجۇڭ گۆشلىرى ئاغرىپ كەتكەن بولسا كۆپچى
ياكى قارىئورۇك قاينىتىپ ئىچىش، سۈتۈ ئىچىش
تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

1. مەنىي تۇتۇش قۇۋۋىتىنى ئاشۇرۇشقا تەپتىجۇش
بېرىلىدۇ. بۇنىڭغا كۆپچى قوشۇپ بېرىلسە تېخىمۇ
ياخشى بولىدۇ.
2. كۆپ ئېھتىلام بولۇشقا تەپتىجۇش كۆپچى بى-
لەن بىللە بېرىلىدۇ.

مەزى بېزى ئامپۇلنىڭ بۇيرۇلۇشى



1. دوۋسۇن يارسىغا، ئۇرۇقدان ياللۇغىغا، مەزى
بېزى ئامپۇلى قەلەمپۇر مېيى بىلەن بىللە بېرىلىدۇ.
بۇنىڭدا دورا ئىشلىتىشتىن يەتتە كۈن بۇرۇن ئۇدا يەل
كەسكە يەۋىتىش تېخىمۇ مەنپەئەتلىك.
2. مەزى بېزى ياللۇغىغا ئىشلىتىلىدۇ. قەلەمپۇر
مېيى بىلەن بىللە ئىشلىتىلسە ئۈنۈمى يۇقىرى بولىدۇ.
بەدەن 51 كۈن يەل كەسكە تازىلىنىپ، ئاندىن
ئىشلىتىلسە تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

چۈچۈك شېكرى



بوۋاقلاردىكى سېرىقلىقنى ئالىدۇ، چۈچۈكنى
ھەيدەيدۇ، قان كۆپەيتىپ ماغدۇر پەيدا قىلىدۇ، ئۇس-
سۈزلۈكنى باسىدۇ. يەڭگىگەن ئاننىڭ سوغۇق تەرلە-
شى ۋە قەۋزىيەتكە مەنپەئەت قىلىدۇ. تېنى ئاجىز كە-
شىلەرنىڭ ئىچىنى يېنىك ھەيدەشكە بەك ماس كېلە-
دۇ.

شېپايى يۆتەلنىڭ بۇيرۇلۇشى

1. ئادەتتىكى يۆتەلگە بېرىلىدۇ.
2. بەلغەم يوق، كېچىلىرى ئۇيقۇدىن كېيىن
ئېغىرلىشىپ قالدىغان، باش ۋە چېكىلىرى ئاغرىپ
قىزىشىدىغان يۆتەلگە دەسلەپ ئىككى كۈن سازقان
ئىچۈرۈۋېتىپ، ئاندىن شېپايى يۆتەل بىلەن تەرياقى
زۇكام بېرىلىدۇ.
3. يۆتەل بىلەن شىلىمشىق بەلغەم چىقىدىغان،
كۆكرەكتە خىرقىراش، نەپەس قىسىلىش بار يۆتەلگە



تىمدۇ؛ ئاشقازان ئاستى بېزىدىكى چاتاقنى ئوڭشاشقا كۈچەيدۇ، ئاشقازان ئاستى بېزى سۈيۈقلۈقنىڭ سان ۋە سۈپىتىنى ئۆستۈرىدۇ.

ئۆزگىچە داۋا- بوزۇغا مېيى

مىجەزنىڭ سوغۇقلىشىپ كېتىشىدىن بولغان بارلىق ساقسىزلىقلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ؛ بالىلار ۋە بوۋاقلارنىڭ ئۆپكەسى گىزىلداپ قىلىشقا مەنپەئەت قىلىدۇ؛ بويۇندىكى قالقانبەز ئىششىقغا ئىشلىتىلىدۇ؛ كۆزنىڭ مۇڭگۈز پەردە ياللۇغىغا مەنپەئەت قىلىدۇ؛ ياز ۋە كۈز پەسلىدە بەكرەك قوزغىلىدىغان قاپارە- مىلىق ئانگىنا (بادامبەز ياللۇغى) غا ئوبدان مەنپەئەت قىلىدۇ؛ گالغا تېمىتىلسا ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ؛ قوزغالسا بويۇن ۋە قۇلاق ئارقىسىدىكى لىمفا تۈگۈ- نى يوغىناپ قالىدىغان، بەزىدە ئۈنۈمىگە قوشۇلۇپ ئاش- قازان - ئۈچەي ساقسىزلىقى كۆرۈلىدىغان، قىزىپ گال ئاغرىپ، گال ئىچى ئەتراپى تومۇرلىرىغا قان تولۇۋال- دىغان، كۆز سانجىلىپ ئاغرىيدىغان، يۇتقۇنچاق بىرىك- مە پەردە ئىسسىقلىقىغا مەنپەئەت قىلىدۇ؛ گالغا تېمى- تىلسا ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ؛ تېرە گەتراپىد- كى ئۆسمىلەرگە سۈرتۈلسە پايدىسى بولىدۇ؛ ئەرلەر بەل ۋە ئۇرۇقدان قىسمىغا سۈرۈپ بەرسە باھنى قۇۋۋەت- لەيدۇ.

شىپايى يۆتەل شىپايى نەپەس بىلەن بىللە بېرىلىدۇ. ئۈچ كۈن بۇرۇن ئۇدا يەل كەسكە بىلەن ئىچىپ، ئاندىن بۇ دورىلارنى باشلىسا تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

4. كۆكۈتەلگە شىپايى يۆتەل شىپايى زەمەم بە- لەن بىللە بېرىلىدۇ. ۋە خام سامساقىتىن بىر چىشنى يۇمشاق سوقۇپ ئىككى ۋاق بىللە ئىچىدۇ.

5. زۇكام بىلەن بىللە كەلگەن يۆتەلگە شىپايى يۆ- تەل بىلەن تەرياقى زۇكام بىللە بېرىلىدۇ.

6. چوڭقۇر يەردىن كېلىۋاتقان كالتە يۆتەلگە شىپايى يۆتەل ئۆتەل بىلەن بىللە بېرىلىدۇ. بۇ ھالدا بەلدە تېلىش ياكى ئاغرىق بولسا كاتتا مېغىز قوشۇلىدۇ.

7. تېپىزلا يەردىن چىقىۋاتقان كالتە يۆتەلگە شى- پايى يۆتەل كالتىسى ئامپۇل، قان بېسىم تابلېتى ياكى شىپايى زەمەم، كاتتا مېغىز قوشۇپ بېرىلىدۇ.

شىپايى دىيابېت كاپسۇلى

دىيابېتنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرىنى پەسەيتىد- دۇ، قان قەنتىنى چۈشۈرۈپ نورمال دائىرىدە تۇرغۇزد- دۇ، قان بېسىمىنى چۈشۈرىدۇ؛ ئۈچەي ماسارىقا ئەترا- پىدىكى ماددا ئالمىشىشنى ياخشىلايدۇ، مۇسكۇلنى چى- ڭىتىپ سىرغىپ خوراشنى ئازايتىدۇ، تەشنىلىقنى با- سىدۇ، نېرۋىنى پەسەيتىدۇ. بۆرەك، جىگەر، ئاشقازان ئاستى بېزى قاتارلىق ھالىسىرىغان ئەزالارنى كۈچەي-

目录

医学研究

健康信息 (4)

临床报告

长期服用避孕药要注意什么? 吾里亚提·买买提、阿依汗·库尔班 (6)
 脑出血及其预防措施 阿卜拉·赛迪艾合麦提 (8)
 引起急性胰腺炎的病因及其治疗 帕尔哈提马木提 (10)
 28列宫颈糜烂患者的维吾尔医和臭氧治疗总结 吾古兰木·托合提 (11)
 43例肺炎患者临床治疗 阿布都克·依米·米沙 (13)
 基层医院慢性阑尾炎腹腔镜手术与剖腹手术的比较
 乃比江·吐尔松、木他力甫·艾合买提 (15)
 子宫脱垂及其处理方法 穆乃外尔·阿卜杜热黑木 (17)
 关于老年妇女阴道炎及其诱发因素 阿依姆妮萨·托合提 (19)
 草药质量与临床适当应用 布海丽且姆·巴拉提、吾买尔·阿不力孜 (21)
 关于酸浆汁炎症性疾病的治疗作用
 西艾力·奴尔买买提、早日古丽·买买提明 (23)
 论部分草药与肝损伤的关系 吾买尔·阿不力孜、布海丽且姆·巴拉提 (25)
 维吾尔医治疗咳嗽临床与古籍思路探讨
 阿依古力·托合提、阿比班·阿克拉 (27)
 观察复方露剂对过敏性皮肤疾病的疗效
 图尔荪古丽·伊力亚斯、木塔力甫·甫拉提 (31)
 关于维吾尔医医院草药房中存在的问题
 绕威古丽·热西提、地里努尔·吾拉音 (33)
 复方苏润江片的稳定性实验验证
 地里努尔·吾拉音、阿不都瓦尔·阿布拉克 (36)
 浅谈医院药房管理存在的问题与改进对策 阿斯木古丽·沙吾提 (38)
 腮腺炎并发脑膜炎的临床表现及其治疗措施 图尔荪古丽·托合提 (41)
 引发胆结石的因素 阿帕尔·胡吉阿合买提 (42)
 高血压的症状与患者应注意的要点 阿不来提·帕它尔 (44)
 计划生育工作的重要性及其有关存在的问题 阿依汗·库尔班、吾里亚提·买买提 (46)

临床护理

中风患者家庭锻炼及护理 麦尔巴·阿不都克尤木 (48)
 心血管疾病及其心理护理 古扎努尔·衣不拉衣木 (50)
 关于维吾尔医护理脓性头癣病 如孜婉古丽·阿巴斯 (51)
 白塞氏综合征患者的维吾尔医护理 热汗古丽·吐尔逊 (54)

性病和艾滋病

关于艾滋病的十条基本知识和十条相关重要信息 (57)

"三高症"专栏

高脂血症的临床表现有哪些 (60)
 减停降压药千万谨慎 (61)

季节与养生

秋季养生要注意什么 (63)

妇幼保健

高龄生二胎营养要关注 (65)
 预防各年龄段儿童感冒的方法各有不同 (66)
 引起儿童牙齿不齐的因素有哪些 (67)

科科努尔专栏

不断发展的新疆科科努尔高科开发股份有限公司 (68)

ساقلىق ساقلاش



保健事业

2016. 9

(月刊, 总第225期)

编委会主任

李新华

编委会副主任

哈木拉提·吾甫尔、帕尔哈提·克力木、彭永、艾尔西丁·买买提、吐尔洪·艾买尔、伊沙克·阿合买提江、姜波、符俐萍、马明辉、阿依夏木·玉努斯、道尔吉、地力夏提·亚克甫、居来提·克里木、唐培作、刘文生、斯拉甫·艾白、博拉提·阿不都克尤木·赛买提、凯赛尔·阿不都克热木、木合塔尔·阿不力米提、热娜·卡斯木、温志琪、白霞

常务编委

马尔当·阿不都热合曼、阿不都热依木·卡德尔、柯比努尔·买买提、阿依仙·阿合尼亚孜、克力木·阿不都热依木、帕尔哈提·拜合提、阿达成提·卡斯木、艾百都拉·肉孜、伊河山·伊明、赛力克·对山拜、木合塔尔·霍加、吐尔逊江·买买提伊明、柯星星、多鲁坤·买买提明、迪力木拉提·斯热吉丁、阿不力米提·阿不都拉、伊力亚尔·夏合丁、阿木提·司马义、巴图尔·吐尔底、纳毕江·玛贺穆德、米吉提·沙依提

总编

殷宇霖、买买提·牙森

主编

亚力坤·阿不都萨拉木

副主编

库尔班·卡得尔、艾尔肯·阿力木

本期责任编辑

买力哈巴·阿帕尔

本期责任校对

乔尔帕·吐尔逊

编辑人员

库尔班·卡得尔、艾尔肯·阿力木


买力哈巴·阿帕尔、热依兰·肉孜



科科努儿科技

www.koknur.net

400 0991 911 0991-8569862



سەنجاڭ گۆڭنۇر يۇقىرى تېخنىكا ئېچىش ھەسسەدارلىق شىركىتى



ئېلزاڧ دوختۇر مەخسۇس كېسەللەكلەر ئامبۇلاتورىيەسى داۋالاش دات

داۋالاش دائىرىسى

- ◎ تېرە ئىچكى بۆلۈم كېسەللەكلەرنى داۋالاش مەركىزى
- ◎ ئاقكېسەلنى دىياگنوز قويۇپ داۋالاش مەركىزى
- ◎ تەڭگە تەمرەتكىنى دىياگنوز قويۇپ داۋالاش مەركىزى
- ◎ لازېر نۇرىدا ھۆسن تۈزەش مەركىزى
- ◎ تېرە تاشقى بۆلۈم كېسەللەكلەرنى دىياگنوز قويۇپ داۋالاش مەركىزى
- ◎ جىنسىي كېسەللەكلەرگە دىياگنوز قويۇپ داۋالاش مەركىزى
- ◎ ئاياللار كېسەللەكلەرگە دىياگنوز قويۇپ داۋالاش مەركىزى
- ◎ مېكرو زەخمىلىك داۋالاش مەركىزى
- ◎ تۇغماسلىققا دىياگنوز قويۇپ داۋالاش مەركىزى
- ◎ ئاياللار جىنسىي كېسەللەكلەرگە دىياگنوز قويۇپ داۋالاش مەركىزى
- ◎ بالىياتقۇ بويىنى كېسەللەكلەرنى داۋالاش مەركىزى
- ◎ ئاياللار ياللۇغلۇق كېسەللەكلەرنى داۋالاش مەركىزى
- ◎ لابوراتورىيەلىك تەكشۈرۈش بۆلۈمى


لابوراتورىيەلىك تەكشۈرۈش بۆلۈمى

ئامبۇلاتورىيەنى تونۇشتۇرۇش

لازېر نۇرىدا ھۆسن تۈزەش مەركىزى



ئامبۇلاتورىيەمىز يۇقىرى دەرىجىلىك سەھىيە ئورۇنلىرىنىڭ تەكشۈرۈپ تەستىقلىشى بىلەن قانۇنلۇق قۇرۇلغان تېرە كېسەللەكلەرنى، جىنسىي كېسەللەكلەر، ئاياللار كېسەللەكلەرنى بويىچە كۆپ كۆرۈلىدىغان، مۇرەككەپ كېسەللەكلەرگە دىياگنوز قويۇش ۋە داۋالاشنى ئۈستىگە ئالغان كىلىنىكا پەن-تەتقىقات قوشۇنى بولغان، داۋالاش ئۈنۈمى دۆلەت ئىچىدە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان مۇنتىزىم داۋالاش ئاپپاراتى ھېسابلىنىدۇ. مەزكۇر ئامبۇلاتورىيە دۆلەت ۋە ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك 5 تىن كۆپرەك پەن-تەتقىقات تېمىسىغا مەسئۇل بولغان، ئېلان قىلغان ئىلمىي ماقالىسى 40 پارچىدىن، نەشر قىلغان كىتابى 10 پارچىدىن ئارتۇق، تەتقىقات نەتىجىسى پەن-تەخنىكىدا ئىلگىرىلەش 1، 2، 3 دەرىجىلىك قاتارلىق مۇكاپاتلارغا ئېرىشكەن.



جىنسىي كېسەللەكلەر بۆلۈمى

ئاياللار كېسەللەكلەرنى بۆلۈمى

تېرە كېسەللەكلەرنى بۆلۈمى

ئاقكېسەلگە دىياگنوز قويۇپ داۋالاش مەركىزى



ئاياللار كېسەللەكلەرگە دىياگنوز قويۇپ داۋالاش مەركىزى
مېكرو زەخمىلىك داۋالاش مەركىزى
تۇغماسلىققا دىياگنوز قويۇپ داۋالاش مەركىزى
ئاياللار جىنسىي كېسەللەكلەرگە دىياگنوز قويۇپ داۋالاش مەركىزى
بالىياتقۇ بويىنى كېسەللەكلەرنى داۋالاش مەركىزى
ئاياللار ياللۇغلۇق كېسەللەكلەرنى داۋالاش مەركىزى



دىياگنوز قويۇپ داۋالاشتا بىز ئەڭ كەسىپلەشكەن! ساغلام، ئازادە روھىي ھالەت كاپالىتى - ئېلزاڧ دوختۇر!

1. پەرھىز تۇتۇش ھاجەتسىز
2. ئاپتاپقا قاقلىنىش ھاجەتسىز
3. ئۇزۇن مۇددەت دورا يېيىش ھاجەتسىز
4. ئۈچ كۈندە ئۈنۈمى كۆرۈلىدۇ

مەنزىل: ئۈرۈمچى دۆڭكۆۋرۈك بازىرى قىران بۈركۈت بىناسى 3 - قەۋەت
تېلېفون: 0991 - 2808822
13699359160