

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى قوللانمىسى

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى
قوللانمىسى

1

1





ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى قوللانمىسى

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى
قوللانمىسى

2

2



تۇردى مۇھەممەت ئاخۇن

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى قوللانمىسى

شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى قوللانمىسى
شىنجاڭ خەلق نەشرىياتى نەشر قىلدى
شىنجاڭ شىنخۇا باسما زاۋۇتىدا بېسىلدى
شىنجاڭ شىنخۇا كىتاپخانىسى تارقىتىدۇ

1977 - يىل 12 - ئاي 1 - نەشرى

1977 - يىل 12 - ئاي 1 - بېسىلىشى

كىتاپ نومۇرى: M14098.23 باھاسى: 1.73 يۈەن

كىرىش سۆز

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىك ئىلمى ۋە تىنىمىزنىڭ ئۇلۇغ مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ بىرى بولغان جۇڭگىيى تىبابىتىنىڭ تەركىۋى قىسمىدىن ئىبارەت. ئۇ — ئۇيغۇر ئەمگەكچىلىرىنىڭ تەبىئەتكە قارشى، ئاغرىق-سېلىقلارغا قارشى ئېلىپ باغان ئۇزاق مۇددەتلىك كۈرەشلىرى جەريانىدا بارلىققا كەلگەن ۋە راۋاجلانغان بولۇپ، ئىككى مىڭ يىلدىن ئارتۇق تارىخقا ئەگەشكەن ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇ، جۇڭگىيى تىبابىتى، شىزاڭ تىبابىتى بىلەن، شۇنىڭدەك ئەرەپ، يۇنان، ھىندىستان تىبابەتچىلىك ئىلىملىرى بىلەن ئۆز ئارا تەسىر، كۆرسىتىش ئۆزئارا ئۆگىنىش ئارقىلىق تەدرىجىي بېسىپ، تاكامۇللىشىپ ئۆزىگە خاس نەزىرىيە تىشى شەكىللەندۈرگەن بولۇپ، تارىختىن بۇيان شىنجاڭدىكى ھەر قايسى قېرىنداش مىللەت خەلقلەرنىڭ ساقلىقنى ساقلاش، كېسەللىكلەرگە قارشى تۇرۇش كۈرەشلىرىدە تايانغان ئاساسىي تىبابەتچىلىك ئىلمى بولۇپ كەلدى.

فېوداللىق جەمىيەتتە ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىنىڭ تەرەققىياتى زور چەكلىمىگە ئۇچرىغان. بولۇپمۇ گومىنداڭ ئەكسىيەتچىلىرىنىڭ قۇستىبىت ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا

كەمسىتىلىپ، چەكلىنىپ، كومۇلۇپ قېلىش. يېزىلىپ كېتىشتەك ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتكە دۇچار بولغان ئىمدى ئازاتلىقتىن كېيىن، ئۇلۇغ جۇڭگو گۇڭخەندىگە - ئىككىنچى توغرا رەھبەرلىكى، ئۇلۇغ داھىمىز ماۋجۇشنىڭ پارلاق مىللىي سىياسىتىنىڭ نۇرى ئاستىدا ماۋجۇشنىڭ "جۇڭگو قىيى - دورىگەرلىك ئىلمى ئۇلۇغ بىر غەزىنە، ئۇنى تىرىشىپ ئېچىش ۋە يۇقۇرى كۆتىرىش لازىم" دېگەن شانلىق يوليۇرۇغىنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئۇيغۇر ئىبابەتچىلىكىمۇ قەدىنى كۆتىرىپ، خەلق ساقلىغىنى ساقلاش ئىشلىرىدا ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرۇش ئىمە - كانىيىتىگە ئىگە بولالدى. جايلاردىكى ئۇيغۇر تىۋىپلار كوللىكتىپلىشىش يولىغا مېڭىپ، بىرلەشمە داۋالاش شىپاخانىلىرىغا ئۇيۇشۇپ، دۆلەت ئىگىدارلىغىدىكى دۈخ - تۇرخانىلارغا ئورۇنلىشىپ، ھەر مىللەت ئىشچى، دىھان، ئەسكەرلەر ئاممىسى ئۈچۈن خىزمەت قىلماقتا.

قولىڭىزدىكى كىتاپنى خوتەن ۋىلايەتلىك ئۇيغۇر تىبابەت شىپاخانىسىدىكى پىشقەدەم تىۋىپ تۇردى مەھمەت ئاخۇن ئۆزىنىڭ 60 نەچچە يىللىق ئەمىلىي داۋالاش تەجرىبىلىرى ئاساسىدا، قەدىمقى تىبابەت ئە - سەرلىرىدىن پايدىلىنىپ تۈزۈپ چىققان. كىتاپتا كېسەل - لەرگە دىئاگنوز قويۇش، داۋالاش ئۇسۇللىرى بىر قەدەر تەپسىلىي سۆزلەنگەن ۋە 200 نەچچە خىل مۇھىم مۇرەككەپ دورا نۇسخىلىرى تونۇشتۇرۇلغان بولۇپ،

ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكى ھەققىدىكى نىسبەتەن تولۇغراق
بىر ئەسەردىن ئىبارەت. بۇ كىتاپ يېڭى ئەۋلات ئۇيغۇر
تىۋىپلىرىنى تەربىيەلەشتە، ئاغرىق-سەھىيە سىلاقلارنى داۋالاشتا
قوللانمىلىق رولىغا ئىگە بولۇپلا قالماي، ئۇيغۇر تىبابەتچىلىكىنى
تەتقىق قىلىش ئۈچۈن مەلۇم ئەھمىيەتكە
ئىگە.

كىتاپتا كەمچىلىك ۋە خاتالىقلارنىڭ بولۇشىمۇ
مۇمكىن. كەڭ كىتاپخانىلارنىڭ تەتقىقىي پىكىرلىرىنى
بېرىشنى سورايمىز.

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە ئىدارىسى

۱۹۷۵-يىلى ۹-ئاي



مۇندەرىجە

بىرىنچى قىسىم. ئۇيغۇر تىبابىتىنىڭ نەزىرىيە ئاساسلىرى

I	ماقالا. تەبىئەت ۋە كەيپىيات	1
	1 - پەسىل: مىزاج	3
II	ماقالا. توت خىلىت (ئەخلاى ئەرەبەئە)	5
	1 - پەسىل: خىلىتلارنىڭ ھاسىل بولۇشى	6
	2 - پەسىل: خىلىتلارنىڭ خۇسۇسىيىتى ۋە ئۆزگە- رىشى	8
	قان	8
	سەپرا (توت)	9
	بەلغەم	10
	سەۋدا	11
	3 - پەسىل: ياش ۋە رەڭگى - روينىڭ خىلىتلار بىلەن مۇناسىۋىتى ۋە ئالامەتلىرى	12
	4 - پەسىل: خىلىتلار ئۆزگىرىشىنىڭ ئالامەتلىرى ...	14
III	ماقالا. ئەزالار ۋە ئۇلارنىڭ خىزمىتى	16
	1 - پەسىل: ئەزالارنىڭ دەرىجىسى	16
	2 - پەسىل: ئەزالار خىزمىتى	18

3 - پەسىل: ئەزالاردا بولىدىغان قۇۋۋەتلەر 19
ماقالا. بەدەننىڭ ئۆزگىرىشى ۋە كېسەللىكنىڭ IV

يۈز بېرىشى 23

1 - پەسىل: كېسەللىكلەرنىڭ تۈرلەرگە بولىشى ... 24

2 - پەسىل: كېسەللىكلەرنىڭ دەۋرى 26

3 - پەسىل: زورۇر ۋاسىتىلار 26

ماقالا. كېسەل پەيدا بولىشنىڭ سەۋەپلىرى ... 32 V

1 - پەسىل: ئىسسىقلىق بولغان كېسەللەرنىڭ

سەۋەپلىرى 33

2 - پەسىل: سوغاقلىق بولغان كېسەللەرنىڭ

سەۋەپلىرى 33

3 - پەسىل: قۇرۇق ۋە ھولىلىكتىن بولغان كېسەل-

لەرنىڭ سەۋەپلىرى 34

4 - پەسىل: ئوتۇش يولىلىرىنىڭ كېڭىيىشى ۋە

تارىيىپ قىلىشى 35

5 - پەسىل: بەدەن تېرىلىرىدىكى ئۆزگىرىش (قۇ-)

رۇپ قىلىش) 36

6 - پەسىل: شەكىل (قىياپەت) بۇزۇلىشنىڭ

سەۋەپلىرى 36

ماقالا. تومۇر ھەركەتلىرى ۋە ئۇلارنىڭ VI

ئەھمىيىتى 37

1 - پەسىل: تومۇرنىڭ ئەھمىيىتى 38

2 - پەسىل: تومۇردىن نىمىتلەرنى بىلگىلى ۋە قات-

داق بىلگىلى بولىدۇ 39

3 - پەسىل: تومۇرنىڭ تۈرلىرى ۋە ھەركىتى 40

- 4 - پەسىل: تومۇرنىڭ سەۋەبلىرى 50
- VII ماقالا. نەپەس ۋە ئۇنىڭ بۇزۇلۇشى 71
- VIII ماقالا. سۇيدۇك ۋە ئۇنى تەكشۈرۈش 73
- 1 - پەسىل: سۇيدۇك تۇرلىرى ۋە ئۇلارنىڭ
ئالاھىدىلىكلىرى 73
- 2 - پەسىل: سۇيدۇكنىڭ قويۇق - سۇيۇقلۇقى
(قەۋامى) 82
- 3 - پەسىل: سۇيدۇك ئۈستىدە كۈپۈك بولۇشى
ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى 87
- 4 - پەسىل: سۇيدۇكتىكى پۇراق ۋە ئەر - ئاياللار -
نىڭ سۇيدۇكنى پەرقلەش 95
- IX ماقالا. چوڭ تەرەت (بەۋل)نى تەكشۈرۈش ... 97
- 1 - پەسىل: چوڭ تەرەتتىكى ئارىلاشمىلار 97
- 2 - پەسىل: چوڭ تەرەتنىڭ سۇيۇق ياكى قويۇق
كېلىشى 98
- 3 - پەسىل: چوڭ تەرەتنىڭ رەڭگى 100
- X بەلغەم ۋە ئۇنى تەكشۈرۈش 102
- 1 - پەسىل: بەلغەمنىڭ مىقدارى 102
- 2 - پەسىل: بەلغەمنىڭ رەڭگى 102
- XI ماقالا. كېسەل ئاقىۋىتىنىڭ ياخشى - يامان
بولۇش ئالامەتلىرى 104
- 1 - پەسىل: كېسەل ئاقىۋىتى ياخشى بولۇشتىن
دېرەك بېرىدىغان ئالامەتلەر 104
- 2 - پەسىل: كېسەل ئاقىۋىتى يامان بولۇشتىن
ئالامەتلىرى 106

XII ماقالا. كېسەللىكنى تولۇش ۋە توسۇش

- تەشخىس قىلىش 110
- 1- پەسىل: كېسەلنى تولۇش 110
- 2- پەسىل: ماددىنىڭ پىششىق ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى 111

XIII ماقالا. كېسەلنى داۋالاش ئۇسۇللىرى

- 1- پەسىل: سۇرۇپ چىقىرىش 117
- (1) قان ئېلىش 117
- (2) ھىجامەت (شەخەك) قويۇش 123
- (3) قۇستۇرۇش (قەيى قىلدۇرۇش) 125
- (4) سۈرگە بېرىش 129
- (5) ھوققە - شامچە 135
- (6) تەرلىتىش 138
- (7) بۇرۇن ۋە تىل ئاستىدىن سۇ ئاققۇزۇش 139
- (8) سۇيدۇك ھەيدەش 140
- 2- پەسىل: ماددىلارنى پىشۇرۇش (مۇنزىج) چارىلىرى 143

- 3- پەسىل: دورا ئىچكۈزۈش 148
- 4- پەسىل: بوۋاقلارنى داۋالاش 160
- 5- پەسىل: كېسەللەر تامىقى 162

XIV ماقالا. ساقلىقنى ساقلاش ۋە كېسەلنىڭ ئال-

- دىنى ئېلىش 165
- 1- پەسىل: جىسمانى ھەركەت 165
- 2- پەسىل: روھى ھەركەت 166
- 3- پەسىل: ھامىلدار ئاياللار ۋە قېرى كىشىلەرنىڭ ساقلىقنى ساقلاش تەدبىرلىرى 167

ئىككىنچى قىسىم. كېسەللىكلەر ۋە ئۇلارنى داۋالاش

- 1 ماقالا. باش ۋە مىڭە كېسەللىكلىرى..... 168
- 1- پەسىل: باش ئاغرىقى (سەدائى ساددە)..... 168
- 2- پەسىل: مىڭە كېسەللىكلىرى..... 182
- ئۇيقۇسىزلىق (سەھرى)..... 184
- مىڭە پەردىسىنىڭ ياللۇغى..... 187
- مىڭىنىڭ ياللۇغلىنىشى (ۋەرەمى دىماغ)..... 190
- تنتىرەش كېسىلى (رەئىشە)..... 195
- ساراڭلىق (جۇنۇن)..... 197
- مالخۇليا..... 198
- ئاپالارنىڭ تۇتاقلىق كېسىلى (ئەتىناقى رەھىم- ھىستېرىيە)..... 199
- مالخۇليايى مەراقى..... 202
- قارا بېشىش (كابۇس)..... 203
- پالەچ ۋە ئىستىرخا..... 204
- تارتىشىپ قېلىش (تەشەننۇج)..... 211
- گەردەن قېتىپ قېلىش (كوزاز- تەمەددۇد)..... 214
- قۇۋۇرغا ئارىلىق ئەسەپلىرىنىڭ ئاغرىشى (ۋەجىئىل خاسىرە)..... 216
- بەل ئاغرىقى (ۋەجىئىل قەتەن)..... 217
- يانپاش ئاغرىقى (ئەرقۇننىسا)..... 218
- قاش ئارىسى ئاغرىشى (ئۇسابە)..... 222

- بەدەن بۇلجۇڭ كوشلىرىنىڭ تارتىشىشى (شەخس) 223
- II ماقالا. كوز كېسەللىكلىرى 224
- 1- پەسىل: كوز كېسەللىكلىرىنىڭ سەۋەبى ۋە داۋالاش چارىلىرى 224
- 2- پەسىل: كوز مۇڭۇز پەردىسى (تەبىقە سەلبە) كېسەللىكلىرى 228
- 3- پەسىل: قاپاق كېسەللىكلىرى 230
- كوزدە گۆش ئۆسۈپ قېلىش (شېرقاق) 230
- كوز قوتۇرى (جەرە بۇلغەين) 231
- قاپاقتىكى ئۆزۈمبەسمان ئۆسمە (تۆتەتۇل ئىچقان) ... 233
- قاپاقنىڭ قىزىرىپ ئىششى (شېرايى بۇلەك) 234
- يىڭنە ئاسقۇ (شەئىرە) 235
- ياش خالتىسىنىڭ يېرىڭلىق ئارقىسى (غەرىپ، ناسۇرى چەشم) 235
- كوزگە قۇم تىقىلغاندەك ئاغرىش (جەماتىل ئەجە-فان) 236
- كىرىپكىنىڭ توكىلىشى (ئىنتىشارۇل ئەھداپ، رەزە-دەئى مۇزگان) 237
- كىرىپكىنىڭ ئاقىرىپ قېلىشى 238
- كوز ياشاڭغۇزاش (دەمەئە) 238
- 4- پەسىل: كوزنىڭ ھەرخىل ئاغرىقلىرى 239
- كوز ۋە قاپاق قىزىرىشنىڭ ياللۇغى (رەمەد) 239
- كوز ئىچىدىكى قىزىل چېكىت (تۇرفە) 243
- كوزگە قانات گۆش ئۆتۈپ قېلىش (زەپەر ياكى ناخۇنە) 244

كوز ئېقىنىڭ يەللىك ئىششىقى (ئىنتىقاخى)

- 245 مۇلتەھمە (مۇلتەھمە)
- 245 كوز ئېقىنىڭ قىچىشى (ھىككە مۇلتەھمە)
- 246 كوز قارچۇغىنىڭ ياللىقى (ۋەرمە قەرىنە)
- 247 كوزگە ئاق چۇشۇش (بەيازۇلئەيىن)
- 249 كورۇش زەئىپلىكى (زەئىپىل بەسەر)
- 251 كوزدىكى يات نەرسىلەر (قەزى)
- 252 كوزگە زەرە تىگىش (زەرە بۇلئەيىن)
- 252 كەچقۇرۇن كورمەسلىك (ئەشا - شەبكورى)
- 253 كوزگە سۇ چۇشۇش (نۇزۇلۇما)

III ماقالا. قۇلاق، بۇرۇن ۋە گال (تاماق)

- 264 كېسەللىكلىرى
- 264 1 - پەسل: قۇلاق كېسەللىكلىرى
- 264 قۇلاق ئاغرىش (ۋەجىل ئۇزۇن)
- 266 ئاڭلاشنىڭ بۇزۇلۇشى (تەرەش)
- 268 قۇلاق قىچقىرىش (تىنىن)
- 268 قۇلاقتىن قان ئېقىش
- 269 2 - پەسل: بۇرۇن كېسەللىكلىرى
- 269 پۇراش سېزىمىنىڭ يوق بولۇشى
- 270 پۇراشنىڭ بۇزۇلۇشى
- 271 بۇرۇندىكى جاراھەت
- 272 بۇرۇن قاناش
- بۇرۇندىن سېسىق پۇراق كېلىش (نەتولى)
- 273 ئەنەق (ئەنەق)
- 274 چۈشكۈرۈش (ئەتسە)
- 275 بۇرۇن قىچىشى (ھىككەتۇل ئەنەق)

- 3- پەسل: تىل كېسەللىكلىرى 273
- 1) تىلنىڭ ياللۇغلىنىشى (ۋەزەمى لىسان) 275
- تەم تېتىشىنىڭ بۇزۇلمىشى 277
- تىلنىڭ ئېغىرلىقى 277
- تىلنىڭ چوڭىمىپ كېتىشى (ئىدلا ئۆللىسان) 280
- تىل ئاستى ئۆسمىسى (زەپدەغ) 280
- تىلنىڭ يېرىلىپ كېتىشى 281
- تىلنىڭ قۇرۇپ كېتىشى 281
- تىلنىڭ جاراھەتلىنىشلىرى 282
- ئېغىزنىڭ ئاق يارىسى (قىلا) 283
- ئېغىزنىڭ يەل يارا كېسىلى (ئاكىلە تۇلفەم) 284
- ئېغىزدىن شولگەي سۇ ئېقىش 285
- تاڭلاي ياللۇغى 286
- كالىۋىكىنىڭ ئاقىرىپ قېلىشى 286
- 4- پەسل: چىش كېسەللىكلىرى 287
- چىش ئاغرىش (دەردى دەندان) 287
- چىشنىڭ قاماپ قېلىشى 289
- قۇرۇت يىگەن چىش 290
- چىش رەڭگىنىڭ ئۆزگىرىشى (تەغىرىرى رەڭگى دەندان) 290
- چىشنىڭ مىدىرلاپ قېلىشى 291
- چىش مۈلۈكلىرىنىڭ قانىشى 292
- 5- پەسل: كال ئاغرىقلىرى 292
- بوغما (ھوناق) 292
- كال ئاغرىقى (ۋەزەمى ھەلەق) 295
- كەچىك تىل ۋە يۇتقۇچ ئەتراپىنىڭ پەلچى (ئىسە)

296	(تىرخانى لوھات)	
298	قزىل ئوڭگەچتىكى يات نەرسىلەر	
299	قزىل ئوڭگەچ ۋە يۇتقۇچنىڭ قىچىشى	
300	يۇتۇشنىڭ قىيىنلىشى	
302	قزىل ئوڭگەچ يارىسى	
302	ئاۋاز پۇتۇش (بەتلانى سوت)	
	ماقالا. كوكرەك بوشلۇغى (سەنە) كېسەللىك-	۱۷
305	لىرى	
305	1-پەسل: ئوپكە كېسەللىكلىرى	
305	دەم سىقىش (زەيقۇلنەپەس، زەبۇە)	
310	يوتەل (سوتال)	
315	قان تۆكۈرۈش (نەپسىدەم)	
318	ئوپكە ياللۇغى (زاتلىرىيە)	
324	ئوپكە سىلى	
329	كوكرەك پەردە ياللۇغى (زاتلىجەنە)	
334	شۇشە كېسلى	
	توش ئىچكى پەردىسىنىڭ ياللۇغى (زاتىل	
335	سەدرى)	
336	كىرگىت پەردە ياللۇغى (بەرسام)	
	كوكرەك بوشلۇغىغا يىرىڭ تولىش (ئىتقاننى	
337	سەنە)	
339	ماقالا. يۈرەك كېسەللىكلىرى	v
	1-پەسل: يۈرەكنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان	
339	كېسەللىكلىرى	
339	يۈرەكنىڭ ئىسسىق مىزاجلىق كېسەللىكلىرى	
340	يۈرەكنىڭ سوغاق مىزاجلىق كېسەللىكلىرى	

- 341 يۈرەكنىڭ قۇرۇق مىزاجلىق كېسەللىكلىرى
- 342 يۈرەكنىڭ ھول مىزاجلىق كېسەللىكلىرى
- 2 - پەسىل: يۈرەك ئويناش (خاپقاننى قەلب)
- 342 كېسلى
- يۈرەك تومۇرلىرىغا سەپرا قۇيۇلۇشتىن بولغان
- 344 خاپقان
- يۈرەك تومۇرلىرىغا سەۋدا قۇيۇلۇشتىن بولغان
- 346 خاپقان
- كوپ قان يوقىتىش ۋە ئۇزۇقلىنىشنىڭ ناچار
- 347 بولمىدىن بولغان خاپقان
- يۈرەكنىڭ سەزگۈ ئەسەپلىرىنىڭ قوزغۇلۇشچان
- 348 بولۇپ قېلىشىدىن بولغان خاپقان
- باشقا ئەزالاردىكى زەرەرلىنىشلەرنىڭ يۈرەككە
- 348 تەسىرىدىن بولغان خاپقان
- 349 ئايلىنىپ كېتىش (غەشيان)
- يۈرەك قۇلىغىنىڭ ياللۇغى (ۋەرەمى ئۇزۇند-
- 356 لقەلب)
- 357 يۈرەكنىڭ سىقىلىشى (زېيىتىل قەلب)
- 358 يۈرەك قېيىغا سۇ يىغىلىش
- 359 ماقالا. ئەمچەك كېسەللىكلىرى
- VI
- 359 1 - پەسىل: سۇت چىقىرىشنىڭ بۇزۇلىشى
- 359 سۇتنىڭ كېمىيىشى
- 360 خىلتلار سەۋەبىدىن سۇتنىڭ ئازىيىشى
- 363 سۇتنىڭ ھەددىدىن ئارتۇق كوپىيىپ كېتىشى
- 364 2 - پەسىل: ئەمچەك ياللۇغى (ۋەرەمى پىستان)
- 368 ماقالا. مەيدە كېسەللىكلىرى
- VII

- 1 - پەسىل: مەيدىنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشلۇق كېسەل -
 368 لىكىلىرى
 368 خاس ئىسسىقلىقتىن مەيدە مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى...
 سەپرا گېشىپ كېتىشتىن بولغان مەئدە
 370 بوزۇلۇشى
 مەئدىنىڭ ماددىسىز ھول ئىسسىق ۋە قۇرۇق ئىس -
 373 سىقتىن بۇزۇلۇشى
 373 مەئدىنىڭ سەۋدا ۋە قۇرۇق سوغاقتىن بۇزۇلۇشى...
 375 2 - پەسىل: مەئدە ئاغرىشى (ۋەجىلمەئدە)
 مەئدىنىڭ يەلدىن ئاغرىشى
 377 ناچار يىمەكلىكلەر سەۋەپلىك مەئدە ئاغرىشى
 مەئدە ئەسەپلىرىنىڭ قوزغىلىشىدىن مەيدە
 378 ئاغرىشى
 379 3 - پەسىل: ھەزىم كېسەللىكلىرى
 379 تاماق سىڭىشنىڭ بۇزۇلۇشى
 382 ئىشتەي تۇتۇلۇش
 386 يەپ تويماسلىق كېسەلى (شەھۋەتى كەلبى)
 387 كالا ئىشتەي (جۇئىلىپەقەر)
 389 ئاچلىقتىن ئايلىنىپ كېتىش (جۇئىلغەش)
 غەلىتى نەرسىلەرنى يېيىشكە مايىللىق (فاسادى
 390 شەھۋەت)
 391 كۆپ ئۆسەش كېسەلى (ئەتىش)
 4 - پەسىل: ئاشقازان ياللۇغلىرى (ۋەرەمى) -
 393 مەئدە)
 ئاشقازان ھوكۇنەك پەردە ياللۇغى (پىلغىمۇنى -
 393 مەئدە)

395	 بەلغەمدىن بولغان ئاشقازان ياللۇغى (ۋەرمە)
396	 مەئدە (بەلغەمىيە)
396	 سەۋدادىن بولغان ئاشقازان ياللۇغى (ۋەرمە مەئدە)
397	 سەۋداۋىيە
397	 مەئدىنىڭ يىرىڭلىق جاراھىتى (دۈبەيلىتۇا)
398	 مەئدە
398	 ئاشقازان يارىسى
400	 ئاشقازان كوپۇش (نەفىخە مەئدە)
400	 كىكىرىش ۋە ئەسەش
402	 قۇسۇش (قەي) ۋە كوڭۇل ئاينىش (غەشىي)
404	 قان قۇسۇش (قەي دەمەۋى)
407	 ھىق تۇتۇش (پەۋاق)
408	 ئاشقازاننىڭ يوتكىلىشى (مۇنقەلىمى مەئدە)
409	 مەئدىنىڭ ئېچىشى
410	 مەئدە بوشىش كېتىش
411	 ئاشقازاننىڭ تارتىش قېلىشى (تەشەنخۇجى)
411	 مەئدە
412	 مەئدىنىڭ قېتىپ قېلىشى
413	 مەئدە سەۋەبلىك ئىچ سۇرۇش (زەرەپ)
416	 ۋابا (ھەيزە ۋابائى)
421	 ماقالا. جىگەر كېسەللىكلىرى
421	 1- پەسل: جىگەرنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشلۇق كېسەللىكلىرى
421	 (1) جىگەر مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىق بۇزۇلۇشى
423	 (2) جىگەر مىزاجىنىڭ سوغاقلىق بۇزۇلۇشى
424	 (3) جىگەر مىزاجىنىڭ قۇرۇقلۇقتىن بۇزۇلۇشى

- 4 2 5 (4) جىگەر زەئىپلىكى (زەئىپلىككە بەد).....
- 4 2 6 2- پەسىل: جىگەردىكى توسىلىش (سۇددىلىككە بەد)...
- 4 2 6 (1) جىگەر ئۆز تومۇرلىرىدىكى توسىلىش.....
- 4 3 1 (2) ماسارىقنىڭ توسىلىشى.....
- 4 3 1 (3) جىگەر كۆپۈپ قېلىش.....
- 4 (4) جىگەر سانچىلىپ ئاغرىش (شىرقە تۈلكە- بەد).....
- 4 3 2 3- پەسىل: جىگەر ئىششىقلىرى.....
- 4 3 3 (1) جىگەرنىڭ ماددىلىق ئىششىقى.....
- 4 3 3 (2) قوساق كىرگەن گۆشلىرىنىڭ ئىششىقى (ۋە- رەمى ئەزلى بەتمى).....
- 4 3 9 (3) جىگەرنىڭ يېرىڭلىق ئىششىقى (دۈبەيلى تۈلكە بەد).....
- 4 4 0 (4) جىگەرنىڭ تارتىشى (خەفە تۈلكە بەد).....
- 4 4 1 (5) جىگەر (ئوتتە) تاش پەيدا بولۇش.....
- 4 4 2 (6) جىگەرنىڭ كىچىكلىشىپ قېلىشى (ھىزال- كە بەد).....
- 4 4 3 (7) جىگەر كېسىلى سەۋىيىدىن بولىدىغان ئىچ سۇرۇشلىرى.....
- 4 4 4 سۇلۇق ئىششىقلار.....
- 4 4 6 سۇ ئالمىشىشنىڭ بۇزۇلۇشى (سۇ ئىلقۇنىيە).....
- 4 4 6 سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقا).....
- 4 4 8 گۆش سۇلۇق ئىششىقى (ئىستىسقا يى لەھمى).....
- 4 4 9 قىسقاچى سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقا يى زىققى)....
- 4 5 2 ئاغراسمان سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقا يى تەبەلى).....
- 4 5 4

456	سېرىق كېسەل (يەرقان).....	
463	ماقالا. تال كېسەللىكلىرى.....	IX
463	1- پەسىل: تالنىڭ مىزاج ئۆزگىرىشلىك	
463	ئاغرىقلىرى.....	
466	تالنىڭ ياللۇغلىنىشى (ۋەرمى تھال).....	
468	تالنىڭ زەئىپلىكى.....	
469	ماقالا. ئۆچەي كېسەللىكلىرى.....	X
469	1- پەسىل: ئۆچەيدىكى ھەزىمنىڭ بۇزۇلۇشلىرى...	
469	ئۆچەي تارتىشىپ قېلىش (زەيىقۇلئەمنا).....	
472	2- پەسىل: ئىچ سۇرۇش (ئىسھال)لار.....	
473	قانلىق ئىچ سۇرۇش (ئىسھال دەمەۋى).....	
478	يىرىڭلىق ئىچ سۇرۇش.....	
480	تولغاق (زەھىرە).....	
484	ئۆچەيگە يەل تولۇش.....	
485	3- پەسىل: چوڭ ئۆچەي كېسەللىكلىرى	
485	(قۇلۇنجى).....	
485	قۇرۇق قوساق ئاغرىش (قۇلۇنجى).....	
488	ئۆچەي توسىلىش.....	
500	چوڭ تەرەت كەلەسلىك (ھەسرە).....	
501	4- پەسىل: ئۆچەي مەدە قۇرۇتلىرى.....	
501	يىلان مەدە (ھەيات).....	
503	قاپاق ئۇرۇغى مەدە (كودۇ دانە).....	
505	5- پەسىل: سولڭ (مەقئەد) كېسەللىكلىرى.....	
505	بىۋاسىرە.....	
511	سولڭ يىرىڭلىق ئاقمىسى (ناسورى مەقئەد).....	
513	سولڭ ياللۇغلىنىش (ۋەرمى مەقئەد).....	

- 515 سولك يېرىلىشى
- 516 سولكنىڭ پالەچلىنىشى (ئىستىرخايى مەقتەد)
- 517 سولك چىقىپ قېلىش (خۇرۇجى مەقتەد)
- 518 سولك يارىلىرى (قۇرۇمى مەقتەد)
- 519 سولك قىچىشى
- 520 ماقالا. بۆرەك كېسەللىكلىرى
- 1- پەسىل: بۆرەكنىڭ مىزاج ئۆزگىرىشلىك ئاغرىقلىرى بۆرەك مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقىدىن بۇزۇلىشى
- 520 قان سەۋىيىسى بىلەن بۆرەك مىزاجىنىڭ بۇزۇلىشى
- 521 بۆرەك مىزاجىنىڭ سوغاقلىقتىن بۇزۇلىشى
- 522 بۆرەكنىڭ كىچىكلىشىپ كېتىشى
- 523 بۆرەك زەئىپلىكى (زەئىفى گۇردە)
- 524 بۆرەكنىڭ يەللىك ئاغرىشى (بادى گۇردە)
- 525 بۆرەك ئاغرىش (ۋەجىئەلگەبەد)
- 2- پەسىل: بۆرەك ياللۇغلىرى (ۋەرەمى گۇردە)
- 526 بۆرەكنىڭ ماددىلىق ياللۇغلىنىشلىرى
- 529 بۆرەك يارىسى
- 531 قەنت سېپىش كېسلى (زىيايمتۇس)
- 533 بۆرەكتە تاش پەيدا بولۇش
- 3- پەسىل: دوساق كېسەللىكلىرى
- 535 دوساق ياللۇغى (ۋەرەمى ماسانە)
- 538 دوساق جاراھەتلىرى
- 539 دوساققا قان ئۇيۇپ قېلىش
- 539 دوساق ئاغرىش (ۋەجىئەلگەبەد)
- 541 دوساق كۆپۈپ قېلىش

XI

- 542 دوساقتا تاش تۇرۇپ قېلىش
544 سۇيدۇك كويگەندەك ئېچىشپ كىلىش
545 سۇيدۇك تۇتۇلۇش (ئېھتىباسى بەۋۇل)
549 سۇيدۇك تامچىلاپ كېلىش
550 سۇيدۇك تۇتالما سلىق (سلىسل بەۋۇل)
552 كېچىسى سىيىپ يېتىش (بەۋۇلى بىلىغراش)
552 قان سىيىش (بەۋلىدەم)
XII ماقالا. قوساق كىرگىت گۈشلىرىنىڭ

- 554 يىرتىلىشى
554 1- پەسىل: چۇقۇق (قېيىل) كېسەللىكلىرى
554 پەتەق
557 قوساق پەتەقى
558 يەل كىندىك

- XIII ماقالا. قول، پۇت ۋە بەل كېسەللىكلىرى
559 1- پەسىل: بەل ئۇمۇرتقا كېسەللىكلىرى
559 ئۇمۇرتقا چىقىپ كېتىش (ھۇدۇبە)
561 غول ئاغرىش (ۋەجىلىھەرە)
564 بەل ئاغرىش (ۋەجىلىخاسەرە)
564 2- پەسىل: سول ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرى
567 بوغۇملارنىڭ ئاغرىشى (ۋەجىلىمۇ پاسىل)
يانپاش بوغۇمى ۋە سۆڭەكلەرنىڭ ئاغرىشى (ۋەج-
574 ئىلۋەرەك)
ھوشۇق ۋە تاپان سۆڭەك بوغۇملىرىنىڭ ئاغرىشى
(نۇقرىسى)
575
576 3- پەسىل: ئاياق قانتومۇرلىرى كېسلى

	ئاياق كوك تومۇرىنىڭ ئەگرى - بۇگرى كېڭىيىپ	
577	كېتىشى (داۋالى).....	
577	پىل پۇتى كېسىلى (دائىل پىل).....	
580	ماقالا. قىزىتىملار (تەپلەر).....	XIV
	1 - پەسىل: بىر كۈنلۈك قىزىتىملار (تەپى	
580	يەۋى).....	
	2 - پەسىل: خىلىتلىك قىزىتىملار (تەپى خىلىتى	
582	ياكى ھۇممىياتى خىلىتى).....	
582	قان ماددىسىدىن بولغان قىزىتما (تەپى دەمەۋى)...	
584	سەپرادىن بولغان قىزىتما (تەپى سەپراۋى).....	
590	بەلغەمدىن بولغان قىزىتما (تەپى بەلغەمى).....	
594	سەۋاددىن بولغان قىزىتما (تەپى سەۋداۋى).....	
598	چۈدەتكۈچى قىزىتما (تەپى دىق).....	
606	3 - پەسىل: يۇقۇملۇق قىزىتىملار (تەپى ۋابائى)....	
608	تائۇن (چۇما) كېسىلى.....	
611	قىزىل (ھوسبە).....	
614	ياۋا چىچەك (چۇدرى).....	
615	4 - پەسىل: بوھران ھەققىدە ئومۇمى چۈشەنچە....	
616	بوھراننىڭ تۈرلىرى.....	
618	بوھران كۈنلىرى.....	
619	بوھران ئالامەتلىرى.....	
620	بوھران ئالدىدىكى ئالامەتلەر.....	
622	ماقالا. تاناسىل ئەزالار كېسەللىكلىرى.....	XV
622	1 - پەسىل: ئەرلەر تاناسىل ئەزا كېسەللىكلىرى....	
622	جىنسى ئاجىزلىق (زەئفى باھ).....	
623	جىنسى ئىنتىلىشنىڭ بولماسلىقى.....	

- جىنىسى ئەزا بوشاپ پالەچلىنىش (ئىستىرخاتى) 625
 مەنى تېز كېتىپ قېلىش (سۈرۈشتى ئىتزال) 626
 جىنىسى ھەۋەسىنىڭ كۆپ بولۇشى 628
 قانلىق مەنى كىلىشى (مەنىيىدەم) 629
 كۆپ ئېھتىلام بولۇش (كەسرەتى ئېھتىلام) 629
 2-پەسىل: ئۇرۇقدان ۋە جىنىسى ئەزا كى-
 سەللىكلىرى 631
 ئۇرۇقدان ياللۇغى (ۋەزەمى ئۇنسەين) 631
 ئۇرۇقدانلىق چوڭىيىپ كېتىشى 633
 ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ تومۇرلىرى كېڭىيىپ ئەگرى -
 بۇگرى كۆپۈپ قېلىش (داۋالى سەفەن) 634
 جىنىسى ئەزا ۋە ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ قىچىقاي
 كېسىلى 634
 سۈيۈك يولىنىڭ توسىلىپ قېلىشى 635
 2-پەسىل: ئاياللار كېسەللىكلىرى 636
 تۇغماسلىق 636
 ھامىلدارلىق ئالامەتلىرى ۋە دىققەت قىلىشقا
 تېگىشلىك ئىشلار 642
 ھامىلدارلىقتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار 642
 كۆپ بويىدىن ئاجراش (كەسرەتى ئىسقات) 644
 قىيىن تۇغۇت 646
 بالا ھەمىرىيى چۈشمەسلىك 648
 ھامىلىنى چۈشۈرۈش 649
 ھامىلدارلىقتىن ساقلىنىش چارىلىرى 650
 يالغان ھامىلدارلىق (رىجا) 651

- 652 ھېمىز كۆپ كېلىش.
- 653 بالىياتقۇ ياللۇغى ۋە جاراھەتلىرى.
- 655 بالىياتقۇنىڭ يىرىڭلىق ئاقىمى (ناسۇر رەھىم) ...
- 655 ئاق خۇن كېسلى (سەيلانى رەھىم)
- 657 ھېمىز كەلمەسلىك
- 658 بالىياتقۇ چىقىپ قېلىش (خۇرۇجى رەھىم)
- بالىياتقۇ يامان سۈپەتلىك ئوسمىسى (سەرتانى رەھىم)
- 661 ھىستېرىيە (ئېھتىناقى رەھىم)
- 662 بالىياتقۇ سۇلۇق ئىششى
- 664 بالىياتقۇ يەللىك ئىششى
- 665 ماقالا. تاشقى ئەزا كېسەللىكلىرى XVI
- 666 1- پەسىل: تېرە كېسەللىكلىرى
- تېرە ئاستى ھۆكۈنەك توقۇلما يىرىڭلىق ياللۇغى
- 666 (فىلىغمونى)
- 669 قاراسان كېسلى (سقاقىلۇس)
- 670 يامان يارا (ھۈمرە، سۇرخى ياد)
- 671 كوز يارا (جەمەرە)
- 672 كويدۇرگە (قورۇھى سائىلە)
- 674 نار فارىسى
- 675 سۇلۇق قاپارتما
- 676 يەلتاشما (شەرا)
- 677 تىلما (ماشەرا)
- 678 بەزلەر ياللۇغى (مۇغابىن)
- 680 چىقان (دۇمىل)
- 682 بىرىڭ خالتىسى (دۇپەيلە)

- 684 ئاغرىقىسىز ئىشەنچلەر (ۋەزىمى روخۇر)
- 685 يەل ئىششىق (نەفىغە)
- 685 پوقاق (سەلئە)
- 687 توبۇق (ئوقدە)
- 688 چاشقان يارىسى (خاناۋىر)
- 690 سەرتان (راك)
- 700 ماخاۋ (جوزام - دائىل ئەسەد)
- 702 تاز كېسلى (سۇنئە)
- 706 قوتۇر (جەرەپ)
- 708 قوتۇر - قىچىشقاق (ھىككە)
- 711 ئىسسىقلىق (ھەسەپ)
- 712 قارا تەمرەتكە (قۇبا)
- 714 سوغان (سوبوز)
- 715 سوكەل (سالىل)
- 716 پاقالچەك يارىسى (بەتەم)
- 717 ئۈزۈمەسمان ئۈسە (تۇتى)
- 718 تېرە ئاستىغا قان چۇشۇش (ئوبۇرسىمان)
- 719 يەل يارا (ئايىلە فەرەنكى، ئاتىشەك)
- 2 - پەسىل: تېرە رەنكى ئۈزۈگىرىش كېسەل -
- 725 لىكىلىرى
- 725 ئاق كېسەل (بەرەس)
- 732 قارا داغ (بەرەس ئەسۋەد)
- 732 داغ (كەلەق)، سەبكۈن (نەمەش)
- 734 مەك (خىلال)
- 735 تېرە كۆكۈرۈپ قېلىش
- 735 تېرە رەنكىنىڭ بۇزۇلۇشلىرى
- 3 - پەسىل: تېرىنىڭ باشقا كېسەللىكلىرى

- 737 باش كېسەكلەش (ھۇزار)
- 737 تېرە يېرىلىش
- 738 چالاش (تۇبا)
- 740 4- پەسل: چاچ كېسەللىكلىرى
- 740 چاچ چۈشۈش (دائىل سۇئەپ)
- 744 چاچنىڭ يېرىلىپ كېتىشى (تەشەققۇق شەئىر)
- 744 باشتىن ياغنىڭ تەپچۈرەپ چىقىشى
- 745 چاچنىڭ بۇرۇن ئاقىرىپ كېتىشى
- 748 5- پەسل: تىرناق كېسەللىكلىرى
- 748 تىرناققا ئاق چۈشۈش
- 749 تىرناق ساغرىپ قېلىش
- 749 پور تىرناق
- 750 تىرناقنىڭ باشقا زەخمىلىنىشلىرى
- 751 سۈپەت (داخەس)
- 752 6- پەسل: تەر كېسەللىكلىرى
- 752 كۆپ تەرلەش
- 754 سېسىق تەرلەش
- 755 7- پەسل: سېمىزلىك ۋە ئورۇقلاش كېسەلى
- 760 8- پەسل: ئۇششۇك ۋە كويۇك
- 760 ئۇششۇك
- 761 كويۇك
- 765 9- پەسل: جاراھەت ۋە يارا
- 765 جاراھەتلەر
- 769 يارىلار
- 774 چاچراتقۇ (قورۇھى سائىيە)
- 774 10- پەسل: يىقىلىش، ئۇرۇلۇش (زەربە)
- 779 11- پەسل: باشقا تېرە كېسەللىكلىرى

779	(قەمەل، سەپەش)
780	يۈز، بېشەنە تېرىسىگە قورۇق چۈشۈش
781	ياتاق يارىسى
781	XVII ماقالا. سۇنۇق ۋە چىقىقلار
782	1- پەسل: سۇنۇق
782	تېرە زەخمىلەنمىگەن سۇنۇق (يېپىق سۇنۇق)
785	تېرە- كۈشنى بۇزغان سۇنۇق (ئوچۇق سۇنۇق)
786	چىقىقلار (خۇلى)
788	كۆپ ئۇچرايدىغان چىقىقلار
	XVIII ماقالا. زەھەرلىنىش ۋە ئۇنىڭغا قارشى
794	چارىلار
794	1- پەسل: دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش
796	مەئدەن جىنىسلىق دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش
801	ئۆسۈملۈك دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش
	2- پەسل: زەھەرلىك ھاشارەتلەر چېقىش ۋە ئۇ-
809	لارنى داۋالاش
809	ئومۇمى چارىلار
812	مەخسۇس چارىلار
816	غالىجر ئىت چىشلەش (غالىجر كېسىلى)
820	قوشۇمچە:
	مەدەن دورىلارنى كۈشتە قىلىش ئۇسۇلى ۋە ئىش-
820	لىتىلىش
823	ئالتۇننى كۈشتە قىلىش
824	كۈمۈشنى كۈشتە قىلىش
826	تومۇر، پولاتنى كۈشتە قىلىش
827	مىنى كۈشتە قىلىش
828	سىمپنى كۈشتە قىلىش
830	ياقۇتنى كۈشتە قىلىش

دوربارلار مۇندەرىجىسى

ھەب (كۇمۇلاچ) دوربارلار

950.....	I (كۆچۈلا كۇمۇلىسى)	ھەببى ئازراقى
951.....	II (كۆچۈلا كۇمۇلىسى)	ھەببى ئازراقى
836.....		ھەببى ئاياراج
834.....		ھەببى سەبرە
857.....		ھەببى سۇرۇنجان
876.....		ھەببى سۇئال
891.....		ھەببى سەكبىنەج
954.....		ھەببى شەبىيار
955.....		ھەببى تەنكار
839.....		ھەببى ئىستەمىخقۇن
948.....		ھەببى ئىمساك
841.....		ھەببى ئەپتىمۇن
843.....		ھەببى قۇقىيا
852.....		ھەببى جەدۋار
873.....		ھەببى پىلىپىل (قارىمۇچ كۇمۇلىسى)
852.....		ھەببى پەرىپىيۇن
861.....		ھەببى زەھەب
910.....		ھەببى رەۋەن
872.....		ھەببى غارىقۇن

851		مەنتىن	هەبىي
860		مۇسەل	هەبىي
921		مۇقىل I	هەبىي
921		مۇقىل II	هەبىي
947		مۇقەۋۋى باھ	هەبىي

قۇرسى (تابىلىت) دورىلار

891		ئەنسۇن	قۇرسى
908		ئەيسەنتىن	قۇرسى
914		ئەنبەر بارىس	قۇرسى
898		ئىلاۋۇسى	قۇرسى
863		فەلىدپەون	قۇرسى
916		بۇزۇرى	قۇرسى
928		بەۋلىمدەم	قۇرسى
916		ئوردان	قۇرسى
901		ئۇد	قۇرسى
877		كەربا	قۇرسى
880		كافۇر	قۇرسى
892		كەۋكەب	قۇرسى
899		كوھلى	قۇرسى
912		كەبىر	قۇرسى
923		كاكىنەج	قۇرسى
917		گۇلنار	قۇرسى
929		گۈل I	قۇرسى
929		گۈل II	قۇرسى

915	قۇرسى غاپەس I
930	قۇرسى غاپەس II
898	قۇرسى سۇمبۇل
901	قۇرسى تاباشىر
902	قۇرسى راسەن
918	قۇرسى زەرنىخ
924	قۇرسى زىياىتۇس
913	قۇرسى مازەرىيۇن I
913	قۇرسى مازەرىيۇن II
937	قۇرسى مور
930	قۇرسى مەرۋايت
931	قۇرسى خەشخاش

سۇيۇپ (تالقان) دورىلار

856	سۇيۇپى سۇرۇنجان I
857	سۇيۇپى سۇرۇنجان II
952	سۇيۇپى سوزاك I
953	سۇيۇپى سوزاك II
900	سۇيۇپى رۇممان
918	سۇيۇپى تىن
935	سۇيۇپى مۇقەۋۋى مەئدە

ئىتىرىپىللەر

835	ئىتىرىپىل سەغىر
835	ئىتىرىپىل كەشەنز

832	 ئىتىرىپىل كەبىر
922	 ئىتىرىپىل مۇقىل
939	 ئىتىرىپىل غۇدۇرى

مەجۇن دورىلار

842	 مەجۇنى ئايارەج پەيقارا
887	 مەجۇنى ئايارەج لوغانىزىيا
903	 مەجۇنى ئاساناسىيا
948	 مەجۇنى ئازاراقى
852	 مەجۇنى بالادۇر I
942	 مەجۇنى بالادۇر II
932	 مەجۇنى بۇزۇرى
924	 مەجۇنى بەلىلۇت
874	 مەجۇنى بىتەپشە
844	 مەجۇنى فىلاسپە (مەجۇنى ماسدە تۇلەيات)
883	 مەجۇنى فىلۇنىيا
884	 مەجۇنى فىلاقى I
919	 مەجۇنى فىلاقى II
844	 مەجۇنى نۇجاھ
849	 مەجۇنى مەشمەدىر تۇس
864	 مەجۇنى جاۋارش كۇمۇنى
893	 مەجۇنى جاۋارش شەرىياران
919	 مەجۇنى جاۋارش خەۋزى
904	 مەجۇنى داۋا ئىلكورگەم

846		مەجۇنى داۋا ئىلمىشىكى شېرىن
883		مەجۇنى داۋا ئىلمىشىكى تەلخى
930		مەجۇنى داۋا ئىلمىشۇر بۇت
935		مەجۇنى داۋا ئىلمىشۇك
838		مەجۇنى مۇفەررىھى ياقۇتى I
881		مەجۇنى مۇفەررىھى ياقۇتى II
885		مەجۇنى مۇفەررىھى ياقۇتى III
846		مەجۇنى نۇشمىدارى ساددە
855		مەجۇنى سەنجىرىنا
855		مەجۇنى سۇرۇنجان
946		مەجۇنى سوم (ساماق مەجۇنى)
932		مەجۇنى زەرگۇنى
875		مەجۇنى زىراۋەند
895		مەجۇنى خۇسۇلەھەدد (تومۇر پوقى مەجۇنى)
909		مەجۇنى پودىنە
925		مەجۇنى ھەجەرلىيەھۇد
912		مەجۇنى كەلكەلانىج I
912		مەجۇنى كەلكەلانىج II
920		مەجۇنى تۇر بۇت
933		مەجۇنى لۇبۇبى كەبىر I
953		مەجۇنى لۇبۇبى كەبىر II
922		مەجۇنى لۇبۇبى سەغىر
925		مەجۇنى ئەقرەب
936		مەجۇنى لوغانىزىيا
951		مەجۇنى قەمبىل

خېمىرلار

- 847..... خەمىرى ئەۋرىشم
854..... خەمىرى گازىۋان
880..... خەمىرى سەندەل

جاۋارشلار

- 833..... جاۋارش جالسىئۇس
900..... جاۋارش خەرنۇپ
896..... جاۋارش بۇزۇرى
889..... جاۋارش تەمىرى ھىندى
890..... جاۋارش ئۇد I
890..... جاۋارش ئۇد II
893..... جاۋارش سەپەرچىلى
894..... جاۋارش نارمىشكى
896..... جاۋارش مۇناسىبى
897..... جاۋارش مۇقەۋۋى مەئدە
899..... جاۋارش كۈندۈر

ئىسكەنجىبىن (ئىسكەنجىۋىل) لار

- 887..... ئىسكەنجىبىن سەپەرچىلى
896..... ئىسكەنجىبىن بۇزۇرى

904.....	ئىسكەنجىيىن بۇزۇرى مۆتىدىل
905.....	ئىسكەنجىيىن بۇزۇرى ھار

مەتبۇخ (قايىنىتىلما) لار

845.....	مەتبۇخى ئىپتىمۇن I
908.....	مەتبۇخى ئىپتىمۇن II
941.....	مەتبۇخى ئىپتىمۇن III
858.....	مەتبۇخى ھېلىلە I
938.....	مەتبۇخى ھېلىلە II
858.....	مەتبۇخى شاتىرە I
934.....	مەتبۇخى شاتىرە II
867.....	مەتبۇخى خىيارى شەنپەر
927.....	مەتبۇخى سۇرۇنجان
878.....	مەتبۇخى مۇلەيىمىن
902.....	مەتبۇخى ئەمرى ھىندى

شەرۋەت (شەرىپەت) لەر

833.....	شەرۋىتى بىنەپشە I
9.....	شەرۋىتى بىنەپشە II
838.....	شەرۋىتى زۇفا
873.....	شەرۋىتى زۇفا
841.....	شەرۋىتى فەۋاكە (مىۋىلەر شەرۋىتى)
864.....	شەرۋىتى تۇققاھ (ئالما شەرۋىتى)

868	شەرۋىتى دىنارى I
906	شەرۋىتى دىنارى II
863	شەرۋىتى رۇممان (ئانار شەرۋىتى)
875	شەرۋىتى ئەنسل
877	شەرۋىتى ئەنجىبار
885	شەرۋىتى ئەۋرىشم
889	شەرۋىتى ئەپسەنتىن I
909	شەرۋىتى ئەپسەنتىن II
876	شەرۋىتى خەشخاش
879	شەرۋىتى نىلۋېر
881	شەرۋىتى بىادىرەنجىبۇيا
881	شەرۋىتى گازىۋان
888	شەرۋىتى زىرىشك (زىرىخ شەرۋىتى)
911	شەرۋىتى بۇزۇرى I
911	شەرۋىتى بۇزۇرى II
915	شەرۋىتى كۈشۈش
923	شەرۋىتى بىنادىق بۇزۇرى

مائىل ئۇسۇللار

840	مائىل ئۇسۇل I
849	مائىل ئۇسۇل II
861	مائىل ئۇسۇل III
862	مائىل ئۇسۇل IV
897	مائىل ئۇسۇل V

906.....	مائل تۇسۇل VI
927.....	مائل تۇسۇل VII
939.....	مائلجىيىن
882.....	سەندەل ئەرەقى

مەلھەم (مەرھەم) دورىلار

865.....	مەلھىمى ئىسپىداج I
938.....	مەلھىمى ئىسپىداج II
937.....	مەلھىمى داخلىمون
940.....	مەلھىمى زەنگار
907.....	زىمار
907.....	زىمار

رەۋغەن دورىلار

853.....	رەۋغەنى قۇست (قۇستە يېغى)
854.....	رەۋغەنى قىرۇتى
866.....	رەۋغەن
926.....	رەۋغەنى ئىقرەب (چايان يېغى)

لۇتۇق (يالانچۇق) دورىلار

869.....	لۇتۇق زەنجىۋىل
870.....	لۇتۇق ئىنجۇر

870.....	لۇتۇقى ھۈلبە
871.....	لۇتۇقى سەرپىستان
871.....	لۇتۇقى خەشخاش

باشقىلار

860.....	سۈرمە دۇشنايى (كوزنى روشەنلەشتۈرگۈچى سۈرمە)
874.....	شۈمشە دەملىمىسى
868.....	نۇتۇقى تەمىرى ھىندى
840.....	ھوقنە دورىسى
867.....	ھوقنە
859.....	شىيافى ئەھمەرلەيىن
921.....	شىيافى كۈھلى

بىرىنچى قىسىم. ئۇيغۇر تىبابىتىنىڭ نەزىرىيە ئاساسلىرى

I ماقالا. تەبىئەت ۋە كەيپىيات

ئىنساننىڭ بارلىققا كېلىشى مۇختىلىپ (قارىمۇ - قارشى) بولغان توت تەبىئەت^① يەنى - ئوت، سۇ، تۇپراق ۋە ھاۋالارنىڭ ئوزۇن ئارال بىرىكىشىدىندۇر. بۇ ئەھۋال ئىنسانلار دىلا بولماستىن، بەلكى ھايۋانلار ۋە ئۆسۈملۈكلەردىمۇ شۇنداق. مەسىلەن، ئۆسۈملۈكنىڭ ئۇنىپ ئۆسۈشىنى ئالىدىغان بولساق يەر (تۇپراق)، سۇ، ھاۋا ۋە ئىسسىقلىق (ئوت) نىڭ ئۇرۇققا بولغان ئوزۇن ئارال تەسىرى بىلەن بولىدۇ. ئادەممۇ خۇددى شۇ توت تەبىئەتنىڭ بىرىكىشى بىلەن قۇۋۋەتى مۇغەييىرە (ئۆزگەرتكۈچى كۈچ) گە يولۇ - قۇپ جىسمىيات (ئورگان) ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ھال تىبا - بەتتە "ئەجسامى بەسەت" دىيىلىدۇ. توت تەبىئەتنىڭ

① توت تەبىئەت - ئۇيغۇر تىبابەت ئەسەرلىرىدە "ئاناسىر ئەرىيە" (4 ماددا نەزىرىيىسىگە ئاساسەن تەھلىل قىلىنىدۇ. بۇ يەردە مۇھىم جايلارنى قىسقارتىپ سۆزلىنىدۇ).

داۋاملىق ئەسىر قىلىشى ئارقىسىدا قۇۋۋەتى نامىيە (توسۇش كۈچى) گە يېتىپ تەرەققى قىلىدۇ. ۋە قۇۋۋەتى مۇسۋىرە (شەكىللىنىش كۈچى) بارلىققا كېلىپ ئادەم سۈرىتى شەكىللىنىدۇ. بۇ ھال "ئەجسام مەسەد" دەپ ئاتىلىدۇ.

توت تەبىئەت ئىنسان بەدىنىدە توت كەيپىياتنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ. ئۇلار: رۇتۇبەت (ھوللۇك)، يۇبۇسەت (قۇرۇقلۇق)، ھارارەت (ئىسسىغىلىق)، بۇرۇدەت (سوغاقلىق) دىن ئىبارەت بولۇپ، ئىنسان ھاياتى ئۈچۈن بەكمۇ مۇھىم. مەسىلەن، بەدەندە ئىسسىغىلىق بولمىسا ئوزۇقلۇق پىشمايدۇ (پارچىلانمايدۇ)، سۇيۇقلۇق بولمىسا ئوزۇقلۇقلار شىمىرىلمەيدۇ. سۇيۇقلۇق بولمىسا بەدەندە ھاياتنىڭ بولۇشى مۇمكىن ئەمەس. ساپ ھاۋا بولمىسا نەپەس ئېلىش قىيىنلىشىدۇ. تەبىئەتتە قۇرۇقلۇق بولمىسا سىڭىنىڭ قو-مانىدانلىق قىلىش كۈچى ئاجىزلىشىپ قەتلى جاپىدا بولماسلىق، ئېغىزدا تاماق ئەمىنى سېزەلمەسلىككە ئوخشاش ئەھۋاللار كېلىپ چىقىدۇ. سوغاقلىق بولمىسا يۈرەكنىڭ خىزمىتى ياخشى بولمايدۇ. بۇنىڭدىن كۆرگىلى بولىدۇكى توت كەيپىيات ئادەم بەدىنىدە باراۋەر بولۇشى لازىم. بىر بىرىدىن كەم بولماسلىقى، ئارتۇق ياكى ئاچار بولماسلىقى كېرەك. توت كەيپىياتنىڭ ئادەم بەدىنىدىكى بىر بىرىگە قارىمۇ - قارشى پائالىيەتلىرى نەتىجىسىدە "مىزاج" ھاسىل بولىدۇ.

1 - پەسىل: مىزاج.

"مىزاج" توت خىل كەيپىيات يەنى ئىسسىق، سوغاق، قۇرۇق، نەمىنىڭ ئومۇمىي بەدەندە ئىپادىلىنىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، توت كەيپىيات تەكشى بولغان مىزاجنى ياخشى مىزاج يەنى مۇۋاپىق مىزاج دەپ؛ توت كەيپىيات تەكشى بولمىغان مىزاجنى بۇزۇق مىزاج (سۇئىلىمىزاج) دەپ ئىككىگە بۆلىنىدۇ. سۇئىلىمىزاج ئوز نوۋىتىدە خىلىت ئارىلاشمىغان مىزاج (سازمەج) ۋە بۇزۇلغان ماددىلار قوشۇلغان مىزاج (ماددى مىزاج)لارغا بۆلىنىدۇ. ياخشى مىزاج ئوز نوۋىتىدە 8 تۈرگە بۆلىنىدۇ.

- (1) موتىدىل ھالدىكى ئىسسىقلىق.
- (2) موتىدىل ھالدىكى سوغاقلىق.
- (3) موتىدىل ھالدىكى قۇرۇقلۇق.
- (4) موتىدىل ھالدىكى ھوللۇك (نەملىك).
- (5) سوغاقلىق بىلەن قۇرۇقلۇقنىڭ بىرىكىپ مو-
تىدىل ھالغا كېلىشى.
- (6) سوغاقلىق بىلەن سۇيۇقلۇقنىڭ بىرىكىپ مو-
تىدىل ھالغا كېلىشى.
- (7) قۇرۇقلۇق بىلەن ئىسسىقلىقنىڭ بىرىكىپ مو-
تىدىل ھالغا كېلىشى.
- (8) ئىسسىقلىقنىڭ ھوللۇك بىلەن بىرىكىپ موتىدىل
ھالغا كېلىشى.

“ناچار مىزاج” مۇ 8 تۈرگە بۆلىنىدۇ

- (1) موتىدىل ھالدىن ئېشىپ كەتكەن. ئىسسىقلىق.
- (2) موتىدىل ھالدىن ئېشىپ كەتكەن قۇرۇقلۇق.
- (3) موتىدىل ھالدىن ئېشىپ كەتكەن سوغاقلق.
- (4) موتىدىل ھالدىن ئېشىپ كەتكەن ھوللۇك.
- (5) موتىدىل ھالەتتىن ئېشىپ كەتكەن ئىسسىقلىق بىلەن قۇرۇقلۇقنىڭ بىرىكىشى.

- (6) موتىدىل ھالەتتىن ئېشىپ كەتكەن ئىسسىقلىق بىلەن ھوللۇكنىڭ بىرىكىشى.

- (7) موتىدىل ھالەتتىن ئېشىپ كەتكەن سوغاقلق بىلەن ھوللۇكنىڭ بىرىكىشى.

- (8) موتىدىل ھالەتتىن ئېشىپ كەتكەن سوغاقلق بىلەن قۇرۇقلۇقنىڭ بىرىكىشى.

كىشىلەرنىڭ مىزاجى مىللەت ئايرىمىسى، ئولتۇراق جايى (كىلىمات)، تۇرمۇش شارائىتى قاتارلىق ئەھۋاللارغا قاراپ ھەر خىل ۋە مۇرەككەپ بولىدۇ. تەۋپ كېسەلنى تەكشۈرگەندە كېسەلنىڭ قايسى مىزاجدا ئىكەنلىكىنى ۋە قانداق ئۆزگەرگەنلىكىنى ئوبدان بايقىشى لازىم. مىزاجنىڭ ئۆزگىرىشىگە ۋە ئادەم مىزاجىنىڭ ھول، قۇرۇق، ئىسسىق، سوغاقلغىغا قاراپ دورا بەلگىلەش كېرەك. ئەگەر مىزاج بەلگىلەشتە توغرا بولمىسا تەشخىس (دىئاگنوز) مۇ ۋە بېرىلگەن دورىمۇ خاتا بولىدۇ.

II ماقالا. توت خىلىت (ئەخلاقى ئەربەئە)

خىلىتلار بىر خىل ھول سۇيۇقلۇق بولۇپ، ئادەم بەدىنىدە دائىم ئېقىپ يۇرىدۇ. خىلىتلار توتكە بولىنىدۇ. قان، سەپرا، بەلغەم ①، سەۋدا.

بەدەننىڭ ساغلام تۇرىشى (قەۋامى) توت خىلىتە. ئىككى ئېتىدالدا (نورمال) بولۇشىغا باغلىق بولۇپ، كەم زىيادە بولۇشى ياكى مۇرەككەپ بولۇشى كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. خىلىتلەر "تەبىئى" ۋە "غەيرى تەبىئى" بولۇپ، ئولچەمگە لايىق "نورمال" بولغىنى تەبىئى، ئۇ-ئىككى ئەكسىچە بولغىنى غەيرى تەبىئى ھىساپلىنىدۇ. مەسىلەن، توق جىگەر رەڭلىك تازا قان تەبىئى قان، قا-رامتۇل، كۆيەك ياكى كۆك يېشىلغا مايىل قان غەيرى تەبىئى قان دىيىلىدۇ. بۇ-قانغا ھەر خىل بۇزۇق خىلىت ۋە ئۇفۇنەت (بۇزۇق گاز) ئارىلىشىپ قالغانلىق - نەتە-جىسى بولۇپ كېسەل تۇغدۇرىدۇ.

① بەلغەم: بۇ يەردىكى بەلغەم ئادەتتە يوتەلگەندە چىقىدۇ.

دىغان شىلىمىشنى خەپىرۈك ئەمەس. بەلكى بىر خىل رەڭسىز (ئاق) شىلىمىشنى سۇيۇقلۇق ماددا بولۇپ، يونان ۋە مىسىر تىۋىپلىرى ئۆز ئەسەرلىرىدە بەلغەمنى لىمفا سۇيۇقلۇقى دەپ ئىزاھلايدۇ (مەخزەنلىجاۋاھىر كىتابىدىن).

1 - پەسىل: خىلىتلارنىڭ ھاسىل بولۇشى

خىلىتلارنىڭ ھاسىل بولۇشى ئادەم يىگەن تاماق-نىڭ خۇسۇسىيىتىگە باغلىق. مەسىلەن، ئىستىمال قىلىنغان ئوزۇقلۇق ئېغىز بوشلىقىدا بىر قەدەر ئىزىلىپ قىزىل ئوڭگەچ ئارقىلىق ① مەيدىگە چۈشىدۇ. مەيدىنىڭ ھەزىم قىلىش كۈچى ۋە ھەزىم بەزلىرى (غۇدۇدى ھەزىمىيە) نىڭ ياردىمى بىلەن ئارپا ئۇنىنىڭ ئۈمچىدەك شىرە ھالىغا يەنى "كەيلىۈس" كە ئايلىنىدۇ. ئوزۇقلۇق ماددىلار (كەي-لىۈسنىڭ جەۋھىرى) مەئدە ۋە ئۈچەيلەردىن جىگەرنىڭ تارتىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋەبى جازىبەسى) بىلەن ماسارىقە دەپ ئاتىلىدىغان تومۇر ئارقىلىق جىگەرگە كىرىدۇ. كېرەكسىز قالدۇقلىرى ئۈچەي ئارقىلىق سىرتقا چىقىپ كېتىدۇ. جىگەرگە كەلگەن قىسمى يۈرەكنىڭ نورمال ھارارىتى (ھارارىتى غەرىزىيىسى) نىڭ ياردىمى بىلەن پىشىدۇ ②. پارچىلىنىپ پىشش ئۆلچەم ئىچىدە بولغاندا قان ئىشلىنىپ چىقىدۇ.

① مەئدە: ئاشقاران.

② بۇ يەردىكى قايناش پىشش سۇنىڭ ۋاراقىپ قايناشى ياكى نەرسىلەرنىڭ ئوتتا پىششىنى ئەمەس بەلكى ئوزۇقلۇقنىڭ بەدەن ھارارىتى بىلەن بەدەنگە ئۆزلەشكىدەك ھالەتتە پارچىلىنىشى كوزدە تۇتىدۇ. قاننىڭ قاينىشىمۇ ئۇنىڭدىكى خىمىيەۋى ئۆزگىرىش لىرىنى كوزدە تۇتىدۇ.

ئاندىن تاماق ماددىسى جىگەرنىڭ ھەزىم قىلىش كۈچى بىلەن سۈتكە ئوخشاش بىر سۇيۇقلۇققا ئايلىنىدۇ. بۇ كەيمۇس دىيىلىدۇ. كەيمۇس داۋاملىق قىيام بولۇپ، جىگەر كۈچىنىڭ ياردىمى بىلەن جىگەر رەڭگە كىرىدۇ. بۇ تەبىئى قاننىڭ ھاسىل بولۇشىدىن ئىبارەت.

قاننىڭ ئېتىدال ھالەتتە قىيامغا كېلىشى نەتىجىدە سىدە ئۇنىڭ يۈزىگە سېرىق رەڭلىك بىر نەرسە ھاسىل بولىدۇ. بۇ قاننىڭ كىچىكى ھىساپلىنىپ نورمال سەپرا (سەپرايى تەبىئى) دەپ ئاتىلىدۇ. قاننىڭ داۋاملىق قىيامغا يېتىشى بىلەن قاننىڭ تېگىدە چوكمىسى (رۇسۇپى) ئول-تۇرىدۇ. ئۇ تەبىئى سەۋادىدىن ئىبارەت بولىدۇ. يەنە داۋاملىق قىيامغا كېلىشىدىن تۇخۇم ئېقىغا ئوخشاش بىر نەرسە ھاسىل بولىدۇ. بۇ تەبىئى بەلغەم دىيىلىدۇ.

خىلىتلەرنىڭ ھاسىل بولۇشى ۋە ئوزگىرىشىگە تۈۋەندىكىلەر تەسىر كۆرسىتىدۇ.

- (1) شۇ كىشىنىڭ ئەسلى نەسلىنىڭ تەبىئىتى
- (2) ئوزۇقلىنىشنىڭ ياخشى-ناچار بولۇشى؛ (3) ئولتۇراق جايىنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى (شۇ جايىنىڭ ئىسسىق، قۇرغاق، نەم ياكى سوغاق بولۇشى؛ (4) پەسلىنىڭ بىر خىل بولماسلىقىغا قاراپ خىلىتلارمۇ ھەر خىل بولىدۇ. مەسىلەن، ياز، كۈز، ئەتىياز ۋە قىش كۈنلىرى تۇغۇلغان خىلىتلار ئوخشاش بولمايدۇ. كۈچلۈك تاماق بىلەن ئوزۇقلىنىدىغان كىشىدە شۇ جايىنىڭ ھاۋاسى قۇرۇق ئىسسىق ۋە پەسلى

ياز بولۇش سەۋىيىدىن قاننىڭ قاينىشى ئېتىدالدىن ئېشىپ كەتسە ئەسلىدە ھاسىل بولىدىغان سېرىق كىپەك كۆپۈك شەكلىدە بولىدۇ. بۇ سەۋدا غەيرى تەبىئى (مۇۋاپىق بولمىغان ھالىدىكى سەپرا) نىڭ ھاسىل بولمىشىدىن ئىبارەت. شۇنداقلا قاننىڭ ئارتۇق قاينىشى بىلەن ئەسلىدىكى رۇسۇپ (چۆكمە) كۆيۈپ كۆيۈندىگە ئوخشاش قارا رەڭلىك بولۇپ سەۋدايى غەيرى تەبىئى ھاسىل بولىدۇ. ئەگەر قايناش بەك تۆۋەن بولغاندا خام قالغان بەلغەم، بەلغىمى غەيرى تەبىئى (مۇۋاپىق بولمىغان ھالىدىكى بەلغەم) بولىدۇ.

2 - پەسىل: خىلىتلارنىڭ خۇسۇسىيىتى ۋە

ئۆزگىرىشى

قان: تەبىئى قان يەنى ئېتىدالدا قايناپ سۇزۇك ھالدا ھاسىل بولغان قان خىزمەت قىلغۇچى قان (خۇنى فائىلى) دىيىلىدۇ.

قاننىڭ كەيپىياتى ھول ئىستىقۇر.

ئۇ تۆۋەندىكى خۇسۇسىيەتلەرگە ئىگە:

- (1) بەدەننى ساپ ھاۋا ۋە ئوزۇقلۇقلار بىلەن تەمىنلەپ دۇ.
- (2) بەدەننى ئىستىتىدۇ. (3) بەدەن ھارارىتىنى ھاسىل قىلىدۇ. (4) بەدەننى سۇغىرىدۇ. (5) بەدەننىڭ شەكلىنى چىرايلىق قىلىدۇ. (6) بەدەننى يۇمشاق، ياغلىق قىلىدۇ.
- قاننىڭ ئۆزگىرىشى - مىقدارىنىڭ كۆپ بولۇشى، قىيامى (قويۇق - سۇيۇقلۇق دەرىجىسى) نىڭ قۇيۇلۇپ

قېلىش. قىيامنىڭ سوۋۇپ قېلىشى ياكى قانغا تۇرلۇك خىلىتلار ۋە تۇرلۇك ئۇفۇنەت (بۇزۇق گاز) ھەم ھەر خىل جەراسىم (مىكروپلار) نىڭ ئارىلىشىپ قېلىشى. تۈپەيلىدىن بولىدۇ.

سەپرا (ئوت): مۇۋاپىق ھالدىكى سەپرا ياكى سەپرائى تەبىئىنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى (1) مەئدە (ئاشقازان) دىكى تاماق ماددىلىرىنى سۇيۇقلاندىرىدۇ، يۇمشىتىپ بېرىدۇ؛ ئېغىز تەمىنى تاتلىقلاشتۇرىدۇ. (2) يۇمشىغان تاماق ماددىلىرىنىڭ ئىنچىكە ئۇچەيلەردىن ئوتىشىگە ياردەم بېرىدۇ. (3) ئۇچەيدە ئېچىش جەريانىنى بارلىققا كەلتۈرۈپ چوڭ تەرەت (بەۋۋل) نىڭ ئادا بولىشىغا ياردەم بېرىدۇ، مەئدە ۋە ئۇچەيلەردە توختاپ قالغان نەرسىلەرنىڭ چىقىرىلىشىنى ئاسانلاشتۇرىدۇ.

ئومۇملاشتۇرۇپ ئېيتقاندا، مەئدەنى قىزىتىش، تاماقنى تېز پارچىلاش سەپرانىڭ تەسىرىدە ۋۇجۇتقا كېلىدۇ. سەپرا كەيپىيات جەھەتتىن قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ، ئىسسىقلىق ھەددىدىن ئېشىپ كەتكەندە سەپرائى غەيرى تەبىئى ھاسىل بولىدۇ. بۇ تۈتكە بولىنىدۇ:

1 - چۈچمەل سەپرا: سەپراغا بەلغەم ياكى سەۋدادىن كېلىپ چىققان بىر خىل شىلىمىشقى ماددا قوشۇلۇپ تەمىنى چۈچمەل قىلىپ قويىدۇ.

2 - كويگەن سەپرا (سەپرائى موھتەرىقە): غەيرى تەبىئى سەۋدانىڭ سەپراغا قوشۇلۇپ قېلىشى بىلەن بەدەندە

ئېچىش ۋە قىزىرىش بارلىققا كېلىدۇ. ياز پەسلىرىدە كۆپ ئۇچراپ ئۇقۇنەت ۋە جەراسىملىرىنىڭ قوشۇلۇشى بىلەن ھەر خىل تەپ (قىزىتما) كېسەللىكلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ.

3 - ئارىلاشما سەپرا (سەپرائى گىراسە): چۈچمەل سەپرا بىلەن كويىگەن سەپرائىنىڭ بىرىكىشى بىلەن كېلىپ چىقىدۇ. سەپرائىنىڭ شەكلى قانۇرۇلغان ئالتۇن گۇڭگۇرت سېرىغىغا ئوخشايدۇ. (بەزىلەر تۇخۇم سېرىغىغا ئوخشىتىدۇ). كويۇك ۋە ئاچچىق نەرسە مەئىدەدە قالىدۇ.

4 - زەھەرلىك ياكى يامان سۈپەتلىك سەپرا: سەپرائى غەيرى تەبىئىيىنىڭ باشقا تۈرلىرىگە ئىسسىق زەھەرلىك بولۇپ، بەدەندە ھاسىل بولغاندا ھەر خىل يامان سۈپەتلىك كېسەللەرنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ.

بەلغەم: تەبىئىي بەلغەم قويۇق ئاق رەڭدە بولۇپ كەيپىيات جەھەتتىن ھول سوغاق، بەلغەم بەدەندە سەپ بولغان تۇغما ھالدىكى سۇيۇقلۇق (روتوبەتى غەيرى) نىڭ ئورنىنى تولدۇرىدۇ. بەدەندىكى ياغ ماددىسىنىڭ كۆپىيىشىگە ياردەم بېرىدۇ. بەدەننىڭ نەملىككە بولغان ئېھتىياجىنى قامداشقا خىزمەت قىلىپ، ئوسۇپ تەرەققى قىلىشىغا ياردەم بېرىدۇ. بەدەننى يۇمشاق ساقلايدۇ، ئادەم ئاغرىپ ياكى ئاچ قېلىپ تاماقتىن ئايرىلغاندا بەلغەم بەدەننىڭ ئوزۇقلۇق ئېھتىياجىنى ۋاقىتتىنچە تەمىنلەپ تۇرىدۇ. بەلغەمنىڭ سەپ بولۇش ئورنى مېڭە - يۇلۇن ھىساپلىنىدۇ.

بەلغەمنىڭ ئوزگىرىشى بەلغەمى غەيرى تەبىئى بولۇپ، ئۆز-
ۋەندىكى 5 خىلدىن ئىبارەت:

1 - بەلغەمى شىرىن (تاتلىق بەلغەم): تەبىئى
ھالدا قەن ئارىلاشقان بولىدۇ.

2 - بەلغەمى شور (ئاچچىق بەلغەم): تەبىئى بەل-
غەمگە خىلىتلار كۆيۈندىسى ئارىلاشقان بولۇپ، بۇنى
جالىنۇس سەپرائى غەيرى تەبىئىنىڭ بىر قىسمى دەپ
ئاتايدۇ. بۇ خىلدىكى بەلغەم باشقىلارغا قارىغاندا ئىسسىق
لىقى يۇقۇرى كېلىدۇ.

3 - چۈچىمەل بەلغەم: بىر ئاز تاتلىق تەمگە
ئىگە توۋەن ھارارەتلىك بەلغەم.

4 - بەلغەم ئەپەس (موزا تەملىك بەلغەم) ياكى
بەلغەمى ئەرەزىيە (ئۆيۈپ قالغان بەلغەم): بەلغەمدە سو-
غاقلىق غالىپ بولغانلىقتىن كېلىپ چىققان بولۇپ، ئۇ-
يىغان ھاكقا ئوخشايدۇ.

5 - بەلغەمى بېمەزە (تەمسىز بەلغەم): ھىچقانداق
تەمى بولمايدۇ. سوغاقلىقنىڭ كۈچىگىدىن كېلىپ چىققان
بولۇپ، كۆچ جەھەتتىن ناچارلىقنىڭ بەلگىسى بولىدۇ.
خۇلاسە قىلىپ ئېيتقاندا، بەلغەم تەبىئىنىڭ ئۆز-
گىرىشى بەلغەمگە ھەر خىل زەھەرلىك ماددىلارنىڭ
ئارىلىشىشى بىلەن ۋۇجۇتقا كېلىدۇ. ھەر خىل كېسەللىك
لەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

سەۋدا: ئىتتىدال ئىسسىقلىق بىلەن پىشىپ ھاسىل
بولغان تەبىئى سەۋدا تال ۋە جىگەر ئارقىلىق سېزىش

ئەزالىرىغا تارقىلىدىغان قويۇق قىزارمىتۇل سۈيۈملۈك بۇنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى:

1. سەزگۈ ئەزالىرىنىڭ سېزىش قابىلىيىتىنى ئا-
شۇرىدۇ.

2. پىكىر قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ.

3. قوساق ئاچقاندا تالدىن كېلىپ مەئىنى
غىدىغلاپ قوساقنى ئاچۇرىدۇ. مەئىنىنىڭ تارتىش (جازىبە)
كۈچىنى ئاشۇرىدۇ.

سەۋدا كەيپىيات جەھەتتىن قۇرۇق سوغاق ھىساپ
لىنىدۇ. سەۋدانىڭ ئوزگىرىشى شۇكى، تەبىئى سەۋدانىڭ
مىقداردىن ئارتۇق بولىشىدىن ۋە يۇقۇرقى 3 خىلىنىڭ
كويىگە ئىلىكىدىن - غەيرى تەبىئى سەۋدا ھاسىل بولىدۇ.

3 - پەسىل: ياش ۋە رەڭ - رويىنىڭ خىلىتلەر
بىلەن مۇناسىۋىتى ۋە ئالامەتلىرى

1 - ياش: ياشلار 4 دەۋرگە بولىنىدۇ:

1. بىر ياشتىن 28 ياشقىچە ئوسۇش دەۋرى بول-
لۇپ، بۇ دەۋردە مىزاج ئىسسىق ۋە سوغاقلقتا مۇتەدىل،
ھوللۇك زىيادە بولىدۇ.

2. ياشلىق دەۋرى (سەنەئى شىباب) 28 دىن 36
ياكى 40 ياشقىچە بولغان دەۋر بولۇپ، ئىسسىقلىق
تەرەققى قىلىدۇ. ئەقلى پاراسەت ئاشىدۇ. ئادەتتە مىزاجى
ھول ئىسسىق كېلىدۇ.

3. يېتىلگەن دەۋر (كۆھولىيەت) 40 دىن 60 گىچە بولغان دەۋرى بولۇپ، قوۋۋەتنىڭ تەرەققى قىلىشى توختايدۇ. ئىسسىقلىق، ھوللۇك تەرەپكە مايىل بولىدۇ. تەبىئى ئىسسىقلىق (ھارارىتى غەرىزى) توۋەنلەشكەنلىكتىن خىلىتلەر جام قېلىشقا باشلايدۇ.

60 ياشتىن ئومرىنىڭ ئاخىرىغىچە قېرىلىق دەۋرى بولۇپ، بۇ دەۋردە ئادەم ئەقلى پاراسەت، ھەركەت ۋە جىسمانى كۈچ جەھەتلىرىدىن دەرىجە بويىچە بارغانسېرى توۋەنلەپ بارىدۇ. تەجرىبىلەرگە ئاساسلانغاندا بەدەندە غەرىزى سۈيۈقلۈك قانچە كۆپ بولسا، شۇنچە ئۇزۇن. ياشايدۇ.

2 - بەدەن رەڭگى: بەدەن رەڭگىنىڭ ھەر خىل بولىشى مەلۇم بىر تۈردىكى خىلىتقا ۋاكالىتلىك قىلىدۇ. مەسىلەن،

(1) بەدەننىڭ رەڭگى قىزىل بولسا، قاننىڭ غالىپلىقى (كۆپلىكى) نى كۆرسىتىدۇ.

(2) بەدەننىڭ رەڭگى سېرىق بولسا سەپىرانىڭ غالىپلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

(3) بەدەننىڭ رەڭگى ئاق بولسا بەلغەمنىڭ غالىپلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

(4) بەدەننىڭ رەڭگى قارا بولسا سەۋدانىڭ غالىپلىقىنى كۆرسىتىدۇ ۋە باشقا خىلىتلەرنىڭ كۆيگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

4. مىزانىڭ بەدەندىكى ئالامەتلىرى:

(1) ئىسسىق مىزاج — بەدەننىڭ قىزىق بولۇشى كۆپ ئۇسشاش، سوغاقتىن راھەتلىنىش، ئىسسىقتىن قەيەش، چىرايى قىزىل بولۇش قاتارلىقلار ئىسسىق مىزاجلىقنىڭ ئالامەتلىرىدىن ئىبارەت.

(2) سوغاق مىزاج — بەدەننىڭ سوغاق بولۇشى، توڭۇشقا مايىل كېلىش، ئەسەپ ۋە پەيلەرنىڭ بوش بولۇشى، ھەزىمنىڭ ئاچارلىقى ۋە مەئىدە ئاچچىق سۇ پەيدا بولۇشلار. سوغاق مىزاجلىقنىڭ بەلگىسىدىن ئىبارەت.

(3) قۇرۇق مىزاج — بەدەن ئۇرۇق بولۇپ ئۇيۇقۇ كەلمەسلىك، مەئدە ئاغرىقلىرىغا ئاسان مايىل بولۇش، كۆپ سۆزلەش، ئېغىز ئىچى كالىپۇكلار دائىم قۇرۇپ تۇرۇش مىزاجلىقنىڭ ئالامىتى.

(4) ھول مىزاج — كۆپ ئۇخلاش، ھورۇن تەبىئەتلىك، بەدەنلىرى بوش ۋە غەيرى تەبىئى سېمىز بولۇش ھول مىزاجلىقتىن دېرەك بېرىدۇ.

ئەرلەرنىڭ مىزاجى ئادەتتە ئىسسىق ياكى ھول ئىسسىق، ئاياللارنىڭ ھول سوغاق ياكى قۇرۇق سوغاق كېلىدۇ.

4 - پەسىل: خىلىمەتلەر ئۆزگىرىشىنىڭ ئالامەتلىرى

1 - قاننىڭ كۆپ بولۇشى: باش ئېغىر بولىدۇ، تولا كېرىلىدۇ، ئەسنەيدۇ، ئۈگىدەيدۇ، ئاغزى تاتلىق، چىرايى قىزىل بولىدۇ، تېرە ئۈستىگە ھەر خىل قاپارتمىلار كۆپرەك چىقىدۇ.

2 - سەپرانىڭ كوپ بولۇشى: چىرايى سېرىق، ئاغ-
زى ئاچچىق، تىل ۋە بۇرنى قۇرۇق كېلىدۇ. ئىشتىھاسى
كەم، ئىچكى ئەزالاردا ئېچىش ۋە سانجىق بولىدۇ،
كوڭلى ئاينىدۇ، كۆزنىڭ ئېقى سېرىق رەڭگە كىرىپ
تىلىنمۇ سېرىق گەز باغلايدۇ، ئورۇقلاپ كېتىدۇ.

3 - بەلغەمنىڭ كوپ بولۇشى: چىرايى ئاق، بە-
دىنى يۇمشاق ۋە بوشىغان بولىدۇ، مەئىدىنىڭ خىزمىتى
ناچارلىشىدۇ، مىڭە خىزمىتى، جۈملىدىن ھەركەت ۋە سەز-
گۈ ئەسەپ (نېرۋا) لىرىنىڭ خىزمىتى ئاجىز كېلىدۇ. ئۇ-
نۇتقاق بولىدۇ، تولا ئۇخلايدۇ.

4 - سەۋدا كوپ بولغاندا چىرايى قارا بولۇپ،
مەنىسىز خىياللارنى تولا قىلىش، يالغان ئىشتەي ھا-
سىل بولۇش، مەئىدە سانجىقلىشىش ۋە يۈرەك خىزمىتى
ئاجىزلىشىش ئەھۋاللىرى كۆرىلىدۇ. كەم قانلىق، ئۇيقۇ-
سىزلىق ياكى ھەر خىل ئەسەپى (نېرۋا) كېسەللىكلىرى
كېلىپ چىقىدۇ.

"يەل" دىگەن مۇستەقىل خىلىت ئەمەس، بەلكى
خىلىتلاردىن ھاسىل بولغان بوخارات (ھور) بولۇپ ئىس-
سىق يەل ۋە سوغاق يەل دەپ 2 گە بۆلىنىدۇ. ئىس-
سىق يەل سەپرا ۋە قاندىن ئاجرىلىپ چىقىدۇ. سوغاق
يەل بەلغەم ۋە سەۋدادىن ئاجرىلىپ چىقىدۇ. يەلنىڭ
بەدەنگە پايدىسى يوق، ئەكسىچە زىيانلىق بولۇپ، كې-
سەللىك كەلتۈرىدۇ.

III ماقالا. ئەزالار ۋە ئۇلارنىڭ خىزمىتى

1 - پەسىل: ئەزالارنىڭ دەرىجىسى

(1) باشقۇرغۇچى ئەزالار (ئەزاى رەئىسە) — پۈتۈن بەدەننى باشقۇرۇپ تەمىنلىگۈچى ئەزالارغا ئېيتىلىدۇ. باشقۇرغۇچى ئەزاغا بىرەر ھادىسە يەتسە باشقا ئەزالارنىڭ ساغلام تۇرۇشى مۇمكىن ئەمەس، بەلكى ئۆلۈم خەۋپى بار. شۇنىڭ ئۈچۈن باشقۇرغۇچى ئەزالارنى تونۇش مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇ تۈۋەندىكىچە:

(1) مىڭە: پۈتۈن ھەركەت ۋە سېزىش ئەسەپ-لىرىگە قومانداىلىق قىلىپ، باشقا ئەزالار خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ. باشقا ئەزالار خىزمىتىنىڭ ياخشى ياكى ناچار بولىشى مىڭىنىڭ قۇۋۋىتى ۋە سالامەتلىكىگە باغلىق.

(2) يۈرەك: پۈتۈن بەدەنگە قان يېڭى ھاۋا يەتكۈزۈپ ۋە ئىسسىقلىق بېرىپ ھاياتلىقنى داۋاملاشتۇرىدۇ.

(3) جىگەر: بەدەندىكى ماددىلارنى باشقۇرىدۇ. باشقا ئەزالارنى كېرەكلىك مىقدىدلا بىلەن تەمىنلەپ تۇرىدۇ. جىگەرگە تەسىر يەتسە ماددىلار قالايمىقانلىشىپ پۈتۈن بەدەن خىزمىتىگە دەخلى يېتىدۇ. قەدىمقى ھو -

كۇما (تۇمپ) لارنىڭ بەزىلىرى يۇقۇرىدىكى 3 ئەزادىن تاشقىرى ئۇرۇق بېزى ۋە مەئدەنىمۇ باشقۇرغۇچى ئەزالار قاتارىغا كىرگۈزۈشنى تەكىتلەيدۇ،

(2) ياردەمچى ئەزالار (ئەزايى مەروسىيە): ئوپكە، مەئدە، تال، ئوت خالىتىسى ۋە بورەكلەر بولۇپ، بۇ خىلدىكى ئەزالار بىر تەرەپتىن باشقۇرغۇچى ئەزادىن مەدەت ئالسا، يەنە بىر تەرەپتىن ئۇنىڭغا ياردەملىشىدۇ. مەسىلەن ئوپكە سىرتتىن ھاۋايى نەسىمى (ساپ ھاۋا)نى تارتىۋېلىپ يۈرەككە يەتكۈزىدۇ. يۈرەكتىن چىققان قاننى تازا ھاۋا بىلەن ئالماشتۇرۇپ يۈرەك ھەركىتى ۋە ئىسسىقلىقىغا ماسلىشىدۇ. مەئدەنىڭ ھەركەتلىنىشى ۋە ھارارىتى يۈرەك ياردىمى بىلەن بولىدۇ. يەنە بىر تەرەپتىن جىگەردىن ئوت ئارقىلىق سەپرا، تالدىن سەۋدا قۇيۇلۇپ مەئدەنىڭ تاماق ھەزىم قىلىشىغا ياردەم قىلىدۇ.

(3) خىزمەتچى ئەزالار (ئەزايى خادىمە): يۈرەك-نىڭ خىزمەتچى ئەزالىرى شىريان (قىزىل تومۇر - ئار-تېرىيە)، ۋەرىد (كۆك تومۇر - ۋېنا) بولۇپ، تال ۋە ئوت خالىتىسى جىگەرگە خادەم ئەزا بولۇپ خىزمەت قىلىدۇ. سەزگۈ ۋە ھەركەت ئەسەپلىرى مىڭنىڭ خىزمەتچى ئەزالىرى ھىساپلىنىدۇ. خىزمەتچى ئەزالار باشقۇرغۇچى ئەزانىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلغۇچىلاردىن ئىبارەت.

2 - پەسىل: ئەزالار خىزمىتى

ئىستېمال قىلىنغان تاماق ئېغىزدا چايىنىلىپ قىزىل
ئوڭگەچ ئارقىلىق مەئىدەگە چۈشىدۇ. مەئىدە تاماق ماددىلىرىغا
ھەزىم سۈيۇقلۇقى ئارىلىشىدۇ. تۈۋەنگە چۈشكەندە ئوت
خالتىسىدىن سەپرا ۋە مەئىدە ئاستىدىكى "لەيلە" دىگەن بەز
ئىشلەپچىقارغان سۈيۇقلۇقلار قوشۇلىدۇ. مىڭدىن كەلگەن
ئەسەپ يىپىچىلىرىنىڭ تەسىرى بىلەن پىشپ تاماق بوت-
قىسى "كەيلۇسى"غا ئايلىنىدۇ. كەيلۇسىنىڭ جەۋھىرى
مەئىدەنىڭ ھەزىم قىلغۇچى كۈچى (قۇۋۋەت) مەزىمە ۋە
شىمىرگۈچى كۈچى (قۇۋۋەت) جازىيە، ھەيدىنچى كۈچى
(قۇۋۋەت) داپىيە) نىڭ ياردىمى بىلەن ئۈچەيگە ئۆتۈپ،
ماسارنىق تومۇرى ئارقىلىق جىگەرگە بارىدۇ. جىگەردە
تېخىمۇ پىشپ (پارچىلىنىپ) كەيمۇسقا ئايلىنىدۇ. دىمەك
كەيلۇس ئوزۇقلۇقلارنىڭ مەئىدە ئىچىدە پىشقان جەۋھىرى،
كەيمۇس بولسا جىگەردە پىشقان جەۋھىرى بولۇپ ئاريا
يارمىسىنىڭ شىرىسىگە ئوخشايدۇ.

كەيمۇس داۋاملىق پىشپ توت خىل جەۋھەر
ئايىرىلىپ چىقىدۇ. يۈزىگە سېرىق كېپەكتەك ئورلەپ چىق-
قىنى سەپرا بولۇپ ئوت خالتىسىغا كىرىدۇ. ئىككىنچى
ئاق سۈيۇقلۇقنىڭ ئەڭ سۈيۈق قىسمى بورەككە سۇيىدۇك
يوللىرىغا ئاجرىلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭ تەركىبىدە بىرئاز
قان بولىدۇ. يەنە بىر قىسمى بىرئاز قويۇغراق بولۇپ

بەلغەم، ماددىسىنى تەشكىل قىلىپ ئۆپكەگە ئوخشاش سۇيۇقلۇق جەلپ قىلغۇچى ئورۇنغا تارقىلىدۇ. ئۈچىنچىسى ساپ قان بولۇپ، كۆك تومۇرلار ئارقىلىق يۈرەككە بارىدۇ. قاننىڭ روسۇبى (لېيى) — سەۋدا بولۇپ جىگەر بۇنى تالغا تاپشۇرۇپ بېرىدۇ. تال سەۋدانى ساقلىغۇچى بولۇپ كېرەك بولغاندا ئەزالارغا يەتكۈزۈپ بېرىدۇ.

3 - پەسىل: ئەزالاردا بولىدىغان قۇۋۋەتلەر

پۈتۈن بەدەننىڭ كۈچى 3 خىل قۇۋۋەت (روھ) ① نىڭ بىرىكىشىدىن ئىبارەت.

1. ھاياتلىق كۈچى (قۇۋۋەبى ھاياۋانى): بۇنىڭ مەركىزى يۈرەك بولۇپ، ئۇ ئەزالارغا تارقالغان ھاياتلىق كۈچىدىن ئىبارەتتۇر، تىرىكلىك شۇنىڭغا باغلىق. يۈرەك بۇ قۇۋۋەتنىڭ تەسىرىدە كېڭىيىش (ئىنبىسات)، تارىيىش (ئىنقىباز) ۋە توختاش (بۇكۇنەت) ھەركەتلىرىنى ئىجرا قىلىدۇ. شۇ ھەركەتلەر ياردىمى بىلەن ئۆپكە ئارقىلىق قانغا سىرتتىن ساپ ھاۋا ئېلىپ، قىزىل تومورغا ماڭدۇرىدۇ ۋە قاندىكى بۇزۇق ھاۋا (بوخاراتى دۇخانى) نى سىرتقا چىقىرىدۇ. كېڭىيىش - تارىيىشتىن ئىبارەت ئىككى ھەركەت ئوتتۇرىسىدا بىر توختاش بولۇپ چېگرىسى ئېنىق

① تىبابەتتە قۇۋۋەتلەر روھ دېگەن ئومۇمىي ئاتالغۇ بىلەن

ئاتىلىدۇ.

كېلىدۇ. ئادەمنىڭ قورقۇش، ئاچچىغلىنىش ۋە خوشاللىق نىشلىرىمۇ قۇۋۋەيى ھايۋانغا باغلىق.

2. سېزىش ۋە ھەركەتلىنىش كۈچى (قۇۋۋەيى نەپسانى): بۇنىڭ مەركىزى مىڭ بولۇپ، ئەسەب (نېرۋا)لار ئارقىلىق پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىپ، سەزگى ۋە ھەركەت ئەزالىرىغا قۇۋۋەت بېرىدۇ. قۇۋۋەيى نەپسانى ئۆز نوۋىيىتىدە سېزىش كۈچى (قۇۋۋەيى مۇدىرىكە) ۋە ھەركەت قىلىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋەيى مۇھرىكە) دەپ 2 چوڭ تۈرگە بۆلىنىدۇ.

(1) سېزىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋەيى مودىرىكە): سەزگۈچى كۈچلەرمۇ 2 گە بۆلىنىدۇ. بىرىنچىسى سېرتقى تەسىراتنى سەزگۈچى بەش كۈچ (خاۋاسى خەمەسە زاھىرى): مەنىلەن، كۆز كۆرۈش قۇۋۋىتىگە: بۇرۇن پۇراش قۇۋۋىتىگە: قۇلاق ئاڭلاش. قۇۋۋىتىگە: تېرىدىكى ئەسەپلەر سىرتتىن كەلگەن ئىسسىق - سوغاقنى ۋە ئاغرىشنى سېزىش قۇۋۋىتىگە: تىل ئاچچىق - تاتلىق، ئىسسىق سوغاقنى سېزىش قۇۋۋىتىگە ئىگە. ئىككىنچىسى، ئىچكى تەسىراتنى سەزگۈچى بەش كۈچ (خاۋاسى خەمەسە بائىنى) بولۇپ، سېزىملەرنى توپلاش قۇۋۋىتى (ھىسى مۇشتەرىكە)، خىيال قىلىش قۇۋۋىتى (ھىسى مۇخەييىلە)دىن ئىبارەت. بۇلارنىڭ ئورنى مىڭ - ئىككى ئالدىنقى بىرىنچى بۆلۈمدە بولۇپ ھىسسىي مۇشتەرىكە كەلگەن تەسىراتنى قوبۇل قىلىپ، ھىسى مۇخەييىلەلەرگە ئۆتكۈزۈپ بېرىدۇ. دەپكە ھىسى مۇشتەرىكەنىڭ

جەلپ قىلغۇچى كۈچى ئارتۇق بولسا ھىسى مۇخەييە -
لەرنىڭ ساقلاش كۈچى (قۇۋۋەيى ماسكە) مۇ كۈچلىك
بولىدۇ. ئۇلار بىر بىرىگە يېقىن مۇناسىۋەتلىك.

(1) سەزگۈنى سەرپ قىلغۇچى كۈچ (قۇۋۋەيى
مۇتەسەررىپە). بۇ پىكىر قىلىش، پىلان تۈزۈش، ئىجتا
قىلىش كۈچلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

(2) قوغدىنىش تۇيغۇسى (قۇۋۋەيى ۋەھمىيە): قورقۇش،
قوغدىنىش ئىستەكلىرى مۇشۇ قۇۋۋەتكە تەئەللۇق بولۇپ
مىگە قوسىغى ئىككىنچى بولۇمنىڭ ئارقا تەرىپىدە
ئورۇنلاشقان.

(3) ساقلاش كۈچى (قۇۋۋەيى ھاپىزە): بۇ يۇقۇر -
دىكى قۇۋۋەتلەر توپلاپ، تەھلىل قىلىپ چىقارغان خۇلا -
سىلارنى ساقلاش كۈچى بولۇپ، ئۆتمۈشتە بولۇپ ئۆتكەن
ئىشلارنى يادىغا كەلتۈرۈشكە ياردەم بېرىدۇ. ئۇنىڭ
ئورنى ئارقا مىگە يېقىن مىگە قوسىغى 3 - بولۇمىدە.

(2) ھەركەتلەندۈرگۈچى كۈچ (قۇۋۋەيى مۇھرىكە)
ئەزالارنىڭ ھەرىكەتلىنىشىگە ياردەم بېرىپ پەيلەرنى ھە -
كەتكە كەلتۈرىدۇ. بۇ كۈچمۇ 2 قىسىمغا بولىنىدۇ.

(1) سەۋەپچى كۈچ (قۇۋۋەيى بائىسە): مىگىدە
نىيەت ھاسىل قىلىدىغان، قوزغايدىغان ياكى نىيەتنى ئۆز -
گەرتىدىغان كۈچ بولۇپ غەزەپ، قىزىق قانلىق، تېرىكىش
قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

(2) قىزىقىش كۈچى (قۇۋۋەيى شەھۋانى) كىشىلەردە

زوق - شوق (قىزىقىش) ئويغىتىپ ئەرسىلىرىگە مۇھەببەت پەيدا قىلىدىغان كۈچ.

(3) قۇۋۋەيى تەبىئىيە.

بۇ كۈچنىڭ مەركىزى جىگەر بولۇپ كوكتومۇرلار ئارقىلىق پۈتۈن بەدەنگە تارقىلىدۇ. بۇ تۈۋەندىكىچە بىر قانچە تۈرلەرگە بولىنىدۇ:

(1) ئوزۇقلاندۇرۇش كۈچى (قۇۋۋەيى غىزائىيە) — ئوزۇقلۇقلار جەۋھىرىنى پۈتۈن بەدەنگە يەتكۈزۈپ بېرىدىغان ئومۇمى كۈچ. توت ھەزىمىدىن ئۆتكەن ئوزۇق لۇقلارنى پۈتۈن بەدەنگە يەتكۈزىدۇ.

(2) ئۆستۈرۈش كۈچى (قۇۋۋەيى نامىە) — بەدەننىڭ ئۆسۈش ۋە تەرەققى قىلىشى ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان يېرىم كۈچ. ئوزۇقلاندۇرۇش كۈچى بىلەن بىرلىشىپ ئەزالارنىڭ ئۆسۈشىگە خىزمەت قىلىدۇ.

(3) ئۆزگەرتكۈچى كۈچ (قۇۋۋەيى مۇئەددىلىيە) — ماددىلارنى يوشۇرۇن ھالىتىدىن ئەسلى ھالىتىگە چىقىرىشقا خىزمەت قىلىدۇ. نەسىللىنىشكە يەلى ئەر - ئايالدىن مەنى قوزغاشتىن تاكى قوساقتىكى بالا تۇغۇلۇشقا قەدەر تەسىر كۆرسىتىدىغان قوشۇمچە كۈچتىن ئىبارەت.

(4) سۈرەت، شەكىل ھاسىل قىلغۇچى كۈچ (قۇۋۋەيى مۇسەۋۋىرە) — بۇ كۈچ بىلەن بەدەننىڭ تۈزىلىشى ۋە شەكىللىنىشى بارلىققا كېلىدۇ.

IV - ماقالا. بەدەننىڭ ئوزگىرىشى ۋە

كېسەللىكنىڭ يۈز بېرىشى

بەدەننىڭ ئوزگىرىشى ۋە كېسەللىنىشى تاشقى ۋە ئىچكى سەۋەپلەردىن بولىدۇ. ئادەم بەدىنىدە ساغلاملىق ۋە كېسەللىكتىن ئىبارەت 2 خىل ئەھۋال بولۇپ، تەبىئى جەريان (مەجرائى تەبىئى) (توغرا ھاۋا ئالمىشىش، توغرا ئوزۇقلىنىش، توغرا ھەركەت ۋە ئەزالارنىڭ توغرا خىزمىتى) ئۈستىدە جارى بولۇپ تۇرىدۇ. مەسىلەن: يىگەن تاماق مۇناسىۋەتلىك ئەزالاردا ياخشى پىشىپ، ھەزىم قىلىنىپ قان قاتارلىق خىلىتلەرنىڭ ھاسىل بولۇپ تۇرۇشى ۋە ئالمىشىپ كونا ھاۋانىڭ ئورنىغا يېڭى ھاۋا كىرىپ تۇرۇشى ساغلاملىق دىيىلىدۇ. بۇنىڭ ئەكسى كېسەللىك بولۇپ تەبىئى جەريان ئەمەس. كېسەللىك: (1) بىرەر ئەزا خىزمىتىنىڭ ناچار بولۇپ قېلىشى ياكى قۇۋۋەتنىڭ ناچار بولۇشى؛ (2) ئەزانىڭ ئەسلى خىزمىتىنىڭ ئىسوزگىرىپ كېتىشى (پاڭ، گىچا بولۇپ قېلىش)؛ (3) ئەزانىڭ يوقىلىشى (قۇل - پۇت ياكى باشقا ئەزالارنىڭ ئۇزۇلۇپ كېتىشى، كېسىلىپ كېتىشى) قاتارلىق ھالەتلەردە كۆرىلىدۇ.

1 - پەسىل: كېسەللەكلەرنىڭ تۈرلەرگە بۆلۈشى

كېسەللىك ئومۇمەن يەككە (مۇفرەد) ۋە مۇرەككەپ دەپ 2 گە بۆلىنىدۇ.

1. يەككە كېسەللىك (مەرىزى مۇفرەد). بۇ مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان كېسەللىك، تەركىپ كېسىلى ۋە زەخىملىنىش كېسەللىكلىرى دېگەن تۈرلەرگە بۆلىنىدۇ. (1) مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان كېسەللىك (مەرىزى سۇ ئىلمىزاج): بۇ بەدەندىكى خىلىتلەرنىڭ ئاددى (سازەج) ئۆزگىرىشلىرى ياكى خىلىتلەرنىڭ ماددىلىق (ماددى) ئۆزگىرىشلىرىدىن كېلىپ چىقىدۇ. يەنى قان، سەۋدا، سەپرا ياكى بەلغەملەردىن بىرسىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن ھاسىل بولىدۇ. مۇنداق كېسەللەكلەرگە خىلىتلەر: ئۆزگەرگەندىكى ئالامەتلەر ۋە باشقا بەلگىلەر ئاساس قىلىنىپ كېنىلىگە ھۆكۈم قىلىنىدۇ.

(2) تەركىپ كېسىلى (مەرىزى تەركىپ): بۇنىمۇ تۆۋەندىكىچە 4 تۈرگە بۆلۈپ چۈشەندۈرۈش مۇمكىن:

(1) تۇغما كېسەللىك (مەرىزى مەۋلۇدى): تۇغما ھالدىكى ھەر خىل كەمتۈكلىكلەر: مەسىلەن، باشنىڭ ئادەتتىكىدىن چوڭ بولۇشى ياكى باش ئۆز جايىدا بولماي گەجگىدە ئورۇنلىشىش، قۇلاق، كۆز، بۇرۇن، ئېغىزلار ئۆز جايىدا بولماسلىق ياكى زادىلا يوق بولۇشى ۋە باشقىلار. بۇنىڭ سەۋىيىسى — ئوتۇش يوللىرىدا ھەر خىل توسالغۇ —

لارنىڭ بولۇشى ياكى ئاياللار بالىياتقۇسىنىڭ تۇتۇۋېلىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋىي ماسكەسى) كۈچلۈك، بالىياتقۇ تار بولۇشىدىن ئىبارەت.

(2) مىقدار كېسىلى (مەرىزى مىقدارى): بىرەر ئەزانىڭ تېگىشلىك ھەجىمىدىن كىچىك ياكى چوڭ بولۇشى مەسىلەن، پىل پۇتى كېسىلى (دائىل فىل) كېسىلىدە بىر پۇتنىڭ چوڭ بولۇپ قېلىشى، سوۋگەك سىل كېسىلىدە سوۋگەكلەرنىڭ كىچىكلىشىپ قېلىشى قاتارلىقلار.

(3) سان كېسىلى (مەرىزى ئەدەدى): ئەزالارنىڭ سان جەھەتتە كەم - ئارتۇق بولۇشى مەسىلەن، بارماقلار 4 ياكى 6 بولۇپ تۇغۇلۇش.

(4) ئورۇنلىشىش كېسىلى (مەرىزى ۋەزىئىتى): ئەزا-لارنىڭ ئەسلى ھالىتىگە قارىغاندا يېقىن ياكى يىراق بولۇشى مەسىلەن، بارماق ئارىلىقى بەك كەڭ ياكى تار بولۇپ تۇغۇلۇش، بەدەندە ھەرخىل قانداق سوۋگەللەرنىڭ بولۇشى.

(5) زەخىملىنىش كېسىلى (مەرىزى تەبەرقىي ئىستىمال): بۇ ئايرىم كىشىلەردە ئۇچرايدىغان ئەزانىڭ سۇنۇشى، چىقىپ كېتىشى قاتارلىقلار.

2. مۇرەككەپ كېسەللىك (مەرىزى مۇرەككەبە). بىر كېسەلگە يەنە باشقا بىر كېسەلنىڭ قوشۇلۇپ قېلىشى مەسىلەن، بىر ئەزاغا يىرىڭلىق جاراھەتنىڭ چىقىشى بىلەن پۇتۇن بەدىنىدە ھارارەت كۆتىرىلىپ، ئوزگىرىش يۈز بېرىشى.

2 - پەسىل: كېسەللىكلەرنىڭ دەۋرى

1. ھەر قانداق كېسەلدە تۆت زامان (دەۋر) بولىدۇ:
باشلانغان دەۋر: بۇ دەۋردە كېسەللىك يېڭىلا
باشلىنىپ ئالامەتلەر (بەلگىلەر) ئاشكارا بولمايدۇ.
2. ئېغىرلاشقان دەۋر: ئالامەتلەر ئېنىق كۆرۈلۈپ
تەرەققى قىلىپ ئېغىرلاشقان دەۋرى بولۇپ دەرھال داۋا-
لاشنى تەلەپ قىلىدۇ.
3. توختىغان دەۋر: كېسەلنىڭ ئالامەتلىرى
بىر ئىزدا توختايدىغان دەۋرى.
4. قايتقان دەۋر: كېسەل-ئالامەتلىرى تەدرىجى
قايتىپ ساقىيىش بەلگىلىرى كۆرۈلۈشكە باشلايدۇ.

3- پەسىل: زورۇر ۋاستىلار

ئادەمنىڭ ھاياتى ۋە سالامەتلىكىگە زورۇر بولغان
مۇھىم ئامىللار 6 بولۇپ، ئۇلار ھاۋا، يىمەك-ئىچمەك،
ھەركەت ۋە جىملىق (سۈكۈت) ئۇيقۇ ۋە ئويغاقلىق
(بىدأرلىق)، چىقىرىش ۋە قوبۇل قىلىش (ئىستىفراق ۋە
ئېھتىباس)، ئىرازى نەفسانىيىدىن ئىبارەت. ئۇلارنى سىتتە
زورۇرىيە دەپ ئاتىلىدۇ.

1. ھاۋا — ھاۋا بەدەندىكى ھاياتلىق كۈچى (روھى
ھاۋانى) نى تەرتىپكە سالىدۇ. يۈرەك ۋە ئۆپكەننىڭ

ھەركىتى ئارقىلىق قاندىكى سېسىق (بەد بوي) ھاۋا بەدەن سىرتىغا چىقىرىپ تاشلىنىدۇ. ساپ ھاۋا قانغا قوشۇلۇپ ئومۇمىي بەدەننى تەمىنلەيدۇ. ھاۋا پەسىل ۋە يەر شارائىتىغا قاراپ ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. مەسىلەن باھار پەسلىدىكى ھاۋانىڭ كەيپىياتى ھول (بەزى تىۋىپلەر موتىدىل دەپ قارايدۇ)، يازنىڭ ھاۋاسى ئىسسىق، كۈزنىڭ قۇرۇق ۋە قىشنىڭ سوغاق كەيپىياتقا ئىگە. كېسەلنى تەكشۈرۈپ دورا بېرىشتە پەسىل ئەھۋالى ۋە ھاۋانىڭ ئۆزگىرىشىگە ئالاھىدە دىققەت قىلىش تەلەپ قىلىنىدۇ. ئادەتتىكى ۋاقىتلاردىكى ھاۋانىڭ كەيپىياتى بىردەك بولمايدۇ. مەسىلەن، جەنۇبتىن كەلگەن شامال ھول ئىسسىق؛ شىمالدىن كەلگەن شامال ھول سوغاق؛ كۈن چىقىشتىن كەلگەن شامال موتىدىل؛ كۈن پېتىشتىن كەلگەن شامال قۇرۇق ئىسسىق بولىدۇ.

ئەگەر تاغ شۇ جاينىڭ جەنۇپ تەرىپىدە بولسا شۇ ئورۇننىڭ ھاۋاسى سوغاق تاغ شىمال تەرىپىدە بولسا ئىسسىق كەيپىياتلىق بولىدۇ.

دەريا-جەنۇبتا بولسا ھاۋا قاتتىق ئىسسىق، شىمالدا بولسا، قاتتىق سوغاق بولىدۇ.

تاشلىق جايلارنىڭ ھاۋاسى قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ، مۇنداق جايلاردا ياشىغۇچى كىشىلەر كۆپرەك مىڭە كېسىلىگە ئۇچرايدۇ. سېغىز تۇپراقلىق يەر ھول ئىسسىق بولۇپ، مۇنداق جايلاردا ياشىغۇچى كىشىلەر ساغلام ئۆسۈپ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرىدۇ.

كوك قۇملۇق يەرلەر قۇرۇق سوغاق بولۇپ، مۇنداق ئورۇنلاردىكى كىشىلەر كۆپرەك يۈرەك كېسىلىگە دۇچار بولىدۇ. چول باياۋان تاغلىق جايلارنىڭ ھاۋاسى قۇرۇق ئىسسىق بولۇپ كىشىلەردە قان كۆپىيىپ كېتىدۇ.

2. يىمەك - ئىچمەك: ئادەم بەدىنىگە كىرگەن يىمەك - ئىچمەكلەردىن سۇدىن باشقىسى ئۆزگىرىدۇ. سۇنىڭ ئەڭ ياخشى بۇلاق سۈيى بولۇپ، تۇپرىقى سېغىزلىق بولۇشى ۋە بۇلاقنىڭ ئاغزى كۈنگە قاراپ تۇرۇشى لازىم. بۇلاق ئەتراپىدا گۈڭگۈرت ياكى قەلەي كېنى بولغاندا بەكمۇ ياخشى. بۇلاقنىڭ ئورنى ئىگىز بولۇشى لازىم. دەريا سۇلىرى (قار - يامغۇر سۈيى) نىڭ ئېقىش ماسا - پىسى ئۇزۇن، تاش قوراملارغا ئۇرۇلۇپ ئېقىپ كەلگىنى ۋە تاتلىق تەملىك بولغىنى ياخشى. ئەكسىچە غەيرى تەملىك زەيكەش ۋە ئوت - چوپ لەشلىرى بولغان سۇ زىيانلىق بولۇپ، كېسەللىك پەيدا قىلىدۇ. خام سۇ ئىچمەسلىك، سۇنى قاينىتىپ ئىچىش كېرەك.

غىزا (تاماق) لار توۋەندىكى بىر قانچە تۈرلەرگە بولىدۇ:

(1) غىزايى مۇتلەق — بۇ خىلدىكى ئوزۇقلۇقلار بەدەنگە كىرىپ ئۆزگىرىدۇ. لېكىن بەدەننى ئۆزگەرتىمەي ئەزالارغا تارقايدۇ.

(2) شىپالىق تاماق (غىزايى داۋائى) بەدەنگە كىرىپ ئۆزىمۇ ئۆزگىرىدۇ، بەدەننىمۇ ئۆزگەرتىدۇ، مەسىلەن:

لەن، قەن، گۈلچەن ۋە ھەسەل قاتارلىقلار، بۇلار بىر تەرەپتىن ئوزۇق، بىر تەرەپتىن داۋا بولىدۇ.

تاماقلار سىڭىشلىق (لەتپ)، ئېغىر (كەشپ) دەپ 2 تۈرگە ئايرىلىدۇ؛ ياخشى قان سىڭىشلىق غىزادىن ھاسىل بولىدۇ. قويۇق قان ئېغىر غىزادىن ھاسىل بولىدۇ. ئوزۇقلۇق-قا باي بولغان تاماق ماددىلىرىنى كەسىرلىغىزا دەپ ئاتە-لىدۇ. تۈۋەندىكى جەدۋەلدە قىسقىچە تونۇشتۇرۇلىدۇ.

3. ئۇيىقا ۋە ئويىغا قلىق: ئاز ئۇخلاش تاشقى ئەزانى سوۋۇتۇپ ئىچكى ئەزانى ئىستىدۇ. مىزاجى ھول كىشە-لەر كۆپ ھەركەت قىلىشى لازىم. مىزاجى قۇرۇق كىشە-لەر كۆپ ئۇخلاپ ئوتتۇرىچە ھەركەت قىلىش كېرەك.

4. ئەمگەك ۋە دەم ئېلىش: ئوتتۇرا دەرىجىدىكى ئەمگەك بەدەننى ئىستىدۇ. ھەددىدىن تېز ھاسىرپ ئىش قىلىش، بىردەم ئولتۇرۇپ يەنە بىردەم تېز ئىش قىلىش بەدەننى قۇرۇتىدۇ. ئۇزۇن دەم ئېلىپ ئاز مە-نەت قىلىش بەدەننى سوۋۇتىدۇ. بوغۇم ئاغرىقلىرىنى كە-تۈرۈپ چىقىرىدۇ. كېرەكسىز ماددىلار بەدەندە تۇرۇپ قالىدۇ. جىنىنى ئالاقە ھەركىتى كۆپ بولغاندا بەدەننى سوۋۇتىدۇ. تەبىئى ئىسسىقلىق (ھارارىتى غەرىزى) نى كېمەيتىدۇ. يۈرەك كېسىلىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

5. تېھتەمباس ۋە ئىستەمباس: ئىستەمباس دىگەن

بەدەندىن سۇيۇقلۇقنىڭ چىقىپ كېتىشى، ئىچى سۇرۇش، ھېيىزنىڭ كۆپ ۋە تېز مېڭىپ كېتىشىگە ئېيتىلىدۇ. بۇ، بەدەننىڭ چىقىرىپ تاشلاش كۈچىنىڭ كۈچلۈك بولۇشى

تالماق تۈرلىرىنىڭ ئۈزۈقلۈك قىسمى ۋە ھاسىل بولىدىغان كەيپۇس ئىھۋالى.

ياكى بەدەندە كېرەكسىز ماددىلارنىڭ كوپلىگىدىندۇر. ئىستىقراغ بىلەن بۇ ماددىلار سىرتقا چىقىرىلىدۇ. ئېھتىباس ئىستىقراغنىڭ ئەكىسى بولۇپ، تەرەتنىڭ ھېيىزنىڭ توختاپ قېلىشى قاتارلىقلار بىلەن پۈتۈن بەدەن ئېغىرلىشىش، ئىشتىھا تۇتۇلۇشلار كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى چىقىرىش يوللىرىنىڭ تارىيىپ قېلىشى، توسالغۇلارنىڭ بولۇشى (بەدەننىڭ تۇتۇلۇشى قۇۋۋىتىنىڭ ئارتۇق بولۇشى ياكى بەدەن ماددىنى ئۆزىگە تارتىۋېلىپ ئەزالاردا سەرپ بولماي قالغىلىقى)دىن كېلىپ چىقىدۇ.

6. ئەرازى نەفسانى: قۇۋۋىتى نەفسانىنىڭ مەئىدە بولىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭ خىزمىتى ھەققىدە يۇقۇرىدا سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدۇق. شۇ خىزمەتلەرنىڭ ئۆز-گىرىشى ياكى جايىدا بولماسلىقى كېسەللىك كەلتۈرىدۇ. مەسىلەن، غەزەپلىنىش، قورقۇش قاتارلىق ئەھۋاللارمۇ كېسەل كەلتۈرىدۇ. چۈنكى قۇۋۋەيى نەفسانى پۈتۈن بەدەندىكى ئەزالارغا قومانداىلىق قىلىدىغان كۈچتۇر.

۷. ماقالا. كېسەل پەيدا بولۇشنىڭ سەۋەپلىرى

1. توت خىلىتلەرنىڭ غەيرى تەبىئى ئۆزگىرىش-لىرى (يوقۇرىدا بايان قىلىندى).
2. تاشقى سەۋەپ: (يادىدە) — ئىسسىق ھاۋا ياكى قاتتىق سوغاقتا يالاڭ يۈرۈپ ئىش قىلىشقا ئوخشاش سىرتقى ئامىللارنىڭ تەسىرى. مۇنداق ھاللاردا بەدەن-نىڭ قارشىلىق كۈچى تۈۋەنلەيدۇ. بۇنىڭ بىلەن بەدەن-دە يوشۇرۇلغان جەراسىم (مىكروپىلار) پۇرسەت تېپىپ كېسەل كەلتۈرىدۇ. ھەم مىڭنىڭ قارشى تۇرۇش قابى-لىيىتى تۈۋەنلىگەنلىكتىن بەدەن ئاجىزلاشىپ ھەر خىل كېسەللەرگە شارائىت تۇغۇلىدۇ.
3. ۋاستىلىق ھالدا كېسەل پەيدا بولۇش (سايىقە): ھەر خىل پاكىز بولمىغان يەل-يېمىش، كوكتات ۋە تاماقلارنى، چىۋىن، چاشقان، بۇرگە، پاشا قاتارلىق زىيان-داشلار بولغان يېمەك-ئىچمەكلەرنى ئىستىمال قىلىش بىلەن قېرىن ئۈچەي كېسەللىرى مەسىلەن، ئىچى سۇرۇش، قۇسۇش ۋە قوساق ئاغرىش قاتارلىقلار كىلىپ چىقىدۇ.
4. ۋاسىلە: چاڭ-توزاڭلاردىكى ھەر خىل ئوفونەت (بۇزۇق ھاۋا) ۋە جەراسىملەر نەپەس ئېلىش ئارقىلىق

ئوپكە قاتارلىق ئىچكى ئەزالارغا چۇشۇپ ئوپكە كېسىلى،
ئاشقازان، ئۇچەي قاتارلىق كېسەللەرنى كەلتۈرىدۇ.
تېرىگە ئورۇنلىشىپ ئاتىشەك (سېغىلىس)، كويدۇرگە (قورۇھى
سائىلە) قاتارلىق كېسەللەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

1 - پەسىل: ئىسسىقلىقتىن بولغان كېسەللەرنىڭ

سەۋەپلىرى

(1) مىڭنىڭ پادالىيىتى (ھەركىتى نەفسانى) نىڭ تەسىرى، مەسىلەن قاتتىق غەزەپلىنىش قاتارلىقلار، قان ۋە سەپىرالار بىرلىشىپ ھارارىتى غەربەينى ئاشۇرىدۇ. ھارارەتنىڭ ئېتىدالىدىن ئېشىپ كېتىشى ھەر خىل كېسەللەرنى كەلتۈرىدۇ. جىنى ئالاقىمۇ ھەركىتى نەفسانى بولۇپ ئارتۇق بولۇپ كەتسە يۈرەك ۋە بورەك كېسەللىرىنى كەلتۈرىدۇ.

(2) جىمىنى ھەركەت (ھەركىتى بەدىنى) نىڭ تەسىرى. ھەر قاچان ئىنسان كۈچىگە قاراپ ئىش قىلىشى لازىم. كۈچى كۆپ بولسىمۇ ئىش قىلماسلىق بوغۇم كېسەللىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ھەركەت قابىلىيەتتىن ئارتۇق بولسا، بەدەن ھارارىتىنى ئاشۇرىدۇ. نەتىجىدە خىلىتلار ئۆزگىرىپ كېسەل تۇغدۇرىدۇ.

2 - پەسىل: سوغۇقتىن بولغان كېسەللەرنىڭ

سەۋەپلىرى

(1) تاشقى تەرەپتىن سوغۇق تېگىش.
2. ئىشتەينىڭ تولۇق بولماسلىقى - بۇ بەدەننى

سوۋۇتۇپ ھارارەتنى ۋە نەملىكنى كېمەيتىدۇ. كۆپ يەپ ئاز ھەركەت قىلىش سۈۋۋىتىدۇ. مەندە ۋە ئۆپكەگە كېرەكسىز ماددىلارنى توپلاپ قويىدۇ. (3) ھاراقنى كۆپ ئىچسە يەدەننى سوۋۇتىدۇ (ئاز ئىچسە قىزىتىدۇ).

(4) بەدەندە سۇيۇقلۇقنىڭ يىغىلىپ قېلىشى (تەكاسىپ)، بۇ ئەھۋال بەدەن ھارارىتىنى تۈۋەنلەش-تۇرۇپ بەدەننى سوۋۇتىدۇ. ئوشۇقچە ھوللۇك (رۇتوبەتى فوزۇلى) ھاسىل قىلىدۇ.

3 - پەسىل: قۇرۇق ۋە ھوللۇكتىن بولغان كېسەللەرنىڭ سەۋەپلىرى

(1) قۇرۇق تەبىئەتلىك نەرسىلەرنى كۆپ ئىستە-مال قىلىش.

(1) چوللۇك ۋە قۇرغاق جايلاردا ياشاپ كېكتات، يەل يىمىشلەرنى يىمەسلىك.

(2) ئاز يەپ كۆپ ھەركەپ قىلىش.

(3) ئۇخلاسا سلىق.

(2) ھوللۇكتىن بولىدىغان كېسەللەر سەۋەپلىرى

ھوللۇكتىن بولىدىغان كېسەللەرنىڭ سەۋەپلىرى ئاسا-

سەن ئۇزاققىچە ئەمگەكتىن ئايرىلىپ قېلىش، كۆپ-

ئۇخلاش، سوغاق سۇنى كۆپ ئىچىش ۋە كۆپ يەپ

ئاز ئىش قىلىشلاردىن ئىبارەتتۇر.

4 - پەسل: ئوتۇش يوللىرىنىڭ كېڭىيىشى ۋە تارىيىپ قېلىشى

1. ئوتۇش يوللىرىنىڭ كېڭىيىشى: قانئومۇر، تەرەت يولى ۋە تاماق يوللىرىدا ئۇچرايدۇ. سەۋىيى ئىزلاردىكى تۇتۇش قۇۋۋىتى (قۇۋۋەت ماسكە) نىڭ كۈچى بولۇشى ۋە چىقىرىپ تاشلىغۇچى كۈچ (قۇۋۋەت) داپىئە نىڭ كۈچلۈك بولۇشىدۇر. ياكى بوشاشتۇرغۇچى دورىلارنى (زېرىخ، سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى) ئىستىمال قىلىشتىن بولۇشى مۇمكىن.

2. ئوتۇش يوللىرىنىڭ تارىيىشى: (1) تۇتۇش قۇۋۋىتى كۈچلۈك ۋە چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىز بولۇشى، (2) كۈچنى ئاجىزلاشتۇرغۇچى دورىلار (ئاق لىلى، ئەكىل مېلىك قاتارلىقلار) نى ئىشلىتىش (بۇلار چىقىرىپ تاشلاش كۈچىنى ئاجىزلاشتۇرىدۇ). قورغۇچى ئىسسىق دورىلارنى (مەسىلەن، ئاقىر قەرە، دارچىن، گۈل سۇسەن، سۇپارى قاتارلىقلارنى ئىشلىتىش؛ (4) سوغاق دورىلار (كافور، يۇمىقاسۇت، سېمىز ئوت، پاقا يوپۇرمىغى) نى ئىشلىتىش؛ (5) ئوتۇش يوللىرىغا جاراھەت چىقىپ ئارتۇق ھاسىل بولۇش ياكى ئولۇك گۆش ئۇلۇپ قېلىش؛ (6) يات جىسىملار شۇ يوللارغا چۈشۈپ توسۇپ قويۇش ياكى سۇيىدۇك يوللىرىدا تاش ھاسىل بولۇش. بەزى ۋاقىتلاردا مەقئەت (ئارقا يول) نىڭ پۈتەيلى.

شېپ قېلىشمۇ ئۇچرايدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى مەقتەپنىڭ يارىم-
لىنىشى ياكى سوغاقلۇقنىڭ ھەددىدىن ئېشىپ كېتىشىدۇر.
5 - پەسىل: بەدەن تېرىلىرىدىكى ئوزگىرىش
(قۇرۇپ قېلىش)

بۇ تاشقى ۋە ئىچكى سەۋەپتىن بولىدۇ. ئىچكى
سەۋەپتىن بولىدىغىنى ھاۋا، قان ۋە سەپرا ھارارىتىنىڭ
كوتۇرۇلۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. تاشقى سەۋەپتىن بولىدۇ -
خىنى توپا - چاڭ ۋە ھاۋادىكى جەراسىم (مىكروپ)لارنىڭ
تېرىگە ئورۇنلىشىپ تەسىر قىلىشى بىلەن كېلىپ چىقىدۇ.
6 - پەسىل: شەكىل (قىياپەت) بۇزۇلۇشىنىڭ

سەۋەپلىرى

(1) بالىنىڭ ئانا قوشىغىدىكى تۇزۇلۇشىنىڭ
يېتەرسىز بولۇشى. مەسىلەن، شەكىللەندۈرۈش قۇۋۋىتى
(قۇۋۋەيى مۇسەۋۋىرە) نىڭ ئىنچىكەلىكىدىن. بالا قىياپەت
جەھەتتىن كەمتۈك تۇغۇلىدۇ. ياكى ئوزگەرتكۈچى قۇۋۋەت
(قۇۋۋەيى مۇغەييىرە) نىڭ ئىنچىكەلىكىدىن شەكىلى ئوز-
گەرگەن ھالدا تۇغۇلىدۇ.

(2) ئاتىلىق ئۇرۇغى، ئانىلىق تۇخۇمنىڭ ياخشى
بولماسلىقى، (ساغلام ياكى تازا بولماسلىقى) سۇس
بولۇشى تۈپەيلىدىن بالا شەكىل جەھەتتىن ھەرخىل يې-
تەرسىزلىكلەر بىلەن تۇغۇلىدۇ.

(3) تۇغۇلۇش جەريانىدا زەخمىلىنىش، تۇغۇلغاندىن
كېيىن كېسەللىنىش، زەخمىلىنىش تۈپەيلىدىن بالىدا
ھەرخىل مېمپىلىقلار، دوڭلىق يۈز بېرىدۇ.

VI ماقالا. تومۇر ھەركەتلىرى ۋە ئۇلارنىڭ ئەھمىيىتى

تومۇرنىڭ ھەركىتى ئەبز دىيىلىدۇ. ئەبز قىزىلتومۇر (شېرىيان) نىڭ ھەركىتىدىن ئىبارەت. شېرىياندا ئىككى ھەركەت ۋە ئىككى سۈكۈت (جىملىق) بولىدۇ. ئىككى ھەركەت كېڭىيىش (ئىنبىسات) ۋە تارىيىش (ئىنقىباز) دىن ئىبارەت. ھەركەت ئوتتۇرىسىدىكى جىملىق دەۋرى روشەن مەلۇم بولمايدۇ. تەۋپ تومۇرنى تۇتقاندا كېڭىيىش ۋە تارىيىشنىڭ مۇددىتى قانچىلىك ھەم سۈكۈتنىڭ مۇددىتى قانچىلىك ئىكەنلىكىنى ئېنىق بىلىش لازىم. كېڭىيىش ھەركىتى ئاسان سېزىلىدۇ. دائىم قول ئۇچىغا ئۇرۇلىدۇ. تومۇر كۈچى ناچارلاشقاندا تارىيىشنى بىلىش قىيىن. مۇنداق ھاللاردا تومۇر ھەركىتىدە قاتتىقلىق، تېزلىك ۋە كىچىكلىكنى سېزىش (ئىزدەش) لازىم.

قىزىلتومۇرنىڭ ھەركىتى يۈرەك ھەركىتىگە تەۋە بولۇپ، ئۇنىڭ ھەركىتى يۈرەك ھەركىتى بىلەن باراۋەر كېلىدۇ، ئارتۇق، كەم بولمايدۇ. قىزىلتومۇر يۈرەكنىڭ پۈتۈن ئەزالارغا بارىدىغان شاخچىسى بولۇپ، بىرەر ئەزادە ئوزگىرىش يۈز بېرىپ قىزىلتومۇر ھەركىتىدە

توسالغۇ بارلىققا كەلسە يۈرەككىمۇ ئۇنىڭ تەسىرى پەيدا بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن يۈرەك ھەركىتى تېزلىشىدۇ. قىزىلتومۇرۇمۇ تېزلىشىدۇ.

1- پەسىل: تومۇرنىڭ ئەھمىيىتى

يۈرەك باشقۇرغۇچى ئەزا بولۇپ، بەدەندىكى قىزىلتومۇرنىڭ ھەممىسى يۈرەكتىن چىقىدۇ. يۈرەك نەپەس (ساپ ھاۋا) ئېلىش ئۈچۈن ئۆپكىدىن ياردەم ئالىدۇ. بەدەنگە ھاياتلىق ھاۋا ۋە قۇۋۋەتلەرنى قىزىلتومۇرلار يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. قاندىكى بۇزۇق ھاۋا ۋە كېرەكسىز ماددىلار يۈرەك ۋاستىسى بىلەن ئۆپكە ئارقىلىق سىرتقا چىقىرىلىدۇ. دىمەك بەدەننىڭ ھاياتلىقى تەبىئىي ئىسسىقلىق (ھارارىتى غەيرىي) بىلەن مەۋجۇت تۇرىدۇ. بۇ كۈچ يۈرەكتە بو-لىدۇ. شۇڭا ھارارىتى غەيرىيىنىڭ ئەھۋالى يۈرەكتىن بىلىنىدۇ. تىۋىپ بۇنى تومۇردىن تاپىدۇ. چۈنكى قىزىل-تومۇر ئىچىدە قان-ھاياتلىق كۈچ بار.

شۇنىڭ ئۈچۈن تىۋىپ بەدەندە ھاياتلىق كۈچ (قۇۋۋەيى ھايۋانى) ۋە ھاجەتنىڭ ئاز-كۆپلىكىنى بىلىشنى مەقسەت قىلغان ھالدا تومۇرنى تۇتۇپ قىزىلتومۇر ھەركىتىدىن ئىزلەش لازىم. كېسەل ئادەمنىڭ تومۇرىنى تۇتۇش بىلەن ئەڭ ئاۋال تومۇرنىڭ تېز ياكى ئاستىلە-غىنى، باراۋەر ياكى ئىگىز-پەسلىكى، ئىسسىق-سوغاق، قاتتىق-يۇمشاقلىق ئەھۋاللىرىنى بىلىش لازىم. بۇلارنى

تەكشۈرۈپ تېپىلما يۈرەكنىڭلا ئەمەس، بەلكى پۈتۈن بەدەننىڭ ئەھۋالىنى مولچەرلەپ بىلگىلى بولىدۇ.

2-پەسىل: تومۇردىن نىمىلەرنى بىلگىلى ۋە قانداق بىلگىلى بولىدۇ

تومۇرنى بىلىش ئۈچۈن بىلەيزۇك بېغىشىدىكى شىريان تومۇرنى تۇتۇش لازىم. بۇ تومۇرنى ئوبدان سەزگىلى بولىدۇ، چۈنكى گۆش قاتلاملىرى قېلىن ئەمەس ۋە تومۇر ئۈزە جايلاشقان بولۇپ يەل ياكى باشقا نەرسىلەر تولغان ئەمەس. باشنىڭ چىكە تومۇرىدىنمۇ ئاسان بىلگىلى بولىدۇ. ئەمما كۆپ ئىشلىتىلمەيدۇ.

تەۋىپ باشبارماقتىن باشقا 4 بارمىغىنى كېسەلنىڭ تومۇرى ئۈستىگە قويۇپ تۇتۇدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تەۋىپ ئورنىنىڭ قول بارماق ئۈچىنى ياخشى ئاسرىشى كېرەك. كېسەل قولىنى ئالدى ياكى كەينىگە قىلماستىن تۈز تۇتۇشى، بىر نەرسىگە تايانماسلىقى لازىم. ئالدى بىلەن تەۋىپ تومۇرىنىڭ سۇس ياكى كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى بايقاپ ئېلىپ، كۈچلۈك بولسا ئوتتۇرا كۈچ بىلەن، ئاجىز بولسا يېنىنىڭ كۈچ بىلەن بارماق ئۈچىنى كېسەلنىڭ بىلەيزۇك بېغىش تومۇرى ئۈستىگە قويۇشى كېرەك. كېسەل مۇرەككەپ بولسا ئۇزۇنراق تۇتۇپ قالدۇرۇش ئۈزگىرىش بارلىغىنى ئېنىق بىلىش لازىم. تۇتۇپ

تۇرغاندا تومۇر ئۆز ھالىدىن ياندىۇ. بۇنى ئىشەنچ قىلماستىن چىقارماسلىق كېرەك.

تومۇرنىڭ چوڭ - كىچىكلىكى، ئىسسىق - سوغاقللىقى، كۈچلۈك - ئاجىزلىقى، توختاپ - توختاپ ياكى ئارقا - ئارقىدىن سېلىشى قاتارلىق ئەھۋالنى ئېنىق بىلگىچە تۇتۇش لازىم.

تومۇرنى تۇتقاندا كېسەل كىشى قورقۇش، خۇشلۇق، غەم، ھەرىش، مونچىغا كىرىش، كۆپ ئۇخلاش، ئۇيقۇ - سىزلىق، تولا ئاچلىق، تولا توقلۇق، غەزەپكە ئوخشاش 10 ئىشتىن خالى بولۇشى شەرت. ھەربىر كىشىنىڭ مىزاجى ھەرخىل بولىدۇ. پەسىل ھاۋا ۋە ئولتۇراق جاي - مۇ بىردەك بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تومۇر تۇتقاندا ھەر ئادەمنىڭ يېشىغا، پەسىلگە، ھاۋانىڭ ئۆزگىرىش ئەھۋالىغا قاراپ تومۇرنى ئايرىش، تومۇر ئەھۋالىدىن ئۆزگىرىش مەلۇم بولسا، ئۆزگىرىشنىڭ سەۋەبلىرى ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزۈش كېرەك.

3-پەسىل: تومۇرنىڭ تۈرلىرى ۋە ھەرىكىتى

تومۇرنىڭ ئۇرۇشى 7 خىل بولۇپ، بۇ 7 قىس - مەت دېيىلىدۇ.

1. تومۇرنىڭ ھەرىكەت مىقدارىدىن ئۆلچەش.
- ھەرىكەت مىقدارىدىن ئۆلچەش دېگەنمىز، تومۇر - نىڭ كېڭىيىش (ئىنبىسات) ۋە تارىيىش (ئىنقىباز) ھەرى -

كىتىدىن ئىزلەش دىگەنلىك بولۇپ 7 خىلغا بولىنىدۇ.
(1) ئۇزۇن (تەۋىل): تومۇرنىڭ ھەركىتى تىۋىپنىڭ بارماقلىرىغا مولچەرلىگەندىن ئۇزۇنراق (شۇ كىشىنىڭ ساق ھالىتىدىكى تومۇر ھەركىتىدىن ئۇزۇن) سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىبى مەزكۇر كىشىدە ھارارەتنىڭ ئېشىپ كەتكەنلىكىدىن ئىبارەت.

(2) قىسقا (قەسىر): تومۇرنىڭ ھەركىتى قىسقا نىسبەتەن قىسقىراق سېزىلىدۇ، ئۇزۇن داۋام قىلمايدۇ. سەۋىبى بەدەن ھارارىتىنىڭ تۆۋەن بولغانلىقىدۇر.

(3) موتىدىل: تومۇر ھەركىتى تىۋىپنىڭ قولىغا ئۇزۇن - قىسقىلىقتا تەكشى بىلىنىدۇ. بۇ مىزاجنىڭ ياخشىلىغى ۋە كەيپىياتنىڭ تەكشى ھالدا تۇرغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.
(4) توم (ئەرىز): تومۇر ھەركىتى قىياستىن توم - راق سېزىلىدۇ، سەۋىبى بەدەندە سۇيۇقلۇقنىڭ كۆپىيىدۇ. كەنلىكىدۇر، بۇ كۆپرەك بەلغەم مىزاجلىق ئادەملەردە كۆرىلىدۇ.

(5) ئىنچىكە (زەيىق): پۈتۈن تومۇر بويىچە قان - نىڭ دولقۇنى قىياستىن ئىنچىكە سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىبى بەدەندە سۇيۇقلۇق ئازىيىپ، قۇرۇقلۇق غەلبە قىلغانلىقىدىن ئىبارەت.

(6) موتىدىل: پۈتۈن تومۇر ھەركىتىدە توم ۋە ئىنچىكىلىكنىڭ تەكشىلىكى بولۇپ، بۇ بەدەندە كەيپە - ماتنىڭ ئوتتۇرا ھالىتى ۋە مىزاجنىڭ ياخشىلىغىنى بىلدۈرىدۇ.

(7) پەس (مۇنخەفەز): پۇتۇن تومۇر بويىچە تومۇر چوڭقۇر ۋە پەسلەپ كەتكەن سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى ھارارەتنىڭ تۈۋەنلەپ كەتكەنلىكىدۇر.

(8) ئۇستۇن (مەشرۇپ) تومۇر ھەركىتى قىياسقا قارىغاندا ئۇستۇن كۈتىرىلىپ، لەيلىگەن سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى ھارارەتنىڭ ئۇستۇنلىقىدىن ئىبارەت.

(9) موتىدىل: تومۇر ھەركىتىنىڭ ئۇستۇن ۋە تۈۋەنلىكتە تەكشىلىكى بولۇپ، بەدەن ھارارىتى ئۈلچەمگە لايىق (ئېتىدالدا) ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ.

يۇقۇرقىلار تىۋىپنىڭ بارماقلىرىغا قىزىلتومۇرنىڭ كېڭىيىش - تارىيىش ھەركەتلىرىدە بىلىنىدىغان بەلگىلەر بولۇپ، تۈۋەندىكىچە پەرق ئېتىلىدۇ:

(1) ئۇزۇن: تومۇر ھەركىتى 3 بارماق ئاستىدا سېزىلىدۇ.

(2) قىسقا: تومۇر ھەركىتى 3 بارماق ئاستىدا

ئەمەس، بەلكى بىر بارماق ئاستىدا سېزىلىدۇ.

(3) كەڭ (توم): بارماق ئۇچى تومۇرنىڭ كەڭلىكىنى

سېزىدۇ.

(4) ئىنچىكە: كەڭنىڭ ئەكسى.

(5) ئۇستۇن: تومۇر ھەركەت قىلغاندا تېرە تەرد -

يىگە كۈتىرىلىپ ھەركەت قىلىدۇ.

(6) پەس: تومۇر گۆش ئىچىگە چۈشۈپ ھەركەت قىلىدۇ.

2 خىل ھەركەتنىڭ بىرگە كېلىشى جۈپ تومۇر

(ئەبىزى شىنائى) دىيىلىدۇ. مەسىلەن، ئۇزۇن بىلەن توم

(يوغان)، توم بىلەن ئۇستۇن (ئىگىز)، قىسقا بىلەن توم

بىللە كېلىدۇ. لېكىن بۇلارنىڭ ئەكسىچە كېلىشى مەسەلەن، ئۇزۇن ۋە قىسقا، توم ۋە ئىنچىكە، ئۇستۇن ۋە پەس تومۇرنىڭ بىللە كېلىشى مۇمكىن ئەمەس. ئەگەر تەسادىپى كورلىپ قالسا، بۇ كېسەلنىڭ ئولۇمىدىن خەۋەر بېرىدۇ. چۈنكى يۈرەك ۋە ھاياتلىق قۇۋۋىتىنىڭ قالايمىقانلىغىدىن بۇ ئەھۋال كېلىپ چىقىدۇ. 3 خىل ھەركەتنىڭ بىرگە كېلىشى 3 بىرلەشمە تومۇر (نەيزى سۇلاسى) دىيىلىدۇ. مەسىلەن، ئۇزۇن-توم ۋە ئۇستۇننىڭ بىللە سېزىلىشى ياكى قىسقا-ئىنچىكە-پەسنىڭ بىللە سېزىلىشى، مۇنداق ئەھۋاللار كېسەلنىڭ داۋالاش دائىرىسىدىن چىقىپ كەتكەنلىكى بولۇپ، بۇ خىل ئاغرىق-لارنى داۋالاشتا كۆپ ئېھتىيات قىلىش كېرەك. چۈنكى تېمپىرېت قانۇنىدا كۆپ ھەم ئاز، ئىسسىق ھەم سوغاق ۋە قۇۋۋەتلىك بىلەن ئاجىزلىقلار بىر كەيپىياتتا جەمئى كەلمەيدۇ دەپ قارىلىدۇ.

2. تومۇر ھەركىتىنى ئۇنىڭ دولقۇن كەيپى-ياتىدىن ئولچەش:

(1) كۈچلۈك — تومۇر تىۋىپنىڭ بارماقلىرىغا قاتتىق ئۇرۇنىدۇ. لېكىن ئۇنى شۇ ئادەمنىڭ ساغلام ۋاقتىدىكى تومۇرنىڭ كۈچى بىلەن قىياسەن سېلىشتۇرۇپ كورۇش لازىم. كۈچلۈكنىڭ سەۋىيىسى ھاياتلىق كۈچىنىڭ ئارتۇقلىغىدۇر.

(2) كۈچسىز — بارماق ئۇچىغا تومۇر ھەركىتى كۈچسىز ئۇرۇلۇپ، قىيىنلىق بىلەن سەزگىلى بولىدۇ. بۇ،

بەدەندە ھاياتلىق كۈچى (قۇۋۋەتى ھاۋانىي) نىڭ ئىچىدا
لىغىدىندۇر.

3) موتىدىل — تومۇرنىڭ بارماققا تېپىش كۈچىنىڭ
قىياس بىلەن تەڭ بولۇشى. بۇ، ھاياتلىق كۈچىنىڭ
ئۆلچەمگە لايىق (ئېتىدال) ھالەتتە ئىكەنلىكىدىن دېرەك
بېرىدۇ.

3. تومۇر ھەركىتىنىڭ ۋاقتى جەھەتتىن ئۇل-
چەش: بۇ تۈۋەندىكى 3 خىلغا بۆلىنىدۇ.

1) تېز — تومۇر ئۆز ھەركىتىنى قىياستىن قىسقا
ۋاقىت ئىچىدە تامام قىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى ساپ ھاۋا-
غا (ھاۋايىي نەئىسەھىگە) بەدەننىڭ تەلۋى كۈچلۈك
بولغانلىغىدىدۇر.

2) ئاستا — تومۇر ئۆز ھەركىتىنى قىياستىن ئۇزۇن
ۋاقىت ئىچىدە تاماملىغانلىقى بولۇپ، بەدەننىڭ ساپ
ھاۋاغا تەلۋىنىڭ ئازلىغىدۇر.

3) موتىدىل — تومۇر ئۆز ھەركىتىنى قىياس بىلەن
تەڭ بولغان ۋاقىت ئىچىدە تاماملىغانلىقى بولۇپ،
بەدەننىڭ ھاۋاغا بولغان تەلۋىنىڭ ئوتتۇرا ھالدا
ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

4 - تومۇر ھەركىتىنىڭ جىملىق ۋاقتىدىن ئۇل-
چەش: بۇ، 2 ھەرىكەت ئوتتۇرىسىدىكى دەم ئېلىش
(جىم تۇرۇش) ۋاقتىدىن ئىبارەت بولۇپ، 3 كە بۆلىنىدۇ.
1) بىر تۇتاش (مۇتەۋاتىر) — جىملىق ۋاقتى

ئۈلچەمدىكى ۋاقىتتىن قىسقا بولغانلىقى بولۇپ، قۇۋۋىدى
ھايۋاننىڭ ناچارلىغىنى كورسىتىدۇ.

(2) پەرقلىق (مۇتەئاۋۇت) — بۇ، جىملىق ۋاقتى
ئۈلچەمدىن ئۇزۇنراق بولغانلىغىدۇر. بۇنىڭ سەۋىيى
قۇۋۋىتى ھايۋاننىڭ ئارتۇق بولغانلىقى.

(3) موتىدىل — جىملىق ۋاقتىنىڭ ئۈلچەمگە لايىق
بولغانلىقى بولۇپ، قۇۋۋىي ھايۋاننىڭ ئوتتۇا ھالدا
ئىكەنلىگىنى كورسىتىدۇ.

5. تومۇرنىڭ كەيپىياتىدىن ئۆلچەش:

(1) قاتتىق — تومۇر قىياسقا قارىغاندا قاتتىق بىد-
لىنىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى بەدەندە قۇرۇقلۇقنىڭ ئارتۇق
بولغانلىغىدۇر.

(2) يۇمشاق — تومۇر بارماق ئۇچىغا يۇمشاق بىلىد-
ىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى بەدەندە سۇيۇقلۇقنىڭ كۆپلىگە-
دىن ئىبارەت.

(3) ئىسسىق — تومۇرنى تۇتقاندا قول ئۇچىغا ئىس-
سىق سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى بەدەننىڭ ھارارىتى
ئارتۇق بولۇشىدىن ئىبارەت.

(4) سوغاق — تومۇرنى تۇتقاندا قول ئۇچىغا سو-
غاق سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى بەدەندە ھارارەتنىڭ
ئاجىزلىغىدىن ئىبارەت.

(5) موتىدىل — تومۇرنى تۇتقاندا ئىسسىق-سوغاق-
لىقنىڭ ئوتتۇراھال بولۇشى بولۇپ، بەدەندىكى ئىس-
سىق-سوغاقنىڭ باراۋەرلىگىنى كورسىتىدۇ.

6. تومۇر ئىچىدىكى روھ يەنى كۈچتىن ئولچەش.

چەش: يەنى تومۇرنىڭ تولۇق، بوش ۋە ئوتتۇراھال بولۇشىدىن ئولچەش.

(1) تولۇق بولغاندا تومۇر ھەركىتى قولغا تولۇق سېزىلىدۇ. بۇ بەدەندە سۇيۇقلۇقنىڭ مولچەردىن كۆپ ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

(2) بوش بولغاندا تومۇر ئىچى خۇددى بوشاپ قالغاندەك سېزىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى بەدەندە سۇيۇقلۇقنىڭ ئازايغانلىقىدىن ئىبارەت.

(3) مۆتىدىل بولغاندا تولۇق ۋە بوشلۇقى ئولچەمگە لايىق بولىدۇ. بۇ، بەدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ ئوتتۇراھال ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

7. تومۇر ھەركىتىنىڭ تەركىمىگە ئاساسەن ئولچەش:

(1) تومۇر ھەركىتىدىكى تەكشىلىك (ئىستىۋا) ۋە يەرق (ئىختىلاپ) دىن ئولچەش:

ئىستىۋا دەپ تومۇر ھەركىتىدىكى تەكشىلىككە، يەنى چوڭ-كىچىك، كۈچلۈك-كۈچسىز، ئاستا-تېز بىر تۇتاش (مۇتەۋاتىر) ۋە ئارىلىغۇچى (مۇتافاۋۇت) لىققا ئوخشاش ئەھۋاللارنىڭ بىردەك مەۋجۇتلۇقىغا ئېيتىلىدۇ. ئىختىلاپ دەپ ئۇنىڭ ئەكسىگە ئېيتىلىدۇ.

(1) پۈتۈن تومۇر ھەركىتىنىڭ ئۈچ باسقۇچىدا بىر-بىرىگە ئوخشاشلىق (مۇتەشەببەھ) ياكى بىر-بىرىگە قارشىلىق (مۇتەخالىپ) بولىدۇ. ئەگەر ئوخشاشلىق بولسا

مۇتلەق تەكشىلىك؛ ئوخشاشلىق بولمىغاندا مۇتلەق مۇختەلىپ دىيىلىدۇ.

مۇتلەق تەكشى (مۇستەۋى مۇتلەق)؛

ئەگەر بەزىدە باراۋەر بولۇپ، بەزىدە باراۋەرلىك بولمىسا باراۋەر بولغان تەرىپى تەكشى (مۇستەۋى)، باراۋەر بولمىغان تەرىپى مۇختەلىپ دىيىلىدۇ.

(2) توت بارماق ئاستىدا بولغان تومۇرنىڭ باسقۇچىدا ئوخشاشلىق بولسا مۇتلەق تەكشى، ئەگەر قارشىلىق بولسا مۇتلەق مۇختەلىپ دىيىلىدۇ.

(3) بىر باسقۇچ تومۇرنىڭ بىر قىسمى يەنى بىر بارماقتىكى بەلگىلەر ئوخشاش بولغاندا تەكشى؛ ئوخشاش بولمىغاندا قارىمۇ-قارشى (مۇتەخالىپ) دىيىلىدۇ.

تەكشىلىك (مۇستەۋى)نىڭ سەۋىيىسى بەدەن ئەھۋالى ۋە مىزاجنىڭ ياخشىلىقى، مۇختەلىپنىڭ سەۋىيىسى مىزاج-نىڭ ناچارلىقى ۋە خىلىتلىرىنىڭ ئېغىرلىقى (كوپلىكى) دۇر.

(2) مۇلتىزىملىق — بۇ مۇلتىزىم ۋە غەيرى مۇلتىزىم دەپ 2 گە بۆلىنىدۇ؛

(1) مۇلتىزىم — بۇ، تومۇر ئوز ھەرىكىتىدە بىر، ئىككى ياكى ئۈچىدىن ئارتۇق دەۋرنى ساقلاپ قېلىشتىن ئىبارەت.

مەسىلەن، تومۇرنىڭ تېزلىكى دەسلەپكى باسقۇچتا بىر قىياسكە توغرا بولۇپ، ئىككىنچى باسقۇچلۇق ۋە ئۈچىنچى باسقۇچلۇق دەۋرىدە مۇشۇ تېزلىكنى ساقلاپ

قېلىشى مۇنتىزىم دىيىلىدۇ. ھەر بىر تومۇرنىڭ بەككىلىك تېزلىكى شۇ تومۇرنىڭ ئالدىنقى تېزلىكى بىلەن تەڭ بولۇپ، بۇ مۇئەييەن مىقدارغا بارىدۇ - دە، كېيىن يەنە ئەسلىدىكى مىقدارغا قايتىدۇ. مۇنداق بولۇشى ئىختىلاپ سەۋىيىنىڭ ئاجىزلىغىدىن ئىبارەت. ئەگەر بۇ سەۋەپ كۈچ - لۈك بولغاندا پەرقلىق (مۇتەفاۋۇت) ۋە بىر تۇتاش (مۇتەۋاتىر) لىق پەيدا بولۇپ، بىر ھالەت بىلەن تۇرماستىن مۇمكىن.

(2) غەيرى مۇنتىزىم - ئىككى دەۋر ئىچىدە تېزلىكىنى بىردەك ساقلاپ قالالمايدۇ. ئۆزگىرىپ كېتىدۇ.

(3) تومۇرنىڭ ۋەزىنىدىن ئولچاش: ۋەزنى دېگىنىمىز ئېغىر ۋە يەڭگىللىك بىلەن چېقىشتۇرىدىغان قىياستتىكى ئولچەمدىن ئىبارەت. ئادەملەردە تومۇر مىزاج، تەن قۇرۇلۇشى، يېشى، ئولتۇراق جايىنىڭ ھاۋاسى ۋە تومۇرنى ئولچىگەن پەسلىنىڭ تەبىئىيەتكە قاراپ ھەر خىل ۋە ئالاھىدە بولىدۇ. تومۇر ھەركىتىنىڭ مۇنداق ئەھۋاللارغا ئۇيغۇن ھالدا بولۇشى ئادەم سالامەتلىكىنىڭ توغرا يول بىلەن كېتىپ بارغانلىقىدۇر. بۇنى مۇئەييەن ۋەزىن دىيىلىدۇ. ئەگەر ئەھۋال ئۇنىڭ ئەكسىچە بولسا بۇزۇق ۋەزىن (رەددۇلۋەزىن) دىيىلىدۇ. بۇ تۈۋەندىكىچە 3 كە بولىنىدۇ.

(1) چېكىدىن ئاشقان ۋەزىن (مەجاۋۇزۇلۋەزىن) - بىر ياشلىق بالىنىڭ تومۇرى ئۆسمۈر ياكى ياشلارنىڭ تومۇرىغا ئوخشاپ قېلىشى.

(2) تەرتىپسىز ۋەزىن (خارىجۇلۋەزى): بالىنىڭ
تومۇر ھەركىتى ھەر قانداق ياشتىكىلىرىنىڭ تومۇرىغا
ئوخشەسلىقى بەلكى كېسەل ئادەم تومۇرىدەك تىترەپ
تۇرۇشى.

تومۇرنىڭ يۇقۇرقى تۇرلىرى يامان ئاقىۋەت ۋە
بەدەندىكى چوڭ ئۆزگىرىشلەرنىڭ بەلگىسى بولۇپ، تەبىئى
قۇۋۋەتنىڭ ساپ ھاۋا ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن تومۇرغا
مۇھتاج بولغانلىغىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئەگەر ئىچكى بەدەندە ھارارەت زىيادە بولۇپ،
سۈۋۈتۈشتىن (تەۋرى) ھاجەت كۆپ بولسا ھەركەت كۆ-
چىنىڭ يېتەرلىك بولۇشى بىلەن ھەركەتلىنىدىغان تومۇر
تەسىرىنى قوبۇل قىلىپ نەتىجىدە تومۇر يوغان سالىدۇ.
ئەگەر ساپ ھاۋاغا مۇھتاجلىق قاندۇرۇشقا بولمايدىغان
دەرىجىدە بولسا تومۇر تېز، مۇتەۋاتىر ياكى يوغان بولىدۇ.
تومۇرنىڭ ھەمكارلىشىش كۈچى ناچار بولسا، تومۇر تېز
ۋە ئىنچىكە بولىدۇ.

تومۇرنىڭ يۇمشاق بولۇشى ھوللۇكنىڭ، قاتتىق
بولۇشى قۇرۇقلۇقنىڭ بەلگىسى. ئەگەر تومۇر ھەركىتىدىكى
دولقۇنغا ئازراق قاتتىقلىق قوشۇلسا، بۇ — مىڭ، مەئدە
ۋە ئۈچەيلەردىن ماددىلارنىڭ باشقا ئەزالارغا ھەيدەلگەن-
لىكىدۇر. تومۇرنىڭ قالايمىقانلىقى بەدەندىكى قۇۋۋەتلەر
يوقىلىپ كېتىپ بارغانلىغىنىڭ ئالامىتى ھساپلىنىدۇ.
ئەگەر بۇ ھال داۋاملىق يۈز بەرسە تومۇر ئوزنىڭ
ھەركەت نىزامى (قانۇنىيىتى) ۋە ۋەزىنى يوقىتىدۇ.

4- پەسىل: تومۇرنىڭ سەۋەپلىرى

تومۇر ھەركىتىنى بارلىققا كەلتۈرگۈچى ئامىللار (ئەسۋابى ماسكە) تۈۋەندىكىچە 3 كە بۆلۈنىدۇ.
(1) ئالەت: يۈرەك ۋە قىزىلتومۇر (شەريان) ئالەت دىيىلىدۇ.

(2) پائىل: ھاياتلىق كۈچى (قۇۋۋەتى ھاياۋى)، يەنى تومۇرنى ھەركەتلەندۈرگۈچى قۇۋۋەت.

(3) ھاجەت: يەنى بەدەننىڭ ساپ ھاۋانى قوبۇل قىلىپ، بۇزۇق ھاۋانى چىقىرىپ تاشلاش ئېھتىياجى. تومۇر كېڭىيىش بىلەن سىرتتىن تازا ھاۋانى ئېلىپ قىزىلتومۇرلار ئارقىلىق پۈتۈن بەدەنگە يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يۈرەكنىڭ ھاۋاغا بولغان ئېھتىياجىنىمۇ قاندۇرىدۇ. تومۇر تارنىمىش (ئىنقىباز) بىلەن ھاۋا ئىچكى ئەزالارنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىغا ئورنىشۋالغان كېرەكسىز بۇس بۇخارات ۋە باشقا كېرەكسىز ماددىلارنى سىرتقا چىقىرىدۇ.

ئالەت، ھاياتلىق كۈچ ۋە ھاجەتنىڭ يۇمشاق- قاتتىقلىقى، كۈچلۈك ۋە كۈچسىزلىك جەھەتتىن مۆتىدىل بولۇشى تەبىئىي بولغاندىلا ھەركەت پۈتۈن بولىدۇ. ئەگەر پائىل كۈچلۈك بولسا ھاجەتنىڭ ئوتتۇرا ھالىدىن كەم ياكى ئارتۇق بولۇشى مۇمكىن ئەمەس. ئالەتلەرنىڭمۇ ئەسلىدىن قاتتىق ياكى يۇمشاق

بولۇشى مۇمكىن ئەمەس، ئومۇرنىڭ كۈچى تەبىئىي ھالدا
دىن ئۆزگىرىشى ھاجەتنىڭ ئارتۇق ياكى كەم، قۇۋۋەتنىڭ
كەم ياكى ئاچارلىقى، ئالەتنىڭ يۇمشاق ياكى قاتتىقلىقى -
خىددىن بولىدۇ. لېكىن ئەڭ مۇھىم سەۋەپ ھاجەت (كې-
ڭىيىش - تارىيىش) دۇر. ھاجەتنىڭ زىيادە بولۇشىغا
توۋەندىكىلەر سەۋەپ بولىدۇ.

(1) ئىسسىقلىقنىڭ كۆپ بولۇشى

(2) دەرتنىڭ (ئاغرىقنىڭ) قاتتىقلىقى ياكى ئەم -

كەكتىن ھېرىش.

(3) قاننىڭ سىرتتىن كىرگەن بۇزۇق ماددىلار

بىلەن بىرىكىپ ئۆزگىرىپ ئاچار بۇس بۇخارات (گاز) لارنى
ھاسىل قىلىشى.

تارىيىش ھەركىتى قىسقا، كېڭىيىشكە نىسبەتەن

زىچراق بولۇپ جىملىق (سۈكۈت) ۋاقتى ئاز بىلىنە،

بۇ بەدەننىڭ ئىچكى قاتلاملىرىدا كېرەكسىز بۇس بۇخارات

ۋە سېسىقچىلىقلارنى سىرتقا چىقىرىشقا بولغان ئېھتىياج -

نىڭ زورلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. ئەگەر بۇنىڭ ئەكسىچە،

يەنى كېڭىيىش تېز، تارىيىشقا نىسبەتەن سۈكۈت قىسقا

بولسا يۈرەك ۋە قىزىلتومۇرلارنىڭ سىرتتىن كىرىدىغان

ساپ ھاۋاغا ھاجىتى كۆپلىگەن ئىپادىلەيدۇ. شۇنىڭ

بىلەن چوڭقۇر نەپەس ئېلىش ھاجىتىمۇ كۆچىيىدۇ. سۇ -

كۈتنىڭ تېز بولۇشى ھاياتلىق كۈچىنىڭ ئاچارلىقى

ۋە روھنىڭ تارقاپ كەتكەنلىكىدۇر.

ئۇنىڭدىن باشقا ھاجەتنىڭ يۇقۇرىلىغىنى كۆرسىتىدۇ.

مەسلەن، غەزەپ، جاپالىق ئەمگەك ۋە بەك ئىسسىق مويچىلارغا چۈشۈش بىلەن ھارارەت زىيادە بولىدۇ. لېكىن بۇ يەردە سەۋەپ ۋاقىتلىق بولغانلىقتىن ھارارەتمۇ ۋاقىتلىق بولىدۇ.

1. تومۇر ھەر خىل سېلىشنىڭ سەۋەپلىرى.

(1) تومۇر تېز سېلىشنىڭ سەۋەبى:

(1) ھاجەتنىڭ كۈپلىگى، قۇۋۋەتنىڭ ئاجىزلىغى.

(2) ھاجەتنىڭ ئاجىز (كەم) ۋە ئالەتنىڭ قاتتىقلىغى.

(2) تومۇر بىر تۇتاش (مۇتەۋاتىر) ئۇرۇشنىڭ

سەۋەبى:

(1) قۇۋۋەتنىڭ بوش ۋە ئالەتنىڭ قاتتىق بولۇشى.

(2) قۇۋۋەتنىڭ بوش (ئاجىز) ۋە ھاجەتنىڭ ئاز

بولۇشى.

(3) تومۇر كىچىك سېلىشنىڭ سەۋەبى.

(1) ھارارىتى مۇھرىقە (كېزىك ئىستىمىسى) بولۇپ

قۇرۇقلۇقنىڭ ئەملىك ئۈستىدىن غەلبە قىلغانلىغى.

(2) تەبىئى ئىسسىقلىقنىڭ ئاجىزلىشى، سوغاق

سۇنى كۆپ ئىچىش، سوۋۇتقۇچى يىمەكلىكلەرنى كۆپرەك

ئىستىمال قىلىش، جىنسى ئالاقىنى كۆپ قىلىش، ئۇزاق

ئەمگەك قىلماسلىق ۋە كوكتاتلارنى ھەددىدىن ئارتۇق

ئىستىمال قىلىش.

(3) سۈرگە دورىلارنى ئىچىش بىلەن تومۇردىۋار-

لىرى تارىيىپ بەدەنگە قۇرۇقلۇقنىڭ ھاسىل بولۇشى.

(4) ئىچكى ئەزالاردا ئېغىر ئىششىقنىڭ بارلىغى

مەسلەن، ئوپكە، جىگەر، قېرىن، يۈرەكنىڭ ئىشقىلىرى.
(5) ئۇيىقا كەم بولۇشى، قۇرۇق تاماقلارنى كۆپ
ئىستىمال قىلىش، ئوزۇقلۇقنىڭ يېتەرسىزلىكى ياكى موز-
چىغا چۈشمەسلىك.

(4) تومۇرنىڭ كېچىكىپ ئۇرۇشى ۋە قاتتىق
ئۇرۇشى: — تەبىئەت بىلەن كېسەللىك ئارىسىدىكى كۈرەش
نەتىجىسىدە تومۇرنىڭ ئۇرۇشى كېچىكىپ قالىدۇ.
(5) تومۇرنىڭ يۇمشاق بولۇشى: بۇ تەبىئى ۋە
غەيرى تەبىئى دەپ 2 گە بۆلىنىدۇ.

(1) تەبىئى: ھوللۇك تاماقلارنى ئىستىمال قىلىش،
شاراپ قاتارلىق ئىچمەكلىكلەرنى ئىچىش، ھاۋا ۋە ئەم-
گەك مۆتىدىل بولۇش.

(2) غەيرى تەبىئى: قوساققا يەل چۈشۈش ياكى
مىڭە كېسەللىكلىرى بىلەن ئاغرىش مەسلەن، پالەچ،
لەقۋا، ئىستىرخا (چالا پالەچ)، تەشەننۇج (تارتىشىپ قې-
لىش) ۋە رەئىشە (تەترەپ تۇرۇش) قاتارلىق كېسەللىك
لەرنىڭ بولۇشى.

(6) تومۇر قۇۋۋىتىنىڭ سۇس بولۇش سەۋەپلىرى:

- (1) ئوزۇقلىنىشنىڭ يېتەرسىزلىكى:
- (2) ئوزۇقتىدا سۈرگە ئىچىپ بەدەندىكى كېرەك-
سىز نەرسىلەرنى تازىلاپ تۇرماسلىق:
- (3) قابىلىيەتكە قاراپ ئەمگەك قىلماسلىق:
- (4) قالايمىقان تاماق يېيىش:

(5) بۇرۇن يولنىڭ توسىلىپ قېلىشى؛

(6) ھۇشسىزلىقنى كەلتۈرىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ

مەۋجۇتلۇقى.

2. تومۇر ھەركىتىنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە مۇرەككەپ-

لىشى.

تومۇر ھەركىتىنىڭ ئۆزگىرىشى تۆت خىل ۋە كەيپىياتتىكى موتىدىللىك بۇزۇلۇپ، بۇ ھال يۈرەك ۋە قىزىلتومۇرلاردىمۇ پەيدا بولىشى بىلەن يۈز بېرىدۇ. ئۇندىن باشقا، ئوزۇقلۇقلارنىڭ بەدەندە كۆپ بولۇپ كېتىشى، ئوتۇش يوللىرىدىكى توسالغۇ (ۋاقىتلىق ياكى دائىملىق)، غەزەپ ياكى خوشاللىقنىڭ بەك ئارتۇق بولۇپ كېتىشى، ئاشقازاننىڭ ئاجىزلىشىپ قېلىشى ۋە قۇۋۋە ۋەتنىڭ ناچار ياكى زىيادە بولۇشى بىلەنمۇ تومۇر ھەركىتى ئۆزگىرىدۇ. قۇۋۋەت زىيادە بولغاندا تومۇر ھەركىتى يۇقۇرىغا، قۇۋۋەت ئاجىز بولغاندا تۆۋەنگە قاراپ ئۆزگىرىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى بەدەن ماددا بىلەن كۈرەش قىلىپ مەغلۇپ بولغانلىقىدىندۇر. بەزىدە بەدەندە قاننىڭ كۆپ بولۇشى بىلەنمۇ تومۇر مۇختىلىپ بولىدۇ. قان ئېلىش بىلەن ئۇ ئەھۋال يوقىلىدۇ. قاننىڭ قويۇلۇپ قېلىشى بىلەن يۈرەك ئەتراپى تومۇرلىرىدا ھاۋا توسىلىپ قېلىپ (يۈرەك سانچىسى) خەنناق قەلىبى دېگەن كېسەلنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇ كېسەل تۇيۇقسىز تۈتۈپ ھۇشسىزلىق بىلەن داۋام قىلىپ ئۆلۈم يۈز بېرىدۇ. ھاراقنى كۆپ ئىچىدىغان كىشىلەردە ئۇچرايدۇ.

تومۇرنىڭ ھەرخىل ئۆزگىرىشى ۋە ئۆرەككە پىلىشتىشى بەدەندىكى كېسەل ئەھۋالدىن ۋە كېسەلنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىدۇ. تىنۇپ - بۇنى ئىنچىكىلەپ تەكشۈرۈشى لازىم، بۇنىڭ ئۈچۈن يېتەرلىك دىققەت قىلىش ۋە تەجرىبىنىڭ بولۇشى كېرەك. مۇختىلىپ تومۇر - لار ھەركىتى توۋەندىكى بىر قانچە خىل بولىدۇ.

(1) چاشقان قۇيرۇقىنى تومۇر (زەنبىلپار): تومۇر ھەركىتىنىڭ خۇددى چاشقان قۇيرۇقىدەك تەرتىپسىز مىندىر - لىنى مۇشۇنداق ئاتىلىدۇ. تومۇر ھەركىتى ئۆلچەمگە قارىغاندا پەيدىن - پەي يوغان سېلىپ، بىردىنلا پەسلەپ كېتىدۇ، ياكى 2 - 3 قېتىم يوغان سېلىپ 1 - 2 قېتىم كىچىك سالىدۇ، ياكى 1 - 2 قېتىم چوڭ سېلىپ ئۇزۇن ۋاقىت ئىچىدە كىچىك سالىدۇ (ھەركەتنىڭ دەۋرى مۇختىلىپ بولىمۇ، لېكىن دەۋر ئاياغلاشماستىن تۇرۇپ ھەركەت - نىڭ توختاپ قېلىشى بولۇپمۇ ئۇستۇن ھەركەتتىن توۋەن - لەشكە باشلىشى ئەڭ پامان. ئەگەر توۋەنلىشى يۇقۇرۇپ (لاشقا ئۆتسە، بۇ ياخشىلىقنىڭ ئالامىتىدۇر).

تومۇر ھەركىتى باشلانغان مىقداردىن تېخىمۇ چوڭ سېلىپ، ئۆز مىقدارىغا يانسا ئۇنىڭ باشلانغان تەرىپى ئىنچىكە بولىدۇ. ئىككىنچى قىسمىدا باشلانغان مىقداردىن كىچىكلىشىپ يەنە ئۆز مىقدارىغا قايتىدۇ. بۇ ھال تومۇر تۇتقۇچى تۈپىنىڭ بارماقلىرى ئاستىدا - بىرىنچى بارماق ئاستىدىكى ھەركەت ئىككىنچى بارماق ئاستىدىكىگە قارىدۇ.

خالددا سۇس، ئۈچىنچى ۋە تۆتىنچى بارماقلار ئاستىدىكى
ھەركەتلىرىمۇ بىر-بىرىگە نىسبەتەن سۇس سېزىلىدۇ.
بۇ قايتقۇچى چاشقان قۇيرۇغىدەك تومۇر (زەنبىلى راجىي)
دېيىلىدۇ. يەنە بىر قىسمى تومۇر ھەركىتى قايتىمىغان
ھالدا سېلىپ تۇرۇش بىلەن دەۋرىنى تامام قىلىدۇ، بۇ
زەنبى مۇنقازا دېيىلىدۇ. ئەگەر قايتىمىسا ۋە دەۋرىنى
تامام قىلىدىغان ۋاقتى سەزگىلى بولمايدىغان دەرىجىگە
يەتمىسە بۇ يېرىم قايتقان چاشقان قۇيرۇغىسىمان تومۇر
(زەنبى ناقىس رۇجۇئى) دېيىلىدۇ. ئومۇمەن زەنبىلار
تومۇر كېسەلنىڭ ئېغىر ئەھۋالىدا ئىكەنلىكىدىن دېرەك
بېرىدۇ.

(2) مۇسەللى: تومۇرنىڭ قۇۋۋەت جەھەتتە چوڭ
سېلىشى كەمرەك بولۇپ، تاتىشقان ھالدا سالىدۇ. كۈچ
جەھەتتە زەنبىلارغا نىسبەتەن 3 دىن 2 قىسىم ئارتۇق
بولىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى ھاجەتنىڭ كۆپلىگىدۇر، ئۇ كېسەل
دە ھارارەت بارلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇ ياخشى ئاقىۋەت
نىڭ بەلگىسى ھىساپلىنىدۇ. ئەگەر ھارارەت بولمىسا
كېسەل ئاقىۋىتىنىڭ ئاچارلىغىنى ئىپادىلەيدۇ، تىۋىپ
بۇنىڭغا دىققەت قىلىپ چارە كۆرۈشى كېرەك.

(3) مىنشارى: تومۇر ھەركىتى قالايمىقان خۇددى
جادى ھەرە ھەركىتىدەك بولىشى، يەنە بىر ئاستىن، بىر
ئۈستۈن، بىر ئۇزۇن، بىر قىسقا، بىر ئىلگىرى، بىر
كېيىن، بىر يۇمشاق، بىر قاتتىق بولۇشتىن ئىبارەت بولۇپ،
بۇ خىل ئىختىلاپلارنىڭ سەۋىيى تۈۋەندىكى نەرسىگە باغلىق:

(1) سەۋەپلەرگە باغلىق ئىختىلاپلار (ئىختىلاپى مەسئۇب): تومۇرلارنىڭ ئوزۇن ئىچىدىكى مەسىلەن، قان، سەپرا، بەلغەم ۋە سەۋدا قاتارلىق خىلىتلەرنىڭ بىرەرسى مۇرەككەپ ھالدا كۆپىيىپ ئوزگىرىشكە باغلىق ھالدا كېلىپ چىقىدۇ. بۇ خىل ئوزگىرىش خىلىتنىڭ سېسىقلىق (ئۇفۇنەت) پەيدا قىلىشى ياكى پىشىش-پىشماشلىقى قاتارلىق ئەھۋاللارغا باغلىق. چۈنكى ئۇفۇنەت يۇمشاقلىق پەيدا قىلىپ، تومۇرنىڭ كېڭىيىش كۈچىنى كېڭەيتىدۇ. ئۇفۇنەت يوقلۇقى بۇنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ.

(2) ئەسەپ (نېرۋا) ۋە پەيلەرگە باي بولغان ئەزالارنىڭ بىرسىدە ئىششىق بارلىقى، ياكى تومۇر دىۋارىدا قاتتىق-يۇمشاقلىقنىڭ بولۇشى ئاستىن ھەركەت پەيدا قىلىدۇ. بۇ ئەھۋال كۆكرەك پەردە ياللىقى (زاتىل جەنبە) كېسەلىدە كۆرۈلىدۇ. چۈنكى زاتىل جەنبە كېسەلىدە نەپەسلىنىش ئەزالىرىنى ئوراپ تۇرغان كىرگىت گۆش ياكى مەندە بىلەن نەپەسلىنىش ئەزالىرى ئوتتۇرىسىدىكى پەردىدە ۋەزەم بولىدۇ. بۇ پەردە ئىچكى ۋە تاشقى تەرەپتىن قان تومۇر ۋە ئەسەپلەرگە باي، ئىششىق ئەزالىدىكى قان تومۇرلار تارتىشقا باشلايدۇ. نەتىجىدە شۇ تەرەپتىكى تومۇر ھەركەتلىرىدە ئوزگىرىش پەيدا بولۇپ قاتتىق، يۇمشاق، بىرتۇتاش، پەرقلىق، لەيلىگەن ۋە چوڭكەن تومۇر ھەركەتلىرى كۆرىلىدۇ. لېكىن ئىششىق بولمىغان تەرەپتىكى قان تومۇرلار ھەركەتتى ئازراق تەسىرگە ئۇچرىدۇ. سىمۇ كۆپ ئوزگىرىش بولمايدۇ.

(4) دولقۇنسىمان (مەۋجى): تومۇر ھەركىتى تىۋىپ قولىغا دولقۇنلاپ ئاققاتىدەك - بىلىنىپ ئۈچ بارماقنىڭ ھەر قايسىسىغا ئىگىز - پەس، ئىلىگىرى - كېيىن، ئۇدۇلغا ۋە توغرىسىغا ئۇرۇلغىنى سېزىلىدۇ. ئوھۇرنىڭ بۇ خىل ھەركىتى بەك ئىسسىق مونتىچىغا كىرگەندە، ھاراقنى - كۆپ ئىچكەندە، ئىستىسقا، پالەج، سەكتە، ئوپكە ئىششىقى قاتارلىق كېسەللەردە ئۇچرايدۇ. بۇ خىل تومۇر ھەركىتى قىزىتمىلىق كېسەللەردە كۆرۈلسە، كېسەل تەرلەپ بوھ - رانغا كىرىشىدىن دىرەك بېرىدۇ. سەۋىيى قۇۋۋەت ئاجىز - لىشىپ تەبىئەتنىڭ تومۇر ھەركىتىنى باشقۇرۇشى ناچار - لاشقانلىقى، يۈرەكنىڭ ئىنسىسات ۋە ئىنقىباز پائالىيەت - لىرىنىڭ ناچارلاشقانلىغىدۇر.

(5) قۇرۇت ئومىلىگەندەك تومۇر ھەركىتى (دۇدى): تومۇر ھەركىتىنىڭ خۇددى قۇرۇت ماڭغاندەك سېزىلىش - گە ئېيتىلىدۇ. دولقۇنسىمان تومۇرغا ئوخشاپ كەتسىمۇ لېكىن كۈچسىز، ئىنچىكە بولۇپ، پەيدىن - پەي سالىدۇ. تىۋىپ بىر قېتىم ئۇرغان تومۇرنى 2 قېتىم ئۇرغاندەك سېزىدۇ. تومۇر تېزدەك بىلىنىدۇ. لېكىن تېز بولمايدۇ. دىمەك بۇ مۇرەككەپلەشكەن تومۇر بولۇپ، قۇۋۋەتنىڭ بىردىنلا يوقىلىپ كېتىپ بارغانلىقىنى يەنى ھاياتلىقنىڭ تۈگەش ئالدىدا ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.

(6) چۇمۇلە ماڭغاندەك تومۇر ھەركىتى (نەملى): تومۇر ھەركىتى تىۋىپقا چۇمۇلە ماڭغاندەك سېزىلىدۇ. بىر تەرەپتىن دۇدى تومۇرغا ئوخشاپ كەتسىمۇ بىراق

كېچىك، مۇتەۋاتىر، قاتتىقراق، ئەمما تاجىز بولىدۇ.
سەۋىيى يۈرەكنىڭ ساپ ھاۋاغا ھاجىتى كۆپ ئىكەنلىكى
ھاياتلىق كۈچىنىڭ خەۋپ ئاستىدا قالغانلىقىدىندۇر.

(7) ئىككى چوققىلىق تومۇر ھەركىتى (غوزالى):
تومۇر ھاجەتكە لايىق ئۇرىدۇ، لېكىن تومۇرنىڭ قاتتىق-
لىقىدىن بىرلا ھەركەت قىلالماي ئىككى ھەركەت ئوت-
تۇرىسىدا بىر توختايدۇ، بۇ ھاجەتنىڭ كۆپلىكىنى
ئىپادىلەيدۇ.

(8) قوش باشلىنىشلىق تومۇر ھەركىتى (زۇلفىت-
رەت): ھەركەت باسقۇچىدا سۈكۈت (توختاش) نىڭ بول-
شى، بۇنىڭ سەۋىيى قۇۋۋەتنىڭ (تەبىئەتنىڭ) ئاجىزلاش-
قانلىقىدىندۇر.

(9) مېترىقى: تومۇر ھەركىتىدە بازغان ئۇرغاندەك
سېزىمنىڭ بولۇشى — يەنى تومۇردىكى دولقۇن بارماققا
ئۇرۇلۇپ بولۇپ ئارقىغا بىر ئاز قايتىپ، مەركەزگە بار-
ماستىن كېڭىيىش ھەركىتىنى تامام قىلىدۇ. بۇ خۇددى
سوقۇلغان بازغاننىڭ قايتىشىغا ئوخشايدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى
بىر تەرەپتىن ھاياتلىق قۇۋۋىتىنىڭ كۈچلۈك بولغانلىقى،
يەنە بىر تەرەپتىن روھنىڭ ساپ ھاۋاغا بولغان ھاجە-
تىنىڭ كۆپلىكىدىن ئىبارەت.

(10) تەرتىپسىز تومۇر ھەركىتى (ۋاقىنى فىلۋەسەت):
جىملىق ئورنىدا ھەركەت يۈز بېرىش، مەسىلەن، كېڭىيىش
تامام بولغاندىن كېيىن تېزلا تارىيىش باشلىنىدۇ. ياكى بىر

ئاز جىملىق بولۇپ تارىيىش باشلىنىدۇ، شۇ ھالدا تومۇر ئالدىراشلىق بىلەن قاتتىق ئۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن جىملىق بولۇش لازىم بولغان ۋاقىت ئىچىدە يەنە ھەركەت يۈز بېرىدۇ. تەرتىپسىز تومۇر بىلەن مېترىقى پەرقى شۇكى تەرتىپسىز سوققان تومۇردا كېڭىيىش تامام بولغاندىن كېيىن كېڭىيىشكە قاراشلىق تارىيىش تامام بولۇشتىن بۇرۇن ئىككىنچى سوقۇش (تېۋىپنىڭ بارمىغى ئۇچىغا تومۇرنىڭ ئۇرۇشى) يۈز بېرىدۇ. مېترىقىدە كېڭىيىشتىن ئىلگىرى بولىدۇ. تەرتىپسىز تومۇرنىڭ سەۋىيىسى بەدەننىڭ ساپ ھاۋاغا ھاجىتىنىڭ كۆپلىگىدىن ھەركەت قىلىشقا تېگىشلىك بولمىغان ۋاقىت ئىچىدىمۇ ھەركەت قىلىشتىن ئىبارەتتۇر. بۇنىڭغا ئەگىشىپ نەپەس ئېلىشۇمۇ تېزلىشىدۇ. 11) تىترىگەن (مۇر ئەتىش) تومۇر ھەركىتى: تومۇرنىڭ تىترەپ ھەركەت قىلىشى بولۇپ، بەدەندە خىلىتەلەرنىڭ كۆپلىگى، قۇۋۋەتنىڭ كۈچلۈكلىگى، تومۇر-نىڭ قاتتىقلىقى، قۇۋۋەتنىڭ كېسەلگە قارشى كۈرەش قىلغانلىقى تۈپەيلىدىن ھاجەتنىڭ كۆپ بولۇپ كېتىش-دىن كېلىپ چىقىدۇ.

12) تەكشى ئەمەس (نامەۋزۇن) تومۇر ھەركىتى: تومۇرنىڭ قالايمىقانلىشىپ بىر قۇر يانغا، بىر قۇر ئۇدۇلغا ئۇرىدۇ. سەۋىيىسى كۆپىنچە قۇۋۋەت ناچار، ھاجەت كۆپ بولۇشىدىن ئىبارەتتۇر.

13) تەكشى (مەۋزۇن) تومۇر ھەركىتى: تومۇر ھەركىتىنىڭ بىر ھالدا بولۇشى. بۇ ھاجەتنىڭ تەبىئەت

بىلەن كۆرەش قىلىپ غەلبە قىلالىغانلىقىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

3. تومۇرنىڭ ياش، جىنسى، پەسىل ۋە مىزاجلار ۋە باشقا جەھەتتىكى ئالاھىدىلىكلىرى.

(1) تومۇرنىڭ ياش جەھەتتىكى ئالاھىدىلىكى: كىچىك بالىنىڭ تومۇرى تېز ۋە مۇتەۋاتىر (پەيدىن - پەي)، يوغان - كىچىكلىكتە موتىدىل بولىدۇ. سەۋىيى ھاجەتنىڭ كۆپلىگىدىن ئىبارەتتۇر. چۈنكى بالىنىڭ بەدىنىدە نەدە - لىك كۆپ بولۇپ، قۇۋۋەت تۇلۇق ھاسىل بولۇپ كەتە - مىگەن بولىدۇ.

ياشلارنىڭ تومۇرى كۈچلۈك بولىدۇ، چۈنكى ئۇلارنىڭ يۈرەك ۋە باشقا ئەزالىرىدا 4 خىل كۈچ تولۇقلىنىپ بولغان ۋە بالىلىق ۋاقتىدىكى نەملىك تار - قىلىپ كەتكەن بولىدۇ. ياش ئۆسمۈرلەرنىڭ تومۇرى يوغان سالغاندا ناھايىتى كۈچلۈك سېزىلىدۇ، بۇ ھاجەت - نىڭ كۆپلىگىدۇر.

قېرىلىق تومۇرى (نەبىزى كۈھولپەت) ياشلىق دەۋ - رىگە نىسبەتەن كىچىك ۋە ئاستا بولىدۇ.

(2) تومۇرنىڭ مىزاجلار جەھەتتىكى ئالاھىدىلىكى: مىزاجنىڭ ئىسسىق تەرەپكە ئۆتۈشى ھاياتلىق قۇۋۋەت - لىرىنىڭ تەبىئىيلىگىدىن ۋۇجۇتقا كېلىدۇ. لېكىن بەدەنگە ئۈزلەشمىگەن ھەددىدىن ئارتۇق ئىسسىقلىق غەيرى تەبىئى بولىدۇ. بۇ ھال ئېتىدالدىن قانچىلىك ئوشۇق بولسا

قۇۋۋەتنى شۇنچە ئاجىزلاشتۇرۇپ قويدۇ. مۇنداق ئەھمىيەت
ۋال كۆپىنچە يۇقۇرى ئىستىملىق كېسەللەردە كورۇلۇپ
تومۇر ھەركىتىدە مۇخالىپەتلىك ئوزگىرىشلەرنى بارلىققا
كەلتۈرىدۇ. مەسىلەن، يۇقۇرى ئىستىملىق كېزىك كې-
سەللىرىدىن ئەسۋىلىك كېزىك (تەبىي مۇھرىقە) قاتارلىقلاردا
قۇۋۋەت ئاجىز بولغانلىقتىن تومۇر ئىنچىكە، ئاستا ھەم
مۇتەفاۋەت سالىدۇ. تومۇر دولقۇنسىمان ياكى موتىدىل
بولۇشى تومۇرنىڭ مىزاجىغا باغلىق؛ ئەگەر قۇرۇق بول-
غاندا ئىنچىكە ۋە قاتتىق ئۇرىدۇ. قۇۋۋەت كۈچلۈك
بولۇپ، ھاجەت ئارتۇق بولسا تومۇر ئىككى چوققىلىق
(يۇقۇرى پەللىلىك) ياكى تىترىگەن (مۇر ئەتەش) بولىدۇ،
يەنى تىترەپ سالىدۇ.

(2) ئەر ۋە ئاياللارنىڭ تومۇرىدىكى پەرق: ئەر-
لەرنىڭ تومۇرى ئاياللارنىڭ تومۇر ھەركىتىدىن چوڭ
ھەم كۈچلۈك بولىدۇ. چۈنكى ئەركىشنىڭ مىزاجى ئىس-
سىق، ھارارىتى يۇقۇرى كېلىدۇ. شۇنىڭدەك ئەرلەرنىڭ
تومۇرىنى تۇتۇش ئورنى كۆپرەك ئۇزۇن ۋە ئازادە
بولىدۇ. تومۇرنىڭ سۈكۈت ئارىلىقى ۋە ۋاقتى ئۇزۇن
ھەم تەپاۋۇتلىق بولىدۇ.

(3) سېمىز ۋە ئورۇق كىشىنىڭ تومۇرى: ئورۇق
كىشىنىڭ تومۇرى سېمىز كىشىنىڭ تومۇرىغا قارىغاندا
چوڭ ھەم ئاستا بولىدۇ. چۈنكى ئورۇق كىشىنىڭ تومۇرى
ئەركىن ھەركەت قىلىدۇ. لېكىن سېمىز ئادەمنىڭ تومۇرى

گوشنىڭ مەلۇم دەرىجىدە توسقۇنلۇغىغا ئۇچراپ ئەركىن ھەركەت قىلالمايدۇ. سېمىز كىشىنىڭ تومۇرى تېز ۋە ئىنچىكە بولىدۇ. ئەگەر سېمىزلىك گوشنىڭ كوپلىگىدىن بولسا تېزلىكى ئارتۇغراق، ياغنىڭ تۇلالىغىدىن بولسا، تېزلىك ئازراق بولىدۇ.

4) يىل پەسىللىرىدىكى تومۇرلارنىڭ ئالاھىدىلىكى: باھار پەسىلىدە تومۇر ھەركىتى موتىدىل بولىدۇ. شەھەر ۋە بازار ئىچىدە ياشىغۇچىلارنىڭ تومۇرى موتەدىل بولىدۇ. ياز كۈنلىرى تومۇرنىڭ ھەركىتى تېز ھەم پەيدىن-پەي، بەزىدە ئاجىزمۇ بولىشى مۇمكىن. تېز بولۇشنىڭ سەۋىيىسى ئىسسىقلىق بولۇشى بىلەن بەدەندىكى ھاجەتنىڭ كوپلىكى، ئاجىز ھەركەت قىلىشى ئىسسىقلىق-نىڭ تارقاپ كەتكەنلىگىدىن كېلىپ چىقىدۇ. كۈز ۋاقىتىدىكى تومۇرلار ئادەتتە موتىدىل بولىدۇ. ئەگەر پەسىل ئۆز تەبىئىتىدە بولماي ئەكسىچە بولسا تومۇر ئۆزگىرىدۇ. مەسىلەن، باھار ۋاقتىدا شامال، بوران ۋە يامغۇر-يېغىن كوپ بولۇپ، ھاۋا تۈتەك ۋە سوغاق بولسا ياكى قىش كۈنلىرى قار ياغماي ھاۋا ئېچىلىپ ئىسسىق بولۇپ كەتسە تومۇر ھەركىتىدە ئۆزگىرىش يۈز بېرىدۇ. ئۇندىن باشقا پەسىل ئۆز ئىتىدالىدىن ئېشىپ كەتسە مەسىلەن، ياز كۈنلىرى ھاۋا ناھايىتى قىزىپ، يامغۇر ياغماي ھاۋا دىمىق بولۇپ قالسا ۋە قىش كۈنلىرى ھاۋا دائىم تۈتەك بولۇپ توختىماي قار يېغىپ تۇرسا بۇنداق ھال-

لاردىمۇ تومۇر ئۆزگىرىدۇ. قىش كۈنلىرى تومۇر ئاستا ۋە كىچىك بولىدۇ، سەۋەپ ھارارەتنىڭ تۈۋەن بولۇپ ھاجەتنىڭ ئاز بولغانلىقىدىندۇر. ئوي ئىچىنىڭ ھاۋاسى ياخشى بولماسلىق، چاڭ-توزاڭ كۆپ بولۇش، سېسىق پۇراق چىقىپ تۇرىدىغان ئورۇنلارنىڭ ئولتۇراق جايغا بەك يېقىن بولۇشىمۇ تومۇردا ئۆزگىرىش ھاسىل قىلىدۇ. (5) ئەمگەك قىلغۇچىلارنىڭ تومۇرى: ئەمگەك قىل-

غۇچىلاردا تومۇر دەسلەپ مۆتىدىل بولۇپ قىزىغانسىرى كۈچلۈك ۋە چوڭ سالىدۇ. چۈنكى ئەمگەك تەسىرى بىلەن بەدەن قىزىپ ھارارەت ئاشىدۇ. ھەركەتنىڭ ئاخىرىدا تومۇر ناھايىتى تېز سالىدۇ. سەۋىيى ھاجەتنىڭ ۋە قۇۋۋەتنىڭ كۈچلۈك بولىشىدۇر. ئەگەر ئەمگەك بەدەن ئىقتىدارىنىڭ چېكىدىن ئېشىپ كەتسە تومۇر سۇس سالىدۇ. سەۋىيىنىڭ چارچاپ قۇۋۋەتنىڭ تارقاپ كەتكەنلىكىدۇر. كۈچى ئاز، ئىش ھەددىدىن زىيادە بولغاندا تومۇر قۇرۇت ئۈمىلىگەندەك ياكى چۇمۇلە ماڭغاندەك سالىدۇ. سەۋىيى كۈچىنىڭ يوقالغانلىقىدىن ئىبارەت.

(6) ئۇخلاۋاتقان، ئويغاق كىشىلەرنىڭ تومۇرى: ئۇيقىنىڭ دەسلەۋىدە تومۇر كىچىك ھەم سۇس بولىدۇ. بەزىدە تەپاۋۇتلىق بولىشىمۇ مۇمكىن. قىسمەن كىشىلەردە توختاپ ئاستا سالىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى تەبىئى ئىسسىقلىقنىڭ بەدەن ئىچكى قاتلاملىرىغا چۈشكۈشىدۇر. بۇ چاغدا ئاشقازان ھەزىم قىلىشقا قاتنىشىپ

قۇۋۋەت ھاسىل قىلىپ بەدەننىڭ سىرتىغا بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تومۇر چوڭ ۋە كۈچلۈك ھەركەت قىلىشقا باشلايدۇ. ئۇيىقا ئوز ئولچىمىدىن ئېشىپ كەتسە تومۇر كىچىك ۋە زەئىپ بولىدۇ. ياكى تېز ۋە تەپاۋۇتلىققا ئۆتىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى بەدەندە ھاسىل بولۇپ ئۆزلەشمىگەن ھارارەت كېرەكسىز بۇ خاراكتېرلارنى پەيدا قىلىپ بەدەندىكى ئىچكىرى قىسمىغا قايتىدۇ. ئەگەر ئۇخلىغاندا مەنىدە تاماق بولمىسا، ئۇ چاغدا مەنىدە ھەزىم قىلىش ئۈچۈن بىر نەرسە بولمىغانلىقتىن قۇۋۋەت ياندۇ، شۇڭا ئىچ ئۇخلىغان ئادەمنىڭ تومۇر ھەركىتى كىچىك، ناچار ۋە كىچىك سالىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى قۇۋۋەتنىڭ زەئىپلەشكەنلىكى ۋە كەيپىياتنىڭ ئۆزگەرگەنلىكىگىدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاخشىمى بالدۇر ياتقان كىشى ئەتىگەندە ئۇخلىماسلىقى لازىم. ئادەتتىكى ئۇيقۇدىن تۇرغان كىشىدە تومۇر چوڭ، تېز بولۇپ، كېيىن ئوز ھالىغا قايتىدۇ. ئۇيقۇدىن قورقۇپ ئويغانسا تومۇر ناچار ۋە زەئىپ بولىدۇ. چۈنكى قورقۇنۇشتىن قۇۋۋەت ئىچكى قاتلىمىغا يالىدۇ. تومۇر بەزىدە چوڭ، تېز، مۇختەلىپ ۋە مورئەتەش بولىدۇ. قورقۇش ھەقىقىي بولمىسا تومۇر تېز ئوز ھالىغا يالىدۇ. ئەگەر ھەقىقىي بولسا ئۇزۇن ۋاقىت شۇ ھالدا قالىدۇ.

(7) تاماقنى ئاز، كوپ يىگەن ۋاقىتتىكى تومۇر ئەھۋالى: ئىستېمال قىلىنغان تاماقنىڭ ئاز-كوپلىكى، تاماقنىڭ مەنىدە ھەزىم بولۇش-بولماسلىقى، ئوزۇقلۇققا

بىاي بولۇش - بولماسلىقىغا ۋە تاماقنىڭ كىشىلەرگە ئاساسلانغان قۇۋۋەتلىك مىقدارىغا قاراپ تومۇر ھەركىتى ھەرخىل بولىدۇ.

تاماقنى كۆپ يەيدىغان كىشىلەرنىڭ تومۇرى تېز ۋە مۇختەلىپ سالىدۇ. چۈنكى مىقدارى كۆپ بولغان تاماقنىڭ مەنىدە ھەزىم قىلىنىشى كېچىكىپ ئېغىرلىق پەيدا قىلىپ ئىختىلاپ ھاسىل قىلىدۇ. يىمەك - ئىچمەك ئۆز ئۆلچىمىدە بولغاندا تومۇر قۇۋۋەتلىك سالىدۇ. چۈنكى ئۇنداق تاماقتىن روھ ۋە بەدەن ھارارىتى ياردەم ئالىدۇ. تاماقنى ئاز يىگەندە تومۇر شۇ تاماقنىڭ كۈچىگە قاراپ ھەركەت قىلىدۇ. ئىسسىق مىزاجلىق كىشى ياكى قىزىق - مىسى بار كىشى كۆپ مىقداردىكى ئىسسىقلىق تاماقنى ئىستىمال قىلغاندا تومۇر ھەركىتى زەئىپ بولىدۇ. چۈنكى مىزاج تېخىمۇ ئىسسىقلىققا ئۆزگىرىپ مىزاجىنى بۇزۇپ قويىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تەبىئەت زەئىپلىشىپ تومۇر ھەركىتىنى ئاچارلاشتۇرىدۇ. ئەسلى مىزاجى ئىسسىق بولغان كىشىلەر سوغاق تەبىئەتلىك تاماقلارنى يىمىشى لازىم. سوغاق مىزاجلىقلار ئىسسىق تاماقلار بىلەن ئوزۇقلانسا مىزاجى موتەدىل ھالەتكە كېلىدۇ. شۇنداقلا قۇرۇق مىزاجلىق كىشىلەر ھوللۇكى زىيادە ئوزۇقلۇقلار بىلەن ئوزۇق - لانغاندا مىزاجى موتەدىللىشىدۇ. ئۇنداق قىلمىغاندا ئەھۋال ئەكسىچە بولۇپ، مىزاجى بۇزۇلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تومۇر ھەركىتى مۇختەلىپلىشىدۇ. چۈنكى سوغاق مىزاج

ئۇستىگە يەنە سوغاقلق قىلىش مىزاجىنى چوقۇم بۇزىدۇ. بۇ يېتەرسىز بولۇپ تۇرغان ھارارەتنى تېخىمۇ ئاجىز-لاشتۇرۇپ نەتىجىدە تومۇرلار ھەركىتىنىلا ئەمەس بەلكى مىگە ۋە ئەسەبلەرنىمۇ زەئىپلەشتۈرۈپ قويىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تومۇر ھەركىتى بىر كېچىكىپ، بىر يوغان ۋە بىر ئاستا سالىدۇ. مۇنداق چاغلاردا ئىسسىقلىق نەرسىلەرنى يەنە ئوز ھالىغا-ئېتىدالغا كېلىدۇ.

ياخشى ئۇزۇقلۇقلار بىلەن ئاچار نەرسىلەرنى قوشۇپ يىگەندىمۇ مىزاجىنى بۇزىدۇ. بۇنداقتا تىۋىپكە ئەسلى يىگەن نەرسىلىرىنى ئېيتىمىغاندا كېسەلنى ئېنىقلاش ۋە ئالدىنى ئېلىش قىيىن بولىدۇ.

ئەسە، تاماكا چېكىش، ھاراقنى كۆپ ئىچىش مىڭنىڭ قۇۋۋىتىنى بۇزۇپ تەپەككۇر قابىلىيىتىنى تۈ-ۋەنلەشتۈرىدۇ. تومۇر ھەركىتىنى سۇلاشتۇرۇپ قويۇش بىلەن مۇختىلىپ ھەركەتلىك تومۇر كېلىپ چىقىدۇ. ھاراقنىڭ ئېغىرلىق پەيدا قىلىشى باشقا غىزالارغا نىس-بەتەن يېنىك، لېكىن بەك كۆپ ئىچىۋەرسە ھارارىتى غەرىزىنى بوغۇپ قويۇپ نەتىجىدە سەكتە (ئۆلۈكتەك ھۇشسىزلىق)، خاپاقان ۋە كوڭۇل ئېلىشىش قاتارلىق كېسەللەرگە دۇچار قىلىپ تۇيۇقسىزلا ئۆلۈپ قېلىش خەۋپىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

8) سۈرگە ئىچكەلدىن كېيىنكى تومۇر ھەركىتى: سۇرۇپ چىقىرىش (ئىستىفراغ) دىن كېيىن تومۇر بوش

ۋە زەئىپ ياكى ئاستا سالىدۇ. ئەگەر سۇرۇش ھەددىدىن
يىنى ئارتۇق بولسا، ئۇ چاغدا تومۇرنىڭ ھەرىكىتى
قۇرۇت ۋە چۇمۇلە ماڭغاندەك بىلىنىدۇ. لېكىن ھۆقنە
(كلزما) دىن كېيىن تولۇق بولىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى
خىلىتلەرنىڭ كۆرىشىدىن ئىبارەت.

9) روھى كەيپىيات بىلەن تومۇر ھەركىتىنىڭ
مۇناسىۋىتى: خۇشلۇق، خاپىلىق، قورقۇش، غەزەپ ۋە
ئاچچىقلىنىشلار ئۆز ئېتىدالىدا بولسا، تومۇرنىڭ ھەرى-
كىتىمۇ ئاستا، قاتتىق، بوشلۇق، چوڭ ۋە كىچىكلىك
جەھەتلىرىدىن مۆتىدىل بولىدۇ. ئەگەر ئۇنىڭ ئەكسىچە
بولسا تومۇر ھەركىتىمۇ ئۆزگىرىدۇ.

خۇشلۇق ۋاقتىدا تومۇر يوغان ۋە پەرقلىق
(مۇتەفاۋۇت)؛ خاپىلىق ۋاقتىدا زەئىپ ۋە ئىنچىكە ياكى
ئاستا؛ قورقۇش ۋاقتىدا تېز ۋە تىتىرىگەن، غەزەپ ۋە
ئاچچىقلىنىش ۋاقتىدا يوغان تېز ۋە پەيدىن-پەي
(مۇتەۋاتىر) بولىدۇ. خىجالەتلىك ھىس قىلغان چاغلاردا
تومۇر مۇختەلىپ؛ لەززەت ۋاقتىدا يوغان سالىدۇ. چۈنكى
لەززەت قۇۋۋەتىنى ھەركەتلەندۈرىدۇ. تېز ۋە پەيدىن-
پەي بولمايدۇ.

10) ھامام (مونچا) غا كىرگەن كىشىنىڭ تومۇرى؛
سۇنىڭ ھارارىتىگە باغلىق بولۇپ مونچا بەك ئىسسىق
بولسا ھاجەتنى ئاشۇرىدۇ. بۇ ھال قۇۋۋەتنى ئاجىزلاش-
تۇرۇپ قويىدۇ. ئىسسىقلىق ئورتا ھال بولسا تومۇر
ھەركىتى يوغان، كۈچلۈك ۋە يۇمشاق بولىدۇ. ئەگەر

سوغاق بولسا (سوغاق سۇ قۇيسا) بەدەن ھارارىتى ئىچكى قاتلامغا يىغىلىپ قېلىپ تومۇر ھەركىتى تېز ۋە كۈچ-لۈك؛ زاك، گۇڭگۇرت، قەلەي كانلىرىدىن چىققان ئىسسىق بۇلاقلارغا (ئارشاڭلارغا) چۈشسە تومۇر ھەركىتى قاتتىق ۋە تېز بولىدۇ.

4) كېسەل كىشىلەرنىڭ تومۇرى.

ساغلام ئادەمنىڭ تومۇرى يۇقۇرىدا سوزۇلپ ئوت-كەن تومۇر ھەركىتىنىڭ تۈرلىرىدە يەنى تېز، ئاستا، يوغان، كىچىك، قاتتىق-يۇمشاق قاتارلىقلاردا ئوز ئېتىدالدا ياكى تەبىئى بولىدۇ. تومۇر ھەركىتىنىڭ ئوزگىرىشى ياكى مۇرەككەپلىشىشى غەيرى تەبىئىلىكتىن ياكى كېسەللىكتىن دېرەك بېرىدۇ.

كېسەلنىڭ تومۇر ھەركىتى ئاغرىشنىڭ قاتتىق-يېنىكلىكىگە ۋە ئاغرىق ئورۇقنىڭ يۈزەككە يېقىن-يىراقلىقىغا ھەم شۇ ئەزانىڭ ئەھۋالىغا قاراپ پەرقلىق بولىشى مۇمكىن. بۇ ھال كۆپرەك ۋەرەم (ياللۇغلىنىش) لىق كېسەللىكلەردە ئۇچرايدۇ. ئاغرىش (دەرت) تومۇرغا بەك تېز تەسىر قىلغانلىقتىن تومۇر تېز ۋە چوڭ سالىدۇ. ۋەرەم يۈرەكتىن يىراق ئەزالاردا بولسا ياكى تومۇر قىسقلانلىق ئەھۋاللىرى بولسا، يۈرەكنىڭ ھەركىتى تومۇر ھەركىتىدىن ئاستاتراق بولىدۇ. لېكىن يۈرەككە يېقىن ئەزالاردىكى ۋەرەم تومۇر ۋە يۈرەك ھەركىتىنى تېزەشتۈرىدۇ. مەسىلەن، ئوپكە ياللۇغى (زاتلىرىيە)

كۆكرەك پەردىسىنىڭ ياللۇغى (زاتىلجەنبە) ھەم مەندە ۋە جىگەر ۋە رەملىرى قاتارلىق كېسەللەردە تومۇر ھەرىكىتى ناھايىتى تېز بولغاندەك، يۈرەك ھەرىكىتىمۇ تېزلىشىدۇ. يۇقۇرى قىزىتمىلىق ۋە ئەسۋىلىك كېسەللەردە تومۇر بەك تېز بولىدۇ. تەپلەر ① نىڭ باشلىنىشى ھەرخىل بولغانلىقتىن تومۇر ھەرىكەتلىرىنىڭ ئۆزگىرىش-لىرىمۇ بىردەك بولمايدۇ. بەزىلەردە تېز، بەزىلەردە ئاستا ياكى يۇقۇرى-تۆۋەن باشلىنىدۇ. مەسىلەن، 2 كۈن-لۈك بەزگەك دەسلەپكى قېتىم تۇتقاندا تومۇر ئاجىز ۋە سۈتەۋاتىر بولۇپ، كېيىنچە يوغان ۋە كىچىك سالىدۇ. بەلغىم ئارىلاشقاندا تومۇر ئاجىز ۋە تاپاۋەتلىك سىلەن باشلىنىپ، كېيىن پەيدىن-پەي بولىدۇ. ئومۇملاشتۇرۇپ ئېيتقاندا كېسەللەردىكى تومۇرنىڭ ھالىتى بەدەندە بار بولغان خىلىتلەرنىڭ كەيپىياتى ۋە قۇۋۋىتىگە، شۇنداقلا سىرتتىن كىرىپ قوشۇلغان جەراسىم (مىكروپ) لارنىڭ شۇ ئورۇندا ھاسىل قىلغان كېسەللىك ئۆزگىرىشنىڭ كۈچلىرىگە باغلىق.

① تەپ: ئۇيغۇر تەبابىتىدە تەپ بارلىق قىزىتمىلىق كېسەللىكلەرنى كۆرسىتىدۇ. بەزگەك ئەمەس. بەزگەك تەپلەرنە دەيدۇ — تەھرىر.

VII ماقالا. نەپەس ۋە ئۇنىڭ بۇزۇلىشى

نەپەس ئېلىش ھاياتلىق ئۈچۈن ئەڭ مۇھىم بولغان ھەركەتنىڭ بىرىدۇر. خۇددى تومۇر ھەرىكىتىدەك پۈتۈن بەدەننىڭ ساقلىق ۋە كېسەللىك ھالىتىدىن خەۋەر بېرىدۇ. يۈرەك ۋە پۈتۈن بەدەندىكى قۇۋۋەت (روھ) نەپەس ئېلىش-چىقىرىش بىلەن ھاۋا ئالمىشىش ئارقىلىق بارلىققا كېلىدۇ. نەپەس ئېلىشنىڭ سەۋەبچىلىرى: پائىل — ھاياتلىق كۈچى؛ ئالت — كاناي، ئوپكە، كېرگىت پەردىسى (ھىجابى ھاجىزە) ۋە قوۋۇرغىلار.

ھاجەت — بەدەننىڭ ھاۋا ئالمىشىش ئېھتىياجى يەنى ھاياتلىق كۈچىنىڭ ياردىمى ۋە ئالتەنىڭ ۋاستىسى بىلەن ساپ ھاۋانى يۈرەك ئىچكى قاتلاملىرىغا يەتكۈزۈپ يۈرەك ۋە بەدەن ئىچىدىكى كېرەكسىز بۇس-بۇ خاراتلارنى سىرتقا چىقىرىدۇ. يەنى كېرگىت گۈشلۈك پەردىنىڭ تومۇرغا ئوخشاش 2 ھەركەت قىلىپ بىر توختىشى (كېڭىيىش ۋە قىسقىرىش) قوۋۇرغىلارنىڭ سەقىشى بىلەن ئوپكە سىقىلىپ تەندىكى بۇزۇق بۇس-بۇ خاراتلارنى سىرتقا چىقىرىدۇ. بەدەننى ئاپەتلەردىن تازىلايدۇ. كېڭىيىش بىلەن سىرتتىن ساپ ھاۋانى قوبۇل

قىلىپ يۈرەكنى شاماللىتىپ تۇرىدۇ. بۇ تەبىئىي نەپەس ئېلىشتۇر. بۇنىڭ ئەكسىچە بولۇشى غەيرى تەبىئىي ياكى مۇۋاپىق بولمىغان نەپەس ئېلىش بولىدۇ. ئانداقتا نەپەس تېز ۋە قىسقا بولىدۇ، ئېغىر ھاللاردا خاقىراپ قېلىش ۋە نەپەس بوغۇلۇشلارمۇ كېلىپ چىقىدۇ. مۇنداق ۋاقىتلاردا كېسەلنىڭ چىرايى كۆكۈرۈپ ئوزى بىئارام بولىدۇ. سەۋىبى سوغاق شامال ياكى سىرتتىن نەپەس ئېلىش بىلەن كىرگەن ھەرخىل ئاپەتلەر سەۋەبىدىن ئۆپكە ۋە كانايىلاردا ۋەرمەگە ئوخشاش توسقۇنلۇقلار يۈز بېرىپ نەپەسنى قىيىنلاشتۇرىدۇ. ياكى ھەرخىل غەيرى تەبىئىي نەرسىلەر، جەراسىملار قانغا قوشۇلۇپ ھارارەت پەيدا قىلىپ، يۈرەكنى قىزىتىپ كۆپ ۋە تېز نەپەس ئېلىش ھاجىتى كېلىپ چىقىدۇ. نەپەس ئېلىشنىڭ ياخشى بولۇشى ئۈچۈن روھ، كۈچ ۋە ئالەتلەرنىڭ ساغلام بولۇشى ھەم يۈرەك، ئۆپكە ۋە باشقا ئەزالار خىزمىتىنىڭ ياخشى بولۇشى شەرت. نەپەس ئېلىشنىڭ ناتوغرا بولۇشى ئەزالارنىڭ بىرىدە ۋەرمە بارلىغىنى كۆرسىتىدۇ. نەپەس ئېلىش خۇددى تومۇر ھەرىكىتىدەك ئەزالاردىكى ئۆزگىرىش ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىدۇ.

VIII ماقالا. سۇيدۇك ۋە ئۇنى تەكشۈرۈش

سۇيدۇك جىگەردىكى ھەزىمنىڭ داۋاملىشىشى بىلەن بۆرەكتە ھاسىل بولۇپ دوساق (ماسانە) دا يىغىلىپ سىرتقا چىقىپ كېتىدىغان سۇيۇقلۇقتۇر. سۇيدۇك تەك- شۇررش ئارقىلىق بەدەننىڭ مىزاجى، بولۇپمۇ خىلىتلار ئەھۋالىدىن ۋە جىگەر ھەم بۆرەكنىڭ خىزمىتىدىن خەۋەر تاپقىلى بولىدۇ. تىۋىپ سۇيدۇكتىن ئاساسەن رەڭگى، قىيامى (قويۇق- سۇيۇقلۇقى)، سۈزۈكلۈكى، دۇغ- لۇغى، كۆپۈكلۈكى، چوكمىسى (رۇسۇبى)، پۇرىغى ۋە مىقدارىغا ئوخشاش 8 نەرسىنى ئېنىقلىشى كېرەك.

1- پەسىل: سۇيدۇك تۈرلىرى ۋە ئۇلارنىڭ

ئالاھىدىلىكلىرى

ئادەم سۇيدۇكى سۈزۈك ئاق بولسا بۇ تەبىئى سۇيدۇك ھىساپلىنىدۇ، چۈنكى سۇنىڭ رەڭگىمۇ ئاق كېلىدۇ، ئاقلىق سۇيدۇكنىڭ ئەسلىدۇر. ئادەم بەدىنىدىكى خىلىتلار 4 خىل بولغانلىغى ئۈچۈن سۇيدۇكنىڭ خە- لىتىلەر رەڭگىدە كېلىشمۇ تەبىئى ھىساپلىنىدۇ. يەنى

ئاق، قىزىل، سېرىق ۋە قارا رەڭلەرنىڭ ھەربىرى بىر خىلنىڭ بەلگىسى بولۇپ، بىر رەڭلەرنىڭ ئۆزگىرىشى قايسى بىر خىلنىڭ ئاز-كۆپلىكى، غالىپ ياكى مەغلۇپلىقىنى كۆرسىتىدۇ، مەسىلەن، سۇيۇقلۇكنىڭ ئاق بولۇشى تەبىئىي؛ شىشەدەك، مەنى سۇيۇقلۇقىدەك ياكى جىگدە شەرۋىتىدەك ئاق بولۇشى غەيرى تەبىئى بولۇپ كېسەللىك ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىدۇ. ئۇندىن باشقا سېرىق سۇيۇق تۆۋەندىكىچە 6 تۈرگە بۆلىنىدۇ. مەسىلەن:

(1) سامان رەڭلىك.

(2) ئاپلىسىن رەڭلىك (تۇرۇنچى) (بۇ ئىككىسى تەبىئىدۇر).

(3) كاۋا چېچىكى رەڭلىك.

(4) يالقۇن رەڭلىك.

(5) زەپەر سېرىقى رەڭلىك.

(6) سېرىق زاك رەڭلىك (بۇ تۆتى غەيرى تەبىئى ھىساپلىنىدۇ).

قىزىل سۇيۇق بولسا، قىزىل گۈل رەڭلىك، قان رەڭلىك (قارىغا مايىل قىزىل)، ئاققا مايىل سۇس قىزىل، ئوردان رەڭلىك دەپ پەرىقلەندۈرۈلىدۇ. سۇيۇقتىكى قىزىللىق بەدەندىكى قان ئەھۋالىنى ئىپادىلەپ بېرىدۇ. قارا سۇيۇق: سېرىققا مايىل قارا، قىزىلغا مايىل قارا دەپ 2 گە بۆلىنىدۇ. بۇ سەۋدا ۋە تال ئاغرىقلىرىدىن خەۋەر بېرىدۇ.

9.1 سۇيۇك رەڭگىنىڭ ئاق ۋەلىشىدىكى سەۋەپ ۋە ئۇنىڭ تالاھىدىلىكى

(1) ھول مۇۋە ۋە كوكتاتلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش، بولۇپمۇ خاڭگا، قوغۇن، شاپتۇل قاتارلىقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىشتىن سۇيۇك رەڭگى ئاق كېلىدۇ. (2) سەپرادىن بولغان ئاغرىقلاردا ھارارەت مىڭگە يېتىپ بارغاندا سۇيۇك ئاق، سۇيۇق ۋە سۈزۈك بولۇپ، تىگىدە چوكمىسى بولمايدۇ. بۇ ھال سەپرانىڭ ياغ بىلەن بىرىككەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.

(3) مىڭ سالامەت بولغاندىمۇ سۇيۇك ئاق كېلىدۇ. سەپرا ئۈچەيگە تۇيۇلغان چاغدىمۇ سۇيۇك ئاق كېلىدۇ. ئەمما بۇ چاغدا ئۈچەيدە يارا پەيدا بولۇش خەۋپى بار. ئاغرىقلارنىڭ سۇيۇك ئاق تۇزۇن ۋاقىت ئۆزگەر-مەي ئاق تۇرسا مىڭ سالامەتلىكىدىن خەۋەر بېرىدۇ. (4) بەلغەم كۆپ بولۇش نەتىجىسىدە سۇيۇك ئاق ۋە قىيامى قويۇق يەنى مەندەك ئاق، قويۇق ۋە شىلىملىق كېلىدۇ. بۇ شەكىلدە پالەچ ۋە تارتىش قىلىش (تەشەننۇج) كېسىلىنىڭ ئالدىنقى بەلگىسىدىن ئىبارەت. ئەگەر سېرىق كۆپۈك بولسا يامان ھېساپلىنىدۇ. سۇيۇكنىڭ رەڭگى يۇقۇرقىدەك بولۇپ، بەلغەمدىن بول-خان كېسەللەرنىڭ بەلگىلىرى كورۇلمىسە سالامەتلىكىنىڭ نىشانى ھېساپلىنىپ، سۈرگە بېرىش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ.

5) سۇيىدۇك ئاق ۋە ياغلىشاغۇ بولۇپ جاۋا ياغلاردا ئېرىش يۈز بەرگەنلىگىدىن دېرەك بېرىدۇ.

2. سۇيىدۇكنىڭ قىزىل بولۇشىدىكى سەۋەپلەر ۋە ئۇنىڭ ئالاھىدىلىگى

سۇيىدۇك قىزىل بولۇشى سېرىق بولغىنىغا نىسبەتەن تەبىئى (مۇۋاپىق) دۇر. چۈنكى سۇيىدۇكنىڭ قىزىل بولغانلىقى قاننىڭ كۆپلىگىنى ئىپادىلەيدۇ. قان خىلىتلارنىڭ ئەڭ ياخشىسى بولۇپ، ئادەم ھاياتلىقى قان بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. قاننىڭ ئىسسىقلىقى سەپراغا قارىغاندا كەمرەك. 1) سۇيىدۇك قىزىل ئەمما سۇيۇق بولسا خىلىت (ماددا) نىڭ خاملىغىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇنداقتا كېسەل ئۇزۇنغا سوزۇلىدۇ.

2) قىزىل سۇيىدۇكتە چوكمە بولمىسا قۇرۇقلۇقنىڭ بەدەلدە كۆپلىگى، تەبىئەتنىڭ ئاچارلىغى، كۈچىنىڭ ئاجىزلىغى ۋە ماددىنىڭ كۆپلىگىنى كۆرسىتىدۇ. ھەم جىگەردە ۋەرەم (ئىششەق) بارلىغىنىڭ بەلگىسى.

3) قىزىل سۇيىدۇكتە ئاق چوكمە بولسا بۇ سا-لامەتلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

4) چوكمىنىڭ قىزىل بولۇشى كېسەلنىڭ ئاقىۋىتى ياخشى بولىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

5) قىزىل سۇيىدۇكتە سەپرا قوشۇلغان بولسا خىلىت كويىن بولۇشى مۇمكىن. چۈنكى 2 خىل ئىسسىقلىق بىرىكسە ھارارەتنى ئاشۇرىدۇ. بۇ ئەھۋال بەزىدە

كېسەل كىشى تېز تەرلەپ ساقىيىشنىڭ بەلگىسى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.

(6) قىزىل سۇيدۇك تامچىلاپ كەلسە، قويۇق ۋە سېسىق بولسا، قىزىتمىلىق ئاغرىقلاردا ماددىنىڭ خاملىقىنى كورسەتىدۇ. سېسىقلىق تەبىئەت مەغلۇپ بولۇپ، كېسەللىكنىڭ غالىپ بولغانلىق ئالامىتىدۇر. ياكى بورەكتە يىرىڭلىق ۋە رەم بارلىغىنى كورسىتىدۇ. (7) سۇيدۇك قىزىل، سۇيۇق، شۇنىڭدەك مەئدە ئاجىز، بەدەندە قىچىشىش بولسا يەرقان (سېرىق كېسەل) باشلىنىشنىڭ ئالامىتىدىن ئىبارەت. قىزىل سۇيدۇك ئۈستىدە سېرىق كۆپۈك بولسا ياكى سېرىق چۆكمە بۇ-لۇتقا ئۇخشاپ سۇيدۇك تېگىدە تۇرسا كېسەلنىڭ ئاقەۋىتى بامانلىقتىن دېرەك بېرىدۇ.

(8) ھارارەتلىك كېسەللەردە سۇيدۇك قىزىل بولسا جىگەرنىڭ ئىسسىقلىغى ئارتۇق ئىكەنلىكىنى كورسىتىدۇ. سۇيدۇك قىزىل بولۇپ، ئارقا تەرىتى قۇرۇق بولسا، كۆكرەك كېسەللىكلىرىنىڭ بولۇپمۇ ئۆپكەسلى پەيدا بولغانلىغىنىڭ بەلگىسى بولىدۇ. بەزى ھاللاردا بۇ قان بىلەن بىرىكىپ كەلگەنلىك نەتىجىسى بولۇپ قانتۇمۇر دىۋارلىرى كېڭەيگەنلىك ئىپادىسىدۇر.

(9) بەزى قاندىن بولمىغان ئېغىر كېسەللەردە، مەسىلەن، ئۈچەي توسىلىش (قولۇنچ) كېسىلىدە سۇيدۇك قىزىل كەلسە بەزىلەر بۇنى قان سەۋىيىدىن دەپ خاتا ئويلىشىدۇ.

(10) جىگەر كېسەللىكلەردە ئومۇمەن سۇيۇك قەندىزىل كېلىدۇ.

(11) سۇددە كېسەللىكلىرىدە (قانتۇمۇرلار تو-سلىش خاراكتىرلىك ئاغرىقلاردا) مۇ سۇيۇك قىزىل بولۇپ، سىل قىزىتمىسى (تەپپىدىق) ۋە ئۇچەي سىلىنىڭ پەيدا بولۇشى ياكى كېسەلنىڭ ئېغىرلىشىۋاتقانلىغىنى ھەم چاۋا ئېرىگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا چوقۇم كېسەلنىڭ ئىچى سۇرۇپ كېتىدۇ. دوساقتا يارا بولسا، سۇيۇك قىزىل بولىدۇ. ئەگەر يىرىڭلىق يارا بولسا، سۇيۇك يىرىڭلىق كېلىدۇ ۋە جىنى ئىزانىڭ توشىڭى ئېچىشىپ قىچىشىدۇ.

(12) بەلغەمدىن بولغان كېسەللەردە سۇيۇكنىڭ قىزىللىغى بوھران (كرىزىس) نىڭ ئالامەتلىرىدىن بىرى ھەم تەرلەشنىڭ بەلگىسى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ. چوڭ تەرەتنىڭ كۆپلىگى، ئوتۇش يوللىرىنىڭ توسىلىشى بەل-خەم ماددىسىنىڭ قويۇلۇپ قېلىشلىرى بەلغەمدىن بولغان كېسەللەرنىڭ ئالامەتلىرىدىن ئىبارەت.

(13) سوغۇق مىزاج كىشىلەرنىڭ سۇيىدىكى قىزىل رەڭلىك، قىزىق ۋە سۇيۇق بولىدۇ.

يۈرەككە يېقىن بولغان ئەزالاردا ۋەرەم بولغاندا سۇيۇكنىڭ رەڭگى قىزىل كېلىدۇ. سەۋىيى يۈرەكنىڭ ھارارىتى ئېشىپ كەتكەنلىكىدۇر.

3. سۇيدۇك سېرىق بولۇشنىڭ سەۋىيىسى ۋە ئالاھىدىلىكلىرى

- (1) سامان رەڭلىك سېرىق سۇيدۇك ھارارەتنىڭ تەدبىرلىك ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
- (2) تورونجى (ئاپلىسىن رەڭگىدىكى) سۇيدۇك بىر ئاز ئىسسىقلىققا مايىللىق بەلگىسىدۇر. سېرىق سۇيدۇك سۇيۇق بولۇپ تېگىدە پاختىدەك رۇسۇپ چۈكە ھارا-رەتنىڭ ئۈستۈنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.
- (3) زاك رەڭلىك (قىزىل سېرىق) سۇيدۇك بەك ئىسسىقلىقنىڭ بەلگىسى. سېرىق قىزىلغا مايىل بولغانىمىدىكى ئىسسىقلىق كۆپ، سوغاقلىق شۇنچە ئازلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. سۇيدۇكى دائىم يالقۇن رەڭدە بولىدۇ. سېرىق سۇيدۇك ئۈستىدە لىيلىگەن چۈكە بولمىسا بۇ ناھايىتى يامان. لېكىن ساغلام كىشىلەردە سۇيدۇكنىڭ سېرىق بولۇشى ئۇزۇقلۇق ۋە سەيرانىڭ كەملىكىدىن بولۇپ، بۇنداق كىشىلەر ئۇزۇق كېلىدۇ.

4. سۇيدۇك قارا بولۇشنىڭ سەۋىيىسى ۋە ئالاھىدىلىكلىرى

- (1) سۇيدۇك قارا رەڭلىك بولۇپ 5 كۈنگىچە ئۆزگەرمەسە كېسەلنىڭ ئاقىۋىتى ناچار بولىدۇ دەپ ھىساپلەنىدۇ. ئەگەر قارا سۇيدۇكنىڭ چۈكمىسى تېگىدە بولمىسا ئۈستىدە بولسا ئاقىۋىتى ياخشى. سۇيدۇك قويۇق بولسا ماددىنىڭ خاملىقى ۋە قۇۋۋەتنىڭ تاجىزلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇ

ھال كېسەللىكىنىڭ ئاخىرىدا يۈز بېرىپ، چوڭمەن ئۆيىدە دۇكىنىڭ تېگىگە چوڭمەن، ئۆستىدە قارا كۆپۈك بولسا مېڭە ئىششىغانلىقتىن ۋە ئۆلۈمگە يېقىنلاشقانلىقتىن دې- رەك بېرىدۇ. قارا سۇيىدۇكىنىڭ ئۆستىدە كۆپۈك بولۇشى باش ئاغرىشى ۋە جويۇلۇشنىڭ سەۋەبچىسى بولۇپ، بۇ- رۇن قاناش بىلەن تۈزۈلۈپ كېتىدۇ.

(2) قارا سۇيىدۇك زاك رەڭگىدە بولسا ماددىنىڭ خاملىغىنى بېلدۈرىدۇ.

(3) سۇيىدۇك قارا سۇيۇق، لەيلىگەن چوڭمەن چى- چىلاڭغۇ، بەدەن ئېغىرلاشقان بولسا، بۇرۇن قاناش بەل كىسىدىن ئىبارەتتۇر. بۇ ھال قارا (ئەسۋىلىك) كېزىك- تە كۆپ ئۇچرايدۇ. ئەگەر قارا كېزىك قاندىن بولغان بولسا، بۇ بەلگى قان كۆيگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. قۇلاق ئېغىرلىغى بىللە كەلسە، بۇ ماددىنىڭ پىششىغانلىغىنى بىلدۈرىدۇ.

(4) كۆكرەك پەردە ياللۇغىدا سۇيىدۇكىنىڭ قارا بولۇشى ئۆلۈم يېقىنلاشقانلىغىنى بىلدۈرىدۇ. سۇيىدۇك قا- رىغا مايىل سۇيۇق بولسا، ئاغرىقنىڭ ئۇزۇن يېتىپ- قالىدىغانلىغىنى كۆرسىتىدۇ.

(5) سېرىق كېسەل (يەرقان) نىڭ سۇيىدۇكى قارا دۇغ بولسا كېسەل ياخشىلىنىشقا باشلىغانلىغىدىن خەۋەر بېرىدۇ. قارا سېرىق، قىزغۇچ كۆپۈكتىن بولسا كېسەل- نىڭ ئېغىر ئۆتكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. قىزىل بولۇشى ھارارەتنىڭ بەلگىسى، قارا بولۇشى ماددا كۆيۈپ تەبىئەت-

نىڭ مەغلۇپ بولغانلىغىنى، كوپۇك بولماسلىغىنى
ئوتۇش يوللىرىنىڭ توسۇلغانلىغىنى كورسىتىدۇ.

6) ساغلام كىشىلەردە سۇيدۇك بىرنەچچە كۈن
قارا نۇرسا بورەككە تاش ئورۇنلاشقانلىغىنىڭ بەلگىسى -
دۇر. چوڭ تەرەت بىلەن سۇيدۇكنىڭ بىردەك قارا
بولۇشى سەپرا ياكى سەۋدانىڭ كويگەنلىگىنى، ھارارەت
تۈۋەنلەپ - تەرلىمىگەنلىگىنى كورسىتىدۇ.

5. باشقا رەڭلەردىكى سۇيدۇكلەرنىڭ سەۋىيىسى ۋە ئالاھىدىلىكلىرى

1) يېشىل رەڭدىكى سۇيدۇك - سەۋدا ۋە بەلغەم -
دىن ھاسىل بولغان كېسەللەرنىڭ بەلگىسى ۋە ئاغرىق
ئورۇنلىغانلىقىنىڭ نەتىجىسىدۇر. پىششىق دەم تىۋىپلارنىڭ
كورسىتىشىچە يېشىل سۇيدۇك جۇزام (ماخاۋ) كېسەلىنىڭ
بەلگىسىمۇ بولىدۇ. كىچىك بالىلارنىڭ سۇيدۇكى يېشىل
بولسا تېزدىن ئولۇپ كېتىشى ئىھتىمال. سەۋىيىسى مېڭە
سۇيۇقلىغى قۇرۇپ كەتكەنلىكتىن تارتىشىش كېلىپ چى-
قىپ چىشلىرى كىرىشىپ قېلىپ ئولۇپ كېتىدۇ. ئۇنداق
ھاللاردا بەدەنگە ھوللۇك بېرىدىغان نەرسىلەرنى ۋە
مايلىق نەرسىلەرنى تېزلىكتە كىرگۈزۈش لازىم.

2) ھاۋا رەڭلىك سۇيدۇك زەھەرلىك نەرسىلەر
بىلەن مەسىلەن، زانىكار بىلەن زەھەرلەنگەن كىشىلەردە
ئۇچرايدۇ.

3) سۇيدۇك زەيتۇن يېغى (سۇس يېشىل) رەڭلىك

بولسا ناچار خىلىتلار ۋە زىيانلىق ماددىلار بىلەن تۇرۇپ قالغانلىقى ئىپادىسى بولۇپ خەتەردىن بىلگە بېرىدۇ. ئەگەر ياغ ئارىلاش بولسا تېخىمۇ خەتەرلىك. (4) قىزىل ياقۇت رەڭلىك، ئوسما رەڭلىك، مايى رەڭلىك، تۇخۇمەك رەڭلىك ۋە پوررەڭلىك سۇيۇك ئاسا- سەن ھامىلدار ئاياللاردا بولىدۇ. گوش رەڭ ۋە زاك رەڭ ئارىلاش سۇيۇك سەپرا بىلەن سەۋدانىڭ بىرىككەن- لىكى بولۇپ خەتەرلىكتۇر.

(5) بىنەپشەرەڭ، نوخۇت رەڭ ۋە بىيەسۇيى رەڭلەردىكى سۇيۇك ئىچكى ئەزالارغا مەسىلەن، مەئىدە، جىگەر، ئۆپكە ۋە تاللاردا ۋە رەم بارلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇ خىل رەڭ- دىكى سۇيۇكلەر كۆپ ئۇچرايدۇ. ئاياللارنىڭ بىنەپشە- رەڭلىك سۇيۇكى قوساققا سۇ چۈشۈش (ئىستىسقا) نىڭ ئالامىتى بولۇپ قەدىمقى تىۋىپلار ئىستىسقانىڭ سۇيۇكى دائىم كاشىكاپ رەڭگىدە بولىدۇ دەپ كورسىتىدۇ.

2 - پەسىل: سۇيۇكنىڭ قويۇق- سۇيۇقلۇقى (قەۋامى)

سۇيۇكنىڭ قويۇقلۇق دەرىجىسى سۇيۇق، قويۇق ۋە موتىدىل دەپ 3 خىلغا بۆلىنىدۇ. سۇيۇك دۇغ بولغاندا قويۇق- سۇيۇقلۇغىغا باھا بېرىش قىيىن، دۇغ- لۇق سۇيۇكنىڭ ئەسلى ماددىسىغا باشقا نەرسىلەر قوشۇلغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ.

1. سۇيۇك سۇيۇق بولۇشنىڭ سەۋەپلىرى:

تاماق ھەزىم بولۇشنىڭ ناچارلىقى؛ تومۇر يوللىرىدا توسالغۇ بارلىقى؛ سەۋدا مىزاجىنىڭ قۇرۇق مە- زاجغا ئۆزگەرگەنلىكى؛ تەبىئى ئىسسىقلىق (ھارارىتى غەرىزى) ئاجىزلىشىپ خىلىتلەرنىڭ خام قالغانلىقى؛ سوغاق سۇنى كۆپ ئىچكەنلىك؛ يۈرەكنىڭ ئاجىزلىقى؛ يۈرەكتە ۋەزەم بارلىقى؛ يۈرەك باكى سۇيۇك يوللىرىدا تاش پەيدا بولۇش؛ تەبىئەتنىڭ سۇنى سەرپ قىلىش قۇۋۋىتى ناچارلىشىش تۈپەيلىدىن (سوغاق مە- زاجنىڭ بوزۇلۇشى ياكى قەن سىيىش كېسەلى سەۋىيى بىلەن) سۇنىڭ ئۆزگەرەي ئور بېتىچە چىقىپ كېتىشى (بۇنداق ھاللاردا كېسەل كۆپ ئۇسسايدۇ، كۆپ سىيىدۇ).
بالىلار سۇيۇكلىقنىڭ سۇيۇق بولۇشى غەيرى تەبىئە- ئى. قويۇق بولغانلىقى تەبىئى ھىساپلىنىدۇ.

چوڭ بالىلار سۇيۇكلىقنىڭ سۇيۇق بولۇشى خاس سېسىقلىقتىن بولۇپ، كېسەلنىڭ ئاخىرىدا يۈز بەرسە خىلىت پىشقانلىق، بوھران يۈتكەلگەنلىك ئىپادىسىدۇر. شۇنىڭدەك پۇت- قوللار ئىششىش، يارا چىقىش، ئىچى سۇرۇش ياكى تەرىلىمەي ساقىيىش بەلگىسى بولۇپ قالىدۇ. ساق كىشىلەرنىڭ سۇيۇكلىقى سۇيۇق، بە- دەندە قىچىشىش، ئەزالاردا ئېغىرلىق سېزىمى بار بول- سا، سۇلۇق قاپارتما چىقىش بەلگىسى بولىدۇ. شۇنىڭ- دەك مىزاج سوغاقلىقنىڭ ئالامىتى بولۇپ، قەبرى كىشە-

لەرنىڭ مىزانىغا ئوخشاپ كېتىدۇ. ئەگەر بۇ مال كۆپ
سەللەردە كۆرۈلسە خىلىت خام قالغانلىقتىن ياكى تۈپ-
مۇر يوللىرى توسىلىپ قالغانلىقىنىڭ، باش ئاغرىش
ۋە كۆڭلى ئايىنىشنىڭ بەلگىسىدۇر.

ساغلام كىشىلەرنىڭ سۇيىدۇكى سۇيۇق، قىزىل
بولسا، ئۇزۇقلۇقنىڭ يېتەرسىزلىكى، ئەمگەكنىڭ كۆپلە-
گىنى ۋە غەزەپلەنگەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ. بۇ ئەھۋال
كېسەلدە كۆرۈلسە خىلىتنىڭ خام قالغانلىقى ۋە ھارا-
رىتى غەرىزەنىڭ ناچارلىغىدىن كېلىپ چىقىدۇ. چېچە-
لاڭغۇ چۈكمىلىك سۇيۇق قىزىل سۇيىدۇك ۋە كۆپۈكلۈك
سۇيىدۇك ھارارەت ئۈستۈن بولۇپ، بەلغەم كۆيگەنلىكىدىن،
كۆكرەك ئاغرىقلىرىدا بولسا بەلغەم كۆپلىگىدىن دېرەك
بېرىدۇ.

سۇيۇق سۇيىدۇكنىڭ ئادەتتىكىدىن كۆپ كىلىشى
باش ئاغرىقى، كۆز كېسەللىرى ياكى دەم سىقىش پەيدا
بولۇشنىڭ بەلگىلىرىدۇر. سۇيىدۇك بىردىنلا كۆپ كېلىش
بىلەن بەدەنگە راھەت ھاسىل بولسا، بۇ خىلىتلار پىش-
قانلىقتىن ۋە قۇۋۋەتنىڭ ئارتۇقلىغىدىن كېلىپ چىقىدۇ.
ئەگەر ئاز كەلسە قۇۋۋەت ئاجىز ۋە قويۇق خىلىتلار
كۆپ بولىدۇ.

2. سۇيىدۇك قويۇق بولۇشنىڭ سەۋەپلىرى

قويۇق سۇيىدۇك ھادىسىنىڭ پىشەنلىغىنى كۆرسە-
تىدۇ. دەسلەپتە سۇيۇق بولۇپ كېيىن قويۇق كەلسە

ماددا پىشقان بولىدۇ. دەسلەپتە قويۇق. ئاخىرىدا سۇ-
يۇق بولسا بۇ ھەقىقىي تامام ئەمەس. سۇيۇكنىڭ دۇغ
بولۇشى بەدەندە ماددىلارنىڭ كۆپلىگىنى ئىپادىلەيدۇ.
لېكىن ماددىنىڭ پىشقان-پىشمىغانلىغىنى كېسەلنىڭ
ئومۇمىي ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلەش كېرەك. بەقرات ①
”سۇيۇك ئىشەك سۇيۇكچىدەك دۇغ بولۇشى باش ئاغرىد-
غىنىڭ ئالامىتىدۇر“ دىگەن. خەلىتلارنىڭ تېز چىقىشى بىلەن
سۇيۇك قويۇق كىلىدۇ. قويۇق سۇيۇكنى بىر سائەت قوي-
غاندىن كېيىنمۇ چۆكمە دۇغ ھاسىل قىلمىسا ئىسسىقلىقنىڭ
كۆپلىگىنى، ماددىلارنىڭ قاتتىقلىغىنى، تەبىئەتنىڭ ئاجىز-
لىقى ۋە ماددىلارنىڭ كۆپلىگىنى كۆرسىتىدۇ. ئەگەر بۇ-
ران ۋاقتىدا سۇيۇك دۇغ بولسا بوھران بولۇشىدىن خەۋەر
بېرىدۇ. كېزىك ئاغرىقلاردىكى قويۇق سۇيۇك بوھراننىڭ
تەرلەش بىلەن تامام بولىدىغانلىغىنى كۆرسىتىدۇ. مۇنداق
ھاللاردا قويۇق سۇيۇك سۇيۇق سۇيۇك بىلەن ئالماشما
يۈرەك، بورەك، جىگەر ۋە مەئدە ئەتراپىدا ۋەزەم
بارلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. پالەچ كېسەللىكلىرىدە بوھران
يۈز بەرگەنلىك ئىپادىسى بولىدۇ. تال كېسەللىكلىرىدە
سۇيۇكنىڭ دۇغ بولۇشى كېسەلنىڭ سەۋادىدىن بولغان-
لىغىنى كۆرسىتىدۇ.

(2) سۇيۇك ئوتۇش يوللىرىدا توسالغۇ بولسا
قويۇق سۇيۇكنىڭ بەزىدە يىرنىڭ ئارىلاش كېلىشى موم-
كىن. شۇ يوللاردا تاش بولسا چۆكمە كۆپ بولىدۇ.

① بەقرات: ھېپوكرات - تەھرىر

چوڭ يوتا ساھەسىدە ئېغىرلىق بولسا، تاشنىڭ بۇرۇلغۇچى ئىكەنلىكىنى، ئەگەر جىنىسى ئەزانىڭ تۇۋى قىچىشىپ ئاۋاز چىقسا تاش دوساقتا ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

سۇيىدۇك دەسلەپتە قويۇق بولۇپ، مەندە ئاغرىش ۋە بەدەن قىچىشىلا بىللە كەلسە سېرىق كېسەل باش-لانغانلىقىنىڭ بەلگىسىدۇر.

سۇيىدۇك ئالدى بىلەن دۇغ چىقىپ كېيىن سۇزۇك كەلسە، بۇ ياخشىلىقنىڭ ئالامىتى، ئەگەر ئالدى بىلەن سۇ-زۇك، كېيىنچە دۇغ بولسا ئىزتىراپ زىيادىلىكىنىڭ، مەڭگە قوزغالغانلىق ۋە ساراڭلىقنىڭ بەلگىسىدىن ئىبارەت.

3. سۇيىدۇك مىقدارى ئاز - كۆپلىكىنىڭ

سەۋەبلىرى

(1) تەشۋىش يوق تۇرۇپ سۇيىدۇك كۆپ بولۇشى بەدەندىكى نەملىك ۋە سۇيۇقلۇقنىڭ جىق چىقىمى بولۇپ كېتىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

(2) ئۇچەي تۈسلىش (قۇلىنج) كېسەللىكىدە ۋە قو-يۇق كۆپ كەلگەن سۇيىدۇك كېسەلنىڭ تېز ساقىيىپ كېتىشىنى ئىپادىلەيدۇ. كۆپ يېپ ئىش قىلمايدىغان كىشىلەر-دە سۇيىدۇك كۆپ ۋە ھەرخىل رەڭلىك كېلىدۇ.

(3) سۇيىدۇك مىقدارىنىڭ كۆپ ۋە رەڭلىك بولۇشى ئىسسىقلىقنىڭ ئالامىتى بولۇپ، ئانچە خەتەرلىك ئەمەس. چۈنكى ئىسسىقلىق بولغاندا ئاغرىقلاردا ماددا ئاسان پىشىدۇ.

- (4) ئىستىملىق كېسەللىكلەردە سۇيدۇك ئاز ۋە قىيىنلىق بىلەن چىققا كېسەلنىڭ ئۇزۇنغا سوزىلىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.
- (5) تامچىلاپ ياكى ئىختىيارسىز كەلگەن سۇيدۇك مىڭگە ئاپەت يەتكەنلىكىنى كورسىتىدۇ. ئېقىل بۇزۇلغانلىق ۋە جويۇلۇش ياكى مالىخۇلىيا كېسەللىكىنىڭ بەلگىسىدۇر.
- (6) سۇيدۇكى ئاز كىشىلەردە بۇرۇن قاناش يۈز بەرسە قۇۋۋەتنىڭ ئاجىزلىقىنى بىلدۈرىدۇ. سۇيدۇك ئاز ۋە قارامتۇل رەڭدە كەلسە ماددىنىڭ كويىگەنلىكىنى ۋە سۇيۇقلۇقنىڭ يوقالغانلىقىنى كورسىتىدۇ.
- (7) بەدەن ھارارىتىنىڭ تەسىرى بىلەن بەدەندىكى سۇ پارغا ئايلىنىپ نەتىجىدە سۇيدۇك مىقدارى ئازىيىدۇ.
- (8) سۇيدۇك يوللىرىدا توسالغۇ (سوددە) بولغاندا، ئىچ سۇرۇش (ئىسھال) ۋە قۇسۇش كۆپ بولغاندا سۇيدۇك مىقدارى كېمىيىدۇ.
- (9) سۇيدۇكنىڭ ئازىيىشى سۇلۇق ئىشلىق (ئىستى-قا) نىڭ ئالامىتى بولۇشى مۇمكىن.

3 - پەسىل: سۇيدۇك ئۈستىدە كۆپۈك بولۇشى ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى

سۇيدۇكتە كۆپۈك ھاسىل بولۇپ، پات بوزۇلۇپ كەتمەي ئۇزۇن تۇرۇش ماددىنىڭ خام، چاپلىشاڭغۇلۇشى ۋە يەل بارلىقىنى كورسىتىدۇ.

كوپۇكنىڭ سۇيىدۇك رەڭگىدە ياكى ساقچۇق قارا بولۇشى يەر قان كېسىلىنىڭ بەلگىسى. كوپۇكنىڭ ئاق سۈتكە ئوخشاش بولۇشى ئوپكە كېسەللىكى بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ. ئەگەر كۆپرەك دەريا سۈيىنىڭ كوپۇكلىرىدەك كالىك - كالىك بولسا - روھى كېسەللىكنىڭ بەلگىسىدۇر.

1. سۇيىدۇكتىكى چوكمە (رۇسۇپ) نىڭ سە - ۋىبى ۋە ئەھمىيىتى

سۇيىدۇكنىڭ ئىچىدە لەيلەپ كېيىن ئاستىغا چۈشكەن پاختا، لاي ياكى شور تۈزدەك نەرسىلەر چۈشكەن (رۇسۇپ) دەپ ئاتىلىدۇ. سۇيىدۇكتىكى بۇ خىل رۇسۇپلار كېسەل ئەھۋالغا قاراپ ھەر خىل بولىدۇ. تەبىئەتتە چوكمە سۇيۇقلۇق ئىچىدە ئۇنىڭ تەركىبىدىن ئاجرىتىپ تۇرغان بىر خىل جەۋھەرى جىسىم دەپ تۈسۈلىدۇ. ئۇ تۈزۈندىكىچە 3 تۈرلۈك بولىدۇ:

(1) چوككەن چوكمە (رۇسۇبى راتىپ): سۇيىدۇك - نىڭ تېگىگە چوكىدىغان چوكمە.

(2) لەيلەپ يۈرگەن چوكمە (رۇسۇبى مۇتەئەللەق): سۇيىدۇكنىڭ ئوتتۇرا قىسمىدا لەيلەپ تۇرىدىغان چوكمە.

(3) ئۇزۇپ يۈرگەن چوكمە (رۇسۇبى غۇمام): سۇيىدۇك ئۈستىدە بۇلۇتتەك ئۇزۇپ يۈرىدىغان چوكمە.

سۇيىدۇكتىكى چوكمە تەبىئەتنىڭ كۈچى بىلەن ماددىنىڭ پىشقان ياكى پىشىمىغانلىقىنى، بەدەندىكى

كېسەللىك ئەھۋالىنىڭ ئۆزگىرىشى ھەم بەدەننىڭ كېسەللىككە قارشى كۈچ - قۇۋۋىتىنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەر بېرىدۇ. ئاغرىق پاكىزە قاچىغا سىيىپ تەخمىنەن بىر سائەتتىن كېيىن تىۋىپقا كۆرسىتىشى لازىم. تىۋىپ سۈيى - دۇكىنى كۆرگەندە تۆۋەندىكى بىرقانچە نۇقتىلارغا دىققەت قىلىش كېرەك:

- (1) چۆكمە پىشقان ياكى پىشمىغانلىقى، (2) تەكشى ياكى تەكشى ئەمەسلىكى، (3) چۆكمىنىڭ ئاز - كۆپلىكى، (4) قويۇق - سۇيۇق ياكى كالىئەكلىكى، (5) رەڭگى، (6) چۆكمىنىڭ سۇيۇق تېگىدە ياكى ئۈستىدە ئىكەنلىكى، (7) چۆكمىنىڭ سىيگەندىن كېيىن تېز ياكى ئاستا ھاسىل بولىشى، (8) چۆكمىنىڭ سۇيۇق بىلەن بىرىككەن ياكى ئايرىم ھالدا ئىكەنلىكى قاتارلىق ئەھۋاللارنى تەپسىلىي كۆزىتىش لازىم.

2. چۆكمە ھاسىل بولىشى

سۇيۇق ھاسىل بولىدىغان ئەزالاردا ياكى سۈيى دۆڭ يوللىرىدا ياللۇغلىنىش (ۋەرەم) پەيدا بولغاندا سۇيۇقكە چۆكمە كۆرىنىدۇ. مەسىلەن، جىگەر، بورەك، ماسانە (دوساق) قاتارلىق ئەزالاردىكى ئاددىي ۋە يىرىڭلىق ۋەرەملەردە بولىدۇ. ۋەرەم خىلىتلارنىڭ بۇزۇلۇشى ۋە تاشقى تەرەپتىن بەدەنگە كىرگەن ئۇفۇنەت ماددىلىرى ۋە جىراسىملارنىڭ مەھسۇلىدۇر. ئۇفۇنەت ماددىلىرى قانغا قوشۇلغاندىن كېيىن قاننىڭ كەپپىيا -

تىنى بۇزۇپ چىرىش پەيدا قىلىدۇ. بەدەندىن ئىشنى يىراقلاشتۇرۇش ئۈچۈن تەبىئەت ماددىنى پىشۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇفۇنەت ماددىلىرى (ھازىرقى تىببى تىلدا ئېيتقاندا مىكروپىلار) ۋە بۇزۇلغان خىستىلار قاندىن ئاجراشقا باشلايدۇ. بۇ تىبابەتتە ماددىنىڭ پىشقانلىقى ① دەپ ئاتىلىدۇ. ماددا پىشقاندا كېمەللىك تەرەققى قىلىش دەۋرىدە داۋاملىشىۋاتقان بولۇپ، شۇ كۈنلەردە سۈيىدۈكتە چوكمىنىڭ يۈز بېرىشى ئۇفۇنەت ماددىلىرىنىڭ قاندىن ئايرىلغانلىغىدىن خەۋەر بېرىدۇ. كېرەكسىز ۋە بۇزۇق ماددىلار چوكمە بىلەن قوشۇلۇپ سۈيىدۈك يولى ئارقىلىق چىقىپ كېتىدۇ. بۇ تەبىئەتنىڭ كۈچى بىلەن بارلىققا كېلىدۇ. كۈچ - قۇۋۋەتنىڭ ھالى ئوزۇق - لىنىشقا باغلىق. يەنى ئوزۇقلۇقنىڭ يېتەرلىك - يېتەرسىز - لىكى، ئوزۇق كەيپىياتىنىڭ ئىسسىق - سوغاقلىقى قاتار - لىق ئەھۋاللار تەبىئەتنىڭ ماددىنى يېگىش ياكى پىشۇ - رۇشقا ياردەم بېرىدۇ. ئاغرىقنىڭ ئىشتىھاسى تۇتۇلۇپ تاماقنى ئاز يىگەندە تىۋىپ بۇنىڭغا دىققەت قىلىشى ۋە مۇۋاپىق ئوزۇقلۇقنى چارە قىلىپ، تەبىئەتنىڭ ماددى - نى پىشۇرۇشىغا ياردەم بېرىشى كېرەك.

ساغلام كىشىلەر سۈيىدۈكىدە چوكمە بولمايدۇ. لې - كىن سېمىز كىشىلەر سۈيىدۈكىدە كۆپ يەپ ئەمگەك

① بۇخىل پىشقان ماددا تىبابەتتە "نەزجى" ماددا دەپ

ئاتىلىدۇ - تەھرىر.

قىلمايدىغان (رىيازەت چەكمەيدىغان) ئادەملەر سۇيىدۇك -
دە چوكمە بولىدۇ.

3. تەبىئى ۋە غەيرى تەبىئى چوكمىلەر

(1) تەبىئى (مۇۋاپىق) چوكمە: سۇيىدۇك تېكىدە
ئاق رەڭلىك تەكشى ھالدا بولىدۇ. ئەگەر چالغۇتۇلسا،
چېچىلىپ تۇرىدۇ. چېچىلغاندىن تېز جەملىشىپ كالا-
لەكلىشىپ تۇرغىنى ناھايىتى ياخشى. چوكمە ئادەتتە
سۇيىدۇك رەڭگىدە بولىدۇ. سۇيىدۇك رەڭگىدە بولغىنى،
ئۇنىدىن قالسا سېرىق رەڭلىك ۋە تورۇغى رەڭلىك
رۇسۇپ ياخشى.

(2) غەيرى تەبىئى (مۇۋاپىق بولمىغان) چوكمە:

(1) شىلىمشىق چوكمە (مۇخاتى) - ئاق، قويۇق،
ماڭقىدەك شىلىملىق بولىدۇ. بۇ غەيرى تەبىئى چوكمىنىڭ
پىشقانلىغىنى، مىزاجنىڭ سوغاقلىغىنى كۆرسىتىدۇ. سۇي-
دۇك يوللىرى كېسەللىكىدە، قويۇمچاق ئەسەبىنىڭ يال-
لۇغى (ئەر قۇننىسا كېسەللىكى) ۋە ئاياغ قان تومۇر -
لىرى ئەگرى كېڭىيىپ كېتىش كېسلى (داۋالى كېسلى)
دە بوھران يۈز بەرگەنلىكىنىڭ ئىپادىسىدۇر.

(2) دۇغلاشقان (ئەلقىمى) چوكمە: مەزى ① سۇيۇق -

① مەزى سۇيۇقلۇغى مەنىنىڭ سۇيۇق قىسمى بولۇپ،
سۇيۇق، سۇزۇك، ئازراق شىلىمشىق سۇيۇقلۇقتىن ئىبارەت.
ئەرلەرنىڭ ئارىلىقتىكى پىيازغا ئوخشاش مەزى بېزىدا ئىشلەپ-
چىقىرىلىدۇ - تەھرىر.

لۇغىدەك چۆكمە بولۇپ، بورەك ياكى دوساقنىڭ يېرىم رىڭلىق ۋە رەملىرىدە ئۇچرايدۇ. بۇنى يىرىڭلىق سۇيىدۇك-تىن پەرقلىش كېرەك. يىرىڭلىق سۇيىدۇك چالغۇتۇلسا پۈتۈن سۇيىدۇك ئاقىرىپ كېتىدۇ ۋە سېسىق پۇرايدۇ. (3) چالپاق-چالپاق (خىراتى) چۆكمە: سۇيىدۇك ئىچىدە بىر پارچە ئاق ياكى قىزىل رەڭلىك لاتىغا ئوخشاش ياپىلاق چۆكمە تۇرىدۇ. سەۋىبى دوساقتا يارا پەيدا بولىشىدۇر. بۇ خىلدىكى چۆكمە قارا، توپا رەڭ-دە ياكى قوڭۇر رەڭدە بولىدۇ. بەزىدە بېلىق تېرىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ. بۇ خىلدىكى چۆكمە خەتەرلىكتۇر. ئاق ياكى قىزىل بولغىنى دوساقنىڭ ئۇقۇنەت، جەرا-سىملاردىن تازىلىنىۋاتقانلىغىنى كۆرسىتىدۇ.

(4) دانلىق (نىخالى) چۆكمە: خىراتىدىن كىچىك، قۇرۇق، ئاق رەڭلىك دانە-دانە بولۇپ، خۇددى كېپەك-شەك تۇرىدۇ. بۇ دوساقتا قاپارتمىلىق ئۈزگىرىشلەرنىڭ بارلىغىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر يىرىڭلىق بولسا سېسىق پۇرايدۇ.

(5) پۇرچاقسىمان (كۆرسىنە) چۆكمە: نىخالىدىن چوڭراق، رەڭگى قارامتۇل ئاق ياكى توپا رەڭلىك بولۇپ، پۇرچاققا ئوخشاپ كېتىدۇ. بۇ بورەك جىگەرگە ئوخشاش نازۇك ئەزالارنىڭ ئىچكى قىسمىدا يىمىرىلىش بارلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئەگەر بۇ خىلدىكى چۆكمە تالقاندەك پارچىلانغان كۆرۈنۈشتە بولسا خەتەرلىكتۇر.

(6) گوشسيمان (لههمى) چوكمه: چوكمىنىڭ رەڭگى
گوش رەڭگىگە ئوخشايدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىمۇ پۇرچاقسىمان
چوكمه بىلەن ئوخشاش.

(7) ياغسىمان (رەسمى) چوكمه: بۇ كوپىنچە سۇيىد-
دۇك ئۈستىدە ياغدەك بەزىدە سېرىق سۇدەك لەيلەپ
يۇرىدۇ. بۇ بەدەندىكى ياغ بولۇپمۇ چاۋا ياغلار ئېرىد-
گەنلىكىنى كورسىتىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيى گۈش ۋە چاۋد-
لارنى ئېرىتكۈچى پاقىراپ تۇرىدىغان سەپرا (سەپرايى
دەرخەشان) بولۇپ، رەڭگى بەزىدە ئاق، بەزىدە قىزىل
كېلىدۇ.

(8) يۇڭسىمان (شەئرى) چوكمه: سۇيدۇك بەك
سۇيۇق بولسى تۈپەيلىدىن چوكمه ئۇزۇن تالا-تالا
بولۇپ چىقىدۇ. رەڭگى قىزىل بولۇپ، بورەك كېسىلىدىن
خەۋەر بېرىدۇ.

(9) قۇمىسىمان (رەملى رۇسۇپ) چوكمه: چوكمىنىڭ
قۇمدەك بولۇشى دوساق ياكى بورەكتە قۇم ياكى تاش
بارلىقىدىندۇر. شېغىل تاش ۋە قۇمدەك قىزىل رەڭلىك
چوكمىنىڭ بولۇشى تاش بورەكتە ئىكەنلىكىنى، ئاق
رەڭلىك بولسا دوساقتا ئىكەنلىكىنى كورسىتىدۇ.

(10) قاندىك چوكمه (دەمەۋى رۇسۇپ): چوكمه
قاندىك بولۇپ، سۇيدۇك بىلەن ئارىلىشىپ كەلسە جە-
گەرنىڭ ناچارلىقى، ئەگەر ئايرىم تۇرسا بورەكتە تاش
كوپلىكىنى كورسىتىدۇ. ئەگەر پارچە-پارچە ئۇيۇپ قالغان
قاندىك تۇرسا تال كېسەللىكىنىڭ بەلگىسى بولىدۇ.

(11) خېمىرىسىمان چوكمە (ئەسنى رۇسۇپ، سۇيۇق) دۇك ئىچىدە بىر پارچە خېمىر باردەك كورىنىدۇ. بۇ مەندە ئاجىزلىغىنىڭ ۋە تاماق ھەزىم بولۇش ئاجارلىق-غىنىڭ ئالامىتىدۇر. بۇزۇلغان تاماق، قېتىق دوغىنى كۆپ ئىچكەندىمۇ شۇنداق بولىدۇ.

(12) كۈلىسىمان چوكمە (رەمەدى رۇسۇپ) چوك-مىنىڭ كۈلىرىگەدە بولمىشى بەلغەمدىن دېرەك بېرىدۇ. ياكى يىرىك ئۇزۇن تۇرۇپ قېلىپ رەڭگى ئوزگىرىپ كەتكەنلىك نەتىجىسىدىن ئىبارەت.

4. چوكمە رەڭگىنىڭ بوھران كۈنلىرى بىلەن مۇناسىۋىتى

(1) قارا چوكمە كېسەل ئەھۋالنىڭ يامانلىغىنى كۆرسىتىدۇ. ئەگەر قارا رۇسۇپ بۇلۇتتەك سۇيدۇك ئۇس-تىدە تۇرسا ئىستىقانىڭ بەلگىسى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ. بۇ سەۋدا كېسەللىكلىرىدە بوھران بولۇشتىن دېرەك بېرىدۇ.

(2) توق قىزىل چوكمە ھارارىتى غەرىزەنىڭ 2 تەرەپكە يەنى ئىچكى تەرەپنى قىزىتىپ، تاشقى تەرەپنى سوۋۇتۇشقا سەرپ بولۇۋاتقانلىغىنى ئىپادىلەيدۇ.

(3) ھاۋارەڭ چوكمە مىزاجنىڭ سوغاقلغىنى ئىپادىلەيدۇ.

(4) قىزىل چوكمە قان ئارتۇق ئىكەنلىگىنى ۋە خام ماددا ئازلىغىنى كۆرسىتىدۇ. كۆپىنچە سالامەتلىكنىڭ بەلگىسى بولۇپ قالىدۇ.

(5) زەيتۇنە چۆكمە: سىل كېسىلىنىڭ بەلگىسىدۇر.
 قىزىل رەڭلىك بۇلۇتتەك چۆكمە سۇيىدۇك ئۈستىدە
 تۇرسا ئاغرىق 7- كۈنى تەرلەيدۇ. توۋمىرەك تۇرسا
 14- ياكى 21 نچى كۈنى تەرلەيدۇ (بوھران بولىدۇ).
 كېسەللىكنىڭ 4- كۈنى چۆكمە ھاسىل بولسا
 ئەرلىمەي ساقىيىدۇ. چۆكىمىنىڭ 6- كۈنى كورۇلگىنى
 ياخشى. بۇنداق ئاغرىقلار 8- كۈنى تەرلەيدۇ.
 قىزىل چۆكمە سۇيىدۇك ئىچىدە لەيلەپ تۇرسا ۋەرمە
 پەيدا بولۇپ يېرىڭغا ئايلاڭلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ.

4- پەسىل: سۇيىدۇكتىكى پۇراق ۋە ئەر - ئاياللارنىڭ سۇيىدۇگىنى پەرقلەش

(1) سۇيىدۇكلەر سەسكەندۇرمەيدىغان، سەسكەندۇرد-
 ىغان پۇراقلىق سۇيىدۇك ۋە پۇراقسىز سۇيىدۇك دەپ
 3 خىلغا بۆلىنىدۇ.

(1) سەسكەندۇرىدىغان يامان پۇراقنىڭ بولۇشى
 ھارارەت ئۈستۈن بولۇش بىلەن خىلىتلەر بۇزۇلۇش ۋە
 ئۇفۇنەت ھاسىل بولۇش نەتىجىسىدۇر. سۇيىدۇك ئوزى
 ئاق بولۇپ، ئادەم سەسكىنىدىغان پۇراق چىقىرىپ تۇرسا
 يۇقۇرى ئىستىما ۋە كېسەل ئەھۋالى ئېغىرلىشىدىغان-
 لىغىنىڭ بەلگىسى بولۇپ تەپ كېسەللىكلىرىدە كورلىنىدۇ.
 ئاياللارنىڭ سۇيىدۇكى ئەرلەرنىڭكىگە قارىغاندا
 قويۇغراق بولۇپ رەڭسىز كېلىدۇ. چۈنكى ئاياللار بەدد-

ئىندە ھارارەت ئەرلەرگە نىسبەتەن توۋەن بولىدۇ. ئاياللارنىڭ مىزاجىمۇ ئانچە ئىسسىق بولمايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئاياللار سۇيىدۇكى رەڭسىز بولغىنى ياخشى؛ سېرىق ياكى قىزىل بولغىنى ئانچە ياخشى ئەمەس. ھامىلدار ① ئاياللارنىڭ سۇيىدۇكى سۈزۈك كېلىدۇ. سېرىق بولسا كۆكۈشەرەك كۆرىنىدۇ ۋە چۆكمە سۇيىدۇك تېگىدە بولىدۇ. ھامىلدارلىقنىڭ ئاخىرقى ۋاقتلىرىدا قىزىل بولۇپ رۇسۇپتا ئۇششاق دانە- دانە نەرسىلەر ئاستىن- ئۈستۈن بولۇپ تۇرىدۇ.

ھامىلدارلىقنىڭ 2 - 3 - ئايلىرىدا سۇيىدۇك سۇيۇق بولۇپ، 2 - 3 قوشۇمچە كېلىدۇ. رەڭگى كېيىنچە قىزىل سېرىق رەڭگە ئۆزگىرىپ ئۈستىدە ئازغىنە كۆپۈك ۋە ياغلىق دانلار بولىدۇ. 4 - 5 - ئايلاردىن كېيىن قىزىل رەڭگە كىرىدۇ. چالغۇتسا دۇغ بولۇپ سۇيىدۇك تېگىگە چۆكىدۇ. بۇ ھامىلىنىڭ سالامەتلىكىنى كۆرسىتىدۇ. ئەگەر دۇغ كۆپ بولۇپ مىدىرلاشقاندا چۆكمەي سۇيىدۇك ئۈستىدە تۇرسا بالىنىڭ سالامەت ئەمەسلىكىنى ۋە خەتەر ئىچىدە ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.

① تەبىئەتنىڭ قەدىمقى كىتاپلىرىدا سۇيىدۇك ئۈستىدىكى بۆلۈتقا ئوخشاش چۆكمە پۈتۈن سۇيىدۇك يۈزىنى قاپلاپ تۇرسا قوساقتىكى بالا ئوغۇل؛ ئەگەر يېرىمىنى قاپلاپ تۇرسا تۈرەلمە قىز بولىدۇ. ئەگەر مەزكۇر چۆكمە دانە- دانە ئايرىلىپ تۇرسا ئايال ھامىلدار ئەمەس، بەلكى ئايالنىڭ بەدىنىدە يەل كۆپلىگەن. دىن دېرەك بېرىدۇ- دېگەن كۆز قاراش بار.

XI ماقالا. چوڭ تەرەت (بەۋل) نى تەكشۈرۈش

1 - پەسىل: چوڭ تەرەتتىكى ئارىلاشمىلار

چوڭ تەرەتنى كۆرگەندە، ئۇنىڭدىكى ئۆزگىرىش ئەھۋاللىرىغا قاراپ قايسى ماددىنىڭ تەرەتكە قوشۇلغان-لىغىنى بىلىپ بەدەندە قايسى ماددىنىڭ كۆپ ياكى غالىپ ئىكەنلىكىگە ھۆكۈم قىلغىلى بولىدۇ. مەسىلەن، سەپرا قوشۇلغان بولسا مەئىدە سەپرانىڭ كۆپلىگىنى، بەلغەم قوشۇلغان بولسا بەلغەمنىڭ كۆپلىگىنى بىلىمىز. سەپرانىڭ تەرەتكە قوشۇلۇپ چىقىشى ئوتنىڭ ئاجىز-لىغىنى ۋە جىگەرنىڭ تارتىش قۇۋۋىتى كۈچسىز بولۇپ سەپرانى تارتىپ ئالالمىغانلىغىنى كۆرسىتىدۇ. سەۋدا قوشۇلغان بولۇشى تالنىڭ ئاجىزلىغىنى ياكى قوشۇلۇپ كەلگەن ماددىنىڭ خام قالغانلىغىنى بىلدۈرىدۇ. سەۋدا-لىق كېسەللەردە تەرەت قارا ۋە سۇيۇق كەلسە كېسەل-نىڭ ياخشىلانغانلىغىنى؛ گۆش چايقىغان سۇدەك كەلسە جىگەرنىڭ ئاچارلىغىنى؛ قاراقان قوشۇلۇپ كەلسە تومۇر يوللىرىنىڭ توسالغانلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. شىلىملىق نەر-

سەلەرنىڭ قوشۇلۇپ كېلىشى ئۆتكۈر تاماقلارنى ئىستىمال قىلغانلىق ۋە خىلىتلار ئۆتكۈر بولغانلىق نەتىجىسىدىن ئىبارەتتۇر. چوڭ تەرەت ئاز بولۇشى تۈۋەندىكى بىر قانچە سەۋەپلەردىن كېلىپ چىقىدۇ.

(1) ئوت يوللىرىنىڭ توسىلىشى بىلەن سەپرا ئۈچەيگە يېتەرلىك چۈشەلمەسلىك.

(2) ئوزۇقلۇققا باي بولغان يېمەكلىكلەرنى كۆپ ئىستىمال قىلىش بىلەن تاماقتىڭ كۆپ قىسمى ھەزىم بولۇپ قانغا ئۆتۈپ كېتىپ، كېرەكسىز قىسمى ئاز قېلىش.

(3) جىگەرنىڭ قۇۋۋىتى ياخشى بولۇپ، كەيلىۋىنى پۇتۇنلەي ھەزىم قىلىپ كېرەكسىز قىسمى ئاز چىقىش. تىنىمۇ تەرەتنىڭ مىقدارى ئاز بولىدۇ. لېكىن مەندىنىڭ كۈچى ۋە ئۈچەيلەرنىڭ ھەيدەپ چىقىرىش كۈچى (قۇۋۋەيى داپئەسى) ناچارلىشىپ تەرەتنىڭ قولۇن (چەمبەر) ئۈچەيدە تۇرۇپ قېلىشى نەتىجىسىدە چوڭ تەرەتنىڭ ئاز كېلىشى كېسەللىك ئەھۋال دۇر. چوڭ تەرەتنىڭ سۇ-يۇق ياكى قۇرۇق كېلىشىنى بىلىش ئالاھىدە ئەھمىيەتتە كە ئىكە.

2 - پەسىل: چوڭ تەرەتنىڭ سۇيۇق ياكى

قويۇق كېلىشى

كەيلىۋىس جىگەر تەرەپكە بارماستىن ئۈچەيگە چۈشۈپ كېتىشى بىلەن تەرەت سۇيۇق ماڭىدۇ. بۇنىڭ

3 خىل سەۋىبى بار: (1) جىگەرنىڭ كۈچى ئاجىز بولۇپ، كەيلىنى ئۆزىگە تارتىشنىڭ ناچارلىقى؛ (2) ماسارىقا تومۇرنىڭ ئاجىزلىقى ياكى ئۇنىڭ ئىچكى يوللىرىغا توسالغۇ پەيدا بولۇپ، كەيلىنىڭ جىگەرگە ئۆتۈشكە توسالغۇلۇق قىلىشى؛ (3) مەئىدە تاماق ھەزىم بولۇشنىڭ ناچارلىقى. بۇنى تەرەت رەڭگىنىڭ ئىستىمال قىلغان تاماق رەڭگى بىلەن ئوخشاش بولغانلىقىدىن بىلىمىز. بۇنىڭ سەۋىبى تاماقنى كۆپ يېيىش بىلەن مەئىدە ئۇنى ياخشى ھەزىم قىلالماي كەيلىنىڭ تەرەتكە قوشۇلۇپ كېتىشىدىن؛ مەئىدە بار بولغان ناچار خىلىتلار تاماقنى ياخشى ھەزىم قىلدۇرماستىن ئۈچەيگە ھەيدىشىدىن ئىبارەتتۇر. چوڭ تەرەت قۇرۇق كېلىشنىڭ سەۋەپلىرى.

ئېغىر ئەمگەكتىن كېيىن بەدەندىكى سۇيۇقلۇقنىڭ تارقاپ كېتىشى، كۆپ سىمىش، كۆپ تەرلەش، مىزانىڭ قۇرۇقلۇققا ئۆزگىرىشى ياكى قۇرۇق نەرسىلەرنى كۆپ ئىستىمال قىلىش قاتارلىق سەۋەپلەر بىلەن تەرەت قۇرۇق كېلىپ ئىچ قاتىدۇ.

تەرەتنىڭ بىر قويۇق بىر سۇيۇق كېلىشى ھەزىم-نىڭ ناچارلىقىدۇر. چوڭ تەرەتنىڭ قويۇق-سۇيۇقلۇقتا مۇئەددىل، سوڭ (مەقئەد) نى ئېچىشتۇرمايدىغان، كۆۋۈك-سىز سېرىق رەڭدىكىسى بەدەن ۋە ئۈچەي يولىنىڭ ساقلىغىدىن دېرەك بېرىدۇ.

3. پەسىل: چوڭ تەرەتنىڭ رەڭگى

(1) تەرەتتە سېرىقلىقنىڭ توقراق بولۇشى بەدەندە سەپرا ماددىسىنىڭ كۆپلىگىدىن خەۋەر بېرىدۇ. ئەگەر كېسەللىكنىڭ ئاخىرىدا تەرەت سېرىق كەلسە ئاغرىقنىڭ ساقىيىش دەۋرىگە ئۆتكەنلىگىدۇر.

(2) تەرەتنىڭ كۆپ بولۇشى: ئىچكى ئەزالاردىن جىگەر، تال ۋە مەئدەلەرنىڭ سوۋۇپ قالغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ.

(3) تەرەتتە قان بولۇشى: ئاشقازان، ئۈچەيدە چارەھەت بارلىقى، تاماق ھەزىم بولمىغانلىقى، ماسارىقا تومۇرىغا توسالغۇ پەيدا بولۇش ياكى يەرقان (سېرىق كېسەل) نىڭ ئالامىتىدۇر.

(4) تەرەتنىڭ قارا بولۇشى سۈيىدۈكنىڭ قارا بولۇشى بىلەن ئوخشاش. جىگەردە خىلىتلەرنىڭ بۇزۇل-غانلىقى، مەئىدە سەۋدانىڭ بولۇشى بىلەنمۇ تەرەت قارا كېلىدۇ. ياكى مەئدە يارىسىدىن چىققان يوشۇرۇن قان قوشۇلۇپ كەلگەن تەرەت قارا كېلىدۇ. سەۋدا قوشۇلغان تەرەت توپىغا چۈشكەندە قاينىغانغا ئوخشاش كۆۋۈكلىشىش يۈز بېرىدۇ. شۇنىڭدىن تەرەتتە سەۋدا بارلىقىنى بىلىمىز. سەۋدادىن بولغان ئاغرىقلاردا تەرەت قارا بولۇشى ماددىنىڭ پىشقانلىقى، كېسەلنىڭ ساقىيىش دەۋرىگە كىرگەنلىگىدۇر.

۵) تەرەتتىڭ كالا تىزىكىدەك بولۇشى: بەدەندە يەل بارلىغىنى، ئەگەر مەزكۇر تەرەتنى سۇغا سالسا چوكمەي تۇرۇشى ئۈچەي توسىلىش (قۇلىنج كېسلى) بارلىغىنى كورسىتىدۇ.

6) تەرەت پۇرۇشى سېسىق بولغىنى — بەدەندە ئۇفۇنەت — جىراسىلارنىڭ كۆپلىگىنى، ئاچچىق پۇرۇشى مىزاجنىڭ سوغاق ئىكەنلىگىنى كورسىتىدۇ.

Ⅹ ماقالا. بەلغەم ۋە ئۇنى تەكشۈرۈش

1- پەسل: بەلغەمنىڭ مىقدارى

بەلغەمنىڭ چىقىش - چىقىمىسىنى بەدەندىكى خام رۇتوبەت (ھوللىك) نىڭ پىشقان - پىشمىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. يۈتەل بار ئاغرىقلاردا بەلغەمنىڭ ئاجراپ چىقىشى ماددىنىڭ پىشقانلىقى، يۈتەلگەندە بەلغەم چىقىمىسى ماددىنىڭ خاملىقىدۇر. بەلغەم قويۇقمۇ ئەمەس، سۈيۈقمۇ ئەمەس، ئوتتۇراھال بولۇشى كۈپىنچە ماددىنىڭ پىشقانلىقى ھساپلىنىدۇ. يۈتەل بار ئاغرىقلار يۈتەلگەندە بەلغەم چىقىشى بىلەن ئارام تاپسا بەدەندە ماددىنىڭ كۈپىلىگى بولۇپ بۇ چاغدا بەلغەمنى تازىلاش (تەنقىھ قىلىش) كېرەك (كېيىنكى باپلاردا تولۇق سۆزلىنىدۇ).

2- پەسل: بەلغەمنىڭ رەڭگى

بەلغەم ئاق رەڭدە بولسا ماددىنىڭ خاملىقى ھەم ساپلىنىدۇ. سېرىق بولسا سەپرا ئارىلاشقان دىيىلىدۇ.

يېشىل دۇغ بولسا ماددىنىڭ كويگەنلىكى ياكى
ھارارىتى غەرىزەنىڭ يوقالغانلىقىدىن ئىبارەت، قارا بول-
سىمۇ شۇنداق. بەلغەم قىزىل بولسا قاننىڭ كوپلىكى
ياكى نەپەس يوللىرىدىكى قان تومۇرلارنىڭ تېشىلگەن-
لىكىدىن بولىدۇ. ئەگەر ئاق بەلغەم قان بىلەن قوشۇ-
لۇپ كەلسە ئۆپكە ئىلىنىڭ ئالامىتى ھېساپلىنىدۇ.

XI ماقالا. كېسەل ئاقىۋىتى ياخشى - يامان بولۇش ئالامەتلىرى

1- پەسىل: كېسەل ئاقىۋىتى ياخشى بولۇشتىن
دېرەك بېرىدىغان ئالامەتلەر

(1) تومۇر كۈچىنىڭ تەبىئەت كۈچى بىلەن تەڭ
بولۇشى؛

(2) نەپەس ئېلىشى، ئۇخلىشىنىڭ ئېتىدالدا بولۇشى، كېسەل كىشىنىڭ ئورنىدىن تۇرۇش ھەركەتلىرى ئوڭاي بولۇپ، ئولتۇرغاندا ئارقىسىغا ئورۇلۇپ كەتمەسلىكى، ياتقاندا پۇتىنى يىغىپ يېتىشى (ئەگەر كېسەل بەك ئاجىزلاپ كەتكەن بولسا، ساقىيىشى ئارقىغا تارتىلغاندىمۇ ھامان ساقىيىپ كېتىدۇ).

(3) مىڭە ھالىتى جايىدا بولۇپ، يېقىن كىشىلەردىن، دوستلىرىنى توغرا تونۇشى، ئومۇمىي ئەھۋالدا بىر رەھبەرلىك، قاتتىق باش ئاغرىقى بولماسلىقى، قىزىتمىلىق كېسەللەرنىڭ چۈشكۈرىشى؛

(4) قىزىتمىسى بىر خىل بولۇپ جىگەر، يۈرەك، ۋە مەئىدىدىن باشقا جايلار قىزىقلىقىنىڭ بولماسلىقى،

ئۇفۇنەتنىڭ بولماسلىقى ھەمدە قىزىتمىلىق كېسەللەردە
بوھران كۈنلىرىدە كالىپۇكقا قوقاق چىقىشى:

(5) قىياپىتى: يۈزى ئورۇق، كۆزلىرى ئواتۇرۇشۇپ
قاياقلىرىنى تەسلىك بىلەن ئېچىشى (مۇنداق ئەھۋاللار
ئۇيقۇسىزلىق ۋە ئورۇنسز خىياللارنى كۆپ قىلىش كۆپ
ئىچى سۇرۇش ياكى كۆپ خۇن كېتىش نەتىجىسى
بولۇپ، خەتەرلىك بولمىسىمۇ، ئەمما ياخشى ئەمەس)؛

(6) بوھران (كرىزىس) كۈنلىرى بورۇن قاناش،
سۇ ئېقىش، ئىچ سۇرۇش، قۇسۇش ئەھۋاللىرىنىڭ بولۇشى
(بۇ، مىڭە ئاغرىقلىرىدا ياخشىلىقنىڭ بەلگىسى ھىساپلىنىدۇ)
ۋە ئۆپكە ياللۇغى (زاتىلىرىيە)دە بەلگەمنىڭ پىشىپ
چىقىشى؛

(7) بەلغەم ئەھۋالى: بەلغەم رەڭگىنىڭ بىر خىل
قويۇق-سۇيۇقلۇقتا ئوتتۇراھال بولۇپ ئاسان چىقىشى،
يىرىك سېسىق پۇراقلىرىنىڭ بولماسلىقى،

(8) كېسەلنىڭ ئىشتىھاسى ياخشى بولۇپ، يىگەن
تاماقلار ھەزىم بولۇپ تۇرۇشى؛

(9) سۈيدۈك ئاپلىسىن (تۇرۇنجى) رەڭگىدە بولۇپ،
چۆكمە ئوتتۇرىدا ياكى تېگىدە تۇرۇشى ھارارەتلىك
ئاغرىقلاردا ۋە مىڭە كېسەللىرىدە ياخشىلىقتىن دېرەك
بېرىدۇ. سۈيدۈك تېگىدە ئاق پاختىدەك چۆكمە تۇرسا
نەزجىنىڭ يەتكەنلىكىگە دالالەت قىلىدۇ.

2- پەسىل: كېسەل ئاقىۋەتى يامان بولۇشنىڭ ئالامەتلىرى

قېدىمقى ھۆكۈمالار توۋەندىكى بەلگىلەر ئادەم
ئۈچۈن تەھلىلىكىلىك ئالامەت بولۇپ قالىدۇ- دەپ
ئېيتىدۇ.

(1) كېسەلنىڭ قىياپىتى- كۆزى چوڭقۇر، بۇرنى
ئۇچلۇق- ئىنچىكە، قۇلىغى سوغاق، پىشانىسى تارتىشاڭغۇ،
رەڭگى كۆك ياكى سېرىق توپا- چاڭ باسقاندەك بولۇشى
ئۇلۇم ئالدىدىكى ئالامەتلەر ھىساپلىنىدۇ.

(2) باش ئاغرىغى- قىزىتمىلىق كېسەللەردە قاتتىق
باش ئاغرىش خەتەرلىك. ئەگەر بېشى ئېغىر ئەمەس
ۋە كېسەل ئۆزى ياش بولسا بىر ئاز ئۇمىت بار.

(3) ئەس- ھۇشى- ئاغرىقنىڭ ئەس- ھۇشى جايىدا
بولماسلىق مەسىلەن، ئەتراپقا قىزىقماسلىق، ئاغرىق
سەزمەسلىك قاتارلىق ئەھۋاللار قۇۋۋەيى ئەفسانى (ھاياتلىق
كۈچى) نىڭ ئاجىزلىغىنى كۆرسىتىدۇ. كېسەل يېۋىزىدىن
چىۋىن تۇتقاندەك، كۆرىنىشىدىن نان ئۇۋاقلىرىنى تەر-
گەندەك ھەركەتلەرنى قىلسا ياكى يېنىدىكى تامنى تاتلاپ
كولاپ تۇرسا بۇ كېسەلنىڭ ئۇلۇمى يېقىنلىشىپ قالغانلىق
بەلگىسىدىن ئىبارەت. قانداقتۇر بىر نەرسىدىن قورقۇش،
ئالاقزادە بولۇش ئەھۋاللىرى مىڭگە سەۋدا خىلىتى تەسىر
قىلغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇمۇ تېز ئۆلۈپ كېتىش-

نىڭ بەلگىسى. ھارارەتلىك كېسەللەر ئۆزىنى قان ئاساسىدا قالغاندەك ھىس قىلسا ماددىنىڭ خام ۋە كۆپلەپلىكىنى بىلدۈرىدۇ. كېسەل كۆزنى يۇمۇپ ئاچالمىسا ئۇنى قاپاقنىڭ تارتىشىپ قېلىشى (تەشەننۇجى) دىيىلىدۇ. كۆز نۇرسىزلانغان بولسا كۆزنىڭ كۆرمەس بولۇپ قالغانلىقىنى، ئالغايلىشىپ قالسا ياكى كۆز ئالغىسى ھەرگىزمۇ بولسا تارتىشىش كۆز گۆشىدە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. بىرلا كۆزدىن ياش ئاقسا بۇ مىڭنىڭ تۇتۇش قۇۋۋىتى ئاجىزلاشقانلىقىدۇر. كۆز چاچراپ چىققاندا بولۇپ تۇرغان ھاللاردا بۇرۇندىن قان ئاقسا بۇ نەزلە ① كۆپلىگەن بەلگىسى ھىساپلىنىدۇ. ياكى مىڭدە ماددىنىڭ كۆپلىكى ۋە مىڭدە ۋەرم بارلىقىنىڭ ئالامىتى بولىدۇ. كۆزى چاپاقلىشىپ قۇرۇپ ئومچۇك توردەك نەرسىلەر كۆرۈنسە ئۇلۇمنىڭ بەلگىسىدۇر. كۆزگە قارا نەرسىلەر كۆرۈنسە قۇسۇشنىڭ ئالامىتى، قىزىل نەرسە كۆرۈنسە بۇرۇن قاناشنىڭ بەلگىسى ھىساپلىنىدۇ.

(4) بۇرنى پۇتۇپ قالغان ۋە نەپەس ئېلىشى تېزلىشىپ كېسەللەر خەتەر ئىچىدە ھىساپلىنىدۇ. بۇرۇندىن ئىپار، قىزىل گۈل ياكى كالا يېغى پۇرىشى كەلسە يامان ئاقىۋەتنىڭ بەلگىسى بولىدۇ. چۈشكۈرتكۈچى دورىلارنى پۇراتقاندىمۇ چۈشكۈرمەسلىك ئۇلۇم ئالدىدىكى بەلگىدۇر.

(5) ئاڭلاشنىڭ ئاجىزلىقى ياكى پۇتۇنلەي يوقى.

① نەزلە: مىڭدىكى ئۇفۇنەتلىك سۇيۇقلۇق — تەھرىر.

لشى يامان بەلگىلەردىن بولۇپ، قېرىلاردا ياشلاشقا نىسبەتەن ئاقىۋىتى ناچارراق.

(6) چىشلارنىڭ ئىختىيارسىز بىر - بىرىگە ئۇرۇشى

ياكى غىچىرىلىشى ناچار بەلگىلەردىن بولۇپ ئىگەك گۆشى تاتىشۋالغانلىقىدۇر. ھارارەتلىك كېسەللەردە - چىشنىڭ كۆكرىپ قېلىشى يامان بەلگىلەردىن ھىساپلىنىدۇ.

(7) ئىستىملىق كېسەللەردە ئېغىز قۇرۇشى، تىلىنىڭ قېلىن ۋە قارامتۇل گەزلىك بولۇشى يامان ئاقىۋەتنىڭ بەلگىسى. ئېغىز ئىچىنىڭ سېسىق پۇرىشى تازىلىققا رايە قىلىنغانلىق نەتىجىسى بولۇپ، كېسەل ئۇچۇن ھەر تەرەپ - تىن زىيانلىق.

(8) سۈرگە بەرگەندىن كېيىن كېسەللەردە ھىق تۇتسا بۇ مەنىدە ئاغزى ۋە قىزىل ئوڭگەچ توشۇگىنىڭ تارتىشىپ قالغانلىقى بولۇپ، يامان بەلگىدۇر ياكى كېسەلدە خەلئاق (بوغما) پەيدا بولسا ياكى يۇتۇش قىيىن - لاشا خەتەرلىك ھىساپلىنىدۇ.

(9) كۈندۈزى ئۇخلاپ كېچىسى ئۇخلىماسلىق، ئۇخلىغاندا ساق چاغدىكىدەك ياتماستىن، ئەكسىچە پۇت - قوللىرىنى سوزۇپ ئوڭدا ياكى دۈم يېتىپ ئۇخلاش، بېشىنى ياستۇقتىن چۈشۈرۈپ ئۇخلاشتەك ئەھۋاللار كېسەل - نىڭ ئېغىرلىقى ۋە مىڭە خىزمىتىنىڭ ئاجىزلاشقانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

(10) قوساق گۆشلىرى ئورۇقلاپ قېلىشى، قوساق - نىڭ ئىچىگە چۆكۈپ كېتىشى يامان ئالامەت.

(11) قول - پۇتلارنىڭ مۇزلاپ كېتىشى ھارارىتى غەرىزىنىڭ ئاجىزلىقى ياكى جىگەر، مەئدەلەردە ۋە رەم بارلىغىدىن بولۇپ ئولۇم ئالدىدىكى ھالەتتۇر. تىر - ئاقلارنىڭ كۆكرىپ كېتىشىمۇ خەتەرلىك ئالامەت. ئەگەر يېشىل بولسا، بەدەندە ئوقۇنەتلەرنىڭ كۆپلىگىنى ئىپادىلەيدۇ. قول - پۇتلارنىڭ تارتىشىپ قېلىشى، گەدە - نىڭ قېتىپ قېلىشى ئولۇم يېقىنلاشقانلىقتىن دېرەك بېرىدۇ.

(12) جويلۇش، ۋاقىراپ سوزلەش مىڭنىڭ ئېغىر ناچار ھالەتتە ئىكەنلىگىنى، ئالدىراپ سوزلەش ھارا - رەتنىڭ يۇقۇرىلىغىنى بىلدۈرىدۇ. كېسەللەرنىڭ بىردىنلا سوزلىمەس بولۇپ قېلىشى يامان ئاقىۋەتنىڭ ئالامىتىدۇر. (13) چوڭ يارىلار ئاغرىشنىڭ بىردىنلا توختاپ قېلىشى ناچار ئالامەت ھىساپلىنىدۇ.

(14) كېسەل كىشى بۇرنىنى تولا كولاش ۋە يې - شنى تولا مىندىرلىتىشلار مىڭنىڭ ئېغىر زەرەرلەنگەنلىكى بولۇپ تۇيۇقسىز ئولۇم بېرىشى مۇمكىن.

VII ماقالالا. كېسەللىكنى تونۇش ۋە توغرا تەشخىس قىلىش^①

1- بەسىل: كېسەلنى تونۇش

ئاغرىقنى تەكشۈرگەندە كېسەل قانداق باشلىنىپ قانداق تەرەققى قىلغانلىغىنى، سەۋەبى ماددىسى قايسى خىل ئىكەنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ پىشقان-پىشىغانلىغىنى توغرا تونۇش لازىم. ئاغرىقنىڭ قانداق كېسەل بىلەن ئاغرىغانلىغىنى بەلگىلەشتە كېسەلنىڭ بەدىنىنى تەكشۈرۈش، تومۇرنى تۇتۇش، ئوزى ۋە ئەتراپىدىكى كىشىلەردىن ئەھۋالنى سوراپ بىلىش؛ شۇنىڭدەك جىنسى، يېشى، مىل-لىتى، كەسپى، تۇراقلىق جايىنىڭ شارائىتى ۋە ھاۋا كىلىماتى، ئوزۇقلىنىش ئەھۋالى، مىزاجى قاتارلىقلارنى ئىنچىكىلەپ تەكشۈرۈپ بىلىش ئاغرىققا باھا بېرىش (تەشخىس قىلىش) ئۈچۈن زور ئەھمىيەتكە ئىگە. كېسەل-نىڭ ئومۇمى ئەھۋالى (نەۋىئى ئام) نى بىر قەدەر تونۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئايرىم (خاس) قىسىملىرىنى ئىزلەش لازىم. مەسىلەن، مىڭ كېسەللى دىگەن سۆز بىر

① تەشخىس — دىياگنوز

خىل ئومۇمى ئاتالغۇ بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىگە 46 خىل كېسەللىك كىرىدۇ. ئۇنىڭ بىرى بولغان باش ئاغرىقى 26 تۈرگە بولىنىدۇ. قىزىتما (ھارارەت) بىر خىل ئومۇمى چۈشەنچە بولۇپ، ھارارەتلىك كېسەللەرنىڭ بىر قىسمى بولغان تەپلەرنىڭ ئوزىلا تەپى يەۋمى (كۈنلۈك بەزگەك) ۋە تەپى موھرىقە (كېزىك) قاتارلىق بىر قانچە تۈرلەرگە بولىنىدۇ. كېسەلنى تونغاندىن كېيىن ئىلاجىغا (داۋالاش - قا) كىرىشىش كېرەك.

قىزىتمىلىق ئاغرىقلارغا چارە كۆرگەندە، ئالدى بىلەن قىزىتمىنى پەسەيتىشكە تىرىشىلىدۇ.

ئەگەر خىلىت ماددىلىرىدىن بولغان قىزىتما بولسا، سۇرۇپ چىقىرىش (ئىستىفراغ^①) دىن كېيىن قىزىتمىنى چۈشۈرۈشكە كىرىشىش كېرەك. يۇقۇملۇق ئاغرىقلاردا ئاغرىقنىڭ بەدىنى، ئورۇن - كۆرپىسى ۋە ئەتراپ مۇھىتىنى پاكىز تۇتۇشقا دىققەت قىلىش لازىم.

2-پەسىل: ماددىنىڭ پىشىشى ۋە ئۇنىڭ ئەھمىيىتى

كېسەلگە سەۋەپچى بولغان ماددىنىڭ پىشىشى ئەزجى دەپ ئاتىلىدۇ. ھەقىقى (تولۇق) پىشقان ماددىنى ① ئىستىفراغ - تىبابەتتە بەدەندە پىشىپ يېتىلگەن ماددىلار - نىڭ بەدەندىن سۇزۇپ چىقىرىلىشىنى ئىستىفراغ دەپ ئاتىلىدۇ. ئىچىنى سۈرگۈزۈش، سۇيدۈك راۋان قىلىش، بەلغەم بوشتىش، قۇستۇرۇش، تەرلىتىش قاتارلىق چارىلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

“نەزجى ھەقتى” ۋە پىشمىغان، يامان ماددا نەزجىيە بەد دىيىلىدۇ. بۇلار بەدەندىكى ماددىنىڭ (خىلىتلارنىڭ) پىشقان، پىشمىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. مەسىلەن، ماددا پىشقاندا، بەدەندىكى ئۆزگەرتكۈچى قۇۋۋەت (قۇۋۋەت مۇ - غەيىرە) كېسەللىك ماددىسىدىن ئۇستۇن كېلىپ كېسەللىكنى يېڭىدۇ. ماددا پىشمىغاندا ئۆزگەرتكۈچى قۇۋۋەت تولۇق كۈچەپ كېتەلمەي (ئاجىز كېلىپ) ماددا تېخىمۇ بۇزۇلۇپ ئۇفۇنەتكە ئايلىنىپ ساقىيىش ۋاقتى ئارقىغا تارتىلىدۇ. مەسىلەن، ئۆپكە ياللۇغى (زاتلىرىيە) كېسەلدە بەلغەم ئاسانلىق بىلەن چىقسا ۋە ئاق ياكى ئازراق سېرىق رەڭدە، ئوتتۇراھال قويۇقلۇقتا بولۇپ، يىرىك ياكى سېسىق پۇرىغى بولمىسا، بۇ ماددىنىڭ تولۇق پىشقانلىقى (نەزجىيە ھەقتى) ھىساپلىنىپ، كېسەل ئەھۋالى ۋە ئاقۇتتىنىڭ ياخشىلىنىشى بىلدۈرىدۇ. ئەكسىچە، بەلغەم قويۇق، قارا ياكى كۆك، سېسىق پۇراقلىق بولسا يامان ماددا (نەزجىيە بەد) بولۇپ كېسەلنىڭ ئەھۋالى يامان - لىغىدىن دېرەك بېرىدۇ. ئەگەر بۇ كېسەلدە بەلغەم چىق - مىسا ماددا تېخى پىشمىغان (خام) ھالدا ئىكەنلىكىدىن ئىبارەتتۇر.

ماددىنىڭ پىشقانلىقى ئاغرىقنىڭ خەتەرلىك باس - قۇچتىن ئوتۇپ كەتكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. شۇنداقىمۇ ئاغرىقنى دىققەت بىلەن پەرۋىش قىلىش لازىم. لېكىن كېسەلنىڭ ساقىيىشى ئۈچۈن ماددىنىڭ پىشقان بولۇشى

شەرتىمۇ ئەمەس. چۈنكى بەزى كېسەللەردە نەزجى بولمايمۇ
ئۇزۇن ۋاقىت يېتىپ ساقىيىدۇ.

ۋەرم (ياللۇغلىنىش) لىق ئاغرىقلار بىردىنلا قىزىپ
ياللۇغلىنىش بار ئەزا قاتتىق ئاغرىپ كەتسە شۇ ۋەرم
ماددىسىنىڭ پىشقانلىغىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇندىن كېيىنكى
ھارارىتى يەڭگىلەرەك بولىدۇ. ئېغىر ئۆتكەن كېسەللەردە
ماددىنىڭ تولۇپ پىشىشى ياخشى ئاقىۋەتنىڭ بەلگىسى.

1- ماددىنىڭ پىشقانلىغى (نەزجى) نى

ئىزلەش ئۇسۇلى

كېسەل ماددىسىنىڭ پىشىش مەنبىئى ئەسلى كېسەل
ئەزادا بولىدۇ. مەسىلەن، ئۆپكە، كۆكرەك كېسەللىكلىرىدە
نەزجىنى بەلغەمدىن ئىزلەش كېرەك. ئۇچەي كېسەللىك-
لىرىدە چوڭ تەرەتتىن، جىگەر كېسەللىكىدە سۇيىدۇكتىن،
مىڭە كېسەللىكلىرىدە بۇرۇندىن ئاققان سۇدىن؛ ھارارەت
ۋە ۋەرمەلىك ئاغرىقتىمۇ سۇيىدۇك ھەم ۋەرمەنىڭ ئۆزى-
دىن ئىزلەش لازىم.

2- مىڭىنىڭ سالامەتلىكى بىلەن مۇنا-

سەۋەتلىك بەزى بەلگىلەر

(1) سوزلەشتە كېسەل ئېنىق سوز قىلالىسا مىڭە
زەرەرلەنگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

(2) كۆزنىڭ روشەن ياكى تۇتۇقلىغى مىڭىنىڭ
ياخشى-يامانلىغىغا باغلىق.

- (3) ئېقىلىنىڭ كەملىكى ۋە ئۈنۈتقاچلىق مىڭى
قۇرۇقلۇق يەتكەنلىكتىن كېلىپ چىقىدۇ،
(4) كوز گەپاشا - كۆمۈتىدەك نەرسىلەرنىڭ كۆرىنىش-
شى، قۇلاققا ھەر خىل غەيرى ئاۋازلار ئاڭلىنىشى مىڭىدە
سۇيۇقلۇقنىڭ كۆپلىگىنى ئىپادىلەيدۇ،
(5) ئاڭلاشنىڭ ناچارلىغى، قۇلاق شاقىراش ياكى
شامالىدەك كۆكرەش ئاۋازلىرىنىڭ بولۇشى مىڭى ۋە
قۇلاق ئەسەپلىرىنىڭ كېسەللىنىشىگە باغلىق،
(6) بۇرۇننىڭ پۇراق سېزەلمەسلىكى ئەسەپلەرنىڭ
دەخلىگە ئۇچرىغانلىغىدىندۇر،
(7) خام خىياللارنى تولا قىلىش روھى كېسەللىك-
نىڭ ئالامىتى بولۇپ، مىڭىدە كېسەللىك ئوزگىرىشلىرى
يۈز بەرگەنلىك بەلگىسىدۇر.

3- مىڭىگە يېقىن ئەزالار ياكى مىڭىگە ئالاقىدار ئەزالاردىكى بەلگىلەر

- (1) كوز ئىچى قۇرغاق بولسا مىڭىنىڭ قۇرۇقلۇغى،
كۆپ ياش ئېقىپ تۇرسا مىڭى ئالدىنقى بوشلۇغىدا
سۇيۇقلۇق كۆپلىگىنى كۆرسىتىدۇ. ئەگەر كوز تومۇرلىرى
قىزىل ياكى سېرىق بولۇپ، ياش ئېقىپ تۇرسا قىزىت-
مىلىق كېسەللەردە مىڭىدە ۋەزەم بارلىغى، ياش بىر
كۆزدىنلا ئاقسا مىڭى ھارارىتىنىڭ يۇقۇرىلىغىنى بىلدۈر-
ىدۇ. كېسەل كۆزنى پات-پات يۇمىۋېلىش مىڭىنىڭ
ئىسسىقلىغى ياكى ساراڭلىقىنىڭ بەلگىسى. كوز چاچراپ

چىققۇدەك بولۇپ تۇرسا مىڭە ئىششىغانلىغىنى، چوڭقۇر بولسا ئاغرىقىنىڭ بەدەنگە تارقالغانلىغىنى بىلدۈرىدۇ. ئەگەر كېسەل كوزنى يۇمۇپ ئاچالمىسا يامان ئاقىۋەتنىڭ بەلگىسىدۇر.

(2) بويۇندا ھەرخىل ۋەرەملەرنىڭ كۆپ بولۇشى ۋە چىش گۆشلىرىنىڭ بۇزۇلۇشى مەندىنىڭ ئاجىزلىغىنى، ئوزۇقلۇقلارنىڭ ئاچارلىغىنى بىلدۈرىدۇ.

(3) مىڭە زەرەرلەنگەندە پۈتۈن بەدەندىكى ئەزالار - غا ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە تەسىر قىلىدۇ. مەسىلەن، چوڭ - كىچىك تەرەتلەرنىڭ توختاپ قېلىشى مىڭە، يۇلۇن ياللۇغىدا ئۇچرايدۇ. قىزىل ئوڭگەچ ۋە يۇتقۇچ بوش - شىپ كېتىپ تاماق ھەتتا چايمۇ ئۆتمەيدۇ.

(4) مەندە ۋە جىگەردە ئاغرىش بولغاندا باشنىڭ يېرىمى ئاغرىپ، كېيىنچە تاغاق قىسمىغا بارىدۇ. بولۇپمۇ تاماق ھەزىم بولىدىغان ۋاقىتلاردا باشنىڭ قاتتىق ئاغ - رىشى مەندىنىڭ ئاچارلىغىدىن بولىدۇ.

(5) باشنىڭ ئوڭ تەرىپى ئاغرىسا جىگەرنىڭ سول تەرىپى ئاغرىسا تالنىڭ مۇناسىۋىتى بار. ئاياللاردا بىر تەرەپ باشنىڭ يېرىمى ئاغرىشى ۋە پۇت - قوللارنىڭ ئاغرىشى بالىياتقۇ زەرەرلەنگەنلىكىدۇر. باشنىڭ چوقا ۋە گەڭگە قىسمى ئاغرىسا يۈرەكنىڭ سەۋىيىدىن بولىدۇ.

XIII ماقالا. كېسەلنى داۋالاش ئۇسۇللىرى

كېسەلنى داۋالاش ئۇسۇللىرى ئاساسەن ئاغرىق كىشى ئاسان قوبۇل قىلالايدىغان ۋە قوللىنىشقا ئەپلىك بولۇشى كېرەك. مەسىلەن.

- (1) مۇۋاپىق دورىلارنى ئىچكىۈزۈش.
- (2) نەپەس يوللىرى ئارقىلىق تەسىرلىك دورىلارنى پۇرۇتۇش.
- (3) ھوقنە (ھەمەل) قىلىش. شامچە شەكلىدە ياسالغان (شىيان) دورىلارنى ئارقا يول ۋە جىنىسى يوللارغا كىرگۈزۈپ تەسىر كۆرسىتىش.
- (4) مۇناسىپ دورىلارنى ماي ياكى باشقىلار بىلەن بەدەنگە سۈرتۈپ تەسىر قىلدۇرۇش.
- (5) ماددىنى پىشۇرۇش (مۇنزىج) چارىلىرىنى كۆرۈش.
- (6) پىشقان ماددىنى بەدەندىن سۇرۇپ چىقىرىش (ئىستىفراغ قىلىش).

ماددىلارنى بەدەندىن سۇرۇپ چىقىرىشنى ئومۇمىي سۇرۇپ چىقىرىش (ئىستىفراغى كۈللى) ۋە قىسمەن سۇرۇپ چىقىرىش (ئىستىفراغى جۈزئى) دەپ ئىككى خىلغا بۆلىنىدۇ.

ئومۇمى سۇرۇپ چىقىرىش ئىسسىق قان ئېلىشقا قارىتىلغان. قىسمەن سۇرۇپ چىقىرىش دەپ تۈرلۈك دورىلار بىلەن قۇستۇرۇش، سۈرگە دورىلار ياكى ھەمەل ئارقىلىق ئىچىنى بوشىتىش، سۇيدۇك ماڭدۇرۇش، بەل-خەمنى بوشىتىش، تەرلىتىش، بۇرۇن، تىل ئاستىدىن سۇ ئاققۇزۇش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

1 - پەسىل: سۇرۇپ چىقىرىش

(1) قان ئېلىش (1) قان ئېلىشتىكى مەقسەت: قان ئېلىش فەسەد دەپ ئاتىلىدۇ. قەدىمقى زامان ھو-كۇمالىرى قان ئىنسان ھاياتى ئۈچۈن بىردىن-بىر ئامىل دەپ تونۇپ قان ئېلىشنى توغرا كۆرمىگەن. كېيىنكى زامانلاردا قان ئېلىشنىڭ كېسەللەرنى داۋالاشتا مەلۇم رولى بارلىقىنى بىلىپ تىبابەت ئەھلى قان ئېلىشنى داۋالاش ئۇسۇللىرى قاتارىغا كىرگۈزۈپ ئومۇمى سۇرۇپ چىقىرىش (ئىستېفراغى كۈللى) دەپ بېكىتىپ قوللانماقتا. بولۇپمۇ ئىچكى ئەزالارنىڭ ۋەزەملىك كېسەللىرىدە قان بۇزۇلغاندا، قان كۆپ بولغاندا قان ئېلىش يۈرەكنىڭ ئېرىكەن ھەرىكەت قىلىشىغا ۋە بۇزۇق ماددىلارنىڭ بەدەندىن چىقىپ كېتىشىگە زور پايدىلىقتۇر.

(2) قان ئېلىشنىڭ ئەھمىيىتى: (1) قاننىڭ تەركىبىدە يەنە باشقا 3 خىل خىلىت بولغانلىقى ئۈچۈن قان چىقىرىش بىلەن باشقا خىلىتلارمۇ سۇرۇپ چىقىرىلغان

بولىدۇ. لېكىن قان ھەممىسىدىن كۆپرەك چىقىپ كېتىدۇ.
(2) قان ئېلىش ئىختىيارى ئىستىفراغ بولىدۇ، يەنى ئېزىق قانچىلىك سۇرۇپ چىقىرىشنى خالىسىڭىز شۇنچىلىك قان چىقىرىشقا بولىدۇ، لېكىن باشقا ئىستىفراغلاردا مەسىلەن، سۈرگە بەرگەن چاغلاردا ئىچى كۆپ سۇرۇپ كەتسە توختىتىش قىيىن، ئەگەر كۈچ بىلەن توختىتىلسا بەدەنگە زەھەرلىك. (3) قان ئالغاندا ماددىنى پىشۇرۇش شەرت ئەمەس، باشقا سۇرۇپ چىقىرىشلاردا ئالدى بىلەن ماددا پىشۇرىلىدۇ، ئاندىن كېيىن سۇرۇپ چىقىرىلىدۇ.

(3) قان ئېلىشتا مەنى قىلىدىغان ئەھۋاللار: تۈۋەن-دىكى ئەھۋاللاردا قان ئېلىشقا بولمايدۇ.

(1) قىزىتمىلىق ئاغرىقلاردا يەنە قايتىدىن ھارارەت كۆتىرىلسە قان ئالماسلىق كېرەك.

(2) ئېغىر ھالەتتىكى ئاغرىقلاردىن قان ئېلىشقا بولمايدۇ. ئەھۋالى ياخشىلانغاندا ئېلىش لازىم.

(3) ئىچ سۈرگەندىن، ئەمگەكتىن، جىنىسى ئالاقىدىن كېيىنلا قان ئالماسلىق كېرەك.

(4) مۈگىدەپ تۇرغان كېسەللەردىن قان ئالماسلىق لازىم.

(5) 12 ياشتىن تۆۋەن بالىلار ۋە ھامىلدار ئاياللاردىن قان ئالماسلىق لازىم.

(6) ئاياللاردىن ھېيىز كۈنلىرى قان ئالماسلىق كېرەك.

(4) قان ئېلىشتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار:

(1) قان ئېلىش گەرچە ياخشى سۇرۇپ چىقىرىش ئۇسۇلى بولسىمۇ كۆپ ئېھتىيات قىلىش لازىم. بىلىمىدىن ياكى بىلىپ تۇرۇپ شىريان تومۇر (قىزىلتومۇر) دىن قەتئى قان ئالماستىق كېرەك. ئەگەر تەسادىپى شىر- ياندىن قان ئېقىۋاتقانلىقى بىلىنسە دەرھال توختىتىش زورۇر. شىريان تومۇردىن قان ئاققانلىق بەلگىسى شۇكى قان سۈزۈك بولۇپ ئېتىلىپ چىقىدۇ. كېسەلنىڭ يۈرەك ھەرىكىتى بارغانسېرى ئاجىزلايدۇ، ئېغىر ھاللاردا ھۇشدىن كېتىدۇ. بۇ چاغدا تومۇر ئېغىزىنى دەرھال تېگىپ كېسەلنىڭ ياستۇغىنى ئىگىز قويۇپ ياتقۇزۇش بىلەن بىر قانچە كۈنگىچە ھەركەتلىنىدىغانلىقى لازىم.

(2) قان ئالغۇچى ئۆزى بىلەن دائىم ئىپار ۋە مەجۈ- نى داۋائۇلىمىشكى (ئىپار مەجۈنى) ئېلىپ يۈرۈشى لازىم. كېسەل ھۇشدىن كەتسە ياكى باشقا غەيرى ئەھۋاللار كۆرۈلسە ئىپارنى پۇرۇتۇش، داۋائۇلىمىشكىنى يىگۈزۈش كېرەك.

(3) قان ئېلىشتىن بۇرۇن كېسەلگە لىمون شىر- ۋىتى، ئانار سۈيى گۈلاپ ۋە ئالما شىرۋىتى قاتارلىق- لارنى مۇۋاپىق ھالدا ئارىلاشتۇرۇپ بېرىلسە قان ئېلىش- تىكى مۇرەككەپ ئەھۋاللار (ئايلىنىپ كېتىش، كۆڭلى ئايىنىش، باش قېيىش) دىن ساقلانغىلى بولىدۇ.

(4) كېسەل قان ئېلىش جەريانىدا يېقىمىسىزلىق

ھىس قىلىش ھۇشىدىن كېتىش بەلگىلىرى كۆرۈلەن دەرىجىدە
ھال كالاغا توخۇپىيى سېلىپ قەي قىلدۇرۇش بىلەن
تۈزۈلۈپ كېتىدۇ.

(5) قان ئالغاندىن كېيىن كېسەلگە ئاسان ھەزىم
بولدىغان يېنىك تاماقلارنى بېرىش لازىم.

(6) نەشتە ① نىڭ پاكىز بولىشىغا ئالاھىدە دىق.

قەت قىلىش لازىم. ئەگەر تومۇر زەخمىلەنگەن بولسا،
توۋەندىكى دورىنى چېپىپ ئۈستىدىن پاكىزە نەرسە بىلەن
چىڭ تېگىپ قويۇپ كۈندە بىر قېتىم يوتكەپ تېگىش
كېرەك. دورىنىڭ نۇسخىسى توۋەندىكىچە:

خونسىياۋشان، ئەنزۇرۇت، زەمچە، زاك، ئاقاقىيا،
ئانار گۈلى، سەبرە ۋە كۈندۈر ھەر بىرى 1 مىسقالدىن
سەمغى ئەرەبى 2 مىسقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى سوقۇپ ئەلگىكتىن
ئۆتكۈزۈپ تۇخۇمنىڭ ئېقى بىلەن يۇمشاق خېمىردەك
تەييارلىنىدۇ. زەخمىلەنگەن ئورۇنغا مۇۋاپىق مىقداردا
قويۇپ ئۈستى تېگىپ قويۇلىدۇ.

(5) قان ئالىدىغان تومۇرلار:

(1) قىپال: مىڭە ۋە باش تەرەپ ئاغرىقلىرىدا
مەسىلەن، باش، كوز، بۇرۇن، قۇلاق، ماڭغلاي، چىش
ۋە لەۋ ئاغرىقلىرىدا قان ئېلىش توغرا كەلسە موشۇ
تومۇردىن ئېلىنىدۇ.

① نەشتە: قان چىقىرىش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان تىغ.

ئورنى: باشبارماق بىلەن بىر سىزىقتا بىسلەكنىڭ سىرتقى قىرىدا.

(2) ئوككەل يەلە بىر ئىسمى ھەپتى ئەندام: بۇ قىپال بىلەن باسلىق تومۇرنىڭ قوشۇلۇشىدىن ھاسىل بولغان تومۇر پۇتۇن بەدەن كېسەللىكلىرىدە ۋە مۇرەككەپ ئەزا كېسەللىكلىرىدە ئوككەلدىن قان ئېلىنىدۇ. بۇ ئومۇمى ئىستىفراغ ئۈچۈن ياخشى تومۇردۇر.

ئورنى: سابابە (كورسەتكۈچ بارماق) بىلەن بىر سىزىقتا بولۇپ، جەينەكنىڭ ئىچكى تەرەپكە ئىگىلىدىغان ئويمانلىقىدا.

(3) باسلىق:

ئىچكى ئەزالاردىن ئوپكە ۋە كوكرەك پەردە يىال-لۇغلىرى (زاتلىرىيە، زاتلىجەنىي، زاتلىسەدرى لەردە) جىگەر ياللۇغلىرى، تال ئاغرىقلىرىدا بۇ تومۇردىن قان ئېلىنىدۇ.

ئورنى: ئوتتۇرا بارماق (ۋۇستار) بىلەن بىر سىزىقتا بولۇپ، قولتۇق ئاستىدىن چىقىپ ئەگىپ جەينەك ئويمانلىقىدا تېرىگە يېقىن چىقىدۇ. باسلىق تومۇرىدىن قان ئالغاندا بەك ئېھتىيات قىلىش كېرەك. چۈنكى شىرپانغا يانداش كىلىدۇ.

(4) مابىز: تىز بوغۇم ئىچكى ئويمانلىقىدا بولۇپ، ئومۇرتقا، ئۈچەي، مەقئەد، بالياتقۇ ۋە بوۋاسىر كېسەللىكلىرىدە بۇنىڭدىن قان ئېلىنىدۇ.

(5) ئۆسەلەم: جىگەر ۋە تال كېسەللىكلىرىدە قوتۇر كېسىلىدە ئۆسەلەم تومۇرىدىن قان ئېلىنىدۇ.

ئورنى — نامسىز بارماق بىلەن چىمچىلاق ئوتتۇرىدا بولۇپ، ئاغرىقنىڭ قولىنى ئىسسىق سۇغا چىلاپ تۇرۇپ ئېلىنىدۇ. جىگەر كېسىلىدە ئوڭ تەرەپتىن، تال كېسىلىدە سول تەرەپ قولىدىن ئېلىنىدۇ.

سافىن: ئاياللارنىڭ ھېيىز كېسەللىكلىرىدە، ئەرلەر جىنىسى ئەزا ۋە تۇخۇم كېسەللىكلىرىدە سافىن تومۇرىدىن قان ئېلىنىدۇ.

ئورنى — ئىچكى ئوشۇق ئۈستىدە، تىزدىن يۇقۇرى قىسمىنى بوغۇپ قويغاندا بۇ تومۇرنى ئاسان كۆرگىلى بولىدۇ. بەل ئاغرىقلىرى ۋە مەئدە كېسەللىرىدەمۇ سافىن دىن قان ئېلىنىدۇ.

(7) ئىرقۇنئىسا: ئىرقۇنئىسا كېسىلى (ئولتۇرغۇچ نېرۋا ياللۇغى) دە بۇ تومۇردىن قان ئېلىنىدۇ.

ئورنى — بۇ خىل گىرەلەشكەن ئەگرى - بۇگرى تومۇر بولۇپ، پاقالچەكنى بوغۇپ قويۇپ، تومۇر كۆپۈپ كۆرۈنگەندە نەشتەر سېلىنىدۇ. بەزى كىشىلەردە بۇ ئۇسۇل بىلەنمۇ تاپقىلى بولمايدۇ. ئۇ چاغدا پۇتنىڭ نامسىز ۋە چىمچىلاق بارماق ئارىلىغىدىن قان ئالسا بولىدۇ. يۇقۇرقىلار قان ئېلىشقا بولىدىغان تومۇرلارنىڭ مۇھىملىرىدۇر. قان ئېلىشتا قاندىكى دۇغلىق سۈزۈلگەندە كە قەدەر قان چىقىرىلىدۇ. قان ئالمىسىمۇ بولىدىغان

كېسەللەردىن قان ئالماشلىق، دورا بىلەن بىر تەرەپ قىلىش لازىم. ئالدى بىلەن قان ئالدىغان ئورۇننى بوغۇپ تومۇر ئېنىق كورۇلگەندە ئەڭ ياخشى نەشتە ھىجامەت (لوڭقا) قويغاندىكىدەك سېلىش؛ ئەگەر كېسەل كىشىدە سۇسلىشىش سېزىلسە قاننى دەرھال توختىتىش لازىم.

2. ھىجامەت (شەخەك) قويۇش

تېرىنى تېپىز قىلىپ لوڭقا قويۇش ئۇسۇلى ھىجامەت (شەخەك) قويۇش دەپ ئاتىلىدۇ. قان ئېلىش مەنىسى قىلىنغان ھاللاردا ۋە يەرلىك ئورۇندىكى بۇزۇق قان، زەرداپلارنى چىقىرىش مەقسىتىدە ھىجامەت قويىلىدۇ. ئىشلەش — تەرتىبى خۇددى لوڭقا قويۇشقا ئوخشايدۇ، قان ئالغان — نىڭ ئورنىدا ياكى زەرداپ بۇزۇق قانلارنى چىقىرىش مەقسىتىدە ھىجامەت قويغاندا تېرىنى گۇلاپ ياكى پاكىزە سۇدا تازىلاپ تىغ بىلەن بىر قانچە يەرنىڭ تېرە پۈتۈنلىكى بۇزۇلۇپ (قان چىقارماسلىق كېرەك)، ئۈستىگە لوڭقا قويۇش ئۇسۇلى بويىچە لوڭقا ياكى ئاغزى تار تۈۋى كەڭ شىشە قۇتقا قويۇلىدۇ. لوڭقىنىڭ تۇرۇش ۋاقتى كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ 1 - 2 سائەت بولۇشى مۇمكىن.

ھىجامەت قويىدىغان ئورۇنلار:

(1) بويۇن ئومۇرتقىسى بىلەن باش سوڭىكى بىر-بىرىگەن جاي (گەزگە). بۇ جايغا ھىجامەت قويۇش ئۈگمەل تومۇرىدىن قان ئېلىش بىلەن تەڭ. ئۇنىڭ

تەسىرى بىلەن بەزىدە ئۇنۇتقا قلىق كېلىپ چىقىدۇ.
شۇنىڭ ئۈچۈن توۋەنرەك يەرگە قويۇش لازىم.

(2) ئارقا تەرەپ ئىككى غول (تاغاق سۈڭەك)
ئارىلىغىغا سەل يۇقۇرى تەرەپكە ھىجامەت قويۇش باسقۇچى
لىق تومۇردىن قان ئالغان بىلەن تەڭ.

(3) پاخالچەك (بېلىق كۆش قىسمى) غا ھىجامەت
قويۇش ساقىن تومۇردىن قان ئېلىش بىلەن باراۋەر
بولۇپ، مەزكۇر جاي ھىجامەت ئۈچۈن خەۋپسىز جاي.
دۇر.

دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار

(1) 60 ياشتىن يۇقۇرى قېرىلار ۋە 2 ياشتىن
توۋەن بالىلارغا ھىجامەت قويۇشقا بولمايدۇ.

(2) يۈرەك ۋە مەئىدىسى ئاجىزلارنىڭ غولىغا
ھىجامەت قويۇش زىيانلىق. مىڭسى ئاجىز (ئۇنۇتقا)
كىشىلەرنىڭ گەۋگىسىگە ھىجامەت قويۇش خەتەرلىك.

(3) مونچىدىن چىقىپلا ھىجامەت قويدۇرۇشقا
بولمايدۇ.

(4) قان ئېلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ھىجامەت
قويۇشقا بولمايدۇ.

زۇلۇك قۇرۇتى تىبابەتتە قان شورىتىش مەقسەت-
دەدە كەڭ قوللىنىلىدۇ. زۇلۇك (ئەلەق) بۇزۇق قاننىلا
شوراپ ساپ قاننى شورىمايدۇ. دىگەن كۆز قاراشلار بار.
زۇلۇك قويۇش ئۈچۈن ھىچبىر مەنى قىلىدىغان ھال ۋە

ئالاھىدە كورسېتىلگەن ئورۇنلار يوق خەتەرسىز ئۆسۈلدۈر.
لېكىن ئۇنىڭ تۇرۇش ۋاقتىغا ھەمدە ئىچكى ئەزاغا كە-
رىپ كەتمەسلىكىگە دىققەت قىلىش لازىم.

3- قۇستۇرۇش (قەي قىلدۇرۇش)

قەدىمقى زامان تىبابەت ئالىملىرى دورىلار بىلەن
قۇستۇرۇشنى ئومۇمى ھەيدەپ چىقىرىش دەپ ئاتاشقان
ئىدى. قۇستۇرۇش پەقەت مەئدە ئىچىدىكى ماددىلارنى سىرت-
قا چىقىرىشلا ئەمەس، بەلكى ئومۇمى بەدەندىكى ماددىلارنى
چالغۇتۇشتىن ئىبارەتتۇر. ئەمما غەيرى تەبىئى قۇسۇشلار
مەسىلەن، ۋابا، ھەزىم بۇزۇلۇش، مەئدەنىڭ تۈۋەن
چۇشىشى، تولغاق قاتارلىق كېسەللەردىكى قۇسۇش ئەك-
سىچە، بەدەننى ئاجىزلاشتۇرىدۇ، بۇنى توختىتىش شەرت.
دورىلار بىلەن قەي قىلدۇرۇش ئاساسەن تۈۋەندىكىچە
مەنپەئەتلەرگە ئىگە:

- (1) باشنىڭ ئېغىرلىقى يېنىكلەيدۇ. (2) كۆز
روشەنلىشىدۇ. (3) كىكرىگىنى بىر تەرەپ قىلىدۇ. (4)
ئوتنىڭ تېشىپ كېتىشىنى توسىدۇ. (5) ئىشتەينى قوز-
غايدۇ. (6) بەدەن سۇسلىغىنى يوقىتىدۇ. (7) مالىخۇ-
لىيا ۋە مەئدە سەۋىيىدىن بولىدىغان مىڭە كېسەللىكلەر-
ىگە (سەرىنى قاتارلىقلارغا) مەنپەئەت قىلىدۇ. (8) ھەر
خىل بوغۇم ئاغرىقلىرىنى قەي بىلەن داۋالاشقا بولىدۇ.
(9) دوساق جاراھەتلىرىنى داۋالاشتا ئۈنۈم بېرىدۇ.
(10) بەدەن رەڭگىنىڭ ئۆزگىرىپ قېلىشىنى توسىدۇ.

(11) سېزىق كېسەل ۋە قوتۇر (جەرەپ) كېسەلىنى ۋە ئىستىسقانى داۋالاشقا ۋە ئالدىنى ئېلىشقا مەنپەئەتلى خېلى ياخشى.

قەي قىلدۇرۇشتىن بۇرۇن كېسەلنىڭ خىلمەت ماد- دىلىرىدىن بولغان (يەنى ماددى) ياكى باشقا سەۋەپلەر- دىن بولغان (يەنى سازەج) كېسەللىك ئىكەنلىكىنى ئېنىق- لاش شەرت. سازەج كېسەللىرىنى دورىلار بىلەن قەي قىلدۇرۇپ داۋالىغىلى بولمايدۇ. ماددا بولسا قايسى ماد- دىدىن ئىكەنلىكىنى بىلىش لازىم ۋە ئالدى بىلەن ماددىنى پۇشۇرۇش (مۇنزىج قىلىش) ئاندىن كېيىن كورسىتىلگەن دورىلار (ھەر خىل ماددىغا ئايرىم دورا كورسىتىلىدۇ) بېرىلىدۇ. ئەگەر ئىككى خىل ماددىنىڭ بىرىنىكىدىن كېلىپ چىققان بولسا، قايسى ماددا كۈچ- لمۇك بولسا شۇنىڭغا خاس قەي دورىسى بېرىلىدۇ. ئادەتتە قان ۋە سەۋدادىن بولغان كېسەللەرگە قەي بى- لەن داۋالاش چارىسى قوللىنىلمايدۇ، ئەزالارنىڭ ئىس- تىغراغى قان ئېلىش ياكى سۈرگە بېرىش بىلەن بول- غىنى ياخشى.

دورىلار بىلەن قەي قىلدۇرۇشتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار

(1) قۇرۇق مىزاجلىق كىشىلەر قەي قىلدۇرۇشتىن بىر كۈن بۇرۇن سۇيۇق تاماقلار بىلەن كوپرەك ئوزۇق- لاندۇرۇلىدۇ. كوپرەك سۇ ئىچكۈزىلىدۇ. مونچىغا چۈشۈپ

كەلسە تېخىمۇ ياخشى. ھول مىزاجلىق كىشىلەرگە ئۇنداق قىلىش ھاجەت ئەمەس.

(2) ھاۋا سوغاق بولسا ئىسقى جايىدا قەي قىلدۇرۇش لازىم.

(3) قۇستۇرىدىغان دورىنى ئىچكۈزۈپ بولغاندىن كېيىنلا كېسەل كىشىنىڭ قاۋىغى ئۈستىگە ئاق پاختا ياكى داكىدەك بىر نەرسە قويۇپ تېگىپ قويىلىدۇ. ئەگەر ياردەمچى كىشى كىسەلنىڭ قوساق ۋە بەل قىسمىنى يۇمشاق مۇچۇپ بەرسە تېخىمۇ ياخشى.

(4) قەي قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئېغىز ئىچىنى ئىسقى سۇ ئارىلاشقان سىركە بىلەن چايقاش لازىم.

(5) قەيدىن كېيىن مىسقال ئۇد ھىندى ياكى مەستكىنى يۇمشاق سوقۇپ شېكەر قوشۇپ ياكى ئالما سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ. ئەگەر بۇ دورىلار بولمىسا گۈلچەن بەرسىمۇ بولىدۇ.

قەي قىلدۇرۇشقا بولمايدىغان ھاللار

(1) بەدىنى بەك ئاجىز كىشىلەرگە دورا بىلەن قۇستۇرۇش چارىسى قوللىنىشقا بولمايدۇ. (2) ئەپەس قىيىنلىشىۋاتقان، قان تۇكۇرگەن، قان قۇسقان، بويۇن قىسمىدا ئىششىق، مىڭە كېسىلى، مەئدەسىدە يارىلىق كېسىلى، سەپرا ياكى قاندىن بولغان قۇلاق ۋە كوز ئاغرىغى، كۆكرەك ئەزالىرىدا كۆكرەك پەردىسى ۋە گىر - گىت گۆش پەردىسىدە ياللۇغلىنىش بارلارغا قەي دورىسى بېرىشكە بولمايدۇ.

قەيدىن كېيىن يۈز بېرىدىغان ئەھۋاللارغا چارە كۆرۈش

(1) قەي قىلىپ بولغاندىن كېيىن بەزىدە ھەق تۆتۈش ئەھۋاللىرى يۈز بېرىدۇ. مۇنداق چاغلاردا قاي-ناقسۇ ئىچكۈزۈش ياكى چۈشكۈرتكۈچى دورىلارنى بۇرۇنغا تارتقۇزۇش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ.

(2) بېقىنغا سانجىق تۇرۇپ قېلىش ھاللىرىدا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش لازىم.

(3) مەئدە ھەرىكىتى تېزلىشىش بىلەن مەئىدىدە تۇرلۇك ئاۋازلار پەيدا بولسا مەستەكنى يۇمشاق سوقۇپ گۈلەن بىلەن يېيىشكە بېرىلىدۇ. زەھەرلەنگەندە قەيدىن كېيىن يېڭى سۇت بېرىلىدۇ.

قەي قىلدۇرغۇچى دورىلارنىڭ نۇسخىلىرى

(1) سەپرادىن بولغان كېسەللەردە قۇستۇرغۇچى

دورىلار:

پالەك سۈيى 4 سەر، ئارپا سۈيى، ھەمشىۋا سۈيى ھەربىرى 7 مىقالدەن قەن بىلەن تەييارلانغان ئىسكەند-جېيىن 1 سەر. بۇلارنى بىرلەشتۈرۈپ ئىلمان قىلىپ ئىچىشكە بېرىلسە قەي قىلىدۇ.

(2) بەلغەمدىن بولغان كېسەللەردە:

نۇرۇپ (لويۇ) ئۇرۇغى 2 سەر، سېرىق چىچەك

ئۇرۇغى 1 سەر، ئاققۇز $\frac{1}{2}$ سەر، بۇلارنى سوقۇپ

يېتەرلىك مىقداردىكى ھەسەل سۈيى بىلەن ئىچىدۇ. ئەگەر

قەي يانمىسا ئارقىدىن كۆپ مىقداردا ئىلمان سۇ ئىچ-
كۆزۈلە قۇسىدۇ.

(3) سەپرا ۋە بەلغەم بېرىكىشى بىلەن بولغان
كېسەللەردە: (+) ھەسەل بىلەن تەييارلىغان سىركەنجىبىن

1 سەر، ئاق تۇز $\frac{1}{2}$ سەر، تۇرۇپ سۈيى 4 سەر

بۇلارنى بىرلەشتۈرۈپ ئىلمان قىلىپ ئىچىدۇ.

(ب) چۈچۈك بۇيا يىلتىزى، سېرىق چىچەك ئۇرۇغى

$\frac{1}{2}$ سەردىن، ئارپا سۈيى، ھەمىشۋا ئۇرۇغى 3 مىقالدىن،

بۇلارنى بىر چوڭ چىنە سۇ قۇيۇپ يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ
بىر سەر مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخا قاراڭ) قوشۇپ
ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ياكى سىركە قوشۇپ ئىچىسىمۇ بولىدۇ.

4 - سۈرگە بېرىش

سۈرگە (مۇسەل) بېرىش تىبابەتتە كۆپ قوللىنىلە-
دىغان سۇرۇپ چىقىرىش چارىلىرىدىن بىرىدۇر. سۈرگە
بېرىش بىلەن تومۇرلار ئىچىدىكى، ئەزالاردىكى ۋە مەئدە
ئۈچەيلەردىكى ماددىلار (كېسەللىك سەۋەپلىرى) نى چىقى-
رىش مەخسەدىگە يېتىلىدۇ. ئادەتتە تەرەتنى يۇمشىتىش
(مۇلەيمىن قىلىش) سۇرۇشنىڭ ئورنىنى پاسالىمايدۇ. ئەمما
قېرى، ئاجىز كىشىلەر، بۇۋاقلار ۋە ئېغىر ئاياللارغا
يۇمشاتقۇچى دورىلار (مۇلەيمىنات) بېرىلسە مەلۇم نەتىجە
بېرىشى مۇمكىن. سۈرگە بېرىشتىن بۇرۇن ماددىنى پىشۇ-
رۇش شەرت. ماددىلارغا قاراپ سۈرگە دورىلىرى تۈرلۈك

تەركىپلەرگە ئىگە بولىدۇ. ئەمما سۈرگە بېرىش جەدىدى
زورۇر بولغان ھاللاردا ماددىنى پىشۇرىمەن دەپ ۋاقىتنى
ئوتكۈزۈپ قويۇشقىمۇ بولمايدۇ.

سۈرگە بېرىشكە بولمايدىغان ئەھۋاللار

قان ئالدۇرغانلارغا، بەدىنى ئاجىز، ئوزۇقلىنىشى
ناچار بولغان كىشىلەرگە، ھامىلدار ۋە ھېيىز مەزگىلىدە
دىكى ئاياللارغا، ئۇچىمى تۈسۈلگەن ۋە ئالماشقانلارغا،
كونا ئىچىۋرۇش كېسلى بارلارغا سۈرگە بېرىشكە بولمايدۇ.

سۈرگە بەرگەندىن كېيىن، دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار

(1) بېرىلگەن سۈرگە دورىسى مەيلى پىلاپ تەمى
چىقىرىلغان (نۇقۇە) ياكى قاينىتىپ تەمى چىقىرىلغان
(مەتبۇخ) بولسۇن ئۇستىدىن سۇ ئىچمەسلىك كېرەك.
چۈنكى سۇ ئىچىلسە سۈرۈشكە تەسىر قىلىدۇ. ئەگەر
سۈرگە ئىچكەندىن كېيىن قوساق تولغاپ ئاغرىپ كەتسە
قايناقسۇ بېرىشكە بولىدۇ.

(2) بېرىلگەن سۇيۇق سۈرگە ئوز كۈچىنى كور-
ستەلمەسە بىر قېتىم سۈرگۈچى ھەپ دورىلارنى بېرىش
لازم. ئەگەر بۇنىڭ بىلەنمۇ سۈرمەسە قايتىلاپ سۈرگە
دورسى بەرمەستىن سەۋىيىنى مۇلاھىزە قىلىش ۋە ھوققە
قىلىشنى ئويلاپ كورۇش لازىم.

(3) سۈرگە دورىسى سۈرۈپ بولغاندىن كېيىن

سوۋۇتۇلغان قايناقسۇ، ئانارشەرۋىتى (47 - نۇسخە) بى -
رىش كېرەك.

(4) تەركىۋىدە ھەببۇلمۇلۇك (ئىنەك پىشتى)،
توربۇت ۋە تۈزلۈك دورىلار كۆپ بولغان (ئاساسى ئۇرۇن -
دا بولغان) سۈرگە دورىلىرىنى بەرگەندە ئۇستىدىن سۇ
بېرىشكە بولىدۇ ①.

(5) ئەگەر سۈرگە دورىلار سۈرمەستىن غەيرى
ھاللار - (يۈرەك سېلىش، مەئدە، قوساق كۆپۈش، باش
قېيىش ۋە كۆڭۈل ئايدىش قاتارلىقلار) يۈز بەرسە دەرھال
قەي قىلدۇرۇش كېرەك. بۇ چاغدا كۆپرەك ئىلمان سۇ
(بىر ئاز تۈز قوشۇپ) ئىچكۈزۈپ قالغا پاكىزە توخۇ
پېيى ياكى بارماقنى تىقىپ ياندۇرۇش كېرەك.

(6) سۈرگە سۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، ئۇچەي،
مەئدىلەردە قىزىش، كۇيۇشتەك ئەھۋاللار يۈز بەرسە،
ئىسپۇغۇل شىلىمىش قىزىش ۋە بىيە ئۇرۇغىنىڭ شىر -
سىنى چىقىرىپ بېرىش كېرەك. بۇنىڭغا بىر ئاز رەيھان
ئۇرۇغى، قەن، گۈلاپ قوشۇپ بەرسىمۇ بولىدۇ.

(7) ئىچى بەك سۇرۇپ كېتىپ توختىتىشقا توغرا
كەلسە، ھارارەت بولمىغان ھاللاردا قېتىق بىلەن زىرىق
ئىچكۈزۈش كېرەك. ئەگەر قىزىتما بولسا، رەيھان ئۇرۇغى،
سېمىز ئوت ئۇرۇغى، قىمۇقۇ ئۇرۇقلىرىنى باراۋەر مىق -
① بۇ يەردە سۇ بېرىش دېگەن سۆز - كۆپ مىقدارد
سۇ بېرىشنى كۆزدە تۇتىدۇ.

داردا ئېلىپ قورۇپ سۇقۇپ تالقان ھالىتىدە بىز ئاز سۇ بىلەن ئىچكىزۈش لازىم. (باشقا چارلار ئىچ سۇرۇش كېسەللىكلىرى بابىدا سوزلىنىدۇ).

(8) سۈرگە دورىلارنى بېرىشتە كېسەلدە ماددىنىڭ غالىپلىق ئەھۋالىغا قاراپ شۇ ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىشنى ئاساس قىلىش كېرەك. مەسىلەن، سەپرا غالىپ بولسا، سەپرا سۈرگىسى، بەلغەم غالىپ بولسا بەلغەم سۈرگىسى قاتارلىقلارنى قوللىنىش كېرەك. قان ماددىسى غالىپ بولغان كېسەللەرگە سۈرگە بېرىشتە ئادەتتە سەپرا سۈرگىسى ئاساس قىلىنىدۇ. چۈنكى قاننىڭ ئىستىفراغى قان ئېلىش بىلەن بولىدۇ.

سۈرگە دورىلار

كېسەلگە سۈرگە بېرىشتە ئەڭ ياخشى يالغۇز (يەككە) ھالدىكى سۈرگىلىك تەسىرگە ئىگە دورىلارنى بەرمەسلىك، بەلكى مۇرەككەپ نۇسخىلار بېرىلىشى كېرەك. بۇ خىل نۇسخىلار كېسەللىك بابىدا تەپسىلى سوزلىنىدۇ. مىسال ئۈچۈن تۆۋەندە بىر قانچىلىرىنى كورسېتىپ ئۆتىمىز:

(1) سەپرا سۈرگىسى ئۈچۈن مەتبۇخى ھەللى 38 - نۇسخە)، ھەببى سەبىرە (4 - نۇسخە) مۇرەككەپ نۇسخىلار - دىن بولۇپ ھىساپلىنىدۇ.

(2) بەلغەم سۈرگىسى ئۈچۈن - شەھى ھەللى، قەتەرىيەن (ياپچان)، ماھى زەھەرەج، غارىقۇن، ھەشىق پىچەك ئۇرۇغى، ئادراسمان ئۇرۇغى، بىسىتپايەج، سىيادان، قامغاق (شۇكائى) قاتارلىقلار يەككە (مۇفرەد) سۈرگە دورى -

لار ھساپلىنىدۇ. مۇرەككەپ دورىلار ئۈچۈن، ھەبىي قوقيا، ھەبىي ئايارەج، ئايارەنجى پەيقارا (7 - 16 - 17 - ئۇسخىلار) ياكى توۋەندىكى نۇسخە بېرىلىدۇ.
نۇسخە: توربۇد 3 مىسقال، زەنجىۋىل 1 مىسقال،

مەستىكى، ئاق تۇز جەۋھىرى $\frac{1}{2}$ مىسقال، شېكەر $\frac{1}{2}$ سەر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلاپ شە قاقچىلاردا ساقلىنىدۇ. كۈنىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن

سوۋۇتۇلغان قايناق سۇ بىلەن ئىچىدۇ.

(3) سەۋدا سۈرگىسى ئۈچۈن يەككە دورىلار، كابۇل ھىلىلىسى (سېرىق ھىلىلىنىڭ چوڭراغى)، قارا ھىلىلە، بالەنگو، سېرىق ئوت، ئوستۇخۇددۇس، سوقمۇنيا، ھەجەرى لاجىۋەرد، ھەجەرى ئەرمىنى، ئاقلىغان ئامىلە، سانا قاتارلىقلار.

مۇرەككەپ سەۋدا سۈرگىسى ئۈچۈن ئادەتتە توۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلار بېرىلىدۇ:

نۇسخە: ئايارەنج پەيقارا 5 مىسقال، تازىلانغان لاجىۋەرد 7 مىسقال، سوقمۇنيا، خەربەق سىيا 2 مىسقال - دىن، رۇمىدىيان (ئەنسۇن) 1 مىسقال، ئەپتىمۇن 1 سەر، ھەجەرى ئەرمىنى 7 مىسقال، شەھى ھەنزەل 2 مىسقال، سۇمبۇلتىپ 1 مىسقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ يېتەرلىك مىقداردىكى چىگىسى

(كەرەپشى) سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ گۈل يېغى بىلەن
كۈمۈلەچ ياساپ سايىدا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈلگە 1 مىسقالدىن 2 مىس-

قالغىچە كەچ ۋاقتىدا قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ.

سۈرگە دورىلارنى تەييارلاشتا دىققەت قىلىشقا

تېگىشلىك بىر قانچە مەسىلىلەر

(1) بىر خىل خىلىت سۈرگىسى بېرىلگەندە ئەگەر

ئۇ بىر ئاز كۈچلۈگرەك (مىقدارى كۆپرەك) قىلىپ بېرىلسە

مەۋجۇت بولغان باشقا خىلىتىنىمۇ چىقىرىدۇ. مەسىلەن،

بەلغەم سۈرگىسى سەپرانىمۇ سۇرۇشى مۇمكىن.

(2) ھەر قانداق بىر سۈرگە كار قىلغاندىن كېيىن

ئومۇمىي بەدەندە سوۋۇش كەيپىياتىنى پەيدا قىلىدۇ. بىر

قانچە قېتىم سۈرگە بېرىشكە توغرا كەلگەندە ئارىلاپ

بەدەننى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى تەدبىرلەرنى قوللىنىش لازىم.

(3) يېڭى باشلانغان قىزىتمىلىق كېسەللەرگە بىر

ھەپتىگىچە سۈرگە دورىلارغا ھىلىلە قوشۇپ بېرىشكە

بولمايدۇ. ئەگەر ھاجەت بولغاندا ھىلىلنى بادام يېغى

بىلەن ياغلاپ ياكى باشقا شىلمىشلىق دورىلارنى (بالەنگە،

سەرىپىستاننى) قوشۇپ بېرىش لازىم. ئۇنداق قىلمىغاندا

ھىلىلە جىگەرنى زەھەرلەپ قويۇشى مۇمكىن.

(4) پۇنۇس، خىار شەنبەر قوشۇلغان سۈرگىلەرگە

بادام يېغى، بىنەفشە، يېغى قوشمىغاندا بەدەنگە قۇرۇق-

لۇق يەتكۈزۈشى، كوڭۇلنى ئاينىتىشى مۇمكىن.

(5) غارقۇنى دورىلار بىلەن قوشۇپ سوققاندا ئۇنىڭ تاش پوستى ئارىلىشىپ قېلىپ زەھەرلىك تەسىر قىلىشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن غارقۇنى سىم تور ئەلگەك تىن سۇرۇپ ئۆتكۈزۈلسلا بولىدۇ، سوقماسلىق كېرەك.

(6) ئەپتىمۇنى قايناتقاندا باشقا دورىلار بىلەن قوشۇپ سوقماستىن ئايرىم لاتا خالىغا سېلىپ قاينىتىپ تەمى چىققاندا تىرىپى ئېلىپ تاشلىنىدۇ.

(7) مەتبۇخ ۋە ئوقۇۋە (چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ ئىچىدىغان دورا تۈرى) ئوز ۋاقتىدا بىر قېتىم ياكى بىر كۈنلۈك تەييارلىنىدۇ.

5. ھوقنە - شامچە

ھوقنە ۋە شامچىلەر سۈرگە دورىسى بېرىش مەنىنى قىلىنغان ھاللاردا ئىچىنى سۇزۇش تەسىرىگە ئىگە بو-
لۇپلا قالماستىن بەلكى ئۈچەي ئارقىلىق دورىلارنى ئو-
مۇمى بەدەنگە تەسىر قىلدۇرۇش ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلىدۇ.
بولۇپمۇ مەئىدىسى ئاجىز بولغان كىشىلەرگە بولغان مەد-
پەئەتى بەكمۇ ياخشى. تىبابەتتە ئىچكى ئەزالار ۋە رەم-
لىرىدە ھوقنە ۋە شامچە (شياق) شەكلىدىكى دورىلارنى
ئىشلىتىش ئاساسى داۋالاش ئۇسۇلى سۈپىتىدە قوللىنىدۇ.
ھوقنەنىڭ ئالاھىدىلىكلىرى:

(1) بەدەندە بولۇپمۇ مەئە ۋە ئۈچەيلەردە پەيدا
بولغان غەيرى تەبىئى بۇخارات ۋە ئۇفۇنەت ماددىلارنى
توۋەن چۈشۈرۈپ مىڭنى ساغلاملاشتۇرىدۇ.

2) ھوقنە ھەرخىل دورىلاردىن تەركىپ تاپقاندا، لىقتىن ئىنچىكە ئۇچەي ۋە 12 بارماق ئۇچەي ۋە مەندىلەرگىچە تەسىر قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ھوقنە كۆپ ۋە سۈرئەت تېز بولماسلىقى لازىم.

3) ئۇچەي يوللىرىنى سىلىقلاشتۇرۇپ ئۇچەي خىزمىتىنى ياخشىلايدۇ.

ھوقنە دورىسى — 5 سەرمىقداردا بولۇش بىلەن دورا ئۆزلىرىنى كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ تاللاش، لېكىن قۇرۇق خۇسۇسىيەتلىك دورىلارنى ئىشلەتمەسلىك لازىم. مەندە، تال ۋە ئۇچەيلەردە توسالغۇ بولغان ھاللاردا تۈۋەندىكى نۇسخە ئىشلىتىلىدۇ.

ئاق لەيلى گۈلى ۋە ئورۇغى، ھەمشىۋا گۈلى، بە-
نەشە گۈلى، شۈمشە، زاراڭزا ئۇرۇغى، سانا 5 مىسقال،
دىن، ياپچان، زىغىر، سوزاپ، ئىسپۇغۇل، بىيە ئۇرۇغى،
ھەزەر ئەسەندە، مۇقىل، جاۋشەر ھەربىرى 2 مىسقالدىن،
گۈل يىغى 5 مىسقال، كۈنجۈت يىغى 15 مىسقال، ئە-
نەك پىتى يىغى 5 مىسقال، تەرەنجۈل 2 سەر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلار چوڭكىدەك مىقدار-
دىكى سۇغا سېلىپ قاينىتىلىدۇ، ئۇزاق قاينىتىش
كېرەك ئەمەس. دورىنىڭ تىرىپلىرىنى سۇزۇپ بولغاندىن
كېيىن ياغلارنى ئارىلاشتۇرۇپ ئاستىلىق بىلەن ئۇچەيگە
ماڭدۇرۇش (ھەمەل قىلىش) لازىم.

ئىچ قېتىپ قالغانلاردا سېرىق ياغ، ئەنجۈر قېقى،

چىلان سەرپىستاننى يېتەرلىك مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ. ئە-
گەر ئىچى قاتقان كېسەللەرگە سۈرگە ياكى ھوقىنە قە-
لىشقا بولمىسا توۋەندىكى دورىلارنى قوساق سىرتىدىن
چىپىش كېرەك. سېرىق موم، ئىنەك پىتى يېغى، سۇت،
مەھمۇدە (سوقمۇنىيا)، كالا ئوتى، شەھمە ھەنزەل.

تەييارلاش ئۇسۇلى: مومنى ئېرىتىپ، باشقا دورىلارنى
يۇمشاق سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ ئۇستىگە سۇت بىلەن كالا
ئوتىنى ئارىلاشتۇرۇپ قوساق ئۇستىگە قويۇلىدۇ.
شامچە (شيان)

شامچە شەكلىدە ياسالغان دورا ئاساسەن سۈرگە
دورىلاردىن تەركىپ تاپىدۇ. ۋە ھوقىنە قىلىشقا بولماي-
دىغان (ئۇچەي ئالمىشىپ قېلىش قاتارلىق) ھاللاردا
سۈرگە ئوز ئەمىلىنى كورستەلمىگەندە ئارقا يولغا
كىرگۈزۈشكە ئىشلىتىلىدۇ. ئۇندىن باشقا شامچە ئارقا
يولنىڭ باشقا كېسەللىرى، ئۇچەي توسىلىش ۋە ئايال-
لار جىنسى يولغا بىۋاسىتە تەسىر كورستىشكىمۇ
ئىشلىتىلىدۇ.

شامچىلارنى تولىمۇ كۆپ ئىشلەتمەسلىك كېرەك،
چۈنكى مەقئەتكە كىرىپ قالغان يات جىسىم بولۇپ،
باشقا ئوزگىرىشلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. شام-
چىلار تەركىۋىدىكى دورىلار كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ
بەلگىلىنىدۇ. ئادەتتە كۆپ قوللىنىدىغان نۇسخىلار
توۋەندىكىچە:

1 - نۇسخە: ئۈچەي يوللىرىدىكى توسالغۇلارنى
ئېچىش ئۈچۈن ئىشلىتىلدۇ. گۈلبەنەفشە 2 مىسقال،
سانا 5 مىسقال، خىيارشەبنەر شىرىسى 1 سەر، ئاق
لەيلى گۈلى 3 مىسقال، ھىند تۈزى 1 مىسقال، قارا شە-
كەر 1 سەر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ،
شېكەر بىلەن خىيار شەبنەر شىرىسىنى ئېرىتىپ يۇغۇرۇپ،
ئۈچ ئىلىك ئۇزۇنلۇقتا شامچە تەييارلاپ سايىدا قۇرۇ-
تۇپ ئىشلىتىش چېغىدا گۈل يېغى ياكى سېرىق ماي
بىلەن مايلاپ ئىشلىتىلدۇ.

2 - نۇسخە: كىچىك بالىلار ۋە بەدەننى ئاجىز كە-
شلىر ئۈچۈن ئىشلىتىلدۇ. ئاق موم 4 مىسقال، ئاش
تۈزى، بورە ئىرىمىنى 1 مىسقالدىن، ئالدى بىلەن
مومنى ئېرىتىپ قالغانلىرىنى يۇمشاق سوقۇپ ئىلەشتۈ-
رۇپ لايىق چوڭلۇقتا شامچە تەييارلىنىدۇ. ئەگەر تېز ياردەم
بېرىش زورۇر بولغاندا ئادەتتىكى يۈز سۈپۈنلىرىنى قە-
رىپ چىلان ئۇرۇغىدەك قىلىپ ئارقا يۈلىدىن ئۈچەيگە
كىرگۈزۈلسە تېز ئۇنۇم بېرىدۇ.

6. تەرلىتىش

تەرلەش بىلەن بەدەندىكى ئارتۇقچە ھوللۇك (رۇ-
تۇبىتى فۇزۇلى) تېرىدىكى تەر بەز توشۇكىلىرى (مىسام)
ئارقىلىق سىرتقا چىقىپ كېتىدۇ. تىبابەتتە تەرلىتىش
چارىسى مونچىغا كىرىش، قىزىق سۇ ئىچىپ چۈمكۈنۈپ

يېتىش ياكى ئادەتتىكى قىزىتما چۈشۈرگۈچى دورىلارنى ئىچكىۈزۈش ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدۇ. ساق كىشىلەرگە تەرىلىتىش دورىسى بەرمەسلىك كېرەك. ئۇلار ئۈچۈن ئەمگەك ئەڭ ياخشى تەرلەش چارىسىدۇر. كېسەللەرگە تەرلەش ھارارەتنى چۈشۈرگۈچى ۋە بەدىنىنى يېنىكلەش- تۈرگۈچى تەسىر كۆرسىتىدۇ. يۇقۇرى قىزىتمىلىق ئاغ- رىقلاردا تەرلەش بۇھرانىڭ بەلگىلىرىدىن بىرى بولۇپ ھىساپلىنىدۇ (بوھرانغا قاراڭ).

7. بۇرۇن ۋە تىل ئاستىدىن سۇ ئاققۇزۇش

تىبابەتتە باش ساھەسىدىكى ئاغرىقلاردا بۇرۇندىن سۇ ئاققۇزۇش بىلەن مىڭدىكى ماددىلارنى چىقىرىش مەقسىدىگە ئېرىشىلىدۇ. ئادەتتە زۇكام ۋە باش ئاغرىقى- دەك كېسەللەردە بۇرۇندىن قويۇق شىلىملىق سۇيۇقلۇق- لارنىڭ ئېقىشى بىلەن كېسەلنىڭ يېنىكلىشىپ قالغانلىقىنى كۆرىمىز. مىڭ كېسەللىكلىرىدە مەسلەن: تۇتقاق كېسىلىدە بۇرۇنغا دورا تاتقۇزۇپ سۇ ئېقىتىش كېسەل- نى ھۇشغا كەلتۈرۈش ۋە كېسەللىك ئالامەتلىرىنى يې- نىكلەشتۈرۈش تەسىرىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ خىلدىكى دورى- لار ئاساسەن قارىمۇچ، قۇندۇز قەرى، خولىنجان، زەن- جىۋىل بولۇپ، سوقۇپ بۇرۇنغا تارتىدۇ. مىقدارى ۋە تۈرى كېسەل ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ.

مەئدە، قۇلاق ۋە كۆز، بۇرۇن كېسەللىكلىرىدە ئېغىزدىن (تىل ئاستىدىن) شولگەي ئاققۇزۇش پايىدىلىق

تەسىرگە ئىگە. بۇ ئۇسۇل كۆپىنچە قىش كۈنلىرى بەدەندە ئادەتتە سۇيۇقلۇق كۆپ بولغان چاغلاردا قوللىنىلىدۇ. ئاقىرقەرھال، تۇخۇمەك مەۋسى، سىركە، يالىپۇز ۋە قىچىلارنى ئىلەشتۈرۈپ تىل ئاستىدا تۇتۇش ياكى ئېغىز چايقاش بىلەن بۇ مەقسەتكە يېتىلىدۇ.

8. سۇيىدۇك ھەيدەش

تىبابەتتە سۇيىدۇك ھەيدۈگۈچى دورىلار (مۇدىراتلار) بىلەن سۇيىدۇك توسىلىشنىلا داۋالاپ قالماستىن بەلكى قالىتومۇر، سۇيىدۇك ئەزالىرى ۋە جىگەر ئەتراپىدىكى غەيرى تەبىئى خىلىتلار — كېسەل سەۋەپچىلىرىنى چىقىرىپ تاشلاش ئۈچۈنمۇ قوللىنىلىدۇ. سۇيىدۇك ھەيدەشتە توۋەندىكى بىر قانچە ئىشلارغا دىققەت قىلىش لازىم:

(1) قويۇق خىلىتلار سەۋىبىدىن بولغان كېسەل — لەردە ئالدى بىلەن سۈرگە بەرمەي تۇرۇپ سۇيىدۇك ھەيدىناۋچى دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. چۈنكى سۈيىدۇك ھەيدەش بىلەن بەدەندە سۇيۇقلۇق مىقدارى ئازىيىپ كېتىپ ماددا تېخىمۇ قويۇقلىشىپ كېتىدۇ ۋە ھەيدىگۈچى چىقىرىش قىيىنلىشىدۇ.

(2) قان ئېلىش، قەي قىلدۇرۇش ۋە سۈرگە بېرىش بىلەن داۋالاشقا توغرا كەلگەنلەردە سۇيىدۇك ھەيدەش چارىسىنى كېيىنكىگە قالدۇرۇش كېرەك.

(3) جىگەر ياللۇغلىرىدا — ياللۇغلىنىش جىگەرنىڭ ئاستىنقى قىسمىدا بولسا (جىگەر كېسىلى بابىغا قاراڭ)

ئالدى بىلەن سۈرگە بېرىش ۋە ئالدىن كېيىن سۇيدۇك ھەيدەش تەدبىرىنى قوللىنىش كېرەك. ئەگەر ۋەزەم يوق قۇرقى يېرىم ئايىمان قىسمىدا بولسا، ئالدى بىلەن سۇيدۇك ھەيدەش لازىم.

(4) سۇيدۇك كۆپ مېڭىپ كەتكەندە تەرلەش ۋە ئارقا تەرەت توختاپ قېلىشى مۇمكىن. شۇڭا ئارقا تەرەت كۆپلىگى ۋە تەرلەش ئاساسى ئورۇندا تۇرىدىغان كېسەللەرگە سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورىلارنى ئوبدان ئويلاپ ئىشلىتىش لازىم.

(5) بەدەندە قۇرۇقلۇق ئالامەتلىرى بار ياكى ماددىسى تېخى خام كېسەللەرگە سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورىلارنى بېرىشكە ئالدىرىماسلىق لازىم. چۈنكى ماددىنىڭ پىشى ئۈچۈن بەدەندىكى سۇيۇقلۇق ئۆستۈرۈش مىقدارىدا بولمىشى كېرەك. چۈنكى كۆپ سۇيدۇك چىقىرىش بىلەن بەدەندە قۇرۇقلۇق كۈچىيىپ كېتىپ ماددىنىڭ پىشىنى ئارقىغا سوزۇپ كېسەلنى ئۇزۇنغا سوزۇپ قويۇشى مۇمكىن.

(6) سۇلۇق ئىششىق، پالەچ ۋە مۇپاسىللەر (بوغۇم ئاغرىقلىرى) دە سۇيدۇك ھەيدەش ئۇسۇلى ئاساسى ئورۇن-دا قويۇلىدۇ.

سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورىلار:

سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورىلار ئىسقى (سوغاقتىن بولغان ئاغرىقلار ئۈچۈن) سوغاق (ئىسسىقتىن بولغان كېسەللەر ئۈچۈن) كەيپىياتتىكى سۇيدۇك ھەيدىگۈچى

دورلار ۋە موتىدىل كەيپىياتتىكى سۇيدۇك ھەيدىگۈچىلەر دەپ 3 تۈرگە ئايرىلىدۇ. بۇلار تۆۋەندىكىچە:

(1) ئىسسىق كەيپىياتتىكى دورىلار:

چىڭسەي ئۇرۇغى، كاۋاۋىچىن، ئارپا بېدىيان، جۇۋىنا، رۇمبېدىيان، سۇزاپ ئۇرۇغى، زۇفا، زەدەك (سەۋزە) ئۇرۇغى قاتارلىقلار مۇۋاپىق مىقداردا (كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ) ئېلىنىپ سوقۇپ قاينىتىپ تەمى چىققان سۇ ئىچكۈزۈلىدۇ.

(2) سوغاقلىق كەيپىياتتىكى دورىلار:

كاسىن ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، ئەگرى ۋە تۈز خاڭگا ئۇرۇغى، ئوغرى تىكەن، ئىسكەنجىۋىن، كاكا-نەج، قاپاق سۈيى، تاۋۇز سۈيى.

(3) موتىدىل كەيپىياتتىكى دورىلار:

ئوپكە، جىگەر، بۆرەك كېسەللىكلىرىدە پىرسىياۋ-شان بىلەن قوغۇن ئۇرۇغى بېرىلىدۇ. ئەگەر جىگەر مە-زاجى بۇزۇلغان بولسا، ئارپا بېدىيان بىلەن كاسىن ئۇرۇغى بېرىلىدۇ. ئۇفۇنەتلىك (مىكروپىلۇق) كېسەللىرىدە ۋە يەللىك ئاغرىقلاردا سېمىز ئوت ئۇرۇغىغا چىڭسەي ئۇرۇغى قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئادەتتە كۆپ ئىشلىتىلىدىغان موتىدىل سۇيدۇك ھەيدىگۈچى دورىلار ئۇسۇخسىدىن تۆۋەندە بىر مىسال كۆرسىتىمىز:

نۇسخە: بېدىيان، رۇمبېدىيان ھەر بىرى 2 مىس-قالدىن، قوغۇن ئۇرۇغى، خاڭگا ئۇرۇغى 3 مىسقالدىن.

تەييارلاش ئۇسۇلى: ئارپا بېدىيان بىلەن رۇمبىدە-
يائىنى چالا سوقۇپ بىر پىيالىە سۇدا قاينىتىپ سۇزۇلىدۇ.
قوغۇن ئۇرۇغى بىلەن تۇز ۋە ئەگرى خاڭگا مېغىزنى
چېقىپ يانچىپ بېدىيان سۈيى بىلەن ئىلەشتۈرۈپ 7
مىسقال قەن ياكى شېكەر قوشۇپ 2 گە بولۇپ بىر كۈن-
دە ئىچىدۇ.

2 - پەسىل: ماددىلارنى پىشۇرۇش (مۇنزىج) چارىلىرى

كېسەلگە سەۋەپچى بولغان ماددىلار (نەزجىلەر) نىڭ
بەدەندىن ئاسانلىقچە تولۇق چېقىپ كېتىشى ئۇچۇن،
بەدەننىڭ ماددىلارنى پىشۇرۇشىغا دورىلار بىلەن ياردەم
بېرىش ئۇسۇلىنى مۇنزىج چارىسى دەپ ئاتىلىدۇ.
بۇنىڭ ئۈچۈن تىبابەتتە ھەر بىر ماددىنىڭ ئالا-
ھىدىلىكى ۋە شۇ ۋاقىتتىكى (مۇنزىج دورىلارنى بېرىش
ۋاقتىدىكى) ھالىتىگە قاراپ پىشۇرغۇچى دورىلار (مۇن-
زىجاتلار) بېرىلىدۇ. مەسىلەن، بىردىن ئارتۇق ماددىلار-
نىڭ زىيادىلىكىدىن بولغان مۇرەككەپ ئەھۋاللار بولسا،
بېرىلىدىغان پىشۇرغۇچى دورىلارمۇ مۇرەككەپ بولۇشى،
ماددا قويۇق (غەلىز) بولسا سۇيۇقلاشتۇرغۇچى ۋە سۇيۇق
بولسا ئېتىداللاشتۇرغۇچى تەركىپلىك بولۇشى لازىم. بۇن-
داق بولغاندىلا ماددىلارنى ئوڭاي پىشۇرغىلى بولىدۇ.
ۋە باشقا غەيرى ئوزگىرىشلەر يۈز بەرمەيدۇ. مەسىلەن،

قويۇق بەلغەم بىلەن سەۋدا ماددىسىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن سۈيۈلدۈرگۈچى دورىلارنى، سۈيۈق ماددىلارنى قويۇلدۇرغۇچى دورىلار ئاساس قىلىش لازىم. قاننىڭ غەيرى تەبىئى ھالەتلىرىنى پىشۇرۇش ھاجەت ئەمەس. بەلكى قانغا ئارىلاشقان باشقا ماددىلارنىڭ ئالامەتلىرىگە قاراپ شۇلار ئۈچۈن پىشۇرغۇچى دورىلار بېرىپ بولغاندىن كېيىن قان ئېلىش لازىم. شۇنداق قىلغاندىلا قانغا ئا- رىلاشقان ماددا چىقىپ كېتىدۇ. بولۇپمۇ سەۋدا قانغا ئارىلىشىپ قالغان ھالەتلەردە بولسا ئالدى بىلەن سەۋ- دانى سۈرگۈچى دورا بەرمەي تۇرۇپ قان ئېلىش داۋا- لاشنى خاتالاشتۇرۇپ قويىدۇ. بۇ نۇقتىغا تەۋبىپ ياخشى دىققەت قىلىش لازىم. تۆۋەندە ماددىلار ئۈچۈن پىشۇر- غۇچى بولغان دورا نۇسخىلىرىدىن مىساللار كۆرسىتىلىدۇ. (تەپسىلاتى كېسەللەر بايانىدا سۆزلىنىدۇ).

(1) سەپرا ماددىسى ئۈچۈن بېرىلىدىغان پىشۇر- غۇچى (مۇنزىج) دورىلار:

نۇسخە: گۈلبىنەفشە، نىلۇفەر، شاتەرە، چالا سو- قۇلغان كاسىن يىلتىزى ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، چە- لان 7 دانە، چالا سوقۇلغان كاسىن ئورۇغى 3 مىس- قال، تەرەنجىۋىل 1 سەر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى 16 سەر قايناقسۇغا چىلاپ قويۇپ 8 سائەتتىن كېيىن ماتادىن ئۆتكۈزۈپ تازا كىتىپ تەمىنى چىقىرىلىدۇ. بۇنىڭغا تەرەنجىۋىلنى سېلىپ

سۇس ئوت بىلەن بىرلا قاينىتىپ قايتا سۇزۇپ تەييار-
لىنىدۇ. 2 سەردىن كۈنىگە 3 قېتىم ئىچىشكە بېرىلىدۇ.
بۇ نۇسخە قىزىتمىلىق سەپراۋى ئاغرىقلاردا ئۇنۇمى
ياخشى. ئەگەر يالغۇز سەپرا ماددىسىلا بولسا بۇ نۇس-
خىدىكى دورىلار 3 كۈندىن 5 كۈنگىچە بېرىلسە ماددا
پىشقانلىق ئالامەتلىرى كورۇلىدۇ.
(2) بەلغەم ماددىسى ئۈچۈن بېرىلىدىغان پىشۇر-
غۇچى دورىلار.

(1) نۇسخە: ئۇرۇغى ئېلىنغان قۇرۇق ئۇزۇم $\frac{1}{2}$

سەر. بېدىيان، قامغاقلار (چالا سوقۇپ) ھەر بىرى 2 مىسقال-
دىن. پىرساۋشان 4 مىسقال. پىشقان ئەنجۈر قېقى 5 دانە.
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلار 2 چوڭ چىنەمە-
دارىدا قايناقسۇغا 8 سائەت چىلاپ قويۇلغاندىن كېيىن
1 ئاز قاينىتىپ ماتادىن ئونكۈزۈپ، تازا سىقىپ
سۇزۇپ سۈيىگە 1 سەر ھەسەل بىلەن تەييارلانغان
گۈلقەن ئېلىشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا
بىر سەردىن ئىچىدۇ. ئەگەر بۇ نۇسخىغا 7 مىسقال
سىركە قوشۇلسا تەسىرى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ. ئەمما
كېسەلدە يوتەل بولسا، سىركە قوشماسلىق كېرەك. سىركە
يوتەلنى كۈچلەندۈرۈپ قويىدۇ.

(2) بەلغەم شور (تۈزلۈك) بولسا دورىلار تەركىبىگە
سەپرانىڭ پىشۇرغۇچىلىرىنى قوشۇش كېرەك.

(3) خاس نوقۇت سۈيى (قاينىتىپ تەمى چىقىرىلغان سۈيى) ئىچىشكە بېرىلسە بەلغەم ۋە سەۋدا ئۈچۈن پىشۇرغۇچى بولىدۇ. ئەمما كېسەلدە قىزىتما بولسا يېرىشكە بولمايدۇ. بەلغەم ماددىسىنى پىشۇرۇپ چىقىرىش ۋاقتى ئۇنىڭ تۈرىگە ۋە بېرىلگەن دورىلارغا قاراپ 5-15 كۈن ئەتراپىدا بولىدۇ.

(3) سەرپىستان 20 دانە، چىلان 10 دانە، گازىۋان، بادىرىنجى بىۋىيا، ئوستۇخوددۇس، پىرسىياۋشان، بېدىيان، شاتەرە ھەر بىرى 6 مىقالدىن، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 3 مىقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: سەرپىستان چالا سۇقۇلىدۇ. چۈچۈكبۇيا يىلتىزىنىڭ تاشقى پوستىنى سۈيۈپ پارچىلاپ ھەممە دورىلارنىڭ ۋەزىنىدىن 5 ھەسسە ئارتۇق قايناق-سۇغا 8 سائەت چىلاپ يېرىمى قالغىدەك قاينىتىپ، ماتا-دىن ئۆتكۈزۈپ سىقىپ سۈزىلىدۇ. قەلەيلەنگەن مىس قازانغا ئالدى بىلەن 1 دانە تۇخۇم ئېقىنى تاشلاپ تازا قوچۇپ ئۇستىگە سۈزۈلگەن دورىنى قويۇپ 5 سەر تەرەنجىۋىل، 10 سەر قەن قوشۇپ يۇمشاق ئوت بىلەن قىيام قىلىنىدۇ. بىرىنچى قېتىم قايناش ئالدىدا يۈزىگە چىققان كۆپۈكلەرنى ئېلىپ تاشلاپ ئوبدان قىيام بول-غاندا ئېلىپ قۇرۇق قاچىلاردا ساقلاپ، قىيام قويۇق بولسا 1 سەرگە 1 سەر قايناقسۇ قوشۇپ قىزىتىپ كۈنىگە 3 ۋاق ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر قىيام سۈيۈك

بولسا سۇ قوشماستىن بېرىلىدۇ. ئەگەر باشقا ماددىلار ئارىلاشقاندا شۇلارنىڭ دورىلىرىنى قوشۇش كېرەك. خاس سەپرانىڭ مۇنزىجلىق ۋاقتى 3 كۈن ھىساپلىنىدۇ.

مۇنزىجلەرنى بېرىشتە شۇنىڭغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەككى: ئالدى بىلەن كېسەلنىڭ ماددىدىن بولمىغان (سازەج) ياكى ماددىدىن بولغان ئىكەنلىكىنى ئوبدان ئايرىش كېرەك. ئۇنداق قىلمىغاندا، ماددى كېسەللەر سازەج دەپ تونۇلۇپ، مۇنزىج بېرىلمەي قېلىپ ماددا كۈچىپ كېتىپ كېسەل ئەھۋالى ئېغىرلىشىپلا قالماستىن، بەلكى كېيىنكى داۋالاشقا زور تەسىر بېرىدۇ. ئەكسىچە سازەج كېسەللەر ماددى دەپ تونۇلۇپ قېلىپ مۇنزىج تەدبىر - لىرى قوللىنىلسا ئاغرىقنىڭ بەدەن قۇۋۋىتىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ قويدۇ. تەبىئىكى بۇ ئەھۋال مۇ كېسەلنى ئېغىر - لاشتۇرىدۇ. ئۇندىن باشقا يۇقۇرقى ماقالىلاردا كۆرسىتىپ ئوتۇلگەندەك پىشۇرغۇچى دورىلار مۇ ئاغرىقلارنىڭ تەن قۇۋۋىتى، يېشى، تۇرمۇش ئەھۋالىغا قاراپ مۇۋاپىق مىقدار ۋە لايىق تەركىپلەردە بېرىلىشى كېرەك. تىبابەتتىكى داۋالاش ئۇسۇلى - كېسەلنى تونۇپ چىقىش (تەشخىس) ماددىنى (مۇنزىج) پىشۇرۇش، ھەيدەپ چىقىرىش (ئىستىفراغ) تەدبىرلىرىنى قوللىنىشتىن ئىبارەت بولۇپ، مۇشۇ تەرتىپ بويىچە چارە كۆرۈشنى تەۋبىپ ياخشى ئىگەللىشى كېرەك.

3 - پەسىل: دورا ئىچكۈزۈش

1. تىبابەتتە ئېغىز ئارقىلىق بېرىلىدىغان دورا

① تۇرلىرى

تىبابەتتە ئېغىزدىن بېرىلىدىغان دورا تۇرلىرى - كېسەلنىڭ قوبۇل قىلىشىغا ئوخشاش بولۇشى ۋە دورىلارنىڭ ئالاھىدىلىكىگە قاراپ ھەرخىل شەكىللەر بىلەن تەييارلىنىشى لازىم. تەييارلاشتىن بۇرۇن، ئالدى بىلەن دورىلارنىڭ يېڭى - كۈنلىكى ۋە ئىشلىتىشكە بولۇش - بولماسلىق قاتارلىق ئۆلچەملەر ئاساسىدا تەكشۈرۈلىدۇ (بۇلار دورىگەرلىك ئەسەرلەردە تەپسىلى سۆزلىنىدۇ). ئۇندىن كېيىن دورىلاردىكى توپا - چاڭ قاتارلىق يات ماددىلار تازىلىنىپ نۇسخىدا كۆرسىتىلگەن ئۆلچەم بويىچە ئۆلچەپ ئېلىپ بەلگىلەنگەن دورا تۈرى تەييارلىنىدۇ. تۈۋەندە دورا تۈرلىرىنىڭ ئادەتتە كۆپ قوللىنىدىغانلىرىدىن بىر قانچىسىنى تونۇشتۇرىمىز.

1) مەئجۇنات (مەجۇنلەر):

ئۇيغۇر تىبابىتىدە ئەڭ كۆپ قوللىنىدىغان دورا تۈرى بولۇپ ئاساسىي تەسىر قىلغۇچى دورا ئىسمى بىلەن ئاتىلىدىغان قوبۇق ھالەتتىكى مۇرەككەپ بىرىكمە دورا تۈرىدىن ئىبارەت. مەسىلەن، مەجۇنى كومۇنى (زىرە) ① دورىلار ھەققىدە تەپسىلى مەلۇمات دورىگەرلىككە ئائىد ئەسەرلەردە يېزىلغان. بۇ باپتا دورا تۈرلىرى ئۈستىدىلا سۆزلىنىدۇ.

مەجۇلى)دە ئاساسىي تەسىر قىلغۇچى دورا زىرە، مەجۇنى پودىنە (پىننە مەجۇنى)دە ئاساسىي تەسىر قىلغۇچى دورىسى پىننە بولىدۇ.

مەجۇناتلارنى تەييارلاش: مەجۇناتلارنى تەييارلاشتا تەركىۋىدىكى دورىلار ئومۇمەن توۋەندىكىچە بىر قانچە باسقۇچتىن ئۆتۈشى كېرەك.

(1) سوقۇش - ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈش: ئادەتتە مەجۇننىڭ تەركىۋىدىكى دورىلارنىڭ ھەممىسى سوقۇلىدۇ. ۋە ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. ئەمما ئالدى بىلەن قاتتىق لىرىنى سوقۇش ئاندىن كېيىن ئاسانراق يۇمشايدىغانلىرىنى سوقۇش كېرەك. ھەر خىل دورىنى ئالاھىدە سو-قۇش ياخشىراق. مېھىز دورىلار ئايرىم يانجىلىپ قىيامغا ئېلەشتۈرۈلىدۇ. مەستىكىگە ئوخشاش يىلىم دورىلار بولسا ئايرىم - ئايرىم سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ئاخىرىدا ئومۇمى تالقانغا بىرلەشتۈرىلىدۇ. تاش (مەدەن) جىنىسلىق دورىلار مەخسۇس ئۇسۇللار بويىچە كويدۇرۇلىدۇ ۋە كۈشتە ① قىلىنىدۇ. مەسىلەن ياقۇت، ھېقىق زۇمرەت، قاش تېشى، سىماپ، سەنگىيا قاتارلىقلار ۋە دېڭىز ئاستى مەھسۇلاتلىرىدىن مەرۋايىت، سەدەپ، مار-جانلار كۈشتە قىلىنىدۇ ياكى كويدۇرۇلىدۇ.

(2) يەنجىش (سالايە): ئىپار، ئەنپەر، كۈشتە، ياكى كويدۇرۇلگەن دورىلارنىڭ ھەممىسىنى ئايرىم - ئايرىم

① قوشۇمچە كۈشتە قىلىش "ئۇسۇللىرىغا قاراڭ.

دىن توزاغدەك (قولغا يۇقۇپ يىرىكلىك سىزلىكىڭىزدەك
ھالدا) يانچىلىدۇ. بۇ سالاھىيە دەپ ئاتىلىدۇ.

(3) يۇغۇرۇش: مەجۇناتلار ئاساسەن موھسىز (تازە
لانغان) ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇلىدۇ. ئەھۋالغا قاراپ
قەن ياكى شېكەر قىيامى ۋە ھەسەل بىلەن يۇغۇرسىمۇ
بولىدۇ. (مەسلەن ئىتىرىپىللەرنى) ھەسەلنىڭ مىقدارى
ياز كۈنلىرى تەييارلانغان مەجۇناتلار ئومۇمى دورا
مىقدارى (سوقۇپ تالقانلانغان ھالىدىكى ئېغىرلىقى)دىن
2 ھەسسە، قىش كۈنلىرى بولسا 3 ھەسسە ئارتۇق بو-
لىشى كېرەك. ئالدى بىلەن ھەسەل بىۋاسىتە ئوتتا قوي-
ماستىن بەلكى قايناپ تۇرغان سۇ ئۈستىگە ھەسەلنى
قاچا بىلەن قويۇپ ئېرىتىلىدۇ. ئەگەر شېكەر قىيامى قو-
شۇشقا توغرا كەلسە ھەسەل ئۈستىگە قىزىق قىيامىنى
قۇيسلا بولىدۇ. ھەسەلنى بىۋاسىتە ئوت ئۈستىگە قوي-
غاندا ھەسەلنىڭ شىپالىق تەسىرى بۇزۇلۇپ كېتىدۇ.
ھەسەل سوۋۇپ ئىلىمان بولغاندا، ئەگەر شۇ مەجۇن
تەركىبىدە زەپەر، ئىپار، ئەنەبەر بولسا ئالدى بىلەن
ئۇلارنى سېلىپ، ياخشى ئارىلاشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن
باشقا دورىلار قوشۇلىدۇ. سىرلانغان كوزا ياكى چىنە
قاچىلاردا يېرىمراق ئېلىپ ساقلىنىدۇ (چۈنكى مەجۇنات-
لار تەييارلاپ بولغاندىن كېيىن خېمىرغا ئوخشاش كو-
پۇپ كېتىدۇ). مەدەن جىنىسلىق ۋە تاش جىنىسلىق
دورىلار سېلىنغان مەجۇناتلار 6 - 3 ئايدىن كېيىن ئىس-

تىمال قىلىنىدۇ. باشقا خىل مەجۇنلەر، بولۇپمۇ مېغىز دورىلار كوپرەك سېلىنغان مەجۇناتلارنى 3-6 ئاي ئىچىدىلا ئىشلىتىپ بولۇش كېرەك. مەجۇن ئادەتتە بىر كىشىنى بىر قارار داۋالاشقا يېتەرلىك مىقداردىلا تەييارلىنىدۇ. لېكىن داۋالاش ئورۇنلىرى چوڭ بولسا مەلۇم نىسبەت بويىچە كوپلەپ تەييارلاش مۇمكىن.

(2) ھەپ — كۇملاچ دورىلار: تېز تەسىرلىك ھەپلەر ماش چوڭلۇغىدا، ئادەتتىكىلىرى پۇرچاق چوڭلۇغىدا ياسىلىشى كېرەك. ياساس چېغىدا نۇسخىدا كورسەتىلگەن دورىلارنى سوقۇپ تالقانلاپ ئەلگەكتىن ئوتكۈزۈپ، سۇ بىلەن قاتتىقراق يۇغۇرۇپ گۈل يېغى ياكى كۈنجۈت يېغى بىلەن قولنى مايلاپ تۇرۇپ يومۇلاقلاپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ. ھەپلەر نۇسخىدا ئادەتتە تاق ساندا (1-3-5-7) يېزىلىدۇ.

(3) قۇرس (تابىت دورىلار): چوڭراق تۈگمە شەكىللىك دورا ياسالغىنى بولۇپ، تەييارلاش ئۇسۇلى ھەپ بىلەن ئوخشاش. يىلىم دورىلار ئېرىتمىسى بىلەن يۇغۇرۇپ تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.

(4) تالقان (سۇيۇپ): يۇمشاق سوقۇلغان تالقان دورا. نۇسخىدىكى تەركىبىگە قاراپ ئومۇمى دورا ئېغىرلىغىغا نىسبەتەن 2 ھەسسە مىقداردا قەن ياكى ناۋات قوشۇلىدۇ.

(5) شەرۋەت: قەن بىلەن قىيام قىلىنغان سۇيۇق

دورا. تەركىۋىدىكى دورىلارنىڭ تاتقىنى ئەرەق تارتىش چىلاش ۋە قاينىتىش قاتارلىق ئۇسۇللار بىلەن چىقىرىپ 5-7 باراۋەر قەن ياكى ناۋات قوشۇپ قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ. دورىلار تەركىۋىگە ۋە قىيامنىڭ قويۇق-سۇيۇقلۇقىغا قاراپ قايناقۇ بىلەن تەڭشەپ (3 ھەسسە قايناقۇ قوشۇپ) ئىچىشكە بېرىلىدۇ. قۇرۇق قاچىلاردا ئاغزى مەھكەم ساقلانمىسا بۇزۇلىدۇ. ئەگەر پاختىلاشقان لىشى مەلۇم بولسا بىر ئاز قەن قوشۇپ قايتا قاينىتىل سا بولىدۇ. شەرۋەت سۇزۇك تەييارلىنىشى ئۈچۈن 1 دانە تۇخۇم ئېقى قوشۇلىدۇ. دەسلەپ يۈزىگە ئورلەپ چىققان كۆپىكى سۇزۇپ تاشلىنىدۇ.

6) قايناتما (مەتبۇخ): قاينىتىپ تەمى چىقىرىلغان دورا تۇرى. قايناتىملار تەركىۋىدىكى يىلتىز دورىلار چالا سوقۇلىدۇ. ئۇرۇق ۋە مېغىز دورىلار يۇمشاق سوقۇلىدۇ. مەۋە تۇرىدىكىلىرى (ئەينۇلا، قارا ئورۇك، ئەنجۈر قاتار-لىقلار) بىر قانچىغا پارچىلاپ تاشلانس بولىدۇ. دورىلار پۈتۈن ئېغىرلىغىنىڭ 5-7 باراۋىرىدە قايناقۇغا 6-8 سائەت چىلاپ (ئۇستى يېپىق ھالدا) قاينىتىپ $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ قىسمى قالغاندا ماتا بىلەن سۇزۇپ سىقىپ تەييارلىنىدۇ. ئادەتتە قايناتىملار بىر قېتىملىق ياكى بىر كۈنلۈك تەييارلىنىدۇ.

7) چىلانما (نۇقۇ): قايناقۇغا چىلاپ تەمى چى-

قىزىلغان دورا تۇرى. قاينىتىشقا بولمايدىغان ياكى سوغاق دورىلارنى مەسىلەن، خىيارشەمبەر، تەمىرى ھىندى قاتار-لىقلارنى يېتەرلىك مىقداردا (دورا چوڭىدەك قايناقسۇغا چىلاپ ئۈستىنى يېپىپ) 4 سائەتتىن كېيىن، پاكىزە قوشۇق بىلەن مېچىپ تەمىنى تولۇق چىقىرىپ مائا ئارقىلىق سۇزۇپ تەييارلىنىدۇ. ئادەتتە بىر قېتىملىق مىقداردا تەييارلىنىدۇ.

(8) ئەرەق: پار سۈيى شەكلىدە تەييارلانغان دورا تۇرى. بۇلارنىڭ ئوزۇنى يالغۇز ھالدا ياكى باشقا دورا تۈرلىرى بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ. يۈرەك، مىڭە ۋە جىگەرگە تەسىر قىلغۇچى ۋە پۇراقلىق دورىلار ئۇسۇخلاردا كورسىتىلگەن مىقداردىكى سۇ بىلەن پار قازانغا سېلىنىپ، بەلگىلىك مىقداردا چىقىرىلىدۇ. بەزى كىتاپلاردا ئەرەقنى گۈلاپ دىگەن ئاتالغۇ بىلەنمۇ ئاتىلىدۇ. ئەمما بىزنىڭ بۇ كىتاپىمىزدىكى گۈلاپ دىگەن ئاتالغۇ قىزىل گۈلنىڭ ئەرەقىدىن ئىبارەتتۇر.

ئەرەقلەرنى تەييارلاشتا ئەرەق تارتىلىدىغان دورىنىڭ گۈللەش، چىچەكلەش پەسلى ئەڭ ياخشى ۋاقىت ھېسابلىنىدۇ. مەسىلەن، بىدەمىشكى ئەرەقى، كاسىن ئەرەقى، قىزىل گۈل ئەرەقى ياز ۋە كۈز پەسلىلىرىدە تەييارلاپ ساقلىنىدۇ. يېڭى، ياش، غولى بولمىغاندا قۇرۇق گۈللىرىنى 6-8 سائەت قايناقسۇغا چىلاپ قويۇپ ئەرەق تارتىلىپ سىمۇ بولىدۇ.

(9) مۇراببا ۋە گۈلچەنلەر: قەن قىيامى بىلەن تەييارلانغان دورا تۇرى: مۇراببالار دورىلارنىڭ ئوردا ھالدا پىشقان ياكى ياخشى پىشقان پەسىللىرىدە تەييارلىنىدۇ. قۇرۇق دورىلاردىن تەييارلانغان مۇراببانىڭ داۋالىق ئۇنىۋىتەتسىيە بولمىدۇ. ساقلاش ۋاقتى ئۇزۇنراق بولىدىغان مۇراببالار (ھىلىلە مۇرابباسى، زەنجىۋىل مۇرابباسى) نىڭ قىيامىنى ناھايىتى ئۇستۇن ئېلىپ قاتۇرۇلىدۇ. ئۇزۇن ساقلىمايدىغانلىرىنىڭ قىيامى ھەسەلدە قىلىنىدۇ. مەسىلەن، ئەينۇلا، ئەنجۇر ۋە مۇراببالار، مۇراببالار قۇرۇق قاچىلارغا ئېلىپ سوغاق جايدا ساقلىنىدۇ. ئالغاندا قۇرۇق قوشۇقلار بىلەن ئېلىنىدۇ، ئۇنداق قىلىنغاندا ئاساسلا بۇزۇلۇپ كېتىدۇ. ئەگەر كۆكرەپ قېلىش ۋە غەيرى پۇراق ۋە تەم پەيدا قىلسا بىر ئاز قەن بىلەن قايتا قىيام قىلىنىدۇ.

گۈلچەنلەرمۇ دورا گۈل چىچەكلىرى ئېچىلغاندا تەييارلىنىدۇ. گۈل ياپراقلىرىنى تازىلاپ، ئاق قىسمىنى كېسىپ تاشلاپ يانچىپ 4 سەر يانچىلغان گۈلگە 1 جىڭ شېكەر ھىساپلاپ قىيام قىلىپ ياكى شۇنداقلا سوقۇلغان قەن ياكى شېكەرنى ئېلەشتۈرۈپ تەييارلىنىدۇ. سىرلانغان ساپال كوزا ياكى چىنە كوزىلارغا ئېلىپ تۇمۇز ئاپتۇندا ئەڭ ئاز بولغاندا 2 ئاي مىقدارى قويۇپ پىشۇرىلىدۇ. قىزىلكۈل گۈلچىنى ھەسەل بىلەنمۇ تەييارلىنىدۇ. بۇ ھەسەل گۈلچەن دەپ ئاتىلىدۇ. باش

قا گۈلقلەنلەر (پىتنە، بىنەپشە ۋە ئانار گۈلى گۈلقلەنلىرى) قەن بىلەنلا قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ. شېكەرنى قىيام قىلماي ئارىلاشتۇرۇپ ياسىغان گۈلقلەنلەر ئاپتايى گۈلقلەن دەپ ئاتىلىپ، داۋالاش ئۇنۇمى جەھەتتىن قىيام قىلىپ تەييارلىغان (ئاتەشى گۈلقلەن) لەردىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. گۈلقلەن تەييارلاشتا تۆۋەندىكى بىرقانچە نۇقتىلارغا دىققەت قىلىنىسا دورا ئاسانلا بۇزۇلۇپ كېتىدۇ ۋە داۋالاش ئۇنۇمىگە تەسىر يېتىدۇ. گۈلقلەن تۇرىدىكى دورىلار تىبابەتتە كۆپ قوللىنىلىدىغان ھەم داۋا ھەم غىزالىق تەسىرگە ئىگە دورا تۈرلىرىدىن ئىبارەتتۇر:

(1) قىزىلگۈلنىڭ غوزىسىغا تىگىپ تۇرغان سېرىق قىسمى قىرقىپ تاشلىنىشى ھەم گۈل ئۇتتۇرىسىدىكى ئۇ-رۇغىدەك سېرىق نەرسىلەر قوشۇلۇپ قالماسلىقى كېرەك. (2) ئانار گۈلىنى تەرگەندە قول بىلەن ئالماستىن، ياغاچ تىمكەنلەرگە سانجىپ يىغىۋېلىش كېرەك (يەرگە تۈكۈلگەنلىرىنى).

(3) گۈلقلەنلەر ئاپتاپتا تۇرغاندا بىرىنچى قېتىم بىر ھەپتىدىن كېيىن، كېيىنچە 2 - 3 كۈندە بىر قېتىم ياغاچ قوشۇق بىلەن ئاستىن - ئۈستۈن ئارىلاشتۇرۇپ تۇرۇش لازىم. ئەمما تومۇر نەرسىلەر بىلەن قوچۇشقا بولمايدۇ (سىرلانغان مەدەن تاياقچە بولسا بولىدۇ) گۈل - قەننى بۇزۇپ قويدۇ، ساقلىغاندىمۇ تومۇر قاچىلارغا ئالماسلىق لازىم.

(4) تەييار بولغان گۈلقلەنلەر ئۆز رەڭگىدە بولسا

بۇ تەلەپكە لايىق تەييار بولغانلىقىدۇر. مەسىلەن قىزىلگۈل گۈللىرىنى سۈزۈك قىزىل رەڭدە، بىنەپشە گۈللىرىنى مائىسا رەڭدە بولىدۇ.

10) دەملەنمە (كاشكاپ): ئاز مىقداردىكى بىر قېم-تىملىق دورىنى چەينەككە نەرسىلەردە دەملەپ بىر ئاز قەن، شېكەر بىلەن تەم كىرگۈزۈپ بېرىلىدىغان دورا تۇرى. يۇقۇرقلاردىن باشقا، يەنە ئۇيغۇر تىبابىتىدە ھەرخىل مەدەنلەر مەخسۇس ئۇسۇللار بىلەن كۈشتە قىلىنىپ دو-رىغا ئىشلىتىلىدۇ (قوشۇمچە كۈشتىلەر ماۋزۇسىغا قاراڭ). ھايۋانلار (ئىشت، كالا ۋە ئىشەك) نىڭ ئوت خالىتى ئۆچەي ۋە مەئىدى قاتارلىقلارنىڭ ئىچكى ئەزالىرىدا پەيدا بولىدىغان ئاشقا ئوخشاش بىرخىل ماددا يەنى فادزەھەر ھايۋانلىرىنى تېز قۇتقۇزىدىغان ۋە زەھەر قايتۇرىدىغان دورا سۈپىتىدە قوللىنىدۇ.

2. باشقا داۋالاش ئۇسۇللىرى

تىبابەتتە ماددىنى پىشۇرۇش، ھەيدەپ چىقىرىش ۋە ئېغىزدىن دورا بېرىشتىن باشقا يەنە تۈۋەندىكى بىر-قانچە چارىلەر بار. بۇلارنى كۆرسىتىپ ئوتتۇرىغا تەد-بىرلەر بىلەن توشۇپ ياكى مۇستەقىل قوللىنىش مۇمكىن.

1) پۇراتقۇچى دورىلار (شەمۇم) — ئۆتكۈر پۇراق چىقىرىپ تۇرىدىغان دورا تۈرلىرىنى پۇرۇتۇش بىلەن تەسىر كۆرسىتىش، ئۇسۇلى بولۇپ، سۇيۇقلۇق دورا تۈر-لىرىنى پۇرۇتۇشنى "لەخلەخە"، قۇرۇق (تالكاندەك سۇقۇل

خان دورىلارنى بۇرۇن ئىچىگە تارتقۇزۇپ مىڭىدە غىدىق
لىنىش — چۈشكۈرۈش پەيدا قىلىش ئۇسۇلى “سۇئۇت”
دەپ ئېيتىلىدۇ.

(2) نۇپۇخ: يۇمشاق سوقۇلغان دورىلارنى بوشلۇق
ئەزالارغا (بۇرۇن، تاماق، ئېغىزلارغا) پۈركۈش ئۇسۇلى
بولۇپ، چىش تۈۋىگە دورا بېسىشنى “سۇنۇن”، جاراھەت
(يارا) ئۈستىگە دورا بېسىشنى “زورۇر” دەپ ئاتايدۇ.
(3) ئىنكباب: دورىلارنىڭ قاينىتىپ چىقىرىلغان

ھورغا پۈتۈن بەدەننى ياكى بىرەر ئەزانى (مەسىلەن،
قۇلاقنى) ئوراپ تۇرۇپ تۇتۇش ئارقىلىق ھورلاندۇرۇپ
تەرلىتىش ئۇسۇلى.

(4) كىماد: ئىسسىق ئۆتكۈزۈش (قۇرۇق ئىسسىق
ئۆتكۈزۈش).

(5) تەمرىخ: نەم دورا تۇرلىرىنى بەدەنگە قويۇپ
تەسىر كۆرسىتىش. ياغلارنى سۈركەپ تەسىر كۆرسىتىش
بولسا “تەرھىن” دەپ ئاتىلىدۇ.

(6) پىلتە: قۇرۇق تالقان، مەلھەم، ياغ ياكى سۇ-
يۇق دورىلارنى پىلتىدەك بىر نەرسىگە يۇقتۇرۇپ بوشلۇق
ئەزالار (بۇرۇن، قۇلاق، سوڭ، سۆيىدۈك يولى) جاراھەتنىڭ
ئېچىلىپ قالغان توشۇگىگە سېلىش.

(7) ھومۇل: چوڭراق ھەجىمدىكى پىلتە ياكى لاتى-
دەك نەرسىلەرنى نەم دورىلارغا مېلاپ بالىياتقۇ ئاغزىغا،
چوڭ يارا ئىچىگە تىقىپ قويۇش (ئاياللار جىنىسى يولى-
غا قويىلىدىغىنى — فەرزىجە دىيىلىدۇ).

(8) مەلەم: قويۇق ھالدىكى ماي دورا شەكلى.
سۇيۇق ياغدەك بولغىنى رەۋغەن دىيىلىدۇ.

(9) زىماد: ھەرخىل مۇرەككەپ دورا تۇرلىرىنى
بەدەنگە بىر مەزگىل قويۇپ تەسىر كۆرسىتىش.

(10) تىلا: قاتتىق دورا تۇرلىرىنى (مەسىلەن بوزۇغا،
جويۇز، موزا قاتارلىقلارنى) سۇيۇق دورا ياكى سۇ بىلەن
تاشقا سۇرۇپ ئەزاغا (بەدەنگە) چېپىش بىلەن تەسىر
كۆرسىتىش.

(11) پاشۇيە: مۇرەككەپ دورىلارنىڭ تەمىنى چى-
قىرىپ ئىلغان ھالدا تېزدىن ئاستىنقى قىسمىنى چايقاش
(تېزدىن توۋەنگە قاراپ قويۇش). بۇنىڭدا كۆپىنچە بەك
قىزىتمىلىق تەپلەردە ھارارەتنى پەسەيتىش ۋە باش ئاغ-
رىنى توختىتىش تەدبىرى سۇپىتىدە قوللىنىدۇ. بۇ ئۇ-
سۇلنى قوللانغاندا كېسەلنىڭ ئالدىغا پەردە تارتىپ قو-
يۇش، باشنى ئۇستۇنرەك قويۇپ ئىشلەش كېرەك. بۇنىڭ
داق قىلىنغاندا باش بىردىنلا قېيىپ كۆڭلى ئاينىشلار
پەيدا بولىشى مۇمكىن.

(12) ئابزەن: تەمى چىقىرىلغان دورا سۇيىدە
بەلدىن ئاستىنقى قىسمىنى چىلاپ ئولتۇرغۇزۇش.

(13) بوخۇر: دورىلارنى كۆيدۈرۈپ ئىسنى بۇرۇن
غا ماڭدۇرۇش ياكى مەلۇم بىر ئەزانى ئىسلاش (بۇۋاسىر
كېسىلىدە بۇۋاسىر ئوسۇكچىسىگە ئىس بىلەن تەسىر كۆر-
سەتلىنىدۇ).

14) مىڭنىڭ زەربىگە ئۇچرىشى (ئۇرۇلۇش، يىقىلىش) سەۋەپلىك كېسەل ھۇشسىزلانغاندا ياكى تۇتقاق كېسەل ۋە ئېغىر كوئۇل ئېلىشىش كېسەللىكلىرىدە قۇلاق ئارقىسى، گەجگە ۋە بۇرۇن تۈكلىرىنى يۇلۇش (موچىنىلاش) بىلەن كېسەلنى ھۇشىغا كەلتۈرىلىدۇ.

3. دورا بىلەن زەھەرلىنىش ۋە ئۇنىڭغا قارشى چارىلار

كورگەنلا دورىنى ئېغىزغا سېلىپ كورمەسلىك، گۇمانلىق دويلارنى ئىستىمال قىلماسلىق لازىم. زەھەرلىك نەرسىلەر (مەيلى تاماق ياكى دورا بولمىسۇن) كوي دۇرۇش، ئېچىشتۇرۇش ۋە باشنى ئايلاندۇرۇش قاتارلىق بەلگىلىرىنى بېرىدۇ (زەھەرلىنىش ۋە ئۇنىڭغا قارشى چارىلار ماۋزۇسىغا قارالسۇن). زەھەرلىك دورىلارنىڭ ئۈزۈلگە خاس ئالامەتلىرىمۇ بولىدۇ. زەھەرلەنگۈچى ئېغىر ھالدا قۇسۇپ ياتسا ۋە ئاغزىدىن پۇراق چىقىپ تۇرسا دەرھال تەدبىر قوللىنىش كېرەك. ئۇيغۇر تىبابىتىدە كوپ ئىشلىتىدىغان دورىلار ئىچىدە توۋەندىكىلىرى زەھەرلىك دورىلاردۇر.

فەرىپيۇن، ئەپيۇن، زەڭگەر، ئاق پارپى، بېلىق ئوتى، كىلە ئوتى، قاپلان ئوتى، ئاق-قارا خەربەق، زەرنىخ ۋە باشقىلار.

چارە: زەھەرلەنگەنلىكى ئېنىقلانغاندىن كېيىن دەرھال قەي قىلدۇرۇلىدۇ.

قەي قىلدۇرۇش ئۇسۇلى: توخۇ يېنىنى گالە تەقىپ ئۈزلىگىدىن قەي قىلدۇرۇش ياكى كۈنجۈت يېغى بىلەن كۆپ مىقداردا ئىلمان سۇنى ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇش لازىم. ئەگەر كۈنجۈت يېغى ئورنىدا زەيتۇن يېغى بولسا ناھايىتى ياخشى. ئەنجۈر ئۇرۇغىنى كالا يېغى بىلەن قاينىتىپ ئىچىرىلسە دەرھال قۇسىدۇ. ئەگەر زەھەرلىك ماددا قەي بىلەن چىقىپ كەتمەسە تەرىياك ۋە مەسرو دىتوسىدەك زەھەر قايتۇرغۇچى دورىلارنى بېرىش لازىم. زەھەرلەنگۈچىگە كۆپلەپ سۇت بېرىش كېرەك، ياكى كالا سۈتى مەسكە مېيى بېرىسمۇ بولىدۇ. تىنچ ياتقۇزۇپ كىيىملىرىگە خۇشپۇراق نەرسىلەرنى چېچىش ۋە مىڭنى تازىلاش ئۈچۈن چۈشكۈرتكۈچى دورىلارنى پۇرۇتۇش لازىم. ئايلىنىپ كېنىدىغان ئەھۋاللار كۆرۈلسە قول-پۇتلىرىنى ئۆگىلاش بىلەن ئالامەتلىرىگە قاراپ چارە قىلىش كېرەك.

4 - پەسىل: بوۋاقلارنى داۋالاش

يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلار كېسەللىكنىڭ سەۋەپلىرى ئۇلارنىڭ تەن ئالاھىدىلىكلىرىگە ئاساسەن ئومۇمەن سەپ-را، بەلغىم ۋە سەۋدانىڭ پازلىرىدىن ئىبارەت بولىدۇ. بوۋاقلار ئاغرىپ قالغاندا كۆرۈلىدىغان بەلگىلەر تۆۋەندىكى بىر قانچە تۈردىن يىراقلاشايدۇ.

(1) گەجگە (بويۇن) قىسمى قاتىىدۇ، چىرايى سارغىيىپ ۋاقىراپ يىغلايدۇ.

چارىسى: ئانىسى يەللىك نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىشى لازىم. سەبەب، قۇندۇزقەرى، زىرىلەرنى قوشۇپ يۇمشاق سوقۇپ ئانا سۈتىدە ئېزىپ ئىچكۈزۈش كېرەك.

(2) ئايلىنىپ كېتىپ كۆز قارىچۇقلىرى ئارقىغا تارتىلىپ كېتىپ، ھۇشسىزلىنىدۇ.

چارىسى: مارجانى بىر ئاز قىزىتىپ ئىككى قاش ئوتتۇرىسىغا يېقىش بىلەن بالا ھۇشقا كېلىدۇ. ئاندىن كېيىن كېسەلگە قاراپ چارە قىلىش لازىم.

(3) چۈچۈيدۇ. بۇ مىڭدە ياللۇغلىنىش يۈز بەرگەنلىك نەتىجىسى بولۇپ، مەسائىلە، زەپەر ۋە قەنتلەرنى قوشۇپ كوندۇرۇپ چىققان ئىسنى بۇرۇنغا تۇتۇش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ.

(4) بالىنىڭ چىرايى سارغىيىپ ئۇسسۇزلۇق كۆپ بولسا، ھول قاپاقنىڭ پوستى، پەتەنگان ئۇرۇغى، سېمىز ئوت كۆكنى سوقۇپ باشقا چېپىش لازىم. ياكى يۇمىلاق سۈتنىڭ سۈيىنى گۈل يېغىغا قوشۇپ پىشانىسىغا چېپىش كېرەك.

بالىنىڭ كۆزى ئاغرىپ قالسا ياڭاق ۋە زىرنى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ بىر ئاز نەم قىلىپ قىز بالا ئىسۋاتقان ئايالنىڭ سۈتى بىلەن يۇغۇرۇپ پاختىغا سۈۋاپ كۆز ئۈستىگە قويۇش لازىم.

بوۋاقلارنىڭ قۇلىغى ئاغرىپ قالسا دائىم قۇلىغىنى ياستۇققا سۈركەيدۇ، تولا يىغلايدۇ، مۇنداق ۋاقىتلاردا

ھەسەل بىلەن بادام يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ پىلتە ياپىدۇ.
قۇلاق ئىچىگە تىقىپ قويۇش لازىم.
بالىلارنىڭ چىشى چىقىش ۋاقىتلىرىدا ئېغىز ئىچىنى
بادام يېغى، توخۇ يېغى، ئىلىكلەر بىلەن ياغلاپ تۇ-
رۇش لازىم.

5 - پەسىل: كېسەللەر تامىغى

كېسەللەرگە بېرىلىدىغان غىزا ئاغرىق ئۇچۇن ئوزۇق
بولۇشتىن تاشقىرى مەلۇم داۋالىق (شېالىق) ئۇنۇمىگە
ئىگە بولۇشى، كېسەللىك سەۋەپچىسى بولغان ماددىنى
كۆپەيتىدىغان ياكى قوزغىتىدىغان بولماسلىقى كېرەك
(بۇ ھەقتە مۇناسىۋەتلىك كېسەللەر بابىدا ئايرىم توختى-
لىمىز). تۆۋەندە تىبابەتتە كۆپرەك قوللىنىدىغان تاماق
تۈرلىرىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز:

(1) قىيما شورپا:

كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ياش مال گۆشىنى
ئۇششاق توغراپ سۇ ۋە تەم كىرگۈزۈش ئۇچۇن تۇز
سېلىپ ئوبدان پىشۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. كۆكتاتلاردىن
يېتەرلىك مىقداردا پالەك قوشۇلسىمۇ بولىدۇ. سەپرا
ئارتۇق بولغان چاغلاردا ۋە قىزىتمىلىق چاغلاردا شورپا
بېرىشكە بولمايدۇ. شورپا بەدىنى ئاجىز كىشىلەرگە ۋە
ماغدۇرسىزلىقتىن بولغان كېسەللەر ئۇچۇن ياخشى.

(2) ئارپا سۈيى (مائۇششېئىر)
قىزىتمىلىق كېسەللەر ئۈچۈن ئۇزۇق بولىدىغان
ۋە شىپالىق ئۇنۇمى بار تاماقدۇر.

تەييارلاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن ئارپىنى شاكىلىدىن
ئايرىش (مۇقەششەر قىلىش) كېرەك، يەنى يېتەرلىك سۇ
بىلەن بىر ئاز قايناتسا ئارپا شاكىلىدىن ئاجرايدۇ. بۇ
خىل ئارپىنىڭ ئېغىرلىقى بىلەن 4 باراۋەر سۇ قۇيۇپ كوچا
ئاش پىشۇرغاندەك پىشۇرۇپ سۈزۈپ سۈيى بېرىلىدۇ.
ئەگەر كېسەلدە ئىچ سۇرۇش ھادىسىسى بولسا ئالدى
بىلەن ئاقلاغان ئارپىنى تومۇر قازاندا بىر ئاز قورۇۋې-
تىپ پىشۇرۇش لازىم.

كېسەلدە يۈتەل، زۇكام ياكى قۇرۇقلۇق ئالامەتلى-
رى بولسا، ئارپىغا چىلان، سەرپىستان قوشۇپ قاينىتى-
لىدۇ. سۈزۈپ بىر ئاز شېكەر سېلىپ بېرىلىدۇ. ئارپا
سۈيى بىلەن ئىسكەنجىيىن قوشۇپ بەرمەسلىك لازىم.
چۈنكى سىركە بىلەن ئارپا بىرلەشسە مەيدىنىڭ ھەزىم
قىلىش قۇۋۋىتىنى بۇزۇپ قويدۇ. قىزىتمىلىق كېسەللىكلەردىن
كېيىن ئارپا سۈيىگە گۆش سېلىپ پىشۇرۇپ بى-
رىلە كېسەلنىڭ ئاسان ماغدۇرغا كېلىشىگە ياردەم بېرىدۇ.
ئەمما قىزىتمىلىق ھاللاردا گۆش بېرىشكە بولمايدۇ.

(3) ھەرسە: كىچىك قۇشلارنىڭ مەسلەن، قوشقاچ،
تۇرۇلغا قاتارلىقلارنىڭ گۆشىنى پۇرچاق قوشۇپ سۇدا
پىشۇرۇپ سۈيىگە سىركە، يۇمىلاقسۇت قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.

تاماق. ھەر قانداق كېسەللەرگە مۇۋاپىق ئىشلىتىش ھېسابلىنىدۇ.

(4) زىرباج: قىيما شورپىغا ئۇزۇم، ئۇرۇك، چىلان، ئەينۇلا قاتارلىق قۇرۇق مېۋىلەر ۋە شاپتۇل قېقى قو- شۇپ (بىر ئاز زەپەر ۋە يېتەرلىك مىقداردا زىرە قو- شۇش لازىم) قاينىتىپ سىركە قۇيۇپ سۈيىنى ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

(5) گوش سۈيى (مائۇللەھىمى) ئېغىر كېسەللەر ئۈچۈن ئەڭ مۇۋاپىق ئوزۇق بولۇپ پۈتۈنلەي بەدەنگە سىڭىپ كېتىشى مۇمكىن. تەييارلاش ئۇسۇلى "توپكە سىلى" ۋە "جۈدەتكۈچى قىزىتما" بايانىدا تەپسىلى سۆزلىنىدۇ.

XIV ماقالا. ساقلىقنى ساقلاش ۋە كې- سەلنىڭ ئالدىنى ئېلىش

بەدەن سالامەتلىكىنى ساقلاش ۋە كېسەلدىن ساقلىنىش چارە تەدبىرلىرى زورۇر سەۋەپلەر دىگەن ماقالا-
لىدا تەپسىلى سۆزلەنگەن. توۋەندە بۇنىڭ يەنە ئايرىم-
قىسىملىرى سۆزلىنىدۇ.

1 - پەسىل: جىسمانى ھەركەت

ھەركەت — جىسمانى ۋە روھى (نەفسانى) بولىدۇ. جىسمانى ھەركەت ئادەم سالامەتلىكى، جۈملىدىن كېسەلدىن ساقلىنىش ئۈچۈن ناھايىتى مۇھىم. چۈنكى جىسمانى ھەركەت جۈملىدىن ئەمگەك بەدەنگە ئىسسىقلىق بېرىدۇ، نەپەسنى تېزلەشتۈرىدۇ. بۇنىڭ بىلەن تەبىئى ئىسسىقلىقنى قوزغايدۇ. بەدەندىكى ئوزۇقلۇقلارنى تەنگە تارقىتىپ، يىغىلغان كېرەكسىز ماددىلارنى نەپەس، تەر ئارقىلىق بەدەن سىرتىغا ھەيدەيدۇ. ئۇندىن باشقا مۇۋاپىق بولغان جىسمانى ھەركەت گۆش، پەي ۋە بوغۇملارنى چېگىتىپ بەدەننىڭ تاشقى سەۋەپلەر (تەسىراتلار) بىلەن

كېسەللىنىشنى توسىدۇ. ئەگەر جىسمانى ھەركەت تېزلاپ
بەلغەتتە (ھەددىدىن ئارتۇق بولۇپ كەتكەندە) ياكى پەقەت
ھەركەت قىلمىغاندا ئەكسىچە بەدەن ئاجىزلىشىپ ھەرخىل
كېسەللىكلەر بىلەن ئاسانلا ئاغرىپ قالىدۇ.

2 - پەسىل: روھى ھەركەت

بۇ روھى پائالىيەتتىن ئىبارەت بولۇپ، ساقلىقنى
ساقلاش جەھەتتە ئوزۇقلىنىش ۋە جىسمانى ھەركەتتىنمۇ
يۇقۇرى تۇرىدۇ. مەسىلەن.

(1) خوشلۇق: خوشلۇق يۈرەك ھەركىتىنى تېزلەش-
تۇرۇپ تۇرۇشلاردىكى قاننى ھەركەتلەندۈرۈپ، ئوزۇقلۇق
نىڭ بەدەنگە ياخشى سىڭىشىنى كۈچلەندۈرۈپ، كىشىلەر-
نىڭ رەڭگى-روپىنى قىزىل ۋە بەدەننى ساغلام قىلىدۇ.
ئەكسىچە خاپىچىلىق سالامەتلىككە، جۈملىدىن ئوزۇقلۇقنىڭ
سىڭىشىگە ناچار تەسىر كۆرسىتىدۇ. خوشلۇقنىڭ ئوزۇق-
تىندالدا بولغىنى ياخشى. ھەددىدىن ئارتۇق خوشلۇق
يۈرەك ھەركىتىنى بىردىنلا توختىتىپ قويۇش بىلەن
ئۆلۈمگە ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن.

(2) غەزەپلىنىش: غەزەپ سەپرا خىلىتىنى قوزغايدۇ.
تەبىئىي قۇۋۋەتنى قالايمىقانلاشتۇرۇپ بەدەننى ئاجىزلى-
تىدۇ. قورقۇنچ بىلەن تەبىئىي كۈچ بەدەننىڭ سىرتقى
قاتلىمىدىن ئىچىگە يۆتكىلىپ، يۈرەك ئاجىزلىشىپ كې-
سەلگە قارشى كۈچ تۈۋەنلەيدۇ.

3- پەسل: ھامىلدار ئاياللار ۋە قېرى كىشىلەرنىڭ ساقلىقنى ساقلاش تەدبىرلىرى

ھامىلدار ئاياللار قان ئالدۇرۇش، ھىجامەت قوي دۇرۇش، سۈرگە دورىسى ئېچىش، قەي قىلدۇرغۇچى دورىلارنى ئىچىشتىن ساقلىنىش لازىم. تىۋىپ ھامىلدار ئايالغا دورا بېرىشتە كۆپ ئېھتىيات قىلىشى كېرەك. ئېغىر نەرسە كۈتەرمەسلىك، قاتتىق ۋاقىراش، خاپا بولۇشلار-دىن ساقلىنىشى، ئارىلاپ ئىسكەنجىيىن، گۈلقەن، ھەسەل ئىستىمال قىلىپ تۇرۇشى كېرەك.

قېرى كىشىلەرنىڭ مىزاجى ئادەتتە قۇرۇق سوغاق بولىدۇ. شۇڭا بۇلارغا كۆرىلىدىغان تەدبىرلەردە ئۇنىڭغا دىققەت قىلىش (ھول ئىسسىقلىق قىلىش) لازىم. ھول ئىسسىق مايىلار بىلەن باغلىنىپ تۇرۇش، مونچىغا چۈشۈپ تۇرۇش كېرەك. تاماقلارمۇ ھول ئىسسىق بولۇپ، ئاز-ئازدىن كۈنىگە بىر قانچە قېتىم بېرىلىشى لازىم. ئەمما بەك ئىسسىقلىق قىلماسلىق لازىم. ھەزىم قىلىنىشى ناچار، سەۋدا ماددىسىنى تۇغدۇرىدىغان غىزالاردىن پەرھىز قىلىش ۋە يېتەرلىك دەم ئېلىش كېرەك. توپا-چاڭ بەك ئىسسىق ۋە سوغاق ھاۋادىن ساقلىنىش لازىم. ھەسەل بىلەن تەييارلانغان گۈلقەن يەپ تۇرۇش، قېرىلاردا ھەرخىل كېسەللەرگە قارشى قۇۋۋەتنى ئاشۇرىدۇ.

ئىككىنچى قىسىم كېسەللىكلەر ۋە ئۇلارنى داۋالاش

I ماقالا. باش ۋە مېڭە كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: باش ئاغرىقى (سەدائى)

ئاددى باش ئاغرىقى (سەدائى ساددە)

ئاددى باش ئاغرىقى مېڭىنىڭ ئوز جىسمىدىكى كېسەللىك بولماي بەلكى ھارارەتلىك كېسەللەر مەسلەن، كېزىكلەر، قىزىل، چېچەك، نۇقرىس (كىچىك بۇغۇملار ئاغرىقى) ۋە بورەكتىكى زەرەلىنىشلەرنىڭ باشلىنىشىدا باش ئاغرىيدۇ. ياكى شاراپ (ھاراق)، كاۋاپلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىشتىن ۋە كۆپ جىنسى ئالاقىدىنمۇ باش ئاغرىقى كېلىپ چىقىدۇ. قاتتىق غەزەپلىنىش چاڭ - توزاڭلىق جايلاردا ۋە گۇڭگۇرت كانلىرىدا ئىشلەشمۇ باش ئاغرىغىغا سەۋەپچى بولىدۇ.

داۋاسى: سەۋەپلىرىنى يوقىتىش بىلەن ئالامەتلىرىگە قاراپ تەدبىر قوللىنىش لازىم.

ئەسەبى (نېرۋىلىك) باش ئاغرىغى (سەدائى ئەسەبى)
 سەۋەبى: ئەسەپلەرنىڭ مىزاجى سۇۋۇپ كەتكەنلىك
 تىن، شۇنىڭدەك بەدەننىڭ ئومۇمى مىزاجىمۇ سوغاقلق
 تەرىپىدە بولغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. بەزىدە بىردىنلا
 كۆپ مىقداردا مۇزدەك سوغاقسۇ ئىچىش، سوغاقسۇغا چۆ-
 شۇش ياكى سوغاق ھاۋادا باش ئوچۇق قېلىش بۇ خىل
 باش ئاغرىقىغا سەۋەبچى بولىدۇ. ئاتشەك (سېغىلىس)
 كېسلى قاننى بۇزۇش بىلەن ئەسەپلەرگە تەسىر يېتىپ
 ئەسەبى باش ئاغرىقىغا دۇچار قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: باش ئاغرىغى قاش ۋە پىشانە
 تېرىسىنى ھەركەتلىنىدۇرگەندە كۈچىيىدۇ. باشنىڭ تېرە
 ۋە چاچلىرىنى باسقاندىمۇ ئاغرىق سېزىلىدۇ. پىشانىنى
 تۇتۇپ كورگەندە ئىسسىق سېزىلىدۇ.

داۋاسى: 1 قارا چاي ياكى ئاق چاي 1
 مىسقال، قوزاق داچىن 1 مىسقال، ئوستۇخوددۇس 1
 مىسقال لاچىن دانە 1 مىسقال، قەھۋە (كافى) 3
 مىسقال، ئۇلارنى سۇقۇپ قاينىتىپ ناۋات سېلىپ ئى-
 چىشكە بېرىلىدۇ. ھىلىلە مۇراپىياسىدىن 2 دانىنى گازىۋان
 ئەرەقىسىدىن 4 مىسقال بىلەن بېرىلىدۇ. يېنىشكە
 ئىتتىرىپىل كەبىرى (1-نۇسخە) نى ئەرەقى گازىۋان بىلەن
 بىللە يېنىشكە بېرىلىدۇ.

2 خەمىرى گازىۋان (2 3 - نۇسخە) دىن 3 مىسقال
 نى ئەرەقى گازىۋان بىلەن بېرىلىدۇ.

3) ئاق سەندەلنى گولاپتا تاشقا سۈرۈپ پىشاشقا
ئىسقا چاپىدۇ. ئەگەر ئىسسىقتىن بولسا، پىشانىسىگە
سەرگە چاپىدۇ (قىزىتمىسى بولۇپ يۈز-كۆزلىرى قىزار-
غان بولسا).

قاندىن بولغان باش ئاغرىغى (سەدائى دەمەۋى)

سەۋەبى: باشنىڭ كوكتۇمۇرلىرىدىكى قاننىڭ كۆپ-
يېشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. مۇنداق باش ئاغرىغى سەدائى
دەمەۋى ۋەرىد دىيىلىدۇ. شۇنىڭدەك باشنىڭ قىزىلتومۇر-
لىرىدىكى قاننىڭ كۆپىيىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇنداق
باش ئاغرىغى سەدائى دەمەۋى شىريانى دىيىلىدۇ.
يەنە يۈرەكتىكى قان مىقدارىنىڭ زىيادە بولۇشى
تۈپەيلىدىن قاننىڭ يۇقۇرقىدەك قانتومۇرلاردا تولۇپ
كېتىشى بىلەن قاندا خىلىتلارنىڭ مىقدارى ئېشىپ، مىڭ
ساھەسىگە توپىلىشىپ مىڭنى سىقىپ قويۇش بىلەن باش
ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ. ئاياللاردا ھېيىزنىڭ ۋاقتىدىن
بۇرۇن توختاپ قېلىشى، راھەتپەرەسلىك ۋە قۇۋۋەتلىك
تامىقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىپ ھەركەت، ئەمگەك قىل-
ماسلىق بىلەن قاندىن بولغان باش ئاغرىغى كېلىپ
چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: باش ئىسسىق، ئېغىر بولىدۇ. پىشانە-
قىسمىنى تۇتۇپ كۆرگەندە قىزىق سېزىلىدۇ. يۈزى ۋە
كۆزىنىڭ ئىچىمۇ قىزارغان بولىدۇ. تومۇر تېز ۋە كېچى-

ككەن، سۇيدۇك قىزىل قان رەڭگىدە كېلىدۇ. تېغىز ئىچى تاتلىق، ئاۋازى پۈتكەن بولۇپ، تەشئالىق ئانچە كۆپ بولمايدۇ.

داۋاسى: (1) شەرۋەت بىنەپشە (2 - نۇسخە) كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 10 مىسقالدىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. (2) توۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلار بىلەن پاشۇيە قىلىنىدۇ:

نۇسخە: بۇغداي كىپىگى، ئارپا ئۇنى، 9 مىسقال دىن، تۇز 1 سەر 10 جىڭ سۇ بىلەن قاينىتىپ، يىل مان ھالەتكە كەلگەندە تاكى كېسەلنىڭ كوڭلى ئاينىپ خاھقا قەدەر پۇتىنىڭ تىز ئاستى قىسمى يۇيىلىدۇ. (3) ئىترىپىل كەبىرى (1 - نۇسخە) 3 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(4) تامىغىغا چۈجە شورپىسى بېرىلىدۇ. سەپرادىن بولغان باش ئاغرىغى (سەدائى سەپراۋى) سەۋىيى: (1) جىگەرنىڭ ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتى ناچارلىغىدىن كەيمۇسنىڭ ھاسىل بولۇشى غەيرى تەبىئى بولۇپ، مەيدە ئىچىدە غەيرى تەبىئى سەپرا توپىلىشىپ قالىدۇ. بۇ باشنىڭ قاتتىق ئاغرىشىنى كەلتۈرىدۇ. (2) جىگەرنىڭ ئوز ئاغرىقلىرىدا ئومۇمى ھەزىم قىلىش خىزمىتى ناچارلىشىپ باش ئاغرىغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئالامەتلىرى: رەڭگى ۋە كوز ئىچى سېرىق، تەش-ئاللىق كۆپ بولۇپ، بېشى تۇتقاقلىق ئاغرىيدۇ. سوغاق

نەرسىلەرنى ئىستىمال قىلغاندا ياكى سوغاق خىتاۋغا چىققاندا ئاغرىق پەسىيىپ قالىدۇ. قىي قىلىا ئاچچىق سېرىق سەپرا قۇسىدۇ. ئىچى سۇرسىمۇ سەپرا بىللە كېلىدۇ. بۇ خىل سەپراللىق خىلىتلارنىڭ سېرىقا چىقىشى بىلەن باش ئاغرىشى ساقىيىپ قالىدۇ.

داۋالاش: (1) باشنىڭ ھارارىتىنى تۈۋەنلەشتۈر-كۈچى تۈۋەندىكى تەدبىرلەرنىڭ بىرى قوللىنىلىدۇ:

(1) سوغاق سۇ قويىلىدۇ. قاپاق، خاڭىكالارنىڭ ھۆل تىرىپلىرى باشقا قويىلىدۇ. (2) ئاق سەندەلنى گو-لاپتا تاشقا سۇرۇپ پىشانە ۋە باشقا سۇركىلىدۇ. (3) كاپورنى گولاپتا ئېرىتىپ باشقا سۇركەيدۇ. (4) يۇم-ھاقۇتنى سوقۇپ نەم ھالىتىدە باشقا چېپىلىدۇ. (5) ئۇزۇم سىركىسى بىلەن باش نەملىنىدۇ. (6) قاپاق مېغىزنىڭ يېغىنى پىشانىغا سۇركەيدۇ.

(2) ئۇسۇلۇقىغا لىمۇن شەرىۋىتى، ئەينۇلا شەرىۋىتى ياكى ئازار شەرىۋىتىدىن بىرى بېرىلىدۇ.

(3) مەئدە زەئىپ بولسا جەۋارىش ئامىلە (3) - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(4) تۈۋەندىكى نۇسخىدىكى پاشۇيە قىلىنىدۇ.

نۇسخە: گۈل بىنەپشە، نىلۇفەر، ھەمشۇا گۈلى 3 مىسقالدىن، تۇز 3 مىسقال، بۇغداي كىپىكى، قاپاي پوستى 15 مىسقالدىن يىتىرلىك مىقداردا سۇ بىلەن قاينىتىپ داسقا قۇيۇپ قىزىق - پۇتلارنى چىلاپ يۇيىدۇ.

(5) مۇنۇ نۇسخىدىكى كاشكاپ چاي ئورنىدا دەم-
لەپ بېرىلىدۇ.

نۇسخە: گۈل بىنەپشە، نىلۇفەر، ئۇسۇك ئۇرۇغى،
يۇمىلاقسۇت ئۇرۇغى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، ئەينۇلا
5 دانە، چىلان 7 دانە، كاسىن ئۇرۇغى 2 مىسقال.

باشنىك يېرىمى ئاغرىش (شەقىقە)

سەۋىيى: (1) ئاياللاردا ۋاقتىدىن بۇرۇن ھېيىزنىڭ
توختاپ قېلىشى، (2) مىڭگە قۇرۇقلۇق يېتىپ قېلىش،
(3) بورەكنىڭ سۇسلىشىپ قېلىشى، (4) مەئىدىنىڭ ھەزىم
قېلىشى بۇزۇلۇپ، بۇخاراتلارنىڭ مىڭ تەرەپكە كۆتۈرۈل-
مىشى، (5) جىنىسى ئالاقىنىڭ كۆپ بولمىشى.

ئالامەتلىرى: باشنىڭ يېرىمى ئاغرىيدۇ. ئاغرىش
كۈن چىقىش بىلەن باشلىنىپ، كۈن ئولتۇرۇشى بىلەن
توختايدۇ. كۈنگە قارىسا ئاغرىق كۈچىيىدۇ. قۇۋۋەت
ئاجىزلاشقان تەرەپ باش ۋە ماڭلاي قىسمى قاتتىق
ئاغرىپ، بەزىدە تۇتقاقلىق خۇسۇسىيەتلىك بولىدۇ.
ئاغرىق تەرەپ قىزىل تومۇرى (شرىيان) قاتتىق
ئۇرۇپ تۇرغانلىقى بىلىنىدۇ. شۇ تەرەپ بىلەك شىريان
تومۇرى باغلاپ قىيۇلسا ئاغرىق دەرھال توختايدۇ.
داۋاسى: (1) قاتتىق ئاغرىشنى توختىتىش ئۈچۈن

سەمغى ئەرەبىدىن 1 مىسقال، ئەپيۇندىن $\frac{1}{2}$ مىسقال،

زەپەردىن $1\frac{1}{2}$ پۇك، خۇنسىياۋشانىدىن 1 مىسقال

ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ (ئەپيۇننى ئېرتىپ) 2 دانە
تۇخۇمنىڭ ئېقىغا ئارىلاشتۇرۇپ قەغەز ئۈستىگە بىر ئار
سۇۋاپ ئاغرىق تەرەپ قۇلاق ئارقىسىغا ياكى دولقۇنلاپ
تۇرغان تومۇر ئۈستىگە چاپلاپ قويۇلسا ئاغرىقنى دەر-
ھال توختىتىدۇ. (2) سەپرادىن بولغان باش ئاغرىقىدا
يېزىلغان نۇسخە بويىچە پاشۇيە قىلىنىدۇ. (3) ماددا
پىشۇرۇش ئۈچۈن توۋەندىكى پىشۇرغۇچى دورا بېرىلىدۇ.
گۈل، بىنەپشە، گازىۋان، ئىشت ئۈزۈمى، سېرىق يۈگەي
ئۇرۇغى (زىغىر ئارىلاش بولغىنى ياخشى). شاتەرە،
ئەپسەنتىن ھەربىرى $1\frac{1}{2}$ مىقالدىن، ئەينۇلا،
چىلان ھەربىرى 9 دانىدىن، تەمرى ھىندى 6
مىقال، تۇرپۇت 2 مىقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: چوڭ سېرىق يۈگەي ئۇرۇغىدىن
باشقىلىرىنى چالا سوقۇپ 2 جىڭ سۇ بىلەن قاينىتىپ
سۈزۈۋېلىپ كۈنگە 2 قېتىم 3 ئاش قوشۇغى ئىچىدۇ.
(4) مىڭىنى تازىلاش ئۈچۈن — ھەبى سەبىرە (4) -
نۇسخە) ياكى ئىتتىپىل سەغىر (5 - نۇسخە) دىن 3 - 5
مىقالدىن بېرىلىدۇ.

باش قېيىش (دەۋۋار)

سەۋىيى: (1) بەدەن قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىز بولۇشى;
(2) قاننىڭ غەيرى تەبىئى ئۆزگىرىشلىرى: (3) ناچار

ھەزىم بولىدىغان تاماقلارنى كۆپ يېيىش؛ (4) تاماكنى كۆپ چېكىش؛ (5) يېقىلىش، ئۇرۇلۇش نەتىجىسىدە ئەسەلەرنىڭ زەخىلىنىشى؛ (6) يۈرەك ۋە جىگەر كېسەللىكلىرى؛ (7) جىنى ئالاقىنىڭ كۆپ بولۇشى قاتارلىق سەۋەپلەر بىلەن مىڭە قانتومۇرلىرىدا قاتتىق خىلىتلەر توختاپ قالىدۇ. بۇنىڭ بىلەن مىڭە بارىدىغان ھاياتلىق قۇۋۋىتى (روھى نەفىسى) نىڭ ئوتۇش يوللىرى (قانتومۇرلار) دا توسىلىش كېلىپ چىقىدۇ. شۇنداق ئەھۋال ئاستىدا ئاپتاپقا قاقلىنىش ياكى ئىسسىق جايغا كىرىش بىلەنلا قاتتىق خىلىتلەر ئېرىپ مىڭدە جىددى ئەھۋال كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. نەتىجىدە باش قاينىدۇ.

ئالامەتلىرى: تۇيۇقسىزلا باش قاينىدۇ، كۆز قاراڭغۇلىشىدۇ، دەلدەڭلەپ كېتىدۇ ياكى يېقىلىپ چۈشىدۇ. باش ئېغىر بولۇپ، قۇلاققا بوران چىقىدۇ. قاندىك ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ، بەزىلەر ھۇشسىزلىنىپ قالىدۇ. بۇ كېسەل تەدرىجى تۇتقاق كېسەلگە سەۋەبچى بولىدۇ. باشنىڭ ئېغىر بولۇشى، مىڭدە قويۇق ماددىلارنىڭ كۆپلىگىنى، باشنىڭ يېنىك بولۇشى سۇيۇق ماددىلارنىڭ كۆپلىگىنى بىلدۈرىدۇ.

داۋاسى: (1) مىڭدە قاننىڭ كۆپلىگى سېزىلسە قاننى سۈرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. خىلىتلارنى سۈرۈش ئۈچۈن توۋەندىكى ھوققە قىلىنىدۇ.

بىستاپايەج، بىنەپشە، شەھى ھەنزىل بىر ھەس-

سەندىن، سانا، قەنتەرىيۇن، سېرىق چېچەك، پىرساۋشان،
بادىرەنجىبويى، گازىۋان، زاراڭزا ۋە ئۇرۇقسىز ئۈزۈم،
فۇنۇس 2 ھەسسىدىن، سېرىق ياغ مۇۋاپىق مىقداردا.

تەييارلاش ئۇسۇلى: يۇقۇرقى دورىلارنى 3 چىنە
سۇدا قاينىتىپ يېرىمى قالغاندا سۇزۇپ ئۈستىگە سېرىق
ياغنى سېلىپ 3 كۈنگىچە ھەر قېتىمدا بىر جىڭدىن
جەمى 3 قېتىم ھوقنە قىلىنىدۇ، (2) بەلغەم ماددىسىنى
تازىلاش مەقسىدىدە توۋەندىكى دورىلار بېرىلىدۇ،
ئۇرۇغىدىن ئايرىلغان ئۈزۈم 15 مىسقال، شاتەرە 5
مىسقال، چىلان 10 دانە، رۇم بېدىيان، مەستىكى 1
مىسقالدىن، تۇربۇت 3 مىسقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: يۇقۇرقىلارنى چالاراق سوقۇپ،
2 چىنە سۇ بىلەن قاينىتىپ، تەمى چىققاندىن كېيىن
سۇزۇپ ھەركۈنى 5 سەر مىقدارىدا ئىچىشكە بېرىلىدۇ.
سەپرا بىلەن بەلغەم بىرىككەن بولسا بۇنىڭغا 30 دانە
قارا ئۇرۇك، 5 مىسقال تەمىرى ھىندى قوشۇلىدۇ.

(3) ئىتىرىپىل كەشنىز (6 - نۇسخە) ياكى ئىتىرىپىل
سەغىر (5 - نۇسخە) دىن 3 مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم
بېرىلىدۇ.

(4) بەلغەم ماددىسى غالىپ بولۇپ، رەڭگى ئاق
ئۈزى ئىزىلەڭگۈ بولسا، ھەبىي ئايارەج (7 - نۇسخە)دىن
3 مىسقالدىن بېرىلىدۇ ۋە مىڭنى كۈچلەندۈرۈش

ئۇچۇن بۇرۇنغا ئىپار. ئەنئەنە پۇرۇتۇش بىلەن
 مەجۇنى مۇپەررىھى ياقۇتى (9 - نۇسخە) دىن
 $\frac{1}{2}$ مىسقال، ئالما مۇرايىياسىدىن 5 مىسقال، ئامىلە
 مۇرايىياسىدىن بىردانە ئېلىپ كۆمۈش ۋە مەرق بىلەن بېرىلىدۇ.
 (5) ئەگەر مەئدە ئاجىز بولسا، جەۋارش جالىنۇس
 (3 - نۇسخە) دىن $\frac{1}{2}$ مىسقال، نۇش دارى ئەلۋى
 (8 - نۇسخە) دىن $\frac{1}{2}$ مىسقال بېرىلىدۇ.

زۇكام ۋە نەزلە

زۇكام كېسەلى خەلق ئىچىدە مەشھۇر بىر كېسەل
 بولۇپ بۇرۇندىن سۇ ئېقىش بىلەن ئوتىدۇ. مىگە ئال-
 دىنقى بوشلۇغىدا توپلاشقان سۇيۇقلۇق (رۇتۇبەت) بۇرۇن-
 دىن ئېقىپ چىقسا زۇكام، سۇيۇقلۇق كالدىن ئىچكى
 ئەزالارغا چۈشسە نەزلە دىيىلىدۇ. بۇ سۇيۇقلۇق ئۆپكە
 يولىغا چۈشكەندە ئۆپكە ياللۇغى (زاتلىرىيە)، كۆكرەك
 پەردە ياللۇغى (زاتلىجەنە) ھاسىل قىلىدۇ. مەئدە يول-
 لىرىغا چۈشكەندە مەئدە ۋە ئۈچەيلەردە ياللۇغلىنىش،
 ھەتتا يارا ھاسىل قىلىدۇ. ئىچ سۇرۇش كەلتۈرۈپ چى-
 قىرىدۇ. ھەتتا بوغۇم ئاغرىقلىرىنىمۇ كەلتۈرىدۇ. شۇنىڭ
 ئۈچۈن زۇكام تىبابەتتە كېسەللىكلەر ئانىسى (ئۇمۇمىي)
 ئەمراز دىيىلىدۇ. ئەتىياز، باھار ۋە قىش پەسىللىرىدە
 ھاۋا كۆپ ئۆزگىرىپ تۇرىدىغان ۋاقىتلاردا ئۇچرايدۇ.

زۇكامنىڭ سەۋەپلىرى كۆپ ۋە مۇرەككەپ بولۇپ، ئومۇمەن مىڭە بوشلۇقىدا سۇيۇقلۇقلارنى بىر تەرەپ قىلىشنىڭ ناچارلىشىشى بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. زۇكام ھا- سىل بولۇش سەۋەپلىرىگە قاراپ ماددى سەۋىيى بولمى- خان (سازەج) ياكى ماددى سەۋىيى بولغان زۇكام دەپ 2 خىلغا بۆلىنىدۇ. توۋەندە بۇلار تەپسىلى سۆزلىنىدۇ.

1. سازەج زۇكامنىڭ سەۋىيى: بۇ ئىسسىقلىق بولغان، سوغاقلىق بولغان ياكى مىڭە ۋە ھەزىم قىلىش- نىڭ ناچارلىغىدىن بولغان دەپ 3 تۈرگە ئايرىلىدۇ.

1. ئىسسىقلىق بولغان زۇكام:

سەۋىيى: مىڭدە ھارارەت يۇقۇرى بولۇپ مە- ئىدىكى سۇيۇقلۇقنى بۇرۇن يولى بىلەن سىرتقا قوغلايدۇ. ئالامەتلىرى: بۇرۇندىن ئاققان سۇ ئىسسىق ۋە سۇيۇق بولىدۇ. بۇرۇن ۋە كۆز ئېچىشىدۇ، كۆز ئىچى قىزىل، ئۇسۇزلۇق زىيادە. ھارارەت ئۈستۈن بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن قىپال تېمۇرىدىن بېرىم سەر مىقداردا قان ئېلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن سۈرگە دو- رىلار بېرىلىدۇ. ئىلمان سۇغا چۈشۈرىلىدۇ. بۇرۇندىن كەلگەن سۈنى توختىتىش ئۈچۈن كاپۇرنى كويىدۇرۇپ بۇرۇنغا پۇرتىش كېرەك.

نۇسخە: گۈل بىنەپشە 5 مىسقال، ئاق لەيلى، ھەمشىۋا، گازىۋان 2 مىسقالدىن، چىلان 7 دانە، بېيە

ئۇرۇغى، ئەرەپ يىلمى ھەربىرى 1 مىسقالدىن، بۇلارنى
كاشكاپ قىلىپ دەملەپ بېرىلىدۇ.

2. سوغاقتىن بولغان زۇكام:

سەۋىبى: مىڭگە سوغاق ئوتۇش ئاساسى سەۋەپ
بولىدۇ. مەسىلەن، سوغاق سۇ بىلەن باش يۇيۇش،
ئىسسىق ئويىدىن سوغاق ھاۋاغا يالاڭپاش چىقىش ۋە
باشقىلار.

ئالامەتلىرى: باش ۋە بەدەن ئېغىر، بۇرۇندىن
كەلگەن سۇ ئاق ياكى كۆك بولىدۇ. ئاغرىق كىشى
قىزىيدۇ، يوتىلىدۇ.

داۋاسى: سەندەل، قۇستە، سىيادانلارنى باراۋەر
مىقداردا سىركىگە چىلاپ نەم قىلىپ كويدۇرۇپ بۇرۇنغا
پۇرۇتۇلىدۇ. ياكى سىياداننى قورۇپ بۇرۇنغا تۇتىدۇ.
2. ماددى ياكى مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان زۇكام:

سەۋىبى: 4 خىللىت بەدەندە ئۆزگەرگەن سەۋەپتىن
بۇس ھاسىل بولۇپ، مىڭگە ئورلەپ زۇكام ۋە نەزلە
پەيدا قىلىدۇ. ئۇ سەپرادىن، قاندىن، بەلغەمدىن ۋە
سەۋادىن بولغان نەزلە دەپ تۈرتكە بولىدۇ.

(ئا) سەپرادىن بولغان نەزلە: سەپرا خىللىتى ئار-
تۇق بولۇش تۈپەيلىدىن بولىدىغان زۇكام بولۇپ،
ئالامەتلىرى باش ئاغرىش، باش، كۆزلەر چىڭقىلىش،
كۆزدىن ياش ئېقىش، گالدا ئاچچىق سىزىلىشلەردىن

ئىبارەت. تەشەنلىق كۆپ، بۇرۇندىن ئاققان سۇ سېرىق بولۇپ، خۇددى ئوتتا كويگەندەك بۇرۇننى ئېچىشتۇرىدۇ.

داۋاسى: سەپرانى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن — بىنەپشە 5 مىسقال ئاق لەيلى 2 مىسقال، ئەينۇلا 7 دانە، پۈنۈس، تەمرى ھىندى ھەربىرى 15 مىسقالدىن، ئىت ئۇزۇمى 3 مىسقال، چىلان 11 دانە، تەرەنجىۋىل بىر سەر ئېلىپ كاشكاپ ئۇسۇلى بىلەن دەملەپ بىر كۈندە ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن — بىنەپشە، بابونە، ئاق لەيلى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، ئۇسۇك ئۇرۇ — غىدىدىن $2\frac{1}{2}$ مىسقال ئېلىپ قاينىتىپ بىر ئاز سوۋۇتۇپ

باشنى يۇيۇدۇ.

(ب) قاندىن بولغان نەزلە، قاننىڭ ئارتۇقلىقىدىن بولىدىغان زۇكام بولۇپ، ئۇنىڭ ئالامىتى: كۆز ئىچى ۋە يۈزى قىزارغان، باش ئېغىر بولۇپ، كۆپ ئۇخلايدۇ. گال ۋە قۇلاق قىچىشىدۇ، كېسەلنىڭ ئۆزىگە ئاغزى تاتلىق تېشىدۇ، سېسىق بۇرايدۇ، بۇرۇندىن كەلگەن سۇ قىزىلگۈل رەڭگىدە ئىسسىق كېلىدۇ.

داۋاسى: ئىسۋال قىپال تومۇرىدىن 5 مىسقال مىقدارى قان ئېلىش بىلەن قاننى پەسەيتكۈچى چارلار قىلىنىدۇ. بۇنىڭغا ئارپا سۈيى ئىچكۈزۈش، چىلان شەرى — ۋىتى بېرىشلەر كىرىدۇ. سۈنبۇل، سۇندۇرۇس پۇرتىلىدۇ. باشقا چارلار ئىسسىق زۇكام بىلەن ئوخشاش.

(س) بەلگەمدىن بولغان نەزلە: بۇ خىلدىكى زۇكام باشقىلارغا قارىغاندا ياخشىراق. چۈنكى بەلگەم خىلمىتى ئوزى يۇمشاق بولۇپ، مىڭنىڭ مىزاجى بىلەن ئوخشاشراق كېلىدۇ، خەتىرى ئاز.

ئالامەتلىرى: بېشى ئېغىر ۋە سېزىمى توۋەن بولىدۇ. ئېغىزدىن سۇ ئاقىدۇ، بۇرۇندىن كەلگەن سۇ قويۇق، ئېغىزى تەمىز بولىدۇ. ئاۋازى غاراڭ-غۇرۇڭ چىقىدۇ.

داۋاسى: زۇپا، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 3 مىسقال، ئەنجۈر قېقى 3 دانە، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم 11 دانە. بۇلارنى بىر چەينەككە سېلىپ چايدەك دەملەپ ئۈستىگە بىر سەر تەرەنجمۇل سېلىپ بىرلا ئىچىدۇ. تامىغىغا بادام مېغىزى ئارىلاشتۇرۇلغان بۇغداي كېڭىسىدە ياسالغان بۇلماق (ھەرسە) نى بىر ئاز ھەسەل قوشۇپ بېرىلىدۇ.

بۇرۇن يوللىرى توسىلىپ ماددىنى پۇشۇرۇش كېرەك بولسا سېرىق چىچەك، بابۇنە، بادىرەنخېنبۇيا، سۈتتەر، قۇشقاچ تىرىغى (ئەككىل مىلىك) لەرنىڭ ھەر-بىرىدىن 2 مىسقالدىن ئېلىپ يېتەرلىك مىقداردىكى سۇدا قاينىتىپ ئىلمان ھالەتتە باشقا قويىلىدۇ. يوتەل بولسا شەرۋىتى زۇفا (10 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(2) سەۋدادىن بولغان نەزلە: سەۋدانىڭ كۆپ بولىشىدىن بولىدىغان زۇكام ئاز ئۇچرايدۇ. ئاقىۋىتى ناچار، ساقىيىشى ئۇزۇن.

ئالامەتلىرى: كۆزى قۇرۇق بولىدۇ، ئاغرىق كىشى كۆزىدە ئېغىرلىق ھىس قىلىدۇ. پۈتۈن بەدىنى ئېغىر، بېشى سوغاق، ئېغىز ئىچى تېتىقسىز بولۇپ، ئىس پۇرايدۇ.

داۋاسى: بىنەپشە، ئاق لەيلى، ئۇسۇك ۋە قا- پاقنىڭ ياپراقلىرىنى قاينىتىپ باشنىڭ ئالدى قىسمىغا قويۇش بىلەن ئالامەتلىرىگە قاراپ ئىلاج قىلىش مۇۋاپىق كىچىك بېرىش لازىم.

زۇكامنىڭ ماددىسى ئىسسىق ۋە سۇيۇق بولغاندا- لىقتىن بەدەننىڭ ھەرقانداق يېرىگە چۈشكەندە ئەگەر شۇ ئورۇننىڭ قارشىلىق كۈچى ئاجىز بولسا، شۇ ئورۇندا كېسەل پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا يۇقۇملۇق كېسەللىك- لەرنىڭ كۆپىنچىسى. زۇكام - نەزلەنىڭ ئاقىمۇتى بولۇپ كېلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن زۇكامغا سەل قارىماسلىق ۋە بەدەننى چېنىقتۇرۇش، جۈملىدىن مىڭ ۋە يۈرەكنى قۇۋ- ۋەتلەندۈرۈش تەدبىرلىرىنى ئېلىپ بېرىش لازىم.

2 - پەسل: مىڭە كېسەللىكلىرى.

ھۆشىز ئۇيىقا (سۇبات)

بۇ كېسەلدە ئاغرىق ھېچنەرسە سەزمەستىن قاتتىق ئۇخلايدۇ. خۇددى ئولۇكتەك ھالەتتە بولۇپ، ئۇيغىتىش ناھايىتى قىيىن.

سەۋەبى: مىزاننىڭ قاتتىق سوغاق بولۇشى، مە-
ئىدە سۇيۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كېتىشى ياكى تاشقى زەرە،
ئۇرۇلۇش قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: سەۋەبلىرىگە قاراپ ھەرخىل بولىدۇ.
(1) مىزاننىڭ سوغاق بولۇشى — سوغاقلق نەرسە-
لەرنى كۆپ ئىستىمال قىلىش ياكى سوغاقلق تەرەپتىكى
ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلارنى كۆپرەك بېرىش بىلەن
كېلىپ چىقىپ، چىرايى كۆكۈش، تومۇرى قاتتىق ۋە
پەرقلىق سالىدۇ. باش قىسمىنى سوغاقتىن قاچۇرىدۇ.

داۋاسى: مىزاننى ئۈزگەرتىش ئۈچۈن خۇشپۇ-
راقلىق دورىلاردىن جۈملىدىن قۇندۇز قەرى، ئاقىر قەر-
ھانى، پۇرىتىلىدۇ يىيشكە داۋا ئۆلمىشكى بېرىلىدۇ.
مىكېيان توخۇ گۆشى داۋاپ قىلىپ بېرىلىدۇ.

(2) مىڭدىكى سۇيۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كېتىشى —
باشنىڭ ئالدى قىسمى ناھايىتى ئېغىرلىشىدۇ، كۆز ئالە-
سىمۇ ئېغىر تۇيۇلىدۇ، بەزىدە بۇرۇندىن سۇ ئاقىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن مىڭنى تازىلاش لازىم.
بۇنىڭ ئۈچۈن ھەببى ئوستوخۇددۇس ياكى ھەببى
ئىستەمىقۇن (11-نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن
12-نۇسخىدىكى دورا ھوقنە قىلىنىدۇ.

(3) تاشقى زەرە ياكى ئۇرۇلۇش نەتىجىسىدە مە-
ئىدە زەرەر يەتسىمۇ بۇخىل ھۇشسىز ئۇيىقا كېلىپ
پەيدا بولىدۇ (ئالامەتلىرىگە قاراپ داۋالىنىدۇ).

تۇيۇقسىزلىق (سەھىرى)

سەۋىيى: ئۇخلىيالماسلىق كېسلى مىڭدە قۇرۇغلۇق زورراق بولغانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. ئالامەتلىرى: كېچىسى تۇيۇق كەلمەيدۇ. باش ئېغىر، ئېغىز ئىچى ۋە بۇرۇن ئىچى قۇرۇق بولىدۇ. داۋاسى: ئوزۇقلۇق جەھەتتىن ھول تەبىئەتلىك نەرسىلەرنى بېرىش لازىم. مەسىلەن، ئېمىپ تۇرغان ئوغلاقنىڭ باش ۋە پۇت گۆشلىرى، چۈجە گۆشى بېرىش، قاپاق ۋە پالەكنى كۆپ ئىستىمال قىلىش كېرەك. قىز بالا تۇغۇپ ئېمىتىۋاتقان ئايالنىڭ سۈتىگە قاپاق ئۇرۇغى - نىڭ مېغىزىنى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ باشقا چېپىش كېرەك. مىڭگە ھوللۇك يەتكۈزۈش ئۈچۈن مۇنۇ نۇسخە بېرىلىدۇ. نۇسخە: گۈل بىنەپشە، ئىلۋىپەر، ئۇسۇڭنىڭ ھول يوپۇرمىغى (ياكى ئۇرۇغى)، يۇمىلاقسۇت ئۇرۇغى ياكى چۆپى بىر ھەسسىدىن، كۆكنار شاكىلى يېرىم ھەسسىگە ئېلىپ چالا سوقۇپ بىر كېچە قايناقسۇغا چىلاپ قويۇپ ئەتىسى بىرلا قاينىتىپ سۇزۇپ ئىلمان ھالدا باشقا قويۇشقا بۇيرۇلىدۇ.

سەكتە

قىزغىنلىقنىڭ مىڭدىن بەدەنگە تۇيۇقسىز كېلىشى بىلەن بەدەندە سېزىم ۋە ھەرىكەت يوقىلىپ كېسەل كىشى بەخۇتلىنىپ - يېقىلىدۇ. كېسەل ئوڭدىسىغا يېقىلىپ نەپەس ئېلىشى، يۈرەك ھەرىكىتىنى بىلگىلى بولمايدىغان

ھالدا خۇددى ئولۇكتەك يېتىپ قالىدۇ. رەڭگى تاتارغان بولۇپ، ئېغىر بولغاندا ئاغزىدىن كۆپۈك كېلىپ تۇرىدۇ. بۇ ھال سەكتە دىيىلىدۇ. كېسەل كۆپىنچە ئولۇپ كېتىدۇ. جالىنۇس "كېسەلنىڭ مىزاجى سوغا قلىقتىن ئىسسىق-لىققا تەدرىجى ئۆزگىرىشى" دىن كېلىپ چىقىدۇ، دېگەن. زەخىرە خارىزىمى دېگەن كىتاپتا جالىنۇسنىڭ پىكىرىگە قوشۇلىدۇ. ئەمما ئەبۇ ئەلى سىنا بۇ پىكىرگە قوشۇلمايدۇ. ئەبۇ ئەلى سىنا: "بۇ كېسەلنىڭ سەۋىبى مىڭدە قۇرۇغ-لىۋىنىڭ تەدرىجى ھالدا بەيدا بولىشى بىلەن مىڭنىڭ مىراجىدە قۇرۇقلۇق غەلبە قىلىپ نەتىجىدە ئادەمنىڭ ئورە تۇرۇش قابىلىيىتى يوقۇلۇپ "يىقىلىدۇ" دەيدۇ. بەزىلەر بۇ كېسەلنى يۈرەك بوغىمىسى (خەنناق قەلىبى) دەپمۇ ئاتايدۇ. **سەۋىبى:** (1) ئومۇمەن سەكتەنىڭ سەۋىبى مىڭنىڭ ھەممە بوشلۇقلىرىدىكى ئوتۇش يوللىرىدا توسالغۇ بەيدا بولۇشتۇر. بەلغەم، سەۋدا ۋە سەپرا سەۋىبى بىلەن مىڭ بوشلۇقلىرىنىڭ ئوتۇش يوللىرىدا كېلىپ چىققان توسىلىش نەتىجىسىدە روھنىڭ مىڭگە ئوتۇشى توسىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن سەكتە پەيدا بولىدۇ.

(2) بۇقرا: "سەكتە كۈچلۈك بولسا، ئۇنىڭغا دۇچار بولغان كىشى ساقايمايدۇ، كۈچسىز بولسا ئۇنى ساقايتىش ئاسان ئەمەس" دېگەن.

(3) جازاھەتلىنىش تۈپەيلىدىن مىڭ بوشلۇقىغا قويۇلغان ماددا (قان) نىڭ ئۇيۇپ قېلىشى ھىس ۋە

ھەركەت يوللىرىنى توساپ قويىدۇ. بۇنىڭ بىلەن سەكەت ھاسىل بولىدۇ.

داۋاسى: داۋالاشنى ھۇشسىزلىقتا ھەم ھۇشقا كەلگەندىن كېيىن دەپ 2 باسقۇچقا بۆلۈپ ئېلىپ بېرىلىدۇ. (1) ھۇشسىز ھالىتىدىكى داۋالاش تەدبىرلىرى: ئالدى بىلەن ئاغرىقنىڭ چاشلىرى چۈشۈرۈلۈپ تۈۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلار بېشىغا قويۇلىدۇ.

نۇسخە: پەرىمىيون، قۇندۇز قەرى، قارىمۇچ، زەنجىۋىل، سىيادانلار باراۋەر مىقداردا ئېلىنىپ، سوقۇپ ياش ئۈستىگە قويۇلىدۇ.

(2) ھوقنە ئارقىلىق بەدەندىكى ماددىلارنى تارقىتىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن 12 نۇسخىدىكى ھوقنە ئىشلىتىلىدۇ.

(3) ئىپار، سوزاپ، قەلەمپۇرلارنى بىرلىكتە پۇرۇتۇلىدۇ، ياكى پىلىپىل، قۇندۇز قەرى، كوندۇشلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ ئاغرىقنىڭ بىسۈرى ئىچىگە پۇركۇلىدۇ. ھۇشقا كەلگەندىن كېيىن دەرھال قەي قىلدۇرۇش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن توخۇ پىپىگە بىر ئاز ئايارەج پەيقارا سۇرتۇپ ئاغرىقنىڭ گېلىگە سالا كېسەل دەرھال قۇسىدۇ. رۇمىيىدىيان، ئارپايدىيان، گازىۋاندىن 3 مىقالدىن ئېلىپ چايغا ئوخشاش دەملەپ بىر سەر گۈل قەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ (كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇدا بىر قانچە كۈنگىچە): ئىچىش ئۈچۈن

چاي ئورنىغا ئارپا بېدىيان يىلتىزى، رۇمبېدىيان، زىرىدىن
باراۋەر مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ بېرىلىدۇ؛

13 - نۇسخىدىكى ما ئىلتۇسۇل ۋە 25 ھەم 186 -
نۇسخىلاردىكى دورىلار داۋاملىق بېرىلىدۇ.

ھۇشغا تولۇق كەلگىچە ئىچىدىغان دورا بېرىشكە
قەتئى بولمايدۇ. ھوقنە، باش ئۈستىگە دورا قويۇش،
پۇرۇتۇش بىلەن چەكلىنىش كېرەك.

سەكتە تۇتقاندا كېسەل خۇددى ئولۇكتەك ياتىدۇ.
ئېغىر ھاللاردا ئولۇپ كېتىشىمۇ مۇمكىن. سەكتە بولۇپ
ئولگەن ئاغرىقنى ئالدىراپ دەپنە قىلماسلىق لازىم.
ئاغرىقنىڭ راست ئولگەنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن كوز
قارىچۇغىغا قاراش لازىم. ئەگەر كوز قارىچۇغى سۈزۈك
بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدە قارشى تەرەپنىڭ سورىتى ئەكس
ئەتسە تىرىك، ئەكس ئەتمىسە ئولۇك ھىساپلىنىدۇ. ياكى
ئاغرىقنىڭ ئاغزى ئالدىغا ئەينەك تۇتۇپ تۇرۇش لازىم.
ئەينەك ھورلانا نەپەس بارلىغىنى بىلدۈرىدۇ. شۇنداق
بولسىمۇ ئاغرىقنىڭ رەڭگى كۆكۈرۈش ياكى قوساقلىرى
ئېسىلىپ قالغىنىچە دەپنە قىلماسلىق لازىم. چۈنكى گاىي
سەكتە ئاغرىقلار بىر - ئىككى كۈندىن كېيىن ھۇشقا
كېلىپ قېلىشىمۇ مۇمكىن.

سەگە پەردىسىنىڭ ياللۇغى (سەرسام)

مىڭىنى ئوراپ تۇرغۇچى ۋە چاناق سۆڭىكىگە
چاپلىشىپ تۇرغۇچى پەردىلەرنىڭ ياللۇغى (ۋەرەمى)
سەرسام دىيىلىدۇ.

سەۋەبى: قان، بەلغەم، سەۋدا ۋە سەپرانىڭ ئوزگىرىشلىرى سەۋەپ بولىدۇ. قاندىن بولغان سەرسام قارانتۇس، بەلغەمدىن بولغىنى لىسەرغۇس، سەۋدادىن بولغىنى قارانتۇس سەپراۋى، سەۋدادىن بولغىنى قاراندە-تۇس خالىس دىيىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: سەۋەپلىرى ھەرخىل بولىدۇ:

(1) قاندىن بولغان سەرسام-قاتتىق ھارارەت بىلەن باشلىنىپ ئاغرىق جويلۇيدۇ، كوزىدىن ياش ئاقىدۇ. باش ئاغرىيدۇ، سەۋەپسىز كۈلىدۇ، ئەس-ھۇشنى يوقىتىپ ناھايىتى بىئارام بولىدۇ. سۆيىدۈكى قىزىل رەڭدە بولۇپ، نەپەس ئېلىشى تېز ۋە خاقىراپ چىقىدۇ، ھۇشسىزلىقتىن كېتىدۇ. تومۇر يوغان-مۇتەۋاتىر بولىدۇ.

داۋاسى: كېچىكتۈرمەستىن دەرھال قىيالىدىن قان ئېلىش لازىم. باش كېسەللىكلىرىدە سوزلەنگەن پاشۋىيە قىلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن 15-ئۇسخىدىكى مەۋە شەرۋىتى (شەرۋىتى فەۋاكە) بېرىلىدۇ.

(2) سەپرادىن بولغان سەرسامنىڭ ئالامەتلىرى: تەبىئىي سەپرانىڭ ئېتىدالىدىن ئېشىپ كېتىشىدىن بولۇپ، كۆرىلىدىغان ئالامەتلەر: قىزىتما، ئۇيىقىسىزلىق يۇرۇن ۋە ئېغىزنىڭ قۇرۇق بولۇشى، رەڭگى سېرىق، تومۇرنىڭ يېنىك بولۇشى قاتارلىقلاردىن ئىبارەتتۇر. كېسەل جويلۇيدۇ، ئاچچىقى يامان، قوزغىلىشچان بولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: (1) كېرەكلىك مىقداردا ئوقۇت ئېلىپ پىشۇرۇپ تەمى چىقىرىلىدۇ، بۇنىڭغا تەمى ھىندى،

تەينۇلا، قارا ئۇرۇك، سرخش، تەرەنجىۋىللەردىن باراۋەر مىقداردا قوشۇپ تەمىنى چىقىرىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. (2) باش كېسەللىكلىرىدە يېزىلغان چاپىدىغان دورىنىڭ قايسى بىرى بولسۇن بېشىغا چاپسا بولىدۇ. (3) ئۇيىقا كەلمەسە ئوسۇڭ يوپۇرمىغى، كوكنار گۈلى ياكى يوپۇر- مىغى، بابۇنەلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ باشقا قويۇش كېرەك.

(3) سەۋدادىن بولغان سەرسامنىڭ ئالامەتلىرى: — بۇ تۈردىكى سەرسامدا ھارارەت ئاز بولىدۇ ياكى بولماس. لىغى مۇمكىن. جويلۇش ۋە قورقۇنچىسى كۈچلۈك بولۇپ، ئاغرىق كۆپ يىغلايدۇ، ئەندىشە قەندۇ. نەپەس ئېلىشى تېز، تەمۈرى ئىنچىكە، بەزىدە قاتتىق بولۇپ، ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: (1) ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن مۇنۇ لۇسخە بېرىلىدۇ: گازىۋان، بادىرەنجىۋىيا، بىستىپايەج، سەرىستانلارنى چەينەككە دەملەپ تاكى ماددا پىشقىچە چاي ئورنىدا ئىچكۈزۈپ بېرىلىدۇ. تاتلىق ئىسكەنجىبىن بۇيرىلىدۇ. (ئىسكەنجىبىن باراۋەر مىقداردىكى ئۇزۇم سىركىسى بىلەن قەنتنى سۇدا قاينىتىپ تەييارلىنىدۇ).

(2) قاپاق ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى، نىلۇفەر بىنەپشەلەرنى كېرەكلىك مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ قىز بالا ئېمىتىۋاتقان ئايالنىڭ سۈتى بىلەن يۇغۇرۇپ باشقا قويۇلىدۇ.

(3) ھەبىي ئەپتەمۇن (14 - نۇسخە) ھەبىي كۆنى
ئاخامدا بىر مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(4) بەلغەمدىن بولغان سەرسامنىڭ ئالامەتلىرى -
ھارارەت يېنىك، تىلى ئاق رەڭدە بولۇپ كۆپ ئەسەيدۇ.
ئەس - ھۇش، ھەركىتى ھەتتا كۆزنى يۇمۇپ ئېچىشمۇ
ناھايىتى سۇس بولىدۇ. سۆزلەش توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ.
تىلى كەمتۈك بولۇپ، ئۇخلىغاندا خۇددى ئويغاقتەك
كۆزنى ئېچىپ ياتىدۇ.

داۋاسى: (1) ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن - بېدىيان
يىلتىزى، چىڭگەي ئۇرۇغى، رۇمبېدىيان، ئۇزۇم، ئىزخىز،
ئۇستۇخۇددۇس (يۈرەك ئوتى) لاردىن باراۋەر مىقدارىدا
ئېلىپ قايىنىتىپ يېتەرلىك مىقداردا گۈلگەن ياكى ھەسەل
قوشۇپ بېرىلىدۇ.

ماددا پىشىپ بولغاندىن كېيىن مىڭنى تازىلاش
ئۈچۈن ھەبىي ئايارەج (7 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

زاتىل كېسلى، مەئدە ۋە بالىياتقۇ (رەھىم) كېسەل -
لىكىلىرىمۇ سەرسامغا سەۋەبچى بولشى مۇمكىن. سەرسامنى
داۋالاش ئاساسەن ھوللۇك تەرەپتە بولشى لازىم. چۈنكى
قۇرۇغلۇق تارتىشىش (تەشەننۇج) كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
سەرسامغا تەشەننۇجنىڭ قوشۇلۇپ قېلىشى ئۆلۈم بىلەن
ئايانلىشىدۇ.

مىڭنىڭ ياللۇغلىنىشى (ۋە رەمى دىماغ)

سەۋىيى: بۇ مىڭنىڭ ئوز جىسمىنىڭ ياللۇغلىنىشى
بولۇپ قاننى سۈپەت جەھەتتىن ئۆزگەرتىدىغان ئۇقۇنەت -

لەر مىڭىدە ناھايتى يامان ۋەرم ھاسىل قىلدۇ. ۋەرم تومۇرلارنى بېكىتىپ قويۇشى بىلەن مىڭىگە تەبىئى ئى- سىقلىقنىڭ يۇرۇشى توسۇلىدۇ. بۇ مىڭىدە ھاياتلىقنىڭ توختاپ قېلىشىغا سەۋەپ بولۇشى مۇمكىن. بەزىلەر بۇ كېسەلنى ۋەرمەلەرنىڭ ئەڭ يامانراغىدۇر دەپ 3 كۈنگىچە داۋالاشقا كىرىشمەسلىكنى تەۋسىيە قىلغان. 3 كۈندىن ئوتتە ساقىيىشىدىن ئۈمىت قىلغىلى بولىدۇ دەپ قارايدۇ. ئالامەتلىرى: — ئاغرىق كىشى بېشىدا ئوت كويۇ- ۋاتقانداك ھىس قىلىدۇ. قاتتىق يىئارام بولىدۇ. يۈزى سېرىق بولۇپ تۇتۇپ كۆرگەندە سوغاق سېزىلىدۇ. ئاغ- رىق پات- پات ھۇشىدىن كېتىدۇ.

دۋاسى: قىپال تومۇرى، پىشانە تومۇرى، بۇرۇن ئۇچى، تىل ئاستى تومۇرىنىڭ بىرىدىن قان ئېلىش كېرەك. سەرسامدا كورسىتىلگەن دورىلار بېرىلىدۇ. غىزاسى ئۈچۈن پەقەت ئارپا، قاينىتىلغان سۇ بېرىش كۇپايە قىلىدۇ.

تۇتقاق كېسەل (سەرئى)

ئاغرىق كىشى تۇيۇقسىز يىقىلىپ چۈشىدۇ، پۇت- قوللىرى تارتىشىپ قالىدۇ. ئاغزىدىن كۆپۈك كېلىپ يۈزلىرى كۆكىرىپ كېتىدۇ. كىچىك بالىلار چوڭ- كىچىك تەرەت قىلىپ تاشلايدۇ. مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن ھۇشىغا كېلىدۇ.

سەۋىبى: — تۇتقاق كېسەلنىڭ سەۋىبى توغرىلۇق

ئىختىلاپ كۆپ. "قازۇن" كىتاپىدا مىڭە سۆيۈلۈشىنىڭ كۆپ بولۇشى ۋە بەدەننىڭ ئاجىز بولۇشىنى كۆرسەتكەن. جالنىۇس "قويۇق كەيموسنىڭ سۈددەسىدىن تۇغۇلىدۇ" دەيدۇ. ئەبۇ ئەلى سىنا: "مىڭىدىكى يەككە ھوللۇك (رۇتۇ بەتى - س) نىڭ كۆپلىگى ۋە ئۇنى مىڭە سىڭدۈرەلمە - كەنلىك - پىچى بولىدۇ" دەپ ئېيتقان. بەزىلەر بەدەن - دىكى ماددىلارنىڭ بۇخاراتى (بۇسى) مىڭىگە كۆتۈرۈلۈپ تۈسۈلۈش ھاسىل قىلىنالىق بولىدۇ، دەيدۇ. بۇ خىل پىكىردىكىلەر كۆپچىسىگە ھەرخىل زەھەرلىك تەسىرلەر مەسىلەن، غالىجىر ئىت چىشلەش، يىلار چىقە - شامۇ سەرتىگە سەۋەپچى بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: تۇتقاقلققا خاس بولغان تارتىشىپ ھۇشنىدىن كېتىشلەردىن باشقا، كېسەلدە يەنە تۆت خىل - نىڭ بىرى كۆپ بولغانلىق ئالامەتلىرىمۇ كۆرىلىدۇ:

(2) بەلغەمدىن بولسا - ھەركەتتە سۇسلىق بولۇپ، باش ئېغىر، زېھنى تۈۋەن، ھورۇن بولىدۇ. كېسەل تۇت - قاندا ئاغزىدىن بۇزۇلداپ كۆپۈك كېلىدۇ.

(1) سەپرادىن بولسا ئەزالاردا ئېچىش سېزىلىدۇ، رەڭگى سېرىق بولىدۇ.

(3) قاندىن بولغاندا يۈزى قىزىل، بەدەنلىرى ئېغىر بولۇپ دائىم يېشى قايىدۇ.

(4) سەۋدادىن بولغاندا دائىم يۈزىگى سالىدۇ، ئاغزى ئاچچىق بولۇپ ئېغىزدىن كەلگەن سۇ تۇپراققا چۈشە بۇزۇلداپ تۇرىدۇ. ئۆزى ئورۇق بولۇپ تاماقنى

كۆپ يەيدۇ. ھەرخىل خام خىياللارنى قىلىدۇ. كىچىك بالىلاردا تىل ئاستى زەخمىلەنگەن بولىدۇ.

داۋالاش: ئالدى بىلەن كېسەلگە سەۋەبچى بولغان ماددىسىغا قاراپ، شۇ ماددىنى پىشۇرىدىغان دورىلار بېرىلىدۇ. ئاندىن كېيىن توۋەندىكى دورىلار بىلەن ماددا تازىلىنىدۇ. (1) ھەببى ئەپتىمۇن (17- نۇسخە) دىن ھەركۈنى ئاخشامدا

$2\frac{1}{2}$ مىقالدىن بېرىلىدۇ، ياكى ھەببى سەبىرە، ھەببى

ئايارەج (4- ۋە 6- نۇسخە) بېرىلسىمۇ بولىدۇ.

(2) قارىمۇچ بىلەن قۇندۇز قەرىنى سوقۇپ بۇ- رۇنغا ناس ئورنىدا تارتتۇرۇش لازىم.

(3) كېسەل تۇتقاندا، ئاغرىق كىشىنىڭ تىلىنى چىشلۇپلىشىدىن ۋە باشقا ئەزالىرىنى زەخمىلەندۈرۈپ قويىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئاغزىغا قولىياغلىقنى پۈكلەپ تىقىپ قويۇش كېرەك. ھىڭنى ھەسەلدە قاينىتىپ گالغا تامغۇزۇلسا كېسەل كىشى دەرھال ھۇشقا كېلىدۇ. پىشۇرغان تۇخۇم، سۈت، قېتىق، سۇيۇق ئاشتىن پەرھىز قىلىشى كېرەك.

كىچىك بالىلاردا (10 ياشتىن توۋەن بالىلاردا) بولىدىغان تۇتقاق كېسەل ئادەتتە ئۈمىمى سەبىيان دەپ ئاتىلىدۇ.

ئەمچەكتىكى بالىلاردا تۇتقاق كېسەل بولسا، ئانىسىغا يۇقۇرىدىكى دورىلارنى بېرىش؛ ئۇدسەلىنىنى

سۇ ياكى قىز تۇققان ئايالنىڭ سۈتى بىلەن ئاشقان سۈرۈپ بالىنىڭ پەيلىرىگە چېپىش كېرەك. بالا قەۋزىيەت بولۇپ قالسا بالىلارغا ئىشلىتىلىدىغان شامچە قويىلىدۇ. بالىلاردىكى تۇتقاق كېسەلنىڭ خەتىرى ئانچە چوڭ ئەمەس. ئەمما 10 ياشتىن چوڭ بولغانلارنىڭ ئاقمۇتى چوڭلارنىڭكى بىلەن ئوخشاش. ئۆدسەلىنى سۈرۈپ چېپىش بۇلار ئۈچۈنمۇ پايدىلىق.

قېتىپ قېلىش (جۇمۇد)

جۇمۇد ئەرەبچە قېتىپ قېلىش دېگەنلىك بولۇپ بۇ كېسەلنى يەنە شىغۇسۇمۇ دېيىلىدۇ. ئاغرىق كىشى كېسەل تۇتۇشتىن بۇرۇن قايسى ھالەتتە بولسا شۇ پېتىلا قېتىپ قالىدۇ.

سەۋەبى: ئارقامىڭىزگە ئورناشقان سەۋدا ماددىسى بولۇپ، ئەسەب يوللىرىنى توسۇپ ھەركەت، ھەس، نەپەس ئېلىشلارنى توختىتىپ قويىدۇ. نەپەسلىنىش پۈتۈنلەي ئۈزۈلگەندە ئۆلۈم يۈز بېرىدۇ. ھۇشسىز ئۇيقا (سۇبات) بىلەن قېتىپ قېلىشنىڭ پەرقى شۇكى ھۇشسىز ئۇيقىدا كۆز يۇمۇلغان بولسا، قېتىپ قېلىشتا ئوچۇق تۇرىدۇ ياكى ئالغاي بولىدۇ. ھۇشسىز ئۇيقىدا تومۇر يۇمشاق، قېتىپ قېلىشتا تومۇر بوشالىدۇ. سەكتە بىلەن قېتىپ قېلىشنىڭ پەرقى مۇنداق: سەكتە بولغان ئاغرىقنىڭ ئاغزىغا سۇ قۇيغاندا گالدىن ئوتىدۇ. قېتىپ قالغاندا سۇ ئوتىشى مۇمكىن ئەمەس. سەرسام بىلەن قېتىپ قېلىش -

نىڭ پەرقى بولسا، سەرسامدا ھارارەت ناھايىتى ئۈستۈن بولىدۇ. قېتىپ قىلىشتا ھارارەت بولمايدۇ.

داۋاسى: سەۋدانى ھەيدىگۈچى دورىلار بىلەن مىڭنى تازىلاش ئۈچۈن ئاغرىق قېتىپ قالغان ھالىتىدە توۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىنىدۇ. ئەپ-تىمۇن، يېستىپايەج، ھىلىلە كابىلى، غارىقۇن، تۇربۇت، گازد-ۋان، پىرسىياۋشان، بۇغداي كېپىگى، كۈنجۈت يېغى، قارا توغرىغا، شەھىمى ھەنزىل باراۋەردىن ئېلىپ ھوقنە قىلىش ئۇسۇلى بويىچە بېرىلىدۇ. ھۇشغا كەلگەندىن كېيىن ھەببى ئايارەج (7- نۇسخە) يېيىشكە بېرىلىدۇ. مىڭسىگە قۇندۇز قەرنى گۈل يېغى بىلەن سۇرۇپ چېپىش كېرەك.

تىترەش كېسەلى (رەئىشە)

ھەركەت ئەزالىرى — قول — پۇتلارنىڭ ئىختىيارسىز ھالدا تىترىشى بولۇپ، بەزىدە يۈز ۋە كالىپۇكلاردىمۇ ئۇچرايدۇ.

سەۋىبى: مىڭ ۋە يۇلۇننىڭ ھەركەتنى باشقۇرۇش قۇۋۋىتىنىڭ ناچار بولۇشى؛ ھەركەت ئەزالىرى ۋە ئەسەللەرنىڭ يېتەرسىزلىكى؛ ياكى ھەرخىل ئەھۋالنىڭ بىللە كېلىشىدۇر. بۇلار توۋەندە تەپسىلىي بايان قىلىنىدۇ.

(1) مىڭ يۇلۇننىڭ ھەركەت قۇۋۋىتى ناچار بولۇش ئەھۋالى ھەرخىل يامان كېسەللەردىن كېيىن قاتتىق غەزەپلىنىش، قورقۇش، ھاياجانلىنىش، مىڭسىگە سىرتتىن بولغان زەربە، تۇرمۇشتىكى تەسادىپى ئۆزگە-

رىشلەر تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىدۇ. يەنە جىنى ئىلاھ بىلەن بەك زىيادە شۇغۇللىنىش ھەركەتلىنىش قۇۋۋىتىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. مىڭە يۇلۇننىڭ ھەركىتى باشقۇرۇش قۇۋۋىتىنىڭ بۇزۇلۇشى رەئىشنى پەيدا قىلىدۇ.

(2) ھەركەت ئەزالىرى ۋە ئەسەبلەرنىڭ بوشاپ كېتىشى مىزاجنىڭ سوغاق بولىشىدىن كېلىپ چىقىپ ئەسەبلەر بوشاپ، پۇت-قول يېرىم پالەچلىك ھالغا كېلىپ قالىدۇ. بۇ ھالدا ھەركەت قىلدۇرغۇچ كۈچ ئەزانى تارتىپ تۇرۇشقا قادىر بولىمۇ، ئەمما زەئىپلىك سەۋىيىدىن تىترەپ تۇرىدۇ. بۇخىلدىكى رەئىشە قېرى كىشىلەردە كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: قول-پۇتلار دائىم تىترەپ تۇرىدۇ، يۈز ۋە كالىپۇكلىرىمۇ تىترەيدۇ. تىترىگەن ئەزا يېرىم پالەچلىك ھالىتىدە بولىدۇ. باشقا كېسەللەردىن پەرقى شۇكى ئۇخلىغاندا تىترەش بولمايدۇ.

داۋالاش: بۇنداق ئاغرىقلاردا بەلغەم ماددىسى غالىپ بولغانلىقتىن، ئالدى بىلەن مىڭنى بەلغەمدىن تازىلاش ئۈچۈن ھەبى ئايارەج (7- نۇسخە) ۋە مائىل ئۇسۇل (13- نۇسخە)لارغا 3 مىسقال ئۇستۇخۇددۇس قوشۇپ كۈندە بىر قېتىمدىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئاغرىق ياش بولسا بۇ چارىدىن كېيىن نۇشدارى ساددە (21- نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(3) زەمىتۇن يېغى: ئاقىرقەرھە، قۇندۇز قەرلەرئى
بەرۋەر مىقداردا ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ تىترەپ تۇرغان
ئەزاغا سۇرتىلىدۇ.

ساراڭلىق (جۇنۇن)

سەۋىيى: ماددىلارنىڭ كويگەنلىكىدىن پەيدا
بولىدۇ. ماددىلارنىڭ كويۇش بىلەن مىڭگە ھەرخىل
بۇخاراتلار توپلىشىپ، تۇرلۇك ئالامەتلەرنى بېرىدۇ.
ساراڭلىق كېسلى بۇخىل ئالامەتلەرگە قاراپ 14 تۈرگە
بولىنىدۇ. ئۇلاردىن ئەڭ كۆپ ئۇچرايدىغىنى دائىم
تېرىكىپ تۇرىدىغان، ئۇرۇشقا بولغىنى "مانيا" دەپ
ئاتىلىدۇ. ئادەم ئولتۇرۇشكە قەست قىلغۇدەك دەرىجىدىكىلە-
رى "جۇنۇنى قاتىل"، ئۆزىنىڭ يېقىن كىشىلىرى،
يولدىشى، ئاتا-ئانىلىرىدىن قاچىدىغانلىرى "جۇنۇنى
نەپسا"، ئاشىق بولۇپ قېلىپ ساراڭ بولغانلار "جۇنۇنى
ئىشقى" دەپ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆرسىتىلگەن روھى ھالەتتىن
تاشقىرى، قايىسى خىلىتتىن كېلىپ چىققان بولسا شۇ
خىلىتنىڭ ئالامەتلىرى بولىدۇ. مەسىلەن: يەپىرانىڭ
كويۇشىدىن بولغان جۇنۇندا ئاغرىقنىڭ ئوزى ئورۇق،
رەڭگى قارا كېلىدۇ. قاننىڭ كويۇشى ۋە ئىسسىقلىقتىن
بولغان جۇنۇندا كېسەلنىڭ يۈزى ۋە كۆزىنىڭ ئىچى
قىزىل بولىدۇ.

داۋاسى: ماددىسىغا قاراپ ئاۋال شۇ ماددىنى

پىشۇرىدىغان، ئالدىن ئۇنى سۇرۇپ تازىلايدىغان دورىلار بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن يۈرەك ۋە مىڭنى كۈچلەندۈرگۈچى دورىلار ياكى مۇفەررىھى ياقۇتى (9-نۇسخە) بېرىلىدۇ.

مالخوليا

سەۋدە كۆپ ئويلاش، ئورۇنسز خىيال ۋە گۇ-مانلارنى قىلىش، سەۋەپسىز غەم-ئەندىشە ئىچىدە ياشاپ تۇرغا پىكىردىن يىراقلىشىشتەك كېسەللىك ئالامەتلىرى بىلەن ئوتىدىغان بىرخىل روھى كېسەللىك. سەۋەبى: غەيرى تەبىئى سەۋدا (كويگەن سەۋدا) نىڭ بۇخاراتلىرى مىڭگە ئورلەپ چىقىش، ياكى تەبىئى سەۋدانىڭ ئېتىدالدىن (نورمىدىن) ئېشىپ كېتىشى ۋە بەلغەم ماددىسىنىڭ غەيرى تەبىئى ھالدا سەۋدا بىلەن بىرىكىشىدىن پەيدا بولىدىغان بۇخاراتلارنىڭ مىڭگە ئورلەپ چىقىشى بۇ كېسەلگە سەۋەبچى بولىدۇ. يەنە سەۋدانى كۆپەيتىدىغان يىمەكلىكلەر مەسلەن، تۇزلىغان بېلىق، جەيزىلەرنى كۆپ يىمىش؛ قۇرۇق مىزاجنىڭ ئېشىپ كېتىشى؛ ئاياللاردا ھېيىزنىڭ توختاپ قېلىشى ۋە باشقىلارمۇ بۇ كېسەلگە سەۋەبچى بولۇشى مۇمكىن. ئالامەتلىرى: كورسىتىلگەن روھى ئالامەتلەردىن باشقا، خىلىتلارنىڭ ئوزگىرىشىگە قاراپ تۈۋەندىكى بىر قانچە ئالامەتلەرمۇ قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

1) ئومۇمەن تومۇر ھەركىتى قاتتىق ۋە مۇختە-

لىپ بولىدۇ، سۇيدۇك قارامتۇل بولۇپ، قايى خىلىت
كوپ بولسا شۇنىڭ رەڭگىگە مايىل كېلىدۇ. مەسىلەن، قان-
دىن بولسا قىزىلغا مايىل قارا ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش بولىدۇ.
داۋاسى: (1) ئالدى بىلەن مەيلى قايى ماددى-
نىڭ كويگەنلىكى سەۋەپ بولسا قان ئېلىش كېرەك.
قان ئوكھەل ياكى باسلىق تومۇرىدىن ئېلىنىدۇ. ئايال-
لاردا ھېمىزنىڭ توختاپ قالغانلىقى بىلىنمەسە ساقىن
تومۇرىدىن قان ئېلىش لازىم.

(2) ماددىنى پىشۇرغۇچى دورىلار — بىنەپشە، نىلۇ-
فەر، گازېۋان ھەربىرى 3 مىسقالدىن، چىلان، سەرىپ-
تان 7 دانىدىن، ناۋات بىرسەر ئېلىپ ئۇلارنى دەملەپ
ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر ماددا مۇرەككەپ بولسا مەۋجۇت
ماددىلارنى پىشۇرغۇچىسى بېرىلىدۇ.

(3) مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بىلەن
بەدەن تازىلىنىدۇ.

(4) داۋائىلمۇشكى (22 - نۇسخە) ياكى نۇش-
دارى لۇئىلىۋى (8 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(5) سەۋدا ئالامەتلىرى ئېغىرراق بولسا خېمىرى
ئەبىرىشم (23 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

**ئاياللارنىڭ تۇتقاقلىق كېسىلى (ئېھتىناقى رەھىم -
ھىستېرىيە)**

ئاياللاردا تارتىشىش ۋە بەھۇشلۇق ئالامەتلىرى
بىلەن ئوتىدىغان تۇتقاقلىق كېسەل بولۇپ، دوختۇرلار

ھىستېرىيە دەپ ئاتايدۇ. بالىياتقۇدىكى زەرەرلىنىشلەرنىڭ مېڭە ۋە يۈرەككە تەسىر بېرىشى بىلەن پەيدا بولىدۇ. **سەۋىيى:** بالىياتقۇدا ئوفۇنەت توپلىشىپ زەھەرلىك كەيپىياتقا ئايلىنىپ مېڭە ۋە يۈرەككە ئورلىيدۇ. (2) ھېيىزنىڭ توختاپ قېلىشى، بالىياتقۇنىڭ بوغۇلۇپ قېلىشى تۈپەيلىدىن بۇ كېسەل كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: كېسەل تۇتۇش ۋاقتى يېقىنلاشقاندا كېسەل قوساق ساھەسىنى دوۋىسۇندىن تارتىپ يۈرەك تەرىپىگە قاراپ ئىختىيارسىز ئۇۋىلاشقا باشلايدۇ، زېھنى ئېلىشىدۇ، بۇزۇق خىياللارنى قىلىدۇ، بېشى ئاغرىپ كوزى قاراڭغۇلىشىدۇ، رەڭگى توپىرەڭ بولۇپ پۈتۈن بەدەنلىرى بوشىشىپ كېتىدۇ، كوزى ياشاڭغۇرايدۇ. شۇنىڭ بىلەن يېقىلىپ ھۇشسىزلىق پەيدا بولىدۇ. ھەركەت ۋە ئاۋاز توختايدۇ. ئادەتتىكى تۇتقاق كېسەلدىن پەرقى شۇكى بۇ كېسەلدە ھىس پۈتۈنلەي يوقالمايدۇ. تۇتقاق كېسىلىدە پۈتۈنلەي يوقىلىدۇ. ئاغ-زىدىن كۆپۈك كېلىدۇ. ئېھتىناقى رەھىمدە ئېغىزىدىن كۆپۈك كەلمەيدۇ.

داۋالاش: كېسەل تۇتۇشنىڭ دەسلەپكى ئالامەتلىرى كۆرۈلگەن ھامان قول-پۇتلىرىنى باغلاپ راسا ئۇگۇلاش لازىم. قىچا، نەمەكى ھىندىنى ئىسسىق سۇ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ قول-پۇتلىرىنى يۇيۇش لازىم. (2) بۇرۇنغا سېسىق پۇراقلىق دورىلار مەسلەن،

جاۋشېر، ھىڭ، يۇڭلارنى كويدۇرۇپ پۇرۇتۇش، كىندىك ئاستىغا، يوتىغا لوڭقا قويۇش كېرەك.

(3) خۇشپۇراقلىق دورىلارنى مەسىلەن، ئىپار، ئەنبەر، ئادراسمانلارنى كويدۇرۇپ جىنىنى يولغا دۇت بېرىش ياكى گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ جىنىنى يوپۇق ئىچىگە سۈركەش لازىم.

(4) ھېيز، توختاپ قېلىش سەۋىبىدىن بولسا پەر- پىيون، پىلىللەرنى جىنىنى يولغا كىرگۈزۈش دەرھال نەتىجە بېرىدۇ.

(5) ھۇشىغا كەلگەندىن كېيىن ھەببى ئىستەم- خىقون (11- نۇسخە) ياكى ھەببى ئايارەج (16- نۇسخە) بىلەن بەدەننى تازىلاپ بولۇپ مەجۇنى مىش- دىرتۇس (23- نۇسخە) بېرىلىدۇ. داۋاملىق تۇردە ھەپتىدە بىر قېتىم ھەببى ئايارەج، بىركۈندىن كېيىن مەجۇنى نۇجاھ (19- نۇسخە) بېرىپ تۇرۇش كېرەك. ئەگەر مىزاجى ئىسسىق تەرەپتە بولسا (قىزىتمىسى بار)، يۈزى قىزىل، يېشى ئېغىر بولسا يۇقۇرقىدەك ئىسسىقلىق دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن كېسەل ھۇشىغا كەل- گەندىن كېيىن باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىش بىلەن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20- نۇسخە) بېرىلىشى شەرت، جىنىنى تەلەپنى پەسەيتىدىغان دورىلارنى مەسىلەن، سېمىز ئوت ئۇزۇغىنىڭ شىرىسى، نىلۇفەر شەرۋىتى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ھېيز توختاپ قالغان بولسا ئىلاجىنى قېلىش كې- رەك. كېسەل تۇتۇش ئالدىدا كافۇر، سەندەل پۇرۇتۇش لازىم.

مالخۇلىيىي مەراقى

ئىسسىق تەبىئەتلىك كويگەن خىلىتلارنىڭ مەئىدە، تال ۋە چاۋا قان تومۇرلىرى (ماسارىقا) قاتار-لىق ئىچكى ئەزالاردا بۇس-بۇخارات ھاسىل قىلىپ مېڭە ۋە يۈرەككە تەسىر بېرىشى نەتىجىسىدە پەيدا بولىدىغان كېسەل بولۇپ، مالخۇلىيانىڭ بىر خىلىدۇر.

سەۋەبى: خىلىتلارنىڭ كويگەن قىسمى مەئىدە ئاستىغا چۆكۈپ مەئىدە ياللۇغلىنىش (ۋە رەم) پەيدا قىلىدۇ؛ ماسارىقا يوللىرىغا چۆكۈپ توسالغۇ پەيدا قىلىدۇ؛ كويۇك خىلىت تالدا ياللۇغلىنىش بېرىدۇ؛ قوساق پەردىسىگە چۈشۈپ بۇنىڭدىمۇ ياللۇغلىنىش پەيدا قىلىدۇ. بۇ ياللۇغلىنىشلاردا ھاسىل بولغان بۇس-بۇخاراتلار مېڭە ۋە يۈرەككە ئورلىيدۇ.

ئالامەتلىرى: مالخۇلىيادىكى روھى ئالامەتلىرى بولغاندىن تاشقىرى، يەنە توۋەندىكى ئالامەتدە بەلگىلىرى بولىدۇ: (1) مەئىدە ۋە قوساق ئاغرىدۇ، قاتتىق ئېچىشىدۇ، ئېغىزدىن كويۇك كېلىپ ئاچچىق كىكىرىدۇ، كىكىرىك خۇددى ئىسقا ئوخشاش پۇرايدۇ. يالغان ئىشتەي پەيدا بولىدۇ، كۆپ يېمىمۇ ئورۇق بولىدۇ. ئاغرىقنىڭ ئۆزىگە قوساقتىن مېڭە تەرمەپكە قانداقتۇ بىر سېسىق بۇس ئورلەپ كېتىۋاتقانلىقى سېزىلىپ، كارىيلىرى ئېچىشىپ بىر نەرسە تاتىلىغاندەك بولىدۇ. تال چوڭ بولۇپ، تەرتىبى سۇيۇق كېلىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر شەرت ھازىر بولسا 40 كۈندە بىر

قېتىم قان ئېلىش، ئاغرىقنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ قان ئېلىش مىقدارىنى بەلگىلەش كېرەك. قان باسلىق تومۇرىدىن ئېلىندى. دۇ، گازېۋان، نىلۇفەر، كاسىن ئۇرۇغى، ئىت ئۇزۇمى، تەرەپ-جىۋىللەرنى ناۋات بىلەن قوشۇپ بېرىدۇ. شەرۋىتى بىنەپشە (2-نۇسخە) بېرىلىدۇ. باشقا دورىلار مالىخۇلىياغا ئوخشاش.

قارا بېشىش (كابۇس)

كېسەل كىشى ئۇخلاۋېتىپ دائىم قورقۇپ ئويغىنىپ كېتىدۇ. چۈشىدە ئاغرىقنى ئېغىر بىر نەرسە بېسىۋالغاندەك تۇيۇلىدۇ، نەپەس قىسىلىدۇ، مىدىرلاشقا قانچە ھەركەت قىلىمۇ مۇمكىن بولمايدۇ. ۋاقىرىسا ئاۋازى چىقماي بوغۇلۇپ قالىدۇ. كېسەل ئاران ئويغىنىدۇ. خېلى ۋاقىتقىچە ئۆزىگە كەلمەي تۇرىدۇ. قارا بېشىش تەرەققى قىلسا تۇتقاق كېسەلگە ئۆزگىرىشى مۇمكىن.

سەۋىيى: قان يوللىرىدا پەيدا بولغان نامۇۋاپىق خىلىتلارنىڭ بۇخاراتى مىڭگە ئورلەيدۇ. كېسەل ئۇخلىغاندا بۇ بۇخاراتلار مىڭگە ئالدىنقى قىسمىغا توپلىشىپ مىڭنى قورشىۋالىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ھاياتلىق كۈچى سىقىلىپ پۈتۈن بەدەندە غەيرى بىر ئەھۋال ھىس قىلدۇرىدۇ. بۇخاراتلارنىڭ خاراكتېرىگە قاراپ قارا بېشىش قاندىن، بەلغەمدىن ۋە سەۋدادىن بولغان دەپ 3كە بۆلىنىدۇ.

(1) بۇخارات قاندىن كەلگەن بولسا بەدىنى ۋە كۆزى قىزارغان ھالدا بولىدۇ. ئاغرىق چۈشىدىمۇ

كۆز ئالدىدا بىر خىل قىزىللىق كۆرگەندەك بولىدۇ.

(2) بەلغەمدىن بولسا چىرايى ئاق، روھى تۈۋەن، بېشى ئېغىر بولىدۇ. ئاغزىدىن كۆپۈك كېلىدۇ.

(3) سەۋدادىن بولغان بولسا ئادەتتىكى چاغلاردا، روھى بەلگىلەر كۆرىلىدۇ. مەسىلەن، ئاچچىقى يامان، تولا ئويلايدىغان بولۇپ، بەدىنى قارا، ئۆزى ئورۇق بولىدۇ. داۋاسى: كېسەلنىڭ ماددىسىغا قاراپ تەدبىر قىلىش كېرەك؛ مەسىلەن، قاندىن بولغان كېسەللەرگە قاننى تازىلايدىغان دورىلارنى بېرىش ئاياق تەرەپلىرىگە ھىجامەت قويۇش لازىم.

بەلغەمدىن بولغانلارغا ئالدى بىلەن قەي قىلدۇ. رۇپ ۋە بۇرۇنغا چۈشكۈرتكۈچى دورىلار تارتتۇرىلىدۇ. قەي قىلدۇرۇش ئۈچۈن سېرىق چىچەك، تۇرۇپ ئۇرۇ. غىنى قاينىتىپ ھەسەل بىلەن قوشۇپ بېرىلسە قۇسۇنىدۇ. سەۋدادىن بولغانلارغا مەتبۇخى ئىپتىمۇن (20- نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇ چارىلاردىن كېيىن ئاغرىقلارغا ئاپارەج پەيقارا ياكى ھەببى قوقيا بېرىلىدۇ (17- 16- نۇسخىلارغا قاراڭ).

پالەچ ۋە ئىستىرخا

بەدەندىكى مەلۇم ئەزانىڭ ھەركىتى ۋە سېزىش قابىلىيىتى چەكلىنىپ قالغان ياكى پۈتۈنلىرى دەخلىگە ئۇچرىغان كېسەللىكنى پالەچ ۋە ئىستىرخا دەپ ئېيتىلە. دۇ. بەزى كىشىلەر پالەچ بىلەن ئىستىرخانى ئايرىمايدۇ.

ئەمما يېقىنقى زامان ئىۋىپلىرى گەۋدىنىڭ يېرىمى
باشتىن ئاخىرغىچە ھەركەتلىنەلمەس بولۇپ قېلىشنى
”پالەچ”، ئومۇمىي بەدەننىڭ پۈتۈنلەي پالەچ بولۇپ
قېلىشنى ئىستىرخا دەپ قارايدۇ.

كېسەللەك باشلانغاندىن كېيىن، بەزى كىشىلەردە
سېزىم مەۋجۇت بولۇپ، ھەركەت دەخلىگە ئۇچرىشى
مۇمكىن. بەزىلەردە ھەرىكەتسىز بىردەك دەخلىگە ئۇچ-
رىشى ئېھتىمال. ئالدىنقى مىڭگە چۈشكەن قان سەزگۈ
مەركىزىنى بېسىپ قالماي، ھەركەت مەركىزىنى بېسىپ
قالغانلىق نەتىجىسى، كېيىنكى بولسا ھەرىكەتسىز
مەركەز بىردەك بېسىلىپ قالغانلىق نەتىجىسىدۇر.

سەۋەبى: پالەچلىك ئاساسەن مىڭە بوشلۇقلىرىغا قان
چۇشۇپ، مەلۇم سېزىم مەركىزى ۋە ھەركەت مەركىزىنى
بېسىپ قېلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. چۈشكەن قاننىڭ ئاز-
كۆپلىكى، بېسىلغان دائىرىدىكى مەركەزلەرنىڭ ئاز-
كۆپلىكى، ئاغرىقنىڭ ئەسلىدىكى سالامەتلىك ۋە چېنىقىش
ئەھۋاللىرى كېسەللەكنىڭ ئېغىرلىق دەرىجىسى، ساقىيەش
ئاقىۋىتى قاتارلىقلارغا زىچ مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ.

مىڭىگە قان چۇشۇپ ئەسەپلەرنىڭ سېزىم ۋە
ھەركەتتىن باشقۇرۇش قابىلىيىتىنى توسۇپ قويىشىدىن
تاشقىرى، يۇلۇننىڭ زەخمىگە ئۇچرىشى، ھەرخىل
ۋەدەم، ئىششىقلارنىڭ يۇلۇننى قىستاپ بېسىپ قويىشى،
مەلۇم ئەزالارنى باشقۇرىدىغان ئەسەپلەرنىڭ مەلۇم

تەسراتقا ئۇچرىشىمۇ بەلگىلىك ئەزا پالەچلىك ئىكەنلىكىنى
رۇپ چىقىرىدۇ (مەسىلەن، يۇتقۇنچاق، تىل، ئىنچىك
ئۆچەي، قول بارماقلىرىنىڭ چەكلىك دائىرىلىك
پالەچلىنىشلىرىغا ئوخشاش).

ئالامەتلىرى: پالەچ ھوللۇكتىن بولغاندا ئاستا
باشلىنىدۇ. تومۇر ئاستا سۇس ياكى مۇتەفاۋەتلىك
بولىدۇ. ئېغىر تۈرلىرىدە تومۇر تېز، ئىنچىكە ۋە
مۇتەۋاتىر بولىدۇ. سۇيدۇك قايسى ماددىنىڭ — بەلغەم
ۋە قاننىڭ غالىپلىقىغا قاراپ ئاق ياكى قىزىل كېلىدۇ.
بەدەننىڭ پالەچلەنگەن قىسمى ئوز رەڭگىنى
يوقاتىسا ۋە "ئورۇقلاپ" (يىگىدەپ) كەتمە داۋالاش
ياخشى نەتىجە بېرىدۇ.

سەۋەپلىرىگە قاراپ پالەچلىك ۋە ئىستىرخا
توۋەندىكى تۈرلىرىگە بولىدۇ.

(1) ئومۇمى پالەچلىك (ئىستىرخا) — پۇتۇن
بەدەننىڭ ھەركەت ۋە ھىسسىنىڭ بولماسلىقى.

(2) يېرىم پالەچ — بەدەننىڭ يېرىمى يەنى بىر
تەرەپ يۈز، ئېغىز، قول-پۇتلارنىڭ پالەچ بولۇپ قې-
لىشى.

(3) لەقۋا — پالەچلىككە پەي ۋە گوشنىڭ تارتىش-
ۋېلىشى قوشۇلۇپ كېلىش نەتىجىسىدە يۈز گوشنىڭ
پالەچلىنىپ قېلىشى. بۇنداقتا توۋەندىكىدەك ئالامەتلەر
كورۇلىدۇ: يۈز بىر تەرەپكە مايماقلىشىپ قالىدۇ؛ ئەس -

ھۆشى جايدا بولىدۇ. ئاغزى تەم سېزەلمەيدۇ،
تۈۋەنكى قاپاقلىرى ساڭگىلاپ قالىدۇ، پىشانە تېرىسى
قورۇقلىشىدۇ، ئېغىز سۈيى قۇرۇپ قالىدۇ. يۈز گۈشلىرىنىڭ
تارتىشىۋېلىشى تەشەننۇجنىڭ بەلگىسى بولۇپ قالغان.
لىقلىرى پالەچلىك ئالامىتىدۇر.

(4) بەل ئاستىنىقى قىسمىنىڭ پالچى — مىڭە ۋە
يۇلۇنغا زەرەر يەتكەندە ياكى ئاتىشەك (سفىلىس)
كېسەلىدە ۋە جىنى ئالاقە بىلەن زىيادە شۇغۇللانغۇچى
كىشىلەردە يۈز بېرىشى مۇمكىن. دەسلەپتە بەل ئاغرىش،
ئايماقلار ماغدۇرسىزلىنىش قاتارلىق باشلامچى بەلگىلەر بولۇپ،
تۈيۈقسىزلا ياكى تەدرىجى ھالدا سېزىم ۋە ھەركەت يو-
قىلىدۇ. دوۋساق پالەچلەنگەنلىكتىن سۇيىدۈكنى تۇتالماي
دائىم تامچىلاپ ئېقىپ تۇرىدۇ.

(5) تىترەپ تۇرىدىغان پالەچلىك (پالچى رەئە-
شى). پالەچلەنگەن ئەزا (بولۇپمۇ قول) تىترەپ تۇرىدۇ.
ئاياللاردا خۇسۇسەن ھاراقنى كۆپ ئىچكۈچىلەردە كۆرۈ-
لىدۇ. كېسەللىك ئاستا باشلىنىدۇ، دەسلەپ تىترەش
كېلىپ چىقىپ، كېيىن سەزمەس بولۇپ قالىدۇ،
ھەتتا مۇنداق تىترەش ئۇخلاۋاتقاندىمۇ داۋاملە-
شىدۇ.

(6) بالىلار پالچى (پالچى ئەتقال) — بالىلاردا
ھەرخىل ياشتا ئۇچرىشى مۇمكىن. ئەمما بوۋاقلاردا
كۆپرەك يۈز بېرىدۇ. ئاغرىق باشلىنىشتىن بۇرۇن زۇكام

بەلگىلەردى ئاشقازان بۇزۇلغانلىق ئالامەتلىرى كۆرۈلۈپ، بەدەنگە تاشىملار چىقىشى مۇمكىن. بەزىدە قىزىل، چېچەك كېسەللىرىدىن كېيىنلا يۈز بېرىدۇ. كېسەللىك تۈ-يۇقسىز باشلىنىپ بالا ماڭالمىي قالىدۇ، ئومۇمى بەدەن-لىك بولغاندا ھەتتا بالا بويىنىنى تىكلىيەلمەي قالىدۇ.

داۋاسى: پالەچ ۋە ئىستىرخانى داۋالاشتا ئالدى-راپلا تېز تەسىر قىلغۇچى تەدبىرلەرنى قوللانغىلى بول-مايدۇ. ئالدى بىلەن سەۋەبچى ماددا قان ۋە بەلغەمنى پىشۇرۇشقا كىرىش كېرەك.

(1) مائىل ئۇسول (24 - نۇسخە) ماددا پىشۇرۇشقا بېرىلىدۇ.

(2) ماددا پىشقاندا تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) بېرىش كېرەك.

(3) مىزاجنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن مەجۇنى فىلاسپە (18 - نۇسخە)، ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە)، مەشدىرتۇس (25 - نۇسخە)، ھەببى جەدۋار (26 - نۇسخە)، ھەببى پەرىپىيۇن (28 - نۇسخە)، ھەببى مەنتىن (27 - نۇسخە) قاتارلىق دورىلارنىڭ بىرىنى تاللاپ بېرىشكە بول-لىدۇ. ئەڭ ياخشى 25 ۋە 29 - نۇسخىلاردىكى دورى-لارنى بېرىش كېرەك.

(4) پىشقەدەم تىۋىپلار مەشدىرتۇسنى ھەر كۈن-دە بىر مىقالدىن بېرىپ تۇرۇش، ئايارەج پەيقارانى 5 كۈنگىچە بېرىش كېرەك دەپ كۆرسەتكەن. بەزىلەر

ھەر كۈنى بىر مىسقال ئايارەج پەيقاراغا قارىمۇچ،
قۇندۇز قەرى قوشۇپ بېرىشنى كورسىتىدۇ. بەزىلەر
ھەپتىدە بىر قېتىم ھەببى قوقيا بىلەن سۈرگە بېرىش
كېرەك دەيدۇ. كېسەلنىڭ ئەمىلى ئەھۋالىغا قاراپ بەل-
كىلەش مۇۋاپىقدۇر.

(5) سامساق، ئۈزۈم، ياڭاق جويۇز، پىلىپىل، قار-
مۇچلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ
يېمىشكە بېرىلىدۇ. تۇخۇمغا بىر ئاز يوز بوغا ئارىلاشتۇرۇپ
پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ. قۇشقاچ گوشى كاۋاپ قىلىپ بېرىلىدۇ.
(6) ئەگەر كېسەلنىڭ ئەھۋالى مەنئى قىلىمسا
قان ئېلىشنى ئويلاپ بېقىش كېرەك.

(7) پالەچلەنگەن ئەزاغا ئازىراق تاتلىق شىرنىلىك
سۇيۇقلۇقنى يۇقتۇرۇپ ھەرىكە چاقتۇرۇلسا، ھەرە زەھىرىنىڭ
تەسىرى بىلەن ھەرىكەتكە كېلىشى مۇمكىن. شۇنىڭدەك
قۇستە يېغى (30 - نۇسخە) بىلەن ياغلاش ۋە ئىسسىق ئوت-
كۈزۈپ ياغنى سىڭدۇرۇپ بېرىش كېرەك.

ئەسەپ (نېرۋا) ئاجىزلىغى (زەئىپىل ئەسەپ)

ئۇزاق مۇددەت ئەسەپلەرنى غىدىغلايدىغان، ھالىمىز-
لاندۇرىدىغان سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىدىغان
كېسەللىك بولۇپ، بەزىلەر ئۇنى مالىخۇلىيا كېسەللىكىنىڭ
بىر تۈرى دەپ ھساپلايدۇ.

سەۋىيى: ئەسەپ ئاجىزلىغىنىڭ سەۋەپلىرى كۆپ
ۋە خىلمۇ-خىلدۇر، ئۇلاردىن مۇھىمىرەكلىرى تۆۋەندى-

كىسلەردىن ئىبارەت: (1) ئەجدادى زەئىپىرەك بولغان كىشىلەرنىڭ ئەۋلاتلىرى بۇ كېسەلگە ئوڭايلا دۇچار بولىدۇ. شۇنىڭدەك نازۇك تەبىئەتلىك (ئىنچىكە مىزاجلىق) ۋە تېنى ئاجىز كىشىلەرمۇ بۇنىڭغا مايىل كېلىدۇ. (2) جەۋرى-جاپا، روھى غىدىغلىنىشلارغا كۆپ ئۇچراش؛ (3) ئەقلى ئەمگەكلەر بىلەن ئۇزاق شۇغۇللىنىش؛ (4) مىڭىنى ئارتۇقچە ئىشلىتىش؛ (5) ھاراق ۋە زەھەرلىك چېكىملىكلەرنى كۆپ ئىستىمال قىلىش؛ (6) قەھۋە (كافى) نى زىيادە ئىچىپ يۈرۈش؛ (7) خەتەرلىك ئورۇنلاردا (كان ئىچى، قۇدۇق ئىچى ۋە يۇقۇرى ئىبارەت) قۇرۇ-لۇشدا دائىملىق ئەندىشە ئىچىدە ئىشلەش؛ (8) يۇقۇرى قىزىتمىلىق كېسەللىكلەر ۋە ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئاغرىق-لار بىلەن ئۇزاق ئاغرىش؛ (9) مەئدە، جىگەر، ئۇچەي ئاغرىقلىرى نەتىجىسىدە مىڭە ئاجىزلىشىش؛ (10) جىنسى ئالاقە بىلەن ھەددىدىن زىيادە شۇغۇللىنىش؛ ياكى ئۇزاققىچە جىنسى ئالاقىنى تەلەپ قانماسلىق.

ئالامەتلىرى: ئاغرىق كىشى روھسىز، خىيالىچان، چىرايى سېرىق بولىدۇ، ئۇخلىمايدۇ، ئۇخلىسىمۇ كۆپ چۈش كۆرۈپ ھارغىن ھالەتتە ئۇيغىنىدۇ، ئادەم كۆپ جايلاردا تۇرۇشتىن قاچىدۇ، يالغۇزلۇقنى خالايدۇ، كۆڭلى ئېلىشىدۇ، ئىشتىيى تۈتۈلۈپ ئورۇقلايدۇ. پىكىر قىلىش، ئەستە قالدۇرۇش قابىلىيەتلىرى تۈۋەنلەيدۇ. ئەرلەردە باھنىڭ ئاجىزلىشىشى، سۇيۇقلۇققا ئوخشاش ئەھۋاللارمۇ قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

داۋالاش: سەۋەپچى بولغان ئامىللارنى يوقىتىشقا ھەركەت قىلىش، ئوزۇقلىنىشنى كۈچەيتىش، مۇۋاپىق جىسمانى ئەمگەك، تەنتەربىيە بىلەن چېنىقىش كېرەك. شۇ-
ئىگدەك توۋەندىكى دورىلارنى بېرىش، ئىمكانىيەت بول-
سا دورىلارنىڭ بىرقانچىسىنى بىرلىكتە بېرىش لازىم.
چۈنكى مۇنداققا ئۇنۇمى تېزرەك كورۇنىدۇ.

دورىلار: خەمىرى گازىۋان (32 - نۇسخە)، خەمىرى
ئەۋرىشم (23 - نۇسخە)، داۋائىلمۇشكى (22 - نۇسخە)،
لۇبۇبى كەبىر (2 - نۇسخە)، بۇلاردىن ئەڭ ياخشى تە-
سىر قىلىدىغىنى 32 - نۇسخىدىكى خەمىرى گازىۋاندۇر.

تارتىشىپ قېلىش (تەشەننۇج)

مەلۇم بىر ئەزا ياكى پۇتۇن بەدەن پەيلىرىنىڭ
تارتىۋېلىشى ۋە گۈشلەرنىڭ تارتىشىپ يىغىلىپ قېلىشىنى
تارتىشىش (تەشەننۇج) دىيىلىدۇ.

سەۋىيى: 1. بەدەندە ئەملىكنىڭ ئارتۇق بولۇشى-
دىن ئىبارەت بولۇپ، بەلغەم، سەۋدا ماددىلىرىنىڭ كەڭ
تارمۇش، پەيلەرگە توپلىشىپ ئۇلارنىڭ ئۇزىراپ-قىسقۇ-
رىش قابىلىيىتىنى چەكلەپ قويىدۇ. ئەگەر ماددا قويۇق
بولسا تارتىشىش بىلەن ئىستىرخا (پالەچلىك) بىللە
قوشۇلۇپ كېلىدۇ. قان ۋە سەپرالارمۇ تارمۇشلاردا يۇقۇر-
قىدەك ئۆزگىرىشلەرنى كەلتۈرۈشى مۇمكىن.

2. قىزىتما ھارارىتى بىلەن پەيلەردىكى ماددىلار
كويىدۇ. نەتىجىدە پەيلەر قىسقىرايدۇ. ياكى ھارارەتنىڭ

زىيادە بولۇشى بىلەن بەدەن قۇرۇپ كېتىپ تارتىشىپ قېلىش كېلىپ چىقىدۇ. بۇنى قۇرۇق تارتىشىش دېيىلىدۇ.
3. سۈرگە دورىلارنى كۆپ ئىچىپ ھەددىدىن زىيادە ئىچ سۈرۈپ كەتكەندە ياكى كۆپ قان ئالغاندىمۇ تارتىشىش كېلىپ چىقىدۇ.

4. مىڭگە زەرەر يەتكەندە ياكى تارمۇشلارغا بىۋاسىتە زەرەر يەتكەندىمۇ تارتىشىش كېلىپ چىقىدۇ. بۇ تۈۋەندىكى بىر نەچچە خىلغا بولىنىدۇ:

(1) ھەر خىل زەھەرلىك نەرسىلەر ياكى دورىلار مەسىلەن، ئەپيۇن، زاڭكار قاتارلىقلار بىلەن زەھەرلىنىش مىڭگە تەسىر بېرىپ پۈتۈن بەدەن تارتىشىپ قالىدۇ.
(2) پەيلەرگە سىرتتىن سوغاق تېگىش ياكى ئىچكى تەرەپتىن بولغان سوغاقلىقنىڭ پەيلەرگە تەسىر قىلىشىدىن بولىدۇ.

(3) زەھەرلىك ھاشارەتلەر (مەسىلەن، چايان قاتارلىقلار) نىڭ چېقىشى بىلەن بەدەندە تارتىشىش كېلىپ چىقىدۇ.

(4) قوساقلىقنى مەدە قۇرۇتلارمۇ تارتىشىشقا سەۋەپ بولىدۇ.

(5) ئوت سەپراسى مەئىدىدە غەيرى تەبىئى ئۆزگەرىپ قاتتىق ئېچىشىش پەيدا قىلىدۇ. نەتىجىدە مەئىدىنىڭ ئۆزىدە تارتىشىش كېلىپ چىقىدۇ. ئېغىر ھاللاردا بەدەندىمۇ تارتىشىش پەيدا بولىدۇ. مەسىلەن، ۋابا كېمىلىدە پاقالچەك ۋە بىلەك گۈشلىرى تارتىشىپ قالىدۇ.

ئالامەتلىرى: كېسەلنىڭ باشلىنىشى ئادەتتە تېز بولىدۇ. ئالدى بىلەن ئەسەك تۇتىدۇ. پېشقەدەم تەۋپلار "ئەسەش گەجگە گوشلىرىنىڭ تارتىشى ئالامەتلىرىدۇر." دەپ كورسىتىدۇ. كېسەل بۇ ۋاقىتتا بىئاراملىشىپ، قايى خىلىت كۆپ بولسا شۇ خىلىتنىڭ ئالاھىدىلىكلىرى كۆرۈنىدۇ. مەسىلەن، بەلغەمدىن بولسا رەڭگى ئاق، ھورۇن، ئېغىر تەبىئەتلىك بولۇپ تومۇرى تېغرىسىغا سالىدۇ. سۇيۇك ئاق قويۇق بولىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئاغرىق تۇيۇقسىزدىن تارتىشىپ قالىدۇ. ئېغىر ھالەتتە ھۇشىدىن كېتىدۇ. كىچىك بالىلار ۋە قېرى كىشىلەرنىڭ ساقىيىشى قىيىن.

نەملىك سۇيۇقلۇق يوقىلىش بىلەن بولغان تىز تىشىتا بەدەنلىرى قۇرۇق. رەڭگى تاتارغان ھالدا بولىدۇ. كۆپ سۇيۇقلۇق يوقىتىشتىن تارتىشىپ قالغان ئاغرىقنىڭ تارتىشقان قىسمىغا ياغ ياكى سۇت سۈركەپ قويۇلسا دەرھال قۇرۇپ كېتىدۇ. ئەمما باشقا تۈردىكىلەردە ئۇنداق بولمايدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سەۋەپلەرگە قارىتا چارە قىلىش، ماددىلارنى پىشۇرۇش ۋە تازىلاش تەرتىپلىرىگە ئاساسەن داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

1) بەلغەمدىن بولغان تارتىشىشتا مائىل ئۇسۇلنى كۆلەن بىلەن بېرىپ، تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) ياكى ھەبىي قوقىيا (17 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

تازىلىغاندىن كېيىن قۇست يېغى (30 - نۇسخە) بىلەن ئەزالارنى ياغلاش كېرەك. سەۋدادىن بولغانلارغا تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) ياكى 14 - نۇسخە بېرىلىدۇ.

(2) سۈرگىدىن كېيىنكى تارتىشىشتا، ئالدى بىلەن بەدەنگە ھوللىك يەتكۈزۈش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ئىشەك سۈتى، ئۈچكە سۈتى، ئارپا سۈتى، بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇ-ئابىنى ئارىلاشتۇرۇپ بەدەنگە سۈركەش بىلەن، ئىچىشكە شەرۋىتى بىنەپشە (2 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. تاماققا ئوغلاق گوشى، پالەك قاتارلىق كوكتاتلارنى بادام يېغى بىلەن سىلە بېرىلىدۇ ۋە كۆپ مىقداردا سۇ بېرىلىدۇ.

(3) مىڭە ۋە ئەسەپلەرنىڭ زەرەلەنگەنلىكىدىن بولغانلارغا تۇتقاق كېسەل بايدا كورسىتىلگەنلەر بويىچە چارە قىلىنىدۇ.

(4) زەھەرلىك ماددىلار ۋە مەئدە سەۋەبىدىن بولسا مەئدىنى تازىلاش (قەي قىلدۇرۇپ)، مەدە قۇرۇت-لار بولسا چۈشۈرۈشكە تەدبىر قىلىش لازىم.

گەردەن قېتىپ قېلىش (كۇزاز - تەمەددۇد)

بويۇن، گەردەن گوش ۋە پەيلىرىنىڭ تارتىشىپ قېلىشى. سەۋەبى: (1) سوغاقلىقنىڭ پەيلەر ئارىسىدىكى سۇيۇقلۇققا تەسىر قىلىشى بىلەن پەيلەر (تارىمۇچلار)دا تارتىلىش ھادىسىسى ۋۇجۇتقا كېلىدۇ. سوغاقلىقنىڭ تە-سىرى تۈۋەندىكىچە بولىدۇ:

(1) سوغاقسۇ، قار، مۇزنىڭ، بۇاستە تەسىر قىلد-
شى ياكى سىرتتىن سوغاق تەبىئەتلىك دورىلارنى مەسىلەن،
ئەپيۇن، لۇپاھ يىلتىزى (بىللادۇنا يىلتىزى)، بەڭگى
دېۋانە قاتارلىقلارنى تېڭىش، سوغاق (مۇزدەك) سۇ
ئىچىش ياكى ئەپيۇن يىيش.

(2) سەرسام كېسلى قاتارلىق يۇقۇملۇق كېسەللەر-
دە ياكى باشقا كېسەللەردە قاتتىق ئاغرىش نەتىجىسىدە
بويۇن پەيلىرى تارتىشىپ قالىدۇ. بو ھال كوپىنچە
قاتتىق قۇسۇستىن كېيىن ياكى ھايۋانلارنىڭ چىشلىشى
بىلەن يۈز بېرىدۇ.

(3) قۇرۇقلۇقتىن بولىدۇ (قۇرۇقتىن بولغان تار-
تىشىشقا ئوخشاش).

ئالامەتلىرى: گەردەن قېتىپ قېلىشنىڭ ئوقىرەك
ئالدى ۋە ئارقا تەرىپىدىن باشلىنىشى تەمەددۇد دىيىلىپ
ئاغرىق پۈتۈن يېرىم گەۋدىسىنى ئالدىغا يا ئارقىسىغا
مىدىرلىتالمايدۇ. كۈزادە تارتىشىش بويۇن ۋە گال قىس-
مىدا بولۇپ ئاغرىق بويۇن قىسمىنى پەقەت ھەركەتلەند-
ۈرەلمەيدۇ، ھەتتا تىلىنى مىدىرلىتىشمۇ قىيىن
بولۇپ، گالدىن سۇمۇ ئوتىمەيدۇ.
كۈزازنىڭ باشلىنىشىدىن بۇرۇن پۈتۈن بە-
دەن قىچىشىدۇ. ھەرقانچە تاتلىغان بىلەنمۇ پەسەيمەيدۇ.
كوزى قىزىل بولۇپ كوزنى بىر ئېچىپ بىر يۇمۇپ تۇرىدۇ.
چېكە ۋە ماڭلاي تىزمۇرلىرى كۆپكەن بولىدۇ.

چىرايى قارا رەڭگە كىرىپ قالىدۇ. تەمەددۇد بولغاندا يۈز گۈشلىرىنىڭ تارتىشىپ قېلىشى نەتىجىسىدە ئاغرىقنىڭ يۈزى ھىجايغاندەك قىياپەتكە كىرىپ قالىدۇ. تەمەددۇد سۇيدۇك خالتىسى، ئۈچەي قاتارلىق ئەزالاردا يۈز بەرگەندە سۇيدۇك توختىماسلىق ھەتتا تومۇرلار ئۈزۈلۈپ كېتىشى بىلەن سۇيدۇكتە قان كېلىدۇ. ئۈچەيدە يۈز بەرسە قولىنچى يەنى ئۈچەي توسىلىش كېلىپ چىقىدۇ. **داۋاسى:** (1) ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن گۈل بە- مەپشە 1 مىقال، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم 9 دانە، ئارپا بېددە- يان 3 مىقال، گازىۋان، رۇمبىدىيان $\frac{1}{2}$ مىقال، كا- سىن يىلتىزى، سورۇنجان 2 مىقالدىن ئېلىپ كاشكاپ تەرىقىسىدە دەملەپ بېرىلىدۇ.

(2) تازىلاش ئۈچۈن — تۇربۇت $\frac{1}{2}$ 2 مىقال،

سانا 7 مىقال، قۇنۇس، خىيارشەنبەرھەربىرى 2 سەردىن، بادام مېغىزى 5 دانە ئېلىنىدۇ. توربۇت بە- لىن بادام مېغىزى بىرئاز سۇقىلىدۇ. قالغان دورىلارنى سوقماستىن ئاخشى بىرچىنە قايناقۇغا چىلاپ قويۇپ ئەتىسى سىقىپ، سۈزۈپ بىراقلا ئىچىدۇ.

قوۋۇرغا ئارىلىق ئەسەپلىرىنىڭ ئاغرىشى
(ۋەجىئىل خاسرە)

سەۋەبى: ئاياللاردا ھېمىز توختاپ قېلىشى ياكى بالىياتقۇنىڭ بوغىلىشى سەۋەپ بولىدۇ. تۇتقاق كېسەلنىڭ

بىر ئالامىتى بولۇپمۇ كېلىدۇ. ئاساسەن قوۋۇرغا تەرەپكە بارغۇچى يۇلۇن ئەسەبلىرىنىڭ ياللۇغلىنىشى سەۋەپ بولىدۇ. ئالامىتى: ئاغرىش بەل ساھەسىدە كۆپ بولۇپ قوۋۇرغىلارغا تارىلىدۇ. بېسىپ تۇرسا ئارام بېرىدۇ. **داۋاسى:** مىزاجنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن مائىل ئۇسۇل (24 - نۇسخە)، ياغلاش ئۈچۈن قۇست يېغى (30 - نۇسخە)، يېپىشكە سەنجاننا (33 - نۇسخە) ياكى 25 - نۇسخىدىكى دورا بېرىلىدۇ.

بەل ئاغرىقى (ۋە جىمىل قەتەن)

سەۋەبى: بەدەننىڭ زەئىپلىكى، ئېغىر ئەمگەك، سوغاق تېگىش، كۆپرەك ھوللۇكتىن بولىدۇ. مۇپاسىلىنىڭ بەل ئۇمۇرتقىلىرىنى زەرەرلىشى بىلەنمۇ بەل ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ. **ئالامەتلىرى:** كېسەل تېز باشلىنىدۇ. بەلنىڭ ئاغرىشى بىلەن ئاغرىق ئورە تۇرالمايدۇ. ھەتتا ئولتۇرغاندا دېمۇ ئاغرىيدۇ.

داۋاسى: (1) بەل ساھەسىنى ياغلاش ئۈچۈن قۇست يېغى ياكى قىچا يېغى بېرىلىدۇ. لوپان، مەستىكى 1 مىسقالدىن، ھەسەل، شېكەر 7 مىسقالدىن ئېلىپ، ئالدى بىلەن ھەسەلنى بىر ئاز قىزىتىپ باشقىلارنى ئېزىپ ئارىلاشتۇرۇپ بەلگە سۈركەشكە بېرىلىدۇ ياكى لوپان، مەستىكى ۋە گۈل يېغىنى 3 مىسقالدىن ئېلىپ ياغ تەييارلاپ ئاغرىق جايىنى ياغلاشقا بېرىلىدۇ.

(2) يېمىشكە مەجۇن فىلاسىپە (18 - نۇسخە) 3
مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(3) بەلغەم زىيادە بولسا زىماد قىلىش ئۈچۈن
ئاق مومدىن 2 مىسقالنى 8 مىسقال گۈل يېغى بىلەن
ئېرىتىپ ياغلاشقا بېرىلىدۇ. بۇندىن كېيىن ئاق ئەيلى
گۈلى، بابۇنە گۈلى، ئەكىلىل مىلىك، شۇمىشا ئۇرۇغى،
زىغىر، ئارپا ئۇنىنىڭ ھەر بىرىدىن باراۋەر مىقداردا
ئېلىپ سوقۇپ ئىنەك پىستى يېغى قوشۇپ بىر ئاز ئىسسىتىپ
ئاغرىق جايغا تېگىش لازىم.

(4) تازىلاش ئۈچۈن ھەبىي ئايارەج (7 - نۇسخە)
بېرىلىپ، ئارقىدىن جاۋارش جالىنۇس (3 - نۇسخە)
ياكى مەجۇنى فىلاسىپە (18 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇلارنى
بىر سەر بېدىيان ئەرەقى بىلەن بېرىش لازىم. تازىلى-
غاندىن كېيىن ئىتتىپىل سەغىر (5 - نۇسخە) ۋە مەجۇنى
سورۇنجان (34 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

يانپاش ئاغرىغى (ئەرقۇنىسا)

ئەرقۇنىسا يانپاش بوغۇمىدىن باشلىنىپ پۇتۇن
پۇت ئەتراپىغا شاخلايدىغان كوك تومۇرنىڭ ئىسمى
بولۇپ، ئەرقۇنىسا كېسىلى شۇ تومۇر ئەتراپىدىكى پەي
ۋە ئەسەپلەرنىڭ ئاغرىغىدۇر. ئاغرىش بەك قاتتىق بولۇپ
يانپاشتىن باشلىنىپ ئوشۇق ۋە پۇت بارماقلىرىغىچە
تارقىلىدۇ.

سەۋىيى: (1) ھەركەت قىلماسلىق نەتىجىسىدە

بوغۇملارغا كېرەكسىز سۇيۇقلۇقلار يىغىلىدۇ. (2) مەئدە -
 نىڭ ھەزىم قىلىشى ناچار بولغاندا خىلىتلار خام قېلىپ
 بوغۇملارغا يىغىلىپ قالىدۇ. (3) تاماق يېمىش ۋە تۇر -
 مۇشتىكى تەرتىپسىزلىكلەر، مەسىلەن ھەرخىل ئىسسىق -
 سوغاق تاماقلارنى قالايمىقان يېمىش، قوساق بەك توق
 چاغدا جىنسى ئالاقە قىلىش، مونچىغا چۈشۈش، ھەركەت
 قىلىشلار. (4) زۇكام ماددىلىق بولغاندا ماددىنىڭ بو -
 غۇملارغا توكلۇشى. (5) ئادەتتە بولۇپ تۇرىدىغان ھەيدەپ
 چىقىرىشنىڭ توختاپ قېلىشى، مەسىلەن سۈرگە ئىچىپ
 كۈنۈپ كەتكەن كىشىلەر بىر مەزگىل سۈرگە ئىچمەي
 قويۇش. قان ئالدۇرۇپ ئادەتلەنگەن كىشى قان ئالدۇر -
 ماي قويۇش، ئاياللاردا ھېيىز توختاپ قېلىشقا ئوخشاش
 سەۋەپلەر بىلەن بەدەندە ئارتۇقچە ماددا كۆپۈيۈپ ئۇلار -
 نىڭ بوغۇملارغىمۇ يىغىلىشى. (6) بەلغەم، قان ماددى -
 لىرىنىڭ غەيرى تەبىئى ئۆزگىرىشى، ياكى مەزكۇر ئىككى
 خىلىتنىڭ بىرلىكتە تەسىر قىلىشىدىنمۇ پەيدا بولىدۇ.
 يەلدىن كامراق يۈز بېرىدۇ، سەپرا ۋە سەۋادىن بولمايدۇ.
داۋاسى: باشقا بوغۇم ئاغرىقلىرى بىلەن ئوخشاپ
 كەتسىمۇ لېكىن داۋالاش جەھەتتە پەرقلەندۈرۈلۈشى. بۇ ئاغرىقتا
 قەي قىلدۇرغۇچى دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. ئۇلارنى
 بەرگەندە ئاغرىقنى كۈچلەندۈرۈپ قويىدۇ. چۈنكى بۇ
 كېسەلدە ماددا بەدەننىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىدا بولىدۇ.
داۋاسى: (1) ھېيىز ياكى بوۋاسىر قېنى توختاپ

قېلىشى نەتىجىسىدە بولسا باسلىق ۋە ئۇرۇنسا تومۇرىدىن قان ئېلىش كېرەك. جالىنۇس ماسبىز ۋە ساقىن تومۇرىدىن قان ئېلىش كېرەك دىگەن. قايسى تومۇردىن قان ئېلىش مەسلىسىنى كېسەلنىڭ ئەمىلىي ئەھۋالىغا قاراپ بەلگىلەش لازىم. قاننى كۆپ ئالماسلىق كېرەك. بۇ كېسەلنى داۋالاشتا تېزىرەك چارە قىلىش لازىم. بولمىسا ئاغرىق يامانلىشىپ كېتىدۇ. ھەر قېتىم قان ئالغاندىن كېيىن بىر مەزگىل دەم ئېلىش لازىم. ئەمما ئارىلىق بەك ئۇزۇن بولماسلىقى كېرەك.

(2) ئاغرىق توختىتىش ئۇچۇن — سېرىق چېچەك بىلەن كۈنجۈت چېچىگىنى سوقۇپ قويۇش ياكى مەرزەن جۈش، يابۇنە، يانتاق ياپرىقى، ئەكىلىل مىلىك ھەر بىرى 10 مىسقالدىن، سېپەندىن ئۇرۇغى 5 مىسقال سوقۇپ بىر ئاز سۇ بىلەن نەم قىلىپ ئاغرىق ئورۇنغا چاپلاپ قو-يۇلىدۇ.

(3) داغلاش — ئۇرۇنسا تومۇرىنى ئىزلەپ* تېپىپ داغلاش بىلەن ساقايىتىش مۇسكىن. داغلاش ئۇسۇلى تو-مۇرىنى قىزىتىپ پاقالچەكنىڭ ھوشۇقتىن 8 سانتىمېتىر يۇقۇرى ئورنىدىن ئۇرۇنسا تومۇرىنى ئىزلەپ تومۇر ئۈستىنى داغلاش لازىم. باشقا ئۇسۇللار بىلەن نەتىجە ھاسىل بولمىغاندا داغلاش چارىسى قوللىنىلىدۇ.

* ئۇرۇنسا تومۇرىنى ئىزلەش ئۇسۇلى ھەققىدە "ئەن-ئىلىش" بابىدا قاراڭ.

(4) بابۇلە، ئەكىللىلىك، قەنىشەرىيەن، چىگىيەي يىلتىزى، ھاشا، سېرىق چىچەك، سۇتتەر ھەربىرىدىن 10 مىسقالدىن ئېلىپ ئۇلارنى قاينىتىپ ئىسقراق ھالدا ئاغرىق تەرەپنى يۇيۇشقا بېرىلىدۇ.

(5) ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن — گۈل بىنەپشە، قەسىپى زەرىرە، ئىت ئۇزۇمى، بېدىيان يىلتىزى، شاتەرە، سورۇنجان ھەر بىرىدىن 2 مىسقالدىن ئېلىپ، بىر دانە قۇرۇتۇلغان مۇناقى ئۇزۇم بىلەن بىللە قايناقسۇغا چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ سۇزۇپ 12 مىسقال تەرەنجىۋىل قوشۇپ سەھەردە بىراقلا ئىچىدۇ.

(6) سۇرۇش ئۈچۈن — گۈل بىنەپشە، كاسىن يىلتىزى، بېدىيان يىلتىزى ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، ئۇرۇقسىز ئۇزۇم 9 دانە، گازىۋان گۈلى بىر مىسقال، ئەگرى تەرەخمەك ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، گازىۋان ياپرىغى، پىرسىياۋشان، ئىت ئۇزۇمى $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، چىلان،

سەرىپىستان 5 دانىدىن، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، ھەمىشۋا گۈلى، ئاق لەيلى گۈلى، قىزىل گۈل، سانا، ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، فۇنۇس، گۈلقەن، خەمىرى بىنەپشە، تەرەف جىۋىل، قارا شېكەر ھەربىرى 7 مىسقالدىن، بادام مېغىزى 5 دانە.

تەييارلاش: پۇنۇس، تەرەنجىۋىل ۋە سانادىن باشقا

دورلارنى چالا سوقۇپ 2 چىنە سۇدا قاينىتىپ سۇزۇپ بولۇپ سانا، پۇنۇس، تەرەلجىۋىلىنى تاشلاپ بىر قاينىتىپ ئۇستىگە گۆلەن ۋە خەمىرى بىنەپشىنى ئارىلاشتۇرۇپ بىراقلا ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

(7) يىيش ئۈچۈن ھەبىي سورۇنجان (37 - نۇسخە) 2 مىسقال ئىتتىرىپىل سەغىر بىر مىسقال بېرىپ، ئارقىسىدىن ئەگرى تەرەخمەك ۋە قوغۇن ئۇرۇغىنىڭ ھەمدە ئوغرى تىكەنلەرنىڭ شىرىسىنى چىقىرىپ بېرىلىدۇ. ياكى سۈپۈيى سورۇنجان (35 - ياكى 36 - نۇسخە)، نىلۇفەر شەرۋىتى ياكى ئىت ئۇزۇمى شەرۋىتى بىلەن بىللە بېرىلىدۇ.

قاش ئارىسى ئاغرىش (ئۇسابە)

ئىككى قاش ئوتتۇرىسىدىكى جايىنىڭ ئاغرىقى ئۇسابە دىيىلىدۇ.

سەۋىيى: خاس ئىسسىقلىقتىن بولىدۇ. يەنى مىڭگە ئىسسىق ئوتۇش (ئاپتاپتا ئۇخلاش)، بەدەندىن ئورلىگەن بۇخاراتلارنىڭ مىڭە ئالدىنقى قىسمىغا تەسىر قىلىشى سەۋەپ بولىدۇ. ئاغرىش كۈن چىقىش بىلەن باشلىنىپ كەچ كىرگەندە پەسىيىپ قالىدۇ.

داۋاسى: كافۇرنى گۈل يېغى بىلەن ئېرىتىپ بۇرۇندىغا تامغۇزۇلىدۇ. ئەگەر بۇرۇندىن قان ئېلىنسا پايدىسى كۆپ بولىدۇ. بۇرۇندىن قان ئېلىش مۇمكىن بولمىغاندا قىپال تومۇردىن قان ئېلىش لازىم.

بەدەن بولجۇڭ گۇشلىرىنىڭ تارتىشى (ئىختىلاج)

قاپاق ۋە بەدەن گۇشلىرىنىڭ لىكىلىداپ تارتىشى ئىختىلاج دەپ ئاتىلىدۇ. تارتىش يۈز، كۆز، قاپاقلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ.

سەۋەبى: بەلغەم ياكى قان ماددىسى سەۋەپ بولىدۇ. ئالامەتلىرى: يۈز، قاپاق ياكى باشقا ئەزالار ئىختىيارسىز ھالدا تارتىدۇ. ئەگەر تارتىش يۈز، كۆز ياكى قاپاقلاردا ئۇزۇنراق داۋام قىلسا، بۇ لەقۋانىڭ ئالامىتى. قوساق ئەتراپلىرىدا بولسا تۇتقاق كېسەلنىڭ باشلىنىشى؛ قولتۇق ۋە قوۋۇرغا ئەتراپلىرىدا بولسا شۇ جايلاردا ياللۇغلىنىش بارلىغىنى ئىپادىلەيدۇ. پۈتۈن بەدەندە بولسا سەكتەنىڭ باشلىنىشى بولىدۇ.

داۋالاش: يېنىك بولسا تاش تۇزنى قىزىتىپ قويۇپ ئىسسىق ئۆتكۈزۈش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ. ئىغىر بولسا بەلغەم ماددىسىنى يېشۇرىدىغان ۋە سۇرىدىغان دورىلارنى بېرىش لازىم. ئاياللاردا ئەگەر ھېمىز نوختاپ قالغان بولسا قان ئېلىش كېرەك.

II ماقالا. كوز كېسەللەكلىرى

1 - پەسىل: كوز كېسەللەكلەرنىڭ سەۋىيىسى ۋە داۋالاش چارىلىرى.

1. كوز مزاجلىرى ۋە ئۇنى بىلىش.
كوزنىڭ مزاجى ھول ئىسسىق. كوز ھەركىتىنىڭ تېزلىكى، قاپاق ئېچىلىش ۋە يېپىلىشنىڭ تېزلىكى، كوز ئىچىنىڭ ئىسسىق ۋە نەم بولۇشىمۇ بۇنىڭغا دالالەت قىلىدۇ.

كوك كوزنىڭ ھول ئىسسىقلىقى كامراق، قارا كوزنىڭ ئىسسىقلىقى باشقا رەڭدىكى كوزلەردىن كۆپرەك بولىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن كوزگە سۇ چۈشۈش (نۇزۇلۇما) قاتارلىق كېسەللەر كۆپ ئۇچرايدۇ. قىزىلغا مايىل كەلگەن كوز موتىدىل مزاجدىكى كوز بولىدۇ.

كوز كېسەللىكى كوزنىڭ تۈزۈلۈشىگە ئاساسەن تۆت تۈرگە بۆلۈنگەن. مەسىلەن، (1) كوز مزاجىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن بولغان كوز كېسەللىرى، (2) ماددىلار سەۋىيىسىدىن بولغان كوز كېسەللىرى، (3) ھەرخىل ۋەزەم ۋە جاراھەتلەر تۈپەيلىدىن بولغان كوز كېسەللىرى؛ (4) كوز قىسمىلىرىنىڭ ئۆزگىرىشىدىن پەيدا بولغان كوز

كېسەللىرى. مەسىلەن، كۆزگە بىر نەرسىنىڭ 2 كۆرىنىشى،
كۆز قارىچۇغىنىڭ سىرتىغا چىقىپ تۇرۇشى قاتارلىقلار.

2. كۆز كېسەللىكلىرىنى داۋالاش چارىلىرى.

كۆز ئاغرىقلىرىنىڭ سەۋەپلىرى تۆت خىل بولغىنى -
دەك ئۇنى داۋالاشنىمۇ تۆۋەندىكى تۆت خىل تەدبىرنى
قوللىنىش لازىم.

(1) مىزاجنى ئۆزگەرتىش: ئىسسىق بۇزۇق مىزاج
بولسا ئىت ئۇزۇمى سۈيى، كاسىن، ئوسۇڭ سۈيى، قىزىل -
گۈل ئەرەقى، تۇخۇم ئېقى ياكى بىنەپشە گۈلىنىڭ يېغى
قاتارلىقلارنى ئىشلىتىش كېرەك. ئەگەر سوغاق مىزاج
بولسا ئىپار، مامرانچىن، ئىگىر، پىلىپىلەرنى قوللىنىش
لازم. نەملىك ئارتۇق بولغاندا توتىيا، ئىقلىمياغا
ئوخشاش سۇيۇقلۇقنى تارتقۇچى دورىلار بېرىلىدۇ.
قۇرۇق بولسا بادام مېغىزى، تۇخۇم ئېقى، قىزىلگۈل
گۈلابى، ئادەم سۈتى ئىشلىتىلىدۇ. مىزاجنى ئۆزگەرتىشتە
يېمەك - ئىچمەكلەرگىمۇ دىققەت قىلىش لازىم.

(2) ماددىنى چىقىرىپ تازىلاش: ماددا كۆز ياكى
مىڭىدە بولسا تازىلىغۇچى دورىلارنى بىرىش ياكى ھىجا -
مەت قويۇش، كۆز كېسەللىرىدە قان ئېلىشقا بەلگىلەنگەن
تومۇرلاردىن قان ئېلىش كېرەك. چۈشكۈرتكۈچى دورى -
لارنى بۇرۇنغا تارتىش ياكى كۆزدىن ياش ئاققۇزۇش
چارىلىرى ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. ئەمما ئالدى بىلەن
بەدەننى تازىلاش لازىم. ئۇنداق قىلمىغاندا ماددا يەنە
كۆزگە يىغىلىپ قالىدۇ.

(3) كوز جاراھەتلىگەندە سۇيۇق دورىلارنى كۆپ ئىشلەتمەسلىك كېرەك. ھەم بەكمۇ قۇرۇق بولماسلىقى لازىم. كوزنى كويدۇرگۇچى، قاتتىق ئېچىشتۇرغۇچى دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ، كوزگە ئىشلىتىدىغان دورىلار دائىم كوزنىڭ مىزاجى بىلەن قارىمۇ-قارشى بولىشى كېرەك. ئۇنداق بولمىغاندا كوزگە زەرەرلىك. مەسىلەن، كوزنىڭ مىزاجى ھول ئىسسىق بولسا بېرىلگەن دورىمۇ ھول ئىسسىق بولسا بولمايدۇ.

(4) كوزدىكى زەرەرلىنىشنىڭ قايسى خىلىتىن كەلگەنلىكىنى ئالدى بىلەن ئېنىقلاش لازىم. ھەم ماددا ئومۇمى بەدەندىمۇ ياكى باشتىمۇ بۇنى كورۇش كېرەك. ئەگەر پۈتۈن بەدەندە بولسا ئومۇمى بەدەنلىك سۈرگە بېرىش، خاس باشتا بولسا مىڭنى تازىلاش چارسىنى قىلىش، ئالدىن كېيىن كوزنى تازىلاش بىلەن شۇغۇللىنىش كېرەك. ماددىنى سۇرۇپ چىقارماي تۇرۇپ ھەرگىز داۋالاشقا قول تىقماسلىق. كوز ئاغرىغى بىلەن باش ئاغرىش بىللە كەلسە تارقاتقۇچى (مۇھەللىل) دورىلارنى ئىشلەتمەسلىك لازىم. چۈنكى ئۇنداق قىلغاندا ئاغرىقنى كۈچلەندۈرۈپ قويۇش بىلەن خەتەرلىك يەتكۈزۈشى مۇمكىن.

ئومۇمى بەدەننى تازىلاش ئۈچۈن ئەينۇلا، بىنەپشە، سېرىق ھېلىلە، قارا ھېلىلە، سانا، ئىلۇفەر، گازىۋان، بېدىيان، ئەپتىمۇن، ئۈستۈخۇددۇس، بىستىپايەج قاتارلىق دورىلار ياكى ھەببى سەبرە بېرىلىدۇ (4 - نۇسخە).

يەرلىك تازىلاش ئۇچۇن كوزىگە مۇناسىپ دورىلار -
نى تامغۇزۇش، شۇمشە قايناتقان سۇ ياكى تازا سۇت
بىلەن كوزنى چايقاش، چۈشكۈرتكۈچى دورىلارنى ئىش-
لىتىش كېرەك.

5) ئەگەر كوزدىكى ماددا سۇيۇق بولۇپ قان
ياكى سەپرادىن بولسا ياكى بىرىكىپ كەلگەن بولسا
قىپال تومۇردىن قان ئېلىش لازىم. قان ئالغاندىن كې-
يىن سۈرگە دورىلار بېرىلىدۇ. ئەگەر يەلدىن بولسا موند-
چىغا كىرىش ۋە يەلنى تارتقۇچى دورىلارنى كوزىگە تې-
گىش كېرەك. كوزنىڭ ھەر خىل ئاغرىقلىرىدىن ساقلىد-
نىش ئۇچۇن كوزىگە ئۆتكۈر تەسىر قىلىدىغان يىمەك-
ئىچمەكلەردىن پەرھىز قىلىش، چاڭ-توزاڭ ۋە تۇتۇندە
ئۇرۇن تۇرماسلىق، كوپ يىغىلماسلىق، يورۇق تارقاتقۇچى
دەرىسلەرگە (مەسىلەن ئاپتاپقا) ئۇزۇن قارىماسلىق لازىم.
كوزنىڭ مىزاجىنى بېلىش، كوز كېسەللىگىنى داۋالاشتا
زور ئەھمىيەتكە ئىگە. بۇلار توۋەندىكىچە ئىپادىلىنىدۇ.
كوزنىڭ ئىسسىقلىقى ئاشقانلىق بەلگىسى - كوز
قىزىل، ھەركىتى تېز بولۇشتۇر. توغۇرلار قىزارغان بولۇپ
تۇتۇپ كورگەندە قىزىق سېزىلىدۇ. كوزنىڭ سوغاقلىقى
بۇنىڭ ئەكسىنچە - كوز يوغان، رەڭگى ئاق بولۇپ كوز -
نىڭ ھەركىتى سۇس بولىدۇ. قۇرۇقلۇقنىڭ بەلگە -
سى كوز كىچىكلىشىپ قالغان بولىدۇ. چاپاق ۋە ياش
بولمايدۇ.

2 - پەسىل: كۆز مۇڭگۈز پەردىسى (تەبىقە - سەلبىيە) كېسەللىكلىرى.

كۆزنىڭ ئەڭ ئالدىنقى قەۋىتى تەبىقىي سەلبىيە يەنى قاتتىق قەۋەت دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ پەردىنىڭ كېسەللىكلىرى ئاساسەن مۇڭگۈز پەردىنىڭ ياللۇغلىنىشى ۋە ئۇنىڭ قۇرۇپ قېلىشىدىن ئىبارەتتۇر.

1. مۇڭگۈز پەردىنىڭ ياللۇغلىنىشى

باشقا قەۋەتلەرنىڭ ياللۇغى بىلەن بىللە كېلىشمۇ بۇمكىن، ئاساسەن كۆرىلىدىغان ئالامەتلەر كۆزنىڭ سىرتقا چىقىپ كېتىۋاتقاندا كۆز سېزىلىشى، كۆز گۆھرىنىڭ چوققۇرى ئاغرىشىدۇر. ئەگەر قان ماددىسى غالىپ بولسا كۆز ئىچى قادىلىدۇ، قىچىشىدۇ، قان ۋە قويۇلغان سەپىدىن بولغان ياللۇغلىنىشتا كۆز ئىچىدە قىزىش ۋە قىزدىرىش يۈز بېرىدۇ. ئەگەر بەلغەمدىن بولسا، كۆز ئېغىر ۋە ھەركىتى سۇس بولىدۇ. مەيلى قايسى خىللىقتىن بولسا، سۇن مۇڭگۈز پەردىنىڭ ياللۇغى كۆزنىڭ سىرتقا تېپىپ چىقىشى (ھوجۇز) نى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر قاندىن بولسا، بىنەپشە، نىلۇفەر، ئاق لەيلى، ئاقلىغان ئارپا، كۈنجۈت يېغى، شېكەرلەرنى ئېھتىياجغا لايىق بېرىلىدۇ. ۋە توۋەندىكى دورىلار بىلەن ھوققە قىلىنىدۇ. چىلان، سەرپىستان، ئەينۇلا.

نەلۇفەر، ئاق لەيلى، يۇمغاقسۇت، كۇنجۇت يېغىنى يېتەر -
 لىك ئىقدازدا ئېلىپ قاينىتىپ تەرەنجىۋىل قوشۇپ
 ھۆقنە قىلىش لازىم. بەدەن كېرەكسىز ماددىلاردىن تازى -
 لانغاندىن كېيىن كۆزگە توۋەندىكى شامچىلار قويۇلىدۇ.
 نىشاشتە، سەمغى، ئەرەبى، كەتىرا ھەر بىرى 2 مىسقال -

دىن، قەلەي كۈشتىسى 6 مىسقال، ئەپيۇن $\frac{1}{3}$ مىسقال،

بۇلارنى يۇمشاق (توزاڭدەك) سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ
 تۇخۇم ئېقى بىلەن خېمىر قىلىپ جىگدە ئۇرۇغى
 چوڭلىغىدا شامچە تەييارلىنىدۇ. ئەگەر ماددا سەپرادىن
 بولسا مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئارقە -
 دىن بىيە ئۇرۇغى، ئاقلانغان ئارپا، تۇخۇمەك ئۇزۇمى ۋە
 ئەنزۇرۇتلەرنى ھاجەت مىقدارى ئېلىپ بىر ئاز قايناقسۇ
 بىلەن تەمىنى چىقىرىپ كۆزگە تېمىتىلىدۇ.

(2) مۈڭگۈز پەردىنىڭ قۇرۇپ قېلىشى - ئاغرىق
 كۆزنىڭ ئارقىغا تارتىشىپ قالغانلىغىدىن زارلىنىدۇ. كۆز -
 نىڭ ئېقى نۇرسىزلىنىدۇ.

داۋاسى: مىگە ۋە بەدەننى ھوللۇك تەرىپىگە مايىل
 قىلىدىغان دورا ۋە غىزالارنى بۇيرۇش كېرەك. ھول
 قاپاقتا ئاش قىلىپ بېرىش، بادام مېغىزى، ئوسۇڭ،
 كۈدە، پالەك، يۇمغاقسۇت، توخۇ گۆشى، پاقلان گۆشى
 قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. بۇرۇنغا قوي سۈتى، بىنەپشە يېغى
 تامغۇزۇش، باشقا قوي سۈتى قۇيۇش بىلەن كۆزگە
 قوي كۆزنى تېگىپ قويۇش لازىم.

3 - پەسىل: قاپاق كېسەللىكلىرى.

قاپاق قىرلىرىنىڭ قېلىنلىشىپ قېلىشى (سۇلاق)

كۆز سۇيۇقلىغىنىڭ تەبىئىي شور بولۇشى بىلەن قاپاق قىرلىرى قىزىرىپ قېلىنلىشىپ قالىدۇ. بۇ ئەھۋال تەرەققى قىلسا كىرىپكەلەر توكلۇپ كېتىپ، قايتا چىققاندا، لىرى تەتۈر چىقىپ كۆز قارىچۇغىغا قادىلىپ ئۇنى زەرەرلەيدۇ. ھەر ئىككىلا كۆزدە بولىدۇ.

داۋاسى: سىناق سۈيى تېمىتىلىدۇ. ياكى ئاچچىق ئانارنىڭ دانىسىنى قاپلاپ تۇرغان نېپىز پەردە، قىزىل-كۈل، ئاقلىغان سىماقلارنى ئېھتىياجلىق مىقداردا ئېلىپ پىشۇرۇپ كۆزگە قويۇلىدۇ. كاسىن، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنى (ياكى كۆكنى) سوقۇپ بىر ئاز كۈل يېغى بىلەن كۆزگە قويسا ئۇنۇمى ياخشى. ھەر كۈنى ئەتىگەندە مونچىغا كىرىشنى بۇيرۇش لازىم.

بۇلار ئۇنۇم بەرمىگەندە پاقالچەك ئەتراپىغا ھىجا-مەت قويۇش، پىشانە تومۇرىدىن قان ئېلىش بىلەن قىزىل شامچە (شىناق ئەھمەر) بېرىلىدۇ.

كۆزدە گۆش ئۆسۈپ قېلىش (شېرقاق)

زۇكام ئەزلە سەۋەبىچى بولىدۇ. كۆزنى ئېچىش قىيىن بولۇپ، قاپاق ئاستىنى قول بىلەن قايرىپ كۆر-گەندە كېرگىتكە ئوخشاش نەرسە ئۆسۈپ قالغانلىقى كۆرىنىدۇ. كۆز ئىچى دائىم ھوللىنىپ تۇرغان بولۇپ، يۇرۇقلۇقتىن قاچىدۇ، كۈنگە قارىيالمايدۇ.

داۋاسى: كېسەلنىڭ دەرھالغا قاراپ قان ئېلىنىدۇ. ھەزىم قىلىش قىيىن بولغان يىمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىدۇ. مۇنچىغا كىرىپ تەرلىنىش، ياشاڭغىراتقۇچى دو-رىلار تارتقۇزۇش ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ. سەبە، ئاقاقىيا، ھۇزۇر (روسۇت)، مامشا شىپا، زەپەرلىرنى تېگىشلىك مىقداردا ئېلىپ ئىرمۇدۇن سۈيى بىلەن يۇغۇرۇپ شامچە قىلىپ قۇرۇتۇپ ساقلاپ، كېرەك بولغاندا بىر ئاز نەم قىلىپ كۆزگە سۈرمە تاتقاندا كۆز تارتىش كېرەك.

كۆز قوتۇرى (جەرە بۇلەيىن) ①

قاپاقنىڭ ئىچى تەرىپىدە مۇدۇر تۈگۈنچىلەر ھاسىل بولۇشتىن ئىبارەت بولۇپ، قاتتىق قىچىش بىلەن قوتۇرغا ئوخشايدۇ. سەۋىي: شور بەلغەم بولۇپ ئىسسىقتىن بولغان كۆزنىڭ ياللۇغلىنىشىدىن كېيىن پەيدا بولىدۇ. چاڭ-توزاڭلارنىڭ كۆزگە كىرىپ كېتىشى، ئۇزۇن مۇددەت تۇتۇنلىك جايدا تۇرۇشۇم بۇنىڭغا سەۋەپ بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆز قوتۇرى تەۋەندىكىچە 4 خىل بولىدۇ. 1) قاپاق تېگىدە ئازراق قىچىش ۋە ئىچى-شىش بىلەن قاپاق ئىچكى يۈزىگە ئۇششاق مۇدۇرلار پەيدا بولىدۇ. كۆز بىر ئاز قادىلىدۇ، ياشاڭغۇرايدۇ. **داۋاسى:** ئىپتىمۇن قايناتمىسى (20 - نۇسخە)

① جەرەپ دىگەن قوتۇر مەناسىدا بولۇپ، دوختۇرلار "تراخوما" دەپ ئاتايدىغان كېسەلدىن ئىبارەتتۇر.

بېرىپ بەدەننى تازىلاش بىلەن قىيال تومۇرىدىن قان ئېلىش ياكى ھىجامەت قويۇش، قاپاقنى ئورۇپ تۇرۇپ زەرەرلەنگەن جايغا شىپا ئىھەمەر سۈركەش كېرەك. (دورا قىسمىدا 4 - نۇسخىغا قاراڭ) ياكى قاپاقنى ئوبدان ئورۇپ تۇرۇپ موزانى سۈرۈپ زەرەرلەنگەن جايغا سۈركەش لازىم. كۆز قوتۇرىنىڭ بۇ خىلى ئەگەر ماددىلار ياكى تاشقى سەۋەپلەر (ئۇفۇنەتلەر) تەسىرىگە ئۇچرىمسا ئاقىۋىتى ياخشى بولىدۇ. ئەكسىچە بولغاندا ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ.

(2) قاپاق تېگىدىكى مۇدۇرلەر بىر بىرىگە قوشۇلۇپ چاراهەت ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ئۇفۇنەتلىك سەۋەپ ياكى ماددىلارنىڭ يۇخاراتى بىلەن پەيدا بولىدۇ. ئېچىش، قادىلىش ۋە ئاغرىش يۇقۇرىدىكىگە نىسبەتەن ئېغىر بولۇپ كۆز دائىم ياشاڭغىراپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: (1) مەتبۇخى ئەيتىمۇن بېرىش، قان ئېلىش، ئاغرىق پەسەيتكۈچى شىپالارنى قويۇش لازىم. (2) ئاندىن كېيىن مودۇرلەرنى قىرىش، تاتىلاش لازىم. بەزىلەر شادىنەج بىلەن قىرىشنى كۆرسىتىدۇ. بەزىلەر تومۇر ئەسۋاپلار بىلەن، بەزىلەر بولسا ئەنجىر ياغىچى ياكى ئەنجىر يوپۇرمىغى بىلەن قىرىشنى كۆرسىتىدۇ. كۆپىنچە دەريا بىلەن قىرىشنىڭ ئۈنۈمى ياخشى.

(3) كۆز قوتۇرىنىڭ بۇ خىلى ھەممىدىن يامانراق بولۇپ، قاپاقنى ئورۇپ قارىسا زەخمىلەنگەن جاي خۇددى ئەنجىرنىڭ پوستىدەك توشۇك كۆرىنىدۇ. يۇقۇرقى ئالا-مەتلەر تېخىمۇ ئېغىر بولىدۇ.

داۋاسى: ئىككىنچى خىلغا ئوخشاش بولۇپ، قان ئېلىش، مەتبۇخ بېرىش بىلەن بىللە قاپاقنى كور-ستىلگەن ئۇسۇللار بىلەن قىرىپ قاپاقنى ئېپىزاتىش كېرەك. كۆپىنچە دەريا ياكى ناۋات بىلەن قىرىسىمۇ بولىدۇ. تۇخۇم سېرىغىنى گۈل يېغى بىلەن قاپاق ئۈس-تىگە قويۇش لازىم.

(4) قاپاق تېگىدىكى زەخمىلىنىش قارامتۇل كۆك ئىششىققا ئايلانغان بولۇپ، بۇ خىلدىكى كۆز قوتۇرىنىڭ ئاقىۋىتى ناچار.

داۋاسى: قان ئېلىش ۋە ھىجامە تەتتىن كېيىن ئايىارمىچ پەيقارا (16-نۇسخە) سېرىلىدۇ. قاپاقنى يۇ-قۇرقى ئۇسۇللار بىلەن قىرىلىدۇ. مۇنچىغا كىرىش بىلەن مۇنۇ دورىلارنى بۇرۇنغا تارتقۇزۇپ چۈشكۈرتۈش كېرەك: سەبەز، جاۋشېر، ئەنزۇرۇت، ھاشا، زەپەر، رۇسۇت، ناۋات، ئاچچىق يېمۇق 1 مىسقال، كوندۇش 5 مىسقال. بۇ دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ مەرزەد-جۇش سۈيى بىلەن يۇغۇرۇپ قارىمۇچتەك ھەب قىلىپ قۇرۇتۇپ كېرەك بولغاندا بۇرۇنغا تارتىلىدۇ. ھەم كۆز ئىچىدىكى يامان سۈيەتلىك سۈيۈقلۈكنى چىقىرىشنى مەق-سەت قىلىپ ياش كەلتۈرگۈچى سۈرمىلەر تارتقۇزىلىدۇ. كۆنراپ كەتكەنلىرىگە نىسبەتەن دەستكارە (ئوپىراتسىيە) چارىسى قوللىنىلىدۇ.

قاپاق تېگى ئۈزۈمە سىمان ئۈسە (تۆتەتۈل ئىدجان)
قاپاقنىڭ ئىچكى تەرىپىدە ئۈزۈمە شەكلىدە بەزىگە

ئوخشاش گۆش پەيدا بولۇشتىن ئىبارەتتۇر. بىر خۇددى ساڭگىلاپ تۇرغان ئۇرۇمنى ئەسلىتىدۇ. يۈزۈلغان قاندىن كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن قان ئېلىش، ئاندىن كېيىن سۈرگە بېرىش، يۇمىلاقسۇتنى سىرقۇپ قاپاق ئۈستىگە قويۇش لازىم. بۇلار نەتىجە بەرمىسە، كېسىپ ئېلىۋېتىش كېرەك. **قاپاق قىزلىرىغا سۈگەل چىقىش (سۇلۇلى پۇلۇك)** قاپاق قىزلىرىغا مەرخىل چوڭلۇقتا سۈگەل چىقىدۇ. سەۋىبى سوغاق خىلىتلاردىن ياكى سەۋدادىن بولىدۇ.

داۋاسى: مەتبۇخ ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بىلەن سەۋدانى سۈرگەندىن كېيىن ياغلاش ئۈچۈن زەيتۇن يېغى بېرىلىدۇ. ياكى سىياداننى سىركە بىلەن ئېزىپ بىرئاز تۇز قوشۇپ سۈگەل ئۈستىگە چېپىش ئۈچۈن بېرىلىدۇ. ئەگەر نەتىجە بەرمىسە قىسقۇچ بىلەن قىسىپ تۇرۇپ تۈۋىدىن كېسىلىدۇ (بىرئاز قان ئېقىشقا يول قويۇش لازىم)، قان توختىغاندىن كېيىن جاراھەت ئۈستىگە زاك سېلىنىدۇ.

قاپاقنىڭ قىزىرىپ ئىششى (شىرايى پۇلۇك) قاپاقنىڭ سەۋەپسىزلا قىچىشىپ، ھەرە چاققاندا ك قىزىرىپ، ئىششى بىلەن ئىششى يانماي توختاپ قېلىشقا شىرايى پۇلۇك دەپ ئېيتىلىدۇ. سەۋىبى - كۆپىنچە قان ياكى سەيرادىن بولىدۇ.

داۋاسى: قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىش ياكى

مەتبۇخ ھېلىلە (38 - نۇسخە) قاتارلىق سۈرگۈچى دورىلار بېرىلىپ، شادىنەج، ئەدەسى، مەغۇلدىن سۈرمە تارتىش كېرەك. شەرۋىتى شاتەرە (39 - نۇسخە) بۇ كېسەلگە ياخشى نەتىجە بېرىدۇ.

يىگنە ئاسقۇ (شەئىرە)

كۆزنىڭ قاپاق قىرى ياكى بۇرجەكلىرىدە ئارپا چوڭلۇغىدا مۇدۇر پەيدا بولۇپ، يىرىڭلاپ قىزىپ ئىش-شىيدۇ. قاپاق ھەركىتىگە تەسىر بېرىدۇ، قاتتىق ئاغرىيدۇ، سەۋىبى بۇزۇلغان قاندىن ئىبارەتتۇر.

داۋاسى: سۈرگە بېرىش بىلەن كاسىن، سەبىرە، روسۇت، گىلى ئەرمىنلەرنى ئىپتىياجغا لايىق ئېلىپ يىگنە ئاسقۇ ئۈستىگە چېپىش كېرەك. ئۇندىن كېيىن قىزىتىلغان دۈمبە ياغنى قويۇش لازىم. بۇلارمۇ نەتىجە بەرمىگەندە يىگنە ئاسقۇ قېپى بىلەن كېسىلىدۇ، قان بىر ئاز ئېقىپ توختىغاندىن كېيىن ئۈستىگە زورۇ ئەسفەر سېپىلىدۇ.

ياش خالتىسىنىڭ يىرىڭلىق ئاقەمىسى (غەرەپ،

ناسۇرى چەشم)

كۆزنىڭ بۇرۇن تەرەپتىكى بۇرجىگىدە پەيدا بولۇپ-دىغان خالتىسىمان يىرىڭلىق ئاقما غەرەپ دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ ئاقما دائىم يىرىڭ قېپىغا ئىگە بولىدۇ.

داۋاسى: قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىنىدۇ. سۈرگە

بېرىلىدۇ. ئەگەر قان ئېلىش مۇمكىن بولمىسا، يىرىڭنى تازىلاپ توۋەندىكى نۇسخىدىكى شامچە خالتا ئىچىگە تارتىشقا بېرىلىدۇ. تەركىۋى: سەبىر، كۈندۈر، ئەنزۇرۇت، خۇنسىياۋشان، ئانار گۈلى، كوھلى، زەمچىلەرنىڭ ھەربىرى 4 مىقالدىن، زانگىكار 1 مىقال ئېلىنىپ سوقۇپ شامچە تەييارلاش ئۇسۇلى بويىچە تەييارلىنىدۇ. ئەگەر ئاقىمىنىڭ ئېغىزى ئېتىلىپ قالسا يىرىڭ توپلىشىپ ئىششىق يوغاناپ كېتىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن مېرۇ ئۇرۇغىنى سوقۇپ ئايال سۈتى ياكى ئىشەك سۈتى بىلەن يۇغۇرۇپ ئازراق زەپەر قوشۇپ ناسۇر ئۈستىگە قويۇلسا يىرىڭنى ئاققۇزىدۇ.

(2) يەنە بىر جارىسى كەپتەر ھايىغى، ئېرىتىلگەن زاك، سەككىنەلەرنى لازىم مىقداردا ئېلىپ سىركە بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ياش خالتا ئاقىمىغا سۇرتۇشقا بېرىلىدۇ. ئاقما ئىچىدىكى يىرىڭنى چىقىرىپ بولغاندىن كېيىن يانگاق مېغىزنى قورۇپ، ئالما قېقى ۋە سىماپ تۈزىنى ئارىلاشتۇرۇپ ئاقما ئىچىگە كىرگۈزۈلسە نەتىجىسى ياخشى. **كوزىگە قۇم تىقىلغاندەك ئاغرىش (جەشائىل ئەجفان)**

بۇ كېسەلدە ئويقىدىن كېيىن كوزنى ئاچقاندا كوز ئىچىگە قۇم تىقىلغاندەك سېزىلىدۇ. كوزنى بىرقانچە قېتىم ئېچىپ-يۇمۇش بىلەن ئۈزلىگىدىن تۈزۈلۈپ كېتەدۇ. كوز ئىچى قىزارغان ۋە چاپاقلاشقان ھالدا بولىدۇ. سەۋەبى: قويۇق ماددىنىڭ كۆپلىگىدىن پەيدا بولىدۇ. داۋاسى: مونچىغا كىرىش، قايناقسۇ مورىغا كوزنى

تۇتۇپ تۇرۇش قاتارلىق يۇمشاتقۇچى چاريلارنى قىلىش لازىم. بەلغەمنى تازىلاش سۈرگىسى (42 - نۇسخە) بېرىش بىلەن شىپاى ئەھمەر (40 - نۇسخە) شامچىسى كوز ئىچىگە قويۇلىدۇ.

كىرىپىكنىڭ توكۇلىشى

(ئىنتىشارۇل ئەھداپ، رەزىدەئى موژگان)

سەۋىبى: بەلغەم ياكى سەۋدا خىلىتلىرى ياكى قۇرۇقلۇقنىڭ غالىپ بولۇشى؛ قاپاق قىرلىرىنىڭ زەرەرلەشمىشى؛ تەپ ئاغرىقلىرىدىن كېيىن دائىل سۇئەپ^① كېسىلى بىلەن ئاغرىش.

داۋالاش: ئالدى بىلەن سەۋىبىگە قاراپ سۈرگە بېرىلىدۇ. ئەگەر قىچىش بولسا، ھەجرى ئەرمىنى سۇرۇپ چىپىش لازىم. دائىل سۇئەبتىن بولسا، كىرىپىك ئۈستىگە سۈرمەروشنايى سۈرتۈش كېرەك. ياكى توۋەندىكى چارە قىلىنىدۇ.

خورما ئۇرۇغىنى كويىدۇرۇپ سۇمبۇل، لاجۋەرد، كۈندۈر، كۈندۈر تۇتۇنى^② نى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ ئارىلاشتۇرۇپ كىرىپىك ئۈستىگە سۈركەش لازىم. قۇرۇق -

① دائىل سۇئەپ: تۈلكە كېسىلى دېگەن مەنادا بولۇپ، بەدەن تۈلكىلىرىنىڭ توكۇلۇشىدۇر.

② كۈندۈر تۇتۇنىنى ئېلىش ئۇسۇلى: كۈندۈرنى ئوتقا سېلىپ چىقۇۋاتقان ئىسقا بىر دانە چىنىنى دۈم قىلىپ تۇتقاندا چىنە ئىچى ئىلىشىدۇ. سوۋىغاندا ئىس قىرىپ ئېلىنىدۇ.

لۇقتىن بولغان بولسا ھوللەندۇرگۈچى تەدبىرلەرنى قىلىشى بىلەن ئىسپھان سۇرمىسى سۇرتۇش كېرەك.

كىرىپىكىنىڭ ئاقىرىپ قېلىشى

ياشلاردا كىرىپىكىنىڭ ئاقىرىپ قېلىشى بەلغەم خام قىسمىنىڭ تەسىرىدىن بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن بەلغەم سۇرگىسى بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن شۇمشە ۋە ئاق لەيلىنىڭ يوپۇرمىغىنى سوقۇپ چىپىش لازىم. ياكى توغرىغىنى كويدۇرۇپ چاۋا ياغ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كىرىپىك ئۈستىگە سۈركەشكە بېرىلىدۇ.

كوز ياشاغۇراش (دەمەئە)

بۇ كېسەلدە كوز دائىم نەملىشىپ تۇرىدۇ ۋە ياش ئاقىدۇ.

سەۋىبى: تۇغما بولىدۇ؛ تۇتۇش قۇۋۋىتى ياكى ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىز بولۇشى؛ ئۆتكۈر دورىلارنى ئىشلىتىش؛ كوز بۇرجىگىدىكى گوشنىڭ كەم بولۇشىدىن ئىبارەتتۇر. يەنە ناخۇنىنى كەسكەندىن كېيىن كوز ياشاڭ-غۇرايدىغان بولۇپ قالىدۇ. بەزىدە قىزىتمىلىق ئاغرىقلاردا كوز ياشاغۇرايدىغان بولىدۇ. ئەمما سەۋەپنىڭ يوقىتىلىشى بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ. تۇغما كوز ياشاغۇراش بىلەن كوز گوشلىرىنىڭ يېتەرسىزلىكى سەۋىبىدىن بولغان كوز ياشاغۇراشلار ساقايمايدۇ.

داۋاسى: شىياق مامشا، زەپەر 4 ئارپا مىقدارىدا،

سەبەرە $\frac{1}{2}$ مىسقال، شەبى يەمانى، كوك تاش 1

مىسقالدىن، بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ
كونا ھاراققا چىلاپ سايىدا قۇرۇتۇپ ئېلىپ كوزگە
سۈرمە قىلىپ تارتىلىدۇ. ياكى 41 - نۇسخىدىكى سۈرمە
بېرىلىدۇ.

4 - پەسىل: كوزنىڭ ھەرخىل ئاغرىقلىرى

كوز ۋە قاپاق قىرلىرىنىڭ ياللۇغى (رەمەد)

كوز نېپىز پەردىسى ۋە قاپاق قىرلىرى ياللۇغنىڭ
بەزىلىرى ھەقىقى بولىدۇ. بەزىلىرى قىسقا مۇددەتلىك
بولۇشىمۇ مۇمكىن. بۇلارنىڭ سەۋىيى كۈن نۇرى ياكى
باشقا نۇرلار كوزگە تەسىر قىلىش، ئاپتاپ ئوتۇپ
كېتىشتىن بولغان باش ئاغرىقى، بىر كۈنلۈك بەزىگەك،
چاڭ - توپا، سوغاق، كوزگە ئۇرۇلغان قاتتىق شامال ۋە
سىرتقى زەربىلەردىن ئىبارەتتۇر. كوزدە قىزىرىش، ئېچە -
شىش، ئاغرىش ۋە ياشاڭغۇراشقا ئوخشاش ئالامەتلەر
بولۇپ ئۇلارنى داۋالىمىسۇمۇ سەۋەپلەرنىڭ يوقىلىشى
بىلەن ساقىيىپمۇ كېتىدۇ.

كوز قوتۇرى (تراخوما) بىلەنمۇ كوز نېپىز پەر -
دىسىنىڭ ياللۇغى بىللە كېلىشى مۇمكىن. ئۇنىڭ سەۋىيى
كوزنىڭ مۇدۇرلەر بىلەن سۈركۈلىشىدۇر، بۇ ئەھۋال كوز
قوتۇرىنى داۋالاش بىلەن يوقاپ كېتىدۇ.

كوز نېپىز پەردىسىنىڭ ھەقىقىي ياللۇغى (رەمىدى ھەقىقىي) كوز نېپىز پەردىسىنىڭ قان، سەپرا، بەلغەم، سەۋدا ۋە يەلدىن بىرىنىڭ سەۋىيى بىلەن پەيدا بولغان ياللۇغىدىن ئىبارەتتۇر. ياللۇغلىنىش پەيدا قىلغۇچى بۇ خىللىتلار كوزنىڭ ئىچىدە پەيدا بولۇشى ياكى نەزلە بولۇپ كوزگە چۈشۈشى مۇمكىن. بەزىدە قىزىل تومۇرلار، دىكى ئارتۇقچە ماددىلار كوزگە قويۇلىدۇ. بەزى ھاللاردا كوزگە چۈشىدىغان بۇ خىللىتلار باش ياكى مىڭدىن كەلمەستىن، باشقا ئەزالاردىن كېلىدۇ. چۈنكى كوزنىڭ مىزاجى بۇزۇلۇپ كوز ئاجىزلاشقاندا ۋە كېسەلگە مايىل بولۇپ قالغاندا باشقا ئەزالاردىن ئارتۇقچە ماددىلار كېلىپ قۇيۇلىدۇ.

ئالامەتلىرى: (1) قاندىن بولسا، كوز ئىچى ئۆتكۈر قىزىرىدۇ ۋە كوز تومۇرلىرى كۆپۈشىدۇ، ئاغرىد- مايدۇ، ئەمما قادىلىدۇ. چاپاقلشش ئېغىر بولۇپ قاپاقلاردا دائىم چاپلىشىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىش كېرەك. ئۇندىن كېيىن گۈل بىنەپشە، نىلۇفەر، ئىت ئۆزۈمى، ئەينۇلا، ئاق لەيلى، ئاقلانغان ئارپا، چىلان، سەرپىستان، تەمرى ھىندى، تەمرەنجۈبىللەرنى ئېھتىياجغا لايىق كاشكاپ قىلىپ دەملەپ ئىچىشكە بېرىد- لىدۇ. ھېلىلە سۈيىگە بىنەۋشە ئېزىپ كوز ئۈستىگە چېپىش لازىم. مامشا، ئەنزۇرۇتتىن 8 مىسقالدىن، زەپەر

كەترادىن 1 مىسقالدىن، ئەپيۇندىن $\frac{1}{2}$ مىسقال

ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ يامغۇر سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ
شامچە تەييارلاپ، تۇخۇم ئېقى بىلەن مايلاپ قۇرۇ-
تۇپ، قويۇپ، كوزگە كۈندە 2-3 قېتىم سۈركەش
كېرەك.

(2) سەپرادىن بولسا، قاتتىق قادىلىپ ئېچىش
ئاغرىيدۇ. سېرىق چاپاق كۆپ چىقىدۇ. كۆز ئىچىگە قۇم
تىقىلغاندەك بولۇپ قىزىرىپ تۇرىدۇ. كۆپ ياش ئاقىدۇ،
بەزىدە ياش كەلمەيدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن مەتبۇخ ھېلىلە (38-
لۇسخە) بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن كاسن شىرىسى، ئىت
ئۆزۈمى، يۇمىلاقسۇت ئۇرۇغى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئىسپىغۇل،
بىيە ئۇرۇقلىرىنى سوقۇپ قىز تۇققان ئايالنىڭ سۈتى
بىلەن بىرلەشتۈرۈپ كوزگە تېمىتىلىدۇ. ئاغرىقنى پەسەي-
تىش ئۈچۈن كافۇر شامچىسى ياكى ئەپيۇن شامچىسىنى
كوزگە سۈرتىلىدۇ. تۇخۇم ئېقىنى كوزگە چېپىش ياخشى
نەتىجە بېرىدۇ. يېمىش ئۈچۈن ئاقلانغان ئارپا، ئەينۇلا،
پالەك ۋە كىپەك شىرىسى بېرىلىدۇ. ئوبدان ئوخلاش،
ياخشى دەم ئېلىش كېرەك.

(3) بەلغەمدىن بولسا، ۋەزەم ئېغىر بولۇپ كۆپ
ياشاڭغۇرايدۇ. ئاغرىيدۇ، چاپاق ئاق رەڭدە بولۇپ، كوز-
نى ئېچىش قىيىنلىشىدۇ. قادىلىش بىلەن ئېچىش ئانچە

بولماسلىقى مۇمكىن. باش ئاغرىدۇ، كوز ئېغىرلاشقاندا
سىزىلىدۇ.

داۋاسى: بەلغەمنى پىشۇرۇش ئۈچۈن ئاۋال پىشۇر-

- غۇچى دورىلارنى بېرىش بىلەن بىللە ھەببى ئايارەج
(7 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. كوزگە سۈرتۈش ئۈچۈن تۈۋەن -
دىكى شامچە بېرىلىدۇ. سەمغى ئەرەبى، سەبرە، زەپەر،
مامىشا، رۇسۇتلاردىن ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ، يۇمشاق
سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ سۇ بىلەن يۇغۇرۇپ شام-
چە تەييارلىنىدۇ ياكى سېمىز ئوتنىڭ سىقىپ چىقىرىپ
قۇرۇتۇلغان سۈيى، ئارپا تالقىنى، ئىسپىغۇل، ئىت ئۇزۇمى
سۈيى، قۇندۇز قەرى، زەپەرلەرنى تۇخۇم ئېقى بىلەن
قوشۇپ كوزگە چېپىش ئۈچۈن بېرىلىدۇ.

(4) سەۋدادىن بولسا، كوز ئىچى قۇرۇق بولۇپ

قادىلىدۇ، كوز ئىچى كۆكۈش تۇرسىمۇ لېكىن قاپاق قىر-
لىرى قىزارغان بولىدۇ.

كوز نېپىز پەردىسى ياللۇغنىڭ بۇ خىلى ئۇزۇنغا

سوزۇلىدۇ. كۆپىنچە باش ئاغرىغى قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

داۋاسى: مىڭگە ھوللۇك يەتكۈزۈش تەدبىرلىرىنى

قىلىش لازىم. يىمەك - ئىچمەك جەھەتتە ئوزۇققا باي
بولغان سۇيۇق تاماقلارنى بېرىش كېرەك. بىنەپشە، ئىلۈ-
فەر، ئارپا تالقىنى، ئاق لەيلى، قاپاق گۆشى قاتارلىقلار-
نى ئازراق سوقۇپ يۇمشىتىپ باشقا قۇيۇش ياكى قاينى-
تىپ سۈيىنى باشقا قۇيۇش كېرەك. بۇرۇن ئىچىگە بىنەپ-

شە يېغى، يېڭى سۇت تامغۇزۇش بىلەن بىللە بىيە ئۇرۇغ-
نىڭ لۇئابىنى كوزگە چېپىش لازىم. توۋەندە كورسەتىل-
گەن شىيانى دىنارىنى كوزگە سۇرتۇش ئۈچۈن بېرىلىدۇ.
سۇرگە بېرىشتىن ساقلىنىش كېرەك، بەزى تىۋىپلەر دائىم
سۇرگە قوللىنىدۇ، بۇ خاتا. كوز ئاغرىغىنىڭ بۇ خىلىدا
پەقەت ھوللەندۈرۈش بىلەن چەكلىنىش لازىم.

شىيانى دىنارىنىڭ نۇسخىسى:

قەلەي كىۋىشتىسى، ئىقلىمىيا 1 سەردىن، ئەپيۇن

1 مىسقال، كەتىرا $1\frac{1}{2}$ مىسقال، نىشاستە بىر مىسقال

بۇلارنى سوقۇپ سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ شامچە تەييارلاپ
قۇرۇتۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

كوز ئاغرىغىنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە ئەكىلىل مىلىك
2 سەر، زەپە 4 مىسقال، يۇمىغاقسۇت تالقىنى 1 سەر،
تۇخۇم سېرىغى 3 دانە، سوقۇلغان قۇرۇق نان 1 سەر
بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ تۇخۇم سېرىغى بىلەن مەلەم
شەكلىدە تەييارلاپ كوز ئۈستىگە چېپىش ئۈچۈن بېرىلىدۇ.

كوز ئىچىمىدىكى قىزىل چىمكىت (تۇرغە)

كوزنىڭ ئېقىدا قىزىل ياكى كوكۇشەرەڭلىك چىمكىت
لەرنىڭ پەيدا بولۇشى تۇرغە دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋىيى: كوزنىڭ زەخمىلىنىشى، شامال، توپا -
چاڭلارنىڭ كوزگە قاتتىق تېگىشى ياكى كۈچ بىلەن قەي
قىلىشتىن پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىش بىلەن كوزگە ئايال سۇتى تامغۇزۇش كېرەك. تۇخۇم ئېقىش كوزگە چېپىش ۋە كەپتەر ياكى ئودەكنىڭ قاننىنى يۇلۇپ قانات ئۇچىدىكى قاننى كوزگە تىمىتىش كېرەك. شىيان ئەھمەر (40 - نۇسخە) نى كوز ئىچىگە سۇرتۇش لازىم. بەدەننى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ھېلىلە بېرىلىدۇ (38 - نۇسخە).

كوزگە قانات گۆش ئۇنۇپ قېلىش (زەپەر ياكى ناخۇنە)

ناخۇنە پارسچە تىرناق دىگەنلىك بولۇپ، كوز - نىڭ ئاق قەۋىتى ئۈستىگە تىرناققا ئوخشاش گۆشنىڭ ئوسۇپ قېلىشىدىن ئىبارەتتۇر. بۇ - دائىم كوز بۇرچىگىنىڭ بۇرۇن تەرىپىدىن باشلىنىپ كوز قارچۇغى تەرىپى - گە قاراپ ئوسىدۇ. ھەتتا قارچۇغىنى يېپىۋالىدۇ. قانات گۆشىنىڭ بەزىلىرى قىزىل ياكى سېرىق رەڭدە بولۇپ قاتتىق ياكى يۇمشاق كېلىدۇ.

داۋاسى: جالنىۇس ھېكم "چۇجۇكبويىا يىلتىزى ناخۇنە ئۈچۈن ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ" دەپ كۆرسىتىدۇ. كۈندۈرنى بەسەينىڭ سىقىپ چىقىرىلغان سۈيىدە ئىزىپ بىر سائەت تۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن كوزگە تامغۇزۇش لازىم. ئۆشكە سۈتىنى ھەسل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ كوزگە تام - مۇزۇشقا بېرىلىدۇ. زاڭكار شامچىسى ۋە سۈرمەرۇشتايىلارنى كوزگە تارتىشقا بېرىلىدۇ. قانات گۆشىنىڭ كۈنەرپ

كەتكەنلىرى ياكى قاتتىق بولغانلىرى كېسىپ ئېلىپ
تاشلىنىدۇ. سۈرگە ئۈچۈن ھەبىي ئايارەج (7 - نۇسخە)
بېرىلىدۇ.

كوز ئېقىنىڭ يەللىك ئېشىشى (ئىنتىفاخى مۇلتەھەمە)

كوز ئىچى پۈۋلىگەندەك كۆپكەن سېزىلىدۇ. كوز
بۇرجىگىدە قىچىشىش ۋە ئېچىشىش بولىدۇ. بەلغەم ياكى
يەلدىن پەيدا بولۇشى مۇمكىن.

داۋاسى: بەلغەمدىن بولسا كوز ئېچىز پەردىسىنىڭ
بەلغەمدىن بولغان ياللۇغغا ئوخشاش چارە قىلىنىدۇ.
يەلدىن بولسا يەللىك تاماقلاردىن (مەسلەن. قازان ئېنى،
قىيىلىق تاماقلاردىن) پەرھىز قىلىش، بابۇنەنى قاينىتىپ
ھورىغا كوزنى تۇتۇش لازىم. ھەم بابۇنە، بىنەپشە،
مەيرەلەرنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ سوقۇپ بىر ئاز سۇ
بىلەن نەم قىلىپ قاپاق ئۈستىگە قويۇلىدۇ.

كوز ئېقىنىڭ قىچىشىشى (ھىككە مۇلتەھەمە)

قاپاق تېگىدىن باشلاپ كوز ئىچى سەۋەپسىز قات-
تىق قىچىشىدۇ. ئۈگىلاش ۋە تاتىلاش نەتىجىسىدە قاپاق
ئۈستى ۋە كىرىپك قىرلىرى قىزىرىپ كېتىدۇ.

داۋاسى: سەۋەپچى ماددىسىغا قاراپ سۈرگە بېرىش

لازم، ئىسسىق مۇنچىغا چۈشۈش، ئوتكۈر ۋە تۈزلۈك

تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش لازىم.

كوز قارىچۇغىنىڭ ياللۇغى (ۋەرەمى قارىچى)

كوز تومۇرلىرى قىزىرىپ كوز قارىچۇغىدا ياللۇغ
لىنىش (ۋەرەم) پەيدا قىلىدۇ. ئاغرىقنىڭ ئۆزىگە بولۇت
ياكى تۇتۇندەك نەرسىلەر كورىنىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن قىيال تومۇرىدىن قان
ئېلىش كېرەك. ئاندىن كېيىن مىڭە ۋە كوزنى ماددىلاردىن
تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا ياكى ھەيىي قوقىيا
(16 - 17 - نۇسخىلەر) بېرىلىدۇ. ساماق، پىياز، قوغۇن،
كالا گۆشى، بېلىق گۆشى، شورپا، قورداق قاتارلىق تا-
ماقلاردىن پەرھىز قىلىش، توپا - چاڭ ۋە تۇتۇنلۇك جاي-
لاردا تۇرماسلىق كېرەك.

كوز ئالدىدا پاشا تۇچقاندىك سېزىلىش (خىيالات)

كوز ئالدىدا پاشا، چمۇندەك ئۇشاق نەرسىلەر
تۇچۇپ يۈرگەندەك كورىنىش خىيالات دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋىبى: كوزگە سۇ چۇشۇش (ئۇزۇلۇما) كېسە -
لىنىڭ باشلىنىش ئالامىتى بولۇپ كېلىدۇ؛ مەئىدە
ھەزىم قىلىشنىڭ ناچار بولۇشى نەتىجىسىدىكى بۇسلارنىڭ
يۇقۇرى ئورلىشى؛ كوز يەردىلىرى ۋە سۇيۇقلۇقلىرىنىڭ
زەرەرلىنىشىدىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: كوزگە سۇ چۇشۇش سەۋىبىدىن بول-
غاندا كوز ئالدىدا كورىنىدىغان پاشا كومۇتىدەك نەرسى-
لەر بارغانسېرى كۆپىيىدۇ. داۋاسى كوزگە سۇ چۇشۇش
كېسەلنى داۋالاش بىلەن ئوخشاش بولىدۇ.

مەئدە خىزمىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولسا، قوساق
توق چاغدا خىيالات كۆپ بولۇپ، مەئدە بوش بولغاندا
بولمايدۇ.

داۋاسى: مىڭ ۋە باش تەرەپنى تازىلايدىغان
ھەبىي قوقىيا، ئايارەج پەيقارا (16 - 17 - نۇسخىلەر)گە
ئوخشاش دورىلار بېرىلىدۇ.

كۆز نېپىز پەردىسى ۋە كۆر سۇيۇقلۇقلىرىنىڭ
زەرەرلىنىشى سەۋەپ بولسا كۆز ئىچىنىڭ ئۆزگىرىشلىرى،
باش ئاغرىش ۋە كۆز نېپىز پەردىسىدىن كېيىن بۇ خىل
ئالامەتلەر يۈز بېرىدۇ.

داۋاسى: يۇقۇرقىدەك تاماق ئۇچۇن توقۇت بىلەن
مىكيمان توخۇ پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ. كۆزگە مۇۋاپىق
سۈرمە تارتىشقا بېرىلىدۇ.

كۆزگە ئاق چۈشۈش (بەيازۇلئەيىن)

كۆزنىڭ مۇڭگۈز پەردە (قەرىنە—كورنېيا) ئاستىغا
چۈشكەن ئاق سۇيۇقلۇقتىن ئىبارەت بولۇپ، كۆزنىڭ
كۆرۈش خىزمىتى ئوخشاش بولمىغان ھالدا بۇزۇلىدۇ.
چۈشكەن ئاقنىڭ بەزىلىرى نېپىز بولۇپ "بۇلۇت" دەپ
ئاتىلىدۇ. بەزىلىرى قېلىن بولۇپ مۇتلەق ئاق دىيىلىدۇ.
ئاق بەزىدە كۆز قارىچۇغىنىڭ بىر قىسمىنى قاپلايدۇ
ياكى پۈتۈنلەي قاپلايدۇ.

سەۋىبى: كۆزنىڭ ھەر خىل زەخمىلىنىشلىرى نەتىجىسىدە
ئاق چۈشۈپ قالىدۇ. كۆز نېپىز پەردىسىنىڭ يال

لۇغى ياكى كوز ئېقىنىڭ كېسەللىرىنى داۋالاشتىكى خاتالىقلار سەۋەپچى بولىدۇ؛ شەققە كېسىلىدىن كېيىنمۇ كوزىڭىز ئاق چۈشىدۇ.

داۋاسى: ئېپىز ئاق پەردە داۋالاش بىلەن تۈزۈلۈپ كېتىدۇ. ئەمما قېلىن بولغىنىنىڭ ساقىيىشى تەس.

ئەگەر سەۋەپ مەۋجۇت بولسا، ئالدى بىلەن قان ئېلىش ياكى سۈرگە بېرىش كېرەك. لەيلى قازاقنىڭ سۈيى، قەنتەربون سۈيى، ھەسەللەرنى لازىم مىقداردا ئېلىپ كۈزگە سۈركەش كېرەك. ئەگەر چوڭ قېلىن بولسا بېرىلىدىغان دورىلار كۈچلۈك بولۇشى لازىم. مەسىلەن كويدۇرۇلگەن مېس، زەڭگەر، نوشىدىر، نەمەكى ھىندى، كوپىگى دەريا، زەرمۇرەلەرنى لازىم مىقداردا ئېلىپ يۇم - شاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ كۈزگە تارتىش ئۈچۈن بېرىلىدۇ (زەرمۇرە كۈشتە قىلىنىدۇ) ياكى توۋەندىكى نۇسخە بېرىلىدۇ.

(1) نۇسخە: قىلىورغا (سۇمار) 3 مىسقال، قەنتەربون 5 مىسقال، مەرۋايىت، زەڭگەر 1 مىسقالدىن، بىخ مارجان، بۆرەنەرمىنى (ياكى ئورنىغا توغۇرغۇ) 2 مىسقالدىن، ئۈشە $\frac{1}{2}$ مىسقال، كويدۇرۇلگەن تۇخۇم شاكىلى 3 مىسقال،

تۇتىيا $\frac{1}{2}$ 2 مىسقال، ئىپار 2 تال ئارپا مىقدارى. تەييار -

لاش ئۇسۇلى: تاش دورىلار كۈشتە قىلىنىدۇ. باشقا دورىلارنى

قوشۇپ ئۆيىدەك ئۇششاق سوقۇپ كۈنىگە 3 قېتىم سۈر-
مە قىلىپ كوزىگە تارتىلىدۇ.

2 - نۇسخە: دەريا قۇلۇلىسى (سەرتان نەھرى)،
كوپىكى دەريا، قىلىورغا مايىغى، توخۇ تاشلىغى، مىسىر
توتىياسى، تۇخۇم شاكىلى، مىس، مەرۋايىت (كويىدۇرۇل-
مەن)، ھېقىق، كوك قاش ئېشى، پىلىپىل، ئاقمۇچ، ئىقلىب
مىيا، بىخ مارچان، گىل مەختۇم، مەھمودە كېرەكلىك
مىقداردا ئېلىپ يۇقۇرقىدەك ئۇسۇل بىلەن تەييارلىنىدۇ.

كورۇش زەئىپلىگى (زەئىپىل بەسەر)

كورۇشنىڭ كورۇشى ناچار بولۇش - يىراقتىكى نەرسى-
لەرنى ئېنىق پەرق قىلالمايلىق. توغرا كورەلمەسلىك
مەسلەن، قارا نەرسىنىڭ كوك رەڭدە كورنىشى، كوكنىڭ
قارا كورنىشى، ئۇزۇن نەرسىنىڭ قىسقا، قىسقىنىڭ ئۇزۇن
كورنىشى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت بولۇپ، كورۇش ئالەت-
لىرى (ئاپپاراتلىرى) نىڭ ئۆزگىرىشى بىلەن يۈز بېرىدۇ.
سەۋىيىسى: كورۇش ئالەتلىرىنىڭ زەرەرلىنىشى ۋە
مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: كورۇش ئالامەتلىرى سەۋىيىدىن بول-
غان كورۇش ئاجىزلىغىدا كوزىدىن ئاز مىقداردا قويۇغراق
ياش ئاقىدۇ، ئازراق چاپاقلىشىدۇ، كوز گوھىرى ئادەت-
تىكىگە قارىغاندا چوڭراق بولىدۇ. ئەمما ئاغرىش ياكى
قىزىقلىق بولمايدۇ. تاماقتىن ياكى ئۇيقىدىن كېيىن ۋە

ھەزىم ناچار بولغان چاغلاردا كوزدىكى زەئىپلىك ئېغىرلىشىدۇ.

داۋاسى: مىڭىنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى قوقيا (۱۷ - نۇسخە) ياكى توۋەندىكى سۈرگە كومۇلىسى (ھەببى مۇسەل) بېرىلىدۇ.

سېرىق ھېلىلە، كابۇل ھېلىلىسى، بەلىلە پوستى ھەر بىرى 1 مىقالدىن، سانا 2 مىقال، غارىقۇن،

تۇرپۇت، يۇيۇلغان لاجمۇرد $2\frac{1}{2}$ مىقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئىلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ سۇ بىلەن قارىمۇچ چوڭلۇقىدا ھەپ قىلىپ، بادام يېغى بىلەن ياغلاپ قويۇپ ھەر كۈنى ئاشامدا ۱۱ دانە ياكى ۷،۵ دانىدىن بېرىلىدۇ. كوزگە تارتىش ئۈچۈن سۈرمە رۇشنايى (۴۱ - نۇسخە بېرىلىدۇ).

مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغاندا مىڭنىڭ مىزاجىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن تۇرۇلغا گوشى ياكى مىكىيان گوشە - نىڭ شورپىسىغا ئوقۇت، دارچىن سېلىپ بېرىلىدۇ. بۇرۇنغا ياسمەن يېغى تامغۇزۇش لازىم.

كوزگە توۋەندە كۆرسىتىلگەن شامچىلەرنىڭ بىرىنى سۈرتۈش ئۈچۈن بېرىلسە بولىدۇ.

سېرىق شامچە (شيافى ئەسقىرى) نىڭ نۇسخىسى:
سېرىق ھېلىلە، توتىيا، ئۇدى ھىندى ھەر بىرى 5 مىقالدىن، پىلىپىل، سەمغى ئەرەبى ھەر بىرى 3 مىد -

قالدىن، زەپەر 1 مىسقال. تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سۇ بىلەن يۇغۇرۇپ جىگدە ئۇرۇغىدەك شامچە تەييارلىنىدۇ.

يېشىل شامچە (شېافى ئەخزەر) نىڭ نۇسخىسى:
زەڭگەر 3 مىسقال، كۆيدۈرۈلگەن زاك 6 مىسقال.
ئۇشەق 1 مىسقال، بورەئەرمىنى، كۆپىكى دەريا، قىزىل زەرنەخنىڭ ھەر بىرى 1 مىسقالدىن، نوشىدىر $\frac{1}{2}$

مىسقال. تەييارلاش ئۇسۇلى: ئۇشەقنى سۇزاپ سۈيىدە ئېرىتىپ قالغان دورىلارنى سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ شامچە تەييارلىنىدۇ. سايدا قۇرۇتۇپ كېرەك بولغاندا كۆزگە سۈرتۈشكە بېرىلىدۇ.

كۆزدىكى يات نەرسىلەر (قەزى)

كۆز ئىچىگە پاشا، كوموتىغا ئوخشاش جاندارلارنىڭ ياكى باشقا جانلىق نەرسىلەرنىڭ كىرىپ كېتىشى قەزى دەپ ئاتىلىدۇ.

كۆزگە كىرگەن نەرسە مەيلى قانداق نەرسە بولسۇن ھەرگىز كۆزنى ئۇۋۇلمايلىق كېرەك. ئەگەر بىرەر زەھەرلىك ياكى قاتتىق نەرسە كىرىپ كەتكەندە كۆزنى قالايمىقان ئۇۋۇلاش قارغۇلۇققا ئېلىپ بېرىشى مۇمكىن، چىقىرىش تەدبىرى شۇكى: كۆزگە بىر نەرسە كىرىپ كەتكەن ھامان كۆزنى ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيۇش، بالا ئېمىتىۋاتقان ئايالنىڭ سۈتىنى كۆزگە تامغۇزۇش لازىم. ئەگەر كۆزگە كۆرۈنگىدەك بولسا، پاختا بىلەن ئېلىۋېتىش كېرەك. بۇ

خىل چارىلار نەتىجە بەرمىسە كۆز ئىچىگە توشۇرۇپ
نىشاستە قويۇپ بىردەمدىن كېيىن ئىسسىق سۇ بىلەن
كۆزنى چايقاش كېرەك. كۆز ئىچى زەخمىلەنگەن بولسا،
كۆز جاراھەتلىرى قاتارىدا چارە قىلىش لازىم. قىز تۇققان
ئايال سۈتىگە تۇخۇم ئېقىنى ئارىلاشتۇرۇپ كۆزگە تامغۇ-
زۇش كېرەك.

كۆزگە زەربە تىگىش (زەربە بۇلغەيىن)

كۆزنىڭ سىرتقى تەرەپتىن ئۇرۇلۇش، سوقۇلۇشى
نەتىجىسىدە ھاسىل بولغان قىزىللىق ياكى ئىششىقتىن
ئىبارەت بولۇپ، ھەرخىل سەۋەپلەردىن بولۇشى مۇمكىن.
ئاغرىقتا ھارارەت بولسا، قىپال تومۇردىن قان ئېلىش
كېرەك. ياكى قايىى ماددا زىيادە بولسا شۇنى ياندۇرۇشقا
تەدبىر قىلىش، تۇخۇمنىڭ ئاق - سېرىقىنى ئارىلاشتۇرۇپ
گۈل يېغى بىلەن كۆز ئۈستىگە قويۇش لازىم. ئاغرىش
تۈگەپ كەتكەندىن كېيىن كۆكەرگەن يەرگە يۇمىلاقسۇت،
پىننە، قارىمۇچ ئارىسىدىن چىقىدىغان تاش، زەرنىخلەردىن
باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ كۆز ئۈستىگە قويۇشقا
بېرىلىدۇ. ئەگەر جاراھەت بولسا، جاراھەتلەر قاتارىدا
تەدبىر قىلىش لازىم.

كەچقۇرۇن كۆرمەسلىك (ئەشاشەبىكۇرى) ①

كۆزنىڭ كۆندۈزى ياخشى كۆرۈپ ئاخشىمى ياخشى

① ئادەتتە ناماشىم قارغۇلىغى دەيدىغان كېسەللىك.

كورمەيدىغان ھالغا كېلىپ قېلىشى كەچقۇرۇندا كورمەسلىك
(ئەس، شەيكورى) دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋىيى: كوزدىكى سۇيۇقلۇقلار (رۇتۇبتىلەر) بىر-
نىڭ قويۇقلىشىپ قېلىشى كوزنىڭ كورۇش قۇۋۋىتىنىڭ
ئاجىزلىقى ياكى ماددىنىڭ غەلىزلىكى، ئوزۇقلۇق ماددى-
لىرىنىڭ ياخشى بولماسلىقى سەۋەپ بولىدۇ.

داۋاسى: قان كۆپ بولسا قىيالىدىن قان ئېلىش
لازم. شۇنىڭ بىلەن بىللە ماددىلارنى سۈرگۈچى دورى-
لارنى بېرىش كېرەك. كوزگە تەغۈزۈش ئۈچۈن سۈزۈلگەن
ھەسەلگە بېدىيان سۈيى ئارىلاشتۇرۇپ بېرىدۇ. بۇ ياكى
ئۆشكە جىگىرىگە پىلىپلىنى سوقۇپ سىيىپ كاۋاپ قىلىنىدۇ.
جىگەردىن ئېقىپ چىققان سۈيى ئېلىپ قويۇپ كوزگە
تامغۇزۇلىدۇ، جىگەرنى يېمىشكە بېرىلىدۇ.

كۆزگە سۇ چۈشۈش (نۇزۇللۇلما) ①

”نۇزۇللۇلما“ ئەرەبچە سۇ چۈشۈش دېگەن سۆز
بولۇپ، كورۇشكە توسالغۇچى بولغۇچى سۇيۇقلۇقلار نەتە-
جىسىدە كوزنىڭ كورۇشى ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە
بۇزۇلۇشتىن ئىبارەت. كوزگە سۇ چۈشۈشنىڭ كېلىپ
چىقىشى ۋە سەۋىيى جەھەتتە ئىختىلاپلار كۆپ بولسىمۇ،
كۆپچىلىك تەۋىپلار ئەبۇئەلى سىنانىڭ تەۋەندىكى پىكىرىنى
قۇۋۋەتلەيدۇ.

نۇزۇللۇلما — ئوقياسىمان قاتلام (ئەنەبىيە) توشۇ-

① نۇزۇللۇلما دوختۇرلۇقتا كاتاراكىتا دەپ ئاتىلىدۇ.

گىدە، ئاقسىلىسمان قاتلام بىلەن مۇڭگۈز قاتلام ئارىسىدا تۇرۇپ قالدىغان كېرەكسىز سۇيۇقلۇق (رۇتۇبەتى غەرىبى) لەردىن ئىبارەت. ئۇ سۇيۇقلۇق نەرسىلەر سايىسىنىڭ كۆزگە چۈشۈشىگە توسقۇنلۇق قىلىدۇ.

سۇيۇقلۇق چۈشۈش مىقدار ۋە كەپپىيات جەھەتتە- لىرىدىن ھەر خىل بولىدۇ. مىقدار جەھەتتىن ھەرخىل بولىشى:

سۇيۇقلۇق مەزكۈر توشۇككە قارىغاندا جىقراق بولۇپ، ئۇنى پۈتۈنلەي توسىۋالىدۇ. بۇ ئەھۋالدا كۆز ھىچنەرسىنى كۆرەلمەي قالىدۇ. بەزىدە توشۇككە قارىغاندا ئاز بولىدۇ، ئۇنىڭ بىر تەرىپىنى توساپ، بىر تەرىپىنى ئو- چۇق قويىدۇ؛ توسالغان تەرەپتە تۇرغان نەرسىلەرنى كۆز كۆرمەيدۇ؛ ئوچۇق قالغان تەرەپتىكىلەرنى كۆرۈش مۇمكىن. بەزىدە كۆز نەرسىلەرنىڭ يېرىمىنى ياكى بىر قىسمىنى كۆرۈپ قالغىنىنى كۆرمەيدۇ، لېكىن باشنى ئايلاندۇرسا كۆرەلەيدۇ. بەزىدە ئۇ نەرسىنى بىر قېتىم تولۇق كۆرۈپ، ئىككىنچى قېتىمدا تولۇق كۆرەلمەيدۇ؛ بۇ، نەرسىلەرنىڭ تۇرۇش جايىغا قاراپ تۇنداق بولىدۇ، چۈنكى نەرسە پۈتۈن گەۋدىسى بىلەن توسالغان جاينىڭ ئۇدۇلىدا بولسا، كۆز ئۇنىڭ ھىچبىر جايىنى كۆرمەيدۇ؛ ئوچۇق قالغان تەرەپتە بولغاندا پۈتۈن گەۋدىسىنى كۆرەلەيدۇ. سۇ تولۇق بولمىغان توسىلىش كۆرۈش توشۇگىنىڭ يۇقۇرقى تەرىپىدە بولۇپ، يۇقۇرىنىلا توسىدۇ. ياكى يۇقۇرى ھەم تۆۋەندە

بولىدۇ. گايدا توشۇكنىڭ دەل ئوتتۇرىسىدا بولۇپ،
توشۇكنىڭ چورسى ئوچۇق قالىدۇ. بۇ ھالدا نەرسىلەرنىڭ
ئەتراپى كورىنىدۇ، ئوتتۇرىسى كورۇنمەيدۇ. ھەتتا ئۇ
نەرسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا تۇڭلۇك ياكى چوڭقۇرغا ئوخشاش
بىر شەكىل كورۇنۇپ تۇرىدۇ. يەنى ئۇ كىشى شۇ جايىنى
كورمەيدۇ ۋە ئۇ يەردە بىر قاراڭغۇلۇق كورۇنۇپ تۇرۇپتۇ،
دەپ گۇمان قىلىدۇ.

كوزگە سۇ چۇشۇشنىڭ كەيپىياتى جەھەتتىن ھەرخىل
بولىشىغا كەلسەك ئۇنىڭ قويۇق - سۇيۇقلۇقى ھەرخىل
بولىدۇ. بەزىسى سۇيۇق ھەم سۇزۇك بولۇپ، ئۇرنى (چىراق
يورۇغىنى) ۋە كۈننى توسمايدۇ؛ بەزىسى بەك قويۇق بولىدۇ،
قويۇق خىللىرىدىن شۇنداقلىرى باركى، ئۇ ناھايىتى
قاتتىق بولۇپ، سۇ چۇشۇش دائىرىسىدىن چىقىپ كېتىدۇ
ۋە ئۇنى داۋالىغىلى بولمايدۇ. سۇيۇق ھەم سۇزۇك خىل
دىكىسى داۋالاشنى ئاسان قوبۇل قىلىدۇ.

رەڭ جەھەتتىن ھەرخىل بولىشى - بەزىسى ھاۋا -
رەڭ، بەزىسى ئاق گەژگە ئوخشاش، بەزىسى ئاق مەر -
ۋايىت رەڭلىك، بەزىسى ئاق بولۇپ، كوك ياكى چەشەرەڭگە
ۋە ئالتۇن رەڭگە مايىل كېلىدۇ. بەزىسى سېرىق، بەزىسى
قارا، بەزىسى گۇڭگىرات بولىدۇ. ئۇنىڭ گەژ رەڭدىكىسى
يېشىل، گۇڭگۇرت رەڭلىكلىرىنى تۇم قارا ۋە سېرىغىنى
داۋالاشمۇ ھەتتا كېسىپ ئېلىشمۇ مۇمكىن ئەمەس.

سەۋىبى: (1) يىقىلىش ياكى باشقا زەربە ئەتە -

جىسىدە مېڭە سىلكىنىشى بىلەن مېڭىدىكى سۇيۇقلۇقنىڭ كوز قاتلاملىرىغا چۈشۈپ توختاپ قېلىشى؛

(2) ناچار ئوزۇقلۇق ماددىلىرىنىڭ بۇسلىرى نەتىجىسىدە، خۇددى ئوت ھاسىل بولغاندەك تەدرىجى ھالدا سۇيۇقلۇق كېلىپ كوزگە چۈشۈپ قالىدۇ؛

(3) ئۇزۇنغا سوزۇلغان قاتتىق باش ئاغرىش؛

(4) كۈچ بىلەن قاتتىق قوشۇش؛

(5) قاتتىق سوغاق مىزاجلىق ياكى تەسادىپى ھالدا

قارغا، مۇزدەك سوغاق سۇغا چۆكۈپ كېتىشلەر؛

(6) كوزنىڭ زەئىپلىگى بولۇپمۇ ياشانغان كىشىلەر

ياكى ئۇزۇن ۋاقىت كېسەل بولغۇچىلار كوزنىڭ زەئىپلىگى، ئالامەتلىرى: كوزگە سۇ چۈشۈشنىڭ دەسلەپكى

ئالامەتلىرى ئېنىق سەۋەپچىسى بولمىغان ھالدىكى كوز

ئالدىدا پاشا - كومۇتىدەك نەرسىلەر ئۇچۇپ يۈرگەندەك سېزىلىشتىن ئىبارەت. شۇنىڭ بىلەن بىللە، كوزدە، بو -

لۇپمۇ ئىككى كوزنىڭ بىرىدە خىمىرلىك بولىدۇ ۋە كوزگە چىراققا ئوخشاش يورۇغلۇق نەرسىلەر ئىككى بولۇپ كور -

رىنىدۇ.

كوزگە سۇ چۈشۈش بىلەن كوز ئىچكى قىسمىدىكى

توسىلىشتىن كېلىپ چىققان كوز ئالدىدا پاشا ئۇچقانداك

كورۇنۇش ئوتتۇرىسىدىكى پەرق تۈۋەندىكىچە:

(1) ئەگەر كوزگە سۇ چۈشۈش بولسا كوزنىڭ

بىرسىنى يۇمىغاندا ئىككىنچى كوزنىڭ قارىغۇغى كېڭىيىدۇ.

كوز ئىچكى قىسمىدىكى توسىلىشتا كېڭەيمەيدۇ.

(2) كوز ئالدىدا چىۋىن ئۇچقاندەك كورۇلۇش بىر كوزدە كۆپرەك ئۇچرايدۇ؛

(3) كوز ئالدىدا چىۋىن ئۇچقاندەك كورىنىش بارغانسېرى زىيادىلىشىدۇ. يەنى دەسلەپتە پاشىدەك، كېيىنچە چىۋىندەك نەرسىلەر كورىنىدۇ.

(4) مەيدىنىڭ كۆپكەن ياكى بوش بولۇشى چىۋىن ئۇچقاندەك كورىنىشنىڭ ئاز - كۆپ بولۇشىغا سەۋەب بولمايدۇ.

(5) چۈشكەن سۇنىڭ رەڭگىگە قاراپ ھەرخىل رەڭلىك زەرەرلىنىش كورىنىدۇ.

(6) سۈرگە ياكى ئايارەج دورىلار نەتىجە بەرمەيدۇ. تېۋىپ داۋالاشتىن بۇرۇن زادى كوزگە سۇ چۈشۈشمۇ ياكى ئەمەسمۇ ئېنىق ئايرىشى كېرەك. قالايىمقان چارە - تەدبىر قىلىش بىلەن كوزگە سۇ چۈشۈشنى داۋالاش دائىرىسىدىن چىقىپ ۋاقىتنى قولىدىن بېرىپ قويۇشى مۇمكىن.

داۋاسى: (1) كوزگە سۇ چۈشۈش ئىككىنچىلىكى ئېنىقلىنىپ بولغاندىن كېيىن، ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن ھەببى زەھەپ (44 - نۇسخە)، تازىلاپ چىقىرىش ئۈچۈن مائىل ئۇسۇل (43 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئەمما بۇ خىل دورىلارنى بەرگەندە ئاغرىقنىڭ ئومۇمى ئەھۋالىنى نەزەرگە ئېلىش لازىم. سۈرگە دورىلارنى بەك كۈچلۈك ياكى ئاز - تۇق بەرگەندە زەرەر كەلتۈرۈشى مۇمكىن.

(2) قان ئېلىش، بولۇپمۇ قۇلاق ئارقا تومۇرىدىن

قان ئېلىشنى ئويلاپ بېقىش كېرەك. چۈشكۈرتكۈچى ۋە قەي قىلدۇرغۇچى دورىلارنىڭ پايدىلىق تەرەپلىرى بولسىمۇ لېكىن خەتەردىن خالى ئەمەس.

(3) ئەفئائىلىنىڭ زەھىرىنى كوزگە ناھايىتى ئاز

مقداردا سۈرمىدەك تېمىتىپ بۇ كېسەلنى داۋالاشقا ھەققىدە خاتىرىلەر بار.

بەزىلەر ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن مەتبۇخى قەدە-

تەرىپى بېرىشنى كورسىتىدۇ (46 - نۇسخە)، مەتبۇخى قەنتەرىونغا 3 مىسقال مىقدارى ئايارەج پەيقارانى قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئاغرىق جىنىسى ئالاقە ۋە مىڭىنى سۇلاشتۇردىغان ئىشلاردىن ساقلىنىش لازىم.

(4) ئەبۇئەلى ئىبنىسىنا - نەزۇل ① تامام بولغاندا

كوز پۈتۈنلەي كورمەيدۇ. بۇنىڭ دورىسى پەقەت كېسۋىلىش (قەدەھ) دۇر - دېگەن. ھەقىقەتەنمۇ ئۇزۇللۇلمانى باشلىنىشىدىلا بايقاپ تەدبىر قىلىنسا پايدا قىلىدۇ. ئەمما ئورنىتىپ قالغاندا كېسپ ئېلىشتىن باشقا ئىلاج يوق. بۇ كېسەلگە دۇچار بولغان كىشىنىڭ بەك تويۇپ تاماق يېيىش ۋە ئىچىشتىن، جىنىسى ئالاقىدىن ساقلىنىشى، چۈشتە بىر قېتىم تاماق يېيىش بىلەن چەكلىنىشى كېرەك؛

① قەدەھ - 11 - ئەسەردىكى نۇسخىلارنىڭ كوزگە سۇ

چۈشۈشنى ئوپپراتسىيە قىلىش جابدۇغى مەقدۇھ، كېسۋىلىش ئۇسۇلى قەدەھ دەپ ئاتىلىدۇ.

شۇنىڭدەك بېلىق، ھول مۇۋە، بولۇپمۇ ھەزىم بولۇشى
ئېغىرراق گۆشلەردىنمۇ ساقلىنىشى لازىم.

كوزگە سۇ چۇشۇشنى كېسىۋېلىش تەجرىبىسى:
ئالدى بىلەن كېسىۋېلىشقا مۇمكىن ياكى مۇمكىن
ئەمەسلىكىنى ئېنىقلاش كېرەك (بۇلار يۇقۇرىدا تەپسىلى
سۆزلەندى)، مەسلەن، سۇيۇق ھەم سۇزۇك بولغىنىنى ئالاق،
ئۇنى يورۇق چۇشۇپ تۇرغان دالدا - ئايدا تەكشۈرۈپ
كورۇپ، ئۆستىگە بارماق بىلەن بېسىلىدۇ. ئۇ دەرھال
تارقىلىپ قايتا يىغىلىدۇ. ئاشۇنداق كوزگە چۈشكەن سۇنى
كېسىۋالغاندا يوق بولۇپ كېتىشى مۇمكىن. ئەمما شۇنداق
تەجرىبىنى بىرقانچە قېتىم تەكرارلاش كېسەلنى تىنچىسىز-
لاندۇرىدۇ ۋە كېسىۋېلىشنى قىيىنلاشتۇرىدۇ. بەزىدە
ئۇنى باشقا يول بىلەن سىناپ كورۇلىدۇ؛ كوزگە بىر
پارچە پاكىز پاختا قويۇپ شۇ پاختىغا قاتتىق پۇلىنىدۇ.
ئاندىن يىغىلغان سۇدا قوزغىلىش بار - يوقلۇغىنى بايقاش
ئۈچۈن پاختىنى تېزلىكتە ئېلىپ قارىلىدۇ. ئەگەر قوز -
غىلىش كورۇنسا بۇنى كېسىش نەتىجىلىك بولۇشى مۇمكىن.
بىر كوزنى يۇمغاندا ئىككىنچىسىنىڭ قارىچۇغى كېڭەيسمۇ
كېسىش نەتىجە بېرىدۇ.

كوزگە سۇ چۇشۇشنى كېسىشتىن ئاۋال تىۋەندىكى
بىرقانچە تەدبىرلەرنى قوللىنىش كېرەك:

(1) پۇتۇن بەدەننى خۇسۇسەن مىڭىنى ماددا سۇر-
مى بىلەن تازىلاش ياكى قان ئېلىش لازىم.

(2) تاماقنى ئاز يېرىش. خۇسۇسەن ئېغىز تاماق-
لاردىن، ماددىنى قويۇقلاشتۇرغۇچى نەرسىلەردىن مەسلەن،
كالا گۆشى، ماش، پۇرچاق، سامساق، چەيزە، شوخلا،
تۇرۇپ، قېتىق، ھاراقلارنى چەكلەش، جىنى ئالاقىنى
مەنى قىلىش كېرەك. چۈنكى بۇ نەرسىلەر كوزىگە سۇ
چۇشۇشنى تېزلەشتۈرىدۇ.

(3) ئاغرىقتا باش ئاغرىغى، يۈتەل، زۇكام، يۈرەك
سىقىلىش ۋە تېز غەزەپلىنىدىغان ئەھۋاللار بولسا داۋالاپ
ساقايتىش لازىم. بۇلار كوزىدە ئىششىق پەيدا بولۇش ياكى
كوزىگە سۇ چۇشۇشنى تەكرارلايدىغان ئامىللاردۇر.

(4) كېشى ئالدىدا ھاراقىتىن، جىنى ئالاقىدىن
ۋە مونچىغا چۇشۇشتىن ساقلىنىش لازىم.

(5) "كامالەتكە يەتكۈزۈش" كېرەك. كېسەل باش-
لىنىشىدىلا كەسمەستىن بەلكى سۇ توختاپ، ئۇنىڭ چۇ-
شىدىغىنى چۇشۇپ ۋە ئوزى بىر ئاز قويۇقلانغاندىن كېيىن
كېشى كېرەك. بۇنداق قىلىشتىن مەقسەت چۇشكەن
سۇنى مىقدەدە ياردىمى بىلەن كوزىنىڭ توۋەن قىسمىغا
سۈرگەندە ئۇ ئەنە شۇ جايدا توختاپ قالىدۇ. شۇنىڭ
ئۈچۈن سۇنىڭ قويۇقلۇغى يېتەرلىك بولمىسا قويۇقلاش-
تۇرغۇچى نەرسىلەر بېرىپ قويۇقلاشتۇرۇش ياكى بەك
قويۇق بولسا يۇمشاتقۇچى نەرسىلەرنى بېرىپ ئېتىدالغا
چۇشۇرۇش لازىم. مەسلەن، بېلىق گۆشى يىگۈزۈش، كۈھلى
جاۋاھىر سۈزمىسى تاتقۇزۇش كېرەك. چۈنكى بەك سۇيۇق

ياكى قويۇق بولسا چۈشكەن سۈنى كېسەشكە بولماي قالىدۇ.
 6) باھار پەسلىدىن باشقا پەسلىلەردە كەسكىلى
 بىرلەيدۇ. كۈن ئوچۇق، شامال-بورانسىز بىر كۈنى ۋە
 بەك يورۇق بولمىغان بىر جاينى تاللاش كېرەك.
 7) كېسەلنىڭ ساق كوزىنى تېگىپ بىر كىشىنى
 ئاغرىقنى تۇتۇپ بېرىشكە ياردەملەشتۈرۈش كېرەك.
 8) ئاغرىقنى چىداملىق بولۇش ئۈچۈن كوندۇرۇش
 كېرەك.

كېسەش باسقۇچلىرى: كېسەلنى كوزنىڭ ئىچكى
 بۇرجىكىگە ۋە بۇرنىغا قاراپ تۇرۇشقا بۇيرۇلىدۇ؛ شۇ
 ھالەتنى ساقلاپ تۇرغان ۋاقىت ئىچىدە مەقدەمە بىلەن
 تېشىلىدۇ. بۇ ئەسۋاپنى ئىككى قاتلام ئارىسىغا تاكى
 كورۇش توشۇگىنىڭ ئۇدۇلىغا بارغىچە كىرگۈزۈلىدۇ. ئەسۋاپ
 شۇ يەردە بوشلۇق ۋە ئارىلىققا ئۇچرايدۇ. شۇ چاغدا
 بەزى ماھىر تەبىپلەر مەقدەمەنى چىقىرىۋېلىپ، شۇ ئارى-
 لىققا مېھت^①نىڭ قۇيرۇغىنى تىقىدۇ. ئۇنى كى-
 رۇش توشۇگىنىڭ ئۇدۇلىغىچە كىرگۈزۈپ، مېھتەننىڭ ئوتتۇرى-
 تەرىپى ھەركەتلىنالايدىغان بوش جاي تەييارلايدۇ. ۋە
 ئاغرىقنى چىداشقا ئۈگىتىدۇ. كېيىن مېھتەننى بەلگىلەنگەن
 چېگرىغىچە كىرگۈزۈلىدۇ. ۋە ئۇنى سۇنىڭ ئۈستىگە قو-
 يۇپ، كوزنى تازىلاپ، سۇ موڭگۈز قاتلام ئارىسىغا توۋەن
 تەرەپكە يوشۇرۇنغىچە پەسكە قاراپ بېسىلىدۇ. كېيىن
 ① مېھت، كوزنى كېسەش ئەسۋاپلىرىدىن بىرى.

مەھەتتى خېلى ۋاقىتقىچە شۇ جايدا تۇتۇپ تۇرىدۇ. شۇنداقلا نۇزۇل ئۆتكەن جايغا ئورۇنلىشىدۇ. كېيىن مەھەتتى ئۇ يەردىن ئېلىپ چۈشكەن سۇ بالدۇرقى ئو- رۇنغا قايتامدۇ - يوقمۇ قارىلىدۇ. ئەگەر ئۇ يەنە قايتسا، تاكى ئۇنىڭ قايتماسلىقىغا ئىشەنچ ھاسىل بولغىچە بالدۇرقى تەدبىر تەكرارلىنىدۇ. ئەگەر سۇ پەستكى تەرەپكە چۈشۈشكە بويسۇنمىسا، بەلكى باشقا تەرەپكە چۈشىدىغان بولسا، ئۇنى ئۆزى بېرىۋاتقان تەرەپكە ھەيدەپ شۇ يەرگە چېچىپ تاشلىنىدۇ.

ئەگەر سۇنىڭ قايتقانلىقى (قايتىلانغانلىقى) كو- رۇلسە دەل ئەنە شۇ ئېچىلغان توشۇككە مەھەتتى قايت- تىدىن كىرگۈزۈش لازىم، چۈنكى توشۇك تېخى پۇتۇپ كەتمىگەن بولىدۇ. ئەگەر توشۇككە قان ئېقىپ كەلسە ئۇنىمۇ چۈشۈرۈۋېلىش ۋە ئوز ھالىغا قويماستىن كېرەك. چۈنكى ئۇ يەردە قان قېتىپ قالسا ئۇنى داۋالىغىلى بولمايدۇ.

چۈشكەن سۇنى چۈشۈرۈۋالغاندىن كېيىن كېسەل- نىڭ كوزىگە تۇخۇم سېرىغىنى بىنەپشە سۈيى ياكى گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ پاختا بىلەن قۇيۇلىدۇ. ساق كوزىمۇ باغلاغلىق تۇرۇشى كېرەك. كېسەلنى 3 كۈنگىچە قاراغۇ جايدا ئوڭدىسىغا ياتقۇزۇش لازىم. باش ئاغرىش ياكى كوزدە ئىشىشىلار كورۇلسە بىر ھەپتىگىچە دورىنى يېڭىلاپ، يېڭىنى ساقلاپ ئوڭدا ياتقۇزۇشقا توغرا كېلىدۇ.

ئەگەر ئىششىق يۈز بەرگەندە تېگىق قاتتىق بولسا بىر ئاز
بوشىتىش كېرەك. خۇلاسە قىلىپ ئېيتقاندا كېسەل كىشى
كۆزىگە قويۇلغان نەرسىنى ئاغرىق كەتكىچە ساقلىشى ۋە
تېگىقنى يەشمەسلىكى پايدىلىق. لېكىن تېگىقنى ئادەتتە
3 كۈندە بىر قېتىم يېشىپ دورىنى يېگىلاپ تۇرۇش
كېرەك.

تېگىق يېشىلگەندە قىزىلگۈلنى سۇدا قاينىتىپ بىر
ئاز ئىلمان ھالغا كەلگەندە پاختا ياكى لاتىنى ھوللىپ
كۆزگە قويۇش مۇمكىن.

كۆزگە چۈشكەن سۇنى كېسىۋېلىشتا تىۋىپلارنىڭ
يەنە بىر قانچە ئۇسۇللىرى بار: بەزىلەر مۇڭگۇزسىمان
قاتلامنى يېرىپ شۇ جايدىن سۇنى چىقىرىۋالىدۇ. بىراق
بۇ ئۇسۇل خەتەرلىك. چۈنكى سۇ قۇيۇقراق بولسا، ئۇنىڭ
بىلەن بىللە ئاقسىلىسىمان سۇيۇقلىقنىڭمۇ چىقىشى مۇمكىن.

III ماقالا. قۇلاق، بۇرۇن ۋە كال (تاماق) كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: قۇلاق كېسەللىكلىرى

قۇلاق ئاغرىش (ۋە جىل ئۇزۇن)

قۇلاق ئىسسىق ياكى سوغاقتىن ۋە يەلدىن ئاغ-
رىيدۇ. شۇنىڭدەك قۇلاقنىڭ باشقا ھەرخىل زەرەرلە-
نىشلىرىگە قوشۇلۇپمۇ كېلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىسسىقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىغى:

1. قۇلاق ئىچى قاتتىق ئېچىش بىلەن كىشىنى

بىئارام قىلىدۇ. كوز ۋە قۇلاق ئىتراپلىرى قىزارغان

بولىدۇ. كېسەل قۇلىغىدا ئوت كويۇۋاتقاندا ھىس قى-
لىدۇ، يېرىك ئاقىدۇ ۋە سوغاق تەدبىرلەر قىلىنسا ئارام

بېرىدۇ. مەيدىدىكى سەۋەپتىن كېلىپ چىققان بولسا

قىزىل ئوڭگەچ ئېچىشىدۇ. ئۇسۇزلۇق يامان بولۇپ،

كوزدىن ياش ئاقىدۇ. بەزىدە قاتتىق ئىسسىق ھاۋادا

يول مىڭىش ياكى ئىسسىق ئارىشاڭلارغا چۈشۈش بە-

لەنمۇ قۇلاق ئاغرىغى كېلىپ چىقىدۇ. ئالامەتلىرى يۇ-

قۇرقىدەك بولىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر زورۇر بولسا، باسلىق تومۇر -
دىن قان ئېلىش ۋە سوغاق نەرسىلەر بىلەن ئوزۇقلۇق -
نىش كېرەك. قۇلاق ئىچىگە بىنەپشە يېغى، گۈل يېغى
تامغۇزۇش ياكى بىر ئاز ئەپيۇننى ئايال سۈتىدە ئېرىتىپ
قۇلاققا تامغۇزۇش لازىم. گۈل يېغى بىلەن سىركىنى
بىللە قاينىتىپ سۈۋۈغاندىن كېيىن قۇلاققا تامغۇزۇش،
قۇلاققا سوغاق ئۆتكۈزۈش يۇمىلاقسۇت، ھول قاپاق، ئو -
سۇڭ قاتارلىقلارنى كۆپرەك ئىستىمال قىلىش.
2. سوغاقتىن بولغان قۇلاق ئاغرىغى:

مەئىدىدە بارلىققا كەلگەن سوغاق يەللەر ياكى
مىڭدە بولغان ئارتۇقچە سوغاق ماددىلارنىڭ قۇلاققا
چۈشۈشى بىلەن ئاغرىش پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: مەئىدىدىكى سەۋەپتىن كېلىپ چىق -
قان بولسا، كۆڭلى ئاينىش، ئېغىزدىن كۆپ سۇ ئېقىش.
يېنىڭ باش ئاغرىشلار بولۇپ، باشقا ئىسسىق سۇ قۇيۇل -
سا ئارام ئالدىدۇ. مىڭدىكى سەۋەپتىن كېلىپ چىققان
بولسا باش ئېغىرلىشىپ ئاغرىپ تۇرىدۇ. قۇلاققا ھەرخىل
ئاۋازلار ئاڭلىنىش بىلەن ئاغرىشىمۇ بىللە داۋاملىشىدۇ.
داۋاسى: ئايارەج پەيىقارا، ھەببى قوقىيا

(16 - 17 - نۇسخىلار) نىڭ بىرى بېرىلىدۇ. قۇلاق ئىچىگە
ھەرخىل ئىسسىقلىق ياغلار مەسىلەن، سۇزاپ يېغى، ئىنەك
پىتى يېغى تامغۇزۇش كېرەك. ئەگەر تېخىمۇ ئىسسىقلىق
قىلىش ھاجەت بولسا، مەزكۇر ياغلارغا ئازراق قۇندۇز
قەرى، پەرىپيون ئارىلاشتۇرۇپ تېمىتىش كېرەك.

ئاڭلاشنىڭ بۇزۇلۇشى (تەرەش)

ئاڭلاشنىڭ بۇزۇلۇشى — ئاڭلاش قابىلىيىتىنىڭ يې-
مەرسىرلىكى (تەرەش)، تۇغۇلغاندىن كېيىنكى پائالىيەت
(ۋەقە) ۋە تۇغما پائالىيەت (سۇمما) دەپ ئۈچ خىلغا
بولىنىدۇ.

سەۋەپلىرى:

- (1) تۇغما بولۇشى مۇمكىن. ئۇنىڭ داۋامى يوق؛
- (2) قۇلاقنىڭ ھاۋا كىرىش يوللىرىغا توسالغۇ پەيدا
بولۇشى؛ (3) قېرىقلىق نەتىجىسىدە مىزاننىڭ قۇرۇق
سوغاقلىققا ئۆزگىرىشى؛ (4) يېقىلىش ياكى ئورۇلۇش
نەتىجىسىدە ئاڭلاش ئەسەپلىرىنىڭ زەھەرلىنىشى؛ (5) كې-
رىك قاتارلىق قىزىتمىلىق ئاغرىقلاردا بوھران بولغاندا
تەرلەش بىلەن سەپرا ماددىسى قۇلاققا كېلىپ چۈشۈشى
نەتىجىسىدە گاسلىق پەيدا بولىدۇ. ياكى كېزىكىنىڭ
ئاخىرقى دەۋرلىرىدە گاسلىق پەيدا بولۇشى مۇمكىن.
- (6) ئىسسىق، سوغاق، ھول، قۇرۇق ھالەتتىكى مىزان-
نىڭ بۇزۇلۇشى قۇلاقنىڭ ئاڭلاش ئالەملىرىگە چۈشۈپ
قالسا قۇلاققا گاسلىق پەيدا قىلىدۇ. چۈنكى مىزاننىڭ
بۇزۇلۇشى قۇلاق ئەسەپلىرىنى ھەرخىل دەرىجىدە زەھەرلەپ
ئاڭلاشنى بۇزۇپ قويىدۇ.

ئالامەتلىرى: مىزان بۇزۇلۇشى تۈرلىرىدە
ئالامەت ئالامەتلىرى بولمايدۇ. پەقەت ئاڭلاشنىڭ ھەرخىل
دەرىجىدە بۇزۇلغانلىقى كۆرىلىدۇ. مەيەز بۇزۇلغان تۈر-

لىرىدە بولسا قۇلاقنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىدا ئاغرىش ۋە ئېچىش بولىدۇ. سوغاقلق تۈپەيلىدىن يۈز بەرگەن بولسا، سوغاق دورا ياكى سوغاق ئۆتكۈزۈش تەدبىرلىرى پاڭلىقنى ئېغىرلاشتۇرۇپ قويدۇ. ئىسسىق بولغانلىرىدا بولسا ئىسسىقلىق قىلىش زەرەر قىلىدۇ.

داۋالاش: تۇغما پاڭ، قېرىقلىتىكى ۋە توسالغۇ-لار تەبىئىيىدىكى پاڭلىق ساقايمايدۇ. ئاڭلاش ئىسەپ-لىرىنىڭ زەخمىلىنىشى بىلەن بولغان پاڭلىقمۇ تولۇق ساقايماستىن مۇمكىن. كېزىك ئاغرىقلىرىدىن بولغان پاڭلىقتا ئالدى بىلەن مەنبۇخ ھېلىلە (38-نۇسخە) بېرىپ ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش، ئۇندىن كېيىن تو-ۋەندىكى تەدبىرى قىلىش لازىم.

ئانار بىلەن داۋالاش (داۋايى رۇمان):

ئاچچىق ئانار 1 دانە، سىركە 5 مىقال، كۈد-

دۇر 1 مىقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: ئانارنىڭ كىز-دىگىدىن تېشىپ دانلىرى ۋە ئىچىدىكى پوستلىرىنى پۈتۈنلەي ئېلىپ تاشلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن ئانار دانە-لىرىنى سىقىپ، سۇرۇپ سۈيىنى ئانار ئىچىگە قۇيۇپ ئۇستىدىن سىركە قۇيۇپ ئۇستىگە كۈندۈرنى تاشلايمىز. ئانارنى چوغ ئۈستىدە بىر دەم قويۇپ قىزىتىپلا ئېلىپ ئىچىدىكى سۇدىن قۇلاق ئىچىگە تامغۇزۇلىدۇ.

مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغاندا، ئالدى بىلەن

مىزانى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن تورۇلغا گوشى، مىكىيان گوشى بېرىش بىلەن بىللە، ئىچىشكە دىنار شەرۋىتى بېرىلىدۇ. بابۇنە، ئەكىللى مىلىك، سەئىتەر، بىنەپشە، چىگىسەيلەرنى قاينىتىپ ئۇنىڭدىن چىققان ھورغا قۇلاقنى ەزلىگىچە تۇتۇش لازىم. قۇلاق ئىچىدىكى كىرلەر توسالغۇ پەيدا قىلىپ ئاڭلاشقا تەسىر بەرگەن بولسا، كىرنى تازىلاش لازىم. ەزلىگۈنى ئاخشى قۇلاق ئىچىگە كۈنجۈت يېغى، گۈل يېغى ياكى بادام يېغىدىن بىرنى تامغۇزۇپ، ئەتىسى قۇلاقنى قايناقسۇ ھورغا تۇتۇش لازىم. شۇنىڭ بىلەن يۇمشاپ چىققان كىرلەر تازىلىنىدۇ.

قۇلاق قىچقىرىش (تىنىن)

قۇلاق ئىچىدە قاتتىق چىقىرىغاندەك ئاۋاز ئاڭ-لىنىپ تۇرۇش قۇلاق قىچقىرىش (تىنىن) دەپ ئېيتىلىدۇ. بوشراق گۈڭىرىگەندەك ئاۋاز ئاڭلىنىشى "دەۋى" دىيىلىدۇ. داۋاسى: سەۋەپنى يوقىتىش كېرەك. ئەگەر قۇلاقنىڭ ەس قىلىش قۇۋۋىتى ئېشىپ كېتىش ياكى قالمايىقانلىشىپ كېتىشى سەۋەپ بولسا، قوي، كالا پا-قالچەكلىرى بىلەن ئوزۇقلىنىش، سىركە بىلەن گۈل يېغىنى بىللە قاينىتىپ ئازراق ئەپيۇن ئارىلاشتۇرۇپ قۇلاق ئىچىگە تامغۇزۇش كېرەك.

قۇلاقتىن قان ئېقىش

ئەگەر قاننىڭ بەك زىيادىلىكىدىن بولسا، بەدەندە قان زىيادىلىك ئالامەتلىرى بولىدۇ. مۇنداق ھاللاردا

فېپال تومۇردىن قان ئېلىش لازىم. زەربە نەتىجىسىدىن بولسا موزنى سىركە بىلەن قاينىتىپ قۇلاققا تامغۇزۇش كېرەك. ئەگەر قىزىتما بوھرانىدىن بولسا، كېسەلنىڭ ئايلىنىپ كېتىش خەۋپى بولمىسا قاننى توختاتماسلىق لازىم.

ئىلان، چايان قاتارلىق زەھەرلىك جاندارنىڭ چېقىشى بىلەن قۇلاقتىن قان كەلسە زەھەرنى قايتۇرۇش چارىلىرىنى بىرلىكتە كۆرۈش لازىم. بۇلاردىن باشقا قۇلاقنىڭ دائىم قىچىشى ئۈچ-رايدۇ. بۇنىڭغا ئەپسەنتىنى سىركە بىلەن قاينىتىپ، سۈزۈپ، ئاچچىق بادام يېغى بىلەن قۇلاققا تامغۇزۇلىدۇ.

2 - پەسىل: بۇرۇن كېسەللىكلىرى

پۇراش سىزىمىنىڭ يوق بولۇشى

بۇرۇنغا ھىچقانداق پۇراق پۇرىمايدىغان ئەھۋال-لار بۇرۇن ئىچىدە گۆش ئۆسۈپ قېلىش ياكى توسالغۇ بولىدىغان ياللۇغلىنىشلار نەتىجىسىدە يۈز بېرىدۇ.

زىيادە گۆشنىڭ پەيدا بولۇپ قېلىشى بۇرۇن بوۋاسىرى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭغا كۆرىلىدىغان چارە-تەدبىرلەر بوۋاسىر بىلەن ئوخشاش بولىدۇ. ياللۇغلىنىش نەتىجىسىدىكى توسىلىشنىڭ ئالامەتلىرى — بۇرۇندىن زەر-داپ سۇ ئاقىدۇ، سېسىق پۇرايدۇ. زەخمىلىنىش جارا-

ھەتكە ئايلىنىپ بۇرۇن قاناتلىرىغا زەرەر يەتكۈزگەندە
"ئەلىق" دەپ ئاتىلىدۇ.

داۋاسى: قان ئېلىش بىلەن مۇۋاپىق جايغا
ھىجامەت قويۇش كېرەك. ھەببى قوقيا ياكى ھەببى
ئايارەج بىلەن تازىلاش كېرەك. جاراھەتكە توۋەندىكى
دورلار بېرىلىدۇ:

كويدۇرۇلگەن مىس، زاكىلارنى باراۋەر مىقداردا،
زەررىخىدىن $\frac{1}{2}$ ھەسسە ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ مۇۋاپىق
ماي بىلەن مەلھەم قىلىپ سۈركەشكە بېرىلىدۇ.
زىيادە ئوسۇپ قالغان گوشنى تىغ بىلەن كېسىش
كېرەك، ياكى قىل بىلەن بوغۇپ قويۇلسا بىر ئەچچە
كۈندىن كېيىن ئوزىچە چۈشۈپ كېتىدۇ.

پۇراشنىڭ بۇزۇلىشى

پۇراشنىڭ بۇزۇلىشى — ھەرخىل پۇراقلىق ماددىلار -
دىن بىرخىل پۇراق سېزىش، بىرخىل پۇراقلىق ماددىدىن
بىر قانچە خىل پۇراق سېزىش ياكى بىرخىللا پۇراقنى
سېزىپ، باشقىنى سەزمەسلىك (مەسىلەن، خۇشپۇراقنى
سېزىپ بەدبوي پۇراقنى سەزمەسلىك) دىن ئىبارەت.

سەۋىبى: (1) مىزاجنىڭ ئوزگىرىشى ياكى بۇ -
رۇن يوللىرىدىكى زەرەرلىنىشلەر، (2) ئىسسىق ياكى
سوغاقلارنىڭ تەسىر قىلىشى، مەسىلەن، ئىسسىقلىق مىڭ -
نىڭ پۇراش خىزمىتىنى بۇزىدۇ. سوغاقلق ھىس قابى -
لىيىتىنى توۋەنلەشتۈرىدۇ.

داۋاسى: مىزاجنى ئۆزگەرتىش تەدبىرلىرىنى قىلىش بىلەن ھەببى ئايارەج، ھەببى قوقىيا بېرىلىدۇ (16-7-نۇسخىلار) ۋە يەنە ۋە نىلۇفەر ۋە بابونىلارنى قاينىتىپ بۇرۇنغا تۇتۇش كېرەك. مىزاجنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن ئىسسىق مىزاج بولسا كافۇر، سەندەل-لەرنى كۆيدۈرۈپ بۇرۇننى ئىلاپ بېرىش لازىم. ئەگەر سوغاق مىزاج بولسا، بابونە، ئەكىلىل مىلىك، سوۋتەر، دەرەمە، مەر زەنجۈشلەرنى قاينىتىپ بۇرۇنغا تۇتۇلىدۇ. ئەگەر خۇشپۇراقنى سېزىپ، سېسىق پۇراقنى سەز-مىسە قۇندۇز قەرىنى يۇمشاق سوقۇپ بۇرۇنغا تارتىش كېرەك. سېسىق پۇراقنى سېزىپ خۇشپۇراقنى سەزمىگەندە بۇرۇنغا ئىپار تاتقۇزۇش لازىم.

بۇرۇندىكى جاراھەت

بۇرۇن ئىچىگە تۇرلۇك سەۋەپلەر بىلەن تۇرلۇك جاراھەتلەر چىقىدۇ. بۇلارنىڭ بەزىلىرى نەم، بەزىلىرى قۇرۇق بولىدۇ.

سەۋەبى: نەم جاراھەتلەر مىڭدىن ئوشۇقچە ھوللۇكنىڭ بۇرۇنغا چۈشۈشى بىلەن پەيدا بولىدۇ. بۇ خىلدىكى جاراھەتلەرگە چارە كۆرۈشتە ئالدى بىلەن مۇۋاپىق جايغا ھىجامەت قويۇش ۋە مىڭنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى قوقىيا (17-نۇسخە) بېرىش كېرەك. ھەمدە توۋەندىكى يىاغ دورا ياغلاشقا بېرىلىدۇ. ئىسپىداچ (قەلەي تۈزى)، مۇردارسەك، قوغۇشۇن

تۈزۈنى يۇمشاق سوقۇپ، گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ
جاراھەتنى ياغلاشقا بېرىلىدۇ. 50 - نۇسخىدىكى مەلۇمى
ئىسپىداچ بېرىلىدۇ.

قۇرۇق جاراھەتلەرنىڭ سەۋىيى كويگەن خىلىتلار
بولۇپ كۆپ ئۇچرايدۇ. داۋالاشتا، بۇرۇنغا 51 - نۇسخا -
خىدىكى مايىنى ياغلاشقا بېرىلىدۇ. بۇ جاراھەتلەر ئۇزۇن -
غا سوزۇلۇپ كەتسە، يامان سۈپەتلىك جاراھەتلەرگە
ئايلىنىپ، دائىم سېسىق پۇراق چىقىرىپ تۇرىدۇ.
بۇنداق بولۇشى مەزكۇر جاراھەتلەرگە ھەرخىل جەراسىم -
لارنىڭ قوشۇلۇشىدىندۇر. بۇنىڭغا قارا خەربەقنى سوقۇپ
بۇرۇنغا پۈركەش بىلەن، بۇرۇن ئىچىنى سىركە بىلەن
چايقاش كېرەك.

بۇرۇن قاناش (رناق)

بۇرۇن قاناش ئادەتتە قىزىتمىلىق كېسەللەرنىڭ
بوھرانىدىن ۋە بەدەندە قاننىڭ بەك زىيادىلىغىدىن
كېلىپ چىقىشى مۇمكىن.

سەۋىيى: (1) تەپ يەنى كېزىك كېسەللىكلە -
رىدە بوھران كۈنلىرىدە بۇرۇن قانايدۇ، بۇ ئاغرىقنىڭ
ساقىمىش دەۋرىگە كىرگەنلىگىنى بىلدۈرىدۇ. چۈنكى
كېسەللىك ماددىلار قان بىلەن قوشۇلۇپ چىقىپ كېتە -
دۇ. لېكىن ئارتۇق قاناپ ھۇشمدىن كېتىشتەك ئەھۋال -
لارنىڭ يۈز بېرىشىدىن ساقلىنىش لازىم. (2) قاننىڭ
بەدەندە ئېشىپ كېتىشىدىن بۇرۇن ئىچىدىكى تومۇرلار

ئېچىلىپ كېتىپ (يېرىلىپ كېتىپ) بۇرۇن قانايدۇ. مۇنداق ھاللاردا قان ئاز-ئاز ئەمما سۇيۇق ئاقىدۇ. سەپ-رانىڭ غالىپلىقى كورۇلىدۇ.

داۋاسى: بوھران ئەمەسلىكى بىلىنگەن زامان دەرھال توختىتىش تەدبىرلىرىنى كورۇش كېرەك. مەسەلەن قول، پۇت، ئەمچەك، قۇلاقلىرى تېگىش بىلەن ئاق سەندەل گۈلابىغا كافۇر ئېزىپ پىشانىگە چېپىلىدۇ. باشقا مۇز قويۇلىدۇ. موز، قۇرۇق يۇمىلاقسۇت، تۈگمەن توزۇندىسى، كۈندۈر، سەبرى، خۇسنىياۋشان، زەمچىلىرى ھاجەتكە لايىق ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، تۇخۇم ئېقىغا چېلانغان پاختا پىلتىگە يۇقتۇرۇپ قاناۋاتقان بۇرۇن توشۇڭىگە تەقىلىدۇ. بۇ چارە بىر قانچە قېتىم تەكرارلىنىدۇ. ئەگەر قان بېسىمى يۇقۇرلىقتىن بولسا ئاغرىقتا قان بېسىمى يۇقۇرلىقنىڭ ئالامەتلىرى بولىدۇ.

مۇنداق ھاللاردا ئەھۋالغا قاراپ قان ئېلىش ياكى ھىجامەت قويۇش كېرەك. لىمون قوشقان چىلان شەرۋىتى، ئالما شەرۋىتى، ئۈزۈم غورىسىنىڭ شەرىتى قاتارلىقلار بېرىلىدۇ ۋە يۇقۇرقى چارە بىلەن بۇرۇنغا پاختا پىلتە تىقىش كېرەك. ياكى ئومچۇك تورىنى تازىلاپ بۇرۇنغا تىقىش ياخشى نەتىجە بېرىدۇ.

بۇرۇندىن سېسىق پۇراق كېلىش (نەتۇلى ئەنەق)

بۇ كېسەلدە كۆپىنچە ئاغرىق ئۆزىنىڭ تىنىغىدەككى سېسىقلىقنى سەزمەيدۇ.

سەۋەبى: بۇرۇن ئىچىدىكى كونىراپ كەتكەن بوۋاسىر ياكى باشقا ھەرخىل جاراھەتلەرنىڭ سېسىقلىق بېرىشى؛ مىڭە ياكى باشقا ئەزالار (مەسىلەن، مەئدە) دىكى خىلىتلار بۇزۇلۇپ ئېغىز ياكى بۇرۇن ئارقىلىق پۇراق بېرىشىدىن بولۇپ، شۇ ئەزالاردىكى قوشۇمچە ئاغرىقلار بىللە بولىدۇ.

داۋاسى: خىلىتلارنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى قوقيا (17 - نۇسخە) ياكى ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. سىركە، ئۈزۈم غورىسىنىڭ سۈيى ۋە قىچىلار - نى ئارىلاشتۇرۇپ ئېغىزنى چايقاش لازىم. قىزىلگۈل، قەلەمپۇر، سۈمبۈللارنى قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاش بىلەن بۇرۇنغا رەيھان شارابى تامغۇزۇش كېرەك.

چۈشكۈرۈش (ئەتسە)

چۈشكۈرۈش ئۆپكەندىن كەلگەن يۈتەلگە ئوخشاش مۇھاپىزەت قىلغۇچى ئامىل بولۇپ مىڭنىڭ ساغلاملىغى - دىن دېرەك بېرىدۇ. ئەمما ئۇنىڭ ئېتىدالدىن زىيادە بولۇپ كېتىشى مىڭنىڭ زەرەرسەنگەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. بولۇپمۇ زۇكام ۋە قىزىتمىلىق كېسەللىكلەرنىڭ باشلىنىشىدا چۈشكۈرۈشنىڭ كۆپ بولۇشى ياخشى ئالامەتلەر - دىن ئەمەس. ساغلام كىشىلەرنىڭ ۋە تۇغۇت ۋاقتىدا ئاياللارنىڭ چۈشكۈرۈشى پايدىلىق ھېساپلىنىدۇ. ھەددىدىن ئارتۇق چۈشكۈرۈشنى داۋالاش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن باشقا ئىسسىق سۇ قۇيۇشقا بۇيرۇلىدۇ. بۇرۇنغا سۈمبۈل،

ئاق سەندەل ئەرەقنى تارتىشقا بېرىلىدۇ. قۇلاق ئىچىگە
بادام يېغى، گۈل يېغى تامغۇزۇش كېرەك. ئەگەر بوۋاق -
لاردا بولسا قوي بورىگىنى كاۋاپ قىلغاندا ئېقىپ چىق -
قان سۇنى تامغۇزۇشقا بۇيرۇش كېرەك.

بۇرۇن قىچىش (ھىككە تۇل ئەنەق)

بۇرۇننىڭ كۆپ قىچىش كېتىشى زۇكام، نەزلە
ياكى چېچەك كېسىلىنىڭ ئالامەتلىرى سۈپىتىدە كۆرىلىشى
مۇمكىن. بۇنداقتا سەۋىيىنى داۋالاش كېرەك. ئەگەر
سوغاق ھاۋا ياكى بەدەندىكى بۇخاراتلار سەۋىيىدىن
بولسا مەتبۇخ شاتەرە بېرىلگەندىن كېيىن، ئىنتىرىپىل
كەشتىز بېرىلىدۇ (6 - 39 - نۇسخىلار).

3 - پەسىل: تىل كېسەللىرى

1. تىلنىڭ ياللۇغلىنىشى (ۋەرەمى لىسان)

تىلنىڭ ياللۇغلىنىشلىرى سەۋەپ جەھەتتىن قاندىن،
سەۋدادىن، بەلغەمدىن ۋە سەپرادىن بولغان دىگەندەك
4 خىلغا بۆلىنىدۇ.

(1) قاندىن بولغان ياللۇغلىنىش (ۋەرەمى دەمەۋى):
ئالامەتلىرى تىل قىزىرىپ قالىدۇ، قاتتىق ئاغرىيدۇ ۋە
ئېغىزدىن شولگەي ئاقىدۇ.

داۋاسى: قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىش، سۈرگە
دورلار بىلەن بىللە مەتبۇخ بېرىلىدۇ. تىل ئۇستىگە

مەلەم ئىشلىتىشنىڭ ھاجىتى يوق. ۋەزەمنى ياندۇرۇش ئۈچۈن بابۇنە، ئەككىلى مىلىك، بىنەپشە، خىيارى شەنبەر، ئانار گۈلى، سەندەل، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنى قوشۇپ ئېغىزنى چايقاشقا بېرىلىدۇ.

(2) سەۋدادىن بولغان تىل ياللۇغلىرىدا تىلنىڭ رەڭگى سېرىق بولىدۇ. ئاغرىش ۋە ئېچىشىش بولۇپ، تىلنىڭ شەكلى تامامەن ئۆزگىرىدۇ. داۋاسى — قان ئېلىش پايدا بەرمەيدۇ، قاندىن بولغان تىل ياللۇغىدىكى چاردەلارنى قىلىش بىلەن ھېلىكە قايناتمىسى (3.8 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(3) بەلغەمدىن بولغان تىل ياللۇغلىرىدا تىل ئاق رەڭلىك بولۇپ، ئېغىزدىن كۆپ سۇ ئاقىدۇ. ئاغرىش ئانچە بولمايدۇ. ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مۇۋاپىق دورىلار بىلەن ھەقتە قىلىنىدۇ. بېدىيان، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، بىنەپشە، چىلانلارنى قاينىتىپ سۈيىگە گۈلەن سېلىپ ئېغىزنى چايقاش كېرەك. مەجۇنى مەشەدەر تۇس (2.5 - نۇسخە)، سەنجەرىنا (3.3 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(4) سەۋدادىن بولغان تىل ياللۇغىدا تىلنىڭ رەڭگى قارا، ئېغىز ئىچى قۇرغاق بولىدۇ. ئەنجىر، شۈمبە زىغىرنى قاينىتىپ، سۈيىگە بىنەپشە يېغى قوشۇپ ئېغىزنى چايقاش ئۈچۈن بېرىلىدۇ ۋە ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخ ئەپتىمۇن بېرىلىدۇ (2.0 - نۇسخە).

تەم تېتىشىنىڭ بۇزۇلۇشى

تەم تېتىشىنىڭ بۇزۇلۇشى ئاساسەن ئېغىزغا بىر نەرسە تېتىماسلىق، ياكى ئەكسىچە سېزىش مەسىلەن، ئاچچىق نەرسىنى تاتلىق، تاتلىق نەرسە ئاچچىق سېزىشلىرىدىن ئىبارەتتۇر.

سەۋىيى: (1) مىڭدىن كېلىپ شاخلاغان تىل ئاستى سىزگۈ ئەسەبلىرى ئارتۇق سۇيۇقلۇقلار تەسىرى بىلەن نەملىكنى قوبۇل قىلىپ، تىلنىڭ تەم سېزىشى ئۈزگىرىدۇ. (2) ماددىلارنىڭ كەيپىيات ئاھۋالى سەۋەپ بولىدۇ. مەسىلەن، قان غالىپ بولغاندا ئېغىز دائىم تاتلىق، سەپىرادا ئاچچىق. بەلغەمدە تۈزلۈك، سەۋادادا چۈچىمەل بولىدۇ.

داۋالاش: ئارتۇق سۇيۇقلۇقنى پىشۇرۇش ئۈچۈن مائىل ئۇسۇل (45 - نۇسخە) بېرىپ، ئېغىزنى چايقاش ئۈچۈن ئاقىر قەرە، تۇخۇمەك ئۈزۈمى، قىچىلارنى ھا-جەتكە لايىق مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيىدە ئېغىز چايقىلىدۇ. تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا، ھەببى قوقىيا (16 - 17 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ.

تىلنىڭ ئېغىرلىغى

بۇ كېسەلدە ئاغرىق سۆزلەشتە قىيىنلىدۇ. ھەرىپ-لەرنىڭ تاۋۇشىنى توغرا تەلەپپۇز قىلالمايدۇ.

سەۋىيى: مىزاجنىڭ بۇزۇلۇشى — كوپىنچە ئىس-سىقتىن بولىدۇ. بۇنداق ھاللاردا تىل سۇيۇقلۇقنى يو-

قەتەدۇ. تىل گەۋشلىرى ۋە پەيلىرى تارتىشىش ھالىغا كېلىپ تىلنىڭ ئەركىن ھەركەت قىلىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن سوزنى دادىل ۋە ئاھاڭلىق چىقىرىشقا تەسىر بېرىدۇ. بۇخىلدىكى تىلنىڭ ئېغىرلىق-غەنى ساقايتىش قىيىن، پەقەت كېسەلنىڭ ئېغىرلىشىپ كەتسە، سىلگىگە چارە قىلىنسا نەتىجىلىك بولۇشى مۇمكىن. (2) تىلنىڭ پالەچ بولۇشى — بۇ چاغدا باشقا ئەزالاردا پالەچلىك ئالامەتلىرى بولماسلىقى مۇمكىن. ياكى مىڭنىڭ سېزىش قابىلىيىتى زەرەرلەنگەن بولۇپ، تىل ھەركەتسىز ۋە ئېغىزدىن دائىم سۇ ئېقىپ تۇرىدىغان بولىدۇ. پالەچ ئېغىر بولسا، پەقەت سوز قىلالايدۇ. يېنىڭىرەك بولغاندا كېكەچلىنىپ سوزلەيدۇ. (3) قۇرۇقلۇق نەتىجىسىدە تىلنىڭ پەيلىرى تارتىشىپ قالىدۇ. سوز قىلغاندا تەسلىك بىلەن سوزلەيدۇ. تىلنىڭ ھەركەت قىلىشى ناچار بولىدۇ.

(4) مىڭە پەردە ياللۇغى (سەرسام) كېسىلىنىڭ بىر ئالامىتى بولۇپ كېلىدۇ ياكى مەزكۇر كېسەلدىن كېيىن ئاسارەت بولۇپ قالىدۇ. بۇ مىڭە پەردىنىڭ ياللۇغلىنىشى نەتىجىسىدە ماددىنىڭ مىڭىدىن تىل ئەسەپلىرىگە قۇيۇلىشىدىن بولىدۇ.

(5) تىل ئاستىدىكى چاندېرنىڭ قىسقا بولۇشى — بۇ تۇغما بولۇشى ياكى تىل ئاستىغا جاراھەت چىقىپ قالدۇرغان تارتۇق نەتىجىسىدە تىل ئاستىدىكى پەيلەر قىسقىرىپ قېلىشىدىن بولىدۇ.

داۋاسى: (1) ئىسسىقلىق مىزاجى بۇزۇلغان ئاغرىقلارغا ھوللۇك نەرسىلەرنى تىلغا سۈركەشكە بېرىلىدۇ. مەسىلەن، بىنەپشە يېغى، قاپاق مېغىزى، تاتلىق بادام يېغى، بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇئابى، ئاق لەيلى ئۇرۇغىنىڭ لۇئابى، توخۇ يېغى، ئودەك يېغى قاتارلىقلارنى بىرلەش- تۇرۇپ مېغىز دورىلارنى ئېزىپ بىرلىكتە تىل ئۈستىگە بىر قانچە قېتىم سۈركەشكە بېرىلىدۇ.

(2) خىلدىكىلەرگە ئالدى بىلەن مۇۋاپىق سۈركە بېرىلىدۇ. قىچا، ئاقىر قەرەھا، سوتتەر، توغرىغلارنى بىرلىكتە قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاشقا ۋە تىلگە سۈركەش- كە بېرىلىدۇ.

(3) قۇرۇقلۇق نەتىجىسىدە تىل پەيلىرى تارتە- شىپ قالغان ئاغرىقلارغا ئالدى بىلەن ھەببى ئىستەم- خىقۇن ياكى ئايارەج پەيقارا (7 - 11 - نۇسخىلار) بېرىد- لىپ، ئۇشادىر، يىلپىل بىلەن ئېغىزنى چايقاپ، سېرىق چىچەك يېغى، بابونە يېغىنى تىلگە سۈركەشكە بېرىلىدۇ.

(4) مىڭە يەردە ياللۇغىدا ئېغىزدىن سۇ ئاققۇزۇش كۈپايە قىلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن نوشۇدور بىلەن ئاق تۈزى ئارىلاشتۇرۇپ تىلغا سۈركەش كېرەك.

(5) تىل ئاستىدىكى چاندىر قىسقۇرپ قالغاندا چاندىرنى كېسىش كېرەك. كەسكەندە تىل ئاستىدىكى شىرياللەرنىڭ كېسىلىپ كەتمەسلىگىگە دىققەت قىلىش بىلەن كېسىپ بولغاندىن كېيىن قەان توختىتىش ئۈچۈن كەسكەن جايغا زاك سېپىلىدۇ.

تىلنىڭ چۇڭىيىپ كېتىشى (ئىدلاۋۇللىسان)

ئاغرىقنىڭ تىلى بەك چۇڭىيىپ كېتىپ ئېغىزغا پاتماستىن سىرتقا چىقىپ قالىدۇ.

سەۋىيى: ئارتۇقچە ھوللۇكنىڭ باشتىن كېلىپ تىل گۆشلىرىگە چۇشۇشى ياكى ماددىلاردىن قان ياكى بەلغەم نەتىجىسىدە كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن بىلەك ياكى تىل ئاس-تىدىن قان ئېلىش، تىل ئۇستىگە قاتۇرغۇچى (قابىز) دورىلارنى - سۈركەش، ئاچچىق ئانار سۈيى بىلەن ئېغىز ئىچىنى چايقاپ بېرىش لازىم. نەتىجە يەرمىگەندە دەستكارە (ئوپېراتسىيە) بىلەن ئىلاج قىلىنىدۇ.

تىل ئاستى ئۆسمىسى (زەپدەغ) ①

تىل ئاستىدا ئۆسۈپ قالغان ئۆسمە گۆش بولۇپ، شەكلى ۋە رەڭگى خۇددى پاقىغا ئوخشايدۇ.

سەۋىيى: كۆپىنچە قان ياكى بەلغەم ماددىسىنىڭ تىل ئاستىغا چۇشۇپ قېتىپ قېلىشىدىن بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن ماددىنى سۈرۈپ چىقىدۇ. رىش ئۈچۈن مەتبۇخ ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. سوتتەر، زۇپا، تۇز، ئانار پوستى، ئوشۇدور، زاك، زاڭكار، گۈل سۈسەنلەرنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ، قاينىتىپ سىركە ئېلەشتۈرۈپ ئېغىزنى چايقاش ئۈچۈن بېرىلىدۇ.

① زەپدەغ - پاقا دېگەنلىك بولۇپ تىل ئاستى ئۆسمىسى پاقاسىمان شەكىلدە بولىدىغانلىقى ئۈچۈن شۇ نام بېرىلگەن.

ئەگەر بۇ ئۇسۇل نەتىجە بەرمىسە يىڭنە بىلەن تېشىپ
سۈيىنى چىقىرىپ ساسلىغاندىن كېيىن قاچا بىلەن
كېسىپ ئېلىنىدۇ.

تىلنىڭ يېرىلىپ كېتىشى

مىڭە قاتتىق قۇرۇقلۇق كەيىپياتقا ئۇچراپ قېلىشى
نەتىجىسىدە ياكى ئۇزۇقلۇق ماددىلىرى ناچار ۋە كوك-
ئاتلارنى ئاز يىگەندە ئەينىازدا پەيدا بولىدۇ.
ئالامەتلىرى: تىل ئۈستى يۈل-يۈل بولۇپ
يېرىلىپ كېتىدۇ. رەڭگى قىزىل بولۇپ دائىم ئېچىشىپ
تۇرىدۇ. پۈتۈن بەدەنلىك قۇرۇقلۇق ئالامەتلىرىمۇ بولىدۇ.
بۇ ھال كۆپىنچە چالاش كېسەللىكىدە ئۇچرايدۇ.

داۋاسى: ئاق لەيلى ئۇرۇغىنىڭ لۇتابى، بىيە
ئۇرۇغىنىڭ لۇتابى، بىنەيشە يېغى ۋە موم يېغى قاتار-
لىقلارنى ئەھۋالغا قاراپ بېرىلىدۇ. ئاغرىقنىڭ ئۈزۈغە-
نى ياخشىلاپ، يېڭى كۆكتاتلار ئىستىمال قىلدۇرۇلىدۇ.

تىلنىڭ قۇرۇپ كېتىشى

تىلنىڭ قۇرۇپ كېتىشى كۆپىنچە كېزىك ئاغرىق-
لاردا قىزىتمىدىن، قان، سەپرا ماددىلارنىڭ غالىپ بو-
لىشىدىن، ياكى مىزاجنىڭ بۇزۇلۇشى - قۇرۇق ئىسسىق-
لىقتىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: تىل دائىم قۇرۇق بولۇپ سېرىق
گەز داغلاپ تۇرىدۇ. بەدەندە قان ياكى سەپرا كۆپلىك
ئالامەتلىرى بار بولىدۇ. بەزىدە بەدەندە ھىچىر ئالا-

مەتلەر بولماستىن تىلنىڭ قۇرۇق بولۇشىمۇ ئۇچرايدۇ.
داۋاسى: ھوللۇك نەرسىلەر بېرىلىدۇ. مەسىلەن،
بىيە ئۇرۇغى، نىلۇفەر ۋە شېكەرلەرنى ئېھتىياجغا لايىق
مقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ، سۈيىنى ئېغىزدا تۇتۇپ
تۇرۇش لازىم. قاپاق ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، پە -
تەنگان ئۇرۇغى، تاۋۇز ئۇرۇقلىرىنىڭ مېغىزلىرىدىن شىرە
چىقىرىپ، ئېغىز ئىچىدە تۇتۇپ تۇرۇپ ئىچىشكە بېرىدۇ.
لىدۇ. بەزىدە جىگەر خىزمىتىنىڭ ئاجىزلىغىدىمۇ نىلنىڭ
قۇرۇپ قېلىشى ئۇچرايدۇ. بۇخىل ئەھۋالدا ئەسلى سە -
ۋىبىنى داۋالاشنى بىرلىكتە ئېلىپ بېرىش لازىم.

تىلنىڭ جاراھەتلىنىشلىرى

تىلنىڭ ياللۇغلىنىشى، ئىسسىق خىلىتلارنىڭ تەسە -
رى، ئۆتكۈر نەرسىلەر (مەسىلەن، تىراپ) نى بىلىمىي
ئىچىپ تاشلاش، مەئىدە ۋە مىڭدىكى ھارارەتلىرى سە -
ۋىبىدىن يۈز بېرىدۇ.

ئالامەتلىرى: تىل ئىششىيدۇ، قىزىرىدۇ. تاماق
چايداش ۋە سوز قىلىش تەس بولۇپ، ئېغىزدىن سۇ
ئاقىدۇ. خىلىتلارنىڭ كۆپ بولۇشىغا قاراپ ئۇلارغا خاس
ئالامەتلەر بولىدۇ.

داۋاسى: قان زىيادىلىك ئالامەتلىرى كۆرۈلسە،
ئالدى بىلەن قان ئېلىش لازىم. ئاندىن كېيىن سوغاق -
لىق تەدبىرلىرى قىلىنىدۇ. مەسىلەن، سېمىز ئوت ئۇرۇغى،
يۇمىلاقسۇت، بىيە ئۇرۇغى، ئىسپۇغۇل قاتارلىقلارنى مۇۋا -

پىق مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيىنى ئېغىز چايقاش
ئۈچۈن بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن بابۇنە، ئەكىلىل مىلىك،
بىنەپشە، خىمارى شەنبەرلەرنى كېرەكلىك مىقداردا ئېلىپ،
قاينىتىپ، سۈزۈپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر بەلغەم
ئالامەتلىرى بولسا ھەسەلنى يالغۇز ياكى ئايارەج پەيقارا
(۱۶ - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ. ياللۇغنىڭ سەرەتانغا
(راققا) ئايلىنىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن ئېغىز ئىچىدە كاسىن
ۋە يۇمىماقسۇتنى دائىم چايناپ يۇرۇش كېرەك.

ئېغىزنىڭ ئاق يارىسى (قىلا)

ئېغىز شىللىق قاتلاملىرىدا پەيدا بولىدىغان ئاق
رەڭلىك زەخىملىنىشلەردىن ئىبارەت بولۇپ، تەرەققى قىل-
لىپ پۈتۈن ئېغىز ئىچىنى، ھەتتا قىزىل ئوڭگەچلەرگىچە
تارقىلىشى مۇمكىن. بەزىدە سۇ كۆتىرىلىپ چىققان ھال-
دىمۇ بولىدۇ.

سەۋەبى: قان ياكى سەپىرادىن پەيدا بولىدۇ.
بەزىدە ھەر ئىككىسىنىڭ بىرلىشىپ كېلىشىمۇ ئۇچرايدۇ.

داۋاسى: قان ئېلىش بىلەن تاباشىر، كافۇر،

ئانارگۈللىرىنى سوقۇپ ئېغىز ئىچىگە سېپىلىدۇ. ئېغىز

ھاللاردا سىركە ۋە تۇزنى قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاشقا

بېرىلىدۇ. ئەگەر سىركىنىڭ چۈچىمەللىكى ئۆتكۈر بولسا

ئازراق زەپەر قوشۇپ ئىشلەتسە بولىدۇ. كىچىك بالىلاردا

بولسا كىراخماننى ئىت ئۇزۇمى سۈيىگە ئېزىپ چېپىشقا

بېرىلىدۇ ياكى گازىۋاننى كۆيدۈرۈپ كۈلى سېپىلىدۇ.

ئېغىزنىڭ يەل يارا كېسىلى (ئاكىلە تۇلفەم) ①

“ئاكىلە” دىگەن سۆز “ئويۇپ يەپ تاشلىغۇچى” دىگەن مەنانى بىلدۈرىدۇ. بۇ كېسەل ئېغىز ئىچىدە بىر ئورۇندا پەيدا بولۇش بىلەن بىللە جاپىسانلا ئەتراپقا كېڭىيىپ ئويۇلغاندا چوڭقۇر يارا ھاسىل قىلىدۇ. ئالامەتلىرى: ئېغىز ئىچىدە، بولۇپمۇ قوۋۇز گوشىدا دەستلەپ چېكىت چوڭلىقىدا يارا پەيدا بولۇپ، بىر قانچە كۈن ئىچىدىلا زورىيىپ، يۈز گوشىنى خىرىتىپ تاشلاپ چوڭ كامار ھاسىل قىلىپ چىش مۈلكىنى ئې- چىپ قويدۇ. سېسىق بۇرايدۇ، كۈيۈشۈش ۋە ئېچىش ۋەھۋالىرى ئېغىر بولىدۇ. ئېغىر ھاللاردا ئاغرىق تاماق يېيەلمەي قالىدۇ.

داۋالاش: ئەگەر مەنى قىلىدىغان ئەھۋاللار بول-

مسا، ئالدى بىلەن قان ئېلىپ، ئۇندىن كېيىن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئېغىز ئىچىنى سىماق- نىڭ قاينىتىلغان سۈيى بىلەن چايقاش كېرەك. سىرتتىن سېپىش ئۈچۈن قۇرسى يەلدىيۇن (46 - نۇسخە) نى ئېزىپ جاراھەتكە سېپىشكە بېرىلىدۇ. ياكى تاتلىق ئانار پوستى، ئاچچىق ئانار پوستىنىڭ ھەربىرىنى 3 سەردىن، موزا، ئانارگۈلى، سېرىق چىچەك، ئاقىر قەرھانىڭ ھەربىرىنى 1 سەردىن، سىماق 15 مىسقال، نەمەكى ھەندى، نو- شۇدۇر ھەربىرىنى 5 مىسقالدىن ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ

① ئاكىلە تۇلفەم - دوختۇرلۇقتا “نوما” دەپ ئاتىلىدۇ.

ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سىركە بىلەن دۇغۇرۇپ توقچاق تەييارلاپ لازىم كەلگەندە ئېزىپ ئىشلەتىش كېرەك.

ئېغىزدىن شولگەي سۇ ئېقىش

ئۇيىقا ۋاقتىدا ياكى ئادەتتىكى چاغلاردا ئېغىزدىن كۆپ مىقداردا شولگەي ئاقىدۇ.

سەۋەبى: مەيدىنىڭ تەبىئىيەتتە ھول ئىسسىقلىق - نىڭ غەلبە قىلغانلىقى ياكى مەدە ئىچىدە سوغاق سۇيۇقلۇقلارنىڭ توپلىشىپ قېلىشىدىن پەيدا بولىدۇ. بۇ ھەزىمنىڭ ناچارلىغىنى ئىپادىلەيدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىسسىقلىقتىن بولسا، شولگەي قوساق ئاچ ۋاقتىدا كۆپىيىدۇ. ئەگەر سوغاقتىن بولسا، قوساق توق ۋاقتىدا شولگەي كۆپىيىپ، ئېغىز چۈچمەل بولىدۇ.

داۋاسى: ئىسسىقلىقتىن بولغانلىرىغا ئانارۋە ئالما شەرۋىتى (47-48-نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. سىماق، ماش قىزىلگۈللەرنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ، قايى-ئىتىپ سۈيى بىلەن ئېغىزنى چايقاش لازىم. ئەگەر سوغاقلقتىن بولسا ئالدى بىلەن سېرىق چىچەك، تۇرۇپ ئۇرۇغى، چۈچۈكبۇيا يىلتىزىنى قاينىتىپ ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇش لازىم. ئۇندىن كېيىن ئىتريپىل كەبىر (1-نۇسخە) ۋە جاۋارش كۈمۈنى (49-نۇسخە) بېرىلىدۇ. كۈندۈز بىلەن مەستىكى چاپناشقا بېرىلىدۇ.

تاغلاي ياللىغى

بەلغەم ياكى قاننىڭ سەۋىيىسىدىن تاغلاي ئىشىپ قالىدۇ. تاماق يېيىش ۋە سۆزلەشكە مەلۇم تەسىر بېرىدۇ. * ئالامەتلىرى: قان سەۋىيىسىدىن بولغانلىرىدا ھارا- رەت بىللە كېلىپ ئاغرىش قاتتىق بولىدۇ. تاغلاي قىزىرىدۇ ۋە ئىشىشىدۇ. ئەگەر بەلغەمدىن بولغان بولسا رەڭگى ئاق ۋە ئاغرىش ئانچە بولمايدۇ. **داۋاسى:** ماددىسىغا قاراپ تازىلىغۇچى دورىلار بېرىلىدۇ. باشقا چارىلار ئېغىز ئىچىنىڭ ئاقۇش يارىسى- دىكىگە ئوخشاش.

كالىپۇكنىڭ ئاقىرىپ قېلىشى

كالىپۇك (لەب) نىڭ ئاق رەڭدە بولۇپ قېلىشى قاننىڭ ئۆزگىرىشى، بەلغەمنىڭ خاملىغى ۋە باشقۇرغۇچى ئەزالار (ئەزاىي رەئىسە) نىڭ ھارارىتى ناچارلاشقانلىقتىن يۈز بېرىدۇ. مۇھىم سەۋىيى بەلغەمدۇر.

داۋاسى: تەرتىپ بىلەن بەلغەمنى سۈرۈپ چىقىرىش ئۈچۈن ئايارەج پەيىقارا (16 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. كۈل يېغى، ياسمەن يېغى بۇرۇنغا تامغۇزۇلىدۇ. يەللىك تاماقلاردىن پەرھىز قىلىنىدۇ. ئەگەر سەۋىيى قىزىتمىلىق كېسەللەردىكى بوھران بولسا داۋا قىلىش ھاجەتسىز، ئۈزلىگىدىن يوقاپ كېتىدۇ. ئۇندىن باشقا كالىپۇكتىكى قوقاق قاتارلىق مۇدۇرلارنىڭ سەۋىيى قان ۋە سەپرادىن

بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلارنى بىللە داۋالغاندا قىپال
تومۇرىدىن قان ئېلىش كۇپايە قىلىدۇ.

4- پەسىل: چىش كېسەللىكلىرى

چىش ئاغرىش (دەردى دەندان)

چىش ئاغرىقى سەۋەپلىرىگە قاراپ توۋەندىكىچە
4 خىلغا بۆلۈنىدۇ. ئۇلار سەۋەپلىرىگە قاراپ داۋاسىمۇ
بىرىرىدىن پەرقلىنىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن چىش ئاغرىقىنى
داۋالاشنىڭ مۇھىم باسقۇچى ئۇنىڭ سەۋىيىنى بىلىشتۇر.

1) ماددىلاردا ئۆزگىرىش بولمىغان ھالدا مىزاج
بۇزۇلۇپ ئىسسىقلىقتىن ئاغرىش: ئىسسىقلىقتىن كېلىپ چىققان
چىش ئاغرىقلىرىدا مۇھىم ئالامەتلىرىدىن بىرى ئېغىز
ئىچىگە سوغاق نەرسە ئالسا ئاغرىش پەسىيىپ قالىدۇ.
چىش تۈۋى قىزىق بولىدۇ، ئاغرىش قاتتىق باشلىنىدۇ.
داۋاسى: سىركە بىلەن گۈلاپنى ① ئارىلاشتۇرۇپ

ئېغىزدا تۇتۇپ تۇرۇلىدۇ. ئەگەر ئاغرىش بەك قاتتىق بولسا
بىر ئاز ئەپيۇننى گۈل يېغى بىلەن بىرگە ئاغرىۋاتقان
چىشقا قويسا دەرھال ئاغرىق ئارام بېرىدۇ.

2) ماددىلاردا ئۆزگىرىش بولمىغان ھالدا مىزاج
بۇزۇلۇپ سوغاقتىن ئاغرىش: سوغاق شامال ياكى سوغاق
نەرسە تىگىش بىلەن ئاغرىش كۈچىيىپ كېتىدۇ. ئىسسىق

① گۈلاپ: قىزىلكۈل ئەرەقى.

نەرسە تەسىر قىلىپ دەرھال پەسىيىپ قالىدۇ. ئاغرىش قاتتىق بولماستىن، بەلكى تېلپ ئاغرىپ تۇرىدۇ. (بۇ ئەھۋال بەلغەمدىن بولغان چىش ئاغرىشىمۇ ئۇچرايدۇ).
داۋاسى: ئالدى بىلەن بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى ئايارەج ياكى ھەببى سەبرە (4 - 7 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. ئاقىر قەرھا، توغرىغۇ، زەنجۋىل، پىلىللارنى سىركە بىلەن قاينىتىپ ئېغىزغا ئېلىش، 52 - نۇسخىدىكى تەرياقى سۇنۇنى چىش تىزۋىگە قويۇش كېرەك. ئەگەر بۇ چارىلار نەتىجە بەرمىسە تومۇر زىخنى قىزىتىپ دىققەت بىلەن ئاغرىۋاتقان چىشنىڭ دەل ئۈستىگە بىر قانچە قېتىم قويۇپ داغلاش ياكى گۇڭگۇرت تېزى (گۇڭگۇرت كىسلاتاسى) بىلەن كويدۇرۇش لازىم. داغلاش ياكى تىزىنى ئىشلىتىشتە باشقا ساق چىش ياكى ئېغىز ئىچىگە تەككۈزۈپ قويۇشتىن قەتئىي ساقلىنىش كېرەك.
(3) قان ماددىسىنىڭ غالىپلىقىدىن ئاغرىش: بۇ - ئىگدا چىش تۈۋى قىزىرىپ ئىششىغان ھالدا بولۇپ، ئاغرىش چىشنىڭ تېگىدىن چىقىۋاتقاندا سېزىلىدۇ.
داۋاسى: ئەھۋالغا قاراپ قىپال تومۇردىن قان ئېلىش، ياكى ھىجامەت قويۇش لازىم. ئۇندىن كېيىن مەتبۇخى ھېلىلە ياكى مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - 38 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. گازىۋان، ئىت ئۇزۇمى، يۇمىلاقسۇت - لەرنى قاينىتىپ سۈيىنى ئېغىزدا تۇتۇپ تۇرۇش، ئاغرىق قاتتىق بولسا، 52 - نۇسخىدىكى تەرياقى سۇنۇنى چىشقا قويۇش كېرەك.

4. سەپرادىن بولغان ئاغرىش: ئاغرىش قاتتىق بولمايدۇ. لوقۇلداپ ئاغرىپ پەسىپ تۇرىدۇ. چىش تۈۋى سېرىق بولىدۇ.

داۋاسى: مەتبۇخ ھېلىلە ياكى تەمىرى ھىندى بېرىلىدۇ. يۇقۇرىدا سۆزلەنگەن ئاغرىق پەسەيتكۈچى تەدبىرلەر قوللىنىلىدۇ.

ئۇندىن باشقا چىش ئاغرىقلىرى ئۈچۈن جەۋھەرى شىپا ياخشى ئۇنىۋم بېرىدۇ. ئىشلىتىش ئۇسۇلى — پاخ-تىغا تەككۈزۈپ ئاغرىق چىش ئۈستىگە قويۇپ چىشلەپ تۇرۇش لازىم.

چىشنىڭ قاماپ قېلىشى

ئادەتتە كىشىلەر چۈچمەل نەرسىلەرنى يىگەندە چىش قاماپ قېلىپ بىر نەرسە چايناش قىيىن بولۇپ قالىدۇ. شۇنىڭدەك چىش ئەسەبلىرىنىڭ سەزگۈرلىكى ئېشىپ كەتسە چىش قاماپ قېلىشى دائىم ئۇچرايدۇ.

داۋاسى: ئاغرىقنىڭ مىزاجى ئىسسىق بولسا مەت-بۇخ ھېلىلە ياكى مەتبۇخى ئەپتىمۇن (38-20 - نۇ-خىلار) بېرىپ گۈل يېغى، كافۇرلارنى چىشقا قويۇش لازىم. ئەگەر سوغاق بولسا جويۇز، ئاچچىق بادام مە-ھىزىنى قىزىتىپ چىشلارغا سۈركەش لازىم. ياكى تۇخۇم سېرىغىنى چالا پىشۇرۇپ سىركە بىلەن قاماپ قالغان چىشلارغا چېپىش كېرەك.

قۇرۇت يىگەن چىش

ئادەتتە كىشىلەر بۇ كېسەلنى چىشنىڭ قۇرۇتلاپ كېتىشى دەپ ئاتايدۇ.

سەۋەبى: بۇزۇق ماددىلار سەۋەبى بىلەن چىشنىڭ چىرىشىدىن ئىبارەت.

داۋاسى: ئاغرىش بولمىغاندا ئالدى بىلەن مىڭنى ئارتۇقچە ماددىلاردىن تازىلاش ئۈچۈن ھەببى قوقىيا بېرىلىدۇ. چىش كاۋاكلىشىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە چىشنىڭ قارشى تۇرۇش كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن رۇسۇت، نارجىل، سۇندى ھىندى، موزا، ئاقىر قەرھالارنى قايتا تاقان سۇ بىلەن ئېغىزنى چايقاش لازىم. ۋە ھەببى ئاس، ئازار گۈلى، زەمچىلەرنى لازىم مىقداردا ئېلىپ بىر ئاز سۇ بىلەن پىشۇرۇپ چىشنىڭ كاۋاك يېرىگە قويۇلىدۇ. ئەگەر ئاغرىش بولسا، چىش ئاغرىغىدا كۆر-سىتىلگەن جارىيلار قىلىنىدۇ.

چىش رەڭگىنىڭ ئۆزگىرىشى (تەغىرىزى رەڭگى دەندان)

چىشلاردا قارا، كۆك، سېرىق داغلار پەيدا بولۇپ قالىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى بۇزۇق ماددىلارنىڭ چىش جەۋھىرىگە ئۆتۈشىدىندۇر. قايسى ماددىنىڭ سەۋەبىدىن ئىكەنلىگىنى ئۇنىڭ رەڭگى بەلگىلەيدۇ. ئەگەر ماددا قۇيۇق بولسا ئۆزگىرىش ئاستا بولىدۇ، سۇيۇق بولسا تېز بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن بەدەن ۋە مىڭنى كېرەك-سىز خىلىتلاردىن تازىلاش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەبى ئايارەج ياكى ھەبى قوقىيا (7 - 17 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن ئەگەر رەڭگى سېرىق بولسا، ئىت ئۇزۇمى سۈيى بىلەن سىركىنى ئارىلاشتۇرۇپ چىشقا سۈركەپ، ئېغىزنى چايقاش لازىم. قارا رەڭدە بولسا بىخكەبىر، ئەپسەنتىن، سېرىق ئوت، مەستىكى، ئۇشەنلەرنى لازىم مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چىشقا قويىلىدۇ. ھەم تاتلىق مېۋىلەرنىڭ ياغىچىدىن مېۋاڭ ياساپ (ياغاچنىڭ ئۈچىنى سوقۇپ چۈتكىغا ئوخشاش قىلىپ) چىشىنى يۇيۇپ تۇرۇش لازىم.

چىشنىڭ مىدىرلاپ قېلىشى

چىش تۇۋىدىكى نەملىكنىڭ ئارتۇق بولۇشى ياكى چىش گۈشلىرى قاچقانلىقتىن چىشلار مىدىرلاپ قالىدۇ. بەزىدە يېقىلىش ياكى زەربىدىنمۇ چىشلار مىدىرلاپ قالىدۇ.

داۋاسى: مىدىرلىغان چىشنى قول ياكى تىل بىلەن تولا مىدىراتماسلىق، قاتتىق نەرسىلەرنى چاينىد-ماسلىق، ھەببۇل ئاس، سەكبىنەجىلەرنى قاينىتىپ سۈيىدە چايقاش لازىم. ئاچچىق ئانار پوستى، سېرىق ھېلىلە پوستى، قىزىلگۈلنىڭ يوپۇرمىغى، ئانار گۈلى، موزىلارنى

لازم مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ تالقان قىلىپ چىشلار تۈۋىگە باسسا بولىدۇ.

چىش مۇلۇكلىرىنىڭ قانىشى

قانىنىڭ بۇزۇلۇشى ياكى چىش مۇلۇكلىرىنىڭ تۇتۇش قۇۋۋىتى ناچارلىشىپ كەتكەنلىكتىن چىش سەۋەپسىز قانايدۇ.

داۋاسى: چىش تۈۋىدىن چىققان قاننى كوپىرەك چىقىرىش مۇمكىن. بۇ قان ئېلىشنىڭ ئىزىنى باسدۇ. ئۇنىدىن كېيىن قىزىلگۈل، جۇپتى بەلمۇت، ئازارگۈلى، ھەببۇل ئاس، خەرنۇپ شامى، سىماق، سۈئىدە، يىلپىل دارازلارنى باراۋەردىن ئېلىپ سوقۇپ چىش تۈۋىگە بېسىش لازىم.

5-پەسىل: گال ئاغرىقلىرى

بوغما (ھوناق)

يۇتقۇچ ۋە تاماق ئەتراپىنىڭ قويۇق بۇزۇق ماددىلار سەۋىۋىدىن ئىشىشىپ يالغان ئاق پەردە بىلەن قاپلىنىشى بوغما (خەنناق ۋابائى) دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ كېسەل كۆپىنچە كىچىك بالىلاردا ئۇچرايدۇ. بوغما يۈرەككە تەسىر بەرسە ئاقىۋىتى يامان؛ ئۆپكەگە تەسىر بەرسە ئۆپكە ياللۇغى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بوغما ئېغىر ئۆتكەندە قىزىتما، تارتىشىپ قېلىشلار قوشۇلۇپ كېلىشى مۇمكىن.

بۇ ئاغرىق ئۈچۈن خەتەرلىك ئاقىۋەت بېرىدۇ. بوغما
نىڭ ماددىسى ئاساسەن قان، سەپرا ۋە بەلغەمدىن ئى-
بارەت. سەۋدادىن كەمسەك بەلىدۇ.

ئالامەتلىرى: بوغما (خەنناق ۋابائى) نىڭ ئالامەتلىرى
ماددىنىڭ خىلىغا قاراپ توۋەندىكى بىر قانچە تۈرلۈك
بولىدۇ:

(1) ھارارەت يۇقۇرى بولۇپ ئېچىشى ئاغرىشقا
قارىغاندا ئۆتكۈر بولىدۇ. گال ئىچىگە قارىسا بوغۇز
ئەتراپى ئىششىغان بولۇپ، رەڭگى ساغۇش ساختا پەزدە
بىلەن قاپلىنىپ تۇرىدۇ. بۇ سەپرانىڭ ئالامىتىدۇر.

(2) ئاغرىش ناھايىتى قاتتىق بولۇپ، ئىچىشىدۇ.
ھارارەت ئۈستۈن، گال، بوغۇز ئەتراپى قىزارغان بولۇپ،
ئىششىق ئېنىق كۆرىنىدۇ. بۇ قان ماددىسىنىڭ بەلگە-
سىدىن ئىبارەت.

(3) بەلغەم ماددىسىدىن بولغاندا يۇقۇرقى ئالا-
مەتلىرى ئانچە ئېغىر بولمايدۇ. لېكىن ئىششىق ئاق
رەڭلىك بولۇپ كۆرۈنىدۇ.

ئومۇمەن بوغما كېسىلىدە يۇقۇرقى ئالاھىدە ئالا-
مەتلىرىدىن باشقا، كېسەلنىڭ ئومۇمى ئالامەتلىرى —
ئەپس سىقىلىش، ئېغىزنىڭ دائىم ئۇچۇق قېلىشى، كوزى
چاچىراپ چىقىپ كېتىدىغانىدەك ھالەت ۋە تىلىنىڭ
سىرتقا ئېسىلغانىدەك بولۇپ قېلىشى قاتارلىقلارمۇ كۆرۈ-
لىدۇ. كېسەلنىڭ ئاۋازى پۈتۈپ قالىدۇ، كوڭلى ئاينىدۇ،
لېكىن قۇسالىمايدۇ.

داۋاسى: (1) قان ياكى سەپرادىن بولسا، ئالدى بىلەن قان ئېلىش لازىم. بوغمىدا قان ئېلىش بەزىدە چوڭ نەتىجىلىك بولۇپ چىقىدۇ. ئەگەر كېسەلنىڭ ئومۇمى ھالىتى ناچار بولسا بىراقلا كىرىپ قان ئېلىشقا بولمايدۇ. بىر قانچە كۈنگىچە كۈندە بىر قېتىم ئاز-ئازدىن قان ئېلىش لازىم. ياكى پاقالچەك ساھىسىغا ھىجامەت قويۇلسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر ياللۇغلىنىش ئېغىر بولماي ئاغرىق كۈچلۈك بولسا، گەدەننىڭ بىر تەرىپىگە ياكى ئىككى تەرىپىگە ھىجامەت قويۇلىدۇ. ھىجامەت قويغان جايدىن بىر ئاز قان چىقىرىش مەنپەئەت قىلىدۇ. ئەگەر قان ئالمىسىمۇ بولىدىغان ھاللاردا قان ئالماسىنمۇ مۇۋاپىق سۈرگە بېرىش كۇپايە قىلىدۇ. ئەمما ئاغرىقنىڭ تىلى سىرتقا چىقىپ ئەھۋالى ناچارلاشقاندا دەرھال تىل ئاستى تومۇرلىرىدىن بولسىمۇ قان چىقىرىش لازىم.

(2) ئارقا تەرەتنىڭ ئەھۋالىغا دائىم دىققەت قىلىپ، قاتتىق كەلسە ياكى ئەستە كەلسە يۇمشاتقۇچى ھوقمە (53-نۇسخە) قىلىنىدۇ. ھەم تۈرلۈك مېۋە سۇلىرى بېرىلىدۇ. قان ۋە سەپرانىڭ بۇخاراتلىرىنى پەسەيتىش ئۈچۈن سىركە، گۈلاپ، ئىكەنجىۋىل، چىلان شەرىۋىتى بېرىلىدۇ. ۋە كاسىن ئۇرۇغى، قاپاق ئۇرۇغى، يۇمغاقسۇت قاينىتىلغان سۇغا شاتۇت سۇيىمىنى قوشۇپ غار-غار قىلىشقا بېرىلىدۇ. غىزاسىغا ئاقلىنىغان ئارپا شىرىسى بېرىش پايدىلىق.

(3) كېسەلنىڭ 3-كۈنى پۇنۇسىنى كالا سۈتىگە ئېزىپ كالىنى چايقاشقا بېرىلىدۇ ياكى يۇمىلاقسۇت كو-كىنىڭ سۈيى، ئىت ئۈزۈمىنىڭ سۈيى، شاتۇت، قىزىل-كۈل، چۈچۈكبويىلارنى قايناتقان سۇغا پۇلۇسىنى ئېرىتىپ ئېغىزنى چايقايدۇ.

(4) ياللۇغنىڭ يىرىك پەيدا قىلىپ ئېغىز ئال-ماي ئاغرىتىپ تۇرسا توغرىمۇ، ھىڭ ۋە قالىغاچ مايد-غىنى ئوخشاش مىقداردا ئېلىپ يېڭى كالا سۈتى ۋە قىزدۇرغان كۈنجۈت يېغى بىلەن كالىنى غار-غار قە-لىنسا ئاسان ئېغىز ئالىدۇ. ئېغىز ئالغاندىن كېيىن ئېغىز ئىچىنى تازىلاش ئۈچۈن كالا سۈتىگە ھەسەل ئېلەشتۈرۈپ ئېغىز چايقىلىدۇ.

بوغمىنى ئېغىز ئالدۇرۇش ئۈچۈن، تاشقى تەرەپ-تىن سوغاق دورىلارنى ئىشلىتىشكە رۇخسەت قىلىنمايدۇ. مۇنداق قىلىش ياللۇغلىنىشتىكى ئوفۇنەتلەرنى بەدەنگە تارقىتىپ قويىدۇ.

ئەگەر سەۋدانىڭ كۈپلىگى كورۇلسە يۇقۇرقى چارىلار بە-لەن بىللە ئايارەج پەيقارا، مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20-16-نۇسخىلار) قوشۇمچە بېرىلىدۇ.

گال ئاغرىغى (ۋەرەمى ھەلەق)

ئالامەتلىرى جەھەتتىن بوغمىدىن ئانچە پەرقلەن-مەيدۇ. ئەمما بوغۇلۇش، ساختا پەردە بولمايدۇ. ئايرىم

كىشىلەردە ئۆتكۈر قىزىتما بولماسلىقى مۇمكىن. سەۋەبى چى ماددىلارغا قاراپ ياللۇغلىنىپ ئىششىغان جايىنىڭ رەڭگى ھەر خىل ۋە ئاغرىشىمۇ ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە بولىدۇ. ئاغرىش بىر نەرسە يىگەندە، ھەتتا تۈكرۈكنى يۇتقاندا روشەن بىلىنىدۇ. گال قۇرۇق، تەش-ئاللىق كۆپ بولىدۇ. ئېغىر ھاللاردا ئىششىق روشەن كورۇنۇپ، ئاغرىش قاتتىق بولىدۇ.

داۋاسى: بوغمىدىكى چارىلار ئاساس قىلىنىدۇ. تەشنى ئاللىق ۋە گالنىڭ قۇرۇشى ئېغىر بولغاندا تەمىرى ھىندى، تەرەنجىۋىل ھەر بىرىدىن 2 سەردىن ئېلىپ قايناقسۇغا چىلاپ تەمىنى ئوبدان چىقىرىپ ماسا بىلەن سۇزۇپ بىراقلا ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ياكى مەتبۇخى خىيار شەنبەر (54-نۇسخە) بېرىلىدۇ. بەلغەم ماددىسى-نىڭ كۆپلىكى كورۇلە بەلغەمنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۇ-چۇن ھەببى قوقىيا (17-نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئېغىزنى چاقىش ئۇچۇن بوغمىدىكى دورىلار بېرىلىدۇ.

كىچىك تىل ۋە يۇتقۇچ ئەتراپىنىڭ پالچى (ئىستىرخايى لوھات)

بۇ، مىزاج بۇزۇلۇش سەۋىيىسى بىلەن پەيدا بولغان يۇتقۇچ ۋە كىچىك تىلنىڭ پالچ بولۇشىدىن ئىبارەت. بۇ كېسەلنىڭ سەۋىيىسى تۆۋەندىكىچە ئىككى خىل بولىدۇ.

1) مىزاجنىڭ ئىسسىقلىقى بۇزۇلۇشىدىن كېلىپ چىققان پالەچلىك — بۇنىڭ ئالامەتلىرى شۇكى: ئاغىرىق كال ئىچىدە بىر نەرسە ئېسىلىپ تۇرغانلىقىدىن زارلەنمىدۇ، ئاغىرىش بولمايدۇ. قاراپ كۆرگەندە كىچىك تىل ۋە يۇتقۇچنىڭ قىزارغان ھالدا ئېسىلىپ تۇرغانلىقى كۆرۈلىدۇ. تاماقنى يۇتۇش بارغانسېرى قىيىنلىشىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن قىپال تومۇردىن قان ئېلىش بىلەن تەرەنجمۇل، پۇنۇس، شېكەرتى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ قايناقسۇدا ئېرىتىپ پاكىزە ماتا ئارقىلىق سۇزۇپ ئىچىرىلىدۇ ۋە (53 - نۇسخىدىكى) دورا ھوققە قىلىنىدۇ.

2) مىزاجنىڭ سوغاقتىن بۇزۇلۇشىدىن كېلىپ چىققان پالەچلىك — بۇنىڭدا يۇقۇرقى ئالامەتلىرىدىن باشقا زەرەرلەنگەن جايىنىڭ ئاق بولۇشى، ئېغىزىدىن شۆلگەي كۆپ ئېقىشلارمۇ ئۇچرايدۇ.

داۋاسى: زەمچە، ھەببۇلئاسلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، ئانار سۈيىگە سېلىپ، ئېغىزنى چايقاشقا بېرىلىدۇ. زەمچە، بۇغا مۇڭگۈزى (كۆيدۈرۈلگەن) ۋە نوشۇدۇرلارنى كىچىك تىل ۋە يۇتقۇچقا پۇركۇش كېرەك.

ئۇندىن باشقا ئالامەتلىرىنىڭ تەرەققى قىلىش ئەھۋالىغا قاراپ پالەچكە قارشى تەدبىرلەر قىلىنىدۇ.

قىزىل ئوڭىگەچىكى يات نەرسىلەر

قىزىل ئوڭىگەچكە ھەر خىل يات جىسىملار — تا —
ماقنىڭ تۇرۇپ قېلىشى، زۇلۇك قۇرۇتى چاپلىشىپ قې —
لىش قاتارلىق ئەھۋاللار ئۇچراپ تۇرىدۇ. بۇنىڭغا دەر —
ھال چارە قىلىنمىسا ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە يۇ —
تۇش قىيىنلاشمىش، روھى جەھەتتە بىئارام بولۇش، قور —
قۇش ئەھۋاللىرى يۈز بېرىدۇ. ھەتتا بەزى يات ماددىلار
گالدىن ئۆتۈپ كېتىش بىلەنمۇ روھى جەھەتتىن يۈك
بولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: 1 تومۇر جىنىسلىق نەرسىلەر (يىڭىنە،
مىخ قاتارلىق) نى يۇتۇپ تاشلىغاندا ئاھانرە باتاش
(ماگىت تېشى) دىن بىر مىسقالنى يۇمشاق سوقۇپ بىر
قوشۇق ئىساستە بىلەن يىگۈزىلىدۇ (ئاج قوساقتا)، يېرىم
سائەتتىن كېيىن 5 مىسقال سانا، 2 مىسقال قىزىلگۈل،
بىنەپشە، 3 دانە سەرپىستاننى بىر پىيالە سۇ بىلەن قاي —
ىتىپ 15 مىسقال تەرەنجىۋىل قوشۇپ سوزۇپ ئىچىشكە
بېرىلىدۇ. ئۈستىدىن قەن چاينى رەيھان ئۇرۇغى بىلەن
بېرىلىدۇ.

2 گوش، نان پارچىسى، سوڭەك قاتارلىقلار
تۇرۇپ قالغاندا دەرھال ئىككى تاغاق ئوتتۇرىسىغا مۇش
بىلەن بىر قانچە قېتىم بوشراق ئۇرۇش كېرەك. بونىڭ
بىلەن چاپراپ چىقىپ كېتىدۇ ياكى توۋەنگە چۈشۈپ

كېتىدۇ. ئەگەر بۇنىڭ بىلەن نەتىجە بولمىسا قەي قىل-
 دۇرۇش كېرەك (كالىغا تۇخۇ پېيى ياكى بارماقنى سې-
 لىپ قەي قىلىنىدۇ) شۇنىڭ بىلەن چىقىپ كېتىشى
 مۇمكىن. شۇنداقتىمۇ ھەل بولمىسا كېسەلنى ئوڭدا يات-
 قۇزۇپ قاراش كېرەك. ئەگەر كۆرگىلى بولمىسا ئۇزۇن
 قىسقۇچ بىلەن ئېلىشقا چارە قىلىنىدۇ. ئەڭ ياخشى
 دەرھال دوختۇرخانىلارغا يوللاپ تېز قۇتقۇزۇش كېرەك.
 3) زۇلۇك قۇرۇتى يۇتقۇچ، كاناي ۋە بۇرۇن
 يوللىرىغا چاپلىشىۋېلىپ كىشىلەرگە چوڭ ئازاپ كەلتۈ-
 رىدۇ. دائىم كۆڭلى ئاينىش، غەم بېسىش ۋە بەزىدە قان
 قۇسۇش ياكى قانلىق سۇ كېلىشلەر بولىدۇ. كانايغا
 چاپلىشىۋالسا توختىماستىن يۈتەل تۇتىدۇ. مۇنداق
 ھاللاردا ئەگەر زۇلۇك كۆرىنىپ تۇرسا قالايمىقان تارتىپ
 ئۇزۇپ قويۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئازراق ئېرىق لېي-
 ى لاتىغا ئۇراپ كېسەلنىڭ ئېغىزىغا تىقىپ قويۇلسا
 زۇلۇك قۇرۇتى لايىغا قاراپ مېڭىپ چىقىدۇ. ۋە لايىغا
 چاپلىشىۋالىدۇ. لايىنى ئالغاندا زۇلۇكىمۇ بىللە چىقىپ
 كېتىدۇ ياكى كېسەلنى ئىسسىق مونچىغا ئىككىرىپ بىر-
 دەمدىن كېيىن ئېغىزىغا مۇز سالسا زۇلۇك ئاجراپ چىقىدۇ.

قىزىل ئوڭىگەچ ۋە يۇتقۇچنىڭ قىچىشى

مەئىدىگە يىغىلىپ قالغان كۆيگەن قويۇق خىلىتلار
 بۇخارات ۋە يەل پەيدا قىلىپ مەئىدىنىڭ ئۈستىكى قە-

سىملىرىنى — قىزىل ئوڭگەچ، يۇتقۇچىلارنى غەدىغلاپ قىچىش ھاسىل قىلىدۇ. كېسەل دائىم گېلى قىچىش بىلەن توختىماستىن تۇتقان يۈتەلدىن شىكايەت قىلىدۇ. **داۋاسى:** سېرىق چىچەك، لوبىيا، تۇرۇپ ئۇرۇغە-نى ئوخشاش مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيىگە سىركە بىلەن شېكەر قوشۇپ ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرىلىدۇ. كونا سىركىنى ئېغىز چايقاشقا ۋە سۈتكە شېكەر سېلىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

يۈتۈشنىڭ قىيىنلىقى

يىگەن ۋە ئىچكەن نەرسىلەر گالدىن قىيىنلىق بىلەن ئۆتىدۇ. دەسلەپتە قاتتىقراق نەرسىلەر ئۆتمەسە، كېيىنچە بارغانسېرى سۇمۇ ئۆتمەيدىغان بولۇپ قالىدۇ. **سەۋەبى:** قىزىل ئوڭگەچنىڭ تارىيىشى؛ قىزىل ئوڭگەچتىكى ئۈزگىرىشلەردىن ئىبارەتتۇر. يۈتۈش ئاساسەن يۇتقۇنچاق ۋە ئەتراپىدىكى گۈشلەر ھەمدە قىزىل ئوڭگەچنىڭ تەبىئى پائالىيىتى بىلەن بولىدۇ. مەسىلەن، قۇرۇق ئىسسىقلىق يۇتقۇنچاقنىڭ تۈۋەنگە ھەيدەش قۇۋۋىتىنى بۇزىدۇ. بۇنىڭ بىلەن گالدىن تاماق ھەيدەش لىشى بۇزۇلىدۇ. قۇرۇق سوغاق غالىپ بولغاندىن قىزىل ئوڭگەچنىڭ ئۈزىگە تارتىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋىتى جازىبە-سى) بۇزۇلۇپ تاماقنىڭ مەنىدىگە قاراپ تارتىلىشى نا-

چارلىشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن يۇتۇشنىڭ قىيىنلىقى كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئاغرىق يىگەن، ئىچكەن نەرسىلەر-
نىڭ گېلىدە تۇرۇپ قالىدىغانلىقى، گالدىن ناھايىتى
ئاستىلىق بىلەن ئۆتمىدىغانلىقى، ھەتتا يېنىپ كېتىدۇ-
غانلىقىدىن زارلىنىدۇ. قۇۋۋەتسىزلىك ئالامەتلىرى ۋە
ئورۇقلاش كۈندىن-كۈنگە تەرەققى قىلىدۇ. ئەمما تاماق
يۇتقاندا ئاغرىش بولمايدۇ. ئىسسىقلىق بولغاندا تەشئالىق
يامان بولىدۇ، سوغاق سۇ ئىچسە راھەتلىنىدۇ. ئەگەر
سوغاقتىن بولسا، ئەكسىچە ئېغىزدىن دائىم شولگەي ئېقىپ
تۇرىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن مىزاجنى ئۆزگەرتىش
لازىم. ئاغرىقنىڭ مىزاجى ئەھۋالغا قاراپ ئىسسىق بول-
سا نۇقۇتتى تەمىرى ھىندى (55-نۇسخە) سېمىز ئۇت
ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى ئىسپىغۇل لۇئابىنى بىرلەشتۈرۈپ
ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ھول يۇمىغاقسۇت، كاسىن ۋە ئوسۇڭ
يوپۇرمىغىنى قاينىتىپ ئېغىزنى چايقاشقا بېرىلىدۇ. سەد-
دەل، كاپۇر، يۇمىغاقسۇت، بىنەپشە يېغى، موم يېغى بىر-
لەشتۈرۈپ ئىككى تاغاق ۋە غول ئارىسىغا چېپىش لازىم.
ئەگەر سوغاقتىن بۇزۇلغان مىزاج سەۋىيىدىن بولغان بولسا
شەرۋىتى دىنارى (56-نۇسخە) ياكى شارابى بادىرەنجىمۇيىغا
رۈەبىدىيان، سۇمبۇل، مەستىكىلەرنى قوشۇپ ئىچىشكە
بېرىلىدۇ. سۇمبۇل، مەستىكى، ئەپسەنتىلەرنى قۇست يېغى،

سېرىق چىچەك يېغى ياكى تۇرۇپ يېغىنىڭ بىرىگە قۇر-
شۇپ تاغاق ئارىلىغى ۋە غۇل ئەتراپىغا سىرتتىن سۈر-
كەشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر تەبىئىي نەملىككە زىيادە مايىل
بولسا ئالما شەۋىتى (48 - نۇسخە) غا بىر ئاز زەپەر
قوشۇپ بېرىش كېرەك.

قىزىل ئوڭگەچ يارىسى

يارا قىزىل ئوڭگەچتە بولسا يۇتۇش بىلەن قاتتىق
ئاغرىش سېزىلىدۇ. يۇتقۇچ ئەتراپلىرىمۇ قىزارغان بولۇپ
ھارارەت بولىدۇ. ئاغرىش ئادەتتىكى چاغلاردىمۇ بولىدۇ.
ئەگەر يارا ئۆپكە يېغى ئەتراپلىرىغا تارقىلىپ كەتسە
سوزلىگەندە تۇتۇن، چاڭ - توزاڭلىق جايلاردا كېسەل كە-
شى كاناي ساسسىدا بىئاراملىق، ئاغرىش سېزىلىدۇ.
يوتەل ۋە بۇزۇلغان بەلغەم بولىدۇ.

داۋاسى: باسلىق تومۇردىن قان ئېلىش، ئىيىنۇلا،
تەمىرى ھىندى، خىيار شەنبەرلەرنى باراۋەر مىقداردا
ئېلىپ قايناقسۇغا چىلاپ، سىقىپ تەمىنى چىقىرىپ ئ-
چىشكە بېرىلىدۇ. ئەتە - ئاخشام گۈل يېغى، بىنەپشە،
ئىسپىغۇل لۇئاپلىرىغا شېكەر قوشۇپ بېرىلىدۇ. سوغاق
نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش كېرەك، سىمپلىق دورىلارنى
ئىشلىتىشنى ئويلاپ باقسا بولىدۇ.

ئاۋاز پۇتۇش (بەتلانى سەۋىتى)

ئاۋازنىڭ پۇتۇشى غىرتىلىداق (ھەنجەر) نىڭ ھەم
خىل سەۋەپلەر بىلەن زەرەرلىنىشىدىن پەيدا بولۇپ، سوز-

لىگەندە ئاۋاز چىقاسلىق، كىسىلداپ قېلىش ياكى ئەس-لىدىكىدىن ئۆزگىرىپ كېتىش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. سەۋەپ-لىرىگە قاراپ توۋەندىكىچە 4 خىلغا بۆلۈنىدۇ. ئۆز ۋاقتىدا داۋالسا تېز ساقىيىدۇ. ئەگەر ئۇزۇنغا قالسا ساقىيىش تەس.

(1) مىزاج بۇزۇلۇش ھالىتى — يەنى غىرىتلىداق مىزاجنىڭ ماددىلار ئارلاشمىغان ھالدىكى بوزۇلۇشىدىن پەيدا بولغان ئۇنى پۇتۇش — غىرىتلىداقنىڭ ئەسلى مىزاجى ھول — قۇرۇقلۇقتا موتىدىل بولۇپ، بۇ ئاۋازنىڭ ئۆز يولى بىلەن چىقىشىغا ياردەم بېرىدۇ. بۇ ھال ئۆزگەرسە مەسىلەن، ھوللۇك ياكى قۇرۇقلۇق ئېشىپ كەتسە ئاۋاز بوزۇلىدۇ. ھوللۇكنىڭ ئېشىپ كېتىشى ھوللۇك تاماقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىشتىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامىتى: سۆزلىگەندە ئاۋاز ئۇشقىتقانداك چىقىدۇ. قۇرۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كېتىشى — قۇرۇق تاماقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش، قۇرغاق ھاۋادا ئۇزۇن مۇددەت نەپەس ئېلىپ تۇرۇشلار سەۋەپ بولۇپ، ئالامىتى سوز-لىگەندە ئاۋاز كىسىلداپ چىقىدۇ. ئېغىز ۋە لەۋلىر قۇرغاق بولىدۇ.

داۋاسى: ئىسپىغۇل لۇئابى، شېكەر، توخۇ شور-پىسى، مەسكە مايلىرىنى مۇۋاپىق ھالدا بىرلەشتۈرۈپ بېرىلىدۇ. ياكى ئانارنىڭ يېغىنى ئېلىۋېتىپ كىچىك

تۈشۈك ئېچىلىدۇ، ئانار چوغ ئۈستىدە بىردەم تۇرغاندىن كېيىن ھور چىقىشقا باشلىغاندا تۈشۈكتىن بىر ئاز بىسنەپشە يېغى، بادام يېغى قۇيۇپ سەل تۇزغۇزۇپ چىقىرىپ سۈيى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئۇنىمى ناھايىتى ياخشى. ياكى لۇتۇقى زەنجىۋىل، لۇ-ئۇقى ئەلجىر، لۇتۇقى ھولبە (57-58-59-نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. بۇ دورىلار غىرىتلىداقنىڭ مىزاجىنى تەڭشەشكە زور پايدىلىق بولۇپ، ئاۋازنى ئاچىدۇ.

(3) نەزلە سۇيۇقلۇقى مىڭە تەرەپتىن كالىغا قۇيۇلۇشى بىلەن ئاۋاز پۈتۈشنى نەزلە ئاۋازى (سەۋىتى نەزلى) دىيىلىدۇ.

ئالامەتى: كاناي قىسمى تاتىلغاندەك ئېچىش ۋە كالى قۇرۇش بىلەن ئاۋاز ھەر خىل دەرىجىدە پۈتمەيدۇ.

داۋاسى: لۇتۇقى سەرپىستان (60-نۇسخە) ۋە لۇتۇقى خەشخاشلار (61-نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(4) قىزىتىش كېسەللەردە بولىدىغان ئاۋاز پۈتمەش غىرىتلىداقنىڭ سۇيۇقلۇقنىڭ يوقىلىشىدىن بولۇپ، بەلگىسى قۇرۇقتىن بولغان ئاۋاز پۈتۈش بىلەن ئوخشاش. داۋالاشتا ئارچا قايناتقان سۇ ئىچىشكە بېرىپ ئاقلاشقان ئارپا، چىلان، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، سەرپىستانلارنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيىگە ئاۋاز سېلىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

IV ماقالا. كوكرەك بوشلۇقى (سەنە) كېسەللىكلىرى

1. - پەسىل: ئوپكە كېسەللىكلىرى

ئوپكە كېسەللىكلىرى، ئوپكە ياكى ئۇنى ئوراپ تۇرغۇچى پەردىنىڭ بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىق زەرەرلىنىش ھەم باشقا ئەزالاردىكى ئۆزگىرىشنىڭ مەسىلىن، مىڭگە يۈرەك، جىگەر قاتارلىقلارنىڭ زەرەرلىنىشلىرى سەۋىيىسى بىلەن كېلىپ چىقىدۇ. بۇلار ئومۇمەن تۈۋەندىكى بىر - قانچە خىلدىن ئىبارەت: ماددىسىز مىزاج يۈزۈلۈش ياكى ماددىلىق ئۆزگىرىش؛ ياللۇغلىنىش ۋە جاراھەت توسالغۇ؛ ئوپكىنىڭ زەرەرلىنىشى ئوپكىدىكى ئۆزگىرىشلەر مەيلى قايسى سەۋەبتىن بولمىسۇن دەم سىقىش ۋە يۈتەل بىلەن ئوتىدۇ.

دەم سىقىش (زەيىقۇلنەپەس رەۋە)

نەپەس سىقىلىش ئۇزۇنغا سوزىلىدىغان ئاغرىق بولۇپ، ۋاقىت ئۆتكەنسېرى داۋالاش شۇنچە تەس بو -

لىدۇ. كېلىپ چىقىش سەۋەپلىرىگە قاراپ بۇ ئۈنۈمدىن كىچىك 9 خىلغا بۆلۈنىدۇ.

(1) بەلغەم ماددىسىنىڭ كۆپىيىپ ئۆپكىنىڭ ھاۋا يولىغا توپلىشىپ ئالغانلىقىدىن پەيدا بولىدۇ. ئالامەت - لىرى يۈتۈلىدۇ، كۆپ مىقداردا بەلغەم چىقىش بىلەن ئۆپكىدە غىزىلداشنىڭ بولۇشىدۇر.

داۋاسى: زۇپا شەرىۋىتى بىلەن بەلغەمنى پىشۇرۇپ، ئۇنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى غارىقۇن (2-63-64 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. زۇپا شەرىۋىتىدىن 2 قوشۇققا 3 قوشۇق قايناقسۇ قوشۇپ كۈنىگە 3 قېتىمدىن داۋاملىق بېرىلىدۇ. ئەگەر ھاجەت بولسا تۇرۇپ (لۈبۈ) قاينىتىلغان سۇغا ھەسەل قوشۇپ ئىچىشكە بېرىپ قەي قىلدۇرىلىدۇ. يىمىشكە توخۇ گۆشى، قۇشقاچ گۆشى بىر رىش لازىم. نەپەس قىيىنلىشىشى ئېغىر بولسا، زىغىرنى چالا سوقۇپ قاينىتىپ سۈيىگە بىر ئاز ھەسەل قوشۇپ بېرىلسە نەتىجىسى ياخشى. كۈچلۈك تەسىر قىلغۇچى دورىلارنى بېرىشتىن ساقلىنىش كېرەك. زىغىر يېغى ئۆشكە بورىگىنىڭ يېغىدىن 1 سەردىن، ئاق مومدىن 5 مىسقال ئېلىپ بىرلەشتۈرۈپ ئېرىتىپ كۆكرەك ئۈستىنى ياغلاشقا بۇيرىلىدۇ. بەلغەمنى چىقىرىش ئۈچۈن ھەببى پىلىپىل بېرىلىدۇ (4-64 - نۇسخە).

(2) يۈرەكتىكى زەرەرلىنىش نەتىجىسىدە بۇخاراتا - لارنىڭ ئۆپكىگە تەسىر قىلىشى بىلەن بولغان نەپەس

قىيىلىشىش. بۇنىڭدا نەپەس ھەركىتى تېز بولۇپ، تو-
مۇر تەرتىپسىز، چوڭ ۋە تېز سالىدۇ. ئۇسسۇزلۇق كۆپ
بولىدۇ.

داۋاسى: سول قەل باسلىق تومۇردىن قان ئې-
لىنىدۇ. ئىسپۇغۇل لۇئابى^①نى ئىلۇفەر شەرۋىتى ياكى
بىنەپشە شەرۋىتىگە قوشۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. تەشئالىق
ئۈچۈن ئالما شەرۋىتى قايناقسۇ بىلەن تەڭشەپ بېرىل-
دۇ. ياكى سەندەل شەرۋىتى (48 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.
ئەزالارنى مۇجۇپ تۇتۇش، ئىسسىق ئۆتكۈزۈش پايدىلىق
ئامىللاردىندۇر، ئەڭ مۇھىمى يۈرەكتىكى كېسەلنى دا-
ۋالاش چارىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ ئېلىپ بېرىش لازىم.

(3) ماددىسىز مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان دەم سىقىش
ئىسسىق - سوغاق ۋە قۇرۇقلۇقتىن پەيدا بولىدۇ.

ئىسسىقتىن بولغىنىدا تومۇر ھەركىتى تېز ئەمما
كىچىك بولىدۇ، كۆپ ئۇسسايدۇ، سوغاقلىقتىن راھەتلى-
نىدۇ (كېسەلى يېنىكلەشكەندەك بولىدۇ).

داۋاسى: ئىسپۇغۇل لۇئابىنى مەجۇنى بىنەپشە
(65 - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ.

قۇرۇقلۇقتىن بولغىنىدا قۇرغاق ھاۋادا ئۇزۇن تۇ-
رۇش، چول ۋە قۇملۇقلاردا سەپەر قىلىشلاردىن پەيدا

^①ئىسپۇغۇل لۇئابى تەييارلاش: كېرەكلىك مىقداردىكى
ئىسپۇغۇلنى چىلاشقىمىدەك سۇغا سېلىپ بىردەمدىن كېيىن تازا
چالغۇتۇلما شىلمىلىق بىر سۇيۇقلۇق يەنى لۇئاپ ھاسىل
بولىدۇ.

بولىدۇ. ئالامىتى خەپرۇك بولىمايدۇ، ئاۋازى بۇلىدۇ.
تەشئالىق زىيادە بولىدۇ.

داۋاسى: ئارپا سۈيى، ئۈچكە سۈتى ئىچىشكە بېرىلىدۇ.
ھەم قىز تۇققان ئايالنىڭ سۈتى كۈكرەككە سۈرتىلىدۇ.
سوغا قلىقتىن بولغىنىدا كۈپىنچە ئۈپكىگە سوغاق
ئوتۇپ كېتىش سەۋەپ بولىدۇ. كېسەل ھاۋانىڭ سوغاق
كونلىرى ياكى يامغۇرلۇق كۈنلىرىدە نەپەس قىيىنلە-
ششنىڭ زىيادە بولىشىدىن زارلىنىدۇ.

داۋاسى: تاشقىرىدىن ئۈپكىگە ئىسسىق ئوتكۈزىلىدۇ
ۋە شۈمشە (شياڭدۇزا) دەملىمىسى (66 - نۇسخە) ئىچىش-
كە بېرىلىدۇ. ياسمەن يېغى، نەغمىز گۈل يېغى كۈكرەككە
سۈرتىلىدۇ. تۇخۇم سېرىغى، زىرە ۋە پىشەنە بىلەن بى-
رىلىدۇ.

4) ھاۋا يوللىرىدىكى يەل سەۋەبىدىن بولغان
دەم سىقىش: كۈكرەك ئىچىدە يېقىمىزلىق سېزىلىدۇ.
بەلغەمسىز يۈتەل بولىدۇ ۋە يەللىك نەرسىلەر ئاغرىقنى
يامانلاشتۇرىدۇ.

داۋاسى: بىرىنچى خىلدىكى چارلار بىلەن ئايارەج
پەيقارا بېرىپ ئارقىسىدىن ئۇشدارى (16 - 21 - نۇسخىلار)
ياكى مەجۇنى فىلاسىپە (18 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. تىرتتىن
سۇزاپ يېغى، سېرىق چىچەك، بابۇنە سۈركەشكە بېرىلىدۇ.
5) ئۈپكە ۋە ئۇنى قاپلاپ تۇرغۇچى پەردە، كىر-
گىت پەردە ۋە جىگەر ياللۇغلىرىدىكى نەپەس قىيىنلە-

شېشىنىڭ. ئالامەتلىرى: يۈتەل ئاز مىقداردىكى بەلغەم
ۋە كۆكرەكنىڭ ئاغرىشىدىن ئىبارەت. ئىگەر ياللۇغلىنىش
ئۆپكىنىڭ ئۆزىدە بولسا چىرايى قىزارغان بولىدۇ.
پەردىدە بولسا ئاغرىش ئېغىر بولىدۇ.

(6) بوغىمىدىن نەپەس قىيىنلىشىش — يۇتقۇچ تو-
شۇكى ئەتىراپىنىڭ ياللۇغلىنىشى نەتىجىسىدە بوغۇلۇش
كېلىپ چىقىدۇ. بۇنىڭ داۋاسى بوغىمنى داۋالاشتىن
ئىبارەت.

(7) مەئىدىنىڭ ھەددىدىن ئارتۇق كۆپۈپ كېتىشە-
دىن دەم سېقىش. كۆتۈرۈلگەن مەئە ئۆپكىنى قىسىپ
قويغانلىقىدىن نەپەس قىيىنلىشىدۇ.

داۋاسى: ئايارەج پەيىقارا (16 - نۇسخە) بىلەن
مەئىدىنى بوشىتىپ ھەزىمنى ياخشىلىغۇچى دورىلار
مەسىلەن، مەجۇنى كۈمۈنى (49 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(8) كىرگىت پەردە (ھىجابى ھاجىزە) نىڭ بوشە-
شپ كېتىشى بىلەن ئاغرىق قوش نەپەس ئالىدۇ. نە-
پەس ھەركىتى كېڭىيىش ھالىتىدە بولىدۇ. تومۇر يۇمشاق
ئۆرىدۇ.

داۋاسى: شۇمىشە قاينىتىلغان سۇغا ھەسەل قۇ-
شۇپ بېرىلىدۇ. سىياداننى يۇمشاق سوقۇپ ھەسەل ۋە
سېرىق چىچەك بېغى بىلەن كۆكرەككە سىرتتىن سۇرتۇشكە
بۇيرۇلىدۇ. ھۆل سوغاق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىنىدۇ.
(9) نەپەس يۆللىرىغا قۇيۇق خىلىتلار قاپلىشىپ
ياكى ياللۇغلىنىپ تۈسلىشتىن بولغان دەم سېقىش: بۇ

ناھايتى ئېغىر ئۆتمىدۇ، ئاغرىق ياتالمايدۇ. ئولتۇرغاندا دەمۇ نەپەس قىيىنلىشىپ بىئارام بولىدۇ. بەلغەم چىقىش بىلەن بىرئاز يېنىكلىشىدۇ.

داۋاسى: ئاغرىقنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ئالا-مەتلىرىنى يېنىكلىشتۈرۈش ئۈچۈن يۇقۇرىدا كورستىلگەن چاريلاردىن مۇۋاپىق بولغانلىرى قوللىنىلىدۇ.

يوتەل (سۇئال)

چۈشكۈرۈش مىڭنىڭ مۇداپىئەلىنىش ھەرىكىتى بولغىنىدەك. يوتەل ئوپكىنىڭ ئاپەتلىرىدىن قوغدىنىش پائالىيىتىدۇر.

يوتەلنىڭ سەۋىيى ئاساسەن مىزاج بۇزۇلۇش، يال-لۇغلىنىش، جاراھەتلەر ۋە ھەرخىل تاشقى تەسىراتلار مەسىلەن، سوغاق شامال، چاڭ-توزاڭ، تۇتۇن، ئاچچىق-چۈچۈك تاماقلار ياكى ئۇنىڭ نەپەس يوللىرىغا ئۆتۈپ كېتىشى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

1) مىزاجنىڭ بۇزۇلۇشى ماددىسىز ۋە ماددىلىق دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ:

(1) سازەج يەنى ماددىسىز يوتەلنىڭ ئىسسىقلىق بولغىنى ھارارەتلىك شارائىتلاردا مەسىلەن. خۇمدان، تۈ-نۇر باشلىرىدا ئۇزۇن تۇرۇش، قۇملۇق چوللۇك جايلاردا تۇرۇش بىلەن ئوپكىگە يۇقۇرى ھارارەت تەسىر قىلىپ ئوپكىدە ساپ ھاۋا يېتىشمەسلىك ئەھۋالى

پەيدا بولىدۇ. يەنى ھاۋاغا بولغان ھاجەت كۆپىيىدۇ. ئۆپكىنىڭ جازىمە (تارتىش) قۇۋۋىتى يېتىشمەسلىك ئەتە-جىسىدە ئۆپكە غىدىغلىنىش بىلەن يۆتەل پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆپ ئۇسايدۇ، ئېغىز ئىچى قۇر-غاق بولۇپ، سوغاق نەرسىلەرنى ئىستىمال قىلغاندا يۆتەل بىر ئاز يېنىكلەشكەندەك بېلىنىدۇ، ئىسسىق ھاۋا ياكى ئىسسىق شارائىت يۆتەلنى يامانلاشتۇرىدۇ. ئاغرىقنىڭ رەڭگى قىزارغان ھالەتتە بولىدۇ.

داۋاسى: ئىسپۇغۇل لۇئابى بېرىلىدۇ. ئاق سەندەل، كاپۇر، يۇمىلاقسۇت، قاپاق لېشىنى بىرلەشتۈرۈپ كۆكرەككە قويۇلىدۇ. لۇئۇقى سەرپىستان (60 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(2) ماددىسىز يۆتەلنىڭ سوغاقنىڭ بولغىنى: ئۆپ-كەك سوغاق تەسىر قىلىشى بىلەن ئۆپكەدە سوغاق ھاۋا تۇرۇپ قالىدۇ، سىرتتىن كىرگەن ھاۋا ئۆپكىنىڭ چى-قىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتى بىلەن قايتۇرۇپ چىقىرىلىپ نەتىجىسىدە يۆتەل تۇتىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىسسىق ھاۋا ۋە ئىسسىق يىمەك-ئىچمەكلىكلەر بىلەن يۆتەل بىر ئاز پەسىيىدۇ. سوغاقلىق يۆتەلنى ئېغىرلاشتۇرۇپ قويىدۇ. ئاغرىقنىڭ رەڭگى كۆكرەگەندەك ھالەتتە (قوغۇشۇن رەڭلىك) بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سەۋىيى (سوغاق شارائىتى-نى) يوقىتىپ، ئاندىن لۇئۇقى ئىنجۇر ياكى باشقا

ئىسسىقلىق شىرىلىك دورىلاردىن بىرى بېرىلىدۇ (28-نۇسخە).

(2) ماددىلىق مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان يۈتەل: بۇ، ئۆپكەگە قان ئارىلاش سەپرائىڭ قۇيۇلۇشىدىن پەيدا بولىدۇ. ھاۋا يوللىرىنىڭ توسىلىپ ياكى چىقىقلىپ كېتىشى بىلەن ئۆپكەدە سىقىلىشتەك بىر ئەھۋال كېلىپ چىقىپ، ئۆپكەنىڭ چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتى تەسىرىدە يۈتەل كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: نەپەس ئېلىش چوڭقۇر بولۇپ، سىرتقا چىققان نەپەس قىزىق سىزىلىدۇ. يۈتەل بەلغەمسىز ۋە ئاغرىقنىڭ چىرايى قىزارغان بولىدۇ. ئەگەر سەپرا غالىپ كەلسە ئاز مىقداردا سېرىق رەڭلىك بەلغەم چىقىدۇ.

داۋاسى: قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىنىدۇ. كېيىن توۋەندىكى قايناتما بىلەن ماددىلار تىزىلىنىدۇ. تەركىبى: گۈل بىنەپشە، گازىۋان، ئاق لەيلى ئۇرۇغى 3 مىسقالدىن، قاپاق ئۇرۇغى 2 مىسقال، چىلان، سەرىستان 20 دانىدىن، سانا 2 مىسقال، تەرەندە جىۋىل 2 سەر. تەييارلاش ئۇسۇلى ۋە ئىچىش مىقدارى ئادەتتىكى قايناتىملار بىلەن ئوخشاش.

(3) نەزلە ماددىسى مىڭدىن ئۆپكە يوللىرىغا چۈشۈش بىلەن بولغان يۈتەل، ئاساسى سەۋىيى كىنايى شاخچىلىرىنىڭ نەزلە ماددىلار بىلەن زەرەللىنىشىدىن بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: يوتەل كۆپىنچە كېچىلىرى، ئۇيقىدىن كېيىن ئېغىرلىشىپ قالىدۇ. بەلغەم بولمايدۇ. باش ۋە چېكىلىرى قىزىپ تۇرىدۇ. بۇ خىلدىكى يوتەلنىڭ سىل كېلىگە ئايلىنىپ كېتىش ئېھتىمالى بار. كۆكرەك قىسمىدا ئېغىرلىق ياكى ئاغرىش سېزىدۇ.

داۋاسى: خەشخاش لۇتۇقى (61 - نۇسخە) ياكى خەشخاش شەرۋىتى (62 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئېنجۇر قايناتقان سۇغا قىچا تالقىنى سېلىپ باشقا چېپىشقا بۇيرىلىدۇ. ئېغىزدا شۇمۇپ يۇرۇشكە ھەببى سوتال (70 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(4) ئۆپكە ۋە كىرگىت پەردىدە ئارتۇق سۇيۇقلۇق يىغىلىپ قالىدۇ. بۇ كۆپىنچە قېرى كىشىلەر ۋە ھول مىزاجلىق كىشىلەردە ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: يوتەل بىلەن كۆپ مىقداردا شىلىملىق بەلغەم چىقىدۇ. كۆكرەكتە خېقىراش كۆپ بولىدۇ، ھەركەت قىلغاندا نەپەس قىيىنلىشىدۇ.

داۋاسى: زۇپا شەرۋىتى (63 - نۇسخە) بېرىپ، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى بىلەن تۇرۇپ ئۇرۇغىنى قاينىتىپ، سۈيىگە بىر ئاز ھەسەل قوشۇپ ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇلىدۇ. ياكى مۇۋاپىق بولغان سۈرگىلەردىن تاللاپ بېرىلىدۇ. بۇنىڭغا توۋەندىكى سۈرگە بېرىلىدۇ.

چىلان 10 دانە، بىنەپشە 2 مىسقال، ئاق لەي - لى ئۇرۇغى، ھەمشۇا ئۇرۇغى، سانا 3 مىسقال، چۈچۈكبۇيا

يىلتىزى $\frac{1}{2}$ مىسقال، ئەنجۈر 5 مىسقال، ئۇرۇق -

سز ئۇزۇم 6 مىسقال، خىيار شەنبەرئىڭ ئىچكى قىسمى
15 مىسقال، تەرەنجىۋىل 15 مىسقال، بادام يېغى 1
مىسقال، تەييارلاش ئۇسۇلى - خىيار شەنبەر ۋە تەرەنجە -
ۋىلىدىن باشقىلىرىنى بىر ئاز سوقۇپ 3 چوڭ چىنە
كەلگىدەك قايناقسۇغا ئىككى سائەت چىلاپ قويۇپ،
ئاتادىن ئۆتكۈزۈپ، راسا سىقىپ سۈيىگە خىيار شەنبەر
بىلەن تەرەنجىۋىلنى سېلىپ بىر قېتىم قاينىتىپ ئېلىپ،
بادام يېغىنى ئۈستىگە قۇيۇپ بىر پىمالدىن ئەتە -
ئاخىدامدا ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

(5) ئۆپكە مەراجىنىڭ قۇرۇق ئىسسىقلىققا
ئۆزگىرىپ كېتىشىدىن بولغان يۆتەل ئاچلىق ۋە تەشنا -
لىق ۋاقىتلىرىدا ئېغىرلىشىپ، مونچىغا كىرگەندە - ياكى
قوسىغى توپىغاندا يېنىكلىشىپ قالىدۇ. يۆتەل بىلەن
نەپەس قىيىنلىشىش بولۇپ ئاغرىق ئورۇقلايدۇ، بەلغەم
بولمايدۇ، تومۇر ھەركىتى تېزلىشىدۇ، بەزىدە قىزىتما
بولىدۇ.

داۋاسى: ئىسپۇخۇل لۇئابى ياكى ئارپا سۈيى
بېرىلىدۇ. بادام يېغى بىلەن سوڭ (مەقئەت)، تاپان ۋە
كوكرەك ياغلىنىدۇ. قويۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈكبۇيا قاينە -
تىلىمىسى، قاپاق ئۇرۇغى، تەرەخمەك ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى
نىشاستە، كەتىرا، گۈل بىنەپىشلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا

ئېلىپ، ئىسپۇغۇل لۇئابى ۋە تۇخۇم ئېقى بىلەن تەييارلانغان كۇمۇلاچنى ئېھتىياجغا قاراپ ئېغىز ئىچىدە شۇمۇپ تۇرۇشقا بېرىلىدۇ.

(6) چاڭ-توزاڭ تۇتۇن ۋە ئىسلاردىن بولغان ياكى ئۇزاققىچە يۇقۇرى ئاۋاز بىلەن ۋاقىراشتىن بولغان يۈتەل. بۇنى (5) قىسمىدا كۆرسىتىلگەن چارلار بىلەن داۋالسا ئۈنۈم بېرىدۇ.

(7) ئۆپكە ياكى ئۇنى ئوراپ تۇرغۇچى پەردىدىكى كېسەللىكلەر يۈتەلگە سەۋەپ بولىدۇ، بۇ خىلدىكى يۈتەل قان تۈكۈرۈش، كۆكرەكنىڭ ئاغرىشى بىلەن ئىپادىلىنىدۇ ۋە گال ئەتراپىدىكى جىناھەتلەردىمۇ يۈتەل بولىدۇ. بۇخىل يۈتەلنى داۋالاش ئاساسەن سەۋەپچى ئاغرىقنى داۋالاش ۋە يۈتەل پەسەيتكۈچى دورىلارنى مۇۋاپىق ھالدا تاللاپ بېرىش لازىم.

قان تۈكۈرۈش (نەپىسدەم)

قان تۈكۈرۈش ئومۇمەن قاننىڭ چىقىش ئورنىغا قاراپ ئۈچۈندىكىچە 3 قىسىمغا بۆلىنىدۇ.

(1) ئېغىز بوشلۇقىدىن كەلگەن قان: چىش مۇلۇكلىرىدىن، تاماق ۋە يۇتقۇچتىن چىققان قانلار بولۇپ، چىش مۇلۇكلىرىنىڭ زەرەرلىنىشى، چىش تۈۋىنىڭ بوشاپ قېلىشى ياكى چىش مۇلۇك قاننى مۇرلىرىنىڭ يېرىلىشىدىن تۈكۈرۈك بىلەن يېڭى قان چىقىدۇ. بۇنداق ھاللاردا چىش مۇلۇكىنىڭ زەرەرلىنىشى.

رىگە قاراپ چىش كېسەللىكلىرىدە كۆرسىتىلگەن چارىلار قىلىنىدۇ. ھەيۋىل ئاسى، ئازارگۈلى، رۇسۇت ۋە زەمچەلەرنى باراۋەر سوقۇپ چىش تۈۋىگە قويىلىدۇ.

(2) ھەنچەردىن كەلگەن قان: كاناي ئاغزىدىن چىققان قان بولۇپ، بۇنىڭ ئىپادىسى شۇكى، ئادەتتىكى بەلغەم ياكى تۈكۈرۈكلەردە قان بولماستىن، بەلكى بەلغەم چىقىرىش ئۈچۈن كۈچەپ قاقىرىش بىلەنلا ئاچ قىزىل رەڭلىك قان ئارىلاش قاقىرىق چىقىدۇ، يوتەل بولمايدۇ.

داۋاسى: ھەيۋىل ئاسى، ئازارگۈلى، ئازار پوستى، موزا ۋە زەمچىلەرنى باراۋەردىن ئېلىپ قاينىتىپ ئۇنىڭ سۈيىدە گال چايقاشقا بۇيرىلىدۇ ۋە قورسى كەھرىبا بېرىلىدۇ (71- نۇسخە). ئەگەر يۇتقۇچتا جاراهەت بولسا كۈندۈر، خۇنىسماۋشاندىن 2 مىسقالدىن ئېلىپ سوقۇپ پۇركۇلىدۇ.

(3) كانايدىن كەلگەن قان: يوتەل ۋە كۆكرەك ساھىسىدا ئاغرىشلار بولۇپ، يوتەل بىلەن كۆپۈكتەك قان چىقىدۇ، داۋاسى يۇقۇرقى بىلەن ئوخشاش.

(4) دىماقتىن كەلگەن قان: بۇخىل قان بۇرۇن يولى بىلەن چىقماستىن ئېغىزغا چۈشۈپ، تۈكۈك بىلەن بىللە چىقىدۇ. كۆپىنچە بۇرۇن شىلىشىغىنى ئىچىگە تارتىش بىلەن تولاراق ئۇيۇپ قالغان ھالەتتە چىقىدۇ. قان چۈشۈپ بولغاندىن كېيىن باش بىر ئاز يېنىكلەشكەن.

دەك سېزىلىدۇ. كوپىنچە كېسەل كىشى زۇكام بولغان ياكى بېشى ئاغرىغان بولىدۇ. بۇرۇننىڭ يۇقۇرقى تەرەپ-لىرى قىچىشىدۇ.

داۋاسى: قىپال تومۇردىن قان ئېلىش ياكى كۆمۈش نەرسىلەر بىلەن ھىجامەت قويۇش لازىم. باشقا چارىلىرى بۇرۇن قاناشتىكى چارىلار بىلەن ئوخشاش. (5) ئۆپكە ۋە قىزىل ئۆگىگەچتىن كەلگەن قان: يىقىلىش، سىرتقى زەربىلەر ياكى ئۆپكەنىڭ ساددە ۋە ماددى زەرەرلىنىشلىرى ۋە ئۆپكە قانئومۇرلىرىنى زەخمى-لەندۈرگەن ئۆزگىرىشلەر نەتىجىسىدە يۈتەلدىن كېيىن بەلغەم بىلەن قان كېلىدۇ. قان دەسلەپتە ئاز بولسا كېيىنچە زەخمىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ كۆپىيىدۇ. رەڭگى قىزىلگۈل رەڭدە، دائىرەگىدە يولۇپ قاتتىق يۈتەل بىلەن ئۇيىغان ھالدا بەلغەمگە ئارىلىشىپ چىقىدۇ. بۇ ئۆپكە ياللۇغى (زاتلىرىيە) نىڭ ئالامىتى بولۇپ، كىرەك ۋە بىقەن ئەتراپلىرىمۇ ئاغرىيدۇ. يۈتەلگەنسىرى ئاغرىق كۆچىيىدۇ.

داۋاسى: قىپال ياكى باسلىق تومۇرلىرىدىن قان ئېلىش، قۇرسى كەھرىنا يەنى قان تۈكۈرۈش تاۋىلىتى (71- نۇسخە) نى شەرۋىتى ئەنجىبار (72- نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ.

قىزىل ئۆگىگەچتىن كەلگەن قان دائىم قۇسۇق بىلەن كۆڭلى ئاينىشتىن كېيىن كېلىدۇ. قاننىڭ

مقدارى كۆپ بولسا مەئدە ياكى قىزىل ئۆچكەننىڭ
كەلگەنلىكىگە گۇمان قالمىدۇ. ئەمما ئاز بولغاندا
باشقا جايدىن كەلگەن قاندىن پەرق قىلىش ئۈچۈن،
يوتەل بولماسلىقى ۋە مەئىدىدىكى ئالامەتلەرگە دىققەت
قىلىش كېرەك.

ئۆپكە ياللۇغى (زاتلىرىيە)

زاتلىرىيە ئۆپكەنىڭ ياللۇغلىنىشلىق زەرەرلىنىشە.
دىن ئىبارەت بولۇپ، پەيدا بولۇش سەۋەپلىرى: مىڭە-
دىن ئىسسىق ياكى سوغاق تەبىئەتلىك سۇيۇقلۇقلارنىڭ
ياكى زۇكام نەزلە ماددىسى بىلەن تۇرلۇك زەرەرلىك
خىلىتلىق سۇيۇقلۇقلارنىڭ ئۆپكەگە قۇيۇلۇشى؛ بىرغىچە
ياكى گال ئەتراپىدىكى باشقا جاراھەتلەرنىڭ يىرىغىلىق
ئاجىزلىقىنىڭ ئۆپكەگە چۈشۈش؛ ئۆپكەنى ئوراپ
تۇرغۇچى پەردىنىڭ ياللۇغى (زاتلىجەنە) ياكى (كىر-
گىت گۆش) پەردىنىڭ ياللۇغلىنىشلىرىدا يىرىك ۋە
ئىششىق ئۆپكەگە ئوتۇش؛ ئۆپكەنىڭ ئۆزىدە سۇ يىغىلىپ،
ۋاقىت ئۆتكەنسېرى بۇزۇلۇپ ئۆپكەدە ياللۇغلىنىش
ھاسىل قىلىشلاردىن ئىبارەتتۇر.

ئومۇملاشتۇرۇپ ئېيتقاندا ئۆپكە ياللۇغلىنىشنىڭ
مۇھىم سەۋىيىسى - قان ۋە ئارتۇقچە بەلغەم بولۇپ،
سەپرا تۈپەيلىدىن كەمرەك كېلىپ چىقىدۇ. كۆپىنچە
نەزلىدىن كېيىن ياكى ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ كېلىدۇ.
ئۆپكەنىڭ زەرەرلىنىشى يۈرەككە تەسىر بېرىدۇ. ئۆپكە -

دىكى خىلىتلارنىڭ تارقىلىشى قىيىن بىر مەسىلە.
ئۆپكە ياللۇغى سەۋەپلىرىگە قاراپ توۋەندىكىچە 3 چوڭ
تۈرگە بۆلىنىدۇ:

(1) ئىسسىق ياكى سوغاق، نەزلە سۇيۇقلۇقلىرى
بولىمىسۇن ياكى قان، سەپرا ماددىلىرى سەۋىيىدىن
بولىمىسۇن، ئوفۇنەتلەر تەسىرىدە ئۇلار ئىسسىققا ئۆزگە-
رىدۇ.

ئالامىتى: ئىستىمنىڭ داۋاملىق يۇقۇرى بولۇشى
بىلەن ئاغرىق كۆكرەك ساھىسىدا ئېغىرلىق، كېيىنچە
قاتتىق ئاغرىش سېزىدۇ. يۈز ۋە كۆزلىرى قىزارغان،
بولۇپمۇ ئىككى ئىگەك قىسمى روشەن قىزارغان ھالدا
بولىدۇ. ئېغىر كېسەللەرنىڭ قاپاقلىرى ئىششىغاندەك
كۆرىنىدۇ. تەشەللىق كۆپ بولۇپ، تىلى قېلىن گەزباغلايدۇ.
دۇ. تومۇر دولقۇنىسىمان سالىدۇ. كېسەلنى يۈتەل بەكمۇ
ئازاپلايدۇ. سوغاقتىن راھەتلىنىدۇ، كۈڭلى سوغاق
نەرسىلەرنى تارتىدۇ. ئەگەر ياللۇغلىنىش ئۆپكەنىڭ،
توۋەندىكى قىسمىدا بولسا نەپەس قىيىنلىشىش ئېغىر
بولىدۇ. يەنە بۇلاردىن باشقا، خىلىتلارنىڭ ئالاھىدىلىك-
لىرىگە ئاساسەن تۈرلۈك ئالامەتلەرمۇ قوشۇلۇپ كېلىدۇ.
ئەگەر ياللۇغلىنىش ئۆپكەنىڭ يۇقۇرقى قىسمىدا بولسا
كېسەل كۆكرەك ئارقا قىسمى، تاغاق ئارىلىغىنىڭ ئاغ-
رىشىدىن زارلىنىدۇ.

ئۆپكەندىكى ياللۇغ ئومۇمەن تۈۋەندىكى 3 خىل

ئەھۋال بىلەن ئۆزگىرىش يانسايدۇ: (1) ماددە پىششىق ۋە بەلغەم ئارقىلىق سىرتقا چىقىپ كېتىدۇ. بەلغەم ئاز ۋە ئۇنىڭ رەڭگى ۋە سۈپىتى سەۋەبىچى ماددىلارنىڭ ئالاھىدىلىكلىرىگە ئىگە. نەتىجىدە ياللۇغلىنىش قايتىپ، باشقا تەللىرى يەڭگىللىشىپ، بەلغەم ئاسان چىقىدۇ. خان بولىدۇ. (2) يىرىڭ يىغىپ ئەھۋال ئېغىرلىشىدۇ، ياللۇغلىغان جاي تاشلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئېغىزىدىن بېلىق پۇرىقى كېلىپ تۇرىدۇ. ئەگەر ياخشىلىق بولسا يىرىڭ بەلغەم بىلەن سىرتقا چىقىپ كېتىپ، كۆپكە ماددىلاردىن تازىلىنىدۇ. ئۇنداق بولمىغاندا يىرىڭ باشقا ئەزالارغا تارقاتىپ كېتىدۇ. نەتىجىدە باشقا كېسەللىك قوشۇلىدۇ. يىرىڭ يىغىلىشقا باشلىغاندا كېسەلنىڭ ئەھۋالى بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ، ماددا پىشقاندا قىزىتما پەسىيىدۇ. ئاغرىشىمۇ بولمايدۇ. لېكىن كۆكرەك قىسمىدا ئېغىرلىق ھەس قىلىدۇ. ئەگەر تېشىلە يەنە ھارارەت قابىتىدىن باشلىنىپ، ئاغرىق تىترەيدۇ.

(3) ماددىلارنىڭ سۇيۇق قىسمى تارقاتىپ كېتىپ، قويۇق قىسمى قېتىپ قالىدۇ. ئۇزۇن مۇددەت ساقلىنىدۇ. بۇ چاغدا باشقا ئالامەتلىرى يېنىكلىشىپ كەتمەسلىكى سېزىلىدۇ. ئەمما نەپەس قىيىنلىشىش ئەۋج ئېلىپ، قۇرۇق يۆتەل ۋە كۆكرەكتە ئېغىرلىق ساقلىنىپ قالىدۇ. بۇنىڭ تېشىلىشى ئاز ئۇچرايدۇ. بۇنداقلارنى داۋالاشتا ئۆپكەندىكى بۇخىل قالدۇقنى چىقىرىشقا دىققەت قىلىش لازىم.

داۋاسى: قان ئېلىش ۋە تەبىئەتنى يۇمشاتقۇچى

سۈرگىلىرىنى بېرىش، ھوقنە قىلىش لازىم.

قان ئېلىشتا ئەگەر كېسەللىك نەزلىدىن بولسا

قىيال تومۇرىدىن، قاندىن بولسا ساقىن، كېيىن باسلىق.

ئىن ئېلىنىدۇ. قان ئالىدىغان نومۇرلارنى تاللاشتا

تۈۋەندىكى قائىدە بويىچە تاللاش كېرەك. (1) كېسەل.

لىكىنىڭ دەسلەپكى 3- كۈنلىرى قان ئالغاندا زەرەرلەن.

گەن ئوپكىنىڭ قارشى تەرەپتىكى تومۇرلاردىن ئېلىنىدۇ.

مەسىلەن، ئوڭ تەرەپ ئوپكە يالۇغلانغاندا سول تەرەپتىن

ئېلىش كېرەك. 4- كۈندىن كېيىن قان ئېلىشقا

توغرا كەلگەندە زەرەرلەنگەن ئوپكە تەرەپتىن ئېلىنىدۇ.

ئوپكىنىڭ قايسى تەرەپتىكى زەرەرلەنگەنلىكىنى بىلىش

ئۈچۈن شۇ تەرەپ كۆكرەكنىڭ ئېغىرلىق سېزىشى، شۇ

تەرەپ يۇزقىسىنىڭ قىزىرىپ تۇرۇشى، ئاغرىق ياتقاندا

شۇ تەرەپ ئېغىز بۇرجىكىدىن شۈكەي ئېقىپ تۇ.

رۇشلار ئاساس قىلىنىدۇ. ياكى ئاغرىق قايسى تەرەپنى

بېسىپ ياتقاندا بەلغەم كۆپ چىققا يالۇغ.

لىنىش ئوپكىنىڭ شۇ تەرەپىدە ھەم بېسىپ كۆر.

گەندە ئاغرىق كۈچەيگەن تەرەپىدە يالۇغلىنىش بولىدۇ.

سۈرگە بېرىش مەسىلىسىدە جالىئۇس ھىكىمنىڭ

پىكرىچە، ھارارەت يۇقۇرى بولسا قان ئېلىش بىلەن

كۆپايلىنىش كېرەك. بۇ تەۋبىنىڭ كېسەل ئەھۋالىغا

قاراپ قارار قىلىشقا باغلىق مەسىلە، بېرىلىدىغان

سۈرگە يۇمشاتقۇچى قاينىتىلمىلار بولۇشى كېرەك ۋە ئۈزۈم-
دىكى ھوقنە قىلىنىدۇ (مەتبۇخ 73- نۇسخە). بىنەپشە، ئىت
ئۈزۈمى، ئاق لەيلى گۈلى ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، سەرپىس-
تان، چىلان 20 دانىدىن، ئەينۇلا 5 دانە، زاراڭزا چىچىكى
7 مىسقال، قىزىلگۈل 15 مىسقال، گۈل يېغى 3 مىسقال (سې-
رىق ياغ بولسىمۇ بولىدۇ). چىقىندەر ① سۈيى 15 مىسقال،
قاراشېكەر 15 مىسقال. ھوقنە سۇيۇقلۇقى تەييارلاش
چارىلىرى بويىچە تەييارلاپ ھوقنە قىلىنىدۇ. بۇلارنى
بىر قانچە قېتىم تەكرارلاش كېرەك. ئۇندىن باشقا، ئاق
سەندەل، ئارپا ئۇنى، سېمىز ئوت سۈيىنى بىزئاز بىنەپ-
شە يېغى بىلەن كۆرەككە سۇرتۇش ۋە بابۇنە، ئەكىلىل
مىلىك، ئاق لەيلى، بىنەپشەلەرنى سۇۋاپىق مىقداردا
ئېلىپ سوقۇپ، بابۇنە يېغى بىلەن كۆكرەكنىڭ كۆپ
ئاغرىغان جايىغا سۈركەش لازىم. بۇ ئىشقىنى يۇمشات-
قۇچى ۋە ياندۇرغۇچى تەسىر قىلىدۇ. نەپەس قىيىنلە-
شەش ئېغىر بولسا ئىسپۇغۇل لۇئابىنى بىرئاز قەن سې-
لىپ بېرىش ياكى كۆكرەك ئەتراپلىرىغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش
ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ. ئانار شەرۋىتى (47- نۇسخە)،
نىلۇفەر شەرۋىتى ۋە باشقا ئەرەقلەرنى بېرىش بىلەن
بەك چۈچمەل بولىدىغان ئىسكەنجىۋىل بېرىش كۆكرەك-
نى ماددىلاردىن تازىلاش، ھارارەتنى پەسەيتىش ۋە
تەشەللىقنى قاندۇرۇش تەسىرىنى كۆرسىتىدۇ. بەزىلەر

① چىقىندەر: (چوقۇندەر) قىزىلچىنىڭ بىر تۇرى.

كاپۇر، ئارپا، كاسىن سۈيى، خاڭگا، قوغۇن، تاۋۇز،
قاپاقلارنىڭ سۈيى ۋە ئىسپۇغۇل لۇئابى، سېمىز ئوت
ئۇرۇغى، ئۇسۇڭ سۈيى ۋە ئانار سۇلىرىنى ئېھتىياجىغا
لايىق ئېلىپ بېرىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ.

شەرۋىتى خەشخاش قاتارلىق تۇتقۇچى شەرۋەتلەر
بېرىش مەنى قىلىنىدۇ.

(2) بەلغەم ماددىسىدىن بولغان ئۆپكە ياللۇغى: ھارارەت
ۋە رەڭگىنىڭ قىزىللىغى بولمايدۇ. نەپەس قىيىنلىشىش
ئېغىر بولۇپ، كۆپ مىقداردا يېپىشقاق بەلغەم چىقىدۇ.
ئۆپكەدىن خىقىراش تاۋۇشلىرى ئاڭلىنىدۇ. ئەمما
ياللۇغلىنىشنىڭ تەرەققى قىلىش ئەھۋالىغا قاراپ
ئارىلاپ ئىستىما پەيدا بولۇپ تۇرىدۇ.

داۋالاش: تەبىئەتنى يۇمشاتقۇچى (مەتبۇخى
مۇلەين 73- نۇسخە) بېرىلىدۇ. ياللۇغلىنىش قايتۇر-
غۇچى دورىلار كۆكرەك سىرتىدىن سۇرتىلىدۇ. زۇپا
شەرۋىتى (63- نۇسخە) قاتارلىقلار مۇۋاپىق ھالدا
بېرىلسە بولىدۇ.

(3) قاتتىقلاشتۇرغۇچى ئۆپكە ياللۇغى — ئۆپكەدىكى
ماددىلارنىڭ سۇيۇقلۇق قىسمى تارقىلىپ، قاتتىق
قىسمى قېپىقالىدۇ. بۇنىڭغا سەۋدا ماددىسى ياكى قويۇق
بەلغەم كۆپرەك سەۋەپ بولىدۇ. ئالامەتلىرى — ئاساسەن
نەپەس قىيىنلىشىش (نەپەس ئېلىش قىيىن بولىدۇ)،
قۇرۇق يوتەل، ھارارەت بولماسلىغى كېسەلنىڭ ئۇزۇنغا
سوزۇلۇپ كېتىشىدىن ئىبارەت.

قېدىمقى زامان تىۋىپلىرى زالىنىڭ بۇ قىسمىدا ئۆپكەندە خۇددى بۆرەكتىكى تاشقا ئوخشاش تاش ھاسىل بولغانلىقى توغرىسىدا يېزىپ قالدۇرغان. تاش ھاسىل بولغاندىن كېيىن يوتەل پەسىيىپ قالىدۇ.

داۋاسى: ئىچىنى يۇمشاتقۇچى دورىلار بېرىلىدۇ. زىغىر لۇئابى، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، بادام يېغى قىز تۇققان ئايالنىڭ سۈتىنى بىرلەشتۈرۈپ كۆكرەك قىسمىغا چىپش لازىم. سانا، ئىت ئۇزۇمى، پۇنۇس، ئەگرى خاڭكا ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى، تەرەنجىۋىل قاتارلىق دورىلاردىن تەركىپ تاپقان قايناتما بېرىلىدۇ. ۋە ياۋا پىياز شىرنىسىنى 2 مىسقالدىن كۈنگە 2 قېتىمدىن بېرىلىدۇ. بۇنىڭ تەركىبىدىكى دورىلار: 3 مىسقال ياۋا پىياز (ئەنسىل) نى پىشۇرۇپ، گۈل سۈسەن يىلتىزىدىن 2 مىسقال، جۈسەي ئۇرۇغى، زۇپادىن 1 مىسقال ئېلىپ سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ 2 ھەسسە ھەسەل بىلەن تەييارلىنىدۇ.

ئۆپكە سىلى

”سىل“ دىگەن سۆز ئۇرۇقلاش ئۇقۇمىنى بىلدۈرىدۇ. ئۆپكە سىلى — ئۆپكەنىڭ ئۆز جىسمىدا ئوزگىرىش يۈز بېرىش، كاۋاك ھاسىل بولۇش ۋە پۈتۈن بەدەننى ئورۇقلىتىپ ئاجىزلىتىش بىلەن ئۆتىدىغان كېسەلدىن ئىبارەت. ئۇنىڭدا يوتەل، نەپەس قىيىنلىشىش، قىزىتما قاتارلىق ئالامەتلەر دائىم ئۇچرايدۇ. بۇ كېسەل

باللاردا، سوغاق مىزاج كىشىلەردە ھەم ئاياللاردا كۆپ-
رەك ئۇچرايدۇ.

سەۋىيى: ئوپىكە سىلىنىڭ پەيدا بولۇش سەۋەپلىرى
ئاساسەن تۆۋەندىكى 3 خىلغا بۆلۈنىدۇ.

(1) پىشقان نەزلە ماددىلىرى مىڭدىن ئوپىكەگە
تەۋەلىدۇ. بۇ ماددىلار ئوپىكىنىڭ نېپىز قەۋەتلىرىنى
كۆيدۈرۈپ يارا ھاسىل قىلىدۇ.

(2) كۆكرەك پەردە ياللۇغى ياكى ئوپىكە ياللۇغىنىڭ
ماددىلىرى ئوپىكە يەرلىرىنى زەرەلەپ سىلغا ئۆزگىرىشى
مۇمكىن.

(3) بۇلاردىن باشقا ئوپىكىنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى
سەۋەپلىرىدىن بولغان يارىلىنىشلىرىمۇ سىلغا ئېلىپ
بېرىشى مۇمكىن. ئالامەتلىرى: سۇس ئىستېمىنىڭ بولۇ-
شى بىلەن كېسەل كىشى يۈزىنىڭ يانچاق قىسمى
قىزارغان ھالدا بولىدۇ، بولۇپمۇ بۇ ئەھۋال چۈشتىن
كېيىن روشەن كۆرۈنىدۇ. تەبىئەتنىڭ زەئىپ بولۇشىغا
ئەگىشىپ كېچىدە ۋە ئادەتتىكى چاغلاردىمۇ تەرلەيدۇ. كېسەل-
نىڭ پۇت - دۈمبىسىگە قىسمەن ۋاقىتلاردا ئىششىق پەيدا بو-
لۇپ قالىدۇ. بۇ ئالامەتلەر "تەپى دىق" (جۈدە تېگۈچى قىزىتما)
دىگەن ئاتالغۇ بىلەنمۇ ئاتىلىدۇ. ئوپىكە سىلىدە بەلغەمنىڭ
ئاجراپ چىقىشى ئەسەرەك بولۇپ، شىلىملىق ئاق، سېرىق
سۇيۇق، بەزىدە كۆكۈرەڭلىك بەلغەم چىقىدۇ. ھەتتا
يىرىڭلىق بەلغەممۇ چىقىشى مۇمكىن. يىرىڭلىق بەلغەم

كېسەلنىڭ ئېغىرلىشىۋاتقانلىقىدىن خەۋەر بېرىدۇ. بەزى تىۋىپلار بەلغەمنىڭ شىرىلىك ۋە تەسلىك بىلەن ئاجراپ چىققىنىغا قاراپ پىشقان ماددا (ماددەئى نەزجى) دەپ خاتا ئويلاپ، ئۆپكەنى قويۇق بەلغەمدىن تازىلاشقا تىرىشماي، نەتىجىدە ئاغرىق ئولۇپ كېتىشى مۇمكىن. بەلغەمنىڭ يىرىڭلىق ياكى يىرىڭسىز ئىكەنلىكىنى ئاددىيىنە توۋەندىكىچە ئايرىشقا بولىدۇ. مەسىلەن، خاس يىرىڭلىق بەلغەم دائىم سېسىق پۇرايدۇ. بۇنى ئايرىش ئانچە قىيىن ئەمەس. ئەمما باشقا شىلىملىقلار بىلەن قوشۇلۇپ كەلگەندە پۇرىماسلىقى مۇمكىن. بۇ چاغدا بەلغەمنى سۇغا سالغاندا چۆكسە يىرىڭ، چۆكمەسە يىرىڭ ئەمەس ياكى ئوتقا سالغاندا دەرھال كۆيۈپ سېسىق پۇراق چىقارسا يىرىڭ، كۆيىمەي قاپناپ تارقاپ كەتسە يىرىڭ ئەمەس.

داۋاسى: ۱) ئۆپكە سىلىنى داۋالاشنىڭ نەتىجە -
سىگە تىۋىپلارنىڭ كۆز قارىشى بىردەك ئەمەس. بەزىلەر ئۆپكەدىكى جاراهەت ساقايمايدۇ، چۈنكى ئۆپكەنىڭ ساقەيمىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ دائىم ھەركەتلىنىپ تۇرۇشى نەسىر كۆرسىتىپ ساقايغىلى قويمايدۇ دېيىشىدۇ. جالغۇس ھېكم بولسا جاراهەتنىڭ ساقىيىشى ئۈچۈن شۇ ئەزانىڭ ھەركەتسىز تۇرۇشى ھاجەت ئەمەس دەيدۇ. ئەستايىدىل داۋالاش، ياخشى ئۇزۇقلاندۇرۇش بىلەن تولۇق ساقىيىشى مۇمكىن، لېكىن ۋاقىت ئۇزۇنغا سوزۇلۇشى ئېھتىمال. ئەبۇئەلى ئىبنىسىنا بىر

ئايالنىڭ 23 يىل بىلەن ئاغرىپ يۈرگەنلىكىنى يازغان. ئازيا سۈيىدە دەريا قىسقۇچ پاقىسى (سەرتان)نى پىشۇرۇپ يىگۈزۈش بىلەن ئۈچۈن بەكمۇ ياخشى پايدا قىلىدۇ. ھارارەتنى پەسەيتىش ۋە يۈتەلگە ئارام بېرىپ كۆكرەكتىكى ماددىلارنى تازىلاش ئۈچۈن ئۆپكە كېسەل-لىمىكلەرى ھەققىدە ئىلگىرىكى پەسىلدە كۆرسىتىلگەن دورىلارنى تاللاپ بېرىش كېرەك. مەسىلەن، لۇتۇقى خەشخاش (61- نۇسخە) ۋە باشقىلار بېرىلىدۇ. قەۋزىيەت بولسا كۈچلۈك سۈرگىلەرنى بەرمەي، ئىچىنى يۇمشىتىدىغان خىيار شەنبەرنى كاشكاپ قىلىپ بېرىلسە بولىدۇ. ئەگەر ئىچى سۇرۇپ كەتكەن بولسا شەرۋىتى ھەببۇلىئاس بېرىلىدۇ.

(3) گۈلقەننىڭ ئۆپكە سىلىگە ياخشى مەنپەئەت قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ئەبۇئەلى ئىبنىسىنا ئۆز ئەسەرلىرىدە ئالاھىدە توختالغان، مەسىلەن، بىر ئايالنىڭ بىلەن كېسىلى بىلەن ئاغرىپ، داۋالاش نەتىجە بەرمەي ئۆلەر ھالەتكە يەتكەندە گۈلقەن بىلەن داۋالىنىپ ناھايتى ياخشى ئۈنۈم ھاسىل قىلىپ، ساقىيىپ ئۆز ئىسلىگە كەلگەنلىكى ھەققىدە يازغان. گۈلقەننىڭ شۇ يىلقى يېڭى بولغىنى ئەڭ ياخشى ھساپلىنىدۇ. مىقدارى جەھەتتە چەكلىمە يوق نان بىلەن قوشۇپ ئەتىگەن ئاشتىدا بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى.

(4) سۈت بىلەن داۋالاشتا ئاساسەن ئۆچكە ۋە

ئىشەك سۈتى بېرىلىدۇ. بۇ ھايۋانلار ئالما يوپۇرمىقى، كازىۋان، پاقا يوپۇرمىقى ۋە مەتەكىلەر بىلەن بېقىلىپ سۈتى سېغىلىدۇ. سۈتىنى سېغىشتىن بۇرۇن ھايۋاننىڭ ئەمچەكلىرى 3 قېتىم پاكىزە يۇيۇپ قۇرۇتۇپ يەنە يۇيۇپ تازىلاش كېرەك. سۈت ساقىدىغان قاچا پاكىزە بولىشى، ھايۋاننىڭ ئوزى ساغلام بولىشى شەرت. ئىشەكنىڭ تەخمىنەن 4-5 ئايلىقتىن چوڭ بولىشى لازىم. ئىشەك سۈتى دەسلەپتە 15 مىسقالدىن بېرىلىپ تەدرىجىي ھالدا كۆپەيتىلىشى لازىم. يۇقۇرى مىقدارنىڭ چەكلىمىسى يوق، كەپسەلنىڭ تەبىئىي كۈتەرگىدەك بولسا بولىدۇ. بەك ئىچەلمەسە سۈتكە يېرىم مىسقال تۇز، بىر مىسقال ئىشاستە (بۇغداي كىراخمالى) قوشۇپ بېرىلىدۇ. بەزىلەر ئەگەر مەنپەئەت كۆرۈلسە ئىشەك سۈتىنى بىر ھەپتىگىچە بېرىشكە بولىدۇ دەپ قارايدۇ، ئۈچكە سۈتە-نى بەرگەندە قاش تېشىنى تاۋلاپ سۈتكە چىلاپ (7 قېتىم شۇ خىلدا تەكرارلاپ) تەييارلانغان سۈتنى بېرىش كېرەك.

(5) دەريا قىسقۇچ پاقىسى (سەرتان) نى بېرىش ئۇسۇلى — سەرتاننىڭ پۇتلىرىنى كېسۋېتىپ تازىلاپ ئارپا سۈيىگە سېلىپ ئاشتەك پىشۇرۇپ بېرىلەدۇ. گۈلگەن بىلەن ئارپىلاشتۇرۇپ بەرسىمۇ ياكى يىدوتىل توختاتقۇچى شېرىلىك دورىلار بىلەن بىرگە قوشۇپ بەرسىمۇ بولىدۇ. شۇنداقلا قىسقۇچ پاقا تالقىنى (سۇيۇ-پى سەرتان) قىلىپ بېرىشمۇ مۇمكىن، نۇسخىسى:

كويدۇرۇلگەن قىسقۇچ پاڭا ① 1 سەر، ئاق كوك-

نار، قارا كوكنار ھەر بىرى $2\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، كەتمى

3 مىسقال، ئەرەپ يىلىمى، قېرىس ئارىلىنىڭ گىلى 5
مىسقالدىن. قۇرۇق ئۇزۇم 2 مىسقال، دورىلارنى يۈە-
شاق سوقۇپ تالقان قىلىپ خەشخاش شەرۋىتى (65 -
نۇسخە) ياكى ئىشەك سۈتى بىلەن بىللە بېرىلىدۇ.
تاماق جەھەتتىن، ئۇلاي، كەكلىك، تۇرۇلغا، كاڭكۈك
ياكى قۇشقاچ قاتارلىق ئۇچار قاناتلارنىڭ گۆشىنى
كاۋاپ ياكى شورپا قىلىپ (ياغسىزراق) بېرىلىدۇ.

كوكرەك پەردە ياللۇغى (زاتىلجەنبە)

ئوپكە ۋە كوكرەكنى ئوراپ تۇرغۇچى نېپىز پەردىنىڭ
ياللۇغلىنىشى زاتىلجەنبە دىيىلىدۇ. ئۇ ھەقىقى ۋە
ساختا دەپ 2 تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

1) ھەقىقى كوكرەك پەردە ياللۇغى: ئۇقۇل سەپرا،
سەپرا ئارىلاشقان قان، سەپرا قەشۇلغان بەلغەم ياكى
بىر ئاز ھارارەتلىك سەۋدا ماددىلىرى بۇ پەردىگە چۈشۈپ
ياللۇغلىنىش ھاسىل قىلىدۇ. بۇ پەردە كىرگىت ۋە پەي-
لىمىدىن قۇرۇلغانلىقى ئۈچۈن بەلغەم ۋە قان سەۋدا ماددى-

① قىسقۇچ پاقىنى كويىدۇرۇش ئۇسۇلى: قىسقۇچ پاقىنى
تازىلاپ كوزىغا سېلىپ ئاغزىنى گىل بىلەن ياخشىلاپ بېكىتكەندە-
دىن كېيىن ئوتى توختىغان تونۇر ئىچىدە بىر كېچە تۇرغۇزۇپ
ئېلىنىدۇ. قىسقۇچ پاڭا كۆل ھالىتىگە كېلىپ قالىدۇ.

لىرى ئاسانلىقىچە شىمىرىلىپ كېتەلمەيدۇ، سەپرا قوشۇلۇپ كەتكەندىن كېيىن شىمىرىلىدۇ. كۆكرەك پەردە ياللۇغى كۆكرەك بوشلۇغى كېسەللىكلىرى ئىچىدە ئېغىر ئوتىدىغان، خەتىرى كۆپرەك بىر خىل كېسەل بولۇپ، ئومۇمى بەدەندىكى بەلگىلىرىمۇ ئېغىر. مەسىلەن، ئىستىمنىڭ بەك زىيادە بولۇشى، يوتەل ۋە نەپەسلىنىشنىڭ ئېغىر دەرىجىدە قىيىنلىشىشى، قوۋۇرغىلار ئاستىدا سانجىقىسىمان قاتتىق ئاغرىشلار كۆرۈلىدۇ، تومۇر ھەرىكىتى يېپىلغان شەكىلدە بولۇپ، كېسەل بىئارام بولىدۇ. ھەقىقى كۆكرەك پەردە ياللۇغلىرى توۋەندىكىچە 4 خىلدا بولۇپ داۋالىنىدۇ.

(1) سەپرا قوشۇلغان قان ماددىسىدىن بولغان ھەقىقى كۆكرەك پەردە ياللۇغى: يۇقۇرقى ئومۇمى ئالا-مەتلىرىدىن باشقا، ئاغرىقنىڭ يۈزمۇ، چىقارغان بەلغەمنىڭ رەڭگىمۇ قىزىلغا مايىل كېلىدۇ.

داۋاسى: چىلان، سەرىپىستان، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم، ئەينۇلا، ئەنجىرلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، بىر كېچە قايناقسۇغا چىلاپ، ئەتىسى سىقىپ سۇزۇپ ئۈستىگە خىيار شەنپەر بىلەن تەرەنجىۋىلىنى ئېرىتىپ قوشۇپ بېرىش كېرەك. ياكى (73-نۇسخە) دىكى يۇمشاتقۇچى قايناتما بېرىلسە بولىدۇ. بىنەپشە گۈل قېنى بىلەن بىنەپشە شەرىۋىتى (74-نۇسخە) بېرىشۇ پايدىلىق. بىنەپشە، ئاق لەيلى گۈلى، ئارپا ئۇنىنى لازىم مىقداردا ئېلىپ، ئىسسىق سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ بابۇنە يېغى بىلەن ياغلاپ ئاغرىۋاتقان كۆكرەك

قىسمىغا قويۇش كېرەك. تەدبىقى تىۋىپلار ئاغرىق جاينىڭ قارشى تەرىپىدىكى باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىشنى تەۋسىيە قىلاتتى.

(2) نۇقۇل سەپرادىن بولغان ھەقىقى كۆكرەك پەردە ياللۇغى: ئاغرىش ۋە سانجىق ئېغىر بولىدۇ. سانجىق بار ئورۇن ئېچىشىدۇ. ھارارەت يۇقۇرى بولۇپ، بەلغەمنىڭ رەڭگى سېرىققا مايىل كېلىدۇ. تومۇر ھەركىتى تېز ۋە تەرتىپسىز، تەشەنلىق كۆپ بولىدۇ.

داۋاسى: يۇقۇرقى تۈرىدە كۆرسىتىلگەن دورىلار بېرىلىدۇ. شەرۋىتى نىلۇفەر (75 - نۇسخە) گە ئىسپۇغۇل لۇتابى قوشۇپ بېرىش كېرەك.

(3) سەۋدادىن بولغان ھەقىقى كۆكرەك پەردە يال - لۇغى. يۇقۇرقى ئالامەتلەردىن باشقا، ئېغىز ئىچى قۇرۇق، تىلى قارامتۇل گەز باغلىغان، تىرىك ھالدا بولىدۇ. بەلغەم ئاز ۋە تەسلىكتە ئاجراپ چىقىدۇ، رەڭگى قارىغا - مايىل كېلىدۇ.

داۋاسى: ئاساسەن يۇقۇرقىلار بىلەن ئوخ - شاش بولۇپ، ئاغرىق بار ئورۇنغا كالىكەبەسەي يوپۇرمىغى، بىنەپشە، بابۇنە، ئاق لەيلى ئۇرۇغىنى سوقۇپ قويۇش كېرەك. ئىسسىق نۇ بىلەن ھوللەنگەن ماتادەك نەرسە - لەرنى كۆكرەككە قويۇش سانجىقنى پەسەيتىدۇ. مۇۋاپىق يۇمشاتقۇچى ھوقنەلەر بىلەن تەرەتنى يۇمشىتىپ تۇرۇش لازىم.

(4) بەلغەمدىن بولغان ھەقىقى كۆكرەك پەردە

ياللۇغى ئېغىر بولسىمۇ، ھارارەت يەڭگىل بولىدۇ، سادە-
جىق بولمايدۇ. بەلغەمنىڭ رەڭگى دەسلەپتە قىزىلغا
مايىل ئاق بولسا، كېيىنرەك پۈتۈنلەي ئاق رەڭگە كىرىپ
كۆپ ۋە ئاسان چىقىدۇ.

داۋاسى: زۇپا شەرىپىتى (63 - نۇسخە) ۋە نوخۇت،
ئارپا بېدىيان قوشۇلغان ئارپا سۈيى بېرىلىدۇ.

(2) غەيرى ھەقىقى كۆكرەك پەردە ياللۇغى: بۇ
خىلدىكى كۆكرەك پەردە ياللۇغى سەۋەپلىرىگە قاراپ
ئىككى تۈرگە بۆلىنىدۇ.

(1) قوۋۇرغىلارنى سىرتقى تەرەپتىن ئوراپ تۇر-
غۇچى سوغىك پەردىلىرىنىڭ ياللۇغى: تاشقى زەرەرى يىقى-
لىش، ئۇرۇلۇش، سوقۇلۇشلار بىلەن كۆكرەك سىرتقى
پەردىسىگە ئىششىق ھاسىل قىلىدۇ. ئورۇنلاشقان جاي
جەھەتتىن ھەقىقى كۆكرەك پەردە ياللۇغىدىن پەرقلىنىسىمۇ،
ئالامەتلەر جەھەتتىن ئوخشاش، ئەمما، خەتەرى ئاز.
ئالامەتلىرى: سانجىقسىمان ئاغرىيدۇ. تومۇر ھەركىتى

ۋە ئىستىملار بەزىدە ھەقىقى كۆكرەك پەردە ياللۇغىغا
ئوخشاپ كەتسىمۇ، لېكىن ئېغىزلىق دەرىجىدە ئۇقەدەر
بولمايدۇ. ئاغرىپ تۇرغان جايدا پۇلتىيىپ تۇرغان ئىش-
شىق روشەن كۆرىنىپ تۇرىدۇ. باسقاندا قاتتىق ئاغرىپ-
دۇ. يوتەل بولىدۇ، بەلغەم بولمايدۇ. داۋالاشتا ھەقىقى
كۆكرەك پەردە ياللۇغىدەك داۋالىنىدۇ. بولۇپمۇ سىرتتىن
چاپقۇچى دورىلارنىڭ مەنپەئىتى كۆپرەك.

(2) قويۇق يەللەرنىڭ قوۋۇرغا ئارىلىق كوشلاردىن بىرىگە چۈشۈشىدىن بولغان ساختا كۆكرەك پەردە ياللۇغى؛ قوۋۇرغا ئارىلىقلىرى قاتتىق ئاغرىپ نەپەس ئېلىشقا تەس قىلىدۇ. بۇ خىلدىكى كۆكرەك پەردە ياللۇغىنى بەزى تىۋىپلار ھەقىقى دەپ ئويلاپ قېلىشى مۇمكىن، ئەمما ئىشقىنىڭ كۆرۈنمەسلىكى بىلەن بىرىنچى تۈردىكى ساختا كۆكرەك پەردە ياللۇغىدىن پەرقلىنىدۇرۇش؛ ئالاھىدە ۋە ئېغىر بولغان ئالامەتلىرىگە ئاساسەن ھەقىقىي كۆكرەك پەردە ياللۇغىدىن پەرقلىنىدۇرۇش مۇمكىن.

داۋاسى: بەلغەم ماددىسىنى تازىلاش، سىرتتىن ئىسسىق دورىلارنى سۈركەش لازىم. مەسىلەن، پىرسىياۋشان، بۇغداي كىپىكى، ئاق لەيلى گۈلى، بوغدا مۇڭگۈزى، بىنەپشە قاتارلىقلارنى بابونە يېغى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ سىرتتىن چېپىش لازىم. ھەم ئىسسىق ئۆتكۈزۈش كېرەك. كۆكرەك پەردە ياللۇغىنىڭ يەنە بىر تۈرى بوغۇ-لۇش خاراكتېرلىك كۆكرەك پەردە ياللۇغى (زاتىلىجەنە-خەنناقى) دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭدا ياللۇغلىنىش ئاساسەن كۆكرەك پەردىسىنىڭ تۆۋەندىكى قىسمى يەنى كىرگىت پەردە قىسمىدا بولۇپ نەپەس ئېلىش قىيىنلىشىپ كېتىدۇ. بولۇپمۇ نەپەسنى ئىچىگە ئالغاندا ئاغرىش بەكمۇ كۈچەيىپ كەتكەنلىكتىن، ئاغرىق نەپەس ئالماي خېلى ئۇزۇن تۇرۇپ قالىدۇ. بۇ ھال بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ كەتسە ئاغرىق بوغۇلۇپ ئۆلۈپ قالىدۇ. بۇنى داۋالاشتا بىرىنچى

تۈردىكى كۆكرەك پەردە ياللۇغىنىڭ بىرىنچى خىلى
داۋالاش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىش مۇمكىن.

شۈشە كېسىلى

شۈشە كېسىلى كۆكرەك پەردە ياللۇغىنىڭ بىر
خىلى بۆلىسىمۇ، ئەمما زەرەرلىنىش كۆكرەك ئارقا قىسمى
قوۋۇرغىلىرىنى ئىچكى تەرەپتىن ئوراپ تۇرغۇچى كىر-
گىت گۆشلەرنىڭ ياللۇغلىشىدىن ئىبارەت. بۇنىڭدا
كۆكرەك پەردە ياللۇغىدا كورسىتىپ ئوتۇلگەن كېسەللىك
بەلگىلىرىدىن باشقا قاتتىق ئاغرىش سەۋىيىسىدىن ئاغرىق
كىشى پۈتۈنلەي ھەركەتتىن قالدۇ، مىدىرلاش مۇمكىن
بولمايدۇ، ئاغرىق ياتالمايدۇ.

داۋاسى: ھوققە دورىلارنى مۇۋاپىق تاللاپ ئىش-
لىتىش لازىم. سىرتتىن قالايىمقان دورىلارنى چېپىشقا
بولمايدۇ، ئۇلار كېسەلنى ئېغىرلاشتۇرۇپ قويىدۇ. ئىش-
لىتىلىدىغان دورىلار، ماددىلارنى تاشقىرىغا سۈرۈپ
چىقىرىشنى ئاساس قىلىش لازىم. تال كېسەللىكىدە قولا-
لىنىدىغان ئوتلۇق ھىجامەت (لوئقا) قويۇلىدۇ. ئاغرىق
جايعا تەنچۇر قېقى بىلەن بىللە سوقۇلغان قىچا قويۇلىدۇ.
بىنەپشە، بابۇنە، سېرىق چىچەك ئۇرۇغى، زىغىر، شۈمشە
ئۇرۇغى، ئارپا ئۇنىنى باراۋەر ئېلىپ بىر ئاز سۇ بىلەن
قاينىتىپ، كۈنجۈت يېغى بىلەن ياغلاپ ئاغرىق جايعا
قويۇش كېرەك. باشقا چارىلار كۆكرەك پەردە ياللۇغى
بىلەن ئوخشاش.

توش ئىچكى پەردىسىنىڭ ياللۇغى (زاۋىل سەدرى)

ئۆپكىنى ئوراپ تۇرغۇچى پەردىنىڭ توش سۈڭەك ئارقىسىدىكى قىسمىنىڭ ياللۇغى بولۇپ، سەۋەپلىرى كۆك-رەڭ پەردە ياللۇغىنىڭكى بىلەن ئوخشاش.

ئالامەتلىرى: توش ساھىسىدا قاتتىق ئاغرىش ۋە سانجىقلىق ئېچىشىش بولىدۇ. توش تىك پاسلىنىڭ بىر قىسمى ئىككى تەرەپ ئوقسىرەك سۈڭەك بېشىدىن باشلىنىپ، خەنجەرسىمان ئوسۇككە كېلىپ توختايدۇ. ياللۇغلىنىش كۆكرەكنىڭ بىر قىسمىدا بولسا، ئاغرىق ئىككى تەرەپكە ھەركەت قىلالىسىمۇ، لېكىن ئاستىن تەرەپكە قاراش ياكى تۆۋەنگە ئىگىشىش قاتارلىق ھەركەت قىلىشقا مۇمكىن بولمايدۇ. ئەگەر تەسادىپى بۇ خىل ھەركەت قىلىنسا قاتتىق ئاغرىش نەتىجىسىدە كېسەل بىئارام بولۇپ كېتىدۇ. ئادەتتىكى چاغلاردا كۆكرەك پەردە ياللۇغىنىڭ باشقا ئالامەتلىرى قوشۇلىدۇ. كېسەل كىشى كۆكرەك قىسمىدا بوغۇزدىن باشلاپ تامەندە ئېغىزغا قەدەر بولغان ئارىلىقتا ئاغرىش سىزىدۇ. توش ئىچكى پەردىسىنىڭ 2-شاخچىسى ئۆقسىرەك سۈڭەك بىلەن گەدەن پەيلىرىگە تۇتاشقان ھالدا بولغانلىقى ئۈچۈن ئاغرىق ئىككى تەرەپكە قارىغاندا، يۆتەلگەندە ئېغىرلىشىدۇ.

داۋاسى: كۆكرەك پەردە ياللۇغىنىڭكى بىلەن ئوخشاش بولۇپ، سىرتتىن قىلىنىدىغان تەدبىرلەر توش ئىچكى پەردىسىنىڭ ئورنىغا قاراپ قىلىنىدۇ.

كىرگىت پەردە ياللۇغى (بەرسام)

كىرگىت پەردىنىڭ كۆكرەك پەردە ياللۇغىنىڭ تەسىرىدە ياكى كۆكرەك پەردە ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقارغۇچى سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن مۇستەقىل ھالدا يال-
لۇغلىنىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، قەدىمقى تىبابەتتە يەنىلا كۆكرەك پەردە ياللۇغى (زاتىلىجەنە) قاتارىدا ھىساپلىنىپ كەلگەن. كىرگىت پەردە (ھىجاس ھاجىزە) نىڭ نەپەس ئەزالىرى بىلەن قوساقنىڭ ئوتتۇرىسىدا كۈندىلىك تۇرغۇچى پەردە ئىكەنلىكى ھەققىدە ئوخشاشمىغان كۆز قاراشلار بول-
سىمۇ، لېكىن كۆپچىلىك ھۆكۈمالار بىردەك ئېتىراپ قىلىدۇ.
ئالامەتلىرى: يۇقۇرقى قوساق قىسمى ۋە يېتىم قوۋۇرغىلار ئارىلىقلىرىدا قاتتىق ئاغرىش بولىدۇ.
كېيىنچە، ئوڭ تەرەپ جىگىر ئەتراپىدا ساد-
جىقىسىمان ئاغرىق بېلىنىدۇ. يۈتەل كېسەلنى بەك ئازاپلايدۇ. كۆڭلى ئايىنىدۇ. قۇرۇق ھو-
ئاغرىشنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈپ ھۇشدىن كەتكۈزىدۇ.
قوساق ئەتراپىنى تۇتۇپ كۆرگەندە قىزىق سېزىلىدۇ.
ئومۇمەن ھارارەتمۇ بولىدۇ. يۈتەل بەلغەمىز بولۇپ كېسەل
ئەس-ھۇشنى يوقىتىدۇ. بۇ ھال مىڭگە تەسىر يەتكەن-
لىكتىن دېرەك بېرىدىغانلىقى ئۈچۈن مىڭ پەردە ياللۇغى
(سەرسام) بىلەن ئوخشىتىپ بەرسام دەپ ئاتىلىپ كەلگەن.
داۋاسى: پاقالچەك ئەتراپىغا ھىجامەت قويۇش بىلەن
يەرلىك ئورۇنغا ماددىلارنى پىشۇرغۇچى ۋە تارقاتقۇچى

(مۇھلىل) سۈرتۈش لازىم. مەسىلەن، ياپۇنە، بىنەپشە، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، ئارپا ئۇنى، پۇرچاق، زىغىرلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قايىناقۇ بىلەن يۇغۇرۇپ، بىر ئاز قىزىتىپ ئاغرىق جايغا قويىلىدۇ. تەرەتنى راۋان قىلىش ئۈچۈن كۆكرەك پەردە ياللۇغىدا كۆرسىتىلگەن ھوققە، باشقا چارىلار قىلىنىدۇ.

كۆكرەك بوشلۇقىغا يىرىك تولۇش (ئىھتىقانى سىنە)

ئوپكىنىڭ تۈرلۈك ياللۇغلىرىنىڭ تېشىلىشى ياكى ئوپكىنى ئوراپ تۇرغۇچى پەردىلەردىكى ئىششىقلارنىڭ ئېغىز ئېلىشى نەتىجىسىدە كۆكرەك بوشلۇقىغا يىرىك يىغىلىپ قالىدۇ. يىرىك قويۇق ھالەتتىكى سۈيۈقلۈك بولغاشقا، سىرتقا چىقىپ كېتىشى ئۈچۈن پەقەت سىرتقا قاراپ ئېغىز ئېلىشى زورۇر.

ئالامەتلىرى: يېڭى باشلانغاندا كۆكرەك پەردە ياللۇغىدىكى ئالامەتلەر كۆرىلىدۇ. كۆكرەكنىڭ ئاغرىشى كۆرۈلۈپ، چوڭقۇر تىنغاندا ياكى يۈتەلگەندە كۈچىيىدۇ. بەدەن ھارارىتى ئۆرلەيدۇ، تۈگۈپ تىترەيدۇ، يۈتەلىدۇ. نەپەس ئۆزە ۋە قىيىن، تومۇر ئىتتىك بولىدۇ.

كونارغان چاغدا ئاغرىق كىشى ئورۇقلاپ، ئاجىز - لاپ كەمقانلىشىپ كېتىدۇ. بارماقلىرىنىڭ ئۇچى تۈمەل - شىپ قالىدۇ. ئوپكە سىلى تۈپەيلىدىن كۆكرەككە يىرىك

يىغىلغاندا، يىرىك كۆپرەك بولسا يۈرەك ئويناش، يەنى قىيىنلىشىش قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلىدۇ.

داۋالاش: ئاغرىقنىڭ دەسلەپكى دەۋرىدە ياخشى كوئۇل قويۇپ داۋالاش (كۆكرەك ياللۇغىغا قارشى) ئېلىپ بىرىش لازىم. يىرىكنى سۇيۇلدۇرۇپ چىقىرىش تەدبىر - لىرىنى كۆرۈش كېرەك. مەسىلەن، ئەنجۈر، زۇپا، سەر - پىستان، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، پىرسياۋشان، ئۇرۇقسىز ئۈزۈملەرنى لازىم مىقداردا ئېلىپ، بادام يېغى ۋە ناۋات قوشۇپ قاينىتىپ ئىچىشكە بىرىلىدۇ.

۷ ماقالا. يۈرەك كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: يۈرەكنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان كېسەللىكلىرى

يۈرەكنىڭ ئىسسىق مىزاجلىق كېسەللىكلىرى
يۈرەكنىڭ ئىسسىق مىزاجلىق كېسەلى يۈرەك
ھەركىتى جەھەتلىرىدىلا ئىپادىلەنمەستىن بەلكى پۈتۈن
بەدەندە تەسىر كۆرسىتىدۇ.

ئالامەتلىرى: نەپەس چوڭ، تومۇر ھەركىتى چوڭ
ۋە تېز بولىدۇ. ۋە بىر تۇتاش (مۇتەۋاتىر) ئۇرىدۇ.
كۆكرەك قىزىق، تەشۋالىق زىيادە بولىدۇ. سەۋەپسىز
غەم - ئەندىشە قىلىدىغان، روھى جەھەتتىن ئازاپلىنىدۇ.
خان بولۇپ قالىدۇ. يۈرەك ئەتراپىدىكى يېقىمىزلىق
كېسەلنى تىنچىتىش لازىم بولىدۇ. سوغاق ھاۋادىن
راھەتلىنىپ تۇرىدىغان بولۇپ، ئورۇقلاپ كېتىدۇ.

داۋاسى: قايىسى بىر ماددىنىڭ غالىپلىقى كۆرۈلسە
قائىدە بويىچە شۇ ماددىنى تازىلاپ چىقىرىش ئۇسۇل.
لىرى قوللىنىدۇ. مەسىلەن، قان غالىپ بولسا باسلىق
تومۇرىدىن قان ئېلىشى لازىم. ئەگەر قان ئېلىش مەنى

قىلىنىدىغان ئەھۋاللار بولسا ئىككى غول ئارىسىنى ئېلىپ تۇرۇپ لوڭقا قويۇش لازىم. ئەگەر قىزىش ئارتۇق بولسا ماددىنى تازىلىغاندىن كېيىن قۇرسى كاپۇر (76 - نۇسخە) نى ئانار ياكى ئالما شەرۋىتى بىلەن بېرىش لازىم. ئاق سەندەل، كاپۇرلارنى گۈلايغا سۇرۇپ كۆكرەككە چېپىش كېرەك. سوغاق ۋە خۇشپۇراقلىق نەرسىلەرنى پۇرۇتۇش، ھول مەۋە (ئانار - ئالما) لارنى كۆپرەك بېرىش، تامىغىغا يۇمىخاقسۇت سېلىپ بېرىش كېرەك. قەۋزىيەت بولسا تەمىرى ھىندى بىلەن ئەينىلانى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، قايناقسۇدا دۈملەپ تەمىنى ئىچىرىش لازىم. ئەگەر ئىچى سۈرگەن بولسا، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى بېرىلسىدۇ. خېمىرى سەندەل (77 - نۇسخە)، ئەرقى سەندەل قاتارلىق يۈرەككە قۇۋۋەت بەرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. ئەگەر كېسەل سەۋىيىسى ماددىسىز بولسا، تازىلاش ھاجەت ئەمەس، مىزاجنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن قۇرسى كاپۇر (76 - نۇسخە) يېتەرلىكتۇر.

يۈرەكنىڭ سوغاق مىزاجلىق كېسىلى

مىزاجىدا سوغاقلىقنىڭ غەلبە قىلغانلىقى سەۋەب بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: تومۇر ھەركىتى كىچىك، ئاستا، تەرتىپسىز بولىدۇ. نەپەس ئېلىشى سۇس، بەدەننى ئاجىز ۋە ئوزى ھورۇن بولۇپ قالىدۇ. چىرايى سۇلغان، دائىم غەمكىن ۋە ئادەم خالىمايدىغان بولۇپ، مالىخولىيا ئالا -

مەتلىرى كۆرىنىدۇ. ئىسسىق نەرسىلەردىن راھەتلىنىدۇ.
داۋاسى: داۋا ئۆلچىمىشكى ھار (22 - نۇسخە)
بېرىلىدۇ. شەرۋەتلەردىن گازىۋەن شەرۋىتى، بادىرەنجىبۇيا
شەرۋىتى بېرىش (78 - 79 - نۇسخىلەر) كېرەك. ئىچى -
دىغان چايغا ئىپار، قىزىلگۈل، سۇمبۇل ۋە زەپەر سېلىپ
ئىچىش لازىم. غىزاسىغا كەپتەر، تورۇلغا، قۇشقاچ، توخۇ
شورپىسىغا دارچىن، زەپەر، زىرە، پىننە قوشۇپ بېرىش
كېرەك. سۇمبۇل، دارچىن، سەئىدى كۇپى، قەلەمپۇر،
قىزىلگۈل، بادىرەنجىبۇيا، مەرزەنجۇش، رەيھانلارنى ھاجەت
مىقدارى بىلەن ئېلىپ سوقۇپ، تۇخۇم سېرىغى بىلەن
يۇغۇرۇپ كۆكرەككە قويۇش لازىم. سوغاق نەرسىلەردىن
قەتئى پەرەز قىلىش لازىم. ھەسەل شەرۋىتى (81 - نۇسخە)
بۇ كېسەلگە ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ.

يۈرەكنىڭ قۇرۇق مىزاجلىق كېسلى

ئالامەتلىرى: تومۇر ھەركىتى قاتتىق، كىچىك ۋە
بىر تۇتاش بولىدۇ. ئورۇقلاش ئانچە بولمايدۇ. روھى
جەھەتتىكى غەيرى ئەھۋاللار يوقۇرقىدىكىلەرگە قارىغاندا
بوشراق بولىدۇ. ئۇيقۇسىزلىق ۋە قۇرۇق، قاتتىق يۈتەل
نىڭ بولۇشى بۇ خىلدىكى يۈرەك كېسلىگە خاس ئالا -
مەتتۇر. چۈنكى يۈرەك ۋە ئۆپكەننىڭ مىزاجىدىمۇ قۇرۇق
لۇق غالىپ بولۇپ، نەملىكنىڭ يېتەرسىزلىكى كۆرىلىدۇ.
داۋاسى: ئارپا سۈيىگە بادام يېغى ئارىلاشتۇرۇپ
بېرىلىدۇ. شېكەر قوشۇپ بەرسىمۇ بولىدۇ. ھول سوغاق

تاماقلار بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇلىدۇ، يېڭى سېغىلغان سۈت بېرىش ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ. بىنەپشە يېغى ①، ئاق موم، قاپاق ئۇرۇغى، ھول يۇمىق سۈت سۈيى، تەرخەمەك سۈلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ يانچىپ كۆكرەكنىڭ يۈرەك ئەتراپىغا سۈركۈلىدۇ.

يۈرەكنىڭ ھول مىزاجلىق كېسلى

ئالامەتلىرى: تومۇر ھەركىتى يۇمشاق، ئاستا ۋە مۇختەلىپ بولىدۇ. روھى قوزغىلىش بەلگىلىرى تېز بارلىققا كېلىپ تېز ئۆزگۈرىدۇ. قۇرۇقلۇقتىن راھەت تاپىدۇ. داۋاسى: ھوللۇك تاماقلارنى ئاز بېرىش بىلەن يۈرەككە قۇرۇقلۇق يەتكۈزگۈچى دورىلاردىن قەلەمپۈرە زەپەر، بادىرەنجىبۇيا قاتارلىقلار بېرىلىدۇ، ھەسەل سالغان ئىمسكەنجىۋىل، پىننە شەرىۋىتى ئىچكۈزۈلۈپ، ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى سەبىرە (4 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

2 - پەسىل: يۈرەك ئويناش (خاپقانى قەلب) كېسلى

يۈرەك قوزغىلىش (خاپقان) كېسەللىكلىرى — يۈرەككە يەتكەن تۈرلۈك زەرەرلىنىشلەر نەتىجىسىدە تىترەش ھەركىتى (ھەركىتى ئىختىلاجى) ئارقىلىق قوزغىلىشىدىن ① بىنەپشە يېغى: گۈل يېغىغا ئوخشاش ئۇسۇل بىلەن تەييارلىنىدۇ.

پەيدا بولغان يۈرەكنىڭ تەۋرىشىدىن ئىبارەت. خاپقان كېلىپ چىقىش سەۋەپلىرى ئاساسىدا 8 تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

مزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان خاپقان

بۇ تۈردىكى خاپقانىڭ ئالامەتلىرى ۋە داۋالاش ئۇسۇللىرى يوقۇرىدا سۆزلەنگەن يۈرەكنىڭ مزاج بۇزۇلۇشتىن بولغان كېسەللىرىنىڭكى بىلەن ئوخشاش.

قان قېيىش (ئىمتىلائي خۇن) دىن بولغان خاپقان

قان گەرچە ئوفۇنەتسىز بولسىمۇ يۈرەك تومۇرىلىرىدا راۋان ئاقماي قېيىپ قېلىشىدىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: قان ماددىسى غالىپلىق ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. تومۇر ھەركىتى يوغان ۋە ئېسىلغان ھالدا، سۈيىدۈك قويۇق ۋە قىزىل رەڭلىك بولىدۇ. پۈتۈن بەدەنلىرى ئېغىرلىشىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: چەپ قول باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىش، ئەگەر قان ئېلىشقا بولمايدىغان ئەھۋاللار بولسا، پاخالچەك ياكى ئارقا تەرەپ ئىككى تاغاق ئوتتۇرىسىغا ھىجامەت قويۇش لازىم. قۇرسى كاپۇر (76 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. گۆشىز تاماق، پىشلاق قاتارلىقلار بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش لازىم. مەنىنى چىقىرىش تەدبىرلىرىنى قىلىش ۋە مزاجىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن 1 - پەسلىدىكى چارىلارنى قوشۇمچە ئېلىپ بېرىش لازىم. ئەگەر كېسەلنىڭ بەدىنى بەك ئاجىز بولسا ئۆتكۈر سوغاق دورىلارنى بەرمەسلىك كېرەك.

يۈرەك تومۇرلىرىغا سەپرا قۇيۇلۇشتىن بولغان خاپقان

ئالامىتى: سەۋەپسىز غەمكىن بولۇش، دائىم كوڭۇلسىزلىك ئىچىدە تۇرغانلىق ھىس قىلىش، ئۇيقۇ-سىزلىق ۋە تەشۋالىقنىڭ زىيادە بولۇشىدەك بەلگىلەر بولۇپ، يۈرەك قىزىپ تۇرغانلىق سېزىلىدۇ. يۈرەك تىترەپ تۇرىدۇ. ئەمما ئادەتتە سەپرا سەۋىبى بىلەن بۇ خىل ئەھۋال بولمايدۇ.

داۋاسى: سەپرانى قان تومۇردىن چىقىرىش ئۈچۈن، مەتبۇخى ھېلىلە (38-نۇسخە) بىننەپشە شەرىۋىتى ۋە تەمىرى ھىندىنى قايناق سۇغا چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ھارارەت بولسا مۇۋاپىق تەدبىر قىلىنىدۇ. قاتتىق ھارارەت نەتىجىسىدىكى يۈرەكتە ئىششىق پەيدا بولۇش خەۋپى بولسا، 1 پۇڭ قۇش ئۇزۇمى (يە-برۇج)، 1 پۇڭ كاپىنۇ، 1 پۇڭ ئىسپار، زەپەرلەرنى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ بىر دانە ماش ئېغىزلىغىدا ئىچىشكە بېرىلىدۇ. يۈرەكنىڭ ھارارىتى بەك زىيادە بولسا، ئېپىز كۆپىنەكنى سەندەل ئەرەقى بىلەن بىر قانچە قېتىم ئەمدەپ قۇرۇتۇپ، يۈرەككە تىگىپ تۇرىدىغان قىسمىنى بىر ئاز گۈلپ بىلەن نەم قىلىپ كەيگۈزۈپ قويۇش كېرەك. ياكى قىزىل گۈل، تاباشىردىن بىر مىسقالدىن، يۇمىلاقسۇت ئۇرۇغىدىن 2 مىسقال، كاپۇردىن $\frac{1}{2}$ پۇڭ ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، ئالما ياكى ئانار شەرى-

ۋىتى بىلەن كۈنىگە بىر قېتىم بېرىلىدۇ. ھەم مەۋە
شەرۋىتى (شەرۋىتى فەۋاكە) (15 - نۇسخە) بېرىش مۇمكىن،
بەلغەم ماددىسىدىن بولغان خاپقان
(خاپقانى بەلغىمى)

بەلغەم ماددىسى: 1 يۈرەك غىلاپىغا ① ياكى يۈرەك
تومۇرلىرى ئىچىگە چۈشۈشى بىلەن پەيدا بولىدۇ. يۈرەك
غىلىپى ئىچىگە چۈشكەن ماددا سۇيۇقلۇق ۋە يەل بولۇپ،
يۈرەك تومۇرلىرىغا چۈشكەننى قويۇق توسالغۇ (سۈدە)
بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: نەپەس قىيىنلىشىش بىلەن تومۇر
ھەركىتى يۇمشاق بولىدۇ. بەزىدە ئاغرىق ھۇشسىزلىق
كېتىدىغاندەك بولۇپ قالىدۇ. ئاغرىق يۈرىكىنىڭ سۇغا
چىلىشىپ تۇرغانلىقىنى ھېس قىلىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن
ھەببى ئىستەمىقۇن (16 - نۇسخە) بىلەن ئايارەج پەي -
قارانى (11 - نۇسخە) قوشۇپ بېرىش كېرەك. ھەببى
قوقىيا (17 - نۇسخە) بېرىلسمۇ بولىدۇ. بەزىلەر ئايا -
رەج لوغازيا ياكى بەيادرتۇس (بەيادى تۇس) بېرىشنى
تەۋسىيە قىلىدۇ، ئەگەر قەي قىلىش ئاسان بولسا قەي
قىلدۇرۇپ بەلغەمنى تازىلاش لازىم. ئۇندىن كېيىن داۋا -
ئۆلمىشكى تەلخ (81 - نۇسخە) بېرىلىپ، يۈرەكنى قۇۋۋەت

① غىلاپ: يۈرەك ئىدراپىنى ئوراپ تۇرغۇچى نېپىز پەردە.

لەندۇرۇش كېرەك. نۇشدارى لۇئۇۋى (8 - نۇسخە) بېرىشەن بولىدۇ. ئۇندىن باشقا يۈرەككە ئىسسىقلىق بەرگۈچى دورىلارنى يۈرەك ئۈستىگە چېپىش مەسلەن، قۇست، سۇنبۇل، سەئىدى، دارچىن، سوكلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سو - قۇپ رەيھان سۈيى بىلەن يۇغۇرۇپ يۈرەك ئۈستىگە چېپىش كېرەك.

5. يۈرەك تومۇرلىرىغا سەۋدا قويۇلۇشتىن بولغان خاپقان

سەۋدا خىلىتلارنىڭ لېيى بولغانلىقى ئۈچۈن تو - مۇرلارغا قۇيۇلسا توسالغۇ ھاسىل قىلىپ، يۈرەكنىڭ ساپ ھاۋا (ھاۋايى نەسمى) بىلەن تەمىنلىنىشى ۋە بۇخارات - لارنىڭ چىقىپ كېتىشى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. يۈرەك بۇ توسقۇنلۇقنى دەپنى قىلىش ئۈچۈن كۈچەپ ھەركەتلەن - گەنلىكتىن، تىترەش قوزغىلىش كېلىپ چىقىدۇ؛ ياكى ھاۋايى نەسمى يېتىشمەسلىك سەۋىيىدىن يۈرەك ئېغىپ ھەركەت قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: دائىم يۈرەك ئېغىپ (پۇلاڭلاپ) تۇ - رىدۇ. تومۇر ھەركىتى قاتتىق بولىدۇ. كېسەلدە قورقۇش ۋە ئەندىشە، ئورۇنسز خىياللار پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: بۇ كېسەلنىڭ داۋاسى مالىخولىيانىڭ

داۋاسى بىلەن ئوخشاش. بەلغەم بىلەن سەۋدانىڭ ئارد - لاش ئالامەتلىرى بولسا، بەلغەم ۋە سەۋدانى تازىلاش ئۈچۈن توۋەندىكى نۇسخە بېرىلىدۇ. توربۇت، ئەپتىمۇن،

غارىقۇن، ئۇستۇخۇددۇس، كابىل ھېلىنىنىڭ پۇستى ھەر
 بىرى 3 مىسقالدىن، ئايارەج پەيقارا $4\frac{1}{2}$ مىسقال،
 ئۇدى ھىندى $1\frac{1}{2}$ مىسقال. دورىلارنى سوقۇپ، ئەل
 گەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئايارەجنى ئېرىتىپ شۇنىڭ بىلەن
 ھەب قىلىنىدۇ. ھەر كۈنى كەچتە 2 مىسقالدىن بېرىل-
 دۇ. ئەگەر خاس سەۋادىن بولسا ھەبى شەبىار (2 - 8 -
 نۇسخە) بېرىلىدۇ. يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش ئۈچۈن خې-
 مىرى ئەۋرىشم (23 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

كۆپ قان يوقىتىش ۋە ئوزۇقلىنىشنىڭ ناچار بولىشىدىن بولغان خاپقان

ئاپالار توغۇتتىن كېيىن ياكى ھېيىز سەۋىيىسى بى-
 لەن كۆپ قان يوقىتىش، ئەزلەردە ھەر خىل يوللار بى-
 لەن قان ئېقىش ۋە قاتتىق سۈرگە ئىچىپ كۆپ ئىچ-
 سۇرۇپ كېتىش، يىمەك - ئىچمەكنىڭ ناچار بولىشىدىن
 قان ئازلىق كېلىپ چىقىش قاتارلىق سەۋەپلەر يۈرەكنى
 زەئىپلەشتۈرىدۇ. زەئىپلىكنى يېڭىپ كېتىش ئۈچۈن ئاجىز-
 لىغان يۈرەكنىڭ ھەركىتى تىتىرىگەن ھالەتتە بولۇپ،
 خاپقان پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سەۋىيىنى يوقىتىش، ئۇن-
 دىن كېيىن قان ھاسىل قىلغۇچى تەدبىر - چارىلارنى قى-
 لىش لازىم. مەسىلەن، چالا پىشۇرۇلغان توخۇم سېرىغى،
 نوخۇت سېلىنغان ئۇچار قاناتلار شورپىسى بېرىلىدۇ. يۇ-
 قۇرىدا كورسىتىلگەن يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلار

تاللاپ بېرىلىدۇ. ئاياللارنىڭ ھېيرىنى تەڭشەش
لىرى قىلىنىدۇ. جىنسى ئالاقىنى چەكلەش لازىم.
يۈرەكنىڭ سەزگۈ ئەسەپلىرىنىڭ قوزغۇلىشچان بولۇپ
قىلىشىدىن بولغان خاپقان

غەزەپلىنىش، خوشلۇق ياكى كۈتۈلمىگەن خەۋەرنى
ئانگلاش بىلەن كېسەلنىڭ يۈرىكى تىترەپ سالىدۇ. ھەتتا
ئىسسىق ۋە سوغاقلىق تەسىراتلار مۇشۇنداق ئەھۋاللارنى
پەيدا قىلىشى مۇمكىن.

داۋاسى: سەۋىيىنى تۈگىتىش بىلەن روھنى كۈچ-
لەندۈرگۈچى چارىلارنى قىلىش لازىم. تامىغىغا پاقىلاننىڭ
كالا گۆشى ۋە ھەرسە ① بېرىلىدۇ. يۈرەكنى كۈچلەندۈر-
رۇش ئۈچۈن كېسەلنىڭ مىزاجىغا قاراپ، ۱ - پەسىلدە كۈر-
ستىلىگەن قۇۋۋەت دورىلىرىدىن بىرىنى تاللاپ بېرىش لازىم.

**باشقا ئەزالاردىكى زەرەرلىنىشلەرنىڭ يۈرەككە
تەسىرىدىن بولغان خاپقان**

بەدەندىكى ھەر خىل ئۆزگىرىشلەر، جۈملىدىن ئە-
زالاردىكى زەرەرلىنىشلەر يۈرەككە ئوخشاش بولمىغان دە-
رىجىدە تەسىر قىلىپ، خاپقانىنى پەيدا قىلىدۇ.

(۱) مىڭە كېسەللىكلىرى، قاتتىق باش ئاغرىشلار
يۈرەككە تەسىر قىلىدۇ. نەتىجىدە يۈرەك ھەرىكىتىدە تىترەش-
نى شەكىللەندۈرىدۇ. ئۇندىن باشقا جىگەر مەئدە قاتار-

① ھەرسە: گۆشنى ھاۋىدەك يۇمشاق پىشۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

دىغان بىر خىل غىزا

لىق ئەزالارنىڭ كېسەللىكلىرىمۇ شۇنداق تەسىر كۆرسىتىدۇ.
(2) زەھەرلىك ھاشارەتلەرنىڭ چېقىشى بىلەنمۇ
خاپقان كېلىپ چېقىشى مۇمكىن.

داۋاسى: شىرىكچىلىكى بار بولغان ئەزالاردىكى كې-
سەللىكلەرنىڭ داۋاسى ئاساس قىلىش بىلەن يۈرەكنى
قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلارنى مۇۋاپىق تاللاپ قوشۇمچە
بېرىش لازىم. ئەمما شىرىك ئەزانى ئايرىشتا خاتاغا يول
قويماسلىق لازىم.

تايىلىنىپ كېتىش (غەشى)

غەشى يۈرەكنىڭ ھىس ۋە ئىرادە ئەسەپلىرىنىڭ
ئۆز پائالىيىتىدىن قېلىشى بىلەن كېلىپ چىقىدىغان ئېغىر
ھالدۇر. مەزكۇر ئەسەپلەر يۈرەكتىكى روھنىڭ پۈتۈن بە-
دەنگە قۇۋۋەت بېرىشىنى تەڭشەپ تۇرغاشقا بۇلارنىڭ زەرەر-
لىنىشى ھۇشسىزلىقنى كەلتۈرىدۇ. ھۇشسىزلىقنى كەلتۈرگۈ-
چى سەۋەپلەر: روھنىڭ تارقاپ كېتىشى، روھ بىلەن تاش-
قى ساپ ھاۋا ئالمىشىشنىڭ توسىلىشىدىن ئىبارەت.

(1) روھنىڭ تارقاپ كېتىشى — (1) داۋاملىق ئۆتكۈر
ئىچى سۇرۇش ياكى كۆپ مىقداردا قان كېتىش؛ (2) ھەد-
دىدىن ئارتۇق خوشاللىق ياكى لەززەتلىنىش بىلەن كې-
سەل ھۇشسىزلىق كېتىش؛ (3) قاتتىق ئاغرىش؛ (4) زەھەر-
لىك دورىلارنىڭ تەسىرى، مەسىلەن، سەگىيا، ئاق پارپى،
قاتارلىقلار ئايلىنىپ كېتىشكە سەۋەبچى بولىدۇ.

(2) روھنىڭ توسىلىپ قېلىشى — (1) ئۆتكۈر تەسىر-

لىك يىمەك - ئىچمەكلەرنى ھەددىدىن ئارتۇق ئىستىمال قىلىش، مەسىلەن، ھاراق، مەيزاپلارنى كۆپ ئىچىش، (2) تۇيۇقسىز پەيدا بولغان قورقۇنۇش، ۋەھشەت ۋە غەم، (3) ھەر خىل زەھەرلىك بۇس - بۇخاراتلار، (4) يۈرەك مىزاجىنىڭ ئۆتكۈر بۇزۇلۇشى، (5) مىڭە، ئۆپكە قاتارلىق ئەزالارغا يەتكەن زەھەرنىڭ روھقا تەسىر قىلىشى ۋە يۈرەكنىڭ ئۆزى ياكى غىلاپىدىكى ياللۇغلىنىشلار.

ئالامەتلىرى: ھۇشنىڭ كېتىشى ئالدىدا، تومۇر كىچىك، ئىنچىكە سالىدۇ، رەڭگى ئۆزگىرىدۇ (تاتىرىدۇ)، كۆز ئالمىسىنىڭ ھەركەتلىنىشى ناچارلىشىپ كۆز ئالدىدا بىر نىمە ئۆچۈپ يۈرگەندەك كۆرىنىدۇ، بىر ئاز سوغاق تەرلەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن ھۇشنىڭ كېتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئاغرىقنىڭ رەڭگى توپىرەك، پۇت - قوللىرى سوۋۇپ كەتكەن، نەپەس ئېلىشى كىچىك ۋە ئاستا بولىدۇ. تومۇر ھەركىتى ئاجىز ۋە ئاستا بولۇپ، بارغانسېرى پۇتۇن بەدەن سوۋۇپ كېتىدۇ. ئېغىر ھاللاردا ئۆلۈم بىلەن ئاياغلىشىدۇ. يۈرەك ئويىداش ئېغىر ئۆتكەندىمۇ ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن. ئايلىنىپ كېتىشنىڭ تەكرارلىنىپ تۇرۇشى يامان ئاقىۋەتلىك تۇر. مىڭگە قان چۈشۈش (سەكتە) بىلەن ئايلىنىپ كېتىش (غەشى) نىڭ پەرقى شۇكى، سەكتەدىن كېيىن پۇتۇنلەي ئاۋاز چىقمايدۇ. ئەمما ئايلىنىپ كەتكەن ئاغرىقتىن ئاۋاز چىقىشى مۇمكىن.

داۋاسى: ئايلىنىپ كەتكۈچىلەرنى پۇتۇنلەي ھۇش-

۱ سز ھالەتتە ياكى بىر ئاز ھۇشيار ئۇچرىتىشىمىز مۇمكىن. ھوشىمىز بولغاندا، ئەگەر سەۋىيىنى بىلىشكە ئۇلا-گۈرسەك، ئۇنى دەپنى قىلىش، بولمىسا كۈچنى ئەسلىگە كەلتۈرۈپ ھۇشنىڭ ئەسلىگە كېلىشىگە ياردەم بېرىشىمىز كېرەك. يەنى مۇناسىۋەتلىك سەۋەپلەرگە قارىمۇ - قارشى تەسىر قىلىدىغان دورىلارنى بۇرۇنغا پۇرۇتۇش، يۇتقۇنچاققا تامغۇزۇش لازىم. بۇنداق چاغدا ئاغرىقنىڭ مىزاجىغا دىققەت قىلىش زورۇر. ئۇنداق بولمىغاندا قىلىنغان تەدبىر پايدا بەرمەيدۇ. مەسىلەن، (۱) كېسەلنىڭ مىزاجى ئىسسىق بولسا، كاپۇر، ئاق سەندەل، گۈلاپ، تەرخەمەك سۈيى، خاڭگا سۈيى قاتارلىقلارغا بىر ئاز ئىپار قوشۇپ پۇرۇتۇش لازىم. چۈنكى ئىپار تەبىئىي ئىسسىقلىققا مەدەت بېرىدۇ. سوغاق گۈلاپنى يۇتقۇنچاققا تامغۇزۇش، كۆك رىڭگىگە سوغاق سۇ پۇركەش كېرەك. ھۇشغا كەلگەندىن كېيىن خاپقان كېسىلىدە سۆزلەنگەن سەندەل سۈيىدە نەملىگەن كۆينەك كەيگۈزۈش لازىم. ئەگەر كېسەل ھۇشيار ھالەتتە بولسا قېتىق - دۇغ ئىچكۈزۈش لازىم.

(۲) كېسەلنىڭ مىزاجى سوغاق بولسا ھۇشسىز ھالەتتە ئىپار، ئەنپەر، رەيھان، لاجىندانە، قەلەمپۇر، دارچىن، زەپەر قاتارلىقلارنى پۇرۇتۇش لازىم. يېرىم مىسقال داۋا - ئىلمىشكى، يېرىم پۇڭ ئىپارنى ئازراق رەيھان سۈيى بىلەن ئېرىتىپ، يۇتقۇنچاققا تېمىتىش لازىم. ئەگەر ئاي - لىنىپ كېتىشنىڭ سەۋىيى ئاچ قېلىش، قاتتىق ئىچ سۇ -

رۇش، تومۇردىن كۆپ قان ئېلىش، جاراھەتلەردىن كۆپ قان ئېقىپ كېتىشلەردىن بولسا سوغاق سۇ، گۈلەپ قاتارلىق - لارنى كۆكرەككە قويۇشقا بولمايدۇ. بەلكى تۈۋەندىكىلەر - دىن بىرنى بۇرۇنغا پۇرۇتۇش لازىم: تىخۇ گۆشى كاۋىپى، ئوتقا سېلىپ بىر ئاز پىشۇرۇلغان ئالما ياكى بىيە، بۇغداينىڭ ئىسسىق ئېنى قاتارلىقلارنى پۇرۇتۇش؛ گۆش سۈيىگە گۈلەپ بىلەن ئازراق ھاراق قوشۇپ گالغا تامغۇزۇش كېرەك. مەيدە ئۈستىنى ئىسسىق مايلا بىلەن ياغلاپ بېرىش لازىم.

3) ئايلىنىپ كېتىش كۆپ تەرلەش بىلەن باش - لانغان يولسا، گۈلەپ، سوغاق سۇ قاتارلىقلار بىلەن كېسەل - نىڭ بەدىنىنى سۇرتىدۇ. ئەگەر تەرلەش يەنە داۋام قىلىۋاتقان بولسا ھەببۇل ئاسنىڭ قۇرۇتۇلغان يوپۇرمىغى، موزا، ئانار پوستىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈ - زۇپ، ئەزالارغا سېپىلىدۇ. ئالما، بىيە قاتارلىق مېۋىلەر - نىڭ سۈيى، گۆش شورپىسىغا پۇراقلىق دورىلارنى قوشۇپ يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش لازىم. ئەگەر ئايلىنىپ كېتىش - تىن بۇرۇن ياكى ئايلىنىپ كەتكەن ھالەتتە ھېق تۇتسا ئېغىزدىن نەرسە بېرىشنى توختىتىش ۋە قۇستۇرۇش تەد - بىرلىرىنى قىلىش كېرەك. گالغا توخۇ پىيى تىقىپ قۇس - تۇرسىمۇ بولىدۇ. كوندۇشقا ئوخشاش چۈشكۈرتكۈچى دو - رىلارنى بۇرۇنغا پۇرۇتۇش لازىم.

4) قاتتىق ئاغرىش سەۋىيىدىن ئايلىنىپ كېتىش: بۇ خىلدىكى ئاغرىقلاردا ئالدىنى ئېلىشقا بەك دىققەت

قىلىش لازىم. قاتتىق ئاغرىشنى پەسەيتىش تەدبىرلىرىنى ئۆز ۋاقتىدا كۆرۈش كېرەك. يەنى ئۇچەي توسۇلىش (قۇ-لۇنچ) دىكى قاتتىق ئاغرىشلاردا فولۇنىيا (82 - نۇسخە) بېرىشكە بولىدۇ. زەھەرلىك ھاشارەتلەر چېقىش ياكى ھايۋانلار چىشلەش تەسىرىدىن بولسا ياكى زەھەرلىك يىمەك - ئىچمەكلىكلەرنى ئىستىمال قىلىش بىلەن پەيدا بولغان بولسا مۇمكىن قەدەر قەي قىلدۇرۇش لازىم. ئۇندىن كېيىن تەرياق ياكى ھايۋانلاردىن چىققان زەھەرگە قارشى تاشلار (پادى زەھەرلەر) ①نى، ئەگەر ھايۋانلاردىن چىققىنى بولمىسا، مەدەندىن ياسالغانلىرى ياكى كاندىن چىققانلىرى بولسۇمۇ بولىدۇ. ئۇندىن باشقا تەدبىرلىرىنى كېسەلنىڭ مىزاجىغا قاراپ قوللىنىش لازىم.

5) روھى ھالەتنىڭ تەسىرى ياكى ئەسەپ (نېرۋ) سەۋىيىسىدىن بولغان ئايلىنىپ كېتىش: يۇقۇرىدا سۆزلەپ ئۆتۈلگەن خۇشپۇراق دورىلارنى پۇرۇتۇش، قول - پۇتلىرىنى سوغاق گۈلاپ بىلەن سۇرتۇش، بەدەننى ئىسسىق ساقلاش كېرەك. مەئدە قىسمىنى ئىسسىقلىق مايىلار مەسىلەن، قەلەمپۇر يېغى، نارچىن يېغى، مەستىكى يېغى قاتارلىقلار بىلەن ياغلاش لازىم. بىر ئازدىن كېيىن ئاغرىق

① پادى زەھەر: زەھەر قايتۇرغۇچى دېگەن مەنادا بولۇپ، ئىت، كالا ۋە ئشەك قاتارلىق ھايۋانلارنىڭ ئوت خالىسى. ئۇ چەي ۋە ئاشقازان قاتارلىق ئىچكى ئەزالىرىدىن چىقىدىغان بىر خىل تاشتەك ماددا تىبابەتتە زەھەر قايتۇرغۇچى دورا سۇ-ئىندە ئىشلىتىلىدۇ. ھايۋان ئۆلگەندىن كېيىن ئېلىنىدۇ.

نىڭ ئاغزىنى ئېچىپ بۇرنىنى تۇتۇپ تۇرۇپ، سەييارىنىڭ
لىق بىلەن گۇلاپ ۋە مائۇللەھىنى گالغا تامغۇرۇپ بىر
رىش كېرەك. قول - پۇت ۋە بېشىنى يەڭگىل دەرىجىدە
مۇجۇپ تۇتۇش كېرەك. ئەگەر سوغاق پەسىلدە بولسا
مەجۇنى پىلاپى بېرىلىدۇ.

6) باشقا ئەزالاردىكى ياللۇغلىنىشلار نەتىجىسىدىن
ئايلىنىپ كېتىش: ئاغرىقنىڭ قول - پۇتلىرى تېگىلىدۇ ۋە
ئىسسىق ئۆتكۈزىلىدۇ. قىزىتمىلىق كېسەللەر تۈپەيلىدىن
بولسا سەۋىيىگە قاراپ چارە كۆرۈش لازىم. بالىياتقۇ
بوغۇلۇش (ھىستېرىيە) سەۋىيى بىلەن بولغان ئايلىنىپ
كېتىشلەردە خۇشپۇراق نەرسىلەرنى تېمىتىش مەنى قىلىدۇ.
بەلكى سامساق، يانتاق چېچىكى، زاراڭخرا چېچى
گىنى پۇرۇتۇش بىلەن شۇ كېسەل يابىدا سۆزلەنگەن
چارىلارنى قىلىش لازىم.

يۈرەك ئاغرىشلاردىن بولغان ئايلىنىپ كېتىشكە
چارە قىلىش مەسىلىسىدە - سوغاق سۇ سېپىش ئومۇمى تەد-
بىردۇر. لېكىن قايسى جايغا سېپىش (ياكى پۇركۇش)،
بۇ توغرىلۇق ئىختىلاپ مەۋجۇت. ئەمما كۆپچىلىك يۈرەك
ساھەسىگە پۇركۇشنى توغرا تاپمىغان. چۈنكى سوغاق سۇ
پۇركۇشتىن مەقسەت كېسەلنى ھۇشقا كەلتۈرۈشتۇر. بۇنىڭ
بىلەن روھ ۋە قان قوزغۇلۇپ تەبىئەتكە ئەگىشىدۇ. نە-
تىجىدە ھارارىتى غەرىزە يۈرەككە مەدەت بېرىپ ھىس
كۈچلىنىدۇ. يۈرەك ساھەسىگە سېپىلگەندە ئەھۋال بۇنىڭ

ئەكسىچە بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن سۇلى
يۈزگە چېچىش كېرەك.

دىمەك يۈرەك مۇھىم ئەزا بولغىنى ئۈچۈن بۇنىڭ
ئاغرىقلىرىنى، جۈملىدىن ئايلىنىپ كېتىشىنى داۋالاشتا
بەك ئېھتىيات قىلىش كېرەك. داۋالاشتىن مەقسەت يۈ-
رەكنىڭ ئېتىدالدىكى كۈچ قۇۋۋىتىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش-
تىن ئىبارەت بولۇشى لازىم. تەۋەندە تىبابەت دورىلىرى
ئىچىدە مۇھىم بولغان بىرقانچە يۈرەك دورىلىرىنى كۆر-
سىتىپ ئۆتىمىز:

موتىدىل دورىلار — ياقۇت فىرۇزە، ئالتۇن، كۈمۈش،
گازىۋان؛

ئىسقى دورىلار — درۋنەج ئەقىرەبى، ئىپار، ئەمبەر
(ئەمبەر)، بۇزبۇغا (ئايلىشى)، پىلە، زەپەر، بەھمەن، قەلەم -
پۇر، ئۇدى خام، بادىرەنجىبۇيا، بالەنگۇ، رەبھان چىنى ۋە
ئۇرۇغى، لىمىن پوستى ۋە يوپۇرمىغى، چوڭ - كىچىك
قاقىلە، سازەنچى ھىندى، راسەن.

سوغاق دورىلار — مەرۋايىت، كەھربا، مارجان، كا-
پۇر، سەندەل، تاباشىر، گىلى مەختۇم، ئالما، يۇمىغاقسۇت.
مۇرەككەپ بېرىكمىلەردىن يۈرەك ئاغرىقلىرى ئۈچۈن ياخ-
شى ئۇنۇم بېرىدىغىنى مەجۇنى مۇپەررىھى ياقۇتەدۇر.
بۇنىڭ بىرقانچە نۇسخىلىرى كۆرسىتىلدى، داۋالاش قائىد-
دىلىرىگە ئاساسەن بىرنى تاللاپ بېرىش لازىم. چۈنكى
مۇپەرھى ياقۇتنىڭ نۇسخىسى تىبابەت كىتاپلىرىدا ھەرخىل
كۆرسىتىلگەن (9 - 84 - 85 - نۇسخىلارغا قارالسۇن).

دۇخانىيە

ئاغرىق يۈرەك ساھىبىدىن قانداقتۇ بىر بوس ياكى تۇتۇندەك نەرسىنىڭ يۇقۇرىغا ئورلۇپ كېتىۋاتقانلىقىنى ھىس قىلىدۇ. كېيىنچە روھى ئالامەتلىرى كۆرۈلۈشكە باشلايدۇ. ئېغىر ھاللاردا ئاغرىق ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن. **سەۋىيى:** بەدەندىكى خىلىتلارنىڭ كۆپىگە ئىلىگىدۇر. **داۋاسى:** مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بىلەن خىلىتلارنى تازىلاپ بولغاندىن كېيىن، ئالامەتلىرىگە قازاپ دورا بېرىش بىلەن مۇناسىپ تاماقلار بېرىلىدۇ. ئەگەر مۇنداق كېسەلنىڭ بۇرنى قانىسا ياكى ئارقا تەرەت ھەرخىل رەڭدە ياكى قارامتۇل كەلسە كېسەلدىن پات ساقىيدۇ.

يۈرەك قۇلىغىنىڭ ياللۇغى (ۋەرەمى) ئۇزۇنلىقەلپ

”ئۇزۇنلىقەلپ“ ئەرەبچە يۈرەك قۇلىغى دېگەن سۆز بولۇپ، يۈرەكنىڭ بەدەندىن كەلگەن قاننى قوبۇل قىلىدىغان ئورنىدۇر. بەزىلەر بۇنى يۈرەكنىڭ ”غەزنىسى“ دەپمۇ ئاتايدۇ. بۇ كېسەل كۆپىنچە ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئىستىملىق كېسەللەردە ياكى تېز پەيدا بولغان ئېغىر كېسەللىكلەردە ھاسىل بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئاغرىق دائىم توش سوغىگى بويلاپ ئېغىرلىق ھىس قىلىدۇ، يۈرەكنىڭ كېڭىيىش ھەرىكىتى زور توسالغۇلارغا ئۇچرايدۇ. كېسەل ئارىلاپ

ئايلانغاندەك بولۇپ تۇرىدۇ. چىرايى توق سېرىق رەڭدە بولۇپ، كوزلىرى چەكچىيىپ قالىدۇ، بەدىنى ئۇرۇقلايدۇ.

داۋاسى: ماددىنى يۇمشىتىش تەدبىرلىرىدىن —

بابۇنە، ئەكىلىل مىلىك، پىرسىياۋشان، بوغداي كىيىگىنى قاينىتىپ سۈيىنى كۆكرەككە قۇيۇش كېرەك. ماددىنى تارقىتىش ئۈچۈن ئازيا بېدىيان، ئەكىلىل مىلىك، زىغىر، يالىپۇز، ئاق لەيلى يۇپۇرمىغى، بەسەي، زەپەرلەرنى سوقۇپ خېمىر قىلىپ قويۇلىدۇ. ئوزۇقلۇققا باي بولغان، ئاسان ھەزىم بولىدىغان تاماقلار بېرىلىدۇ. ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلاردىن — داۋائىلىمىشكى، مۇپەررىھى ياقۇتى، شەرۋىتى ئۆزىشم ياكى خېمىرى ئەۋرىشمىلەر (22 - 84، 86، 87 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ.

ئاقىۋەت جەھەتتىن ئالغاندا ياللۇغلىنىش يۈرەك غىلايلىرىدا بولغان ئاغرىقلاردا خەتەرلىك ئانچە كۆپ ئەمەس. ئەمما ياللۇغلىنىش يۈرەكنىڭ قۇلاق قىسمىدا بولغاندا بەدەندىكى قاننىڭ ساپ ھاۋا بىلەن ئالماشتۇرۇش تۈسۈلۈپ، بەزىدە دەرھال ئۆلۈمگە ئۇلىشىپ بېرىشى مۇمكىن. بۇ غىلىدىكى ئاغرىقلاردا بۇرۇندىن قارامتۇل قان كېلىش ئۆلۈم ئالدىدىكى ئالامەتلەردىن بىرىدۇر.

يۈرەكنىڭ سىقىلىشى (زىيىقىتىل قەلپ)

بۇ كېسەلدە ئاغرىق يۈرەك ساھىبىسىدا سىقىلىش پەيدا بولۇپ ئايلىنىپ كېتىدۇ. ئاغزىدىن كۆپ مىقداردا كۆپۈك ۋە سۇ ئاقىدۇ.

سەۋەبى: يۈرەككە بىر ئۆز سەۋدا ماددىنىڭ قۇيۇلۇشى بىلەن يۈرەك ئەسەپلىرى تارنىشىش ھالىتىگە كىلىش نەتىجىسىدە پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: بەدەننىڭ چوڭقۇر جايلىرىدىن سەۋدانى چىقىرىش ئۇچۇن مۇۋاپىق سۈرگىلەر بېرىلىدۇ. چىگەرەنىڭ مىزاجىنى تەڭشەش بىلەن يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى، مالىخۇلىيا كىسالىنى داۋالىغۇچى تەدبىرلەر قىلىنىدۇ.

يۈرەك قېپىغا سۇ يىغىلىش

يۈرەكنى ئوراپ تۇرغۇچى غىلاپ ئىچىگە سۇ يىغىلىدۇ. شۇنىڭ تەسىرى يۈرەككە يەتكەندە، يۈرەك بۇ غەيرى تەبىئى ئەھۋالدىن زەرەرلىنىپ، تىترەپ (ئىختە - لاجلىق) ھەركەت قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بەزىلەر بۇنى تىترەشنىڭ بىر خىلى دەپ ئاتايدۇ.

ئالامەتلىرى: خاپقاندىكى ئالامەتلىرىدىن باشقا، كېسەل يۈرەك ئەتراپىدا قانداقتۇر بىر ئېغىرلىق ياكى يۇرۇڭى چوڭۇپ كېتىپ بارغاندەك ھىس قىلىنىدۇ، نەپەس سىقىلىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سۇيۇقلۇقنى تارقىتىش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا ياكى ئايارەج لۇغازىيا (16 - 87 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ، قىزىل گۈل، سۈمبۈل، زەپەر، ياد - رەنجىيۇيا، قەلەمپۇر، سەئىدى كۆپىلەرنى سوقۇپ، تۇخۇم سېرىغى بىلەن يۈرەك ئەتراپىغا قويۇش لازىم.

VI ماقالا. ئەمچەك كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل. سۇت چىقىرىشنىڭ بۇزۇلۇشى

سۇتنىڭ كېمىيىشى

بالا ئېمىشۋاتقان ئاياللاردا سۇتنىڭ ئازىيىپ كېتىشى ئاساسەن قان ئازلىق سەۋىيىدىن بولىدۇ. چۈنكى سۇت قاندىن ھاسىل بولىدۇ. قاننىڭ ئازىيىپ كېمىيىشى ئۈچۈن تۈۋەندىكىلەر سەۋەپچى بولىدۇ:

(1) ھەددىدىن ئارتۇق قان ئېلىش ياكى ھېچ بىلەن قان كۆپ مېگىپ كېتىش.

(2) ئوزۇقلۇشنىڭ ناچار بولۇشى — ئىشتەينىڭ كەملىكى، تاماقنىڭ مىقدارى ئاز ۋە سۈپەت جەھەتتىن ناچار بولۇشى، مەئدە جىگەر قاتارلىق ھەزىم ئەزالىرىدىكى قۇۋۋەتنىڭ سۇيى بولۇشى قاتارلىق ئەھۋاللار بىلەن قاننىڭ يېتەرلىك مىقداردا ھاسىل بولماسلىقى.

(3) روھى ھالەت ۋە ئەسەبى تەسىراتلاردا مەسىلەن غەم، قورقۇنۇچ ۋە روھى زەربە قاتارلىقلار قاننىڭ ھاسىل بولۇشىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ.

(4) ئومۇمىي يەدەن مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشلىرى سۈت -

نىڭ يىتەرلىك مىقداردا پەيدا بولۇشىغا توسقۇنلۇق قىلىپ
لىمىدۇ.

ئالامەتلىرى يۇقۇرىدىكى سەۋەپلەردىن بىرىنىڭ
مەۋجۇت بولۇشى بىلەن ئەمچەكتىكى سۇت مىقدارىنىڭ
ئاز بولۇشىدىن ئىبارەتتۇر.

داۋاسى: سەۋەبىنى يوقىتىش بىلەن سەۋەبىنى
قايتا ھاسىل بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. قان
كوپەيتكۈچى تاماقلار بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش كېسەلچە
قىلىنىدۇ. بەزىدە يۇقۇرىدىكىنىڭ ئەكسىچە قان كۆپ
تۇرۇقلۇقمۇ سۇت ئازىيىپ كېتىدۇ. بەدەندە ھىچقانداق
بۇزۇلۇش ئەھۋالى بولمىغان ھالدا قاندىن سۇتنىڭ ئاي-
رىلىپ چىقىشى توسقۇنلۇققا ئۇچرىشىمۇ مۇمكىن.

ئالامەتلىرى: ئومۇمى بەدەندە قان ئارتۇقلۇق
بەلگىلىرى بولغىنى ھالدا سۇت كېمىيىپ كېتىدۇ. روھى
جەھەتتە غەمگىنلىك، بالىسىغا مېھرى بولماسلىق ھاللار
بولىدۇ.

داۋاسى: سۇتنى كوپەتكۈچى دورىلارنى بېرىش، قان-
نى بۇزىدىغان نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش كېرەك. مىڭگە
قۇۋۋەت بەرگۈچى دورىلار قوشۇمچە بېرىلىدۇ.

خىمىيەلەر سەۋەبىدىن سۇتنىڭ ئازىيىشى

خىمىيەلەر سەۋەبىدىن بولغان سۇت ئازلىق، ئاساسەن
قاننىڭ بۇزۇلۇشى (چۈنكى بۇزۇق قاندىن سۇت ھاسىل بول-
مايدۇ) ۋە سەپرا، سېۋدا ياكى بەلغەمنىڭ كۆپلىگەندىن پەيدا

بولىدۇ. بەزىدە ماددىلار ئارىلاشمىغان ھالدا مىزاجنىڭ بۆزۈلۈشى بىلەنمۇ پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: (1) سۈت، سۇيۇق، رەڭگى سېرىققا مايىل، سۈت يوللىرىدا ئېچىشى قاتارلىق بەلگىلەر كۆرۈلسە سەپرانىڭ غالىپلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

(2) سۈتنىڭ رەڭگى ئاق، سۈدەك سۇيۇق، چۈچەك-خەل تەملىك بولۇپ قانداقتۇ غەيرى پۇراق (بەلغەمدەك) بولسا بۇ بەلغەمدىن پەيدا بولغان سۈت ئازلىغىدۇر.

(3) سۈت قويۇق، مىقدارى ناھايىتى ئاز، كۆك رەڭلىك بولۇپ، ئەمچەكتىن تامىغاندا خۇددى قىيامدەك سۈزۈلۈپ چۈشە، بۇ سەۋدانىڭ ئالامىتى.

داۋاسى: خىلىتلارنى ئېنىقلاش بۇ خىل سۈت ئازلىغىنى داۋالاشتا مۇھىم ئەھمىيەتكە ئىگە. ئوتكەنكى ماقالىلاردا كۆرسىتىپ ئۆتكەن چارىلار بۇيىچە خىلىتلارنى بەدەندىن چىقىرىش تەدبىرلىرىنى قىلىش بىلەن، شۇ خىلىتلارغا قارشى ھالدا ئۇزۇقلاندۇرۇش لازىم. مەسىلەن، سەپرادىن بولغان سۈت ئازلىقتا: ئارىيا سۈيى، ئەينۇلا مۇرەبباسى، ئانار، لىمون شەرىۋىتى ۋە گۆش شورپىسى قاتارلىقلار بېرىلىدۇ.

بەلغەمدىن بولغان سۈت ئازلىقتا: سەۋزە ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيانلار چاي ئورنىدا بېرىلىدۇ. شورپىغا زىرە، پىننە ۋە ئارىيا بېدىيان سېلىپ بېرىش لازىم. كېيىنكى بۇغداي ئۇنى بىلەن ھەسەلدە كۈنجۈت يېغى ۋە ئازراق

شۈمشە (شەنگەدۇزا) سېلىپ ھالۋا تەييارلاپ بېرىش كېرەك.

سەۋدادىن بولغان سۈت ئازلىقتا: بۇغداي ئۇندۇر-
مىسى، ئاقلانغان نوخۇت، ئارپا، ئەنجۈر ۋە بادام بىر-
لىدۇ. ھەم سۈتلۈك قوينىڭ يىلىنى پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ.
ئەمما سۈت بەك قۇيۇق بولۇپ، ئەمچەكتىن چى-
قىش تەس بولسا، يىنەپشە، ئاق لەيلى ۋە ئارپا
قاتارلىقلارنى لازىم مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيىنى
ئىچىشكە ۋە قاينىتقان نەرسىلەرنى سۈزۈپ ئەمچەك
ئۈستىگە قويۇشقا بېرىلىدۇ.

ماددىلار ئارىلاشمىغان ھالدا مىزاجنىڭ يۈزۈلىشى
بىلەن سۈتنىڭ كېمىمىپ كېتىشى، ئاساسەن ئايال مىزا-
جىنىڭ ئىسسىق ياكى سوغاقلغى بىلەن پەيدا بولۇپ،
يەدەندە بۇلارغا خاس ئالامەتلەر بولىدۇ. مەسىلەن،
ئىسسىق بولغىنىدا - چىرايى قىزىل، تەشئالىق زىيادە
بولىدۇ، سوغاققا بولسا - چىرايى ئاقارغان، كۆكۈش رەڭ-
دە، قول - پۇتلىرى سوغاق بولىدۇ. بۇنداق ھاللاردا مىزا-
جىنى ئۆزگەرتىش بىلەن يىمەك - ئىچمەكنى تەرتىپكە سېلىش
لازىم. دورىلاردىن قان كۆپەيتىدىغان تۈردى سەپىد ۋە
تۈردى سۇرۇخ، كۆكنار ئۇرۇغىنى بېرىش لازىم. سۈتلۈك
قوي، ئۆچكە يىللىلىرىنى پىشۇرۇپ بېرىش ۋە سۈيۈق
نەرسىلەرنى، مېۋىلەرنى كۆپرەك بېرىش كېرەك. كۆكتات -

لاردىن يالەكنىڭ مەنىيەتەتى چوڭ، ئۇندىن باشقا تۈۋەندە تەجرىبىدىن ئۆتكەن بىرقانچە نۇسخىلار كۆرسىتىلدى. تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك.

(1) 1 مىقدار كۈنجۈتنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان ھالىغا كەلگەندىن كېيىن 3 ھەسسە ئۇزۇم شەرۋىتىگە ئارىلاشتۇرۇپ، بىردەم تازا مېچىپ، ماتادىن ئۆتكۈزۈپ سىقىپ سۈيىنى ئىچىشكە ۋە قالدۇق تىرىپلىرىنى ئەم-جەككە قويۇشقا بېرىلىدۇ.

(2) سەۋزە، پىياز، چامغۇر، لوپۇ ئۇرۇغى، سېرىق چىچەك، ئارپا بېدىيانلاردىن باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۈم-شاق سوقۇپ، ئۇلارنى ئومۇمى ئېغىرلىقى بىلەن باراۋەر ئوخۇتنى قورۇپ، سوقۇپ، ئارىلاشتۇرۇپ ھەركۈنى 5 مىس-قالدىن كالا سۈتىگە قوشۇپ ئىچىلىدۇ. بۇ ناھايىتى تېزلا سۈتنى كۆپەيتىدۇ.

سۈتنىڭ ھەددىدىن ئارتۇق كۆپىيىپ كېتىشى

سۈت مىقدارى ئۆز ئىتىدالىدىن كۆپىيىپ كېتىشى سالامەتلىك جەھەتتىن زەرەرلىك، چۈنكى يەدەن سۈس-لىشىدۇ. سۈتنىڭ كۆپ بولۇشى قاننىڭ ئورۇنسز سەرىپ-ياتىنى ئاشۇرۇپ قان ئازلىق پەيدا قىلىدۇ. ئەمچەكتىكى زىيادە سۈت ئايالغا قانداقتۇر بىر خاتىرجەمسىزلىكنى كەلتۈرۈپ قويۇش بىلەن سۈتنىڭ سۈيىتى ئۆزگىرىدۇ. يەنە قو-يۇقلىشىدۇ ياكى تەمى يۇزىلىدۇ. بۇ بالغا زەرەر كەلتۈرىدۇ.

ئارتۇق سۈتنىڭ ئەمچەكتە تۇرۇپ قېلىشى، ئەمچەك چەكنىڭ ھارارىتىنى ئاشۇرۇپ، ئۇنىڭ تەبىئى ھالىتىنى ئۆزگەرتىدۇ. يەنى قاتتىقلىشىدۇ ۋە ئېغىر ھاللاردا - ياللۇغلىنىش كېلىپ چىقىدۇ. دېمەك سۈتنىڭ مىقدارى بەك كۆپ بولۇشىنى ئۆز ۋاقتىدا داۋالاش ئانا ۋە بالىنىڭ سالامەتلىكىگە مۇناسىۋەتلىك ئىش بولۇپ، ئۇنىڭ سە- ۋىبى سۈت كېمىيىپ قېلىشنىڭ ئەكسىدۇر. قان كۆپەيتى- كۈچى تاماقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش بىلەن سۈت بەك كۆپ بولسا، بۇنداقتا دورا قىلىش ھاجەتسىز. بەلكى تاماقنى تەرتىپكە سالسا بولىدۇ. باشقا سەۋەپلەر- دىن بولغاندا سىركە بىلەن ماشىنى پىشۇرۇپ بېرىش، مە- دەستان، لوكنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ تاسقاپ گۈل يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئەمچەك ئۈستىگە قويۇش؛ سۈتنى ۋاقتى- ۋاقتىدا سېغىپ تۇرۇش كېرەك.

2- پەسىل: ئەمچەك ياللۇغى (ۋەرەمى پەستان)

ئەمچەك ياللۇغى باشقا ئەزالاردىكى ياللۇغلىنىشلارغا ئوخشاش سەۋەپلەردىن پەيدا بولۇش بىلەن بىللە، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللاردا سۈتنىڭ تۇرۇپ قېلىشى سەۋەپ بولىدۇ. مەسىلەن، مىزاجنىڭ بەك ئىسسىقلىغى سەۋەپلىك سۈتنىڭ نەملىكى تۈگەپ قويۇقلىشىپ قالىدۇ، شۇنداقلا سوغاق مىزاج سۈتنى ئۇيىتىدۇ. ياكى بوۋاق ئەمچەكنى ياخشى شورالماي، سۈت ئەمچەكتە تۇرۇپ قالىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئەمچەك چىڭقىلىپ قاتتىقلىشىپ قا-
لىدۇ. ئەمچەكنىڭ ئوزى ۋە پۈتۈن بىدەن قىزىيدۇ.
كوكى قاتتىق ئاغرىدۇ.

داۋاسى: يەڭگىل ھاللاردا ئەمچەككە ئىسسىق ئوت-
كۈزۈش لازىم. ئىت ئۇزۇسىنى يوپۇرمىقى بىلەن بىللە
سوقۇپ، گۈل يېغى ئارىلاشتۇرۇپ ئەمچەككە قويۇش كې-
رەك. ياللۇغلىنىش ئېغىر بولسا، قىزىق سۈنى ئىلمان
قىلىپ ئەمچەك ئۈستىگە قويۇش، بىنەپشە يېغى بىلەن
ياغلاش لازىم. ئەمچەك قىزارغان ۋە قاتتىقلاشقان بولسا،
سىركە بىلەن قايناقسۇنى ئارىلاشتۇرۇپ كالىنىڭ دوۋ-
ساق قېپىغا قاچىلاپ ئەمچەك ئۈستىگە قويۇش لازىم.
ئارپا ۋە پۇرچاق ئۈنىنى مۇغاس، تۇخۇم سېرىقى، ھول
يۇمىلاقسۇت سۈيى، سېمىز ئوت سۈيىنى بىرلەشتۈرۈپ،
ئەمچەككە چېپىلىدۇ. ئىستىما بىر ئاز پەسلىگەندىن كې-
يىن — زىغىر، بابۇنە، ئەكىلىملىك، كۈنجۈتلەرنى بارا-
ۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ گۈل يېغى، ئېرىگەن
ئاق موم بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ماي ھالىغا كەلتۈرۈپ،
ئەمچەككە سۈرتىلىدۇ. ئەگەر بۇ نەتىجە بەرمىسە، ئاق
لەيلى ئۇرۇغى، ھەمشىۋا ئۇرۇغى، زىغىرلەرنىڭ شىرىسىنى
چىقىرىپ چېپىش لازىم.

ئەگەر ياللۇغلىنىش سوغاقتىن بولسا — يەنى قىزىش،
قىزىرىش بولماي، ئىسسىغاندەك بولۇپ قاتتىق تۇرسا، ئاق
موم، گۈلىسۈسەن يېغى ۋە قۇستە ياغلىرىنى قوشۇپ

ياغلاش كېرەك. ياكى شۇمىشە ئۇرۇغىنى بۇمىشاق سوقۇپ ئىلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سىركە بىلەن يۇغۇرۇپ، ئەمچەك ئۈستىگە چېپىلىدۇ. سۈتى كۆپ بولغان ئاياللار دائىم سۈتمىنى سېغىپ تۇرۇشقا دىققەت قىلىش لازىم. ياللۇغلىنىش ئۇفۇنەت ھاسىل قىلىپ يىرىڭلايدۇ ھەتتا يىرىڭ خالىتىلىرىنى ھاسىل قىلىدۇ. بۇ چاغدا ئەمچەكنىڭ ئىشىقى تېخىمۇ چوڭىيىپ كېتىدۇ ۋە ئىچىگە يىرىڭ زەرداپ سۈيى يىغىلىنىدۇ. بۇ "رۇنبۇل" دەپ ئاتىلىپ ئەمچەك كېسەللىكلىرى ئىچىدە خەتەرلىك مەركەزۇر. **داۋاسى:** زىغىر، كۈنجۈت، سۈسەن يىلتىزى، قوي، كالا، ئۆچكىنىڭ مىڭسى، كەپتەر مايىغى، نەترون، راتىنەج-لەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ كالا يېغى، كۈن-جۈت يېغى بىلەن ياغلاپ، ئەمچەك ئۈستىگە چېپىلىدۇ. ئەگەر بۇنىڭ بىلەن ھەل بولمىسا دەستكارە (ئوپېراتسىيە قىلىپ) يىرىڭنى چىقىرىش كېرەك. نەشتە ئىزى جاراھەت-لەنسە ئېغىز، تىل جاراھەتلىرى بايانىدا كۆرسىتىلگەن نەدىرلەر قىلىنىدۇ. چۈنكى ئەمچەك، تىل ۋە ئېغىز ئىچىگە ئوخشاش نازۇك ئەزا. بەزىبىر جەرراھلار ① تەج-رىبىسىزلىكتىن نەشتەرنى يىرىڭ خالىتىسىغا قەدەر سالماي، خالتا ساقلىنىپ قالسا، يەنە يىرىڭ پەيدا قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن نەشتەرنى چوڭقۇرراق سېلىش كېرەك.

① جەرراھ: تاشقى كېسەل دوختۇرى.

ئەمچەك كېسەللىكلىرى ئىچىدە يەنە "بەز ئەمچەك" يەنى ئەمچەكنىڭ قېتىپ قورۇلۇپ قېلىشى ياكى ھەددىدىن يوغان بولۇپ كېتىش قاتارلىق غەيرى تەبىئى ھاللارمۇ ئۇچرايدۇ. بەز ئەمچەكتە بىندەپشە يېغى، ئاق موم، تۇخۇم سېرىغى، سۇ مايلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ (ئېرىتىپ، قىزىتىپ) كالا ئوتى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چېپىش لازىم. ئەمچەك بەك چوڭىيىپ كەتكەندە سېغىز (ياكى ساپال)، ئاقاقىيا قەلەي كۈشتىسىنى باراۋەردىن ئېلىپ، مىڭدىۋانە (بەزۇ - دۈلبەنجى) يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى بىلەن يۇغۇرۇپ ئەمچەك ئۈستىگە قويۇلىدۇ.

VII ماقالا. مەيدە كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: مەيدەنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشلۇق كېسەللىكلىرى

(1) خاس ئىسسىقلىقتىن مەيدە مىزاجىنىڭ

بۇزۇلۇشى

مەيدەنىڭ بۇزۇلۇشى بەدەندىكى مۇھىم ئىزالار مەسىلەن: جىگەر، مىڭە، يۈرەك قاتارلىقلارنىڭ پائالىيىتىگە زور تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن مەيدە ئاغرىقلىرىدا نى ياخشى تونۇپ توغرا بىر تەرەپ قىلىش لازىم. سەۋەبى: ئىسسىق تاماقلار (تەبىئىي ئىسسىق بولسا ھان يىمەكلىكلەر) نى كۆپ ئىستىمال قىلىش ۋە ئىسسىقلىق دورا - دەرمانلارنى كۆپ يېمىش، ھاراقنى كۆپ ئىچىش قاتارلىق دائىملىق ئادەتلەر سەۋەب بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئېغىز ئىچى قۇرۇق بولۇپ، ئۇسۇپ تۇرىدۇ، ئىشتەي بولمايدۇ، ئاچچىق كىيىرىدۇ. ئۇچار قاناتلار گۆشىنى يىسە، چاي دورىلارنى ئىچسە مەيدىسى بۇزۇلىدۇ. ئىسسىق شارائىتىدا ئىش قىلىشۇمۇ مەيدىسى بۇزۇلۇپ تۇرىدۇ. ئەمما قوناق، ئارپا قاتارلىقلارنى يىسە ئاسان سىڭىدۇ.

داۋاسى: مەۋە سۇلىرى بېرىلىدۇ. ئالما شەرۋىتى،
ئانار شەرۋىتى، لىمون، گىلاس سۇلىرىنى بېرىش لازىم.
كالا گۆشىگە ئاچچىق سۇ، يۇمىلاقسۇت قوشۇپ بېرىش
پايدىلىق. ھەزىم قىلىشى بەك ناچار بولسا، ئىسكەنجىمىن
سەپەرچىلى (بىمە ئىسكەنجىۋىلى) (88 - نۇسخە)، زىرەشكى
شەرۋىتى (89 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھارارەت بولسا قېتىق
سۇزمىسى بېرىش كېرەك. مەيدە قۇۋۋىتى زەئىپ بولسا
جىۋارش تەمىرى ھىندى (90 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

سەپرا ئېشىپ كېتەشتىن بولغان مەيدە بۇزۇلىشى

سەپرا قاندىسى سەۋىبى بىلەن مەيدە مىزاجىنىڭ
بۇزۇلىشىدىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئېغىز ئاچچىق بولىدۇ، كوگۇل ئاي-
نىدۇ، بەزىدە قۇسىدۇ، قۇسۇق، ئارقا تەرەت ۋە سۇيدۈكتە
سەپرا قاندىسى (سېرىق ئاچچىق سۇيۇقلۇق) كۆپلەپ
چىقىدۇ. تاماقنى كېيىن ئاچچىق ياكى سېسىق كىكىرىك
چىقىدۇ. كىكىرىش بىلەن ئېغىزدىن سېسىپ قالغان
بېلىق پۇرىشى كېلىدۇ. مۇنداق كىشىلەر يالماق مېغىزى
يەپ سالىسا دەرھال سېسىق كىكىرىدۇ. ئەگەر ئىسسىقلىق
يۇقۇرى بولۇپ كەتسە ئېغىز مىس تەملىك بولۇپ قالىدۇ.
ئىشتەي تۇتۇلىدۇ، تاماق سىڭىش دەسلەپتە ياخشى
بولۇپ، بارغانسېرى ناچارلىشىدۇ. مەيدە بوش بولغاندا
ئېغىزدىكى شولىگەي كۆپىيىدۇ، تاماق يىيىش بىلەن
بۇ ھال توختاپ قالىدۇ.

ئەگەر مەيدە يەڭگىل بولۇپ، كوڭۇل ئاينىش مەيدە كويگەندەك ئىچىشىش، تەشەنالىق بولسا بۇ ماددىنىڭ بەك سۇيۇقلىقىنى كورسىتىدۇ. ماددا زىيادە بولسا كوڭۇل ئاينىش ئېغىر بولىدۇ. ماددا ئاز بولسا، تاماق يىگەندىن كېيىن كوڭۇل ئاينىدۇ. ماددا ئاشقازان تېگىدە بولۇپ مەيدە تىۋىتلىرى ئۇنى ئۆزىگە سىڭدۇرۇپ ئالمىغان بولسا، تاماق يەپ بىرەر سائەت ئۆتمىگىچە كوڭۇل ئاينىش بولمايدۇ، ئەگەر ماددىنى سىڭدۇرۇپ ئالغان بولسا قۇسۇش ياكى كوڭۇل ئاينىش داۋاملىق بولۇپ تۇرىدۇ. ئەمما قۇسۇق ياكى باشقا چىقىندىلىرىدا سەپرا بولمايدۇ. قالغان ئالامەتلىرى بولۇپ تۇرىدۇ. قۇسۇق قاتارلىق چىقىندىلىرىدا سەپرانىڭ ئەسەرى بولسا قۇسۇپ تۇرۇپ كوڭۇل ئاينىش پەسەيمىسە. بۇ مەيدە تىۋىتلىرى ماددىنىڭ بىر قىسمىنى شىمىرىپ، بىر قىسمىنى شىمىرمىگەنلىكىدۇر. قۇرۇق كوڭۇل ئاينىش بىلەن قۇسۇش ئالمىشىپ تۇرسا، بۇ ماددىنىڭ مەيدە ئىچىگە باشقا ئەزالاردىن كېلىپ قۇيۇلۇشىنىڭ ئالامىتىدۇر.

كوڭۇل ئاينىش بىلەن قۇسۇش بىللە كەلسە، ماددا مەيدىنىڭ ئۆزىدە پەيدا بولغانلىق ئالامىتىدۇر. تەشەنالىقنىڭ كويلىكى ماددىنىڭ ئىسسىقلىقىدىن ياكى ئۇ شورغا ئايلانغانلىقتىن دېرەك بېرىدۇ. تەشەنالىق سوغاق سۇ ئىچىش بىلەن پەسەيمە، بۇ ماددىنىڭ ئىسسىقلىقىنىڭ قايناقسۇ ئىچىش بىلەن پەس بولسا، ماددا شورلىغىنىڭ

بەلگۈسىدۇر. مەيدە مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىغىنى بىلىش ئۈچۈن مۇنۇ سىناقنىڭ ئەھمىيىتى بار: كېسەلگە ئاريا نېنى بېرىلگەندە سېسىق كىكىرىش بولسا، بۇ مەيدە مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىغىنىڭ ئالامىتى ھساپلىنىدۇ.

داۋاسى: مەيدىنىڭ بۇ خىلدىكى ئاغرىقلىرىنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن يۇقۇرقى سوزلەنگەن ئالامەتلەر ئاساسىدا ماددىنىڭ مەيدىنىڭ ئۆزىدە ھاسىل بولۇۋاتقاندا، لىغى ياكى باشقا ئەزالاردىن كېلىۋاتقانلىغىنى ئايرىش كېرەك. شۇنداق قىلغاندىلا داۋالاش نەتىجىلىك بولىدۇ. ئەگەر ماددىنىڭ مەيدىدە پەيدا بولغانلىغى مەلۇم بولسا قەي قىلدۇرۇش ياكى سۈرگە بېرىش بىلەن تازىلاش؛ قايسى چارە كېسەلگە ئېغىر كەلمەسە شۇنى قىلىش لازىم. تازىلاشتىن كېيىن مەيدىنىڭ مىزاجىغا قاراپ قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلارنى بېرىش كېرەك. قەي قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئىسكەنجىۋىل بىلەن ئىلمان سۈنى كوپرەك ئىچىرىش كىپايە قىلىدۇ. قالغان تەدبىرلەر قۇرۇق ھو بايانىدا تەپسىلى سۆزلەندى.

بەزى ئاغرىقلاردا مەيدە بوش قالغان ۋاقىتلاردا ماددا سىڭىدۇ. مۇنداق كىشىلەر تاماق يېيىش ۋاقتىدىن ئوتتۇپ كەتسە چىداپ تۇرالمىدۇ. ھەتتا بەزىلەر ئۇزاق-راق ئاچ قالسا ھۇشىدىن كېتىپ قالىدۇ. بۇ خىلدىكى ئاغرىقلارغا ئەتىگەندە — ئانار شەرۋىتى، لىمون شەرۋىتى، زىرىخ شەرۋىتىدىن بىرىنى بېرىش لازىم ھەم قوسىغى

ئېچىش ئالدىدىلا بىر نەرسە يەۋىلىشنى تەكىتلىشى لازىم. يەنە بەزىبىر ئاغرىقلار تاماقنى يېپ بولغاندىن كېيىن قەي قىلىمسا تاقىت قىلالمايدۇ. بۇنداقلارغا قەي قىلىپ بول-
 خاندىن كېيىن يۇقۇرقى شەرۋەتلەردىن بىرى بېرىلە
 بولىدۇ. ئەگەر ماددىنى مەيدە تەۋىتلىرى سىڭدۇرۇپ ئال-
 ھان بولسا، ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە)نى تازىلاش
 ئۈچۈن بېرىش لازىم. خاس سەبەرنى بېرىش ئايارەجدىن
 ئەۋزەلرەك، ئىسكەنجىۋىل بىلەن بەرگەندە تېخىمۇ
 ياخشى. ئاغرىقنىڭ ئىشتىيى ناچار بولۇپ، ھو كۈچلۈك
 بولسا، ئايارەجنىڭ تەركىۋىدىكى زەپەر ئورنىغا قىزىل
 گۈل سېلىش لازىم. ماددىنىڭ سەۋىيىدىن ئىسكەنلىكى
 ئېنىق بولغان ھالدا چالغۇنى تەكلىپ قىلغان شەرۋىتى
 ئەپسەنتىن (91 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئەگەر 2 دانە ئارپا
 مىقداردىكى سوقمونيانى سوقۇپ قېتىق ياكى دوغ بىلەن
 تازا تەمىنى چىقىرىپ بېرىلسە، بۇ خىلدىكى مەيدە
 ئاغرىقلىرىغا مەنپەئەتى ياخشى. مەيدىنى ماددىدىن تازىلاش
 ئۈچۈن، ئەڭ ياخشى ئۇسۇل - قېتىققا بىرئاز شېكەر ئارد-
 لاشتۇرۇپ بېرىپ ئارقىدىن 25 مىسقال ئىسكەنجىۋىلنى
 سۇ قوشماستىن ئىچكۈزۈپ ئىككى سائەتكىچە سۇ ئىچ-
 مەسلىكىنى بۇيرۇش كېرەك.

سەپرانىڭ جىگەردىن كەلگەنلىكى مەلۇم بولسا،
 (بەدەندە سەپرانىڭ غالىپلىقى كورۇلسە) ئاغرىقنىڭ ئو-
 مۇمى ئەھۋالىغا قاراپ ئىمكانىيەت يار بەرسە باسلىق

تومۇرىدىن قان ئېلىش لازىم. قان ئالغاندىن كېيىن سۈزمە ئاستىغا ئېقىپ چۈشكەن قېتىقنىڭ سۈزۈك سۈيى (مائۇل جېىن)نى بېرىش لازىم ياكى شەرۋىتى تەپسەندە- تىن (91- 181- نۇسخە) بېرىلىدۇ.

مەيدىنىڭ ماددىسىز ھول ئىسسىق ۋە قۇرۇق

ئىسسىقتىن بۇزۇلۇشى

ئالامەتلىرى: (1) قۇرۇق ئىسسىقتىن بولسا - تەشئالىق قاتتىق. تىل قۇرۇق ۋە بەدەنلىرى ئورۇق كېلىدۇ، قەۋزىيەت بولىدۇ. بۇ خىلدىكىلەرنى داۋالاش ئاساسەن مەيدىنىڭ مىزاجىنى سوۋۇتۇپ، ھوللۇك يەتكۈ- زۇشتىن ئىبارەت بولۇشى كېرەك. مەسىلەن، كالا سۈتى، ئارپا سۈيى، ئارپا تالقىنىغا بادام يېغى، شېكەر قوشۇپ بېرىلىدۇ. مەيدە قىسمىغا ئاق سەندەل، ئالما يوپۇرماقلى- رىنى سوقۇپ قويۇش كېرەك.

(2) ھول ئىسسىقتىن بولسا - يىگەن تاماقلارنى مەيدىگە كىرگەندىن كېيىن دائىم بۇزۇلۇپ، ئېغىزدىن شولگەي ئېقىپ، سېسىق كېكىرىپ تۇرىدۇ. مەيدىدىن بۇس - بۇخاراتلار تىنىگە ئورلىيدۇ. داۋاسى ئىتتىرىپىل كەبىر (1- نۇسخە) بېرىلىدۇ.

مەيدىنىڭ سەۋدا ۋە قۇرۇق سوغاقتىن بۇزۇلۇشى

ئالامەتلىرى: ئىشتەي ياخشى بولسىمۇ، تاماقنىڭ ھەزىم بولۇشى ناچارلىشىدۇ. مەيدە تاماقتىن كېيىن دائىم ئېلىغاندەك سېزىلىپ، قوساق كوپۇپ تۇرىدۇ. مەيدە

ئېچىشىدۇ؛ بەزىدە قەي قىلغاندا قۇسۇق شۇنداق چۈچۈك -
مەل بولىدۇكى، ئاغرىغىنىڭ چىشلىرى قاماپ قالىدۇ. ئال
چوڭىيدۇ.

داۋاسى: مەيدىنى سەۋدا ماددىسىدىن تازىلاش
ئۈچۈن، ئالدى بىلەن مەتمۇنى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە)
بۇيرۇش. ھول ئىسسىق تاماق ۋە چاي دورىلىرىنى
بېرىش لازىم. توخۇ ئورپىغا ئوقۇت سېلىپ بېرىش
كېرەك. بۇ خىلدىكى مەيدە كېسىلىدە قەي قىلدۇرۇش
پايدىسىز، چۈنكى سەۋدا ماددىسى قويۇق بولغانلىقتىن
مەيدىنىڭ تېگىگە ئۆلتۈرۈۋېتىپ قەي بىلەن چىقمايدۇ.
ھول سوغاقتىن بولسا، ئېغىزدىن شولگەي كوپ
كېلىدۇ. تاماق مەيدىدە ئۇزۇن تۇرمايلا ئۈچەيگە ئۆتۈپ
كېتىدۇ. چوڭ تەرەت دائىم يۇمشاق كېلىدۇ. ھوللۇك
يېمەكلىكلەردىن قاچىدۇ. قۇرۇق تاماقلار ياخشى مەنپەئەت
قىلىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن مەيدە مىزاجىنى ئۆزگەر -
تىش ئۈچۈن ئىتتىرىپىل سەغىر بېرىلىدۇ. كېيىن جەۋارش
ئۇد 1، II، جەۋارش كۈمۈنى، مەجۇنى، پىلاپى قاتارلىق -
لاردىن بىرىنى تاللاپ بېرىلسە بولىدۇ (49 - 83 - 92 -
93 - نۇسخىلار). بۇ نۇسخىلەرمۇ شۇ ماۋزۇلاردىكى مەيدە
بۇزۇلۇشىنىڭ كۆپچىلىگىگە ناھايىتى ئۈنۈملۈكتۇر.

2 - پەسىل: مەيدە ئاغرىشى (ۋە جىلمە ئىدە)

مەيدىنىڭ ئاغرىشى، مەيدىنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشلۇق زەرەرلىنىشلىرى بىلەنمۇ پەيدا بولىدۇ. بۇ ھەقتە 1 - يەسىلدە سۆزلەپ ئوتتۇرىدى. تىۋەندە مەيدىنىڭ مەيدىدىكى ياللۇشلىنىش (ۋەرم) ۋە جاراھەتلەر سەۋىيىدىن، يەل سەۋىيىدىن، يىمەكلىكلەرنىڭ سۈپىتى ۋە مەيدە ئىسەپ (نېرۋا) لىرى سەۋەپلىك ئاغرىشىنى سۆزلەپ ئوتتۇرىمىز. مەيدە ياللۇغى ۋە جاراھەتلىرىدىكى ئاغرىش كېسەللەك ئالاھىتى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئالاھىدە يەسىلدە سۆزلىنىدۇ.

مەيدىنىڭ يەلدىن ئاغرىشى

مەيدە ئىچىدە قويۇق يەل كۆپ بولغاندا يەل مەيدە ئىچىگە سىغماي، زەئىپ مەيدە پەردىلىرىدە تار - تىشىش، قورۇلۇش تەھۋالى كېلىپ چىقىپ مەيدە ئاغرىدۇ. ئالامەتلىرى: كۆپ كىكىرىدۇ. بەزىدە ھىق تۇتىدۇ، قوساق كىرگىت گۆشلىرى تارتىشىشقا باشلايدۇ. تاماقتىن كېيىن چېپ تەرەپ قوساق تال ئەتراپىنى تۇتۇپ كۆر - گەندە قولغا يەلسەك ھەرىكىتى (غولدىرلاش) سېزىلىدۇ. ئاغرىش كۆپىنچە چېپ تەرەپتىن باشلىنىدۇ.

داۋاسى: كىيەك، تېرىق، قوناق، تۈزلەرنىڭ

ئوزۇنى يالغۇز ياكى ھەممىنى بىرلەشتۈرۈپ قىزىتىپ ئىسسىق ھالدا مەيدە ئۈستىگە قويۇلىدۇ. يېمىش ئۈچۈن جەۋارىش كۆمۈنى بېرىلىدۇ (49 - نۇسخە). كوندۇر، زىرە، پىتىمە قاتارلىقلارنى دائىم ئېغىزغا سېلىپ چايناش

ۋە سۈيىنى يۇتۇش لازىم. لاپىندانى گولاپ بىلەن قاينىتىپ بېرىلىدۇ. بەلغەم ماددىسىنى تازىلىغاندىن كېيىن ھەزىمى ياكىنىلايدىغان دورىلار بېرىلسە ياخشى نەتىجە بېرىدۇ.

ئەبۇ ئەلى ئىبنىسىنا ئۆز تەجرىبىسىدە بۇ خىل مەيدە ئاغرىغىنى كىندىكىنىڭ ئۆڭ - سول تەرىپىدە ھىجا - مەت قويۇش بىلەن داۋالىغاندا دەرھال ئاغرىق پەسەيگەن. ئىسكەنجىۋىلىنى بىر ئاز قىزىتىپ بېرىلسە، ئاغرىقنى تېزلا توختىتىدۇ. مەيدە ئۈستىگە سىرتتىن ئىسسىق ياغاچلاردىن - مەستىكى يېغى، دارچىن يېغى، قۇست يېغىدىن بىرىنى سۈركەش لازىم. ئەگەر مەيدە يەل بىلەن ئولغان بولسا ھوققە ئارقىلىق تازىلىغاندىن كېيىن ھەببى شەكەبىنەچ (94 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھوللۇك يىمەگەنلىكلەرنى ئاز بېرىش، غىزاسىغا دارچىن، زىرە، سامساق قوشۇپ بېرىش كېرەك.

بەزىدە ئاغرىشنىڭ سەۋىيى شۇر بەلغەم دۆلەتلىكى ئۈچۈن، سوغاق نەرسىلەرنى بەرگەندە، ئاغرىش پەسەيىش كورىلىدۇ. بۇ چاغدا ماددا ئىسسىق ئىكەن دەپ خاتا گۇمان تۇغۇلىدۇ. ياكى ئىسسىق نەرسىلەرنى بېرىش بىلەن ئاغرىق پەسەيىپ، ماددىنىڭ سوغاقلىغىغا گۇمان تۇغۇلىدۇ. مۇنداق ۋاقىتلاردا ئەتراپلىق قىلىپ دورا بەلگىلەش لازىم.

تامماقتىن كېيىنلا ئاغرىش بولسا، قەيى قىلىش ياخشى. ئەگەر ئاغرىش تامماقنى كۆپ يىمىش بىلەن

مۇناسىۋەتلىك بولسا بىرقانچە كۈن تاماق مىقدارىنى ئاز-ئازدىن بىرقانچە ۋاقىت بېرىش لازىم. بۇ خىلدىكى ئاغرىقلارغا تاماق بەرگەندە مەيدىنىڭ مىزاج ئىھۋالىغا قاراپ تەللىلەش ناھايىتى مۇھىم. مەيدىنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش ئۈچۈن جەۋارىش جالىنىۇس، نۇشدارى (3-8-نۇسخە) بېرىلىدۇ. يۇرچاق جىنىسلىق دانلار (ماش، لۇبىيا، سېرىق پۇرچاق)، يەللىك چاي (قارا چاي)لار مەيدە ئىچىدە يەل پەيدا قىلىدۇ. بەك ھوللۇك نەرسىلەر مەسەلمەن، ئالما، قوغۇن، تاۋۇز، قېتىق، ئارپا ئېنىمۇ زەرەر قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

ناچار يېمەكلىكلەر سەۋەپلىك مەيدە ئاغرىشى

سۈپەت جەھەتتە مۇۋاپىق بولمىغان (قاتتىق، خام ۋە بۇزۇلغان) تاماقلارنى يېمىش بىلەنمۇ مەيدە ئاغرىيدۇ. ياكى مەيدىنىڭ ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتى ئاجىز بولۇشى بىلەن بۇ خىلدىكى تاماقلار مەيدىنى تېخىمۇ زەرەرلەپ ئاغرىشىنى پەيدا قىلىدۇ. مەيدىنىڭ ئاغرىقى ئاساسەن يەلنىڭ پەيدا بولۇشى ۋە مەيدە پەردىلىرىنىڭ تارتىش-ۋېلىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر.

ئالامەتلىرى: يۇقۇرقى سەۋەپلىرىنىڭ مەۋجۇت

بولۇشى بىلەن بىللە مەيدە ئۇستۇنكى قىسمى ئاغرىيدۇ. بولۇپمۇ تاماقتىن كېيىن مەيدىنى قىمىرلىتىپ ئاغرىتىدۇ.

داۋاسى: تاماق مەيدىنىڭ يۇقۇرقى قىسمىدا

بولسا قەي بىلەن، تىۋەندە بولسا سۈرگە بىلەن
چىقىرىش لازىم. ئۇندىن كېيىن مەيدىنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش
ۋە ماددىدىن تازىلاش ئۈچۈن، قۇرسى كۆكەپ، قۇرسى
ئەپسەنتىن (95 - 96 - نۇسخىلەر) بېرىلىدۇ.

مەيدە ئەسەپلەرنىڭ قوزغۇلىشىدىن مەيدە ئاغرىش
سەۋدانىڭ مەيدىگە چۈشۈشى، سوغاق سۇ ئىچىش
ياكى روھى قوزغۇلىشلار (يەم، ئىندىشە، ئەسەپلى خەۋەر،
روھى زەربىلەر) تۈپەيلىدىن مەيدە ئاغرىقى تۇتۇش.
ئالامەتلىرى: سەردا مىزاجلىق كىشىلەردە كۆپرەك
ئۇچرايدۇ. بىرەر روھى ئامىل ياكى ئۆتكۈر تەسىر قىل-
غۇچى يېمەكلىك سەۋىيىسى بىلەن تۇيۇقسىز مەيدە ئاغرىپ
كېتىدۇ. بۇ ھال بەزىدە ئۇتقاقلىق شەكىلىنى ئالىدۇ.
بەزىلەردە مالىخۇلىيا ئالامەتلىرى بىللە كېلىدۇ. بەزىلەردە
ئەتمەكەندە ئاشتىدىن ئىلگىرى مەيدە بوش چاغدا ئاغرىيدۇ.
مەئدە يەل بىلەن تولغان بولۇپ، كىكىرىش بىلەن ئاغ-
رىق يەڭگىللىشىدۇ. بەدەندە سەپىرانىڭ غالىپلىقى كۆرىد-
لىدۇ.

داۋاسى: ئالدىنقىسىغا كۆكتار شەرۋىتى بېرىلىدۇ.
كالا - پاقالچەك بېرىلىدۇ. كېيىنكىسىگە ماددىنى تازىلە-
غاندىن كېيىن جەۋارىش جالىنۇس، قۇرسى ئەنسۇنلەردىن
بېرىلىدۇ (3 - 95 - نۇسخىلەر). ئەگەر تىۋىپ ھوقنە
قىلىشنى مۇۋاپىق كۆرسە ھوقنە قىلىش مۇۋاپىق بولىدۇ.

3 - پەسىل: ھەزىم كېسەللىكلىرى

تاماق سىڭىشنىڭ بۇزۇلۇشى

تاماق سىڭىشنىڭ بۇزۇلۇشى — ھەزىمنىڭ ئاجىزلىقى (زەمپى ھەزىم). ھەزىمنىڭ ئاجىزلىقى (سۇتلىق ھەزىم) ھەزىمنىڭ پۈتۈنلەي بۇزۇلۇشى (توخۇمە)لەردىن ئىبارەت بولۇپ، سەۋىبى بىردۇر. سەۋەبچى ئامىل ئاجىز بولسا ھەزىمنىڭ ئاجىزلىقى، ئوتتۇرىچە بولسا ھەزىم ئاجىزلىقىنى، كۈچلۈك بولسا، ھەزىمنىڭ پۈتۈنلەي بۇزۇلۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بۇلار ئىچىدە يامانراقى ھەزىمنىڭ پۈتۈنلەي بۇزۇلۇشىدۇر.

ھەزىمنىڭ ئاجىزلىقىدا: تاماق ماددىلىرى مەئدە ئىچىدە ئۇزۇن تۇرۇپ قالىدۇ. ئاغرىق مەئدەسىدە ئېغىرلىق ۋە چىڭقىلىش ھەس قىلىدۇ. كىكرەگەندە شۇ چاغدا يىگەن تاماقنىڭ پۇرىقى كېلىدۇ.

ھەزىم ئاجىزلاشقاندا، تاماقنىڭ بىر قىسمى سىڭىپ بىر قىسمى سىڭمەيدۇ. ھو (كوگۇل ئاينىش)، مەيدە ئاغرىش بىلەن چوڭ تەرەت كۆپلىگى ئاۋارە قىلىدۇ. كىكرەگەندە سېسىق لاۋىدەك پۇراپ ئاغرىق ئۈزى سەسكىنىدۇ. ئوزۇق لۇقلار بەدەنگە تارقالمىدۇ. تارقالغاندىمۇ بەدەن ئېھتىياجىنىڭ ھوددىسىدىن چىقالمايدۇ. نەتىجىدە سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقا)، قان ئازلىققا ئوخشاش بىر قاتار كېسەللىكلەرنىڭ پەيدا بولۇشىغا سەۋەپ بولىدۇ.

ھەزىمىنىڭ پۈتۈنلەي بۇزۇلۇشىدا بولسا ئاساسىي پۈتۈنلەي سىڭمەيدۇ ياكى تۈۋەنگە چۈشمەيدۇ، يا يېنىپ كەتمەيدۇ. بۇزۇق ماددا ساسىل بولۇپ قەي قىلىشقا ياكى ئىچ سۈرۈشكە ئېلىپ بارىدۇ. ئاغرىق كىشى بەك يادرام بولىدۇ ھەمدە يۇقۇرىدا سۆزلەنگەن كېسەللىكلەرگە دۇچار قىلىدۇ.

سەۋىيى: ھەزىم قىلىش بۇزۇلۇشلارنىڭ سەۋىيى ئاساسەن مەيدە مىزاجىنىڭ ماددىسىز بۇزۇلۇشى ياكى خىلىتلار (بۇزۇق خىلىتلار) نىڭ مەيدە ئۆزىدە پەيدا بولىشى ھەم باشقا مۇناسىۋەتلىك ئەزالاردىن كېلىپ چۈشۈشىدىن ئىبارەت. ماددىسىز (سازمى) ۋە ماددىلىق بولغانىنى پەرق قىلىش داۋالاش ئۈچۈن ناھايىتى زورۇر. ماددىسىز بولغانىدا تاماقتىن كېيىن ئاغرىق مەيدىسىدە ئېغىرلىق ھېس قىلىنىدۇ، قەي بىلەن چىقىرىۋېتىپ قۇتۇلىدۇ. ئېغىر ئەھۋالدىكىلەرنى داۋالاش تەبىئىي. ماددىلىق بولغانى بۇنىڭ ئەكسىچە بولۇپ، تاماقتىن كېيىن مەيدە ئېغىرلىشىدۇ، قۇسۇق بىلەن بۇزۇق خىلىتلار چىقىدۇ. يەڭگىل غىزالارنىلا يىيەلەيدۇ.

مەيدىنىڭ كۈچى تارتىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋىتى جا-زىيە)، تۇتۇش قۇۋۋىتى (قۇۋۋىتى ماسكە)، ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋىتى ھازىمە)، چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتى (قۇۋۋىتى داپىئە) دېگەندەك قۇۋۋەتلەردىن تەركىپ تاپىدۇ. ئۇلارنىڭ قايسى بىرى زەرەرلەنسە مەيدىدە يۇقۇرقىدەك بۇزۇلۇشلار كېلىپ چىقىدۇ. مەسىلەن، تارتىش قۇۋۋىتى

تەسىرگە ئۇچرىسا ھەزىمنىڭ ئاجىزلىقى، تۇتۇش قۇۋۋىتى ئاجىز بولسا، ھەزىمنىڭ ئاچارلىقى پەيدا بولىدۇ. ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتى بىلەن چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتى بۇ-زۇلسا، ھەزىمنىڭ پۈتۈنلەي بۇزۇلىشى كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: جەۋارىش ئۇد، ئىترىپىل كەبىر ياكى ئىترىپىل سەغىر (93 - 1 - 5) بېرىلىدۇ. ئىچىشكە بىيە ئىسكەنجىۋىلى (ئىسكەنجىبىن سەپەر جىلى) بېرىپ، توخۇ تاشلىغىنىڭ ئىچكى سېرىق پەردىسىنى ئاجرىتىپ قۇرۇتقاندىن كېيىن، سوقۇپ خۇشپۇراق شەرۋەتلەر بىلەن بىللە قوشۇپ بېرىلىدۇ (مەسىلەن، ئالار، بىھى شەرۋەتلىرى)، سۇنبۇل، سەئدە كويى، ئىزخىر، مەستىكىلەرنى سوقۇپ، بىر ئاز نارجىل يېغى بىلەن ياغلاپ سىرتتىن مەيدە ئۈستىگە قويۇلىدۇ. غىزاسى ئۈچۈن توخۇ گۆشىگە زەپەر، دارچىن، زىرە، پىننەلەرنى قوشۇپ بېرىش لازىم. قېتىق ۋە ئۇلاي، كەكلىك گۆشلىرى مەيدىنىڭ بۇ خىلدىكى ئاغرىقلىرى ئۈچۈن مەنپەئەتلىك.

ئۆتكەن ماقالىلاردا سوزلەپ ئۆتكىنىمىزدەك مەيدىنىڭ بۇزۇلىشى بەدەندىكى ئاغرىقلارنىڭ ئانىسىدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەزىم قىلىشنىڭ بۇزۇلىشىنى كوڭۇل قويۇپ داۋالاش بىلەن ئۆنىگىدىن ساقلىنىشىمىز ۋە تاماقنى تەرتىپلىك يېمىشىمىز لازىم. ئالدى بىلەن ئاسان سىڭىدىغان تاماقنى، كېيىن تەسەرەك سىڭىدىغانلىرىنى يېمىش كېرەك. توق قوساققا تاماق يېمەسلىك، قوساقنى ئاچۇرۇپ يېمىشنى ئادەت قىلىش، تاماقنى بەك تويۇپ كەتكەندەك يېمەسلىك

لازم. تاماقنىڭ ئارقىسىدىنلا دورا يېمەسلىك كېرەك. چۈنكى بەزى دورىلار تاماقنىڭ ھەزىم بولىشىغا تەسىر بېرىشى مۇمكىن. غىزادىن كېيىن بىر ئاز يەڭگىل ھەر-كەت قىلىش ھەزىم ئۈچۈن پايدىلىق. مەيدە ئىچىدە تاماقنىڭ بۇزۇلغىنى سېزىلسە ياكى غەيرى ھىسلار تۇيۇلسا دەرھال قۇسۇش ئۈچۈن چارە قىلىش لازىم. مەيدىنى تازىلاشنىڭ ئوبدان ئۇسۇلى قەي قىلىشتۇر. ئەگەر قەي قىلىش كېچىكىپ قالغان ياكى ئوڭايىمىز بولسا گۈلگەن. جەۋارش، تەمرى ھىندى، جەۋارش شەھرى بارانلارنى بېرىش يېتەرلىك. بەزىلەر جەۋارش سەپەرچىلى بېرىشنى توغرا كۆرىدۇ (90 - 97 - 98 - نۆسخىلار).

تارتىش قۇۋۋىتىنى كۈچەيتىش ئۈچۈن ئالما، لىمون، سەندەل شەۋەتلىرى، دارچىن، زەپەر، زىرىلەر بىلەن پىشۇرۇلغان توخۇ گۆشلىرى ياخشى. تۇتۇش قۇۋۋىتىنى سوغاقلىققا مايىل قۇرۇق نەرسىلەر كۈچەيتىدۇ؛ ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتىگە مۆتىدىل، ھول ۋە ئىسسىق نەرسىلەر مەدەت بېرىدۇ؛ چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتىنى سوغاقلىققا مايىل ھوللۇك نەرسىلەر كۈچەيتىدۇ.

ئىشتەي تۇتۇلۇش

ئىشتەي (ئىشتەھا) نىڭ تۇتۇلۇشى يېنىك بولغاندا ئىشتەينىڭ كەم بولىشى، ئېغىر بولغاندا پۇتۇنلەي ئىشتەي تۇتۇلۇش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. ئۇلار سەۋەبچى ئامىلنىڭ كۈچلۈك، ئاجىزلىقىغا قاراپ پەرقلىنىدۇ.

ئالامەتلىرى ۋە داۋالاش:

(1) مەيدە ئاغزىنىڭ مىزاج ئۆزگىرىشلىرىدىن بولغان ئىشتەي تۇتۇلۇش: بۇنىڭدا مەيدىنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشلۇق كېسەللىرىدە كورۇلگەن ئالامەتلەر يولۇشتىن تاشقىرى، ئىشتەيمۇ تۇتۇلۇپ قالىدۇ.

داۋالاشتا — ئىسسىقتىن مىزاج بۇزۇلغاندا سوغاقلىق دورىلار بىلەن؛ سوغاقتىن مىزاج بۇزۇلغاندا ئىسسىقلىق دورىلار بىلەن داۋالاش ياخشى ئۈنۈم بېرىدۇ. سامباق، پىشە قاتارلىقلارنى كوپىرەك ئىستىمال قىلىش، قوناق ئۈنىنى قىزىتىپ مەيدىگە تېگىپ بېرىش كېرەك.

(2) خىلىتلارنىڭ كوپىيىپ كېتىشىدىن بولغان ئىشتەي تۇتۇلۇش: بۇ خىل ئىھۋال سەپرادىن ياكى شور خىلىتلاردىن بولسا، مەيدە ئېچىشىپ ئاغرىش، قۇسۇش بىلەن بىللە ئىشتەي تۇتۇلۇش قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇنداقتا ئالدى بىلەن مەيدىنى خىلىتتىن تازىلاش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن قەي قىلدۇرۇش ياكى سەپرا سۈرگىسى بېرىلىدۇ؛ ئەگەر قويۇق بەلغەمدىن بولسا ئاغرىش، ئېچىشىش بولمايدۇ، بەلكى كوكۇل دېيىنىش، قىساق كويۇش ئىھۋاللىرى بولۇپ، كىكىرىسە يېسىكلەيدۇ. ئۇنى داۋالاشتا ئالدى بىلەن ماددىنى بوشىتىش ئۈچۈن قىچا، زاغۇن، بىخ كەبىر ۋە رۇمبىدىيەلارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ سۈيىگە بىرگەز ھەسەل بىلەن تۈز قوشۇپ ئېچىشكە بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن ماددىنى چىقىرىش ئۈچۈن، سېرىق چىچەك

ئۇرۇغى، تۇرۇپ ئۇرۇغى، چۈچۈكنى يا بىلىنمىلىرىنى قايتىپ
تېپىپ سۈيىگە بىر ئاز ھىندى تۇزى ۋە سىركە قوشۇپ
بېرىلسە قەي قىلىدۇ. ئەگەر قەي قىلىش مۇمكىن بولمىسا
سۈرگە دورىسى (مىزاج بۇزۇلۇشلۇق مەيدە كېسەللىكلەردە
كورسىتىلگەن) ۋە مەيدىنى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى مۇناسىپ
دورىلارنى بېرىش لازىم.

(3) خام خىلىتلارنىڭ بەدەندە كۆپىيىشىدىن ئىشتەي
تۇتۇلۇش: بۇ بەلغەمنىڭ خام بولۇشى بىلەن كۆپىرەك
مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئەمگەك قىلماي دائىم دەم ئېلىپ
ياتقانلاردا ئىشتەينىڭ تۇتۇلۇشى كۆرىلىدۇ. بۇنداقلا
تاماقنى ئاز - ئازدىن يېيىش ۋە مۇنچىغا كىرىپ تۇرۇش،
مۇۋاپىق جىسمانى ھەركەتلەرنى قىلىش ئارقىلىق ئىش-
تىنى ئېچىلىدۇ.

(4) تېرە قوشۇكلىرىنىڭ توسىلىشىدىن ئىشتەي
تۇتۇلۇش: تېرىنىڭ پاسكىنا ۋە كىر بولۇشى ياكى باشقا
سەۋەپلەردىن تېرىنىڭ چىقماستىلىقى بىلەن تەدرىجى
ئىشتەي تۇتۇلۇپ كېتىدۇ. مۇنچىغا كىرىپ تەرىلىنىش،
كۈچلۈك تەنھەركەت قىلىش، بەدەننى مۇجۇش، تەرلەتكۈچى
دورىلارنى قاينىتىپ ھورغا ئولتۇرغۇزۇش قاتارلىق چارە-
لارنى قىلىش، ئىسسىق ياغلار بىلەن بەدەننى ياغلاش
كېرەك.

(5) جىگەر زەئىپلىگىدىن ئىشتەي تۇتۇلۇش: جىگەر
زەئىپلىگى ياكى ئۈچەيدىن جىگەرگە ئوزۇقلۇقلارنى يەت-

كۆزىدىغان چاۋا قانتەمۇرلىرىدا توسىلىش پەيدا بولۇشتىن كېلىپ چىققان ئىشتەيسىزلىكلەردە كوڭۇل غىزا خالى-ماسلىق، كۈندىن - كۈنگە ئورۇقلاش، چوڭ تەرەتتىك رەڭگى ھەرخىل بولۇش قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن جىگەر خىزمىتىنى ياخشىلىغۇچى چارىلار قىلىنىدۇ (جىگەر كېسەللىكلىرىگە قاراڭ).

6) مەيدىگە سەۋدا چۈشۈشنىڭ بۇزۇلىشىدىن بولغان ئىشتەي تۇتۇلۇش؛ تالدا توسىلىش بولغانلىقتىن ئىشتەينى قوزغاش ئۈچۈن كېرەك بولغان سەۋدا مەيدىگە كەلمەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن مۇنداق كىشىلەر "قېسۇغۇم ئاچمايدۇ" دەپ زارلىنىدۇ، تال چوڭىيىدۇ. بۇ خىلدىكىلەرگە ئىسكەنجىسىن بۇزۇرى (100 - نۇسخە) بېرىلىدۇ، مۇمكىن بولسا قەي قىلىشنى تەۋسىيە قىلىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن تۇرۇپ ئۇرۇغى، زاغۇن، سېزىق چىچەك ئۇرۇقلىرىنى ھەسەل قوشقان سىركە سۈيى بىلەن بىللە بېرىلسە قەي قىلىدۇ. تالنىڭ چوڭىيىشىغا چارە قىلىنىدۇ (تال كېسەللىكلىرىگە قاراڭ).

7) مەيدە ئەسەپلىرى سەۋىيىدىن بولغان ئىشتەي تۇتۇلۇش؛ بۇ خىلدىكى ئىشتەي تۇتۇلۇشتا مەيدىنىڭ خىزمىتى بارغانسېرى ئاجىزلىشىپ كەتكەنلىكى سېزىلىدۇ. ئىشتەي تۇتۇلۇش بىلەن بىللە نېرۋا ئاجىزلىق ئالا-مەتلىرى، مالىخۇلىيا قاتارلىق روھى ئىزىلەڭگۈلۈك ئالا-مەتلىرى كۆرۈلىدۇ. بۇنى ئايرىش ئۈچۈن ئاغرىققا چۈ-چىمەل نەرسىلەر بېرىلىدۇ. ئەگەر ئىشتەي ئېچىلسا سەپرا-

دىن بولغىنى، ئەگەر ئىچىلمىسا مېڭىدە كېسەللىك
لىغىنى (زەئىپلىك بارلىقى) كۆرسىتىدۇ. بۇنداقلارغا مېڭىنى
قۇۋۋەتلىنىدۇرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ (مىڭە كېسەللىكلەرگە
قاراڭ).

يەپ تويىماسلىق كېسىلى (شەھۋىتى كەلىپ)

”شەھۋىتى كەلىپ“ دىگەن ئەرەبچە ئىت ئىشتىيى
دىگەنلىكتۇر. بۇنداق كېسەلگە دۇچار بولغان ئادەم ھەر
قانچە كۆپ تاماق يېسىمۇ تويمايدۇ. ھەتتا يەيدىغان
مەرسىلەر ئالدىدا تۇرسۇمۇ كىشىلەر بىلەن تالىشىپ ماجرا
قىلىدۇ.

سەۋەبى: (1) سوغاق ۋە قاتۇرغۇچى ماددىلار مەيد-
دىنىڭ مىزاجىنى بۇزۇشى — تەشۋالىقنىڭ بولماسلىقى
مەيدىنىڭ كويۇپ تۇرۇشى بىلەن يۇقۇرقى ئالامەتلەر يۈز
بېرىدۇ. بۇنداقلارنى داۋالاشتا مەيدىنى قىزىتىشنى ئاساس
قىلىش كېرەك. مەسىلەن، جوۋىنە، زىرە، رۇمبىدىيان،
مەستىكىلەرنى ئېغىزدا چاپىناپ تۇرۇپ سۈيىنى يۇتۇش
ھەم مەيدىگە سىرتتىن سۈمبۇل قايناتقان سۇغا جويۇز
سۇرۇپ چېپىش لازىم. جاۋارش جالىنۇس (3 - نۇسخە)
بېرىلىدۇ.

(2) بەلغەم ئارىلاشقان سوغاقلق: ئېغىزدىن شولىگەي
كۆپ چىقىدۇ. بۇنداقلارغا ئالدى بىلەن ھەببى قوقيا
(17 - نۇسخە) يا ھەببى ئايارەنج (7 - نۇسخە)دىن
كېيىن كۆرسىتىلگەن چارە قىلىنىدۇ.

(3) مەيدىگە سەۋدانىڭ كۆپ قۇيۇلىشى: مەيدە بوشىغاندا قاتتىق ئېچىش مەيدە ئېغىزىدا كويۇشۇش ئالامىتى بولۇپ، تاماق يېيىش بىلەن پەسىيىدۇ. بۇ خىلدىكىلەرگە مەتبۇخى ئىپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىپ تال ئۈستىگە ھىجامەت قويۇلىدۇ. چۈچمەل نەرسىلەردىن ساقلىنىش بىلەن قوي، كالىنىڭ بورەك ياكى چاۋا يېغىنى يېيىش كېرەك. مەجۇناتلاردىن جەۋارشى نارمىشكى (99 - نۇسخە) يامەجۇنى خۇسۇلەتتە (100 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(4) مەيدىگە بەلغەم قۇيۇلىشى: كۆپىنچە نەزلىدىن كېيىن نازە، ماددىسى مىڭدىن مەيدىنىڭ ئېغىزىغا قويۇلىدۇ. چۈچمەل كىكىرىك چىقىدۇ ۋە ئاغرىشتىن بۇرۇن زۇكام بىلەن ئاغزىغانلىق تارىخى بولىدۇ. ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا ياكى ھەببى سەبرە (4 - 16 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. غىزاسىغا دارچىن، پىلىپىل، سوتتەر، زىرە سېلىپ توخۇ شورپىسى بېرىلىدۇ.

(5) ئۈچەيدە مەدە قۇرۇتلارنىڭ بولۇشى: ئارقا تەرەتتىن مەدە چۈشىدۇ، يەپ تويمايدۇ. مۇنداق ھال-لاردا مەدەنى يوقىتىش بىلەن جاۋارشى نارمىشكى (100 - نۇسخە) بېرىش كېرەك.

كالا ئىشتەي (جۈنلەپقەر)

“جۈنلەپقەر” كالا ئىشتىسى دېگەنلىك بولۇپ، تىبابەتتە بولسا، پۈتۈن بەدەن ئوزۇقلۇققا مۇھتاج بولۇپ تۇرۇشلۇق كوڭۇل تاماق تارتماسلىق — قوساق ئاچماسلىق

ۋە تاماق خالىماسلىققا ئىيتىلىدۇ. سەۋىيىسى "يەپ تويماسلىق" كېسەلى بىلەن بىر خىل بولۇپ، سەۋەپ يەڭگىل بولسا يەپ تويماسلىق، ئېغىر بولسا "كالا ئىشتىيىسى" كېلىپ چىقىدۇ.

سەۋىيىسى: بۇ كېسەل قاتتىق سوغاقتا سەپەر قىلغۇچىلاردا، بولۇپمۇ ئاچ يۈرۈپ سەپەر قىلغۇچىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. بۇرۇن ئۇزۇن ۋاقىت ئاچ قالغانلارمۇ بۇ كېسەلگە دۇچار بولۇپ قالىدۇ. سەۋەپلىرىگە قاراپ تو-ۋەندىكى 3 قىسىمغا بۆلىنىدۇ.

(1) قاتتىق سوغاقتىن مەيدىگە تەسىر قىلىشى بىلەن مەيدىنىڭ ھىس قىلغۇچى ئەسەپلىرىنىڭ قوزغىلىشى ۋە جازىبە قۇۋۋەتلىرى يوقىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: بەدەن ئورۇقلاش، كۈندىن - كۈنگە ئەھۋالى ناچارلىشىش، تاماق يېمەسلىك قاتارلىق ھاللار بولۇپ، مەيدىنى تۇتۇپ كۆرگەندە مۇزدەك سوغاق سېزىلىدۇ. كېسەللىك ئۇزارغانسېرى ئاغرىق ئايلىنىپ كېتىدۇ ھەم بولۇپ قالىدۇ.

(2) قوينۇق بۇزۇق بەلغەم مەيدىگە چۈشۈشى بىلەن مەيدە ئېغىزىنى تۈسۈۋالىدۇ. ئاغرىق كىشى قۇسىدۇ. قۇسقان نەرسىنى قويۇق شىلىملىق ئارىلاش يولۇپ غىزانى كۆرسە ئىختىيارسىز سەيكىتىدۇ.

(3) سەپىرا ياكى سۇيۇق بەلغەمنىڭ مەيدە ئېغىزىدىكى تۈتلىەرگە سېڭىپ كېتىشى بىلەن مەيدە مىزاجىنى يوقىتىدۇ. ئىستىرخا (ئاچىرلىشىش) سەۋەپلىك قۇۋۋەتنى

جازىبە يوقىلىدۇ. مەيدە بۇزۇلۇش ئالامەتلىرى بىلەن كېلىدۇ.

داۋاسى: بىرىنچى خىل سەۋەبتىن بولغىنىدا ئەگەر ھۇشسىزلىق بولسا، ئالدى بىلەن ئايلىنىپ كېتىش پە- سىلدە سوزلەنگەن چارىلار بىلەن ھۇشقا كەلتۈرىلىدۇ. مەسىلەن، يۈزىگە سوغاق سۇ سېپىش، خۇشپۇراق نەرسە- لەرنى كويدۇرۇپ پۇرۇتۇش، پىشانە ۋە قۇلاق ئارقىسىدىكى تۈكلىرىنى يۇلۇش كېرەك. ھۇشقا كەلگەندىن كېيىن گازىپ ۋىتن، قىزىل گۈل ۋە بىدىمىشكى ئەرەقلىرىگە نان چىلاپ بېرىش، ئالما شەرىۋىتىنى سۇ بىلەن ياكى نان بىلەن يېمىشكە بېرىش لازىم. ئۇندىن باشقا مىكپان چۈجە گەشى، ئوخۇت، زىرە، داچىن ئودەندىلار قوشۇپ پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ. مەيدىنىڭ مىزاجىنى ئۆزگەرتىش ئۇخۇن، تەر- ياقى مەئدە، جەۋارشى بۇزۇرى (102 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. (2 ۋە 3) خىل سەۋەپلەر بولغىنىدا ماددىنى تازىلاپ چىقىرىش بىلەن مەئدە قۇۋۋەتلىنىدۇرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. چۈنكى ماددىنى تازىلىماستىن تۇرۇپ قۇۋۋەت- لەندۈرۈش چارىلىرىنى كىرگۈزۈش نەتىجە بەرمەيدۇ.

ئاچماقتىن ئايلىنىپ كېتىش (جۈنئەلغەش)

بۇ كېسەل بىلەن تاغرىغان كىشى قىزىقى ئاچ- قاندا غىزا كېچىكىپ قالسىمۇ ھۇشىدىن كېتىدۇ. **سەۋەبى:** مەيدە ئېغىز قىسمىنىڭ زەئىپلىگىدىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: ئادەتتىكى چاغلاردا تەشئالىق زىيادە بولۇپ، دائىم قەۋزىيەت بولىدۇ. ئاچ قالسا ئايلىنىپ كېتىدۇ.

داۋاسى: ھۆشىز ھالەتتە بولسا ئايلىنىپ كېتىش بابىدا سوزلەنگەن چارىلار قىلىنىدۇ. ئالما، ئانار شەر-ۋىتى (47 - 48 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. تاماقنى ئوز ۋاقتىدا يېيىش لازىم. ئەگەر بۇ كېسەل ئۇزۇن داۋام قىلسا سەرئىگە ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن. بېرىلىدىغان دورىلار تەسىر جەھەتتە تېز بولۇشى كېرەك.

غەلىتى نەرسىلەرنى يېمىشكە مايلىق (فاسادشەھۋەت)
ئاغرىق كىشىلەر ئادەتتە يېمەيدىغان نەرسىلەرگە ئامراق بولۇپ قالىدۇ. مەسىلەن، سېغىز توپا، گەژ، ساپال ۋە قوغۇشۇندەك نەرسىلەر يېمىشكە مايىل بولۇپ قالىدۇ. كوپىنچە ئاياللار ۋە بالىلاردا بولىدۇ.

سەۋىيى: مەدەدە قۇرۇتلارنىڭ بولۇشى؛ خىلىتلار بۇزۇلغان قىسمىنىڭ مەيدىدە توپلىشىپ قېلىشى نەتىجە-سىدە ھاسىل بولىدۇ. مەيدە ئوزىدىكى بۇزۇلغان خىلىت-لارنىڭ ئەكسىدىكى نەرسىلەرنى تەلەپ قىلىدۇ.

داۋاسى: مەدەدە بولسا ئۇلارنى ئېنىقلاپ چۈشۈ-رۈۋېتىش، ئەگەر مۇمكىن بولسا ھەر ئايدا بىر قېتىم ھەسەل سۈيى، سېرىق چىچەك سۈيى، تۇرۇپ سۈيى، تۇز ۋە ئىسكەنجىۋىللىرىنى بىرلەشتۈرۈپ ئىچكۈزۈپ قەي قىل-دۇرۇش ياكى مۇۋاپىق ھالدا سۈرگىلەرنى بېرىش لازىم.

ئەمما ھامىلدار ئاياللاغا بولسا بۇ چارىنى قىلىشقا بولمايدۇ. 3 ئايدىن كېيىن ئوزىچە ساقىيىپ كېتىدۇ. سۈرگە بېرىشتە — چىلان. گارىۋان، سەرىستانى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ چالا سوقۇپ يېتەرلىك سۇ بىلەن قاينىتىپ سۈيىگە پۇنۇس ۋە تەرەنجىۋىلدىن 3 ھەسسە قوشۇپ ئېرىتىپ سۇزۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بۇنىڭدىن كېيىن جەۋا-رىش مۇناسىپ، جەۋارىش مۇقەۋۋى مەئدەلەردىن بىرىنى (102 - 103 - نۇسخە) بېرىش كېرەك. تەجرىبە قىلغان تىۋىپلار ئۇچار قانالىلار گۆشىنى كاۋاپ قىلىپ، سۈڭەكلەرنى چايناپ شۇمۇشكە بېرىلسە مەنپەئەتى كۆپ دەپ كۆرسىتىدۇ.

كۆپ ئۇسساش كېسىلى (ئەتمەش)

كۆپ ئۇسساش كېسىلى ھەقىقىي كۆپ ئۇسساش ۋە ساختا كۆپ ئۇسساش دەپ ئىككىگە بۆلىنىدۇ. ھەقىقىي كۆپ ئۇسساش — ھارارەتنى پەسەيتىش ۋە ھولۇكلەرنىڭ سەرىپىياتىنى تولدۇرۇش ئۈچۈن بەدەن سۇغا مۇھتاج بولىدۇ. مۇنداقتا سۇ، چاي ئىچىش كىپايە قىلىدۇ. ساختا ئۇسساش — مەئىدە شور بەلغەم ياكى سەۋدا يىغىلغانلىقتىن پەيدا بولۇپ، بەدەن مەزكۇر مەددىلەرنى يۇيۇش ئۈچۈن سۇ تەلەپ قىلىپ ئۇسساش كېلىپ چىقىدۇ. ئەمما ھەر-قانچە كۆپ ئۇسسۇلۇق ئىچكەن بىلەنمۇ ئۇسسۇزلۇق پەسەي-مەيدۇ. ماددىلارنىڭ ئالاھىدىلىكىگە قاراپ ئېغىزنىڭ تەمى يۇزۇلىدۇ. بۇ خىلدىكى ئۇسسۇزلۇقنىڭ ئالاھىدىلىكى شۇكى،

ئەگەر چىداپ تۇرسا بىر مەزگىلدىن كېيىن تەشەللىق ئۆزلىكىدىن يوقاپ كېتىدۇ. ئۇخلاپ قالسىمۇ تەشەللىق پەسىيىدۇ.

سەۋەبى: ھەقىقى كۆپ ئۇسساشنىڭ سەۋەبى ھەركەت، ھارارەتلىك شارائىت ياكى شور سۇ، تۈزلۈك تاماقلارنى ئىستىمال قىلىش، ساختا ئۇسساشنىڭ سەۋەبى بولسا - مەئدە، ئۆپكە، جىگەر، تال قاتارلىق ئەزالاردىكى ھارارەتلىك ۋە قۇرۇقلۇق زەرەرلىنىشلەر ۋە بەدەندىكى قەن سېپىش (زىپايىتىس) كېسىلى قاتارلىقلاردىن ئىبارەت.

داۋاسى: ھارارەت بولسا ئۇنىڭ قايىسى ئەزادا ئىكەنلىكىنى بىلىش كېرەك. ئەگەر ئۆپكە، يۈرەك ياكى بۆرەكتە بولسا خۇشەۋى ۋە سوغاق تەبىئەتلىك دورىلاردىن ئاق سەندەل، بىدىمىشك پۇرىتىلىدۇ. مەئدە ۋە جىگەردە بولسا سوغاق شەرۋەتلەر بېرىش لازىم. سوغاق خىلىتلار (بەلغەم، سەۋدا) سەۋەپ بولسا، ئالدى بىلەن ئىكەنجىيىن بىلەن ئىللمان سۇنى كۆپرەك ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇش كېرەك. ئىچىشكە ئارپا بېدىيان سۈيى بېرىلىدۇ. سۈرگە بېرىش مۇۋاپىق كەلسە ھەبى ئاپاراج (7 - نۇسخە) بېرىلسە بولىدۇ. غىزاسغا مىكيان گۆشى، نەقۇت سۈيى، سامساقنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ بېرىلسە بولىدۇ. زىرە، بادام يېغى، شېكەرلەرنى كۆپرەك ئىستىمال قىلىش لازىم. شور بەلغەم سەۋەپچى بولسا ئارپا - بېدىيان سۈيىدىن باشقا ئىسسىقلىق نەرسە بېرىلمەيدۇ.

قاندا ھارارەت بولسا دورىلار بىلەن ئۇسۇزلۇق ئاسان پەسەيىدۇ. شۇڭا مەنى قىلىدىغان ھاللار بولسا قان ئېلىش كېرەك. قاتتىق ئىچ سۈرگەندە بولىدىغان تەشنىلىق ئۈچۈن شەرىۋىتى زىرەشك (89 - نۇسخە) نە سوۋۇتۇلغان قايناقسۇغا تەكشىپ بېرىش بەك ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ. بەزىدە ئەفئەلنى ياكى پەرىيون ئىمىمال قىلغاندىمۇ تەشنىلىق يۈز بېرىدۇ. بۇنىڭغا سۇت ئارپا سۈيى، خاڭكا سۈيى، بىنەپشە يېغى ۋە مەسكە ماي لارنى ئارىلاشتۇرۇپ ياكى ئايرىم بىرىنى بېرىش مۇمكىن قاننى كۆپ ئېلىش ياكى باشقا سەۋەپلەر بىلەن كۆپ قان كېتىش نەتىجىسىدە پەيدا بولغان تەشنىلىقلاردا لىمون ئانار شەرىۋىتى (47 - نۇسخە)، زەنجىۋىل مۇرابباسى قاتارلىقلارنى ئەھۋالغا قاراپ بېرىش لازىم.

4 - پەسىل: ئاشقازان ياللۇغلىرى (ۋە رەمى مەيدە)

ئاشقازان ھۆكەمەك پەردە ياللۇغى (پىلغىمۇنى

مەيدە)

مەيدەنىڭ قان ۋە سەپرادىن بولغان ياللۇغى پىلغە - مۇنى مەيدە دەپ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: مەيدە قاتتىق ئېچىشىپ ئاغرىيدۇ، قىزىتىدۇ، قاتتىق تەشنىلىق، قۇسۇش ۋە بىئاراملىق كېسەلنى ئازاپلايدۇ. ئىشتەي يوقۇلىدۇ. تىل، ئېغىز ئىچى قىزارغان ياكى سېرىقتا مايلىسراق بولىدۇ. قول - پۇتلىرى

سوۋۇپ كېتىدۇ. ياللۇغلىنىش مەنىسىنىڭ پۈتۈن قىسمىدا بولسا، ئەھۋال تېخىمۇ ئېغىر بولىدۇ. ياللۇغلىنىش مەنىسى ئالدىنقى قىسمىدا بولسا، كەڭلىك ئۈستىدە پۈلتىيىپ چىققان ئىشلىق روشەن كۆرىنىدۇ. كېسەل ئوڭدا ياتقاندا تېخىمۇ روشەن كۆرگىلى بولىدۇ. ئارقا تەرەپتە بولسا كۆرۈنمەسلىكى مۇمكىن. ئەمما ئاغرىق ئۆزى مەيدىسىدە چىقىلىش ۋە تۈگۈندەك بىر نەرسە بارلىقىنى ھېس قىلىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر قان ئېلىش مەنىسى قىلىنىدىغان

ئەھۋاللار بولسا، ئارقا تەرەپ ئىككى غول (تاغاق) ئوت-تۈرسىغا ھىجامەت قويۇلۇدۇ. ياكى ۋەزەرنىڭ ئاشقازان ئارقىسىدا ئىكەنلىكى بىلىنسە، ئالدى تەرەپ مەيدە ئۈستىگە (مەيدە بار جايدىن يۇقۇرىراق) ھىجامەت قويۇلىدۇ. ئەگەر ياللۇغلىنىش ئالدىنقى قىسمىدا بولسا، بەلگە (بۆرەك ئۈستىگە) ھىجامەت قويۇش لازىم. ئۇندىن كېيىن ئانارسىقىپ بېرىلىدۇ ۋە نىلۋېر، بىندېشە، كاسىن ۋە كاسىن شىردىسىنى كاشكاپ قىلىپ بېرىش كېرەك. ئاق سەندەل، مامشا، سۇۋادان تېرەك يوپۇرمىغىنى لازىم مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ مەيدىنىڭ ياللۇغلىنىش بار تەرىپىگە قويۇش لازىم. تاماق جەھەتتە ئارپا سۈيى بىلەن چەكلىنىشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ چارىلاردىن 3 كۈن كېيىن، ئارپا ئۇنى، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، قىزىل گۈللەرنى سوقۇپ گۇلاپ ياكى كاسىن سۈيىدە نەم قىلىپ مەيدە ئۈستىگە قويۇلسا مەدەد

نى تارقىتىدۇ. قەۋزىيەت بولسا خىيار شەنەەر، تەمەرى
ھىندى، كاسىن، بىنەپشلىرىنى كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قا -
راپ لازىم مىقداردا قوشۇپ قاينىتىپ بېرىشكە بولىدۇ.
ئەمما رەسمى سۈرگە بېرىش ياكى قەي قىلدۇرۇشقا بولمايدۇ

بەلغەمدىن بولغان ئاشقازان ياللۇغى

(ۋەرەمى مەيدە بەلغەمىيە)

ئالامەتلىرى. ھارارەت ئانچە يۇقۇرى بولمايدۇ.
ئېغىزدىن شولگەي كۆپ كېلىدۇ. ئاغرىش بىر قەدەر يەڭ -
گىل، ئىششىق يۇمشاق بولىدۇ. ئاغرىق مەيدە ساھەسىدە
كۆپكەنلىك ھىس قىلىدۇ. تىل قېلىن ئاق گەز باغلايدۇ،
رەڭگى ئاقۇش (بەزىلەرنىڭ پىكرىچە قوغۇشۇن رەڭلىك)
ئۆزى بوشاڭغۇ بولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن، مائىل ئۇسۇل
(105 - نۇسخە) بېرىلگەندىن كېيىن تەرياقى ئەرەبىئە
ياكى مەسرىدوتۇس (25 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. تاماق مىق -
دارى ئاز - ئازدىن كۈنىگە بىر قانچە قېتىم بېرىلسە
بولىدۇ. بۇ خىلدىكى ئاغرىقلارغا بېرىدىغان غىزا - ئوقۇت
سۈيى، كالىئەك بەسەي، قىزىلچا سېلىپ پۇشۇرۇلغان
مىكىيان شورپىسىدىن ئىبارەت بولۇشى لازىم. تال گۈلى،
سەئدى ھىندى، ئىزخىر ۋە سۈمبۇللارنى سوقۇپ، بىر ئاز
نەم قىلىپ سىرتتىن مەيدە ئۈستىگە چېپىش لازىم. ئە -
گەر سۈمبۇل يېغى بولسا ناھايىتى ياخشى.

سەۋدادىن بولغان ئاشقازان يالۋىقى (ۋەزەمى) مەيدە سەۋداۋىيە

ئالامەتلىرى: ئىششىق قاتتىق بولۇپ نەپەس قىيىنلىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. كىگۈل ئايىنىپ، تەبىئەت دائىم تۇتۇق، ئاغرىقنىڭ رەڭگى روھى قارامتۇل بولۇپ قالىدۇ. ئەسەبى ئالامەت- لەردىن كۆپ پىكىر قىلىش، يامان خىياللارنى قىلىشقا ئوخشاش ئەھۋاللار بولۇپ، ورۇقلايدۇ. كۆز ۋە ئېغىز ئىچى قۇرغاقلىشىدۇ.

داۋاسى: مزاجىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ ماددىنى پۇشۇرۇش چارىلىرىنى قىلىش كېرەك. مەسىلەن، مزاجى ئىسسىق ۋە ھارارەت بولسا، ئارىيابدېيان ۋە چىڭشەي سۈيىگە خىمار شەنبەرنى ئېزىپ، سۇزۇپ ئىچىكىۈزۈلىدۇ. بىر ئاز گۈلچەن بىلەن بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى. بادام يېغىدىنمۇ بىر ئاز قوشۇش كېرەك. ئەگەر ھارارەت بولمىسا ئىنەك پىتى يېغى قوشۇلغان مائىل ئۇسۇل بىلەن ماددىنى پۇشۇرغاندىن كېيىن، تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا بېرىشكە بولىدۇ (16 - نۇسخە). شۇنىڭدىن باشقا قەت قىلىش لازىمكى، ماددىنى پۇشۇرماي تۇرۇپ سۈرگە بېرىش زىيانلىق. تاشقى تەرەپتىن تۈۋەندىكى دورىلار بىلەن ماي تەييارلاپ مەيدە ئۈستىگە سۈركەش لازىم:

شۈمبە، سۈمبۇل، زىغىر، مەنسائىلە، بايۇنە، زاراڭزا مېغىزى، مۇقىل، ئىپسائىتىن. زەپەرلەرنى سەۋەپ كالىك

بەسەي سۇيى، توخۇ يېغى، كالا پاقالچەك ئىلىگى ۋە
كۈنجۈت يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ مەئدە ئۈستىگە
سۈرتىلىدۇ.

ئەگەر ئىششىق ئۇزۇنغا سۇزۇلغان بولسا قۇرىسى
سۈمبۈل بېرىلىدۇ (106 - نۇسخە)، بەزىبىر كېسەللىكلەردە
(ئاشقازان راكىدا) مەئدە چوڭىيىپ، خۇددى مونەك بار -
دەك بىلىنىدۇ. بۇلارنى مەئدە ياللۇغلىنىشلىرى بىلەن
ئارىلاشتۇرۇپ قويماسلىق لازىم.

مەئدەنىڭ يىرىڭلىق جاراھىتى (دۈبەيلىتۈلمەئىدە)

“دۈبەيلىتۈلمەئىدە” مەئدەنىڭ يىرىڭلىق خالىتى
دىگەن مەنادا بولۇپ، ئىسسىق جاراھەتلەر قاتارىدىكى
مەئدەدە ھاسىل بولغان يىرىڭلىق زەرەرلىنىشتىن ئىبارەت.
بۇ “خۇراج” دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: قىزىتما پەيدا بولۇپ، مەئدە ئاغرىپ
ىدۇ، مەئدەنى تۇتۇپ كۆرگەندە ئىششىق ۋە قىزىق بىلەن
ىنىدۇ. يىرىڭ پىشقاندا لوقۇلداپ ئاغرىش پەسىيىپ قالى
دۇ. يىرىڭ خالىتى ئېغىز ئالغاندا تۇيۇقسىز بەدەن
جۇغۇلىداش، تىترەش بىلەن كۆڭلى ئايىنىپ
يىرىڭ ئارىلاش قۇسىدۇ ياكى قوسىغى قاتتىق ئاغرىپ
ئىچ سۈرۈش بىلەن قان - يىرىڭ چىقىدۇ، ئىششىق يانىدۇ.
داۋاسى: يىرىڭ خالىتىنىڭ ئېغىز ئالغانلىقى
مەلۇم بولسا، مەئدەنى يىرىڭ ۋە زەرداپ سۇلاردىن تازى -
لاش ئۈچۈن ھەسەل ياكى شېكەرنى سۇ بىلەن تەڭشەپ

ئىچىشكە بېرىش ياكى كاسىنى سۈيى بىلەن ئايارەك
پەيقارا بېرىش كېرەك. غىزاسىغا ئارپا سۈيى، قاينىتىلغان
كېسەك سۈيى ياكى بۇغداي ئۇمىچى بېرىلىدۇ. جاراھەت
ئورنىنى يېڭى گوش بىلەن تولدۇرۇش ئۈچۈن، كۈندۈر،
ئاتار گۈلى، قىزىل گۈل، كەھرىيا، گەلى ئەرمىنى، خۇن...
ياۋشان قاتارلىقلارنى يېرىگەرەك سوقۇپ يىمىشكە بېرىلىدۇ.
بۇ چارلاردىن كېيىن غىزاسىغا سېرىق چىچەك ۋە
شۈمشە بىلەن پىشۇرۇلغان مىكىيان شورپىسى بېرىلسە
بولىدۇ.

ئاشقازان يارىسى (قۇرۇھى مەئدە)

ئالامەتلىرى: سىرەك، قىچا قاتارلىق ئۆتكۈر نەرسىلەرنى ئىستىمال قىلغاندا مەئدىنىڭ ئاغرىغى كۈچىيىدۇ، كۈڭلى ئاينىپ قۇسىدۇ. قۇسۇق ياكى تەرەتلىرىدە قان بولىدۇ، ئېغىز قۇرۇيدۇ، كىكىرىك كۆپ بولىدۇ. يارا مەئدىنىڭ ئېغىز تەرىپىدە بولسا ئاغرىش كۈرەك. ئىك توش سۈڭەك ئاستىدا سېزىلىدۇ. بەزىدە پىۋت - قوللىرى سوۋۇپ كېتىدۇ. ئېغىز ھاللاردا نەپەس قىيىن - لىشىش ۋە يەھۇشلۇق قاتارلىق ئەھۋاللار يۈز بېرىدۇ. ئەگەر يارا مەئدىنىڭ ئاستىنقى تەرەپلىرىدە بولسا ئاغرىش كىندىك ئۈستىدە بولىدۇ. غىزا سىڭىپ بولغاندىن كېيىن ئاغرىش ئېغىر بولىدۇ. ئەمما مەئدە ئېغىزغا نىسبەتەن ئاغرىش يەڭگىلىرىك. يارا ھەر ئىككىلا جايدا بولسا كۆرسىتىلگەن ئالامەتلىرىنىڭ ھەر ئىككىسى مەۋجۇت بولىدۇ.

ئۈچەي بىلەن مەئدە ئاستىنقى قىسمىدىكى يار -
نىڭ پەرقى شۇكى مەئىدىدىكى يارىنىڭ ئاغرىشى
كىندىك ئۈستىدە سېزىلسە ئۈچەيدىكى يارىنىڭ ئاغرىشى
كىندىكنىڭ تۈۋەنكى تەرىپىدە بولىدۇ.

مەئدە بىلەن قىزىل ئۈگەچتىكى يارىلارنىڭ پەرقى
قىزىل ئۈگەچ يارىسىدا ئاغرىش تاماق يۇتۇش بىلەن
مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ. دائىم ئارقا تەرەپ ئىككى غول
(تاغاق) ئوتتۇرىسى ئاغرىيدۇ.

داۋاسى: يارىنىڭ دەسلەپكى ۋاقىتلىرىدا ئەگەر
مۇۋاپىق كۆرۈلسە قان ئېلىشنى ئويلاپ بېقىش مۇمكىن.
ئۇندىن قالسا مەئىدىنىڭ يىرىڭلىق جاراھەتلىرىدىكى چار-
لار قىلىنسا بولىدۇ. مەئدە يارىلىرىغا قېتىق مەنبەئەتلىك،
يۇنىڭغا بىر ئاز تاباشىر، قىزىل گۈل ۋە قىمقۇنىنىڭ
ئۇرۇغى قوشۇپ بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى.

ئەگەر يارا كونا بولسا ھەسەلتى گۈلەپ بىلەن
بېرىلىدۇ ۋە قۇرسى كەھرىبا (71 - نۇسخە) يېمىشكە
بېرىلىدۇ. مەئدە يارىلىرىنى داۋالاش جەريانىدا ئىچى
قېتىپ قېلىشقا دىققەت قىلىش لازىم. يارا بەك كونا بول-
مىسا ئارىلاپ ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) بېرىشكە
بولىدۇ. ياكى كاستىن شىرىسى بىلەن پۇنۇس، خىيار شەن-
بەر بېرىلگىنى ياخشى. بەزى كېسەللەردە ئىچى سۇرۇپ
كېتىش ئەھۋاللىرى كۆرىلىدۇ. بۇنداقلارغا قۇرسى تاباشىر
(112 - نۇسخە) شەرۋىتى زىرەشكى، بىيە سۈيى بېرىلىدۇ.

ئاشقازان كوپۇش (نەفىخە مەئدە)

ئادەتتە قوساق كوپۇش دەپمۇ ئاتىلىدۇ. سەۋەب جەھەتتىن بۇ 3 كە بولىنىدۇ:

(2) مەئدە مىزاجىنىڭ سوغاقلىق تەرەپتىن بۇزۇلىشى: مەئدىدىكى تەبىئى ھارارەت يەنى ھارارىتى غورىزە تۈۋەنلەپ كېتىپ، غىزانىڭ ھەزىم قىلىنىشى ناچارلىشىدۇ ۋە يەل ھاسىل بولۇپ مەئدىنى كوپتۇرۇپ قويىدۇ.

(1) ناچار تاماق، چالا پىشقان ياكى يەللىك تاماقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش، بولۇپمۇ ھول تەبىئەتلىك نەرسىلەر (شوخلا، چەيزە قاتارلىقلار) مەئدىدە سىڭىش جەريانىدا مەئدىنىڭ زەئىپلىگىدىن يەل پەيدا قىلىدۇ ياكى ئۆزى يەللىك بولغان نەرسىلەر مەسىلەن، ماش، پۇرچاق، ئارپا ۋە قوناقلىرىنى كۆپ ئىستىمال قىلىش بىلەن مەئدىدە يەل پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆرسىتىلگەن سەۋەپلەردىن بىرى بولۇش بىلەن قوساق كوپىدۇ.

داۋاسى: مەئدە مىزاجىنىڭ بۇزۇلىشىدىن بولغان كېسەللىكلەرگە كۆرۈلگەن تەدبىرلەر قىلىنىدۇ، ھەم لاجىن دانىنى گۈلاپتا قاينىتىپ ئىچىشكە بېرىلسە مەنپەئەتتىن ياخشى، دورىلارنى ھەببى تانكار (204 - نۇسخە) نىڭ ئەھمىيىتى ياخشى.

كىكىرىش ۋە ئەمىنەش

كىكىرىش تەبىئى ۋە غەيرى دەپ بۆلۈنىدۇ.

تەبىئى بولغىنى مەئدە ئىچىدە ھەزىم جەريانىدا ھاسىل بولغان يەلنىڭ ئېغىزدىن چىقىش ئاۋازىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇنىڭ بىلەن مەئدەدىكى ئېغىرلىق يېنىكلىشىدۇ. غەيرى تەبىئى بولغىنى مەئدەنىڭ ھەزىمى بۇزۇلۇپ بۇ خاراكتېرنىڭ ھاسىل بولۇشىدىن ئىبارەت بولۇپ، كىكىرىك چىقىپ تۇرسىمۇ مەئدەنىڭ چىڭلىغى يەنىلا بولۇپ تۇرىدۇ. چۈنكى يەل مەئدەدە پەيدا بولغانلىقتىن، يەل يەنە پەيدا بولۇپ تۇرىدۇ.

ئەسەشمۇ غەيرى تەبىئى كىكىرىشكە ئوخشاش، مەئدە ھەزىم قىلالىمىغان تاماقلاردىن ھاسىل بولغان. بۇخارات، يەللەرنىڭ باش تەرەپكە ئورلىشى بىلەن كېلىپ گەدەن گۆشلىرىگە تەسىر قىلىدۇ. بۇ خىلدىكى يەللەرنىڭ ئەسلى تەبىئىتى سوغاق بولغانلىقتىن مەزكۇر گۆشلەردە تارتىشقان ھالەت پەيدا بولىدۇ. بۇ ھال ئېغىزنىڭ كەڭ ئېچىلىشى — ئەسەكتىن ئىبارەت.

داۋاسى: مەئدەنىڭ ھەزىمى ناچارلاشقاندا كۆرسەتىلگەن تەدبىرلەر قىلىنىدۇ. مەئدەنى تازىلاش ۋە ھەزىمەتنى ياخشىلاشقا چارە قىلىنىدۇ. بېدىياننى يۇمشاق سوقۇپ گۈلگەن بىلەن بېرىلىدۇ. جۈۋىنىنى ھەسەل ياكى سىركە بىلەن يېمىشكە بېرىشنىڭ مەنپەئەتى چوڭ. ئەھۋالغا قاراپ ئىپار، مەستىكى، ئەپەنتىن، سۈمبۈل، رۇمبېدىيان، ئىز-خىر، كەرەپشى ئۇرۇغى، سېرىق چىچەك ئۇرۇغى، كۈندۈز، تاغ زېرىسى، پىلىپىل، سامساقلارنى قاينىتىپ، بىر ئاساز شېكەر بېسىپ سۈيىنى بېرىلىدۇ.

قۇسۇش (قەي) ۋە كوڭۇل ئاينىش (غەشىي)

قۇسۇش بىلەن كوڭۇل ئاينىش (ھو تۇتۇش) مەئىدەنىڭ ھەركىتى بولۇپ، ئۇلار ئادەتتە بىللە كېلىدۇ (مەزەب دە. بىللە بولمايدىغان ئەھۋاللارمۇ بولۇپ تۇرىدۇ). بۇلار مەئىدەنىڭ چىقىرىپ تاشلاش پائالىيىتى (ھەركىتى داپەسى) دىن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ خىل پائالىيەت كۈچلۈك بولغاندا ماددە ھەركەتكە كېلىپ (قوزغۇلۇپ) قۇسۇش كېلىپ چىقىدۇ. ئەگەر ھەركەت كۈچسىز بولسا ماددە قوزغالمىي قۇرۇق ھو تۇتىدۇ، نەپەس ئېلىشمۇ تېزلىشىدۇ ۋە بىماراملىق ھىس قىلىنىدۇ.

ئالامەتلىرى ۋە داۋاسى: ماددە مەئىدە ئۆزىدە بول

ھاندا كوڭۇل ئاينىش بىلەن قۇسۇش بىللە كېلىدۇ. ئەگەر باشقا ئەزالاردىن كەلگەن بولسا ھو بولمايدۇ. خىلىت ماددىسى سەپرا بولسا قۇسۇق بىلەن سېرىق سۇ (سەپرا) بىللە كېلىدۇ. بۇنداقتا ئىسكەنجىبىن بىلەن قايناقسۇ بېرىلىدۇ. ئەگەر قۇسۇقتا سەپرا بولمىسا سۈزگىلەردىن ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە)، سېرىق ھېلىلە سۈيى سوقمونييا بىلەن بېرىلىدۇ. ئامىلە، تەمرى ھىندى، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى ۋە تاباشىرلارنى بىللە قوشۇپ ياكى يالغۇزدىن بېرىلىدۇ. ماددىسى تەلغەم بولسا، قۇسۇق بىلەن ئاق بەلغەمدەك شىلىماقلىار چۈشىدۇ. بۇنىڭغا سېرىق چىچەك قايناتقان سۇغا ھەسەل بىلەن تەييارلانغان ئىسكەنجىبىن بېرىلىدۇ. بۇ مەنپەئەت قىلىمىسا،

تۇرۇپ ئۇرغى ۋە قىچا قوشۇپ بېرىلىدۇ. مەئىدىنى قۇۋۋەت
لەندۈرۈش ئۈچۈن، ئۇدى ھىندى، قەلەمپۇر مەستىكى،
پىننەنىڭ ھەر بىرىنى 2 مىسقالدىن ئېلىپ، يۇمشاق
سوقۇپ كۈندە ئىككى قېتىم بىر مىسقىلىغا بىر سەر گۈل
قەن قوشۇپ يىگۈزىلىدۇ، يەنە زەنجىۋىل ياكى ھېلىلە
مۇراپباسى بېرىلىدۇ. سەۋادىن بولغاندا قۇسۇق ئاچچىق
ۋە بەك چۈچمەل تەملىك بولىدۇ. ھەتتا مۇنداق قۇسۇق
لارغا چىۋىنىمۇ قونمايدۇ. بۇنىڭقىمۇ يۇقۇرىدىكى چارىلار
قىلىنىدۇ. جەۋارش ئۇد، جەۋارش مەستىكى، داۋائىلىشىكى
شىرىن (22، 93، 92 - نۇسخە) دىن بىرىنى بېرىش مۇم
كىن. مەئىدە تېگىدىكى بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن توۋەن
دىكى ھەب تەييارلاپ بېرىلىدۇ. ئايارەنج پەيقارا 6 مىس
قال، پىننە، جويۇز، رۇمبىدىيان، جۇۋىنە، قەرەدمانە،
قەلەمپۇر 1 مىسقالدىن، قارا ھېلىلە، سېرىق ھېلىلە،
قۇرسى گۈل، مەستىكى، نەمكى ھىندى 3 مىسقالدىن،
تۇربۇت 7 مىسقال، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ پىننە سۈيى بىلەن قارىمۇچ چوڭلۇغىدا ھەب
قىلىنىدۇ. سايىدا قۇرۇتۇپ شىشە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.

كۈنىگە 1 - $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن بېرىلىدۇ ياكى قۇرسى

ئىلاۋۇس (107 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

ئەگەر ماددا مەئىدىنىڭ ئۆزىدە بولماي بەلكى باشقا
ئىزادىن كەلگەن بولسا، ئانداقتا شۇ ئەزانى ماددىدىن

تازىلاش لازىم. بۇنداق ئەھۋال كەينىچە تەپ (تەپسىلىي) ئاغرىقلىرىدا ئۇچرايدۇ. كىيىمنىڭ تەرەققىيات ئەھۋالىغا قاراپ ساقىيىدۇ ياكى ئېغىرلىشىدۇ. ئۇلارغا شەرتىي نىلۇپەر (75 - نۇسخە) پايدىلىق. كىيىمنىڭ ئەتراپىغا ياكى ئىككى تاغاق ئوتتۇرىسىغا تىلماستىن ھىجامەت قويۇش، پۇت - قۇللارنى مۇجۇپ تۇتۇش ۋە ئۇيۇقا كەلتۈرۈشكە چارە قىلىش لازىم.

قۇسۇش ياكى كوڭلى ئاينىش، بۇزۇلغان تاماقلار - نى يىيىشتىن بولسا قۇستۇرۇش ياكى سۈرگە بېرىش چارەلىرى بىلەن مەئىدىنى تازىلاش كېپايە قىلىدۇ. ئەگەر مەئىدە زەھىپ بولسا كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن مەئىدىنى قۇۋەتلەندۈرگۈچى دورىلاردىن بىرىنى تاللاپ بېرىش لازىم. بەزىدە مەدە قۇرۇتلارمۇ كوڭۇل ئاينىش ۋە قۇسۇشقا سەۋەبچى بولىشى مۇمكىن. بۇنداقلىرىنىڭ چوڭ تەرىتى بىلەن مەدەلىرىنىڭ چىقىشى، قۇسۇش ۋە كوڭۇل ئاينىشلار بىللە كېلىدۇ. بۇ خىلدىكىسى مەدەنى يۇقىتىش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ.

قان قۇسۇش (قەي دەمەۋى)

سەۋەبى: 1) مەئىدە قانتۇمۇرلىرىنىڭ شەكىستلىنىش - شىددىتى كۆپ مىقداردىكى قان (تۇمۇر ئېغىزى ئېچىلىپ قالغانلىقتىن) مەئىدە ئىچىگە تۈپلەشپ قالىدۇ. مەئىدىنىڭ چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتىنىڭ تەسىرى ئاستىدا قۇسۇش يولى بىلەن سىرتقا چىقىرىلىدۇ (مەئىدە تومۇرلىرىنىڭ شەكىستلىنىشى يېقىلىش ياكى سىرتقى زەربە: مەئىدە

ئىچىدىكى يارلارنىڭ ئېچىلىپ قېلىشى؛ تومۇرلاردا تۈ-
تۇش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىشىشى؛ تومۇردا ماددىلارنىڭ
كەيپىيىپ قېلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. (2) تال ياكى
جىگىرنىڭ زەرەرلىشىشى. (3) قىزىل ئۆگىگەچ تومۇرلىرى-
نىڭ يۇقۇرقىدەك سەۋەپلەر بىلەن شەكىللەنىشىدىن
نەپارەتتۇر.

ئالامەتلىرى: كۆرسىتىلگەن سەۋەپلەردىن بىرىنىڭ
بولىشى بىلەن كېسەل كىشى ھەر خىل مىقدارلاردا قان
قۇتىدۇ.

داۋاسى: قان تولۇپ كېتىش سەۋىيىسىدىن قان
قۇتىغاندا كېسەلنىڭ قول-پۇتلىرىنى چىڭ تېگىش ۋە
پاقالچەك قىسمىغا ھىجامەت قويۇش كېرەك. ئىچىشكە نېمە
سۈيىگە بىر ئازدىن زانار گۈلى، كۈندۈر، ئاق سەندەل،
ئەرەب يىلىقى، گىل ئەرەمنى قاتارلىقلارنى قوشۇپ بىر-
رىلىدۇ. ئەگەر زەرەرلىشىش قىزىل ئۆگىگەچتە بولسا يۇ-
قۇرىدىكى دورىلارنى ئالدىرىماستىن، ئاستا-ئاستا يۇتۇپ
بېرىش كېرەك. سىمىز ئوت ۋە پاقا يوپۇرماق سۈيى ياكى
قۇرسى كۈھلى (108 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. تاشقى زەربە
ياكى يىقىلىشلار بىلەن قان قۇسۇش بولسا ئىچكى
تەرەپتىن يۇقۇرىدا كۆرسىتىلگەن دورىلار بېرىلگەندىن
تاشقىرى، ماش، ھۇغاس، ئالاقىيا، گىلى ئەرەمنى، سەبرە،
مۇرىيەككەلەرنى سۇقۇپ، ھەيىل ئاس سۈيى بىلەن قو-
شۇپ جاراھەت ئۈستىگە (كۆكەرگىن، ئىشىغان ياكى
باشقا ئىز قالغان جايغا) قويۇش لازىم.

مەئدە جاراھەتلىرىنىڭ قانىشى ياكى جىگەر، ئال سەۋىيىدىن بولغان قان قوشۇشلارغا، ئەسلى سەۋىيىنى يوقىتىش بىلەن ئوۋەندىكى سۇسخلاردىن بىرى بېرىلسە بولىدۇ.

(1) موزا، ئانارگۇلى 2 مىسقالدىن، ئەپيۇندىن بىر ئارپا مىقدارى ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ گازىۋان، باد-رەنجىۋىيا سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ، قۇرس تەييارلاپ كۈندە ئەتىگەن ناشىدا بىر دانىدىن بېرىلىدۇ.

(2) يەزىلەر ئال (ئۈزۈم) يوپۇرمىغىنى سىقىپ سۈيى ئىچىرىلسە قان قۇسقاغا پايىسى ياخشى دەپ كورسىتىدۇ.

(3) قۇرسى كەربىيا (71 - نۇسخە)

(4) كوھلى (سۈرمە) قۇرسى (108 - نۇسخە) نى كۈنگە بىر مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

قان بۇرۇن ياكى باش تەرەپتىن چۇشۇپ مەئدە ئىچىدە يىغىلىپ كوگۇل ئايىنىش بىلەن قوشۇپ چىقىرىلىشى مۇمكىن. مۇنداق چاغلاردا دىققەت بىلەن قاراپ، ئىلگىرى بۇرۇن قاناش ئەھۋاللىرىنىڭ بار-يوقلۇغىنى ئويىدان سۇرۇشتۇرۇش لازىم. بۇرۇن ئىچىدىكى قانلىق قەقەشلەر ياكى قاتتىق باش ئاغرىش بىلەن مىڭە غىدىقلىنىش ئالامەتلىرىنىڭ بولىشى، ئەمما مەئدەنىڭ ساغلام بولىشى بۇنىڭغا دىلىل بولالايدۇ. مۇنداق ھاللاردا سەۋەپ ئېنىق بولغاندىن كېيىن، باش كېسەللىكلىرى قىسمىدا كورسىتىپ ئوتۇلگەن چارىلار قىلىنىدۇ.

ھىق تۇتۇش (پەۋاق)

ھىق تۇتۇش مەئدە گۈشلىرىنىڭ تارتىشى ۋە قىتىپ قېلىشى نەتىجىسىدىكى مۇرەككەپ ھەركەتتىن ئىبارەت. بۇ مەئدە ئىغىزىدا ۋە پۈتۈن مەئدە قىسمىدا يۈز بېرىدۇ، بەزىدە قىزىل ئۆگىگەچتىمۇ يۈز بېرىشى مۇمكىن. ئالامەتلىرى ۋە داۋاسى: (1) مەئدە كۆپ مىقدار - دىكى غەلىز تاماقلارنى كۈتىرەلمەي، ھەركىتى مۇرەككەپ - باشپ، مەئدە ساھىسىدە ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. مەئدە بۇنىڭدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ھەركەت قىلىپ ھىق كېلىپ چىقىدۇ. مۇنداق ھاللاردا ئالدى بىلەن سېرىق چىچەك ئۇرۇنى تۇرۇپ ئۇرۇغى، تۇز ۋە ئىسكەنجىۋىل ئىچكۈزۈپ قۇستۇرۇپ مەئدىنى بوشىتىش كېرەك، ۋە مەئدىنى قۇۋ - ۋەتەندۈرىدىغان دورىلار بېرىش، ئاسان ھەزىم بولىدىغان تاماقلارنى بۇيرۇش لازىم.

(2) مەئدە زەئىپلىگى تۈپەيلىدىن، يەللىك تاماقلار يېيىش بىلەن مەئدە ۋە قىزىل ئۆگىگەچتە قويۇق يەل پەيدا بولىدۇ. بۇ يەلنىڭ چىقىش ئۈچۈن قىلغان ھەركەتتىدە مەغلۇپ بولىشى ھىق بولۇپ چىقىدۇ. مۇنداق ئاغرىقلاردا بۇرۇن مەئدە ئاجىزلىق ئالامەتلىرى بار بولىدۇ. بۇ كۆپىنچە بوۋاقلاردا ئۇچرايدۇ. زىرە، مەستكى ۋە پىتىنەنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ ئېغىز ئىچىدە ئويدان چايناپ تۇرۇپ ھاسىل بولغان سۇيۇقلۇق يۇتىلىدۇ. زەنجۋىلنى شۇمۇش كىكەرتىپ، ھىقنى ساقايتىدۇ.

(3) ئۆتكۈر تەسىرلىك دورىلارنى (مەسىلەن، مەخۇ-
نى يىلپىل) ئىستىمال قىلىش نەتىجىسىدە مەئىدە ئۆت-
كۈر غىدىقلىنىش بۇز بېرىپ ئاق، سېرىق ياكى قارام-
تۈل كۆك رەڭدە قۇسىدۇ، ئىسكەنجىيىن بىلەن كۆپ ھىق
داردا ئىلمان سۇ ئىچكۈزۈپ قۇستۇرۇش لازىم. مەئىدە-
كى ئېچىشنى يەسەيتىش ئۈچۈن ئىسپەغۇل لۇئابى، بىيە-
لۇئابى بېرىلىدۇ. ئىچىشكە سۇت ۋە بادام يېغى قوشۇل-
غان قايناقسۇ بېرىش لازىم.

(4) مەئىدە ئېغىزنى بەلغەم ماددىلارنىڭ تەسۋىد-
لىشى تۈپەيلىدىن ھەزىم بۇزۇلۇپ، چۈشمەل كىكىرىش
ۋە ئېغىزدىن سۈكلىش قاتارلىق ئالامەتلەردىن كېيىن
ھىق تۇتىدۇ. بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن ئاپارەج پەيقارا
بېرىش كېرەك. بۇ خىلدىكى ئاغرىقلارغا چۈشكۈرتكۈچى
دورىلار ياخشى تەسىر قىلىدۇ.

(5) مەئىدە مىزاجىنىڭ سوۋۇپ كېتىشىدىن ھىق
تۇتۇشى مۇمكىن. بۇنداقتا ئۇسۇزلۇقنىڭ كەملىكى، ئىس-
سىق نەرسىلەرنى خالاش، مەئىدەنىڭ زەئىپلىكى بولىدۇ.
مەئىدەنى قىزىتىش ئۈچۈن چىڭسەي ئۇرۇغى، ياۋا سەۋزە
ئۇرۇغى، زىرە، رۇمبىدىيان، زەدىچىۋىل، پىننە، قۇندۇزقەرى،
ياۋا پىياز قاتارلىقلارنى لازىم مىقداردا ئېلىپ ئىستىمال
قىلىشقا بېرىلىدۇ.

ئاشقازاننىڭ يۆتكىلىشى (مۇتقەلىمى مەئىدە)

ئاشقازاننىڭ ئەسلىدىكى ئورنىدىن يۆتكىلىشى كۆ-

پىنچە ئۇنىڭ تەرۋەنگە چۈشۈشى بىلەن ئىپادىلىنىدۇ
بەزىدە يۇقۇرىغا تارتىلىشىمۇ مۇمكىن بۇ كۆپىنچە بويى
ئىگىز، تېنى ئىنچىكە ئادەملەردە ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: تاماقتى يەپ بولغاندىن كېيىن،
ھەزىم بولغان تاماقتى قۇسۇپ تاشلايدۇ. مەندە ئېغىر ۋە
ئىچىشىپ تۇرىدۇ. ئۈچەي توسىلىش (ئىلاۋۇس) نىڭ
پەرقى شۇكى، ئۈچەي توسۇلغاندا تەرەت ماددىسى قەي
بىلەن ئېغىر ئارقىلىق چىقىدۇ. ئەمما ئاشقازان يۈتكەل-
گەندە تولۇق ھەزىم بولۇش ئالدىدىكى تاماق چىقىدۇ
ۋە كىندىك ئەتراپلىرىدا ئاغرىق سېزىدۇ.

داۋاسى: ھەزىمنى ياخشىلاش چارىلىرى قىلىنىدۇ.
ۋە ئېچىشىشنى پەسەيتىش ئۈچۈن مېغىزلىق نەرسىلەرنى
بېرىش كېرەك. باشقا دورىلاردىن ئۈچەي كېسەللىكلىرىدە
سۈزلەنگەن چارىلار قىلىنىشى مۇمكىن.

مەئىدنىڭ ئېچىشىشى

پىتىر نان، خام يېمىشلەرنى يېيىش بىلەن مەئى-
دىدە خام سۇيۇقلۇق توختاپ قېلىپ، مەئىدنىڭ قىزىد-
تىشى بىلەن چۈچمەل تەمگە كىرىپ قالىدۇ. بۇ چۈچ-
مەل سۇيۇقلۇق مەئىدە ئېغىزنى ئېچىشتۈرۈپ كويگەندەك
سېزىلىدۇ. سەۋدانىڭ كۆپلىگىدىن بولسا ئېچىشىش ۋە
كويۇش ئېغىر بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: مەئىدە ئېچىشىپ كويگەندەك سېزىلىپ
دۇ ۋە بۇنداق ئالامەتلەر قوساق ئاچقاندا يەڭگىلەپ

قالدۇ. سەۋدادىن بولغان بولسا، مايلىق نەرسىلەرنى بىر كەندە يېنىكلىشىدۇ.

داۋاسى: دورىلار بىلەن قەي قىلدۇرۇش كېرەك. ئۇندىن كېيىن ئىسكەنجىدىن بۇزۇرى (100 - نۇسخە) يېرىپ ھېلىلە ياكى ئىمىلە ھۇرايىسى بېرىلىدۇ.

مەئدە بوشىشىپ كېتىش

بۇ كېسەل پەيدا بولۇش سەۋەپلىرىگە قاراپ تو-
ۋەندىكىچە 2 خىل بولىدۇ

(1) مەئدەگە بىر مىقداردىكى ھوللۇكنىڭ تەسىر قىلىشى بىلەن مەئدەنىڭ قۇتۇن ۋە ۋەدىسى بوشىشىپ كېتىدۇ. بۇنداق ھاللاردا ھەزىم بۇزۇلىدۇ، شۇنىڭدەك ئاغرىقنىڭ كۆكرەك قىسمىنىڭ ئالدىغا چىقىپ قالغان قىيا-
يەتتە بولىدۇ.

(2) مەئدەنى قوساق بوشلۇغىدا ھەر تەرەپكە تار-
تىپ تۇرغان تارمۇشلار بولۇپ، ئۇلار باغلىغۇچىلار
(رېئاتلار) دەپ ئاتىلىدۇ. شۇنىڭ بىرىگە ھوللۇكنىڭ
تەسىر قىلىشى ياكى مىڭە-يۇلۇندىن پەيلەرگە كەلگۈچى
ئەسەپلەرنىڭ زەرەرلىنىشى ئارقىسىدا بۇلاردا بوشىشىپ
كېتىش ھادىسىسى كېلىپ چىقىدۇ. نەتىجىدە مەئدەنىڭ
قايسى تەرەپتىكى تارمۇشى زەرەرلەنگەن بولسا مەئدە
شۇ تەرەپكە ساڭگىلاپ قالىدۇ. ئاغرىققا شۇ تەرەپ
قوساق قىسمى ئېغىرلاشقاندا سېزىلىدۇ. مەسىلەن، ئال-
دى تەرەپكە ساڭگىلاپ كەتسە، كىندىك قىسمىدا ئېغىر-

لىق سېزىلىدۇ. ئارقا تەرەپكە چۈشۈپ كەتسە قوساق ئاستىنقى قىسمىدا ئېغىرلىق بىلىنىدۇ.

داۋاسى: بۇ ئىچكى ئەزالار پالچى ھساپلانغانلىقتىن مىڭە كېسەللىكلىرى بايىدىكى ئىستىرخا كېسەلىدە كورسىتىلگەن چارىلار قىلىنىدۇ. يەڭگىل ۋە ئاسان سىڭىدىغان غىزالارغا خۇشپۇراق دورىلارنى قوشۇپ بېرىش لازىم.

(3) مەئدە گۈشلىرىنىڭ ئىستىرخاسى: قاتتىق قۇسۇش ۋە ھەرخىل سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن مەئدىنىڭ زور دەرىجىدە زەرەرلىنىشى بىلەن كېلىپ چىقىدۇ. بۇ مەئدە كېسەللىكلىرى ئىچىدە ئەڭ يامان بىر كېسەلدىن ئىبارەت، ھەرقانچە ياخشى سىڭىدىغان تاماقلار بولسىمۇ ھەزىم بولمايدۇ. مەئدىنىڭ ھەزىم قابىلىيىتى يوقىلىدۇ. ئارقا تەرەت دائىم قاتتىق كېلىدۇ. ئەمما مەئدىدە ھېچقاندا ياللۇغلىنىش بولمايدۇ. ئاغرىق كۈندىن - كۈنگە ئورۇقلايدۇ. بۇ خىلدىكى ئاغرىقلارغا جەۋارىش ئۇد، ئىترىپىل كەبىر (1 -، 93 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. مەئدە ئۈستىگە مەستىكى يېغى سۈركەپ تۇرۇ - لىدۇ. غىزاسىغا كەكلىك، قىرغاۋۇل قاتارلىق ياۋا قۇش - لار گۈشى بېرىلىدۇ.

ئاشقازاننىڭ تارتىشىپ قېلىشى

(تەشەننۇجى مەئدە)

قان تولۇش ياكى سۈرگە ئىچكۈزۈش نەتىجىسىدە ۋە ئەسەيلەرنىڭ زەرەرلىنىشى تۈپەيلىدىن ئاشقازان

گوشى تارتىشىپ قالىدۇ. ئەگەر تارتىشىش مەنىدە بولسا، يىگەن ناماق ھەزم بولماستىن تۇرۇپ چىقىپ كېتىدۇ. مەنىدە تارتىشىپ قالغانلىقتىن كېسەل كىشى ئالدىغا ئىگىلىپ قالىدۇ، ئاغرىش قاتتىق ئازاپلايدۇ. **داۋاسى:** مېڭە كېسەللىكلىرى بايانىدىكى تارتىشىش (تەشەننۇج) دە كۆرسىتىلگەن چارىلار قىلىنىدۇ. قۇرۇق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش بىلەن ئىچ سۈرۈش-نىڭ ئالدىنى ئېلىشقا دىققەت قىلىش لازىم. چۈنكى بۇ خىل ئەھاللار تارتىشىشنى كۈچلەندۈرۈپ قويىدۇ.

مەنىدىن كېتىپ قېلىشى

مەنىدە ياللۇغلىرىدىن كېيىن، قويۇق سەۋدا خىلىتى مەنىدىن كىچىك پەي يېپىچىلىرىگە چۈشىدۇ. كۆپىنچە مەنىدە ئېغىز قىسمىدا ئۇچرايدۇ، بەزىدە ئومۇمى قىسمىدا بولۇشى مۇمكىن. بۇ ھال مەنىدە بىر خىل قېتىپ قېلىش پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئېغىزدىن كۆپۈكتەك سۇ كېلىپ تۇرىدۇ. ئاغرىق دۇم ياتالمايدۇ. يەرگە قاراپ ئىگىش-كەندە مەنىدىن قاتتىق ئاغرىيدۇ، بىر لوقما تاماق يە-سىمۇ ئاغرىيدۇ. ئاغرىق ئېغىز ياكى يەڭگىل بولۇشى زەرەرلىنىشنىڭ دەرىجىسىگە باغلىق. تاشقى تەرەپتىن تۇتۇپ كۆرسە قاتتىقلىق ئېنىق بىلىنىدۇ.

داۋاسى: كۆش بېرىش مەنى قىلىنىدۇ. سۈي-

دۇك قىزىل ياكى سېرىق بولسا باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىش كېرەك. ئاق موم، گۈل يېغى، بىنەپشە يېغىنى بىرلاشتۇرۇپ مەئدە ئۈستىگە سۈركەش كېرەك. ئەگەر سۇيۇك ئاق بولۇپ، بەدەندە ھارارەت بولمىسا، ياپونە، سۈمبۇل، بىنەپشە، ئىزخىر، شۈمشە، مۇقىل ۋە ئاچچىق بىلەم قاتارلىقلارنى يۇمشاق سوقۇپ، توخۇ يېغى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ماي تەييارلاپ، مەئدە ئۈستى ياغلىنىدۇ. ئۇندىن باشقا قويۇق خىلىتنى تارقاتقۇچى چارلار قىلىنىدۇ.

مەئدە سەۋەپلىك ئىچ سۇرۇش (زەرەپ)

بۇ خىل كېسەلدە تاماق ماددىلىرى ھەزىم بولۇش ئالدىدا بەدەنگە تارقالماستىن، بەلكى ئىچ سۇرۇش بىلەن چىقىپ كېتىدۇ. بەزى تىۋىپلەر بۇ كېسەلنى مەيدەنىڭ ئىسھالى دەپ ئاتىغان. يېگەن نەرسىلەر مەئىدە ئۇزۇن تۇرماستىنلا قەرەت بىلەن چىقىپ كېتىدۇ. كۈنىگە نەچچە قېتىم تاماق يېگەن بولسا شۇنچە قېتىم ئىچى سۇرىدۇ. بۇ كېسەل سەۋەپلىرىگە قاراپ تۆۋەندىكىچە بىر قانچە تۈرلەرگە بۆلىنىدۇ:

(1) مەئىدىنىڭ ماددىسىز مىزاجى بۇزۇلۇش ياكى ماددى سەۋەپلىرىدىن زەرەرلىنىشى: بۇنىڭدا مەئىدە مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى دېگەن پەسلە كېرىستىلگەن ئالامەت-لەردىن باشقا ئىچ سۇرۇشمۇ بىللە قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

داۋاسى: (1) ماددىسىز بولغان تۈرىدە مەئىدە-نى قىزىتىش ۋە نەملىكتىن قۇرۇتۇش تەدبىرلىرى كۆ-

رۇخسۇپ مەجۇنى جاۋارش كۇمۇنى، جەۋارش ئۇدۇم مەجۇنى پىلىپل (49 - 92 - 93 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ.

(2) ماددى سەۋەپتىن بولغان تۇرىدە: ئەگەر بەلغەمدىن بولسا (كېسەلنىڭ چىرايى ئاق بولىدۇ، ئې-خىزدىن سۇ ئاقىدۇ ۋە باشقا ئالامەتلەر بولىدۇ)، ئالدى بىلەن بىر نەچچە قېتىم كورسىتىپ ئۆتۈلگەن چارىلار بىلەن قەي قىلدۇرۇش، ئۇندىن كېيىن جەۋارش كۇندۇر، جەۋارش جالىنۇس، جەۋارش خەرنۇپ (3 - 109 - 110 - نۇسخە) لەردىن بىرى بېرىلىدۇ. سەپرادىن بولسا كۆپىنچە تەپ كېسەللىكلەردىن كېيىن ياكى 2 - 3 كۈنلۈك بەز-گىنەكتىن كېيىن يۇقۇرقىدەك ئىچ سۇرۇش ئالامەتلىرى كۆرىنىدۇ. بەك ئىسسىقلىق تاماقلارنى يىمىش ياكى ھا-راقتى كۆپ ئىچىش بىلەنمۇ كېلىپ چىقىدۇ. كېسەلدە ھارارەت ۋە تەرەتتە سەپرا بولىدۇ.

داۋاسى: ئانار شەرۋىتى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. لازىم مىقداردا سېرىق ھېلىلىنى شېكەر بىلەن سوقۇپ بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن قۇرسى تاباشىر (112 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(2) مەئدە يارىسى ۋە تۇرلۇك مەئدە جاراھەتلىرى سەۋىيىدىن پەيدا بولۇشى: كېسەلدە يارىنىڭ ئالامەتلىرى بىلەن (مەئدە يارىسىغا قاراڭ) ئىچى سۇرۇش بولىدۇ. غىزا يىمىش بىلەن قوساق ساھىسىدە (ئۆچەيدە) تولغاقتىن مېمان ئاغرىش ۋە ئىچىش يۈز بېرىپ، ئىچى سۇرۇپ كېتىدۇ، بەزىدە قۇسىدۇ، ھارارەتمۇ بولىدۇ.

داۋاسى: زەپەرسىز قۇرسى تاباشىر (112 - نۇسخە)،

ھەببۇلئاس شەرۋىتى بىلەن قوشۇپ بېرىلىدۇ.

(3) نەزلە سەۋىيىدىن پەيدا بولغىنى: بۇ مىڭدىن بولغان ئىچ سۇرۇش (ئىسھال دىماغى) دەپمۇ ئاتىلىدۇ. نەزلىدىن كېيىن ياكى نەزلە بىلەن ئاغرىغان كېسەلدە مىڭدە ھاسىل بولغان نەزلىنىڭ سۇيۇقلۇق ماددىسى يۇتقۇنچاققا چۈشۈپ، بۇ يەردىن مەئىدىگە كېلىپ مەئەدىنىڭ ھەزىم قىلىش پائالىيىتىنى بۇزۇپ ئىسھال پەيدا قىلىدۇ. بۇنىڭدىكى مۇھىم ئالامەت ئاغرىشتىن بۇرۇن قاتتىق زۇكام بىلەن ئاغرىغانلىق ۋە باشنى ئىگىز قوپۇپ ئۇخلىغاندىن كېيىن ئىچى سۇرۇپ كەتكەنلىك تارىخى بولىدۇ (باشقا ئالامەتلەر ئۈچۈن زۇكام كېسىلىگە قاراڭ).

داۋاسى: بۇ خىلدىكى ئاغرىقلاردا ئىچ سۇرۇشنى

توختىتىش چارىلىرى پايدىسىز. ئالدى بىلەن نەزلىنى توختىتىشقا تەدبىر قىلىش لازىم. مىڭنى ماددىدىن تازىلاش ۋە قۇۋۋەتلەندۈرۈش كېرەك. ئانار گۈلى، كەتىرا، سەمىي ئەرەبى رۇبىي، زەپەر، ئوسارەيى سارەيى لەھىيە تۈتىتىلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، شەرۋىتى خەشخاش بىلەن بېرىلىدۇ ياكى بۇ قۇرس بېرىلسە نەزلىنى توختىتىدۇ: قىزىل گۈل، سەمىي ئەرەبى، خەشخاش، رۇبىي سۇس، نىشاستە، كەتىرا، زەپەر، ئۇسۇڭ ئۇرۇغىنى ئىسھالغا قاراپ ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ بىر ئاز سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ قۇرس تەييارلىنىدۇ. كۈنىگە بىر مىسقال.

دىن يالغۇز ئۆزىنى ياكى شىرۋىتى زۇپا بىلەن بىللە
بېرىلىدۇ. نەزەلە ساقايىدا ئىچى توختايدۇ.

ۋابا (ھەيزە ۋابائى)

قاتتىق قۇسۇش ۋە ئىچ سۇرۇش بىلەن ئوتىدىغان
ئېغىر كېسەللىك بولۇپ يۇقۇملۇق كېسەل (ئەمرازى
سارىئە) لەردىن بىرى ھىساپلىنىدۇ.

سەۋىيى: ئۇفۇنەت سەۋىيىدىن پۇتۇن بەدەندىكى
ماددىلاردا بۇزۇلۇش يۈز بېرىپ پۇتۇن بەدەندىكى ئەزا-
لاردىن بۇزۇلغان ماددىلار مەئىدىگە قۇيۇلىدۇ. بەدەن
ئۆزىنىڭ چىقىرىپ تاشلىغۇچى قۇۋۋىتى (قۇۋۋەتى داپىەسى)
ئارقىلىق قەيى قىلىش ۋە ئىچ سۇرۇش يولى بىلەن
ئۇنداق ماددىلارنى سىرتقا چىقىرىپ تاشلاشقا مەجبۇر
بولىدۇ.

بۇ كېسەل كۆپىنچە ياز كۈنلىرى ئۇچراپ، تېز
باشلىنىدىغان ۋە خەۋپ خەتتىكى كۆپرەك كېسەللىكدۇر.
كېسەلگە سەۋەبچى ماددىلارنىڭ تۈرىگە قاراپ،
ئۇ ھەقىقى ۋابا؛ سىررەنىڭ بۇزۇلىشىدىن بولغان ھەيزە؛
بەلغەمدىن بولغان ھەيزە ۋە بۇزۇلغان تاماقلارنى يېمىش
ئېغىر دەرىجىدە ھەزىم بۇزۇلۇشتىن بولغان ھەيزە دىگەن
تۈرلەرگە بۆلىنىپ، بىر قانچە ئورتاق ئالامەتلەردىن
تاشقىرى، ھەر قايسىسىدا ئۆزىگە خاس ئالامەت-
لەرمۇ كۆرۈلىدۇ.

ئالامەتلىرى:

1. ھەقىقى ۋاپاتنىڭ ئالامەتلىرى: ئاغرىق جىددى باشلىنىدۇ، جىددى قۇسۇش ۋە ئىچ سۇرۇش يۈز بېرىپ، كېسەل بىردەم-بىردەمدە قۇسۇپ، ئىچى سۇرۇپ تېز كۈندە ئاجىزلىشىپ كېتىدۇ. تومۇر بىلگى بولمايدىغان دەرىجىگە چۈشۈپ قالىدۇ، تارتىشىش يۈز بېرىپ، پۈتۈن ئەزالىرى سوۋۇپ كېتىدۇ، بىوينىمۇ قېتىپ قالىدۇ. ئۇسۇزلۇق كۈچلۈك بولۇپ، ئېغىز ئىچى قۇرغاقلىشىدۇ، بۇرنى ئۇچلۇقلىنىپ، كوزى ئولتۇرۇشۇپ كېتىدۇ، بەدەن قۇرۇپ، ئوزى ھۇشسىزلىنىپ ئولۇپ كېتىشى مۇمكىن. بۇ كېسەل گەرچە ئاشۇنداق دەھشەتلىك ئاغرىق بولسىمۇ، لېكىن ۋاقتىدا كوڭۇل قويۇپ داۋالسا ساقايتىۋېلىش مۇمكىن.

2. سەپرادىن بولغان ھەيز. كېسلىدە يۇقۇرقى-لاردىن تاشقىرى، قۇسۇق ۋە تەرەتتە سەپرا ئارىلاشقان بولىدۇ، يەنى سېرىق سۇيۇقلۇق، چۈچۈمەل ياكى ئاچچىق تەملىك كېلىدۇ. كوڭۇل ئاينىش بىلەن مەئدە ئۇچەي-مەردە ئېچىشىش بىللە كېلىدۇ.

3. بەلغەمدىن بولغان ھەيز. كېسلىدە قۇسۇق ۋە تەرەتنىڭ رەڭگى ئاق (بەلغەم رەڭدە) كېلىدۇ، ئاق، شىلىشىق نەرسىلەر بولۇپ، ئېچىشىش ۋە كوڭۇل ئې-لىشىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

4. بۇزۇلغان يىمەكلىكلەرنى يېمىش بىلەن مەئدە

بۇزۇلۇشتىن بولغان ھەيزىدە، قۇسۇش ۋە ئىچ سۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا كىندىك تەتراپىدا قاتتىق ئاغرىش ۋە تولغاق بىللە قوشۇلۇپ كېلىدۇ. قۇسۇش ئىچ سۇرۇشتىن جىقراق بولىدۇ، ئەسەبى (نېرۋىلىك) ئالامەتلەر روشەن كۆرىنىدۇ. بەزىلەردە بۇ كېسەل بىلەن ئاغرىشتىن بۇرۇن تاماق ھەزىم قىلىش بۇزۇلغانلىق ئالامەتلىرى (قوساق كۆپۈش، تاماق سىڭمەسلىكلەر) بولىشى مۇمكىن. بۇ خىلدىكى ھەيزە بىر قازاندىن ئۇخشاش تاماقنى بىللە يىگەن بىر قانچە كىشى بىر ۋاقىتتا ئاغرىشتەك ئالاھىدىلىكلىرىگىمۇ ئىگە.

داۋاسى: (1) ماددىلارنى مەئىدىدىن تولۇق چىقىرىش ئۈچۈن كۆپ مىقداردا ئىسكەنجىيىن ۋە ئىسسىق سۇ بېرىش كېرەك.

(2) قۇسۇشنى پەسەيتىش ئۈچۈن ئانار شەرۋىتى، لىمون شەرۋىتى ياكى پىنئە قوشۇلغان ئانار شەرۋىتى (47 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. تەمىرى ھىندى شەرۋىتى بېرىلىشىمۇ مۇمكىن.

(3) ئۇسۇزلۇقنىڭ جىددىلىگىنى پەسەيتىش ئۈچۈن ئانار شەرۋىتىگە تاباشىر قوشۇپ بېرىلىدۇ.

(4) ئىچ سۇرۇشقا قارىغاندا قۇسۇش كۈچلۈك بولسا، تەمىرى ھىندى سۈيى ياكى كاسىن سۈيىگە بىر ئاز مەھمۇدە قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئىچ سۇرۇشنى توختىتىش ئۈچۈن بىيە ۋە ئالما سۈيىگە ھەببۇل ئاس قوشۇپ بېرىش، سەندەل، ئانار گۈلى، قىزىل گۈل، بىيە بىر

ئاز كاپۇر، قومۇش يىلتىزنىڭ كويدۇرۇلگەن كۋاللىرىنى
 سىركە بىلەن قوشۇپ، قوساق ئۈستىگە قويۇۋالدى. ياكى
 لاتىنى گۈلاپقا چىلاپ قوساق ئۈستىگە يېپىپ قويۇلىدۇ.
 پۇت - قوللىرى سوۋۇپ كەتكەندە گىلى ئەرەمنىنى سىركە
 بىلەن سۇرۇپ قول - پۇتلىرىغا سۇرتۇپ ئىسسىق يۈگەش
 كېرەك. بۇلار بىلەنمۇ قۇسۇش ياكى ئىچ سۇرۇش توخ -
 تىنچسا مەئدە ئۈستىگە ئوتلۇق ھىجامەت قويۇش بىلەن
 خەشخاش سۈيىگە ئىشاستە قوشۇپ ھوققە قىلىش لازىم.
 (5) ھۇشىدىن كەتكەندە قول - پۇت، باش ۋە
 قۇلاقلىرىنى ئۇۋۇلاش - مۇجۇپ تۇتۇش كېرەك. ماۋىللىھى
 بىلەن بىر ئاز ئىپارنى ئېرىتىپ كالىغا تامغۇزۇش كېرەك.
 (6) تارتىشىپ قالغاندا ئىسسىق ياغلار بىلەن
 ئەزانى ياغلاش ياكى لاتىدەك بىر نەرسىنى ماي بىلەن
 مايلاپ قول - پۇتلارنىڭ گەۋدە تەرەپ قىسمىغا قويۇش
 لازىم.

ھەيزە كېسىلىدە دەسلەپكى دەۋرلىرىدە غىزا بى -
 رىلىمەيدۇ. ئەھۋال ياخشىلانغانسىمۇ ئاز - ئازدىن يېنىك
 تاماق بېرىشكە بولىدۇ. ئۇخلاش بۇ كېسەل ئۈچۈن بەك
 پايدىلىق. ئۇيقۇسىزلىق بولسا ئۇخلىتىش چارىلىرىنى
 قىلىش لازىم. باش - مېڭە كېسەللىرى باھىدا كۆرسىتىپ
 ئوتۇلگەن دورىلارنى باشقا چېپىش ياكى بۇرۇنغا پۇرۇ -
 تۇش كېرەك.

بۇزۇلغان تاماقلارنى يېمىش ياكى ھەزىمنىڭ

ئوتكۇر بۇزۇلشىدىن قۇسۇپ ئىچ سۇرۇش كېلىدە،
ئەگەر لازىم كەلسە ئىسكەنجىدىن بىلەن ھەسەل ۋە كۆپ
مىقداردا سۇ ئىچكۈزۈپ تاكى مەئىدىدىكى سەۋەبچى ماددا
چىقىپ كەتكىچە قۇستۇرۇش، ئاندىن كېيىن قەينى تۇخ -
ئىشش چارىلىرىنى قىلىش، مەسىلەن، قۇرسى ئود ياكى
راسەن (113 - 114 - نۇسخىلار) بېرىش كېرەك. كېسەل
بىر ئاز ياخشىلانمىغىچە تاماق بېرىلمەيدۇ. كېيىنچە رەك
ئۇچار قاناتلار گوشنى ئازار ياكى بىمە سۈيى بىلەن
چۇچىمەل قىلىپ بېرىشكە بولىدۇ. رۇمبىدىيان، زىرە،
مەستىكى، ئۇددى خاملارنى باراۋەردىن ئېلىپ، قاينىتىپ
سۈيىنى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر ماددىنى ئۇچەيدىن
چىقىرىۋېتىشنى مەقسەت قىلىنسا ئايارەنج پەيقارا (16 -
نۇسخە) بېرىلسە بولىدۇ. قۇرسى راسەن بۇ كېسەللىكتە
زور مەنپەئەتلىكتۇر.

VIII ماقالا. جىگەر كېسەللىكلىرى

1- پەسىل: جىگەرنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشلۇق كېسەللىكلىرى

جىگەرنىڭ مىزاج بۇزۇلۇشلۇق كېسەللىكلىرى مەئدە ئاغرىقلىرىدەك ماددىسىز ياكى ماددىلار ئارىلاشقان ئىسسىق-سوغاق يا قۇرۇق زەرەرلىنىشلەردىن ئىبارەت. تىۋەندە مىزاجنىڭ كەيپىياتى جەھەتتە بۇ 3 تۈرگە بولۇپ سۆزلىنىدۇ.

1. جىگەر مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىق بۇزۇلۇشى

جىگەر مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىق سەۋىيىدىن بولغان زەرەرلىنىشىدىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: ئۇسۇزلۇق كۈچلۈك، تىلى قۇرغاق، ئېغىز ئىچى ئاچچىق ۋە ئىشتەي تۇتۇلغان بولىدۇ. بەزىدە قەۋزىيەت بولۇشى ۋە سۇيىدۇك كەلمەسلىكى مۇمكىن. تومۇر تېز، سۇيىدۇك قىزىل بولۇپ قىزىق چىقىدۇ. جىگەر ئۇستىنى سىلاپ كۆرگەندە قىزىق سىزىلىدۇ. ۋە ياسقاندا ئاغرىيدۇ. ماددىلاردىن قاننىڭ غالىبلىقى بولغاندا بەدەن ئېغىر، ئېغىزنىڭ نەمى ئۇزلۇق بولىدۇ. سەپرا غالىپ

بولسا، كوز ئېقى ۋە بەدەنلىرى سېرىق رەڭدە بولۇپ،
كوڭلى ئاينىپ قۇسىدۇ. خۇسۇسەن مايلىق نەرسىلەرنى
يىگەندە كوڭۇل ئاينىدۇ، ئىچى سۇرىدۇ. ئېغىر ھاللاردا
سۇيىدۇك قارامتۇل رەڭدە كېلىدۇ. مالىخولىيادەك روھى
بەلگىلەر ۋە تېرە ئۈستىدە چالاشتەك قارا تەمرە تەكلىر
كورۇلىدۇ.

داۋاسى: ماددىلار ئارىلاشمىغان ھالدا بولسا
(غالىپ بولمىسا) سوغاقلىق قىلىش كېپايە قىلىدۇ. مە -
سىلەن، ئىسكەنجىبىن ۋە سەندەل شەرۋىتى بېرىش ياكى
ئانار سۈيى، كاسىن ئۇرۇغى، خاڭكا ئۇرۇغى، سېمىز ئوت
ئۇرۇغى، نىلۇفەر ۋە ئىسپۇغوللارنى ئەھۋالغا قاراپ بېرىش
لازىم. ماددى بولغاندا ئۇلارنىڭ ئالامەتلىرىگە ئاساسەن
شۇ ماددىلارنى ھەيدەش، قاندىن بولسا ھىجامەت قويۇش
كېرەك. ئۇندىن كېيىن 115 - نۇسخىدىكى مەتبۇخ بېرىد -
لىدۇ. سەپرا غالىپ بولغاندا ھەيدەش ئۈچۈن قان
ئېلىش ھاجەتسىز، 115 - نۇسخىدىكى مەتبۇخ بېرىلسلا
بولىدۇ. ئارپا، ماش، سەندەل سۇپارى، قىزىل گۈل،
خاڭكالىرنى سوقۇپ، جىگەر ئۈستىگە قويۇش لازىم. ئەگەر
جىگەر ئۈستىدىكى قىزىقلىق زىيادە بولسا قېتىقتا
پىشۇرۇلغان دەريا سەرتانى بىلەن ئارپا ئۇنىنى بىر -
لەشتۈرۈپ جىگەرگە قويۇش كېرەك. ئەگەر قەۋزىيەت
بولسا سېرىق ھېلىلىنى قاينىتىپ، سۈيىدە خىمار شەنبەر
بىلەن تەرەنجىۋىلىنى ئېرىتىپ، سوزۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ
(بۇلارنى سۈرگىلەردە كورسەتكەن مىقدار بويىچە ئېلىنسا)

بولدۇ). جىگەردە توسىلىش ئالامەتلىرى كورۇلسە شەر-
ۋىتى دىنارى (56 - نۇسخە) بېرىش كېرەك. جىگەر
كېسەللىكلىرىدە كاسىن سۈيى بىلەن پۇنۇس، خىيارشەن-
بەرنى ئېرىتىپ بېرىش ناھايىتى ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ.
ئوزۇقلىنىش جەھەتتىن ئىچىنى قاتۇرغۇچى نەرسىلەرنى
بېرىشتىن ساقلىنىش، تامىقىغا زىرق، ئەينۇلا ۋە پالەك،
تەمىرى ھىندى قوشۇپ بېرىش، ئىلاجىبار گوش بەرمەس-
لىك كېرەك. ئەگەر تەلەپ قىلسا توخۇ ياكى پاقلان
گوشى بېرىلىدۇ. ئېغىر ھاللاردا سۈيدۈك قارامتۇل رەڭدە
كېلىدۇ. بۇ جىگەرنىڭ زەئىپلىكى ۋە ئوفۇنەتنىڭ جىگەردە
كوپلىگىنى كورسىتىدۇ.

2. جىگەر مىزاجىنىڭ سوغاقتىن بۇزۇلۇشى

ئالامەتلىرى: ھارارەت ۋە جىگەر ساھەسىدە
ئىسسىقلىق بولمايدۇ. كېسەلنىڭ چىرايى ئوزگەرگەن،
ئاقۇش، بوشاڭ كەيپەتتا بولىدۇ. تەشئالىق بولمايدۇ.
تىل ۋە كالىپۇكلىرى ئاق گەز باغلايدۇ. تومۇر سۇس ۋە
ناچار ئۇرىدۇ. بەزىدە چىرايى قوغۇشۇن رەڭلىك بولۇپ
قالىدۇ. ئەگەر بەلغەم ماددىسى غالىپ بولسا، قۇسۇقتا
ئاق شىلىش نەسلىرى بولىدۇ. سۈيدۈك قويۇق كېلىدۇ.
ھەزىم قىلىشنىڭ ناچارلىشىشى بايقىلىدۇ. كېسەل جىگەر
ساھەسىدە يېقىمىزلىق سېزىدۇ.

داۋاسى: ماددىسىز بولغاندا ئىسسىقلىق قىلىش
يېتەرلىك. مەسىلەن، مەجۇنى ئاساناسىيا، داۋائىل كوركەم

(117-116 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. ھەم ھەر كۈنى سەھەردە ئارپا بېدىيان ۋە ئىت ئۇزۇمنى قاينىتىپ گۈلچى ۋە ھەسەل بىلەن بېرىش لازىم. ئىپسەنتىن، سۈمبۈل، ئىزخىر، قۇست، سەلىھەلەرنى قىزىل گۈل ۋە زەپەر قوشۇپ گۈلى سوسەن يېغى بىلەن جىگەر ئۈستىگە قويۇش كېرەك. بەلغەم ماددىسىدىن بولغاندا تازىلاش ئۈچۈن مائىل ئۇسۇل (13 - نۇسخە) ۋە ھەببى سەبە، ئايارەج پەيقارا قاتارلىقلارنىڭ بىرى (16 - 4 - نۇسخىلەر) بېرىلىدۇ. بىر مىسقال زۇپانى قاينىتىپ داۋائىل كۆركەم بىلەن بېرىشمۇ پايدىلىق. بەزىلەرنىڭ تەجرىبىسىچە، بۇ خىلدىكى جىگەر كېسىلىگە ئىنتىرىپىل سەغىر ياكى ئىتىر - پىل كەبىرى (1 - 5 - نۇسخە) ناھايىتى ئوبدان ئۈنۈم بېرىدۇ. ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش بەك كۆپ بولۇپ كەتكەندە، سۇيىدۇك تۇتۇلۇپ قېلىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. بۇنىڭغا دىققەت قىلىش لازىم. سەگەر ئىچى سۇ - رۇپ كەتسە سېپەندىن ئۇرۇغى رەيھان ئۇرۇغى، ئەرەپ يىلىمىدىن 3 مىسقالدىن ئېلىپ ئۇرۇق دورىلارنى قورۇپ ئەرەپ يىلىمى بىلەن قوشۇپ سۇقۇپ بېرىلىدۇ.

3. جىگەر مىزاجىنىڭ قۇرۇقلۇقتىن بۇزۇلۇشى

ئالامەتلىرى: پۈتۈن بەدەن ئورۇق ۋە تېرە قۇر - غاق بولىدۇ. تىل ۋە ئېغىز ئىچى دائىم قۇرۇپ تۇرىدۇ. تۆمۈر قاتتىق سالىدۇ، قان ئازلىق. قەۋزىيەت بولىدۇ. ماددىسى سەپرا بولۇپ، روھى ئالامەتلەردىن غەمكىنلىك،

خىمالىچانلىق، يامان پىكىرلەردە بولۇش، ئەھۋاللىرى كۆرىلىدۇ. ھەزىم قىلىش بۇزۇلۇپ، جىگەر ساھەسى تېلىپ ئاغرىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: ماددىسىز بولغاندا ھوللۇك تەرەپتىكى چارىلار قىلىنىپ، شەرۋىتى نىلۇفەر، شەرۋىتى خەشخاشلار، كاسىن ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى بېرىلىدۇ. قاپاق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى، بادام يېغى، موم ياغلىرىنى بىنەپشە يېغى بىلەن قوشۇپ جىگەر ئۈستىگە سۈزگەش لازىم. غىزاسغا كىپەك شىرىسىدە ناۋات ۋە بادام يېغى بىلەن ھالۋا تەييارلاپ بېرىش، قاپاق، پالەك، ئاقلانغان ئارپا ۋە سوڭەك يىلگى بىلەن تاماق ئېتىپ بېرىش، ئەمما ھوللۇكنى ھەددىدىن ئارتۇق قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

ماددى بولغانلىرىدا ئالدى بىلەن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بەرگەندىن كېيىن يۇقۇرىدىكى چارىلار قىلىنىدۇ.

جىگەرنىڭ زەئىپلىگى (زەئىپۈلكەبەد)

جىگەرنىڭ تۇتۇش، چىقىرىپ تاشلاش، تارتىش ۋە ھەزىم قىلىش قاتارلىق توت قۇۋۋىتىنىڭ زەرەرلىنىشى جىگەر زەئىپلىگىنى پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: سۈيدۈك رەڭكى گۆش يوغان سۈدەك (قىزغۇش) كېلىدۇ، بەدەن ئۇرۇقلاپ دەرىمىسىزلىنىدۇ. ئىشتەي ئازىيىپ ئوڭ تەرەپ يىتىم قوۋۇرغا ئاستىدا

چىمىلداپ ئاغرىش سېزىلىدۇ. بۇ ھال كۆپىنچە مىزاندىن كېيىن يەنى ئوزۇق ماددىلىرىنىڭ جىگەرگە ئۆتۈش ۋاقتى بىلەن توغرا كېلىدۇ. كېسەلنىڭ رەڭگى دەسلەپتە كۆ-كۈشۈك بولۇپ، بارغانسېرى سېرىق رەڭگە مايىللىشىدۇ. ئارقا تەرەت مىقدارى كۆپ، رەڭگى ئاق بولۇپ قالىدۇ. سۈيۈك ۋە تەرەت رەڭگىنىڭ ئۆزگىرىشى ئاساسەن جە-گەرنىڭ ھەزىم قىلىش ۋە شىمىرىش كۈچىنىڭ ئاجىز-لىشىدىن ئوزۇقلۇقلار بەدەنگە ياخشى ئۆزلەشمەي چىقىپ كەتكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. جىگەردىكى تۇتۇشنىڭ بۇزۇلۇشى بىلەن بەدەن كۈندىن-كۈنگە ئورۇقلايدۇ. ۋە بوشاڭلىق پەيدا بولىدۇ. جىگەردىكى چىقىرىپ تاشلاش-نىڭ بۇزۇلۇشى كېرەكسىز ماددىلار جىگەردە ساقلىنىپ قېلىپ، قوساق ئېسىلىشتەك ھاللارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. جىگەرنىڭ زەئىپلىكى، ئۇنىڭ توت قۇۋۋىتىنىڭ بىرقانچىسى ياكى ھەممىسىنىڭ بۇزۇلۇشى بىلەن كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. بۇنى كۆرسىتىلگەن ئالامەتلەر بىلەن ئايرىپ چىقىش مۇمكىن.

سەۋىيى: جىگەرنىڭ زەئىپلىكى ئاساسەن مۇنۇ 3 خىل سەۋەبتىن كېلىپ چىقىدۇ.

- (1) جىگەر مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى (1) - پەسىلدە كۆرسىتىلگەن ئالامەتلەرنىڭ داۋام قىلىشى).
- (2) جىگەر تومۇرلىرىدىكى توسىلىش (سۇددە) ياكى جىگەرنىڭ ياللۇغى.

(3) مۇناسىۋەتلىك ئەزالارنىڭ (مەئدە ۋە تالنىڭ) زەرەرلىنىشى جىگەرگە تەسىر قىلىش.

داۋاسى: (1) جىگەر مىزاجى بۇزۇلغان سەۋەپتىن بولغانلىرىدا يۇقۇرىدا كۆرسىتىلگەن چارىلار قىلىنىدۇ.

(2) جىگەرنىڭ ياللۇغلىنىشى ياكى توسىلىشىدىن بولغانلىرىنىڭ داۋاسى ئاساسەن سەۋىيىنى بىر تەرەپ قىلىش (جىگەر توسىلىش ۋە جىگەر ياللۇغىغا قاراك).

(3) تال ۋە مەئدە سەۋىيى بىلەن بولغان جىگەر زەئىپلىكىدە مەئدە تالنى داۋالاش بىلەن بىللە جە -

گەرنى قۇۋۋەتلەيدىغان دورىلارنى مەسلەن. خۇشپۇراقلىق غىزا، دارچىن، ئىزخىر ۋە زەپەرگە ئوخشاش دورىلارنى

بېرىش لازىم. جىگەرنىڭ چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتىنىڭ زەئىپلىكى ئېغىر بولغانلاردا كونا كىتاپلارنىڭ كۆرسىتىدە -

شىجە ئۆسلىم تومۇرىدىن قان ئېلىش ياخشى نەتىجە بېرىدۇ. جىگەرنىڭ ھەزىم قۇۋۋىتىنى كۈچلەندۈرۈش

ئۈچۈن مەجۇنى سەنجىرىنا (33 - نۇسخە) نى يېمىشكە بېرىپ، سىرتتىن ياغلاش ئۈچۈن سەبرى، ئانار گۈلى،

ئانار پوستى، لادەن، مەۋرۇر قاتارلىقلارنى يۇمشاق سو - قۇپ، گۈلاپ بىلەن نەمدەپ جىگەر ئۈستىگە قويۇش؛

قورۇغۇچىلارنى بېرىشتە ئېھتىيات قىلىپ، توسالغۇنى ئېچىشقا دائىم دىققەت قىلىش لازىم. تۇتۇش قۇۋۋىتىنىڭ

زەئىپلىكىدە ئالما شەرىۋىتى، بىيە شەرىۋىتى بېرىلىپ، زىرە، ئۇد ۋە ئالىمنى قوشۇپ، سوقۇپ جىگەر ئۈستىگە

قويۇش كېرەك. جىگەرنىڭ چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋىتىنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن مائىل جىپىن (181 - نۇسخە) ئىسكەنجىۋىل ۋە ھېلىلا ۋاراباسى بېرىلىدۇ. غىزاسغا چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم سېرىقى ياخشى. ئادەتتە غىزاغا دارچىن، قارىمۇچ، پىلىپىل ۋە زەنجىۋىل سېلىپ بېرىش لازىم.

2 - پەسىل: جىگەردىكى توسىلىش (سۇددىلىكە بەد)

جىگەر توسىلىش - جىگەرنىڭ ئۆز تومۇرلىرىدىكى توسىلىش ياكى ماسارىقا تومۇرىدىكى توسىلىشلاردىن ئىبارەت. ئالامىتى ۋە داۋاسى جەھەتتىن بىر بىردىن پەرقلەندۇ.

1. جىگەر ئۆز تومۇرلىرىدىكى توسىلىش

سەۋىيى: جىگەرنىڭ ھەرخىل جاراھەتلىرىدىن كېيىن جىگەر تومۇرلىرىنىڭ تارتۇقلىشىپ قېلىشى؛ جىگەرنىڭ ياللۇغلىنىشى؛ جىگەر تومۇرلىرى ئىچىگە تەرخىل شىر- لاش، قويۇق ۋە قاتتىق ماددىلارنىڭ ئولتۇرۇپ قېلىشى. توسىلىشنىڭ بۇ خىل سەۋەپلىرى كۆپ ئۇچرايدۇ. مەسىلەن، تاتلىق ۋە غەلىز تاماقلاردىن كېيىن كۈچلۈك تەن ھەركەت قىلىش، ھازاق ۋە مۇسەللەسلەرنى كۆپ ئىچىش، قورغۇچى نەرسىلەرنى كۆپ ئىستىمال قىلىش، بۇزۇلغان يىمەكلىكلەرنى يېمىش بىلەنمۇ توسىلىش

كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. بەزىلەر جىگەر تومۇرلىرىدا -
نىڭ تۇغما تار بولىشىنى بىر سەۋەپ دەپ كۆر -
سىتىدۇ.

ئالامەتلىرى: قان ئازلىق ئالامەتلىرىنىڭ كۈندىن
كۈنگە زىيادە بولىشى، رەڭگى ساغرىش ئالامەتلىرى
بىلەن بىللە تەرەت گوش سۈيىدەك كېلىدۇ. جىگەر سا -
ھەسسىدە ئېغىرلىق ۋە ئاغرىش سىزىلىدۇ. توسىلىش
جىگەرنىڭ ئۈستۈنكى قىرلىرىدا بولسا ئېغىرلىق ۋە
ئاغرىش، جىگەر ئىششىقلارمۇ روشەن ئەمەس. توسىلىش
ئېغىر بولسا بەدەندە ئىششىق كۆرىلىشى مۇمكىن. سۈي -
دۈك ھىقدارىمۇ ئازىيىدۇ. بۇ چاغدا نەپەس قىيىنلىشىش
ۋە ماددىلارنى ئۆزلەشتۈرۈش ئاچارلىشىش ئالامەتلىرى
كېلىپ چىقىدۇ. كېسەلنىڭ رەڭگى ئاقۇش سېرىق بولىدۇ.
جىگەر ياللۇغى بىلەن جىگەر توسىلىشىنىڭ پەرقى شۇكى،
ياللۇغلىنىش قىزىتمىلىق ۋە ئاغرىش كۈچلۈك بولىدۇ.
ئەمما توسىلىش قىزىتمىسىز بولۇش بىلەن ئېغىرلىق
سېزىلىش كۈچلۈك كېلىدۇ.

داۋاسى: توسالغۇ جىگەرنىڭ يۇقۇرقى قىرلىرىدا
بولۇپ، سۈيدۈك ئاز ۋە كېسەلنىڭ مىزاجى ئىسسىق
تەرەپتە بولسا، توۋەندىكى نۇسخە دورىلارنى ئىسكەنجىبىن
بىلەن قوشۇپ بېرىلىدۇ.

نۇسخە: ئارپا بېدىيان، ئوغرى تىكەن، كاسىن
ئۇرۇغى ھەربىرى 4 مىقالدىن، قوغۇن ئۇرۇغى 6 مى -

قال. خاڭكا ئۇرۇغى 5 مىسقال. پىرسىياۋشان 3 مىسقال. ئىت ئۇزۇمى 6 مىسقال. كاسىن يىلتىزى بىر سەر. كاسىن ئۇرۇغى 4 مىسقال. سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى 4 مىسقال مەزكۈر دورىلارنى سوقۇپ 4 سائەت مىقدارى قايناقىغۇغا چىلاپ ئاندىن كېيىن يېرىمى قالغىچە قاي-ئىتىپ سۈزۈپ تەييارلاپ. جىگەر ئۇستىگە چېپىلىدۇ. جۇندە. ئەپەنتىن، رەۋەن چىنىلەرنى سوقۇپ، چىگەي ياكى كاسىن سۈيى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ جىگەرگە چېپىشىمۇ مۇمكىن.

توسىلىش جىگەرنىڭ تۈۋەنكى تەرەپلىرىدە بولسا، كېسەلنىڭ مىزاجىغا قاراپ سۈرگە بېرىلىدۇ. بۇنىڭ تەر-كۈندىكى دورىلار سېرىق ھېلىلە، قارا ھېلىلە، سانا، پۇنۇس، ئىت ئۇزۇمى، ئامىلە، تەمرى ھىندى، تەرەنجە-ۋىل، كاسىن ئۇرۇغى ۋە يىلتىزىدىن ئىبارەت بولۇشى لازىم. ياكى مۇۋاپىق دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىنىدۇ. جىگەردىكى توسىلىشنى ئېچىش ۋە سۈيىدۈك ھەيدەش ئۈچۈن، كېسەلنىڭ مىزاجىغا قاراپ مۆتىدىل ياكى ئىس-سىق خۇسۇسىيەتلىك ئىسكەنجىيىن بۇزۇرى (118-119 - نۇسخىلار) بېرىش ياخشى نەتىجە بېرىدۇ.

غىزالىنىش جەھەتتە، قاننى قويۇقلاشتۇرىدىغان، ئاچار ھەزم بولىدىغان تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش، تېز ھەزم بولىدىغان سويۇق تاماقلارنى بېرىش لازىم.

2. ماسارنىڭ توسىلىشى

ماسارنىقا توسىلىشىغا ئۇنىڭدا ھاسىل بولغان ماددىلار سەۋەپ بولىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى بىرىنچى پەسىلدە سوزلەندى.

ئالامەتلىرى: ماسارنىقا ئورنىدا تارتىشقاندا ك ئاڭ-رىش ۋە ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. ئاغرىش مەئدە ساھەسىدىمۇ سېزىلىشى مۇمكىن. ئەمما جىگەردە ئىششىق ياكى مەئدەدىنىڭ ئۆزىدە بىرەر زەرەرلىنىش تاپقىلى بولمايدۇ. كېسەل بارغانسېرى ئورۇقلايدۇ. توسالغۇنىڭ ھاسىل بولىشى ئاستا داۋاملاشقاندا، بەدەن ئاجىزلاش كېيىنرەك پەيدا بولىشى مۇمكىن. ئەمما مەئدە ساغلام تۇرۇقلۇق ئوڭ تەرەپ قوساقنىڭ كىندىكىگىچە بولغان ئارىلىقىدىكى ئېغىرلىق ۋە ئاغرىش بۇنىڭدىن دېرەك بېرىدۇ.

داۋاسى: جىگەر توسىلىشتا كورستىلگەن توسال-غۇلارنى ئاچقۇچى ۋە ماددىنى سۈيۈلدۈرگۈچى دورىلارنى تاللاپ بېرىش لازىم. مەسىلەن، ئىكەنجىيىنىگە بېدىيان، كاسىن، ئوغرى تىكەن، قوغۇن ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، ئىت ئۇزۇمى، سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى، خاڭگا ئۇرۇغى، سەۋزە ئۇرۇغىنى قوشۇپ قاينىتىپ بېرىلىدۇ.

3. جىگەر كوپۇپ قېلىش

جىگەرگە ناچار ۋە يەللىك تاماقلارنىڭ يېلى پەيدا بولۇپ قېلىپ، قوساق تويغاندىن كېيىن غىزا

ھەزىم بولۇپ كەتكەن چاغدا ئوڭ قوۋۇرغا ئاستىدا تاش-
تىشقانداك ئېغىرلىق ۋە ئاغرىش پەيدا بولىۋالىدۇ. ئەمما
ئاغرىش ئانچە ئېغىر بولمايدۇ ھەم رەڭگى سارغايمايدۇ.
جىگەر ساھەسىدە يەل مېڭىپ يۈرگەندەك سېزىلىدۇ.

داۋاسى: مەجۇنى جەۋارىش كۇمۇنى ۋە شەرۋىتى
دىنارى بېرىلىدۇ (49-120-نۇسخە). ھاجەتكە قاراپ
مۇۋاپىق سۈرگە بېرىلىدۇ. سوغاق سۇ ئىچمەسلىك، ئىچە-
دىغان ئۇسۇلۇقىغا بېدىيان، كاسىن ۋە قىزىل گۈل
ئەرەقى بېرىلىدۇ. تۈز ۋە ئىسسىق كۈل ئېلىپ جىگەرگە
ئىسسىق ئوتكۈزۈش ۋە ئەتىگەندە مۇنچىغا چۈشۈش كېرەك.

4. جىگەر سانجىلىپ ئاغرىش (شوقەتۈلكە بەد) ①

ئالامەتلىرى: كۆپىنچە سەھەردە ئاشتىدىن ئىلگىرى،
قانتىق ئەمگەك ياكى مۇنچىدىن چىقىپلا سوغاق بىر
نەرسە ئىچسە، بىردىنلا ئوڭ تەرەپ قوۋۇرغا ئاستىدا
چىدىغۇسىز سانجىقسىمان ئاغرىق پەيدا بولىدۇ. ئاغرىش-
نىڭ ئالاھىدىلىكى شۇكى تېز باشلىنىدۇ ۋە تېز يوقىلىپ
كېتىدۇ. بۇنىڭغا سەل قارالسا ياكى خاتا گۇمان قىلىنسا
جىگەر ياللۇغى ياكى سۇلۇق ئىششىق كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.
داۋاسى: ماتا ياكى بىر پارچە رەخنى قايناقسۇغا
چىلاپ، دەرھال جىگەر ساھەسىگە قويۇش لازىم. قايناق

① ئادەتتە جىگەر كېسەللىكلىرىنىڭ كۆپچىلىمىدە جىگەردە
ئاغرىش بولىدۇ. بۇ كېسەلنىڭ ئالامەتلىرىدىن بىرى سانجىلىپ
ئاغرىش بۇلاردىن يەرقلەندۈرۈلگەن.

سۇ ئىچكۈزىلىدۇ ۋە سۇمبۇل، مەستىكىلەرنى سوقۇپ، تۇخۇم سېرىقى بىلەن قوشۇپ ئاغرىق بار جايغا قويۇلىدۇ.

3 - پەسىل: جىگەر ئېشىقلىرى

1. جىگەرنىڭ ماددىلىق ئېشىقى

جىگەردىكى ئېشىق خىلىتلار (ماددىلار) سەۋىيە - دىن بولسا بۇ ماددىلىق ئېشىق (ۋەزەمى ماددى) دەپ ئاتىلىدۇ. ئېشىق جىگەرنىڭ دوڭچىسى ياكى ئاستىنقى قىر قىسمىلىرىدا بولۇشى مۇمكىن. ئەمما بەزىدە ھەر ئىككىلا قىسمىنىڭ ئېشىغىمۇ ئۇچرايدۇ. ئېشىقنىڭ قايسى جايىدا ئىكەنلىكىنى توۋەندىكى ئالامەتلەردىن پەرقلەشكە بولىدۇ. مەسىلەن، ئېشىق جىگەر دوڭچىسىدە (يۇقۇرقى قىرلىرىدا) بولغاندا قاتتىق يوتەل، دەم تۇتۇلۇش بىلەن سۇيىدۇك توختايدۇ. جىگەر ئۈستىدە يېرىم ئايىمان ئاغرىيدىغان دائىرە شەكىللىنىدۇ. ئەگەر ئېشىق جىگەرنىڭ توۋەنكى قىرىدا بولسا - كوڭلى ئايىنىش، سەپرا (سېرىق سۇ) قەي قىلىش، قول - پۇت سوۋۇپ كېتىش ۋە ھۇشدىن كېتىش قاتارلىق ئالامەتلەر بولىدۇ. ھەر ئىككىلا قىسمىدا يەنى پۈتۈن جىگەردە ئېشىق بولغاندا قايسى قىسمىنىڭ ئېشىقى كۈچلۈك بولسا، قارشى تەرەپنىڭ ئالامەتلىرى ئانچە روشەن بولمايدۇ. ئەمما ئەتراپلىق كۆرگەندە ئاز - دۇر - كۆپتۈر تېپىلىشى مۇمكىن.

ئالامەتلىرى: (۱) قان ۋە سەپرادىن بولغان جىگەر

ئىششىقلىرىدا ھارارەت، تەشئالىق، جىگەر ئىستىراپىدا ئېغىرلىق سېزىلىش — ئىشتى ئېغىرلىقى ۋە ئىششىقنىڭ بارغانسېرى تۆۋەنگە قاراپ راۋاجلانغانلىقى قاتارلىق ئور — تاق ئالامەتلەر بولىدۇ. قاندىن بولغاندا ئېغىرلىق كۆچ — لۇگىرەك؛ سەپرادىن بولغاندا جىگەردە ئىپچىش ۋە سېرىقلىق كۆپرەك بولىدۇ. بۇلار قان ۋە سەپرادىن بولغان ئىششىقنىڭ ماددىلارغا خاس ئالامەتلىرىدىن ئىبارەتتۇر. ئەمما ئىششىقنىڭ جايلاشقان يېرىگە قاراپ، يۇقۇرقى ئومۇمى ئالامەتلەر بىللە قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بولۇپمۇ بۇ تۈردە ئىششىقنىڭ مەئىدىگە بەرگەن تەسىرى كۈچلۈك بولغاچقا، ھەزىمىنىڭ بۇزۇلۇشى بىلەن بىللە ھېق تۇتۇش روشەن ھالدا ئېغىر كېلىدۇ. كۆپ ھاللاردا، قەۋزىيەت ئېغىر بولغاندا چوڭ ئۆچەي ياللۇغى (قۇلۇنجى) دەپ خاتا گۇمان تۇغۇلىدۇ (چۈنكى ھە ۋە ھېق، ئۆچەي ئاغرىشى بولىدۇ). بۇ چاغدا قۇلۇنجىغا قارشى دورا بەر — گەندە ئېغىر ئاقىۋەتلەر كېلىپ چىقىدۇ. ئەمما ئىششىق ماسارىغا تومۇرلىرىنى توسۇپ ئوزۇق ماددىلىرىنىڭ جە — گەرگە كېلىشى توسىلىپ قالغاندا، ئەكسىچە ئاغرىقنىڭ ئىچى سۈرۈپ كېتىدۇ. ئەبۇ ئەلى ئىبنىسىنانىڭ قارشىچە جىگەر ئىششىقىدىكى ئىچ سۈرۈش ئاغرىقنىڭ ئاقىۋىتى ناچارلىقىنى كۆرسىتىدۇ. تومۇر ھەركىتى قاندىن بولغاندا چوڭ ۋە تېز، سەپرادىن بولغاندا ئىچىك ۋە تېز بولىدۇ.

سەپرادىن بولغان ئاغرىقلارنىڭ سۈيىدۈكى يالقۇن رەڭلىك،
قاندىن بولغانلاردا بولسا قىزغۇش رەڭدە كېلىدۇ.
داۋاسى: ئوككەل ۋە باسلىق تومۇرىدىن قان
ئېلىنىدۇ. قاننى كېسەلنىڭ ئومۇمى ئەھۋالىغا قاراپ ئاز-
ئازدىن بىرقانچە قېتىم ئېلىش لازىم. قان ئېلىپ بول-
غاندىن كېيىن، كاسىن، ئىت ئۇزۇمىنى قاينىتىپ سۇ-
يىنى ئانار شەرىۋىتى (47-نۇسخە) ۋە قەن بىلەن
تەييارلىغان ئىسكەنجىبىنلەر بىلەن قوشۇپ بېرىلىدۇ
(سەپرادىن بولغانلىرىدا قان ئېلىنمايدۇ). ئانار شەرىۋىتىنى
يالغۇز ھالدا ياكى باشقا قورغۇچى مۇۋە سۇلىرى، مە-
سىلەن، بىيە ۋە ئالما سۇلىرى بىلەن بىللە بېرىشكە
بولمايدۇ.

ئىششىق جىگەرنىڭ توۋەنكى قىسمىدا بولغاندا،
سۈيىدۈك ھەيدىگۈچى تەسىرگە ئىگە دورىلارنى بەرمەستىن
ئىچىنى يۇمشاق تۇتۇشقا دىققەت قىلىش لازىم. ئەگەر
قەۋزىيەت كۈچلۈك بىرىلسە، كاسىن ئۇرۇغى ۋە ئىت ئۇزۇ-
مىنى قايناتقان سۇدا پۇنۇس، خىيارشەنبەرنى ئېرىتىپ
سۈزۈپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. دورا مىقدارى كېسەل ئەھ-
ۋالىغا قاراپ بولسا بېرىلسە ياكى ھوقنە قىلىسمۇ بولىدۇ.
ئىششىق جىگەرنىڭ ئۈستۈنكى قىسمىدا بولغاندا،
سۈيىدۈك ھەيدىگۈچى دورىلارنى بېرىش بىلەن تەرەتنىڭ
ئېتىدالدا بولۇشقا دىققەت قىلىدۇ. ئارپا سۈيى ۋە
ئىسپۇغۇل لۇئابى بېرىلىدۇ.

سەرتتىن چېپىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ئىششىق قاتتۇرۇپ
غۇچى (راۋادىيات) لاردىن ئارپا ئۇنى، ئاق سەندەل كېپىكى،
گۈلاپ، كاسىن سۈيى قاتارلىقلارنى باراۋەردىن ئېلىپ، جە-
گەر ساھىسىگە چېپىلىدۇ. ئەگەر ئېچىشىپ ئاغرىش كۈچلۈك
بولسا، بۇ خىلدىكىلەرگە بىر ئاز كاپۇر قوشۇش كېرەك.
ئۇندىن كېيىن تارقاتقۇچى دورىلار (مۇھەللىلەر)نى چېپىش
كېرەك. مەسىلەن، بابۇنە، ئەكىللىلىك، زىغىر، شۇمشە،
ئەنجۇر، گۈل بىنەپشە قاتارلىقلارنى باراۋەر مىقداردا
ئېلىپ، بىر ئاز ئەمدەپ جىگەر ساھىسىگە چېپىلىدۇ،
ئىچى سۇرۇپ كېتىش ئەھۋاللىرى بولسا، توۋەندىكى قۇرس
دورىنى بېرىش كېرەك.

تاباشىر، قىزىلگۈل، زىرىخ ھەر بىرى 5 مىسقال
دىن يۇيۇلغان لەك (لەكى مەغسۇل) 1 مىسقال، زىرا-
ۋەن 1 مىسقال، زەپەر $\frac{1}{2}$ مىسقال، دورىلارنى يۇم-
شاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ سۇ بىلەن بىر مە-
قالدىن قۇرس تەييارلاپ سايدا قۇرۇتۇپ، كۈنىگە بىر
دانىنى ئانار شەرىۋىتى ياكى زىرىخ شەرىۋىتى (47-89-
بىلەن) بېرىلىدۇ.

2) بەلغەم ماددىسى كۆپ بولغان جىگەر ئىششىق
خىنىڭ ئالاھىدە ئالامىتى شۇكى، جىگەر ساھىسىنىڭ ئاغ-
رىشىغا قارىغاندا، ئېغىرلاشقانلىق سېزىمى ئارتۇق بول-
دۇ، رەڭگى ئاقۇش، تەرىتى دائىم ئاق، يۇمشاق كېلىدۇ.
تەشەنلىق بولمايدۇ. ئاغرىق ئىسوزى ھارغۇنلۇق ھەس

قىلىپ، روھى كەيپىياتى ئىزىلەڭگۈ بولىدۇ. ئىششىق جىگەرنىڭ يۇقۇرقى ياكى توۋەنكى قىسمىدا بولغانلىق ئالامەتلىرى 1) تارماقتىكى بىلەن ئوخشاش.

داۋاسى: ئىششىق جىگەرنىڭ يۇقۇرقى دوڭچىسىدە بولسا، سۇيىدۈك ھەيدىگۈچى دورىلاردىن قىزىل گۈل، رۇم-بېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى 3 مىسقال، ئارپا بېدىيان يىلتىزى، كاسىن يىلتىزى 5 مىسقالدىن، ئىزخىر، مەستىكى، جۇۋىنە، سۇمبۇللارنى 2 مىسقالدىن ئېلىپ چالا سۇقۇپ، ئېھتىياجغا لايىق سۇ بىلەن قاينىتىپ سۇزۇپ، ئوزنى يالغۇز ياكى ئىسكەنجىپىن بۇزۇرى بىلەن قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئەگەر ئىششىق ئاستىنقى قىسمىدا بولسا، ئايارەج پەيقارا (16-نۇسخە)دىن 1 مىسقال، غارىقۇندىن 1 مىسقالدىن قوشۇپ ھەب قىلىپ يىيىش كە بېرىلىدۇ. ياخشىسى ھوقئە قىلىش لازىم. ياكى كەچ-تە ئايارەج بىلەن غارىقۇننى بىر مىسقالدىن بېرىپ ئەتىگەندە قۇرسى ئەپسەنتىن (128-نۇسخە) ياكى قۇر-سى رەۋەن (124-نۇسخە) بېرىلىدۇ.

3) سەۋدا ماددىسى كۆپ بولغان جىگەر ئىششىقىدا سەپرانىڭ جىگەردە تۇتۇلۇپ قېلىشى بىلەن ئىششىق باشقا تۈردىكىلەرگە قارىغاندا قاتتىق بولۇپ، جىگەرنى سىرتتىن تۇتۇپ كۆرگەندە قولغا قاتتىق بىلىنىدۇ. تەشەنلىق بولمايدۇ. ئېغىز قۇرۇيدۇ، ھارارەت بەزىدە بار، بەزىدە يوق، بەدەن قارامتۇل سېسىق رەڭدە بولىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن، ھەر ئىككى ئايىدىن، كاسىن ئۇرۇغ، چىڭسەي ئۇرۇغى، گازى ۋان ۋە ئاۋاتلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ قاينىتىپ بېرىلىدۇ. سىرتتىن سۈركەشكە مۇم يېغى بېرىلىدۇ. ياكى تەۋەندىكى تەركىپنى تەييارلاپ سىرتتىن جىگەر ساھىبىغا چېپىلىدۇ. شۇمشە، ئەنجۈر، مۇقىل، ئۇشەق، ئەكلىل مىلىك، ئاق سەندەل كىپىكى، سۇمبۇل، ئاق موم، گۈل يېغى. ئاق مومنى گۈل يېغىدا بىر ئاز قىزىتىپ ئېرىتكەندىن كېيىن، قالغان دۆرىلەرنى يوشاق سوقۇپ ياغ بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. سەۋدانى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن مائىل ئۇسۇل ياكى مەتبۇخى ئەپتى-ئۇن بىلەن مەجۇنى نۇجاھ (121-125 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. بەزىلەر بىر ياشلىق توگە سۈتىنى قەن بىلەن بېرىشنى ياكى 3 مىسقالدىن سېرىق ھېلىلە، قارا ھېلىلە، بىر مىسقالدىن چىڭسەي ئۇرۇغى، رۇمبىدىيان ئېلىپ سوقۇپ، كۈنگە بىر پىيالە سۈت بىلەن بېرىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ.

4) يىقىلىش ياكى ئۇرۇلۇش بىلەن بولغان جىگەر ئىشقىلىرىدا، دەرھال بىر ئاز قان ئېلىۋېتىش بىلەن، ئىسپۇغۇل لۇتئابغا بىر مىسقال گىلىئەرمىنى قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئۇلدىن كېيىن رەۋەن، ئوردان، دارچىنلارنى بىر مىسقالدىن ئېلىپ، يوشاق سوقۇپ تالقانلاپ، بىر مىسقال تالقاننى شەرتى بىنەپشە (74 - نۇسخە) بىلەن

بېرىلىدۇ. ئەبوتەلى ئىبىسسا ئۆز تەجرىبىلىرىدە بۇ خىل
دىكى جىگەر ئىششىقلىرىدا زىراۋەن، گىلى تەرمىنى ۋە
ھەبۇل ئاس ئىچكۈزۈشنىڭ ياخشى نەتىجە بەرگەنلىكىنى
يازغان. سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن 122 - 123 - نۇسخى
لاردىكى چېپىلىدىغان دورىلاردىن بىرى بېرىلىدۇ.

2. قورساق كىرگىت گۆشلىرىنىڭ ئىششىقى (ۋەدەمى ئەزلى بەتمى)

بۇ كېسەل جىگەر كېسەللىكلىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك
ئەمەس، لېكىن كەيپىيات ۋە ئورلى جەھەتتىن جىگەر
ئىششىقلىرى بىلەن ئوخشاش بولغاچقا جىگەر
كېسەللىرى بىلەن، خۇسۇسەن جىگەر ئىششىقلىرى بىلەن
ئارىلاشتۇرۇپ قويماسلىق ئۈچۈن (بولۇپمۇ قورساق ئوڭ
تەرەپ كىرگىت گۆشلىرىنىڭ ئىششىقىنى) ئالاھىدە بىر
پەسىلدە تونۇشتۇرۇلدى. قورساقنىڭ ئاق كىرگىت گۆشلىرى
ئۇزۇنسىغا جايلاشقان بولۇپ، بۇلاردىكى ئىششىقمۇ
ئۇزۇنسىغا ئۇرۇنلىشىدۇ. بەزىدە بىر تەرىپى
توم، يەنە بىر تەرىپى ئىنچىكە خۇددى چاشقان
قوپىرغۇسىدەك شەكىل پەيدا قىلىدۇ. ۋە سىرتتىن
روشن كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ ياكى قىل بىلەن سىلاپ كۆر-
گەندە سېزىلىدۇ. ئىششىق ئوڭ تەرىپتە بولسا، ھارارەت
ۋە ئاغرىش جىگەر ئىششىقىنى ئەسلىتىدۇ. ئەمما جىگەر
ئىششىقى ئوڭ تەرەپ قورساق ئاستىدا يېرىم ئايىسىمان
ئاغرىشلىق دائىرە شەكىللىنىپ، تاپقاندىلا بېلىنىدۇ. ۋە

جىگەر ئىششىغىنىڭ يۇقۇرىدا كورسىتىپ ئوتۇلگەن سۇيا-
دۈكتىكى ئوزگىرىش، ئىشتەي تۇتۇلۇش ۋە باشقا ئالا-
مەتلىرى بار بولىدۇ، لېكىن قوساق كىرگىت گۈشلىرى
ئىششىقلىرىدا جىگەر خىزمىتىگە ئائىت ئالامەتلەر بولمايدۇ.
داۋاسى: سۈرگە بېرىلىدۇ، ئۇندىن كېيىن شور-
خۇچى ۋە تارقاققۇچى دورىلارنى سىرتتىن چېپىلىدۇ.
ماددىسى پىشقاندىن كېيىن ئەگەر يىرنىڭ يىغىلىغا تىغ
بىلەن يىرنىڭ چىقىرىلىدۇ. بۇ چارىلار كىچىكى قالسا
ماددىنىڭ باشقا ئەزالارغا تارقاپ كېتىش ياكى يىرنىڭ
خالىسى يېقىن ئەزالارغا ئېغىز ئېلىش خەۋپى بار،
بۇ يامان ئاقىۋەتلەرگە سەۋەپ بولىدۇ.

3. جىگەرنىڭ يىرىڭلىق ئىششىغى (دۈبەيە تۈلكەبەد)

جىگەرنىڭ ئىسسىقلىقتىن بولغان ئىششىقلىرى تارقاپ
كەتمەي ئۇزۇن تۇرۇپ قالغاندا، يىرىڭلىق خالتىسىمان
ئىششىقلارغا ئايلىنىدۇ، مەئىدىدىكى يىرىڭلىق ئىششىقلار
بىلەن ئوخشاش ئوزگىرىشلەرنى بېرىدۇ.

ئالامەتلىرى: يۇقۇرى قىزىتما، يۈز قىزىرىش،
ئاغرىش، تەشەللىقنىڭ كۈچلۈك بولۇشى، ئىشتەي تۇتۇ-
لۇشلار كورۇلىدۇ، جىگەرنىڭ ئاغرىشى سانجىقىسىمان
بولۇپ، كېسەل ئوڭدا ياتقاندا ئاغرىش ئېغىرلىشىدۇ،
بارغانسېرى ئۆپكە ۋە مەئىدىلەرگىمۇ تەسىر بېرىدۇ، كۆپىنچە
چە ئۆچەي ياكى مەئىدىگە ئېغىز ئېلىپ يىرنىڭ چىقىدۇ،

داۋاسى: ئەگەر مەننى ئىلىنىدىغان ئەھۋاللار بول
مسا، قان ئېلىش، ھىجامەت قويۇش لازىم، مەدە
ئۇچەي تەرەپكە مايىل بولسا يەڭگىل سۈرگە دورىلارنى
بېرىش كېرەك، بۆرەككە مايىل بولسا، كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن
سۇيىدۇك ھەيدىگۈچى دورىلاردىن بېرىلىدۇ، سىرتتىن جىگەر
ئىشىشىدا كۆرسىتىلگەن ئىششىق ياندۇرغۇچى دورىلار
چىپىلىدۇ، بۇ چاغدا تازىلاش مەقسىدى بىلەن قەن سۈيى،
گۈلەپ ياكى ئىسكەنجىنلەرنى يالغۇز ياكى ئاداپا سۈيى
بىلەن ئىچكۈزىلىدۇ، تۈز ۋە ئەگرى خاڭكا ئۇرۇقلىرى،
قوغۇن ئۇرۇغى، كۆكنار شىرىلىرىنى چىلان ياكى نىلۇفەر
شەرىۋىتى بىلەن بېرىلىدۇ، جىگەرنىڭ ئەسلىگە كىلىشىنى
تېزلىتىش ئۈچۈن، ئەت ئالدۇرىدىغان دورىلاردىن كۈن
دۈر بىلەن خۇنسىياۋشان، كاسىن ۋە جىڭسەي ئۇرۇقلە-
رنى ئىسكەنجىبىن، مائىل ئۇسۇللاردىن بىرى بىلەن
بېرىلىدۇ.

4. جىگەرنىڭ تارتىشىشى (خەفەتۈلكە بەد)

بەدەن تېرىسى ياكى قاپاقنىڭ لىكىلداپ تارتىدۇ-
دەك بىرخىل سېزىم جىگەردە سىزىلىدۇ. بۇ تىبابەتتە "خە-
فەتۈلكە بەد" دەپ ئاتىلىدۇ. جىگەردىكى توسالغۇلار سە-
ۋىبى بىلەن پەيدا بولىدىغان بىرخىل كېسەللىك بولۇپ
ناھايىتى ئاز ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: كېسەل كىشى جىگەر ساھەسىدە يۇقۇرىدا
ئېيتقانداك بىر سېزىم سېزىش بىلەن تەڭ جىگەردە ئاغ-

دەق ھەس قىلدۇ. جىگەرگە بىرنەرسە سانچىلغاندەك ئىزدەپ
لىدۇ، پىشانىسى تەرنەيدۇ، تېز پەيدا بولۇپ، تېز يوقاپ
كېتىدۇ. ئۇلدىن باشقا جىگەر توسىلىشىنىڭ بەزى بىر
ئالامەتلىرى بىللە كېلىدۇ.

داۋاسى: توسالغۇنى ئىچىش ئۈچۈن ئىسكەنجىيىن
بۇزۇرى موتىدىل (118 - نۇسخە) گە ئالاھىدە مامىران
چىنى، زەپەر، رەۋەن ۋە زىرخىلەرنى قوشۇپ بېرىلىدۇ.
جىگەرنى خىلىتلاردىن تازىلاش مەقسىدى بىلەن ئىزخىر،
بابۇنە، شاتەرە، ئەپەنتى ۋە غاپەسلەرنى مۇۋاپىق
مىقداردا قوشۇپ بېرىلىدۇ.

5. جىگەر (ئوتتە) تاش پەيدا بولۇش

جىگەردە تاشلارنىڭ پەيدا بولىشىدىكى سەۋەب
سەپرا (ئوت) يوللىرىدىكى توسالغۇلار تۈپەيلىدىن ئوت -
نىڭ ياخشى راۋان بولماي، تەدرىجى ئۇنىڭ تەركىپى -
رى چۆكۈشتىن ئىبارەتتۇر. يەنە باشقا سەۋەپلىرى
بىرەكتە تاش پەيدا بولۇش سەۋەبى
بىلەن ئوخشاپ كېتىدۇ (بىرەك كېسىلىگە قاراڭ).

ئالامەتلىرى: تاماق مەئىدە تولۇق ھەزىم بول -
غاندىن كېيىن ھاسىل بولغان كەيلىس جىگەرگە شىمە -
رىلىپ ئوتكەن چاغدا كوڭلى ئايىنىش بىلەن قەي -
لىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تەڭ جىگەر ساھەسىدە قاتتىق
سانجىقسىمان بىر ئاغرىق سېزىلىدۇ. بۇ تۇتاقلىق بو -

لۇپ، ئاغرىش بەزىدە يەڭگىل، بەزىدە ئېغىر بولىدۇ.
ئوڭ تەرەپ باسلىقتىن ئالغان قان تېگىدە قۇم تېپىلىدۇ.
داۋاسى: قوغۇن ئۇرۇغى، ئوغرى تىكەن، پىرسياۋشان،
چىگىيە ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان، بېدىيان يىلتىزى، كاسىن
يىسلىتىزى قاتارلىقلارنى قاينىتىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.
تاشنى پارچىلاپ چىقىرىش ئۈچۈن بورەكتىكى تاشنى
چىقىرىش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ (بورەكتىكى تاش، قۇم
كېسىلىگە قاراڭ).

6. جىگەرنىڭ كىچىكلىشىپ قېلىشى (ھىزالىكە بەد)

جىگەر ئۆز ئەسلىدىكى ھالىدىن ئۈزگىرىپ قېتىپ
كىچىكلىشىپ قالىدۇ. بۇ جىگەرنىڭ ياللۇغلىنىشى ۋە
ھەرخىل زەرەرلىنىشلىرىنىڭ ئاقىۋىتىدۇر.
ئالامەتلىرى: جىگەر بار تەرەپتە ئېغىرلىق سېزىش،
سانجىقسىمان ئاغرىشلار كېلىپ چىقىدۇ. ھەزىم ناچار-
لىشىدۇ. كېسەل قانچە ياخشى ئوزۇقلانسىمۇ كۈندىن-كۈ-
لگە ئورۇقلانمايدۇ، ئىچى سۇرۇپ تۇرىدىغان بولۇپ قالىدۇ.
داۋاسى: ئوزۇقلىنىش جەھەتتە مىقدارى ئاز،
قەۋۋىتى كۆپ غىزالارنى مەسلەن، قۇش گۆشلىرىنىڭ
شورپىسى - قاتارلىقلارنى بېرىش لازىم. يۇمشاققۇچى ۋە
تارقاققۇچى دورىلارنى سىرتتىن چېپىلىدۇ. ئىچىدىن
بېرىدىغان دورىلارمۇ مۇشۇ ئاساستا بولۇپ، شەرۋىتى بۇ-
زۇرى (101 - نۇسخە)، مائىل ئۇسۇل (121 - نۇسخە)،
ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

7-جىگەر كېسىلى سەۋىيىدىن بولىدىغان ئىچى سۇرۇشلەر

جىگەرنىڭ ھەرخىل زەرەرلىنىشلىرى تىۋەندىكىچە بىرقانچە خىل ئىچى سۇرۇشلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇلار ئالامەت ياكى داۋاسى جەھەتتىن، شۇ خىلدىكى جىگەر زەرەرلىنىشى بىلەن ئوخشاش بولغاننىڭ سىرتىدا، ئايرىم ھاللاردا مەلۇم ئالاھىدىلىكلىرىمۇ بولىدۇ.

(1) جىگەردىن بولغان يىرىڭلىق ئىچ سۇرۇش: جىگەرنىڭ يىرىڭلىق ئىششىقى ئۈچەيگە ئېغىز ئېلىش سەۋەپ بولىدۇ. بۇ چاغدا جىگەر يىرىڭلىق ئىششەننىڭ ئالامەتلىرى بولغاندىن تاشقىرى، ئىچى سۇرۇش دە يىرىڭلىق تەرەت كېلىدۇ. بۇ ھەل ئەھۋال مەئىدىنىڭ يىرىڭلىق خالتىسىمان ئىششىقىمۇ كۆرۈلىدۇ. پەرقى شۇكى جىگەردىن بولغاندا تەرەت سېسىق پۇرايدۇ، مەئىدىدىن بولغاندا بەك سېسىق پۇرايدۇ، قۇساق ئاغرىيدۇ. داۋاسى جىگەر يىرىڭلىق ئىششىقى بىلەن ئوخشاش.

(2) جىگەردىن بولغان گۆش يوغان سۈدەك ئىچ سۇرۇش: چوڭ تەرەت گۆش يوغان سۈدەك كېلىدۇ. سەۋىيى جىگەرنىڭ ئۇزۇق ماددىلارنى شىمىرىش قۇۋۋىتىنىڭ بۇزۇلىشىدىن ئىبارەتتۇر. بۇ خىلدىكى ئىچ سۇرۇشنى ئەبۇئەلى ئىبىنسىنا ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى ھۆكۈمالار قۇرۇق

ئۈزۈم ئۇرۇغى بىلەن داۋالاپ ساقايتقانلىقىنى يازغان.
ئىچ سۈرۈشنى توختاتقۇچى باشقا دورىلار نەتىجە بەر -
مەستىن ئۈزۈم ئۇرۇغى ياخشى نەتىجە بېرىدۇ.

(3) جىگەردىن بولغان قانلىق ئىچ سۈرۈش: جىگەر
سەۋىيىسىدىن قاننىڭ ئۆتمۈرلەرگە قان تولۇپ كېتىپ، ئۇچەي
ئۇششاق تومۇرلىرى يېرىلىپ قان ئارمىلاش ئىچ سۈرىدۇ.
كورىلىدىغان چارىلار مۇنداق: ئاغرىقنىڭ قول - پۇت ۋە
ئىچكىلىرى تېگىلىدۇ. قۇرسى كەھرىبا (71 - نۇسخە)
دىكى دورىلارغا بىر مىسقال رەۋەن قوشۇپ تەييارلاپ
پاقا ئورماق ئۇرۇغى ۋە سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى
بىلەن بېرىلىدۇ. غىزانى ئاز - ئاز مىقدار بىلەن بېرىش
لازم ۋە شەرۋىتى ئەنجىبار (72 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.
بۇلاردىن باشقا يەنە جىگەردىكى سەپىرا ۋە سەۋ -
دانىڭ كۆپلىكى سەۋىيىسى بىلەن ئىچ سۈرۈشمۇ مۇمكىن.
بۇ چاغدا تەرەتتە سەپىرا ۋە سەۋداغا خاس ئالامەتلەر
بىلەن بىللە جىگەرنىڭ شۇ خىلدىكى زەرەرلىنىشلىرى
مەۋجۇت بولىدۇ. جىگەرنىڭ سەپىرا ۋە سەۋدا سەۋەپلىك
بولغان بۇزۇلۇشلىرىغا چارە كۆرۈلسە ئىچى سۈرۈشمۇ
توختاپ قالىدۇ. بەزىلەر مەجۇنى پودىنە (126 - نۇسخە)
بېرىشنى تەكلىپ قىلىدۇ.

جىگەر زەرەرلىنىشىدىن بولغان ئىچ سۈرۈشلەر بىلەن
ئۇچەي زەرەرلىنىشىدىن بولغان ئىچ سۈرۈشنى توغرا پەرق
ئەتمەكتەندە داۋالاش توغرا بولماي كېسەل ئازاپلىنىپ

ناچار ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تۈۋەندىكى بىرقانچە جەھەتلەرگە قاراپ پەرقلەش كېرەك.

(1) ئومۇمەن جىگەردىن بولغانلىرىدا مەندە ياكى ئۈچەيدە ئالاھىدە زەرەرلىنىش بولمايدۇ؛ مەندىدىن بولغانلىرىدا جىگەر خىزمىتى ساغلام بولىدۇ.

(2) ئۈچەيدىن بولغان ئىچ سۈرۈشلەردە قوساقتا تولىغاپ ئاغرىش قاتتىق بولىدۇ. جىگەردىن بولغانلىرىدا ئاغرىش بولمايدۇ.

(3) جىگەر سەۋىيىدىن بولغان قانلىق ئىچ سۈرۈشتە يەل بولىدۇ، ھەمدە ئارنلاپ ئۈزلىگىدىن توختاپمۇ قالىدۇ. ئەمما ئۈچەي سەۋىيىدىن بولغاندا ئىچ سۈرۈش دورىسىز توختىمايدۇ.

(4) جىگەر سەۋىيىدىن بولغان ئىچ سۈرۈش ئۇزۇنغا سوزۇلىدۇ، كېسەل ئورۇقلاپ كېتىدۇ. ئۈچەيدىن بولغاندا مۇددەت قىسقا ۋە ئۆتكۈر بولىدۇ.

(5) جىگەردىن بولغان ئىچ سۈرۈشتە قان كەلگەندە سېسىق پۇرايدۇ ۋە تولغاق بولمايدۇ. قان ساپ ھالدا تامچىدەك كېلىدۇ. بەزىلەر بۇنى بوۋاسىر نەتىجىسىدىكى قاناش دەپ خاتا گۇمان قىلىدۇ. ئۈچەيدىن بولسا سېسىق بولمايدۇ ۋە تولغاپ ئاغرىيدۇ.

سۇلۇق ئېشىقلار

سۇ ئالمىشىشنىڭ بۇزۇلۇشى (سۇ ئىلقۇنىيە)

بۇ پۈتۈن بەدەننىڭ سۇلۇق ئېشىق (ئىستىسقا) نىڭ دەسلەپكى باسقۇچىدىن ئىبارەت.

سەۋىبى: جىگەرنىڭ مىزاجى بۇزۇلۇش، جىگەر
زەئىپلىكى ۋە ھەزىمنىڭ ئاچارلىغى؛ ئەمگەك قىلماسلىق؛
ھېيزنىڭ توختاپ قېلىشى.

ئالامەتلىرى: چىرايى ئاق سېرىق رەڭگە كىرىپ
قالىدۇ. يۈز، قاپاقلار بىرئاز ئىششىدۇ ۋە بوشىپ
قالىدۇ. پۈتۈن بەدەن ماغدۇرسىزلىنىدۇ، تاماق ھەزىم
قىلىشى بۇزۇلىدۇ. كېيىنچە ئىششىق خېمىردەك يۇمشاق-
لىشىپ قول - پۇتلارغىچە يېتىپ بارىدۇ. قوساق ئېس-
لىدۇ، يىل بولىدۇ ۋە چوڭ تەرەت سانى كۆپىيىدۇ. چىش
مۇلكلىرى ئاقىرىپ كالىپۇكلار جاراھەتلىنىدۇ (يېرىلىدۇ)
تاماقنى كېيىنلا تەرەت قىستايدۇ.

داۋالاش: دەسلەپكى دەۋرلىرىدە بەدەندە كېرەكسىز
سۇيۇقلۇقنىڭ يىغىلىپ قالماسلىقى ئۈچۈن ھەركەت قىلىش،
يول مىڭىش قاتارلىق تەن ھەرىكەتلىرىنى قىلىش لازىم.
بەدەننى ماددىدىن تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا (16) -

نۇسخە، ھەبىبى غارىقۇن (62 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. شەرى-
ۋىتى ئەپسەنتىن II (127 - نۇسخە) نىڭ مەلۇماتى زور.

بۇلارنى بەرگەندىن كېيىن سۇيۇق ماڭدۇرغۇچى دورىلارنى
بېرىش لازىم. توغرىغۇ، تۇر، گۈڭگۈرتلەرنى سالغان ئىس-
سىق سۇغا كىرىپ يۇيۇنۇش كېرەك. دائىملىق ئىچىش

ئۈچۈن كاسىن ئىرەق ۋە بىدىيان ئىرەقى بېرىلىدۇ.
غىزاسى تاتلىق تەملىك بولۇشى ۋە دارچىن، زەپەر، پىلىپىل

ۋە مەستىكىلەرنى قوشۇپ بېرىش كېرەك. ھېيزنىڭ توختاپ

قىلىشىدىن بولسا، مەنىنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار بولمىسا
قان ئېلىش مۇمكىن. لېكىن قان ئالىغان ياخشى. ماددىنى
سۈرگۈچى دورىلاردىن ئايارەج يەيقارا (16 - نۇسخە)، مەتبۇخى
ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە)، شەرۋىتى ئەپسەنتىن (91 -
نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇ كېسەلگە يۇقۇرقى چارىلار بىلەن
بىللە مەنىدىنى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلارنىمۇ بېرىش كېرەك.

سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقا)

ئىستىسقا دېگەن سۆز پۈتۈن بەدەن سۇلۇق ئىش-
شىقىنىڭ ئومۇمى ئاتالمىسى بولۇپ، بۇ بەزىبىر ئالاھىدە
ئالامەتلىرىگە قاراپ گوش سۇلۇق ئىششىقى (ئىستىسقاى
لەھمى)، قىسقۇچى سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقاى زىققى)
ۋە ناغراسمان سۇلۇق ئىسسىق (ئىستىسقاى تەبەلى) دەپ
3 قىسىمغا بۆلىنىدۇ. گوش سۇلۇق ئىششىقىدا ماددا
بەدەننىڭ ئۈزە قىسمىدا بولسا، باشقا ئىككى خىلىدا
ئىششىق چوڭقۇر قاتلاملاردا بولىدۇ.

سەۋىيى: سۇلۇق ئىششىقىنىڭ ئورتاق سەۋەپلىرى
بار بولۇپ، تۈۋەندىكىچە بىرقانچە خىلغا مەركەزلەشيدۇ:
(1) جىگەرنىڭ ئومۇمى زەئىپلىكى، جىگەر مىزا-
جىنىڭ بۇزۇلۇشلىرى.

(2) بەدەندىن كۆپ قان كېتىش ياكى ئادەتتە
مېڭىپ تۇرغان قانلارنىڭ (مەسىلەن، ھېيىزنىڭ) توختاپ
قىلىشى.

(3) جىگەرنىڭ خوشنا ئەزالىرى (يۈرەك، مەئدە، تال ۋە ئۈپكە)دىكى زەرەرلىنىشلەرنىڭ جىگەر خىزمىتىگە تەسىر بېرىشى.

(4) پۈتۈن بەدەنلىك ئىسسىق مىزاج بۇزۇلۇشلۇق ئاغرىقلار

گوش سۇلۇق ئىششىقى (ئىستىسقايسى لەھمى)

ئالامەتلىرى: پۈتۈن بەدەن تولىۋىدىن چىققان ئاندەك بوشاڭ ۋە كۆپۈشكەن بولۇپ، بارماق بىلەن باسقاندا ئويمانلىشىپ ئۇزۇن ۋاقىتقىچە ئىسلىگە قايتمايدۇ. باسقان جاينىڭ قېنى قاچىدۇ (ئاقىرىپ قالىدۇ). تامانى ھەزىم قىلىش بۇزۇلىدۇ. ئېغىز ئىچى ئاچچىق بولۇپ، ئادەتتە سۇيۇك ئاق، تەشەنلىك كەم ۋە چوڭ تەرەت راۋان بولىدۇ. ئەمما ھارارەت بىلەن بولغاندا تەشەنلىك كۈچلۈك ۋە سۇيۇك قىزىل كېلىدۇ. يىغىلغان سۇيۇقلۇق شىرىلىك ۋە سوزۇلۇشچان بولىدۇ. بۇ ئالا-مەتلەر جىگەرنىڭ زەرەرلىنىش دەرىجىسىگە قاراپ ئېغىر ياكى يېنىك بولىشى مۇمكىن.

داۋاسى: ئىسلى سەۋىيىنى يوقىتىش — مەسىلەن، مەئىدىدىن بولسا، قەي بىلەن ماددىنى تازىلاپ گۈلەن بىلەن رۇمبىدىيان يىگۈزۈش كېرەك. جىگەرنىڭ مىزاجىنى ئۆزگەرتىش، مەسىلەن، سوغاق تەرەپتە بولسا ئىسسىقلىققا ئۆزگەرتىش كېرەك. ئۇنىڭ ئۈچۈن داۋائىل كوركەم (188 - نۇسخە)، تەرياق ئەربەئە (117 - نۇسخە)دىن

بىرىنى بېرىش مۇمكىن. سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن جىگەر
نىڭ سوغاق مىزاجلىق كېسەللىكىدە كورسىتىپ ئۆتۈلگەن
ئىسسىق دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. ئەمما بەك ئىسسىق دورى-
لارنى ئىشلەتمەسلىك كېرەك. سۈرگە دورىلار بېرىشكە
ھاجەت بولسا ھەببى رەۋەن (128 - نۇسخە) جىگەر
كېسىلى ۋە ئىستىسقا ئۈچۈن خاس دورىدۇر. ئىچىشكە
جۇۋىنە، رۇمبىدىيان سۈيى بېرىلىدۇ. ئەگەر ئىستىسقا
ئىسسىقتىن بولۇپ قىزىتمىسى بولسا، ئالدى بىلەن، ھا-
زارەتنى پەسەيتىش چارلىرىدىن جىگەر كېسەللىكىدە
كورسىتىلگەنلەر قىلىنىدۇ. كاسىن سۈيى بىلەن توگە
سۇتنى ئىچكۈزىلىدۇ. تەجرىبىلەرگە قارىغاندا كاسىن ھول
يوپۇرمىقى سۈيىنىڭ بۇ جەھەتتە مەنپەئەتى بەك ياخشى.
بىنەپشە شەرۋىتى بېرىلسىمۇ بولىدۇ. يۈتەل بولسا زۇپا
شەرۋىتى (10 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئىششقىنى قايتۇرۇش
ئۈچۈن، داۋاملىق بېرىدىغان دورىلاردىن شەرۋىتى بۇزۇرى
II (130 - نۇسخە)غا ئىت ئۇزۇمى قوشۇپ تەييارلاپ
بېرىش كېرەك (شەرۋىتى بوزۇرنىڭ I سى سوغاقتىن
بولغان ئىستىسقاغا بېرىلىدۇ). ئىچىدىغان سۇنىڭ مىق-
دارىنى چەكلەش لازىم. ئەڭ ياخشى ئۇسۇلۇقىغا ئارپا
بېدىيان ياكى كاسىنى ئەرەقلىرىنى بېرىش كېرەك. ئانار
بېرىش تەشۋالىقنى پەسەيتىپلا قالماستىن، بەلكى ئىستى-
قاننىڭ ئوزىگىمۇ ناھايىتى پايدىلىق. بەزى رىۋايەتلەرگە
قارىغاندا، پەقەت ئانار بىلەنلا ئىستىسقا ساقىيىپ كەتكەن.
بەزىلەر كۈنىگە بىر مىسقال تەرياقى فارۇق (186 -

ئۇسخە)، مائىل ئۇسۇل، (105 - ئۇسخە) بىلەن بېرىشنى تەۋسىيە قىلغان. سۇيۇقلۇقنى شىمىرتىش ئۈچۈن، سىرت-تىن دورا چېپىش ياكى تەرلىتىپ چىقىرىش چارىلىرىنى ئويلاپ بېقىش كېرەك. مۇۋاپىق بولغانلىرىدىن بىرىنى تاللاپ ئىشلەتسە بولىدۇ. مەسىلەن، مۇنۇ دورىلاردىن بىرىنى قىلسا بولىدۇ:

(1) توغرىغۇ بىلەن بابۇنە يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ بەدەنگە سۈركەش كېرەك.

(2) تۈزلى يۇمشاق سوقۇپ، كالىنىڭ چاۋا يېغى، بادام يېغى، دارچىن، زىراۋەن، سەلىخە، قەسبۇسۇرە، گۈل سوسەن يېغىنى بىرىكتۈرۈپ ماي تەييارلاپ سۈر-كىلىدۇ.

(3) شۇمشە تالقىنى، كەپتەر مايىغى، كويىكى دەريا، مەستىكىنى سىركىدە ئىزىپ پۇتۇن بەدەنگە چې-پىش كېرەك.

(4) كالا تېزىكى، قوي مايىغى، تال (ئۇزۇم) يا-غاچلىرىنىڭ كۈلى ۋە توغرىغۇلارنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ سىركە بىلەن بەدەنگە سۈرتۈش كېرەك.

تەرلىتىش چارىلىرىدىن بىرىنى تاللاپ ئىشلەتسە بولىدۇ. مەسىلەن، قىزىق قۇمغا كومۇلۇش، ئاپتاپقا ئار-قىسىنى قىلىپ تۇرۇپ، پۇتۇن بەدەننى ياكى ئىششىق بار قىسمىنى كومۇش كېرەك. ئىسسىق مونچىدا تەرلىنىش (سۇ قويماسلىق لازىم)، شور سۇلۇق دەريالاردا چومۇلۇش

ياكى گۈڭگۈرتلۈك ئىسسىق بۇلاقلار (ئارشاڭ)دا يۈيۈنۈش كېرەك. يۇقۇرقلاردىن مەقسەت بەدەندىكى يىغىلىپ قالغان سۈنى چىقىرىپ تاشلاشتىن ئىبارەت.

قىسقۇچى سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقايسى زىققى)

بۇنىڭدا گۈش سۇلۇق ئىششىقىغا قارىغاندا ئىششىق خېلى ئېغىر بولۇپ، نەپەس ئېلىشنى قىسپ قويىدۇ. —
سەۋىيى: يۇقۇرىدا بايان قىلىنغان ئومۇمى سەۋەپ لەردىن تاشقىرى، بەدەننىڭ تارتىش ۋە چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋەتلىرىنىڭ بۇزۇلۇشى ياكى ئۇلاردىن بىرىنىڭ زەئىپلىشىشى بىلەن كۆپ مىقداردا سۇ بەدەندە يىغىلىپ قالىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىششىق قوساقتا بەك كېرەك بولۇپ، قوساق خۇددى سۇ قاچىلانغان تۇلۇمدەك كۆيۈپ كېتىدۇ. قوساقنى ئۇرۇپ كۆرگەندە سۇنىڭ چالغۇنغان ئاۋازى ئاڭلىنىپ، قولغا دولقۇنى سېزىلىدۇ. ئوڭدا يېتىپ بىر تەرەپكە ئورۇلگەندە، بۇ خىل ئەھۋال كېسەلنىڭ ئۈزۈلگەن سېزىلىدۇ. ئىششىق بەل، جىمىسى ئەزا، ئۇرۇقدانلارغىچە ھەتتا يۈز، قول، پۇتلارغىچە بارىدۇ. نەپەسلىنىش ئېغىرلىشىدۇ. ھارارەت بولمىغاندا سۇيۇك ئاق كېلىدۇ. تەش ئالاق بولمايدۇ. بەدەن رەڭگى ئاقارغان ھالدا بولۇپ، كېسەل بەدەننىڭ دائىم سوغاق بولۇشى بۇ خىلدىكى ئىستىسقاينىڭ ئالاھىدىلىكىدۇر. قىزىتما پەيدا بولۇپ قالسا، سۇيۇكنىڭ رەڭگى قىزىل، بەدەنلىرى قىزىق

بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. ئىششىقنى بارماق بىلەن باس-
قاندا ئويما ئالانسىمۇ دەرھال يوقاپ كېتىدۇ ئالدىنقىسىدەك
ئۇزاق تۇرمايدۇ.

داۋاسى: ھارارەتنى پەسەيتىش ئۈچۈن، ئىسكەندە-
جىيىن بىلەن كاسىن سۈيى بېرىلىدۇ. ئەگەر ھارارەت
بولمىسا، ھەسەل قوشقان ئىسكەنجىيىن ياكى شەرۋىتى
يۇزۇرى ! (128 - نۇسخە) بېرىلىپ مىزاج تەڭشىلىدۇ.
ئىچىنى بوشتىتىش ئۈچۈن فۇنۇسنى قايناقسۇغا چىلاپ
تەمىنى چىقىرىپ، بادام يېغى قوشۇپ بېرىلىدۇ.

بەدەندىكى سۇيۇقلۇقنى تارقىتىش ۋە سۇيىدۇك
ھەيدەش ئۈچۈن مىزاجى ئىسسىقلىقتىن بولسا كەلكىلانەج I
(131 - نۇسخە)، سوغاق بولسا كەلكىلانەج II (132 -
نۇسخە) بېرىلىدۇ. سۇيىدۇك ھەيدەش ئۈچۈن بۇ كېسەلگە
خاس دورىلاردىن قۇرسى مازەرىيۇن I (138 - نۇسخە)
ياكى قۇرسى مازەرىيۇن II (134 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.
مەيلى قايسى خىلدىكى سۇيىدۇك ھەيدىگۈچى دورىلار
بولمىسۇن ئالماشتۇرۇپ بېرىش كېرەك. دائىم بىر خىل-
دىكىنى بېرىش بەزىدە ئۈنۈم بەرمەي قالىدۇ.

قايسى خىلدىكى ئىسسىقلىققا بولمىسۇن. جىگەر مىزاجىنى
تەڭشەپ ۋە سۇيىدۇكنى ماڭدۇرۇپ (بەدەندىكى سۇيۇقلۇق
چىقىرىدىغان) دورىلارنى بەرگەندىن كېيىنلا جىگەرنى
قۇۋۋەتلىنىدۇرىدىغان قۇرسى ئىنەنە بارىس (135 - نۇسخە)
بېرىش كېرەك. ماددىسى كۈچلۈك بولمىسا، تۈگە

سۈتىنىڭ مەلۇم نەتىجىسى بار. غىزاسىغا تۇخۇم شورپى-
سى، تۇرۇلغا گۆشى ۋە شورپىسى بېرىلىدۇ. بەزىلەر
قوساقنى تىشىپ سۇ ئىلىش ۋە داغلاش چارىلىرىنىمۇ
قوللىنىپ كۆرگەن. ئەمما خەتىرى كۆپ، نەتىجىسى
ئاز. سۇ يەنە يىغىلىپ قالىدۇ.

ئاغراسىمان سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقاينى تەبەلى)

سۇلۇق ئىششىق بىلەن بىللە تېرە ئاستىدا ھاۋامۇ
بولغان سۇلۇق ئىششىقنى ئاغراسىمان سۇلۇق ئىششىق
(ئىستىسقاينى تەبەلى) دەپ ئاتىلىدۇ. مەئدە ھەزىمىنىڭ
بۇزۇلۇشى ۋە جىگەر ئاغرىقلىرى مۇھىم ئورۇندا تۇرىدۇ.
جىگەرنىڭ زەرەرلىنىشى سۇلۇق ئىششىقنى كەلتۈرسە،
مەئدە ھەزىمىنىڭ بۇزۇلۇشى يەل پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىششىق قوساقتا بولىدۇ. قوساقنىڭ
شەكلى خۇددى پۈدىگەن تۈلۈمدەك بولۇپ قالىدۇ. ئەمما
ئالدىنقىسىدەك ئېغىرلىق سېزىلمەيدۇ. قوساقتا بەزىدە
سانچىق ۋە چىڭقىلىش سېزىملىرى بولىدۇ. قورال
بىلەن قوساققا ئۇرۇپ كۆرگەندە دۇمباقچەك ئاۋاز چىقىدۇ
كىنىدىكىنىڭ سىرتقا چىقىپ قېلىشى بۇ كېسەلدە ئالامەت.
دە بىر ئالامەت بولۇپ ھىساپلىنىدۇ. بىرىنچى ۋە ئىككى-
كىنچى تۈرىدە بۇنداق ئالامەت بولمايدۇ.

داۋاسى: سۇيۇقلۇقلارنى بەدەندىن چىقىرىش
ئۈچۈن كورسىتىپ ئۆتۈلگەن تەدبىرلەر قىلىنىدۇ. بۇ
جەھەتتە جىگەرنىڭ مىزاجىغا رىئايە قىلغان ھالدا چارە

قىلىش كېرەك. ئەمما ئىسسىقلىق بەك ئارتۇق بولۇپ
كەتمەسلىكى لازىم. چۈنكى مۇنداقلا ئۇساش كېلىپ
چىقىدۇ. كۈندۈز ۋە زېرىنى باراۋەر مىقدارلاردا ئېلىپ
دائىم ئېغىزدا چايناپ تۇرۇپ سۈيىنى يۇتۇپ بېرىش،
گۆش سۇلۇق ئىششىغىدا كورسىتىلگەن سىرتتىن چاپە-
دىغان دورىلارنى قىلىش كېرەك. يەنى تارقىتىش
ئۈچۈن مەجۇنى سەنجىرىنا (33-نۇسخە) بېرىش بىلەن
سۇزاپ يۈپۈرمىسى، ئادىراسمان، ئارپا بېدىيان، چىڭسەي
ئۇرۇغى، توغرىغۇ، قارا شېكەرلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ، كىچىك
شامچىلارنى تەييارلاپ ئارقا يولغا تىقىپ قويۇش
كېرەك. قالغان ئالامەتلىرىگە قاراپ گۆش سۇلۇق ئىش-
شىغىدا كورسىتىلگەن چارىلار قىلىنىدۇ. ناغراسمان
سۇلۇق ئىششىق ئۇزۇنغا سوزۇلغاندا، ئىششىق قېتىپ
قېلىپ، باشقا ئالامەتلىر بىرئاز يېنىكلىشىدۇ. بۇنى
تەبەلى ھەيىنى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ چاغدا ئومۇمى
چارىلار بىلەن بىللە، يۇمشاتقۇچى دورىلار ۋە بابۇنە،
ئەككىل مىلىك، مەرزەنجۇش، سۈتتەر، سوزاپ ئۇرۇغى،
قۇندۇز قەرى ۋە يۇلغۇن كۈلى قاتارلىقلارنى سوقۇپ
ئارىلاشتۇرۇپ، سوزاپ سۈيى ۋە تۈگە سۇيىدۇكى بىلەن
نەمدەپ قوساققا قويۇش كېرەك. ئىچىدىغان چېيىغا ئىت
ئۇزۇمى، كاسىن ئۇرۇغى ۋە كاسىن يىلتىزىنى قاينىتىپ
بېرىش لازىم. ئىچىنى بوشتىش ئۈچۈن توۋەندىكىلەر
يېرىلسە بولىدۇ:

سانا 7 مىسقال، بىنەيشە، ئىلۇفە، كاسن ئۇرۇغى ھەربىرى 3 مىسقالدىن؛ سېرىق ھېلىلە، بەلىلە، ئامىلە ھەربىرى 5 مىسقالدىن؛ قۇرۇق ئۇزۇم 15 مىسقال؛ قارا ئورۇك، چىلان 10 دانىدىن؛ سەرىستان 20 دانە؛ فۇنۇس، خىيارى شەنبەر، تەرەنجۈل 10 مىسقالدىن ئېلىنىدۇ. فۇنۇس بىلەن تەرەنجۈلنى ئايرىم ھالدا قايناقسۇغا چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ، باشقا دورىلارنى سوقۇپ قاينىتىپ، يۇقۇرقلارنىڭ سۈيگە ئارىلاشتۇرۇپ سۇزۇپ يالغۇز ياكى ئىسكەنجىيىن بىلەن بېرىلىدۇ. بەزدە-لەر بۇ خىلدىكى ئىسسىقلىققا ھەببى سەكبىنەج (94-نۇسخە) بېرىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ.

سېرىق كېسەل (يەرقان)

سېرىق كېسەل (يەرقان) تىبابەتتە ساغۇش سېرىق كېسەل ۋە قارا سېرىق كېسەل دەپ 2 گە بۆلۈنىدۇ. ساغۇش سېرىق كېسەل جىگەر بىلەن ئوتتىڭ زەرەرلىشىدىن پەيدا بولسا، قارا سېرىق كېسەل كۆپىنچە تال كېسەل-لىكلىرى نەتىجىسىدە پەيدا بولۇپ، رەڭگى قارىغا مايىل تۇق سېرىق رەڭدە بولىدۇ. بۇلار يەنە ئالاھىدە ئالا-مەتلىرى ۋە سەۋەپلىرىنىڭ تۈرلىرىگە قاراپ بىر قانچە-گە بۆلىنىدۇ. تۆۋەندە ئۇلارنىڭ ئالاھىدىلىرى ۋە داۋاسى ئايرىم سۆزلىنىدۇ.

1. ساغۇش سېرىق كېسەل (يەرقانى ئەسفەر)

1. سەپرادىن بولغان قىزىتىلار بوھرانى سەۋىيى بىلەن سېرىقلىق چۈشىدۇ.

ئالامەتلىرى: سېرىقلىقنىڭ پەيدا بولۇشى بوھران كۈنلىرىگە توغرا كېلىدۇ، كوڭلى ئاينىدۇ، ئېغىزى ئاچىچىق، ئىچى قاتقان، ئىچكى ئەزالاردا سانسىق بولىدۇ.

داۋاسى: كېسەلنى ئىسسىق سۇدا ئولتۇرغۇزۇش، ئىسكەندېرىن ياكى يالغۇز كاسىن سۈيى بېرىش كىپايە قىلىدۇ.

2. جىگەر مىزاجىنىڭ ئىسسىقتىن بۇزۇلىشىدىن پەيدا بولىدۇ بۆخىلدا سەپرائى غەيرى تەبىئى قانغا ئارىلىشىپ پۈتۈن بەدەنگە تارايىدۇ. شۇنىڭ بىلەن سېرىقلىق ئومۇمى بەدەنگە چۈشىدۇ. قەي قىلىش، كۆز ۋە بەدەندىكى سېرىقلىق بەك ئېغىر بولىدۇ. سۈيىدۈك رەڭگى قارامتۇل كېلىدۇ. ئۈستىدىكى رۇسۇپ سېرىق بولىدۇ.

داۋاسى: جىگەردىكى قىزىتمىنى پەسەيتىش ئۈچۈن ئازار شەرۋىتى (47-نۇسخە) ۋە ئارپا سۈيى بېرىلىدۇ. جىگەر ۋە بەدەندىن سەپرائى چىقىرىش ئۈچۈن، مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20-نۇسخە) گە مەھمۇدە (سۇقمۇندە) قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن شەرۋىتى فەۋاكە (15-نۇسخە) بېرىلىدۇ.

3. مىزاجىنىڭ ھەددىدىن زىيادە ئىسسىقلىقى ۋە ھارارەت تەسىرىدىن ئوت قانغا ئارىلىشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن قاندىكى ئوت مىقدارى ئېشىپ كېتىپ سېرىقلىق پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: تۇيۇقسىزلا پۇتۇن يەدەن ساغرىپ

كېتىدۇ. سۇيۇكمۇ توساتتىن ساغرىپ بارغانسېرى قارىغا مايىللىشىدۇ. جىگەردىكى زەرەلىنىشتىن بولغان سېرىق چۈشۈشتىن شۇنىڭ بىلەن پەرقلەندىكى، جەگەردىن بولغان سېرىق چۈشۈشتە سۇيۇك دەسلەپتە قىزىل بولۇپ، ئاستا-ئاستا سېرىقلىشىدۇ، بەدەندىكى سېرىقلىقمۇ بىردىنلا پەيدا بولماستىن، تەدرىجى پەيدا بولىدۇ. ئالدى بىلەن ئىشتى تۇتۇلۇش قاتارلىق ھەزىم بۇزۇلۇش ئالامەتلىرى كۆرىلىدۇ. تەشۋالىق ئۆتكۈر بولىدۇ. ئەمما مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقىدىن بولغان سېرىق كېسەلدە بۇ بەلگىلەر بولمايدۇ.

داۋاسى: ئەينولا سۈيى، ئانار شەرۋىتى (47-)

نۇسخە)، كاسىن ئۇرغىنىڭ شىرسى، ئىسكەنجىبىن بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن تازىلاش ئۈچۈن سېرىق ھىلە-لى، شاتەرە، ئەپەنتىن، ئەينۇلا ۋە تەمرى ھىندى قاتارلىقلار قاينىتىپ بېرىلىدۇ.

(4) ئوت خالىتىنىڭ ياللۇغى ياكى ئوت يوللە-

رىدىكى توسىلىشلار سەۋىيى بىلەن بەدەندىكى ئوتنىڭ چىقىرىلىشى توسالغۇغا ئۇچراپ، بەدەندە ئوت مىقدارى ئېشىپ كېتىپ سېرىقلىق پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: قىزىتما، قىي ۋە تىل قۇرۇپ

گەز باغلاش قاتارلىق ئالامەتلەر بىلەن بىللە جىگەر ساھە-

سەدە ئېغىرلىق ۋە ئاغرىش سېزىدۇ. جىگەر ياللۇغى بولسا جىگەر ياللۇغىغا تېگىشلىك ئالامەتلەر كۆرىلىدۇ. **داۋاسى:** جىگەر ياللۇغى بىلەن ئوخشاش.

2. سېرىق كېسەل (يەرقانى سەنەدى)

بۇ خىلدىكى يەرقاننىڭ ئاساسىي سەۋىيىسى سەۋدا - نىڭ قان تەركىبىگە ئارىلىشىپ قېلىشى بولۇپ، بەدەن رەڭگى قارا-تۇل سېرىق رەڭگە كىرىدۇ. سۆيىدۇ ۋە تەرەتنىڭ رەڭگىمۇ قارىغا مايىل بولۇپ قالىدۇ. بىرىنچى قىسمىدا سوزلەپ ئۆتكىنىمىزدەك، تال سەۋدانى ساقلايدىغان ئورۇن بولۇپ، كېرەك بولغاندا سەۋدا ماددىسىنى ئوز يولى بىلەن مەئىدىگە چىقىرىپ ئىشتەي پەيدا قىلىدۇ ۋە ھەزىمگە ياردەم بېرىدۇ. دىمەك قارا سېرىق كېسەل ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا تالنىڭ زەرەر - لىنىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. شۇنداقلا جىگەرنىڭ زەرەرلىنىشى بىلەنمۇ مۇناسىۋەتلىكتۇر. چۈنكى سەۋدا ئەسلىدە جىگەردە ئىشلىنىپ چىقىپ تالغا بارىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن قارا يەرقان تالنىڭ ۋە جىگەرنىڭ بىللە زەرەرلىنىشىدىن پەيدا بولىدۇ. قارا يەرقان سەۋەپ ۋە قىسمەن ئالامەتلىرىگە قاراپ تىۋەندىكىچە بولىدۇ:

(1). تالدىن مەئىدىگە سەۋدا بارىدىغان يولدا تو - سالغۇ پەيدا بولغاندا تالدىكى سەۋدا سەرپ بولماي

تۈپلەشپ جىگەرگە قايتىپ كېلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن جىگەردىكى سەۋدا مىقدارى ئېشىپ كېتىپ كۆپ مىقداردا سەۋدا قانغا ئارىلىنىدۇ. دە، ئەسلىدە قارامتۇل رەڭدە بولغان سەۋدا بەدەنگە غەيرى تەبىئى بىر رەڭ بېرىدۇ. ياكى جىگەردىن تالغا سەۋدا بارىدىغان يول توسىلىپ قېلىپ جىگەردىكى سەۋدا ئېشىپ كېتىپ، ئوخشاشلا قاندا سەۋدا ماددىسى كۆپىيىدۇ.

ئالامەتلىرى: قارامتۇل سېرىقلىق ئاستا-ئاستا يۇز بېرىدۇ. تالدىن مەلۇم ئىگە بارىدىغان يول توسالسا، چېپ تەرەپ يۇقۇرقى وساق، قىسمىدا ئاغرىش ۋە قاداق (سانجىق) بولىدۇ. جىگەردىن تالغا بارىدىغان يول توسۇلسا بۇ ئالامەتلىر ئوڭ تەرەپتە بولىدۇ. ھەر ئىككىسىدە سەۋەپسىز بىردىنلا ئىشتەي تۇتۇلىدۇ، سۈي-دۆڭ قارامتۇل كېلىدۇ.

داۋاسى: توسالغۇنى ئېچىش ئۈچۈن ئىسكەنجە-چىن بۇزۇرى (101- نۇسخە) ۋە شەرۋىتى كۈشۈش (136- نۇسخە) بېرىلىدۇ. قۇرسىغا پەس (137- نۇسخە) ئومۇمەن جىگەر ۋە تالنىڭ توسالغۇ خۇسۇسىيەتلىك كېسەللىكلىرىگە ناھايىتى ئۈنۈملۈكدۇر. ماددىنى سۈرۈپ چىقىرىش ئۈچۈن ئاخىرىدا مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20- نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئىچىش ئۈچۈن كاسىن سۈيىگە ئىسكەنجىپىن قوشۇپ بېرىلىدۇ. توخۇ گۆشىنى سىركە بىلەن پىشۇرۇپ بېرىش كېرەك.

(2) كۈچلۈك ئىسسىقلىقنىڭ جىگەرگە بولغان

تەسىرى ئاستىدا، غەيرى تەبىئى سەۋدا ھاسىل بولۇپ،
قانغا ئوتۇپ قارا سېرىق كېسەل پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: قارا سېرىق كېسەلنىڭ پەيدا بول-

شى - قىزىتما، نەپەس ئېلىشنىڭ قىيىنلىشىشى يۈز بېرىد-

دۇ. ئاغرىقتا تۇرلۇك روھى ئالامەتلەر غەم، ئەندىشە

قىلىش، قورقۇش ھەرخىل پىكىرلەر پەيدا بولىدۇ. سۈي-

دۇك ۋە تەرەت قارامتۇل رەڭدە كېلىدۇ.

داۋاسى: مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

سوغاقلق دورىلا. دىن سىرتىن سۈركەيدىغان دورا

ياساپ سۈركىلىدۇ.

(3) تالنىڭ ئۆزىگە تارتىش قۇۋۋىتى ۋە تۇتۇش

قۇۋۋىتىنىڭ بۇزۇلۇشى سەۋىيىدىن قارا سېرىق كېسەل پەيدا

بولىدۇ. چۈنكى تارتىش قۇۋۋىتى بۇزۇلغاندا تالنىڭ

شىمىرىش كۈچى ناچارلىشىپ جىگەردىن كېلىدىغان

سەۋدانى ئۆزىگە جەلپ قىلالمايدۇ. تۇتۇپ تۇرۇش

كۈچى بۇزۇلسا، سەۋدانى ئۆزىدە تۇتۇپ تۇرۇشى بۇزۇ-

لۇپ، سەۋدانىڭ قانغا چىقىشى بىلەن بۇ خىلدىكى

يەرقان پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: تالنىڭ زەئىپلىك ئالامەتلىرى

ئۇزۇندىن بېرى بار بولىدۇ (تال كېسەللىگىگە قاراڭ).

زېھنى توۋەن، گاراڭ بولۇپ قالىدۇ. كوز ئېقى ئاقىرىپ

كېتىدۇ. قۇسۇش ھەم ئىچ سۇرۇش بىلەن سەۋدا بىلەن چىقىدۇ.

داۋاسى: تالنى كۈچلەندۈرۈش تەدبىرلىرىنى قىلىش كېرەك (تال كېسەللىكلىرىگە قاراڭ).

4) بوھران نەتىجىسىدە غەيرى تەبىئى ماددىلار سىرتقا چىقىدۇ. تال كېسەللىكلىرىنىڭ بوھران كۈنىدە رىدە كوپلىگەن سەۋدا تال، جىگەردىن چىقىرىلىپ بەدەنگە قارارەڭ پەيدا قىلىدۇ ۋە سۇيۇك قارا بولىدۇ. ئەمما بۇ چاغدا ئاغرىقتا ئەسلى كېسەللىگىنىڭ بىر مۇنچە ئالامەتلىرى يەڭگىللىشىپ كېسەل راھەتلىنىپ قالىدۇ. بەدەننىڭ چىقىرىش كۈچىگە ياردەم بېرىش، تالنى كۈچەيتىش كېرەك، بوھراندىن بولغان ساغۇش سېرىق كېسەلدىكى چارىلارنى قىلسا بولىدۇ. مونچىغا چۇشۇش، بەدەنگە بايۇنە يېغى، سېرىق چىچەك يېغى ۋە چىقىرتماق ياغلىرىنى سۈركەش كېرەك.

IX ماقالا. تال كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: تالنىڭ مىزاج ئۆزگىرىشلىك ئاغرىقلىرى

تالنىڭ مىزاجىدىكى غەيرى ئۆزگىرىشلەر - تالدا ئىسسىقلىقنىڭ، سوغاقلىق، نەملىك، قۇرۇقلۇق ۋە ھول ئىسسىقلىقنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن ئىبارەتتۇر. بۇلاردا تال خىزمىتىنىڭ ئوخشاش بولمىغان ھالدىكى بۇزۇلۇشىدىن ئىبارەت ئورتاق ئالامەتلەردىن باشقا، يەنە ئۆزىگە خاس بولغان ئالاھىدە ئالامەتلەر كۆرىلىدۇ ۋە ئۇلارغا مۇناسىپ داۋالاش چارىلىرى بار. ئۇلار تۆۋەندىكىچە:

تالدا ئىسسىقلىقنىڭ ئېشىپ كېتىشى: بۇنىڭدا بولىدىغان ئالامەتلەر سول تەرەپ يۇقۇرقى قوساق قىسمى ئېچىشىپ ئاغرىيدۇ، تەشئالىق بولىدۇ. سۇيۇك ۋە تەرىتىنىڭ رەڭگى قارامتۇل قىزىل رەڭگە كىرىپ قالىدۇ، تېنى قىزىيدۇ.

داۋاسى: سول تەرەپ ئۆسلىم تومۇرىدىن قان ئالغاندىن، كېيىن، ئىت ئۇزۇمى ۋە كاسىن سۈيى (كوك ھالدىكىسى ياخشى) لىرىنى بېرىش لازىم. ماددىنى سۇ -

رۇپ چىقىرىش ئۈچۈن مەتبۇخى ھېلىلا (38 - نۇسخە)
بېرىش كېرەك. ئەگەر قىزىتما بولسا قۇرسى كاپۇر
(76 - نۇسخە) ياكى قۇرسى تاباشىر (112 - نۇسخە)
بېرىلىدۇ.

تالدا سوغاقلۇقنىڭ ئېشىپ كېتىشى: بۇنىڭ ئالا-
مەتلىرى، ئىشتەي تۇتۇلىدۇ، توۋەن قىزىتما يۈز بېرىدۇ،
تەشئالىق بولمايدۇ، قوساقتا پەل كوپىيىپ قالىدۇ.
كىكىرىش كوپ بولىدۇ ھەم ئېغىزدىن دائىم سۇ كېلىپ
تۇرىدۇ. سول تەرەپ يۇقۇرقى قوساق قىسمىدا يېقىم-
سىزلىق سېزىدۇ.

داۋاسى: ئىسكەنجىيىن بۇزۇرى (ئىسسىق خۇ-
سۇسىيەتلىگى) ياكى قۇرسى بۇزۇرى (119 - 137 - نۇسخە-
خىلەر) بېرىلىدۇ. يېشىكە گۈلچەن بېرىلىشى كېرەك.
تالنى قىزىتىدىغان دورىلار تال ساھەسىگە سىرتتىن
چىپىلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئىنجۇر، قۇست، سىركە، سەدەپ،
بىخ كەبىر، ئوسقۇدرىيۇن، ئاچچىق باداملارنى سوقۇپ
ئارىلاشتۇرۇپ سىرتتىن چىپىلىدۇ.

تالدا قۇرۇقلۇقنىڭ ئېشىپ كېتىشى: بۇنداق ھال-
لاردا تال قېتىپ قالغان بولۇپ، بەدەن ئورۇق ۋە
قۇرغاق كېلىدۇ. كېسەلنىڭ چىرىمۇ قارامتۇل كوك
رەڭگە كىرىپ قالىدۇ.

داۋاسى: بەدەن نەملىگىنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن
يىنەيشە شەرۋىتى (69 - نۇسخە)، نىلۇفەر شەرۋىتى (75 -

(نۇسخە)، خەشخاش شەرۋىتى (74 - نۇسخە) دىن بىرىنى تاللاپ بېرىش كېرەك. ھول قاپاق، خاڭگا سۇلىرى بېرىلىدۇ. سېمىز ئوت ئۇرۇغى، قاپاق، قوغۇن، ئاق لەيلى ئۇرۇقلىرىنى چىقىپ مېغىزلىرىنىڭ شىرىسىنى ① چىقىرىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئايال سۈتىنى يىنەشە يېغى بىلەن قوشۇپ تالغا سۈركەش لازىم. غىزاسىغا ھوللۇك تاماقلار، توخۇ گۆشى، پاخان گۆشى، قاپاق ئېشى بېرىلىدۇ. تالدا ھول ئىسسىقلىقنىڭ ئېشىپ كېتىشى؛ سول تەرەپ قوساق ساھەسى دائىم ئېچىشىپ تۇرىدۇ. ئېغىر - لىق ۋە سانجىقىمىمان ئاغرىش سېزىلىدۇ، بەدەن رەڭگى كۆكۈش بولۇپ، بوشاڭ، ماغدىرسىز كېلىدۇ، سۈيدۈك بەزىدە قارامتۇل رەڭگە كىرىپ قالىدۇ.

داۋاسى: ئىسكەنجىمىن (118 - نۇسخە) تەركە - ۋىگە 3 مىسقال بىخ كەبىر قوشۇپ تەييارلاپ بېرىلىدۇ. قىزىل گۈل، يۇلغۇن مېۋىسى (داۋا)، مۇغاس، ئاق سەندە دەللەرنى ياراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ يۇلغۇن مە - ۋىسىنىڭ سۈيى بىلەن نەمدەپ تال ئۈستىگە چېپىلىدۇ.

① شىرە (اۋئاب) چىقىرىش ئۇسۇلى: تەييارلىغان مېغىز ۋە ئۇرۇق دورىلارنى چالا سوقۇپ كىچىك بىر خالىغا سېلىپ تىكىپ بولغاندىن كېيىن، پىيالىگە سېلىپ ئۈستىدىن بىر ئاز قايناق سۇ قۇيۇپ بىر پەس قويىمىز. ئۈندىن كېيىن قوشۇق بە - لەن خالىنى بېسىپ مىچىغاندا ئاق شىرە چىقىدۇ. بۇنى باشقا قاچىغا سۈزۈپ ئالىمىز. بۇنى تەكرا قىلىنىدۇ.

تاللىنىڭ ياللۇغلىنىشى (ۋەزەمى تال)

تاللىنىڭ ياللۇغلىنىشىغا خىلىتلاردىن قان، سەھەر ۋە بەلغەمنىڭ غەيرى تەبىئىي ئۆزگەرگەن ھالىتى سەۋەپ بولىدۇ.

(1) قاندىن بولغان تال ياللۇغى: بۇنىڭ مۇھىم ئالامىتى، تال ساھەسىدىكى ئاغرىش، ئېچىش بىلەن بىللە تەشۋالىق بولۇشى، قىزىتىشنىڭ ھەر 4 كۈندە بىر قېتىم كۆتۈرۈلىشىدىن ئىبارەتتۇر. سۈيدۈك قارا كېلىدۇ، سول تەرەپ تال بار جايىنى قول بىلەن تۇتۇپ كۆرگەندە قىزىق بىلىنىدۇ. باسقاندا قاتتىق ئاغرىق سېزىلىدۇ.

داۋاسى: ئىمكانىيەت بولسا سول تەرەپ باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىش لازىم. ئۇندىن كېيىن پۇنۇس، تەمىرى ھىندى، كاسىن ۋە ئىت ئۆزۈمىسى قاندا بويىچە ئېچىشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر قىزىتما بولسا قۇرسى كاپۇر (76- نۇسخە) ياكى قۇرسى تاباشىر (112- نۇسخە)نى شەرۋىتى زىرىشك (89- نۇسخە)لەر بىلەن بېرىش لازىم. ياكى گۈل بىنەپشە، قىزىل گۈل، بىخ كە- بىر، تەمىرى ھىندى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى شىرىسى بېرىلىدۇ. سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن ئارپا ئۇنى، قىزىل گۈل، ئاق سەندەل، ھەمشۋا، ئىت ئۆزۈمى، ئاقاقىيا، مامشا، يۇمىلاقسۇتلەرنى سىركە بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تال ئۆزىگە قويۇشقا بېرىلىدۇ.

(2) بۇزۇلغان سەپراسىڭ ئالدا يىغىلىپ قېلىش.

دىن بولغان تال ياللۇغى: ئېچىش، ئاغرىش تالدا
ئېغىرلىق، بەدەندە قىزىتما ئېغىر بولىدۇ. پۈتۈن بەدەن
ساغرىپ كېيىنچە قارىغا ئۆزگىرىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى
ھېلىلە (38-نۇسخە) ۋە ئىسكەنجىيىن (101-نۇسخە)
لەرنى بېرىش كېرەك. ئىششىقنى قايتۇرغۇچىلاردىن رۇ-
سۇت، گىلى ئەرمىنى، ئەنجۈر، خىيارى شەنبەر، بۇغداي
كېيىكى، ئىت ئۆزۈمىنى سىركە بىلەن بىللە سىرتتىن
چىپىش ئۈچۈن بېرىلىدۇ. توۋەندىكى تالقان (سۇيۇپ)
يېيىشكە بېرىلىدۇ.

سەمى ئەرەبى 1 مىسقال، قىزىل گۈل 2 مىسقال،
تاباشىر $1\frac{1}{2}$ مىسقال، ئاق سەندەل $1\frac{1}{2}$ مىسقال، كا-

سىن ئۇرۇغى 3 مىسقال، زىرىق 3 مىسقال، سېمىز ئوت
ئۇرۇغى، خاڭگا، تەرخەمەك، قوغۇن ئۇرۇقلىرىنىڭ مېغىز-
لىرى ھەربىرىنى 3 مىسقالدىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ،
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ كۈنىگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(3) بەلغەم سەۋىبىدىن بولغان تال ياللۇغى: تال-
دىكى ئاغرىش كام بولىدۇ، لېكىن ئېغىرلىق سېزىدۇ.
تىلى ۋە بەدەن رەڭگى ئاق بولىدۇ، تەرەت بىلەن
سۈيدۈك ئاق كېلىدۇ. كۆزى ئالايغاندەك بولۇپ كۆرۈنىدۇ.

داۋاسى: بەلغەمنى تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج
پەيقارا ۋە مەتبۇخى ھېلىلە (16-38-نۇسخە) بېرىلىدۇ.

ئۇندىن كېيىن تالنى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلار بېرىلدى.
بۇنىڭ ئۈچۈن ئوردان قۇرسى ياكى قۇرسى بىخى كەبىر
(139-140 - نۇسخە) لەرنى بېرىش مۇمكىن. مۇۋاپىق
دورىلار ھەققىدە قىلىنىدۇ. تال كېسەللىكلىرىدە كۆرسىتىل-
گەن دورىلار سىرتتىن چېپىلىدۇ.

تالنىڭ زەئىپلىگى

تالنىڭ زەئىپلىگى ئۇنىڭ تارتىش (قۇيۇل قىلىش)،
تۇتۇپ تۇرۇش ۋە چىقىرىپ تاشلاش قۇۋۋەتلىرىنىڭ
ئاجىزلىغىدىن ئىبارەتتۇر.

ئالامەتلىرى: تارتىش قۇۋۋىتى ئاجىزلاشقاندا
ئىشتەي يوقۇلىدۇ، سەۋدا كېسەللىگىنىڭ ئالامەتلىرى
كۆرۈلىدۇ. تۇتۇش قۇۋۋىتى ئاجىز بولسا، كوگۇل ئاينىش،
قەي قىلىش ۋە ئىچى سۇرۇش يۈز بېرىدۇ. بۇلار سەۋ-
دانىڭ ئالامەتلىرى (تەرەت ئاچچىق يامان پۇراقلىق،
قارامتۇل رەڭلىك) بولىدۇ. ئەگەر چىقىرىپ تاشلاش
قۇۋۋىتى ئاجىز بولسا تال چوڭىيىدۇ. ئىشتەي بولمايدۇ.

داۋاسى: تالنى قۇۋۋەتلەندۈرىدىغان ئوردان
قۇرسى ياكى قۇرسى بىخ كەبىرلەر بېرىلىدۇ (139-140 -
نۇسخە) لەر، سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن ئەپسەنتىن، سۈمبۇل،
يۇلغۇن ياپرىغى، قەرەد مانا، ئىزخىر، بىخ كەبىر، قىزىل
گۈل، مۇقىللارنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ سىرقۇپ،
سىركە بىلەن نەمدەپ تال ئۈستىگە قويۇش كېرەك.

X قالا. ئۇچەي كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: ئۇچەيدىكى ھەزىمنىڭ بۇزۇلۇشلىرى

ئۇچەي تارىيىپ قېلىش (زەيقۇلئەمئە)

بۇ، ئۇچەينىڭ سىلىقلىشىپ قېلىشى بىلەن بولغان ئىچ سۇرۇش كېسىلىدىن ئىبارەتتۇر. يەنى مەئىدىدىن ئۇچەيگە كەلگەن تاماق ئۇچەيدە ھەزىم قىلىنماستىنلا چىقىپ كېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنى ئۇچەينىڭ تېپىلغاق سۇرۇش كېسىلى دەپمۇ ئاتايدۇ. سەۋەپلىرىگە قاراپ بۇ كېسەل تۆۋەندىكى بىر قانچىگە بولىنىدۇ.

بىرىنچى سەۋىيى: ئۇچەينىڭ ئىسسىقلىقى سەۋىيى بىلەن سەپرا ماددىسىنىڭ كۆپ بولۇشى ياكى ئۇچەي ئۈستۈنكى قەۋەتلىرىگە مۇددۇر (قايارتما) لار چىقىشى تۈپەيلىدىن شىلىملىق سۈيۈقلۈكنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن ئىبارەتتۇر.

ئالامەتلىرى: تاماقنىڭ مەئىدىدىن ئۇچەيگە كېلىشى بىلەنلا قوساقتا ئاغرىش ۋە ئېچىش، چىشلىگەندەك سېزىلىش (سەپرا سەۋىيى بىلەن) پەيدا بولىدۇ. ھەزىم بولغان ۋە چالا ھەزىم بولغاندا تاماق قالدۇق.

لىرى با. بولغان سۇيۇق سېرىق سۇ ئارلاش تەرەت كېلىدۇ. تەرەت چىقىش ۋاقتىدا سوك ئېچىشىدۇ. كېسەل سوغاق سۇ ئىچىش بىلەن ئاغرىش يېنىكلەشكەنلىگىنى ھەس قىلىدۇ. ئاغرىش سېزىلىدىغان جايى كىندىك ئۈستى ياكى ئىككى يان تەرىپى، بەزىدە كىندىك ئاستىدىن، ئىبارەت. ئۈچەي قەۋىتىگە چىققان قاپارتمىلار ئىچ تەرەپتە ياكى تاشقى تەرەپتە بولۇشى مۇمكىن. ئەگەر ئىچ تەرەپتە بولسا تەرەت زەرداپ سۇ ئارلاش كېلىدۇ. تاشقى تەرەپتە بولسا ئۇنداق بولمايدۇ.

داۋاسى: تۈۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىنىدۇ:

نوخۇت، ئارپا ئۇنى، گۈرۈچ ھەربىرى 5 مىسقالدىن. كوكئار پوستى، ئاق لىلى ئۇرۇغى، ھەربىرى 3 مىسقالدىن، سەمغى ئەرەبى، نىشاستە ھەربىرى 1 مىسقالدىن، گۈل يېغى 3 مىسقال، لازىم مىقداردىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۈزۈپ، گۈل يېغىنى قوشۇپ ھوقنە قىلىنىدۇ. رەيھان ئۇرۇغى، كىۋچە ئۇرۇغى، پاقا يوپۇرمىغى ئۇرۇغى ھەربىرى 2 مىسقالدىن ئېلىپ، قاچىغا سېلىپ ئوت (چوغل) ئۈستىدە قويىمىز. دورىلار تازا قىزىپ قورۇلغاندا ئۈستىگە بىر ئاز قايناقسۇ قۇيۇپ ئارلاشتۇرۇپ ئېلىپ، بىر مىسقالدىن كۈنىگە 1-2 قېتىم ئانار شەرتى (47-نۇسخە)، خەشخاش شەرتى (69-نۇسخە) دىن بىرى بىلەن بېرىلىدۇ.

سېرتىن چېپىش ئۈچۈن — ئارپا ئۇنى، ئانار گۈلى،
قىزىل گۈل ۋە ئاق سەندەللەرنى ئالما سۈيى بىلەن
ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

ئەگەر قىزىتمىسى بولسا، قان ئېلىشنى ئويلاپ
كورۇش مۇمكىن. كاسىن، سېمىز ئوت ئۇرۇقلىرىنىڭ
شىرىسى ۋە بىيە سۈيى بېرىلىدۇ. ئاچچىق - چۈچۈك
نەرسىلەرنى تاماق بىلەن بېرىشنى چەكلەش كېرەك.
ئىككىنچى سەۋىيى: خىلىتلارنىڭ كېرەكسىز سۇ-

يۇقلۇقلىرى ئۈچەي پەردىلىرىگە يىغىلىپ ئۈچەي تامللىرى-
نى سىلىقلاشتۇرۇپ قويىدۇ. بۇ ئۈچەينىڭ تۇتۇپ تۇرۇش
قۇۋۋىتىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ ئىچ سۇرۇش پەيدا قىلىدۇ.
ئالامەتلىرى: كۆپلىگەن شىلىمشىق سۇيۇقلۇق

ئارىلاشقان ۋە ھەزىم بولمىغان تاماق ماددىلىرى بولغان
تەرەت كېلىدۇ. ئەگەر ماددىلار كۈچلۈك بولسا ئۇنىڭ
ئالامەتلىرى بىللە بولىدۇ. مەسىلەن، سەپرا بولسا ئېچى-
شش، قاندىن بولسا، قىزىتما قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇ
ئەھۋال بەزىدە مەئىدە يىغىلىپ قالغان كېرەكسىز سۇ-
يۇقلۇق سەۋىيىدىن بولىشىمۇ مۇمكىن.

داۋاسى: مۇۋاپىق دورىلار بىلەن قەي قىلدۇ-
رۇش ياكى سۈرگە بېرىش بىلەن كېرەكسىز سۇيۇقلۇقنى
چىقىرىپ تاشلاش كېرەك. سۈرگە ئۈچۈن مۇنۇ دورىلارنى
بېرىش لازىم: سېرىق ھېلىلە پوستى 2 مىسقال، سۇماق،
ھەببۇلئاس، موزا ھەربىرىنى 1 مىسقالدىن ئېلىپ،
يۇمشاق سوقۇپ تالقانلاپ كۈنىگە 1 - 2 قېتىم 2 مى-

قالدىن بېرىلىدۇ. ياكى ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) بەرسىمۇ بولىدۇ. ماددىنى تازىلاپ بولغاندىن كېيىن ئىچ سۇرۇشنى توختىتىش ئۈچۈن سۇيۇپ رۇمان (111 - نۇسخە) ۋە قۇرسى گۇلنار (140 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئۇلاردىن كېيىن ئۈچەينىڭ تۇتۇش كۈچىنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش ئۈچۈن قۇرسى تاباشىر (112 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇ خىل ئاغرىقلارنى دەسلەپتە بىرەر كۈن ئاچ قويۇش ياخشى نەتىجە بېرىدۇ. كېيىنچە پاقالچەك گۆشى ياكى توخۇ گۆشى بېرىشكە بولىدۇ. ئەگەر قىزىتمىسى بولسا گۆش ياغ بېرىشكە بولمايدۇ.

3) ئومۇمىي بەدەن پالچى ياكى ئۈچەي ئۆزىنىڭ پالەچلىنىشى تۈپەيلىدىن ئۈچەينىڭ تۇتۇش قۇۋۋىتى بۇ - زۇلۇپ تاماق ماددىلىرى ئۈچەيدە تۇرماستىنلا مېڭىپ كېتىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئومۇمىي بەدەنلىك پالەچلىك ئالا - مەتلىرىنىڭ بولۇشى ياكى ئۈچەيگە يەل تولۇپ قوساق كۆپىدۇ.

داۋاسى: پالەچنى داۋالاش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ (ئىستىرخا ۋە پالەچكە قارالغ).

2 - پەسىل: ئىچ سۇرۇش (ئىسھال) لار

ئىچ سۇرۇش توغرىسىدا مەئدە ۋە جىگر كېسەل - لىكلىرى بايانىدا توختىلىپ ئۆتكەن بولساقمۇ، بۇ

پەسلىدىكى ئىچ سۇرۇش ئۇچەينىڭ زەرەرلىنىشى ئاسا -
سىدىكى ئىچ سۇرۇشلەردىن ئىبارەت بولۇپ، سەۋەپ ۋە
ئالامەتلىرىگە قاراپ 4 قىسىمغا بولىنىدۇ:

قانلىق ئىچ سۇرۇش (ئىسھال دەمەۋى)

قانلىق ئىچ سۇرۇشنى ئۇچەينىڭ قەۋەتلىرى سو-
يۇلۇشى بىلەن بولغان قانلىق ئىچ سۇرۇش ۋە ئۇچەي
قان تۈەنلىرىنىڭ شىكەستلىنىشى بىلەن بولغان قانلىق
ئىچ سۇرۇش دەپ 2 چوڭ قىسىمغا بولىنىدۇ. تۆۋەندە
بۇلارنى ئايرىم - ئايرىم سۆزلەيمىز.

1. ئۇچەينىڭ ئىچكى يۈزى سويۇلۇشتىن بولغان
قانلىق ئىچ سۇرۇش (سەھەج): سەپرانىڭ ئۇچەيگە قۇيۇ-
لىشى بىلەن ئۇچەي يۈزىنىڭ نېپىز قەۋەتلىرى كويۇپ
سويۇلىدۇ. ياكى بەلغەم ئۇچەيگە چۈشۈشى (نەزلە ماددە
سىنىڭ ئۇچەيگە قۇيۇلىشى) بىلەنمۇ بۇ ئىھۋال كېلىپ
چىقىدۇ. زەھەرلىك دورىلار سەۋدا ۋە قاتتىق تەرەتمۇ
ئۇچەي يۈزىنى زەخمىلەيدۇ.

1) سەپرا ئۇچەيگە قۇيۇلغاندا بولىدىغان ئالامەتلەر:
ئالدى بىلەن ئۇچەيدە ئېچىش بىلەن بىللە تولغاچ -
سىمان ئاغرىش پەيدا بولىدۇ. كېيىن ئىچ سۇرىدۇ، تە-
رەتتە ئالدى بىلەن قويۇق شىلىملىق نەرسە كېلىدۇ.
كېيىنچە بۇنىڭغا قان قوشۇلىدۇ. ئۇچەينىڭ زەرەرلىنىشى
يۇقۇرقى تەرەپتە بولسا، ئاغرىش، قىزىق سېزىلىش، ئې-
چىش ۋە كويىكەندەك سېزىملەر كىندىك ئۈستىدە بى-

لىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئىنجىق ۋە تەشەنلىق يامان بولىدۇ. ئەگەر زەرەلەنىش ئۈچەينىڭ ئاستىنقى قىسمىدا بولسا، ئالدى بىلەن قان ۋە بەلغەمدەك نەرسىلەر كېلىپ، كېيىن تەرەت كېلىدۇ. ئاغرىش، تولغاپ ئاغرىش قاتارلىق سېزىملەر كىندىك ئاستىدا بولىدۇ. زەرەلەنىش چوڭ ئۈچەي (قۇلۇن ئۈچەي) دە بولسا تەرەتتە قان بىلەن پوتلىدەك نەرسىلەر ئانچە كۆپ بولمايدۇ ۋە ياغ ئارىلاشمىغان كېلىدۇ. ئەمما ئىنچىكە ئۈچەيدە بولغاندا بۇ نەرسىلەر كۆپ بولۇپ قالماستىن، ياغ ئارىلاشقان بولىدۇ. ئۈچەي يۈزى رەڭلىرىنىڭ بۇ خىلدىكىسى ئېغىر ئوتىدۇ. ئۈچەي تېشىلىپ كېتىش ھادىسىسىمۇ كۆرۈلىدۇ. ئۇنداقتا ئۆلۈمگە ئېلىپ بارىدۇ.

2) شور بەلغەمدىن بولغان ئۈچەي ئىچكى يۈزى سويۇلۇشنىڭ ئالامەتلىرى: قوساقنىڭ تاتىلانغاندەك ئاغ-رىشى ۋە ئېچىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، تەرەت بىلەن قان ۋە قويۇق بەلغەمدەك نەرسىلەر كۆپ كېلىدۇ. ئىچ سۈرۈش ئالدىدا كۆپ يەل ماڭىدۇ. تولغاقسىمان ئاغرىق بار جايدا ئېغىرلىق ھېس قىلىنىدۇ. ئاغرىش بىرلا جايدا بولىدۇ، يۆتكەلمەيدۇ. ئەزلە ياكى زۇكام بىلەن ئاغرىغان ھالدا ياكى زۇكامدىن ساقايغان مەزگىلدە يۈز يېرىدۇ. بۇ خىلدىكى سەھەجمۇ ئۈچەينى يارا قىلىشى مۇمكىن.

داۋاسى: يېنىك ھاللاردا ئانار شەرۋىتى، لىمون

شەرۋىتى قاتارلىق چۇچىمەل شەرۋەتلەردىن بېرىلىدۇ. ماددا كۆپ بولسا، ئالدى بىلەن ماددىنى چىقىرىش چارىلىرىنى قىلىپ بولغاندىن كېيىنلا قاتۇرغۇچى دورىلار-نى بېرىش كېرەك. ماددىنى سۇرۇش ئۈچۈن مەتبۇخى خىيار شەنبەر (54 - نۇسخە) ياكى مەتبۇخى تەمىرى ھىندى (115 - نۇسخە) بېرىلگەندىن كېيىن، ئىسپۇغۇل لۇئابى بېرىش شەرت. ئۇندىن كېيىن قاتۇرغۇچى دورىلاردىن بېرىلىدۇ. مەسىلەن، ئىسپۇغۇل، رەيھان ئۇرۇغى، چوڭ پاقا يوپۇرماق ئۇرۇغى، سەمى ئەرەبى، گىل ئەر-مىنى 15 مىسقالدىن، كوكئار ئۇرۇغى 10 مىسقال، پاقا يوپۇرمىغىنىڭ ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، نىشاستە ھەر بىرى 7 مىسقالدىن ئېلىنىپ، ئۇرۇق دورىلار (ئىسپۇغۇل، رەيھان، چوڭ پاقا يوپۇرمىغى ئۇرۇغىدىن باشقىسى) نى ئالدى بىلەن يۇمشاق ئوتتا قورۇپ، ھەممە دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، تالقان قىلىپ 2 مىس-قالدىن كۈنگە 2 قېتىم بېرىلىدۇ. ياكى تۈۋەلدە كۆر-ستىلگەن دورىلارنى ھوقنە قىلىشمۇ بولىدۇ (ئىسپۇغۇلنى سوقۇش مەنبئى قىلىنىدۇ).

نۇسخە: سەمى ئەرەبى، نىشاستە، خۇنسىياۋشان، پاقا يوپۇرمىغىنىڭ سىققان سۈيى، كۆيدۈرۈلگەن قەغەز، كۆيدۈرۈلگەن سەدەپ، قەلەي كۈشتىسى، تۇخۇم سېرىغى (خام) ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، گۈرۈچ، ئارپا، ماش، ئانار گۈلى، ئانار پوستى ھەر بىرى 4 مىسقالدىن يە-تەرلىك مىقداردىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، ماتا ئارقىلىق

سۈزۈپ سىقىپ، سۈيىنى قائىدە بويىچە ھوققە قىلىش كېرەك. ئەگەر ئاغرىش بەك كۈچلۈك بولسا، بېرىلىدىغان تالقان دورىلارغا بىر فوڭ مىقدارىدا ئەپيۇن قوشۇپ بېرىشكە بولىدۇ. بەزىلەر ئەپيۇن بېرىشكە توغرا كەلسە دورىلار تەركىبىگە قۇندۇز قەرى ۋە زەپەر قوشۇپ بەر-مىسە زەھەرلەيدۇ - دىگەن كۆز قاراشلارنى ئورتىغا قوي-غان. تاماق جەھەتتىن گۆش، شېكەر ۋە ياغلىق نەرسە-لەر بېرىلمەيدۇ. ئەمما ئۇچار قاناتلار گۆشى بېرىشكە بولىدۇ.

3) سەۋدادىن ئۈچەي ئىچكى يۈزىنىڭ سويۇلۇ-شى: سەۋدانىڭ ئۈچەيگە قۇيۇلىشىمۇ بۇ خىلدىكى ئىچ سۈرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئالاھىتىلىرى ئېچىش قاتتىق بولىدۇ. تەرەت قارامتۇل رەڭدە كېلىدۇ. بۇنىڭ ئالاھىدىلىكى شۈكى ئاغرىش، تارتىش (تەمەددۇد) بىلەن ئوتىدۇ. ئېغىر ھاللاردا بىھۇشلۇق يۈز بېرىدۇ.

داۋاسى: سەۋدا ھاسىل قىلىدىغان نەرسىلەرنى چەكلەش بىلەن ماددىنى تازىلاش كېرەك. ئۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى بىلەن خىيار شەنەر ياكى ھەتتەبۇخى ئەپىتىمۇن (20 نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن ئاغرىشنى پەسەيتىش ۋە ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش ئۈچۈن سۈيۈپى تىن (141-نۇسخە) بېرىلىدۇ، چۈممەل نەرسىلەردىن ساقلىنىش لازىم. 4) قاتتىق تەرەتتىن ئۈچەي يۈزىنى زەخمىلەندۈرۈشى بىلەنمۇ قانلىق تەرەت كېلىشى مۇمكىن. بۇنىڭ

ئالامىتى شۇكى ئالدىدا قەۋزىيەت بولىدۇ، ئۇزاق ۋاقىت قۇرۇق نان ياكى باشقا قاتۇرغۇچى نەرسىلەرنى يىگەندىمىك تارىخى بولىدۇ. قان تەرەتكە ئارىلاشمىغان ھالدا كېلىدۇ. قاتتىق ئاغرىش ياكى باشقا تىرىلگەن ئالامەتلىرى بولمايدۇ.

داۋاسى: ئۈچەي يوللىرىنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ئىسپۇغۇل ۋە بىيە ئۇرۇغىنىڭ شەرىپلىرىنى بىيەشە شەرۋىتى (74 - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ. بەزىلەر بۇ خىلدىكى كېسەللەردە سۈرگە بېرىپ خاتا قىلىدۇ. چۈنكى يامان ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈش ئېھتىمالى بار.

5) ئۆتكۈر تەسەرلىك ۋە زەھەرلىك دورىلارمۇ ئۈچەينىڭ يۇزىنى زەخمىلەپ قانلىق تەرەت ۋە قانلىق ئىچ سۈرۈش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. مەسىلەن، زەرىخ، نىشۇدۇر، گەجەلەرنى ئىستىمال قىلغاندا يۇقۇردا سوزۇلپ ئۆتۈلگەن قان تولغاقتەك ئالامەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ (بۇ دورىلار ھەققىدە زەھەرلىك دورىلار بابىدا تەپسىلى سۆزلىنىدۇ). مەزكۇر دورىلارنى يىگەنلىگە قاراپ پەرقلەنگىلى بولىدۇ.

داۋاسى: قەي قىلدۇرۇش، يېڭى سېغىلغان كالا سۈتى ئىچكىزۈش كېرەك. بەزىدە كۈچلۈك سۈرگە دورىلارنى كۆپ مىقداردا ئىچىش ئۈچەي ئىچكى يۈزى سوزۇلۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. مۇنداق چاغدا ئىسپۇغۇل ۋە بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇتاپلىرىغا سەمى ئەرەبى

ۋە كەتىرا قوشۇپ ئىچكۈزىلىدۇ. ھەم 142 - نۇسخىدىكى تالقان دورا بېرىلىدۇ. تومۇرنى ئوتتا قىزىتىپ، قېتىققا چىلاپ، شۇ قېتىقنى ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

2. ئۈچەي تاملاردىكى قانتومۇرلارنىڭ شىكەستىلى - مىشى تۇرلۇك جاراھەتلەر ياكى ئۈچەي ئىچكى يۈزىنىڭ سىيۇلۇشى چوڭقۇر بولۇش بىلەن تومۇرلار ئېچىلىپ، تەرەت بىلەن كۆپ مىقداردا قان كېلىدۇ. ئەمما قوساق تولغاپ ئاغرىمايدۇ ھەم سۆڭەك بىۋاسىتە ئىسسىق بولمايدۇ.

داۋاسى: قۇرسى كەھرىبا (71 - نۇسخە) نى شەىر - ۋىتى ھەببۇل ئاس (74 - نۇسخە) ياكى شەرۋىتى ئەنجىب - بار (72 - نۇسخە) بىلەن بېرىش كېرەك. گىل ئەرمىنى، ئانار پوستى، موزىلارنى بازاۋەردىن ئېلىپ، سوقۇپ، 72 - نۇسخىدىكى شەرىپەت بىلەن كۈنىگە 2 مىسقالدىن بېرىش مۇمكىن. داۋاملىق قان كەلسە قوساققا ھىجامەت قويۇپ 4 سائەت تۇرغۇزۇش كېرەك.

يىرىڭلىق ئىچ سۇرۇش

تەرەت بىلەن يىرىڭنىڭ چىقىشى - ئۈچەي ئىچكى يۈزى سىيۇلۇش ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ، زەرەرلەنگەن جاي ئوقۇنەت پەيدا قىلىشى ياكى ئۈچەيدىكى يىرىڭلىق جا - راھەتلەرنىڭ ئېغىز ئېلىشىدىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: ئىچ سۇرگەندە تەرەت بىلەن يىرىڭ ئارىلاش زەرداپ سۇ كېلىشى، سەۋەپلەردىن بۇرۇن ئۈچەي

ئىچكى يۈزى سۈيۈلۈش كېسىلى بىلەن ئاغرىغانلىقى ياكى ئۈچەي چارەھەتلىرى ئالامەتلىرىنىڭ بولۇشى مۇھىم بەلگىسى ھىساپلىنىدۇ. تەرەت سېسىق پۇرىغىنىڭ يىرىڭغا خاس بولۇشى ئوفۇنەتنىڭ ئېغىرلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن ئۈچەينى يىرىڭدىن تازىلاش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن ماش، ئارپا، سىماق، ئازار پوس - تىنى قاينىتىپ سۈيىنى ھوقنە قىلىش كېرەك. بۇنىڭ بىلەن يىرىڭ تازىلىنىپلا قالماستىن بەلكى ئۈچەيدىكى چارەھەتلەرنىڭ ئىت ئېلىشقا ياردەم بېرىدۇ. ئەگەر يىرىڭ كۆپ ۋە ئوفۇنەت ئېغىرلىقى مەلۇم بولسا ماش، گۈرۈچ، ئارپا ئۇنى ۋە پېرىم مىسقال ئۈزۈم ئۇرۇغىنى قوشۇپ بىر كېچە قايناقسۇغا چىلاپ، ئەتىسى قاينىتىپ ئەمىنى چىقىرىپ سۈزۈپ، قۇرسى زەرنىخ (143 - نىسخە) قوشۇپ ئېرىتىپ ھوقنە قىلىنىدۇ. يىرىڭ كېلىش تېخى - تېخىدىن كېيىن، شورلۇق بەلغەمدىن ئۈچەي يۈزى سۈيۈلۈشتە كۆرسەتكەن ھوقنە قىلىنىدۇ.

بۇ كېسەلدە ئۈچەيدىن كەلگەن يىرىڭنى بەلغەم ماددىسى دەپ خاتا گۇمان تۇغۇلۇپ قېلىشى مۇمكىن. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۆپكە سىل كېسىلىدە كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن يىرىڭ بىلەن بەلغەمنى ئايرىش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ ئېنىقلىغىلى بولىدۇ، سەپرا ياكى قان ماددىسى زىيادە بولسا قۇرسى زەرنىخ قوشۇلغان ھوقنەنى قىلىشقا بولمايدۇ. خاس بەلغەمدىن بولسىمۇ ئۇنى ئىشلەتمەسلىك

كېرەك (بۇنى تەرەتتىكى نەرسىنىڭ يىرىك ياكى بەلگەسى ئىكەنلىكىنى بىلىش بىلەن بەلگىلەش كېرەك).

تولغاق (زەھىرە)

كېسەلنىڭ قوسىغى قاتتىق تولغاپ ئاغرىدۇ، ئىنجىق بولىدۇ ۋە پات-پات تەرەت قىستايدۇ. ئەمما تەرەتكە بارغاندا قۇرۇق ئىنجىق ۋە خېلى بىئاراملىقتىن ئاز مىقداردا شىلىملىق بەلگەمدەك نەرسە كېلىپ، ئالامەتلەر سەل يېنىكىلىشىپ قالىدۇ. بارغانسېرى بۇ ھال تۇتقاقلق شەكىل ئېلىپ تەكرارلىنىدۇ. تەرەت ئورنىغا ئازغىنە پوتلىدەك قان ئارىلاش بىر نەرسە كېلىدۇ. ئاغرىق يەڭگىلەشكەنسىمۇ تۇتقاقلق ئارىلىغى ئۇزۇرۇپ تەرەت بىلەن ئازغىنە بەلگەمدەك نەرسە كېلىدۇ. بۇلار تولغاق كېسەلدىكى ئۇمۇمىي ئالامەتلەر بولۇپ، ئۇنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سەۋەپلەرگە قاراپ يەنە ئايرىم ئالاھىدە بەلگىلەرمۇ كۆرۈلىدۇ.

سەۋىبى: 1. چوڭ ئۇچەينىڭ ئىسسىقلىقتىن ياللۇغلىنىشى سەۋىبىدىن كېلىپ چىقىدۇ. مۇنداق كېسەلدە يۇقۇرقىي ئالامەتلەر ئېغىر بولۇش بىلەن بىللە ئۇچەيدە تارتىشىش سېزىلىدۇ. ۋە پات-پات چوڭ تەرەتكە بارىدۇ. تەرەت كەلمەي ئازاپ تارتىدۇ. ئاغرىش بىلەن تەڭ قىزىتما پەيدا بولۇپ، قۇرۇق ھو ۋە بەزىدە سۇيۇك كەلمەسلىك كۆرۈلىدۇ.

2. سوغۇغا ئۆتكۈر سۇغاقلق تەسىر قىلىشى نەتىجە

جىسىدە چوڭ ئۈچەيدە ئىچكى تەرەپكە قاراپ قىقىرىش پەيدا بولىدۇ. بۇنى كېسەل تەرەت قىستىدى دەپ ئويلاپ تەرەتكە بارسا قىقارغان ئۈچەي تەرەتنى ماڭ-خۇزماي ئىنجىقلاش نەتىجىسىدە ئۈچەينىڭ ئېپىز قاتلىمى بىرئاز سۇيۇقلۇق بىلەن كېلىپ ئاغرىش ۋە قىقىرىش يەڭگىللەشكەندەك بولىدۇ.

3. ئۈچەي ئىچىدە قېتىپ قالغان گەندە تۇرۇپ قالغاندا بەدەن ئۇنى كۈچەپ ھەيدەيدۇ. ئەمما گەندە قۇرۇق بولغىنى ئۈچۈن ماڭماي ئىنجىق كۈچى بىلەن ئۈچەيدىكى شىلىملىق نەرسىلەر كېلىدۇ. بۇ يالغان تولغاق (زەھىرە كازىپ) دەپ ئاتىلىدۇ. تەرەت بىلەن كۆپ يەل كېلىدۇ، قوساق غولدۇرلايدۇ. تەرەت شىلىملىق ئارىلاش-قان قوناقتەك، پۇرچاقتەك قاتتىق گەندىدىن ئىبارەت بولىدۇ. بۇنى بەزىلەر باشقا ئىچ سۇرۇشلەر بىلەن ئارد-لاشتۇرۇپ قويۇپ، ئىچنى قاتۇرغۇچى دورىلارنى بېرىپ خاتا داۋالاپ ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈۋېتىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن كېسەلگە شىرىك سۇيۇقلۇق پەيدا قىلغۇچى دورىلاردىن ئىسپۇغۇل، بالەنگۇ قاتارلىق دورىلارنى سۇقماستىن قاي-ناقسۇ بىلەن بىرئاز ئىچكۈزۈلىدۇ. ئەگەر تەرەت بىلەن بۇ دورىلار چىقسا ساخا تولغاق ئەمەس.

4. سەپرا ۋە سەۋدا نەتىجىسىدىن بولغانلىرىدا ئومۇمىي ئالامەتلەر بىلەن سۆڭىكنىڭ ئېچىشى، تەشالىق ۋە قوساقتا قىزىقلىق ھىس قىلىشلار بولۇپ، كېسەل سوغاقلىقتىن راھەتلىگەندەك بولىدۇ.

داۋاسى: تۇلغا قىزىڭ داۋاسى كۆرسىتىلگەن سۈپەت

لىرىگە قاراپ ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئەمما ئومۇمەن ئېلىپ ئېيتقاندا بۇ كېسەلدە دورىلارنى شامچە شەكلى بىلەن تەسىر قىلدۇرۇشنى ئاساس قىلىش كېرەك.

(1) چوڭ ئۈچەينىڭ ئېسىقتىن بولغان ياللۇغ-لىنىشىدا مەنى قىلىدىغان ھاللار بولمىسا كىمىدىك ئاستىغا ھىجامەت قويۇش كېرەك. تاماق مىقدارىنى ئازايتىش بىلەن، ماددىسىنى چىقىرىش، ئاغرىش ۋە تارتىشىشنى پەسەيتىش ئۈچۈن كاسىن، شاتەرە، يېمىز ئوت ئۇرۇقى ۋە چىلان قاتارلىقلارنى قاينىتىپ بېرىش لازىم. ئۇندىن كېيىن ئاق لەيلى گۈل، ھەمىشئۇا گۈلى، بىنەپشە، بابۇنە، كالىك بەسەي يوپۇرماقلىرىنى قاينىتىپ، سۈيىنى ھوققە قىلىش كېرەك. تۆۋەندىكى دورىلار بىلەن شامچە تەييارلاپ سوغغا قويۇش كېرەك. ئەكىل مىلىك، كالىك بەسەي يوپۇرماقى، شۇمشە 3 مىسقالدىن، مۇقىل يېرىم مىسقال، پىياز بىر دانە.

تەييارلاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن پىيازنى ئوتقا

كۆمۈپ پىشۇرۇش كېرەك. ئۇندىن كېيىن تازىلاپ يانچىپ، سۈيىدە مۇقىلنى ئېرىتىپ، قالغان دورىلار يۇمشاق سۈە قۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، مۇۋاپىق مىقداردا شامچە ياساپ سوغغا قويۇلىدۇ. ئەگەر مۇمكىن بولسا كېسەلنى بىر-ئىككى قېتىم قەي قىلدۇرۇش كېرەك. ئەگەر ئۈچەيدە ياللۇغلىنىش ئېغىر بولسا، ئالدى بىلەن ئۈچەي ياللۇغلىرى قاتارىدا داۋالاپ كۆرۈش كېرەك.

(2) سوغغا ئۆتكۈر سوغاقلق تەسىر قىلغاندا، سوغغا ئىسسىق ئۆتكۈزۈش، ئىسسىقلىق ياغلاردىن قۇست ياكى بابۇنە يېغى بىلەن سوغنى ياغلاش كېرەك. بابۇنە سېرىق چىچەك ئۇرۇغى، ئىت ئۇزۇمى، ئەكىلىل مىلىكلەرنى قاينىتىپ چوڭ داسقا ئېلىپ، كېسەلنى ئولتۇرغۇزۇلىدۇ.

(3) ئۇچەيدە قاتتىق گەندە تۇرۇۋالغاندا ئالدى

بىلەن ئۇچەيدىكى قېتىپ قالغان تەرەتنى يۇمشىتىش ئۈچۈن، بىنەپشە شەرۋىتى (74-نۇسخە)گە خىيارى شەد-يەر شىرىسى (قايناقسۇدا ئېرىتىپ سۇزۇلگەن خىيارى شەنەر)، بادام يېغى قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئىلمان سۇ ياكى مۇۋاپىق باشقا دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىش ۋە قاي-ناقسۇنى كۆپرەك ئىچىش كېرەك.

(4) سەپرا ۋە سەۋدادىن بولغىنىدا ئىچىشكە ئازار شەرۋىتى، لىمۇن شەرۋىتى (47-نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھوقنە ئۇچۇن گۈل يېغى، گىل ئەرەمنى، قەلەي كۇشتىسى، شادىج، ھۇمماز ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇقلىرىنىڭ قاينى-تىلغان سۈيى بېرىلىدۇ. ھەم تۆۋەندىكى دورىلار بىلەن شامچە تەييارلاپ مەقئەدكە قويۇلىدۇ.

كوندۇر، روسۇت، سەمغى ئەرەبى، ھەربىرى 2 مىس-قال، زەپەر 2 مىسقال، ئەپيۇن بىر فۇڭ.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەپيۇننى بىرئاز سۇ بىلەن ئېرىتىپ، سۇقۇلغان دورىنى خېمىردەك قىلىپ، مۇۋاپىق چوڭلۇقتا شامچە تەييارلاپ، سايىدا قۇرۇتۇپ، گۈل يېغى بىلەن ياغلاپ سوغغا تىقىپ قويۇلىدۇ.

بەزىدە مەئدە بوش چاغلاردا چۈچمەل نەرسىلەرنى
ئىستىمال قىلغانلىقتىنمۇ تولغاق پەيدا بولىدۇ. بۇنداق
لاردا ناۋات سالغان چاي بىلەن چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم
سېرىقى ۋە گىل ئەرەمنى، سەمغى ئەرەبى قوشۇپ بېرىلىدۇ.
ئۈچەيگە يەل تولۇش

ئادەتتە بۇ قوساق ئېسىلىش، قوساق كوپۇش دەپ
ئاتىلىدۇ. غەيرى تەبىئى يەللەرنىڭ ئۈچەيدە توپىلىش
قېلىشىدىن ئىبارەت.

سەۋىيى: يەل پەيدا قىلغۇچى تاماقلار مەسىلەن،
ئارپا ۋە پۇرچاق خىلىدىكىلەرنى كوپ ياكى داۋاملىق
ئىستىمال قىلىش، كالا، ئۈچكە ۋە كىچىك گۆشلىرىدەك
سىڭىشى تەس ۋە كۈچلۈك تاماقلارنى كوپ يېيىش،
ئۈچەينىڭ سوۋۇپ قېلىشى، بۇنىڭ سەۋىيى سوغاقلقلارنى
كوپ ئىستىمال قىلىش، سوغاق سۇغا كوپ چومۇلۇش
قاتارلىقلار سەۋەپ بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆرسىتىلگەن سەۋەپلەردىن بىرى
بولۇش بىلەن بىللە، قوساق ئېسىلىش، يەل كېلىش ۋە
قوساق غولىدۇرلاشتىن ئىبارەت ئالامەتلەرمۇ بولىدۇ.
ئۈچەي سوۋۇپ كەتكەندە تاماقنى مۇۋاپىق ھالدا يەپ
تۇرسىمۇ بۇ ھال داۋام قىلىۋىرىدۇ. بەزىلەردە ئىچ سۇرۇش
بىللە كېلىدۇ.

داۋاسى: سەۋىيىنى يوقىتىش كېرەك. تاماقنى ئاز -
ئازدىن بېرىش، يېمىشكە مەجۇنى كۆمۈنى ياكى جاۋارش

پىلاپى (144-نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئىگەر ئىچ سۇرۇش بىللە بولسا، جەۋارىش خەۋزى (145-نۇسخە) بېرىلىدۇ.

3. پەسىل: چوڭ ئۇچەي كېسەللىكلىرى (قۇلۇنجى)

چوڭ ئۇچەي كېسەللىكلىرى (قۇلۇنجى) دەپ تىبابەتتە چوڭ ئۇچەيدىكى ھەرخىل زەرەرلىنىشلەر كوز-دە تۇتۇلىدۇ. ئادەتتە قوساقنىڭ باشقا كېسەللىك ئالامەتلىرى بىلەن ئىزاھلاپ بولمايدىغان ئاغرىشلىرى يەنى قۇرۇق قوساق ئاغرىقلىرى، قۇلۇنجى، دەپ قىرىيۇلىدۇ. قۇلۇنجى - كېسەللىكلىرى ئۆز ئىچىگە قوساق ئاغرىش، چوڭ ئۇچەينىڭ توسىلىشى ۋە مەدە قۇرۇتلار سەۋىيىدىن قوساقنىڭ ئاغرىشى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

قۇرۇق قوساق ئاغرىش (قۇلۇنجى)

چوڭ ئۇچەي بار يەرلەردە ئاغرىش سىزىلىپ قەۋزىيەت بولۇپ، تەرەت قىيىنلىق بىلەن كېلىدىغان ئىھۋالنى قۇلۇنجى - قۇرۇق قوساق ئاغرىش دەپ ئاتايدۇ. جالىنۇس: "چوڭ ئۇچەي (قۇلۇن) قوساقنىڭ ھەممە يېرىگە باراۋەر كېلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭ ئاغرىشى پۈتۈن قوساق قىسمىدا سىزىلىشى مۇمكىن" دىگەن. قۇلۇنجى كېسەلى سەۋەپلىرىگە قاراپ بىرقانچە قىسىمغا بۆلۈنىدۇ. مەسىلەن، 1) قىيۇق غىزالار مەسىلەن، ھۆردا پىشۇرۇلغان نان، گۈرۈچ تاماقللىرى ۋە سوغاق يەللىك

نە. سىلەر، ھول ئۇزۇم، شاپتۇل ۋە خاڭكا قاتارلىقلارنى داۋاملىق ياكى كۆپ مىقداردا يىمىش سەۋىيىسى بىلەن بەندە بولىدۇ. بۇنىڭدىكى ئالامەتلەر: قوساق كۆپىيىدۇ، يەل يۇرۇشىدۇ. قوساقتا ئاغرىش بولۇپ يۆتكىلىپ تۇرىدۇ. بەزىدە ئىچ قېتىپ قالىدۇ. تەرەت قىيىنلىق بىلەن ماڭىدۇ. بەزىدە ئىچ سۇرۇش بىلەن كېلىدۇ، كۆڭۈل ئاينىدۇ. (2) مالىخولىيا كېسىلىدە ئۇچرايدۇ. تۇيۇقسىز قوساق ئېسىلىش، چۆچىمەل كىكىرىش كۆرىلىدۇ. ئەمما ئاغرىش ئالغىچە ئىسسىق بولمايدۇ. مالىخولىيانىڭ باشقا ئالامەتلىرى روشەن بولىدۇ.

(3) سەپىرا قولۇنىغا چۈشكەندە قوساقنىڭ ئىككى ئاغرىش ئېچىش بىلەن بىللە بولىدۇ. تەرىتى سېرىق رەڭدە بولۇپ، سۆڭىك بېشىدۇ. تەشالىق بولىدۇ. شور بەلغەمنىڭ چوڭ ئۆچىگە چۈشۈش بۇ خىل ئاغرىق پەيدا قىلىشى مۇمكىن.

داۋاسى: قوساق ئاغرىشلاردا مەيلى قايسى سەۋەپتىن بولمىسۇن ئاۋال سۇرگە بېرىشكە بولمايدۇ. ھوققە ياكى شامچىلا بىلەن تۈۋەنكى تەرەپ يولىنى ئاچقاندىن كېيىن، باشقا تەدبىرلەرنى كۆرۈش كېرەك.

1. تۈردىكى قۇلۇنچىدا ئاۋال مۇۋاپىق دورىلار بىلەن ھوققە قىلىش لازىم. ۋە مۇنۇ نۇسخىدىكى شامچىنى قويۇش كېرەك:

بۆرەنمىنى: 10 مىسقال، شەھى ھەنزەل، مۇقىل،

سەككىزىنچ ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، سوقمولىيا $2\frac{1}{2}$ مىس

قال، قارا شېكەر 9 مىسقال، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ
قارا شېكەر سۈيىدە خېمىر قىلىپ سېرىق ياغ ياكى
گۈل يېغى بىلەن ياغلاپ، ئۇزۇنراق شامچە تەييارلاپ،
سايىدا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. ھاجەت بولغاندا ئىشلىتىدۇ.

ئۇندىن كېيىن ھەنبى ئايارەج (7 - نۇسخە) ۋە
جەۋارشى شەھرىياران (97 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بىر كېچە -
كۈندۈزدىن كېيىن قېرى خوراز گۆشى شۇرپىسىغا دارچىن،
زەنجىۋىل، زىرە ۋە پىننە قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئوقۇت
سۈيى ئىچىرىلىدۇ. ئۇسۇزلۇق ئۈچۈن بېدىيان سۈيى
ياكى ھەسەل سۈيى بېرىلسە ياخشى.

2. تۇردىكى قۇلۇنچىدا يەڭگىل ھوقنە دورىلىرى
بىلەن تەرەتنى بوشىتىپ، ئارقىدىن مەتبۇخى تەپتىمۇن
(53 - 20 - نۇسخىلەر) بېرىلىدۇ (قالغان چارلىرى
ھەققىدە مالىخولىياغا قارالسۇن).

3. تۇردىكى قۇلۇنچىدا - يۇقۇرىدا كورستىلىگەن
شامچە ياكى مۇۋاپىق دورىلار (تەركىۋىدە تەمىرى ھىندى
بار بولغان دورىلار) ھوقنە قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن،
ئىسپۇغول، بىيە ئۇرۇغى ۋە بالەنگۇ لۇئاپلىرى بىلەن،
سېمىز ئوت ئۇرۇغى ۋە پاقا يوپۇرمىغىنىڭ شىرىسى
بېرىلىدۇ. ۋە سەپرانى تازىلاش ئۈچۈن كاسىن ئۇرۇغى
ۋە ئىت ئۇزۇمى سۈيىگە خىيارى شەنبەرنى ئېرىتىپ،

سۈزۈپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئەگەر ھارارەت بولسا، ئۇچەي غولنى (سوقماستىن) گۈلەپ ياكى ئانار سۈيىگە قوشۇپ بېرىلىدۇ.

ئۇچەي توسىلىش

تىبابەتتە چوڭ ئۇچەيدىكى توسىلىش قۇلۇنجى ئىلىتۇر، ئىنچىكە ئۇچەيدىكى توسىلىش قۇلۇنجى ئىلاۋۇس ① دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇچەينىڭ توسىلىشى سەۋەب جەھەتتىن غەلىز بەلغەمدىن؛ غەلىز يەلدىن؛ چوڭ ئۇچەينىڭ ئىششىشىدىن؛ ئۇچەي تولغىشىپ قېلىشتىن؛ قاتقان گەندىنىڭ تۇرۇپ قېلىشىدىن؛ غەيرى تەبىئى سەپرادىن؛ باشقا ئەزالاردىكى ئىششىللارنىڭ ئۇچەينى بېشىدىن بۆلگەن توسىلىشلار دەپ پەرقلەندۈرىلىدۇ. ئۇچەي ئىچە-نىڭ تۇغما تار بولۇشى ياكى تۇغۇلغاندىن كېيىنكى تۈرلۈك زەخمىلىنىشلەر بىلەن تارىيىپ قېلىشىمۇ توسە-لىشقا سەۋەبچى بولىدۇ.

1) قويۇق بەلغەم سەۋىيى بىلەن ئۇچەي توسىلىش: قويۇق گەجەك بەلغەم ماددىسى تەرەتكە قوشۇلۇپ قارغۇ ئۇچەي (ئەتۋەر) نى توساپ قويىدۇ.

ئالامەتلىرى: قاتتىق-قۇرۇق نەرسىلەرنى يىگەنلىك ۋە سېسىق كىكىرىش، تەرەتتە بەلغەمدەك نەرسىلەرنىڭ بولۇشى بۇ كېسەلنىڭ ئالدىدىكى ئەھۋاللاردىندۇر، ئۇندىن كېيىن ئىشتەي تۇتۇلىدۇ، ۋە كىندىك ئاستى چىڭقىلىدۇ.

① ئىلاۋۇس - ئەسلىدە لاتىنچە "ئىلاۋۇس" (ئۇچەي توسىلىش) تىن كەلگەن.

چوڭ تەرىتى ئاز - ئازدىن توختاپ قالىدۇ (تەرەت ماڭماي - دۇ)، قوساق كۆپىدۇ، چۈچمەل نەرسىلەرنى يىگۈسى كىلىدۇ، ئاغرىش قاتتىقلىشىدۇ، ئاغرىشنىڭ قات - تىق بولىشىدىن كېسەل بىارام بولىدۇ ۋە جىگەردە ھارارەت پەيدا بولىشى بىلەن تەشەنالىق كۈچىيىپ، سۈيدۈك قىزىل رەڭدە كېلىدۇ. بەزىلەر بۇ ئەھۋالنى سەپرا نەتىجىسىدىكى ۋەرەم دەپ خاتا گۇمان قىلىدۇ. بۇ كېسەلدە سۈيدۈكنىڭ قىزىل بولىشى ۋە تەشەنالىقنى دىققەت قىلىپ، باھا بەرمىگەندە خاتالىق تۇغۇلۇشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن غەلىز بەلغەم ۋە سەپرانىڭ باشقا ئالامەتلىرىنى ئىزدەپ ئېنىقلاش كېرەك.

داۋاسى: ئالدى بىلەن تۈۋەندىكى شامچە ۋە ھوقنەلەرنى قىلىپ ئۈچەي يولىنى ئېچىش كېرەك. ئۇندىن كېيىن جەۋا ن شەھرى ياران (97 - نۇسخە) گە شەھى ھەنزەل، رىقۇن قوشۇپ قايناقۇ بىلەن كۈنگە 4 مىسقال بېرىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن تەرەتنىڭ مېڭىشى ئوڭايلىشىپ كوڭۇل ئاينىش ۋە قۇسۇش پەسىيدۇ. ئەھ - ۋال ياخشىلانمىغىچە تاماق بېرىلمەيدۇ.

ھوقنە دورىلىرى: سىيادان، تۇخۇمەك ئۇزۇمنى 15 مىسقالدىن ئېلىپ، چالا سوقۇپ يېتەرلىك مىقدار - ىدىكى سۇ بىلەن (3 چوڭ چىنە سۇ قالغىدەك) قاينىتىپ سۈزۈپ، ئۈستىگە قىزىلچا يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى، كالىئەك بەسەي سۈيى، سېرىق ماي 7 مىسقال، بادام يېغى

4 مىسقالنى قوشۇپ ھوققە قىلىنىدۇ. ھوققە قىلىش سۈرئىتى ئوتتۇرا ھال بولغىنى ياخشى.

شامچە دورىسى: تەرىپى، شەھى ھەزەل، ئەنزۇ- رۇت، تۇغرىغۇ، ئاق تۇز، قارا شېكەرنى 3 مىسقالدىن ئېلىپ يۇمشاق سوتۇپ، قارا شېكەرنى بىر ئاز سۇدا ئېرىتىپ، دورىلارنى يۇغۇرۇپ توملىغى ۋە ئۇزۇلۇغى كۆرسەتكۈچ بارماق بىلەن باراۋەر شامچە ياساپ سېرىق ماي بىلەن مايلاپ مەقۇنكە قويۇلىدۇ. تاشقى تەرەپتىن چېپىش ئۈچۈن سىم ئان، تۇخۇمەك ئۇزۇمنى 5 مىسقالدىن ئېلىپ سوقۇپ سېرىق سۇ بىلەن قوساقتا قويۇش ياكى سېرىق چىچەك يېغى، قىچا يېغى، ئارىلاشتۇرۇپ قوساقتا سۇۋاش كېرەك. ئەگەر بۇلارغى بىر ئازدىن ئەپيۇن بىلەن قۇندۇز قەرى قوشۇلسا تېخىمۇ ياخشى.

ئۈچەي توسىلىش كۆپ ۋاقىتلاردا باشقا كېسەل- لەردىكى ئاغرىشلار مەسىلەن، قۇرۇق قوساق ئاغرىش، بۆرەك ئاغرىغى، بالىياتقۇ ئاغرىقلىرى، ۋە مەدە قۇرۇت- لىرى سەۋىبىدىن بولغان ئاغرىشلار دەپ خاتا گۇمان قىلىنىشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ كېسەللىكلەر بىلەن ئۈچەي توسىلىشنىڭ پەرقى توۋەندىكىچە:

(1) قوساق ساھەسىنىڭ باشقا ھەر قانداق ئاغرىق- لىرىدا مەيلى مەدە ۋە ئۈچەيلەردە بولمىسۇن چوڭ تەرەت ئازدۇر- كۆپتۇر ماكىدۇ. ۋە يەل يۇرۇشۇپ يېنىكلىەيدۇ. ئەمما ئۈچەي توسىلىشتا ئاغرىش ئېغىر

بولىدۇ. قوساق بارغانىرى ئېسىلىدۇ. چوڭ تەرەت پۈتۈنلەي كەلمەيدۇ. كېسەل سوغاق تەرلەيدۇ. بەك بئارام بولۇپ، قۇسۇش كوپ ئازاپلايدۇ.

(2) بورەك ئاغرىقلىرىدا، ئاغرىشنىڭ باشلىنىشى بورەك بار جايدا يەنى بەل ساھەسىدە بولۇپ، پىچاق سانچىغاندەك ئاغرىدۇ. يۈتكەلمەيدۇ. سۆيىدۈك توختاش ياكى ئاز كېلىش ئالامەتلىرى ياكى بورەكتە تاش بار. لىغىنى بىلدۈرىدىغان باشقا ئالامەتلەر (بورەك ئاغرىق-لىرىغا قاراڭ) بولىدۇ. ئۈچەي توسىلىشلاردا بەل ئاغ-رىشۇ مۇمكىن. ئەمما ئاغرىش بىر جايدا بولماستىن يۈتكىلىپ تۇرىدۇ. باشلىنىشتا ئوڭ تەرەپ بەل يۇقۇرقى قەسمىدىن باشلىنىدۇ.

(3) بالىياتقۇ (رەھىم) نىڭ ئاغرىشى ئادەتتە تۈۋەندىكى قوساقتا — دوسۇن ئۈستىدە بولىدۇ ۋە ئالدى بىلەن بالىياتقۇغا خاس ئالامەتلەر، ھېمىز توختاپ قېلىش بەلگىلىرى بولىدۇ (بالىياتقۇ ئاغرىقلىرىغا قاراڭ).

(4) ئۈچەيدىكى مەددە قۇرۇتلار سەۋىبىدىن بولغان ئاغرىشلاردا كېسەلدىن مەددە — قۇرۇت چۈشكەنلىگىنى سوراپ، بىلگەندىن كېيىن گۇمان قالمايدۇ. ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا، قەي، ئاغرىش ۋە ئۈچەينىڭ كۈپىش بىلەن كېلىپ چىققان روشەن ھالدىكى ئېغىر قوساق ئېسىلىش، پاقالچەك گۈشلىرىنىڭ ئاغرىشى بىللە بولغاندا ئۈچەي توسىلىشىنى ئويلاش لازىم.

2) قويۇق يەل (بادى غەلىز) دىن بولغان ئۈچەي توسىلىش، ئۈچەي قاتەملىرى ياكى ئېپىز پەردىلىرىگە چۈشكەن قۇيۇن يەل، ئۈچەي يوللىرىنى توساپ قويىدۇ. ئالامەتلىرى: قوساقنىڭ ئاغرىشى بىرەر يەللەك سوغاق نەرسە (ھول يېمىش، ئۇرۇك خاڭگالارنى يېيىش) بانىسى بىلەن باشلىنىدۇ. قوشۇق ئېسىلىدۇ ۋە غولۇر-لايدۇ. ئاغرىش بارغانسېرى ئېغىرلىشىدۇ. ئەگەر سەۋىبى يۇمشاق يەلدىن بەلار بولسا، قوساققا ئېسىق ئۆتكۈزۈش بىلەن كېسەللەك ئالامەتلىرى يەنىڭگىلىشىدۇ. ئەمما قويۇق يەلدە ئوخشاش تارىدۇ. بەزىدە ئۈچەينىڭ يەل تېپىلاشقان جايى ئېنىق ھالدا كۆتىرىلىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: شامچە ۋە ھەۋەسە بىلەن توسىلىشنى ئېچىش كېرەك. بۇ خىلدىكى توسىلىشتا تەۋەندىكى نۇسخىلار بىرىلىدۇ:

شامچە نۇسخىسى: شەھىمى ھەنزەل 3 مىسقال، دۈرە ئېرىمنى، مۇقىل، جاۋۇش، سوزاپ، قارا شېكەر ھەر بىرى 4 مىسقالدىن، قۇندۇز قەرى $\frac{1}{2}$ مىسقال. كىورستىپ

ئوتۇلگەن ئۇسۇل بىلەن تەييارلاپ ئىشلىتىلىدۇ.

ھوققە نۇسخىسى — سوزاپ، يالىۇز، بابۇنە ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، مەرزەنجۇش چىگىمى ئۇرۇغى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، ئارپا بېدىيان، جۈۋىنە 2 مىسقالدىن، ئەنجۈر بەش دانە، تەييارلاش ئۇسۇلى دورىلارنى چالا سىرقۇپ 2 چىڭ مىقدارى سۇ بىلەن يېزىمى قالغىدەك قاينىتىپ، سۈزۈپ، بىر ئاز سېرىق ماي ئارىلاشتۇرۇپ

ھوققە قىلىنىدۇ. شاھچە ۋە ھوققەدىن كېيىن ئۈچەي يولى ئېچىلىپ، تەرەت ماڭغاندىن كېيىنمۇ يەنە ئاغرىش بولسا (مۇنداق ئاغرىش بەگىلەرگە بولىدۇ)، يۇ ئۈچەي-نىڭ سوۋۇپ كەتكەنلىكىدىن شۇنداق بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۈچەينى قىزىتىش چارىلىرىنى قىلىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن قۇناق ئۇنى ۋە تۈزنى قىزىتىپ قىزىققا قويۇش، سۇزاپ يېغى، ياسىمەن يېغى بىلەن ياغلاش كېرەك. ھەم مەجۇنى كۆمۈنى، مەجۇنى پىلاي (49 - 144 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ، ھەسەل سۈيى بېرىلىدۇ.

3) ئۈچەي ياللۇغى ۋە ئىششىقلىرى سەۋەبىدىن ئۈچەي تۈسلىش: ئۈچەيدىكى ياللۇغلىنىش ۋە ئىششىقلىرى يولى تۈسەپ قويغاندا ئۈچەينىڭ تۈسلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئالامەتلىرى: قىزىتما بولىدۇ، لوڧۇلاپ ئېچىشىپ ئاغرىيدۇ، تەشەلىق ئېغىر بولىدۇ. تۈسلىش ئالامەتلىرى ئاستا - ئاستا پەيدا بولۇپ بارغانسېرى تەرەت كەلمەيدىغان دەرىجىسىگە يېتىپ بارىدۇ، سۈيىدۈكمۇ توختايدۇ.

داۋاسى: تۈسلىش ئالامەتلىرى روشەن بولمىغان چاغلاردا تەرەت يۇمشاق كېلىشنىڭ ئامالىنى قىلىپ، تەرەت ئۈچەيدە توپىلىشىپ قېلىشىدىن ساقلىنىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن توۋەندىكى نۇسخىدىكى شەرۋەتنى كۈنىگە 3 قېتىم 3 قوشۇقش بېرىش لازىم. پۇنۇس، ئەينۇلا

ھەر بىرى 15 مىسقالدىن، خىيارى شەنبەر، سرخىت ھەر بىرى 10 مىسقالدىن، كاسىن ئۇرۇغى، ئىت ئۇزۇمى كاكىنج ھەر بىرى 4 مىسقالدىن، ئاق لەيلى، ئىزخىر 2 مىسقالدىن، ھەمشىۋا 3 مىسقال، گازىۋان 3 مىسقال، گۈل بىنەپشە 12 مىسقال، خەشخاش ئۇرۇغى 2 مىسقال، بادام مېغىزى (يەنىچىلىگەن) 15 دانە. يۇقۇرقىلارنى ئۆلچەپ ئېلىپ، سۇ قۇيۇپ ئادەتتىكى شەرۋەت تەييارلاش ئۇسۇلى بىلەن تەييارلىنىدۇ. ئەگەر ئانار سۈيى قوشۇپ بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى. توسلىش ئالامەتلىرى روشەن بولغاندا (ئالامەتلىرى ئېغىر بولسا) ئالدى بىلەن ھوقنە قىلىنىدۇ.

ھوقنە ئۇسخىسى:

شۈمبە ئۇرۇغى، بابۇنە، زىغىر ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، ئارپا سۈيى ئىت ئۇزۇمى سۈيى، خىيارى شەنبەر (قايناقسۇدا ئېرىتكەن)، ھەر بىرى 15 مىسقال، چىلان 10 دانە، سەرپىستان 20 دانە، ئاق لەيلى ئۇرۇغى 3 مىسقال، ئىسپۇغۇل 15 مىسقال، خاڭگا ئۇرۇغى، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى 4 مىسقالدىن، بىنەپشە يېغى 10 مىسقال، بادام يېغى 4 مىسقال. ئىسپۇغۇلنىڭ لۇئابىنى چىقىرىپ شۇ دورىلارغا قوشۇلىدۇ. قالغان دورىلارنى چالا سوقۇپ يېتەرلىك مىقداردىكى سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۈزۈپ ھەممىنى بىرلەشتۈرۈپ ئۇستىگە ياغ دورىلارنى قوشۇپ ھوقنە قىلىنىدۇ.

ئىشقىنىڭ قان، سەپرا ۋە بەلغەمدىن بولۇشى كۆپرەك ئۇچرايدۇ. يۇقۇرقى چارىلار بىلەن ئۇچەي يولىنى ئاچقاندىن كېيىن ماددىسىغا قاراپ دورىلار بېرىلىدۇ ۋە چارە قىلىنىدۇ. قاندىن بولسا يۇقۇرقى چارىلەر يېتەرلىك. سەپرادىن بولغاندا شەۋىتى بۇزۇرى ياكى شەۋىتى بىنەپشىگە سۇقۇمۇنىيا، تەمىرى ھىندى قوشۇپ بېرىلىدۇ (29، + 130، 74 - نۇسخىلار). ئەگەر بەلغەم - دىن بولغان بولسا ھوقنە دورىلىرىغا بەلغەم ماددىسىنى تازىلىغۇچى دورىلارنى قوشۇپ ئىچكۈزۈلىدۇ ۋە مەجۇنى تۇربۇت (146 - نۇسخە) دىن كۈنىگە 5 مىسال بېرىلىدۇ.

4) ئۇچەينىڭ تولغىشىپ قېلىشى: ئۇچەينىڭ تولغىشىپ چىكىلىشىپ قېلىشى، ئۇچەي چاۋا بېغىشلىرىنىڭ ئالمىشىپ قېلىشى ياكى قوساق پەردىسىنىڭ يىرتىلىشىدىن پەيدا بولغان بوشلۇققا ئۇچەي كىرىپ قىلىپ قېلىش قاتارلىق سەۋەپلەر بىلەن ئۇچەي تولغىشىپ قېلىش كېلىپ چىقىدۇ. بۇ ھال كۆپىنچە چۇقۇق (يەتەق) نىڭ ئۇرۇقدانىغا چۈشۈشلىرىدە ئۇچرايدۇ. تىبابەتتە بۇ چۇقۇقتىن بولغان ئۇچەي توسە - لىش (قۇلۇنجى ئىلتىۋائى يەتەقى) دەپ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئەزەلدىن چۇقۇق كېسىلى بارلاردا تەسادىپى ھالدا ئۇرۇقدان خالىتىسىغا ئۇچەي چۈشۈپ ئەكسىگە كەلمەيدۇ. خالتا چوڭىمىدۇ. قاتتىق ئاغرىش ئۇرۇقدان

خالتىسىدا يۈز بېرىپ ئۈچەي تۈسلىشىشنىڭ يۈرۈشىنى كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. ياكى ئىگىز جايىدىن سەكرەش، ئېغىر نەرسە كۆتىرىش پائالىيەتلىرى بىلەن قوساققا قاتتىق ئاغرىش سېزىدۇ. بۇ بارغانسېرى ئېغىر-لىشىپ، تۈسلىشىشنىڭ بەلگىلىرى (قوساق قاتتىق ئاغرىش، قۇسۇش، قوساق ئېسىلىش، تەرەت ماڭماسلىق، قاتتىق بىئارام بولۇش) كېلىپ چىقىدۇ. ئەگەر تۈسلىشىش كىچىك ئۈچەيدە بولسا قۇسۇق بىلەن تەرەت ماددىسى چىقىدۇ. بۇ خىلدىكى تۈسلىشىشنى تىبابەتتە قولۇنچى ئىلاۋۇس دەپ ئاتايدۇ.

داۋاسى: ئاغرىقنى ئوڭدا ياتقۇزۇپ قوساقنى ئاستا مۇجۇپ ئۈچەينى ئوزۇن ئىككىگە كەلتۈرۈش كېرەك. چوقۇقنى ئاستالىق بىلەن جايىغا كىرگۈزۈش لازىم.

5) قاتتىق تەرەتنىڭ تۇرۇپ قېلىشىدىن ئۈچەي تۈسلىش: تىبابەتتە قولۇنچى سەپىل دەپ ئاتىلىپ، تەرەتنىڭ قاتتىق قىسىملىرى قارغۇ ئۈچەيدە تۇرۇپ-لىپ ئۈچەينى توساپ قويىدۇ.

سەۋەبى: قاتتىق نەرسىلەرنى كۆپ يېيىش؛ پارچە-پۇرات نەرسىلەرنى ھەددىدىن ئارتۇق يېيىش، ئۈچەيدىكى قۇرۇق ئىسسىقلىقنىڭ ئېشىپ كېتىشى بىلەن تەرەت ماددىسى ئۈچەيدە قېتىپ قېلىش؛ بەدەندىن كۆپ مىقداردا سۇ چىقىپ كېتىپ (مەسىلەن كۆپ قۇسۇش، ئىچى سۇرۇش، قان كېتىش قاتارلىق سەۋەپلەر بىلەن)

ئۈچەيدە ئەمەلىك ئازىيىپ، تاماق ماددىلىرىدىكى نەمە-
لىكنى بەدەن تارتىپ كېتىپ تەرەت قۇرۇپ قېلىش؛
ئۈچەينىڭ سېزىش قۇۋۋىتى بۇزۇلۇش بىلەن تەرەت
ئۈچەيدىن چىقىرىلماي تۇرۇپ قېلىپ، بارا-بارا قېتىپ
ئۈچەينى توسۇپ قويۇش؛ ئۈچەي سىلىدىن بولغان ئاقما
(ناسۇر) قاتارلىق جاراھەتلەر تۈپەيلىدىن گەندىنىڭ
ئۈچەيدە تۇرۇپ قېلىشى؛ ئۈچەيدىكى مەددە قۇرۇت-
لار پومىلىشۇپ ئۈچەيگە قاپلىشىپ قېلىش
قاتارلىق سەۋەپلەر چوڭ تەرەتنى قاتۇرىۋېتىپ، ئۈچەينى
توساپ قويىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىلگىرى يۇقۇرقى سەۋەپلەردىن بىرى
بارلىقى مەلۇم بولىدۇ ۋە ئۈچەي توسىلىشنىڭ
كورسىتىپ ئوتۇلگەن ئومۇمى ئالامەتلىرى كورۇلىدۇ.
ئالامەت ئەھۋال شۇكى ھارارەت ۋە قىزىق
تېرىسنىڭ پاقىراپ تۇرغانلىقى بىلىنىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: ھوقنە قىلىپ توسالغۇ ئىچىلىدۇ.

ھوقنە نۇسخىسى: بىنەپشە، ئىت ئۇزۇمى، نىلۇپەر،
ئاق لىلى ئۇرۇغى، خاڭگا ئۇرۇغى، تەرخەمەك ئۇرۇغى،
بابۇنە، ئارپا كىپىكى ھەر بىرى 7 مىسقال، چىلان 10
دانە، سەرپىستان 20 دانە، خىيارى شەنبەر 7 مىسقال،
تەرەنجىۋىل 10 مىسقال، ئىسپۇغۇل (لۇئابى چىقىرىلىدۇ)،
بىنەپشە يېغى، كۈنجۇت يېغى ھەر بىرى بىر سەردىن.

تەييارلاش: ئالدى بىلەن دورىلارنى چالا سوقۇپ،

يېتەرلىك مىقداردىكى سۇ بىلەن 2 چوڭ چىنە قالا-
خىدەك قاينىتىپ ماتا ئارقىلىق سۇزۇپ سىقىپ، تەرە-
جىۋىل بىلەن خىيارى شەنبەرنى سېلىپ، دورىلارنى يەنە
بىر قېتىم قىزىتىپ، قايتا سۇزۇپ ئۈستىگە ياغلارنى
قۇيۇپ ئىلمان ھالەتتە ھوقنە قىلىنىدۇ. زورۇر كەلسە
كۈنىگە بىر قېتىمدىن 2 - 3 كۈن داۋاملاشتۇرسىمۇ
بولىدۇ.

ھوقنەدىن كېيىن، ئەگەر ئۈچەيدە قىزىقلىق بول-
مىسا، توغرىغۇ، مەھمۇدە، شەھى ھەنزەللەرنى 3 مىسقال-
دىن ئېلىپ، بىر ئاز قەن بىلەن سوقۇپ كۈنىگە
مىسقالدىن بېرىش كېرەك. ئەگەر ئۈچەيدە قىزىقلىق
بولسا، مېۋە سۇلىرى (ئۇرۇك، شاپتۇل سۈيى) ياكى
بىنەپشە، ئاندار شەرۋىتى (47 - 74 - نۇسخىلەر) نى
بېرىش لازىم. تامىغىغا 2 كۈندىن كېيىن توخۇ شور-
پىسى بىلەن ئوقۇت سۈيى بېرىلىدۇ. تەرەت داۋاملىق
يۇمشاق كېلىشى ئۈچۈن، گۈل بىنەپشە 9 مىسقال،
مەھمۇدە (سوقمۇنىيا) دىن 3 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق
سوقۇپ ئىسپۇغۇل لۇئابى بىلەن قۇرس ياساپ، كۈنىگە
بىر دانىدىن بېرىپ تۇرۇش ياكى توۋەندىكى ھوقنەنى
كۈن ئارىلاپ قىلىش كېرەك: بىنەپشە 5 مىسقال، ئەنە-
جۇر 10، دانە، تەرەنجىۋىل بىر سەر، چىلان 10 دانە،
يادام يېغى (گۈل يېغى بولسىمۇ بولىدۇ) بىنەپشە يېغى
بىر سەردىن. قائىدە بويىچە تەييارلاپ ھوقنە قىلىنىدۇ.

ئۈچەي يولىنى ئېچىپ بولغاندىن كېيىن، سەۋەپ-
لەر قايتا ھاسىل بولماسلىق ئامالىنى قىلىش، مەسىلەن
ئۈچەينىڭ سېزىش قۇۋۋىتى بۇزۇلۇش مەۋجۇت بولسا
تەرياقى فارۇق (186-نۇسخە) ياكى مەشدرتۇس
(25-نۇسخە) بېرىش كېرەك.

(6) يېقىن ئەزالاردىكى ياللۇغلىنىش ۋە ئىششىق
سەۋىيىدىن بولغان ئۈچەي توسىلىش: دوۋىساق، بورەك، جە-
گەر، تال قاتارلىقلارنىڭ ئىششىقى ئۈچەينى قىسمەن
ياكى پۈتۈنلەي توسوپ قويدۇ. بۇنى تىبابەتتە شىرىك
ئەزا تۈپەيلىدىن بولغان ئۈچەي توسىلىش (قۇلۇنجى
مۇشتمەرەكە) دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: كورسىتىلگەن خوشنا ئەزالار ئىشىد-
غىغا خاس بولغان ئالامەتلەر (مەزكۇر ئەزالارنىڭ ياللۇغ-
لىنىشلىرىغا قاراڭ) بار بولۇشى بىلەن ئۈچەي توسىلىش
بەلگىلىرى كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: باشقا ئۈچەي توسىلىشلاردا كورسىتىلگەن
شامچە ۋە ھوقنەلەرنى قوللىنىش كېرەك. مۇۋاپىق تاپقاندا
قەي قىلدۇرۇش چارىسىنى قوللىنىشقا بولىدۇ. بۇنىڭ
ئۈچۈن كۆپ مىقداردىكى ئىلمان سۇ بىلەن كۈنجۈت
يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ ئىچكۈزۈش، ئاندىن كېيىن ئاساسىي
سەۋەپلىرىگە قارىتا ئىلاج قىلىپ، تەرەتتى يۇمشىتىش
چارىلىرىنى بىرلىكتە ئېلىپ بېرىش لازىم.

كويدۇرۇلگەن چايان، بۇغا مۇڭگۈزى، قۇرۇ-

تۇلغان سازاڭ قۇرۇت ۋە ھوپۇپ گۆشىنى بىرلەشتۈرۈپ
يېمىشكە بېرىپ ئومۇمى ئۈچەي تۈسلىش كېسەللىكلىرىنى
داۋالىغان خاتىرىلەرمۇ بار.

چوڭ تەرەت كەلمەسلىك (ھەسرە)

چوڭ تەرەتنىڭ ئۇزۇن مۇددەت كەلمەسلىكى (قەۋ-
زىيەت) ھەسرە دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ قولۇنچىدىكى ئىچ
قېتىشتىن پەرقى شۇكى: بۇنىڭدا ئاغرىش-قاتارلىق غەيرى
تەبىئى ھاللار بولمايدۇ، لېكىن ئۇ ئەھۋال داۋام قىلسا
ئۈچەي تۈسلىش ياكى باشقا كەسەللەرگە سەۋەبچى بو-
لۇپ قېلىشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ كېسەلگە ئالاھىدە
تەھسىيەت بېرىپ داۋالاش لازىم.

داۋاسى: كېسەلنىڭ مىزاج ئەھۋالىغا قاراپ ئۈچەي
تۈسلىرىدىكى چارلارنى قوللىنىشقا بولىدۇ. ياكى مۇنۇ
نۇسخىدىكى شەرۋەت بېرىلىدۇ. ئەنجۈر، يەنەپشە، ئۇرۇقسىز
قورۇق، ئۇزۇم، ئاقلىغان چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 1 سەردىن،
فۇنۇس، خىيارى شەنبەر 7 مىقالدىن، بىستېپەچ، بادام
يېڭى 2 مىقالدىن، تەرەنجۈبىل 2 سەردىن.

تەييارلاش: خىيارى شەنبەر، تەرەنجۈبىل ۋە بادام
يېڭىدىن باشقىلىرىنى چالا سوقۇپ بىر كىچە يېتەرلىك
مىقداردىكى قايناقسۇغا چىلاپ، ئەتىسى سۈزۈپ ئۈستىگە
تەرەنجۈبىل سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن
خىيارى شەنبەرنى ئايرىم ھالدا ئازراق قايناقسۇ بىلەن
شېرىتىپ، سۈزۈپ، بادام يېڭىنى تەييار بولغان قىيام ئۈستىگە

تىگە قويۇپ ئىتە - ئاۋامدا 3 قوشۇقتىن ئىچىشكە
بېرىلىدۇ.

4 - پىسىل: ئۈچەي مەدە قۇرۇتلىرى

ئۈچەيدىكى مەدە قۇرۇتلىرى ئۇلارنىڭ شەكىلىگە
قاراپ يىلان مەدە (ھىيات)، ياپىلاق مەدە (كۆرۈشە)،
تۇتۇ مەدە دەپ پەرقلەندۈرىلىدۇ.

يىلان مەدە (ھىيات)

ئالامەتلىرى: ھەرخىل ئۇزۇنلۇقتىكى يىلاننىڭ يۇ -
مىلاق ۋە ئۇزۇن قۇرۇتلىرى تەرەت بىلەن ياكى قىسقىرىق
بىلەن چۈشىدۇ. بۇ مەدەنىڭ تۇرۇش ۋە كۆرۈش
جايى ئىنچىكە ئۈچەيلەردىن ئىبارەت. قوساق تولاقتىنمان
ئاغرىپ، كۆپكەن ئالدا بولىدۇ. تومۇر ھەرىكىتى سۇس
بولۇپ، كېسەل ھۆۈنلىشىپ، مەئىدە ئاغزىدا قىساداش
ھىس قىلىدۇ. ۋە بىر نەرسە ماڭغانلىقىنى سېزىدۇ. بۇ
ئەھۋال كۆپىنچە قوساق ئاچقاندا روشەن بىلىنىدۇ. دائىم
ئىچى قاتىدۇ، قوسىقى ئىچىپلا تۇرىدۇ، كېچىلىرى ئۇيقىدا
چىشلىرىنى غىچىرلىتىدۇ، كۈندۈزى ئېغىز ئىچى قورغاق
بولۇپ، كېچىسى دائىم ئاغزىدىن شالى ئاقىدۇ. كىچىك
بالىلاردا تارتىشىپ قېلىش ۋە ھۈشنى كىتىشەلمە
كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن 3 كۈن داۋاملىق يېڭى

ساققان سۇت ئىچكۈزۈپ 4 - كۈنى تىۋەندىكى دورىلارنى بىرى بېرىلىدۇ.

(1) بەزەڭگى كابىلى، سىرخىشت، تۇرۇت، قەنىل

ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، تىرمىس، قىزىل لوبىيا، قەستە

تەلخى، ھەربىرى 7 مىسقالدىن، ئەمەن بىر سەر ھىندى

تۈۋى بىر مىسقال، ئۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەي

يارلىنىدۇ. كۈنىگە 3 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(2) بەزەڭگى كابىلى 2 مىسقال، دەرەنە 1 مىسقال،

ئۇرۇغسىز خورما 2 دانە، ئۇلارنى سۇقۇپ تالقان تەي

يارلاپ ئاخشىنى ئۇخلاشتىن بۇرۇن ھەممىسىنى بىرلا

ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار: (1) دورىلارنى

سۇت بىلەن بېرىش لازىم. (2) دورىنى بېرىشتىن ئىلگىرى

كېسەلنىڭ بۇرنىنى تېگىپ قويۇش كېرەك (مەقسەت

دورىلارنىڭ يۇرىغىنى سەزدۈرمەسلىك).

ئەگەر دورىلارنى داۋاملىق ئىچەلمەسە ھوقنە ئار-

قىلىق كىرگۈزۈش لازىم.

ھوقنە نۇسخىسى: سىيادان، قىزىل لوبىيا، بابۇنە

5 مىسقالدىن، ئەپسەنتىن 7 مىسقال، شاپتۇل غازىڭى

بىر سىقىم، بۇلارنى 2 چوڭ چىنە سۇ بىلەن قاينىتىپ،

يېرىمى قالغاندا سۇزۇپ، بىر ئاز كۈنجۈت يېغى قىيىۋېتىپ

ھوقنە قىلىنىدۇ، مىزاجى ئىسسىق بولغانلارغا بەك ئىسسىق

دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. ئۇنداقلارغا ئاچچىق ئانار-

نىڭ يىلتىزى ۋە قوۋزىنىنى بىر كېچەقا يىناقۇغا چىلاپ
ئەتىسى تونۇرنىڭ قىزىغدا پشۇرۇپ، سىقىپ سۈيىنى
3 كۈن بېرىلىدۇ.

شايتۇل يوپۇرمىغى (كوك يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى
بولغىنى ياخشى) ۋە شاتۇتنىڭ قىوۋزىنىنى قاينىتىپ
بېرىلىمۇ بولىدۇ.

شامچە نۇسخىسى: شەھى ھەنزەلدىن بىر مىسقال
قەمبىلدىن يېرىم مىسقالنى يۇمشاق سوقۇپ، كالا ئوشى
بىلەن شامچە ياساپ، بىر ئاز كۈنجۇت يېغى بىلەن ياغلاپ
سوغا قويۇش لازىم. يۇقۇرقى نۇسخىلارنىڭ دورىلىرىنى
قاينىتىپ، قوساققا، كىندىك ئۈستىگە سىرتتىن قويىمۇ
ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ.

قاپاق ئۇرۇغى مەددە (كۇدۇدانە)

ئالامەتلىرى: قاپاق ئۇرۇغىدەك ياپىلاق ئاق مەددە
بوغۇملىرى تەرەت بىلەن، بەزىدە ئادەتتىكى چاغلاردا
تەرەتسىزمۇ چىقىدۇ. ئورنى چوڭ ئۈچەينىڭ يۇقۇرقى قىسمى
لىرىدىن ئىبارەت. ئاغرىقنىڭ قوشىغى بەك ئاچىدۇ. ئاغزى
كېچىسى قۇرغاق بولىدۇ، بەزىدە تەرەت قارامتۇل كېلىدۇ.
داۋاسى: بۇ خىلدىكى مەددىنى چۈشۈرۈشتە ھوقى
قىلىشنى ئاساس قىلىش لازىم. يىلان مەددە قىسمىدا
كورسىتىلگەن نۇسخىلاردىكى دورىلارنى نىسبەتەن كۈچ-
لۇڭرەك قىلىپ بېرىش كېرەك. ھەر كۈنى ئاخشىمى سىركە
ئىچىپ يېتىش بەك تېز ئۇنۇم بېرىدۇ.

ھوققە نۇسخىسى - بەرەنگى كابلې، دەرمەندە ھەر

بىرى $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن. ئەمەكى ھىندى $\frac{1}{2}$ مىسقال،

ئۇرۇت، شەھە ھەنزەل بىر مىسقالدىن.

تەييارلاش ۋە ئىشلىتىش ئۇسۇلى بىلان مەدەدىدىكى
نۇسخە بىلەن ئوخشاش. ئەگەر شامچە قويماقچى بولساق
بىلان مەدەدىدىكى شامچە نۇسخىسىنى ئىشلىتىش مۇمكىن.
مەجۇنى قەسىل (198 - نۇسخە) نىڭ تەسرىمۇ ياخشى.

تۇتۇ مەدەدە

ئالامەتلىرى ئوپىنچە كىچىك بالىلاردا
ئۇچرايدۇ. قىلدەك كىچىك قۇرۇت تەرەت بىلەن ناھايىتى
كوپ ساندا چىقىدۇ. بىلىنىڭ سوڭى بەك قىچىشىپ
كېسەلنى ئازاپلايدۇ. قۇرۇتمىنى ئورنى چوڭ ئۇچەينىڭ
ئاستىنقى قىسمىدا بولىدۇ.

داۋاسى: شامچە قويۇش بىلەن ھوققە قىلىشنى
ئاساس قىلىش كېرەك.

شامچە نۇسخىسى: قۇرۇق ئۇزۇم، ئاچچىق ئورۇك
مېغىزى، تىپتۇل مېغىزى، قۇستى شېرىن ھەربىرى
ۋە مىسقالدىن يۇمشاق سوقۇپ مۇۋاپىق مىقداردا شامچە
تەييارلاپ سوڭغا تىقىپ قويۇلىدۇ.

ھوققە نۇسخىسى: شەھى ھەنزەل، قەنتەرىون، ئەمەكى
ھىندى، ئاچچىق ئورۇك مېغىزى بىلەن شاكىلى،
ئۇلار باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ قاينىتىپ سۇزۇپ،
قائىدە بويىچە ھوققە قىلىنىدۇ.

ئەگەر سۆڭ ئەتراپى يارىلانغان بولسا (تاتىلاش ياكى قۇرۇتلارنىڭ زېدە قىلىشى بىلەن) شاپتۇل مېغىزىنى سوقۇپ چېپىش كېرەك. زىيەت يېغىنى كۆيدۈرۈپ سوغىنى ئىسلاش بىلەن بۇ خىلدىكى مەدەدە قۇرۇتلار چىقىدۇ. بۇ چاغدا جۈپتەڭ ياكى باشقا نەرسە بىلەن قۇرۇتنى تازىلىۋېتىش كېرەك.

5 - پەستىل: سۆڭ (مەقئەد) كېسەللىكلىرى

بوۋاسىر

بوۋاسىر — كۈتەننىڭ باشلىنىشىدىكى تومۇرلارنىڭ ئەمچەكسىمان پۇتايغان ئۈسۈكچىسىدىن ئىبارەت بولۇپ، سەۋىبى غەيرى تەبىئى سەۋدانىڭ تومۇرلاردا قېتىپ قېلىشىدىن ئىبارەت. بوۋاسىرنىڭ بەزىلىرى قانايىدۇ، بەزىلىرى قانمايدۇ. قانايىدىغانلىرى ئومىيا (قارغۇ) بوۋاسىر، قانمايدىغانلىرىنى ۋامبى (كۈزلىك) بوۋاسىر دەپ ئاتىلىدۇ. بوۋاسىرلارنىڭ شەكلىگە قاراپ تۈۋەندىكى بىر قانچە تۈر-لەرگە بۆلىنىدۇ.

- (1) يىلتىز تارتقان كۈرچەتكە ئوخشايدۇ. كۈچەت-سىمان (نەخلى) دەپ ئاتىلىدۇ.
- (2) ئۇزۇنچاق قاتتىق خۇددى خورمىغا ئوخشايدۇ. ئۇنى خورمىسىمان (تەمرى) دەپ ئاتىلىدۇ.
- (3) يۇمىلاق ۋە يۇمشاق خۇددى ئۇزۇم دانىسىغا ئوخشايدۇ. ئۇلارنى ئۇزۇمىسىمان (ئىنەبى) دەپ ئاتىلىدۇ.

(4) ئەنجۈردەك ياپىلاق شەكىلدە بولغىنى ئىنجۈر - سېمان (تىنى) دەپ ئاتىلىدۇ.

(5) كىچىك، پۇرچاق تەك قاتتىق بولىدىغىنى پۇر - چاقسىمان (سۇلۇلى) دەپ ئاتىلىدۇ.

(6) ئۇزۇن ۋە يۇمشاق خۇددى ئۇرۇمىگە ئوخشايدىغىنى ئۇرۇمىسىمان (تۇسى) بوۋاسىر دەپ ئاتىلىدۇ. قانايىدىغان بوۋاسىرلارنىڭ ئاغرىشى قانمايدىغانلىرىغا نىسبەتەن ئاز بولىدۇ. ئۇما داۋا قوبۇل قىلىشى تەس. كۈچەتسىمان ۋە ياپىلاق بوۋاسىرلار باشقا تۈرلىرىگە قارىغاندا ئېغىر ئۆتدۇ. اغرىش قاتتىق ۋە بىر نەرسە چىشلىگەندەك سېزىلىشى قىن بىلەن سەپرائىڭ غالىپلىغىنى، ئېغىرلىق بىلەن سانچىلىش، ھەس قىلىشى قان ئۇيۇپ قالغانلىقىنىڭ ئالامەتلىرىدۇر.

داۋاسى: 1) ساغرا ۋە ئارقا تەرەپ - ئىككى تاغاق ئوتتۇرىسىغا ھىجامەت قويۇش كېرەك. ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. جىگەر ۋە تالنى ئىسلاھ قىلىش ۋە تەرەتنى نورماللاش - تۈرۈش ئۈچۈن ھېلىلە مۇرابباسى، ئامىلە مۇرابباسى ۋە ئىتتىپىل سەغىر (5 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. توخۇ شورپىسىنى كۆكتات سالماي بېرىلىدۇ. قاننى قويۇقلاشتۇرغۇچى يىمەكلىكلەردىن مەسلىن، كالا، كىيىك، ئۆدەك ۋە ئات گۆشلىرىدىن پەرھىز قىلىش كېرەك. ھەمدە سۈرلەنگەن گۆش، قېزا ۋە كۆكتاتلاردىن چەيىرە، شوخلا، كۈدە، دانلىق ئاشلىقلاردىن ماشىن پەرھىز قىلىش لازىم.

(2) يۇقۇرقى چارىلار بىلەن نەتىجە بولمىسا، قۇرۇ-
تۇش چارىلىرى بىلەن بوۋاسىر چۈشۈرۈلىدۇ. بۇ چارىلار
ئىسلاش ياكى سوڭغا، بوۋاسىر ئۆسۈكچىسىگە چېپىشتىن
ئىبارەت.

(1) ئىسلاش ئۇسۇلى:

كېرەكلىك دورىلار — ئاس دەرەخ يوپۇرمىقى، جو-
يۇز، سەرۋە، چەيزە يوپۇرمىقى، بىخ كەبىر، موقىل، يىلان
پوستى، مۇرمەككى، شەھىي ھەنزەللەرنى لازىم مىقداردا
ئېلىپ، بىر داس تۈگە يېغىغا ئوت تۇتاشتۇرۇپ يۇقۇرقى
دورىلار ئۈستىگە سېلىنىدۇ. داسنىڭ ئەتراپىنى مەھكەم
يۈگەپ ئۈستىدىن بىر توشۇك قالدۇرۇپ كېسەلنى شۇ
توشۇككە ئولتۇرغۇزۇلىدۇ ئەگەر كېسەل ناھەت قىلالسا
ئۇزۇنراق ئىسلاش كېرەك. بۇ ئۇسۇل بوۋاسىرنى قۇرۇتۇپ
چۈشۈرۈشنىڭ ئۈنۈملۈك چارىسىدۇر.

(2) دورا بىلەن قاتۇرۇش ئۇسۇلى:

ئانار پوستى، كۈندۈر، جۇپىتى بەللۇت، جويۇز
سەبرى ھەربىرى 5 مىسقالدىن، بىر سەرچە ئۈزۈم قاپ-
نىتىلغان سۇ بىلەن دورىلارنى ئىزىپ ئۇماچتەك ھالەتكە
كەلتۈرۈپ، سوڭغا، بوۋاسىر ئۆسۈكچىسىگە قويۇق چېپىش
كېرەك.

(3) ئىسلاشنىڭ يەنە بىر نۇسخىسى:

موقىل (كۆك رەڭلىك)، كۈندۈر، ئۇدى خام، بىخ
كەبىر ۋە ئادراسمان ئۇرۇغىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ،

يۇقۇرقى ئىسلاش ئۇسۇلى بويىچە ئىسلاش كېرەك. ئاغرىش كىچىك بولسا، قەلەي ئۆپىسى، ئاق موم ۋە گۈل يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ چېپىشقا بېرىلغۇ. ئەگەر ئاغرىش بەك ئېغىر، چېقىلىش ۋە سانجىلىش بولسا بوۋاسىردىن قان ئاققۇزۇش لازىم كىلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن — پىياز، سۈيى، كالا ئوتى، قوي ئوتىنى بىرلەشتۈرۈپ پاختا ياكى يۇڭغا سۈركەپ سوغۇغا قويۇش لازىم. ئەگەر ئاغرىق داۋاملىق كۈچىيىپ بارسا، تۆۋەندىكى دۇخىدىكى دورىلارنى چېپىش بىلەن ئاغرىق پەسىيىدۇ.

تەكلىل مىلىك 3 مىسقال، ئەپيۇن بىر مىسقال، زەپەر يېرىم مىسقال، زىغىر 3 مىسقال، تۇخۇم سېرىقى بىر دانە، ئاق لەيلى 2 مىسقال، پىياز 5 مىسقال، مېۋە سائىلە بىر مىسقال، كالا ئىلىگى، تۈگە ئىلىگى 5 مىسقالدىن. تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، ئىلىكلەرنى ئېرىتىپ قوشۇپ، تۇخۇم سېرىقىغا ئارىلاشتۇرۇپ سوغۇغا چېپىشقا بېرىلىدۇ.

بوۋاسىر قانداپ كەتكەندە قاننى توختىتىش چارد. ئىلىرى: (ئا) قۇرىسى كەھرىبا (71 - نۇسخە)، مەجۈنى خۇبۇلەدد (100 - نۇسخە)لەردىن بىرىنى يىمىشكە ۋە شىافى كۈھلى (147 - نۇسخە)نى سوغۇغا قويۇشقا بۇيرۇ. لىدۇ. ئىچىشكە ھەببى مۇقىل ① بېرىلىدۇ.

① قەۋزىيەت بولسا، ھەببى مۇقىلنىڭ I نۇسخىسى، ئىچ يۇمشاق كەسە II - بېرىلىدۇ.

(ب) تۈۋەندىكى دورىلار بىلەن سوغىنى يۇيۇش كېرەك. ئانار گۈلى، موزا، ھەببۇل ئاس، قىزىل گۈل تۈگۈنچىسى، ئاقاقىيالا، باراۋەر مىقداردا ئېلىنىپ، قاينىتىپ قويۇق سۈيى بىلەن سوك يۇيۇشقا بېرىلىدۇ. ياكى ھەرە ھوكۇنىكى، مەدەستان ۋە ئۆپىلارنى قوشۇپ، سوغا قويۇپ لاتىنىڭ ئوتتۇرىسىنى تېشىپ (تەرەت توشۇڭى ئۈچۈن) تېكىپ قويۇش لازىم. ئەگەر بۇنىڭغا توشقان تۈكى قوشۇلسا ئۇنىمى تەخمىنەن ياخشى بولىدۇ. يۇقۇرقىلار ئۇنىم بىلەنمەندە دورا بىلەن قاتۇرۇپ چۈشۈرۈش ياكى ئەسۋاپ بىلەن كېسىش كېرەك. كېسىشنىڭ خەتىرى كۆپ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئىلاجىبار دورا بىلەن قاتۇرۇپ چۈشۈرۈش كېرەك. بۇنىڭ ئۇسۇلى تۈۋەندىكىچە:

ئۇسۇخە: سىماپ، نوشۇدۇر ھەر بىرى 3 سەردىن،

زەڭگەر $\frac{1}{2}$ 4 سەر، سۈتەگمەن ھاك $\frac{1}{2}$ 4 سەر، كۈلدۈر

11 سەر، سېرىق زەرنەخ 14 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى ئىزىپ تاكى سىماپ ئۆلگىچە ① سالاھىيە قىلىنىدۇ. كېيىن قۇرۇتۇپ، سىركە قوشۇپ يەنە ئىزىپ ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. ئۇماچتەك ھالغا كەلگەندە قاچىغا ئېلىپ قويۇپ ساقلىنىدۇ.

① سىماپنىڭ ئۆلگىنى ئۇنىڭ باشقا دورىلارغا پۈتۈنلەي ئارىلىشىپ كېتىپ كۆرۈنمەي قېلىشىدۇ — تەھرىر.

ئىشلىتىش: ئالدى بىلەن ئارقا يولىنى تارتىپ،
دورنى پەلگۈچ بىلەن بوۋاسىر ئۈستىگە چېپىش كېرەك
(قويۇغراق چېپىلىدۇ).

دېققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار: (1) ئالدى بىلەن
بىر دانە بوۋاسىر پۈۋەكچىسىنى چۈشۈرۈپ بولغاندىن
كېيىن ئەھۋالغا قاراپ ئىككىنچىسىنى چۈشۈرىلىدۇ. ئەگەر
بىرىنچىسىگە نەتىجە بەرمىسە، باشقا چارە ئىزدەش كېرەك.
(2) كېسەلنىڭ يۈرىكىنى كۈچلەندۈرۈش ۋە ئاغرىشقا
چىداشلىق بېرەلىشى ئۈچۈن داۋائىل مىشى ياكى مەجۈنى
مۇپەررىھى ياقۇتلىاردىن بىرىنى بېرىش كېرەك.

ئەسۋاپ بىلەن كېسىش ئۈچۈنمۇ ئالدى بىلەن
يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرگۈچى دورىلاردىن بېرىپ، بىر -
بىرلەپ كېسىپ، جاراھەت ئورنىغا قاتۇرغۇچى مەلەملەر
سۈركەپ قويۇلىدۇ.

بوۋاسىرنىڭ "يەل-بوۋاسىر" دەپ ئاتىلىدىغان
يەنە بىر تۈرى بار. ئۇنىڭ ئالاھىدە ئالامىتى شۇكى:
ئاغرىش خۇددى قولۇنچى ئاغرىشلىرىدەك بولۇپ، بەزىدە
ئاغرىق يەل ساھەسىگىچە يېتىپ بارىدۇ. بەزىدە تۈۋەنگە،
ئۇرۇقدان ۋە جىنىسى ئەزالارغىچە بارىدۇ. قوساق ئېسە -
لىش، يەل تولا مېڭىش ۋە قانلىق تەرەت قىلىش قا -
تارلىق بەلگىلىرى بولىدۇ. بۇ خىلدىكى بوۋاسىر كۆپىنچە
يىرىڭلىق ياللۇغلىنىش ۋە يىرىڭ ئاقىمىغا ئۆزگىرىپ
كېتىدۇ. داۋالاشتا بۇ خىل بوۋاسىر سەۋدا سەۋىيىسى بىلەن

بولدىغانلىقى ئۈچۈن ئالدى بىلەن مەتبۇخى ئەپتىمۇن
(20 - نۇسخە) بېرىپ ماددىنى تازىلىغاندىن كېيىن،
يەنى يوقاتقۇچى دورىلاردىن جەۋارىش شەھرىياران
(97 - نۇسخە) ياكى مەجۇنى پىلاپى (143 - نۇسخە)
بېرىلىدۇ. ھەم بۇلارغا ماسلاشتۇرۇپ تۈۋەندىكى نۇسخە -
لاردىن بىرى بېرىلسە بولىدۇ.

1. نۇسخە: بوزۇغا، دۇرۇنەج ئەقىرىپى، قارا
ھېلىلە، شاترەنج ھىندى، ئاقىرقەرھە، قارسۇچ، پىلىپىل،
جۈسەي ئۇرۇغى، مۇقىل ھەر بىرى 4 مىقالدىن ئېلىپ
ئۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، جۈسەي
ئۇرۇغى سۈيى بىلەن ھەب قىلىپ كۈنگە 2 مىقالدىن
بېرىلىدۇ.

2. نۇسخە: بىخ كەبىر 3 مىقال، سۈتتەر (ياپچان)

$\frac{1}{2}$ 1 مىقالنى يۇمشاق سوقۇپ، جۈسەي سۈيى بىلەن
ھەب قىلىپ كۈنگە 2 مىقالدىن يېيىشكە بېرىلىدۇ.

سوڭ يىرىڭلىق ئاقمىسى (ناسۇرى مەقئەد)

مەقئەد ئەتراپى مەزلىرىنىڭ يىرىڭلىق ياللۇغى
بولۇپ، بەزىسى تىشلىپ ئۈچەيگە ئۆتمىگەن ھالەتتە
بولىدۇ. بەزىسى تىشلىپ ئۈچەيگە ئۆتكەن ئاقما يول
شەكىللەندۈرىدۇ.

بىرىنچى تۈرىنىڭ ئالامەتلىرى: سوڭ (ئارقا يول)
ئەتراپىدا دائىم يىرىڭ ۋە زەرداپ ئېقىپ تۇرىدىغان
جاراھەتلەر بولىدۇ. سوڭ ساھىسى سەزگۈچى ئەسەبلىر

كۆپ ۋە كۆپ ھەركەتلىنىپ تۇرىدىغان جاي بولغانلىقىنى،
ئاغرىشى زىيادە، ساقىيىشى قىيىن بىر كېسەلدۇر.

داۋاسى: يىرىك، زەرداپلارنى تازىلاپ چىقىرىپ
تۇرۇش بىلەن شىيافى غەرىپ (توۋەندىكى نۇسخە) تەي-
يارلاپ، دەل ناسۇر توشۇگىگە تامغۇزۇش كېرەك.

شىيافى غەرىپ نۇسخىسى:

مۇرمەككى، كۆندۈر، ئەنزۇرۇت، خۇلسياۋشان،
سۈرمە، زەمچى، ئانار گۈلى، زەڭگەر ھەر بىرى بىر مە-
قالدىن. بۇ دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ گۈلاپ بىلەن
خېمىردەك قىلىپ شامچە تەييارلاپ سايدا قۇرۇتۇپ
ساقلىنىدۇ. كېرەك بولغاندا سۇ بىلەن ئېرىتىپ ئىشلىتىلىدۇ.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى: كېسەلنى ئوڭدا ياتقۇزۇپ،
ساغرىسىغا ئىگىز بىر نەرسە قويۇپ تۇرۇپ ئېرىتىلگەن
دورنى جاراھەت توشۇگىگە تامغۇزۇپ، شۇ يېتى بىلەن
دورا قۇرۇپ بولغىچە ياتقۇزۇلىدۇ.

ئىككىنچى تۈرىنىڭ ئالامەتلىرى: توشۇك چوڭ
ئۆچەيگە تۇتاشقانلىقتىن بەزىدە تەرەت ۋە يەل جاراھەت
توشۇكلىرىدىن چىقىدۇ. بۇنى ئېنىقلاش ئۈچۈن سوڭ
توشۇگىگە بىر نەرسە قويۇپ جاراھەت توشۇگىنى قول
بىلەن باسقاندا يەل ياكى تەرەتنىڭ چىقىۋاتقانلىقى
سېزىلىدۇ. بۇ جاراھەت چوڭ ئۆچەيگە ئۆتكەنلىك ۋە
تېشىلىكلىك ئالامىتى بولۇپ، دورىلارغا قارىغاندا دە-
تىكارە (ئوپېراتسىيە) بىلەن داۋالاش ياخشىراق ئۇنىۋ-
بىرىدۇ.

سوڭ ياللۇغلىنىش (ۋەرەمى مەقئەد)

سەۋبى: ئىسسىق ماددىلار سەۋبىدىن بەزىدە سو-
غاق ماددىلار سەۋبىدىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: (1) ئىسسىقلىق بولغانلىرى تۇرلۇق
ئىسسىق دورىلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش، بوغۇمنىڭ
قىچىشىلىرى ياكى سوڭ بوۋاسىرىنى تىغ بىلەن كېسىش
ياكى قاتۇرۇشلار تۇپەيلىدىن پەيدا بولۇشى مۇمكىن.
شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭدىكى ئالامەت ئاساسەن مەقئەدنىڭ
قاتتىق لۇقۇلداپ ئاغرىشى ۋە سۇيۇقنىڭ تېمپېر تۇرۇ-
شىدىن ئىبارەت. ئاغرىش ئاستا - ئاستا باشلىنىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن توققۇز كۆز ئۈستىگە ھىجا-
مەت قويۇش كېرەك. ئۇندىن كېيىن تىۋەندىكى دورى-
لاردىن بىرى تاللاپ بېرىلىدۇ.

(1) قەلەي تۈزى بىر سەر، گۈل يېغى 5 مىسقال،
ئاق موم بىر سەر، ئالدى بىلەن مومنى ئېرىتىپ، گۈل
يېغىنى قوشۇپ ئۈستىگە قەلەي تۈزىنى سېلىپ تازا
ئارىلاشتۇرۇپ مەلەم تەييارلىنىدۇ.

(2) تۇخۇم ئېقى ۋە گۈل يېغىنى لازىم مىقداردا
ئېلىپ قوغۇشۇن ياكى چوچۇن ھاۋانچىدا ئىزىپ سوغۇغا
سۈركىلىدۇ. ئەگەر ئاغرىش بەك قاتتىق بولسا، بۇنىڭغا
بىر ئاز (بىر فۇڭ مىقدارىدا) ئەپيۇن قوشۇلسا بولىدۇ.
يۇقۇرقىلاردىن تاشقىرى، سۇۋۇق كەپپىياتلىق دو-

رىلارنى مەسىلەن رەيھان ئۇزۇغى، چىلان، ئەينىلارنى قايناقسۇغا چىلاپ، ئاۋات سېلىپ بېرىلىدۇ.

ماددىنى چىقىرىش ئۈچۈن قەي قىلدۇرۇلسا ياخى- شىراق... بەزىدە ماددىنىڭ قېتىپ قېلىشى بىلەن ۋەرەمدە قېتىش بارلىققا كېلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن توۋەندىكى نۇسخە بېرىلىدۇ.

نۇسخە: ئەكىلىملىك، ئاق لەيلى، ئاقلاڭان ماش، ئىت ئۇزۇمى، يوپۇرمىقى، بىنەفشە ھەر بىرى بەش مەس- قالدىن، گۈل يېغى، بىنەفشە يېغى، تۇخۇم ئېقى، ھەممىشۋا يېغى ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ قاينىتىپ بىر پىمالىچە سۇ قالغاندا ئېلىپ، ئۈستىگە ياغ دورىلارنى قوشۇپ تازا ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ ۋە لازىم بولغاندا مەقئەدكە سۈركىلىدۇ.

سوغاق ماددا (بەلغەمدىن) بولغان سوڭ ياللۇغلىرىدا ھارارەت بولمايدۇ. ئاغرىش نىسبەتەن ئاز بولۇپ، ئومۇمى بەدەندە بەلغەم غالىپلىق ئالامەتلىرى كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى پىشۇرۇش ۋە تارقىتىش ئۈچۈن ئۈدەك يېغى، تۇخۇم سېرىقى ۋە سېرىق گۈل يېغىغا زىننەت يېغى قوشۇپ سۈركىلىدۇ. ياكى مەلەھمى داخلىيەن (177 - نۇسخە) چېپىشقا بېرىلىدۇ. بۇ خىلدىكى كېسەل- لەرگە توخۇ تۇخۇمى سېرىقىنى يالغۇز ياكى قايناقسۇ بىلەن يۇمشىتىلغان دانغا ئارىلاشتۇرۇپ سوڭغا قويۇشنىڭ مەنپەئىتى بارلىقى تەجرىبىلەردىن ئۆتكەن.

سوڭ يېرىلىش

سەپرا ۋە ھارارەتنىڭ غالىپلىقى بىلەن خۇددى قول - پۇتلار يېرىلغانغا ئوخشاش سوڭ ئەتراپى قۇرۇپ يېرىلىدۇ. ئادەتتە خېلى كۆپ ئۇچرايدۇ. ئالامەتلىرى: ئومۇمىي بەدەندە قۇرۇق ئىسسىقلىقنىڭ ئالامەتلىرى بولۇپ، سوڭ يېرىلىدۇ. تەرەت قىلغاندا، يۇغاندا ئېچىشىدۇ.

داۋاسى: سىرتتىن مەلھەمى ئەببەز (ئاق مەلھەم)نى چېپىشقا ياكى مۇم ۋە قىيروتى بىلەن ياغلاشقا بۇيرۇلىدۇ. ئەگەر داۋاملىق ئېچىش بولسا، بۇ سەپرانىڭ كۆپلىكى بولۇپ، ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى خىيارى شەنبەر (54 - نۇسخە)، مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) ياكى بىنەپشە شەرۋىتىگە ئىسپۇغۇل لۇئابى قوشۇپ يېرىلىدۇ، ۋە يۇقۇرقى مەلھەملەرمۇ يېرىلىدۇ.

ئۇندىن باشقا، سوڭ ياللۇغلىرى ياكى بوۋاسىر سەۋىيى بىلەن، ۋە كۆپ قان يوقىتىش ياكى كۆپ ئىچى سۇرۇشتىن كېيىنمۇ سوڭنىڭ يېرىلىشى ئۇچرايدۇ. بۇنداقتا، سەۋىيىنى يوقىتىدىغان چارلار بىلەن بىللە، يۇقۇردىكى چارلارلىمۇ قوشۇمچە قوللىنىش كېرەك. تەرەت يۇمشاق كىلىشكە دىققەت قىلىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەر كۈنى ئەتىگەندە بىنەپشە شەرۋىتى (74 - نۇسخە)گە بىيە ئۇ - رۇغى قوشۇپ يېرىلىدۇ. ئىچ سۇرۇپ كەتسە، قورغۇچى دورىلاردىن بىرىنى بېرىش كېرەك.

سوغنىڭ پالەچلىنىشى (ئىستېراخايى مەقئەد)

سوغنىڭ پالەچلىنىشى سوڭ بىلەن ئۇرۇقدان ئوتتۇردا - سىدىكى پەي (شەرەج) نىڭ پالەچ بولىشىدىن ئىبارەت. سەۋىيى: شەرەج پەيىنىڭ ئىچكى ياكى سىرتقى تەسىراتلار بىلەن زەرەرلىنىشى ياكى بوۋاسىر پوۋەكچىلىرىنى كېسىۋالغاندا پەيىنىڭ زەرەرلىنىشىدىن ئىبارەت. بۇ 2 خىل سەۋەپ بىلەن كېلىپ چىققان سوڭ پالەچنى داۋالاش ئانچە ئوڭاي ئەمەس. بەزىلەردە مەزكۇر پەيگە ئىچكى تەرەپتىن مىزاج بۇزۇلۇشنىڭ تەسىر قىلىشى، تاشقى تەرەپتىن مۇز ياكى قار ئۈستىدە ئۇزاق ئولتۇرۇپ قېلىپ سوغاق ئوتۇشمۇ پالەچلىك كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئالامەتلىرى: يۇقۇرقى سەۋەپلەرنىڭ مەۋجۇتلىقى، سوڭ ئەتراپىنىڭ (بۇرمەكنىڭ) بوشىشىپ كېتىشى بىلەن يەل ھەتتا چوڭ تەرەتنىڭ ئۈزلىگىدىن چىقىپ كېتىشى، چوڭ تەرەت تۇتالما سىلىقلار كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى چىقىرىپ تاشلاش ۋە مىزاج - نى تۈزۈتۈش جەھەتتىن پالەچ باياندا كۆرسىتىلگەن چارىلار قىلىنىدۇ. قۇست يېغى، قۇندۇز قەرى يېغى ۋە پەرفىيۇن ياغلارنى ئارىلاشتۇرۇپ، سوڭ ئەتراپى، شۇنىڭدەك شەرەج پەيى ئۈستىگە سۈرتۈش كېرەك. مېھرى گىيالى سۇ بىلەن تاشقا سۈرۈپ، سوڭغا چېپىشقا بېرىلىدۇ.

ئىترىپىل (5 - نۇسخە) ياكى ئىترىپىل مۇقىل (150 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

سوڭ چىقىپ قېلىش (خۇرۇجى مەقتەد)

سەۋىيى: سوڭنى كۈتىرىپ تۇرغۇچى پەيلەر ئەمەس. ① تەسىرى بىلەن ياكى سوغاق تەسىرى بىلەن بوشىشىپ كېتىپ، سوڭ تاشقىرىغا چىقىپ كېتىدۇ. بۇنىڭدا سوڭنىڭ ئۇرۇنۇپ چىقىشى ئاسان بولۇپ، ئىچىگە كىرگۈزۈشمۇ ئاسان. سوڭ ئىچكى گۆشلىرىنىڭ ئىشىشىپ قېلىشى بىلەنمۇ سىرتقا چىقىپ قالىدۇ. بۇنداقتا سوڭنىڭ چىقىشمۇ قىيىن شۇنداقلا كىرىپ كېتىشمۇ قىيىن.

ئالامەتلىرى: تەرەتتىن كېيىن ياكى ئىنجىقلاش بانىسى بىلەن سوڭ سىرتقا چىقىپ قالىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن چىقىپ قالغان سوڭنى سەۋرىچانلىق بىلەن ئىچىگە قايتۇرۇش لازىم. سوڭنى ئىچىگە كىرگۈزۈشتە، ئالدى بىلەن بوشاشتۇرغۇچى دورىلاردىن سۈركەپ بولغاندىن كېيىن، ئىچىگە كىرگۈزۈپ قانۇرغۇچى دورىلارنى سۈركەش كېرەك. مەسلەن:

(1) قىسمىدا — گۈل يېغى بىلەن ياغلاپ، ئالدىن

كېيىن ئىچىگە كىرگۈزۈپ ئۆستىدىن ئۇيا، ئانار گۈلى، موزا، زەمچە، سۈرمە، ئانار پوستى، كويدۇرگەن سەدەپ، ئاقاقىيا، پاقا يوپۇرمىغى، تۇزلارنى قوشۇپ، سوقۇپ سوڭغا قۇيۇپ مائادىن تەرەت چىقىدىغان توشۇك ئېچىپ تېگىپ قويۇلىدۇ.

① نەملىك — بۇ يەردە مىزاجدىكى ئومۇمى موللۇك كوزدە

تۇتۇلىدۇ.

(2) قىسمىدا—ئاغرىقنى بىسەپشە، ئاۋ، لەيلى، بابۇنە، چامغۇر، بەسەي قۇلىغى ۋە زىنار قاينانغان سۇدا ئۆلتۈر-غۇزۇب، سەك ئىچىگە كىرگۈزۈلىدۇ. ئۇندىن كېيىن ئۈستىدىن—سېرىق چىچەك يېغى، بابۇنە يېغى ۋە موم يېغىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سوغىغا سۇرتۇپ، ئۈستىدىن قاتۇر-غۇچى مەلەم بىلەن ياغلاپ يۇقۇرىدا كۆرسەتكەندەك قىلىپ قويۇش ھەم ئارىلاپ شام، بىللۇت، ياۋا ئانار گۈلى، قىزىل گۈل خەمىكى، بەرگى ئاس قاتارلىقلار قاينىتىلغان سۇ بىلەن نەمدەپ چىرىش كېرەك. جاراھەتلىنىش ئەھۋاللىرى كۆرۈلسە سوڭ باراھەتلىرىدە كۆرسىتىلگەن چارەلارنى قىلىش كېرەك.

سوڭ يارىلىرى (قۇرۇھى مەقئەد)

سوڭ ئەتراپى ۋە بەزىدە ئىچكى قىسىملىرىدا بولمىدىغان دائىم شەلۋەرەپ تۇرىدىغان جاراھەت. داۋاسى: قۇرۇتقۇچى ۋە ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلارنى سىرتتىن چېپىشقا بېرىلىدۇ. مەسىلەن، قوغۇشۇن كۈشتىسى، ئانار پوستى، ماش (ئاقلانغان) جۇپتى بەللۇت، جويۇز، سەبىزلىرىنى يېتەرلىك سۇدا قاينىتىپ، سۈيى ئاز قالغاندا ئۈستىگە توي يېغىدىن ئارىلاشتۇرۇپ ماي تەييارلاپ، سوغىغا چېپىشقا بېرىلىدۇ. ئەگەر ئاغرىش بەك بولسا يىر ئاز ئەپيۇن قوشۇش كېرەك.

سوڭ قىچىشىش

سەۋىيى: تۇتۇ قۇرۇت مەددىلەر، سەۋدا ۋە قىزىق
قاننىڭ پەيدا بولۇشى (بوۋاسىرنىڭ باشلىنىشىدا)، سەپرا
ۋە شور بەلغەم.

ئالامەتلىرى: (1) تۇتۇ قۇرۇتلارنىڭ بولۇشى بىلەن
سوڭ ئەتراپى قىچىشىدۇ. كۆپىنچە كېچىلىرى چىدىغۇسىز
ھالدا قىچىشىدۇ. بۇنداقتا تۇتۇ قۇرۇتنى يوقىتىش كىپايە
قىلىدۇ، ئالامەتدە داۋالاش ھاجەتسىز. (2) سەۋدا، سەپرا
ۋە شور بەلغەم سەۋىيى بىلەن بولغانلىرىدا مەزكۇر خىلىت
لارنىڭ ئالامەتلىرى بىلەن بىللە سوڭ ئېچىشىپ قىچىشىدۇ.
داۋاسى: ئوققۇز كوزگە ھىجامەت قويۇش كېرەك.

ماددىلارنى تازىلاش ئۇچۇن مەتبۇخى. ئەپتىمۇن (125 -
نۇسخە) بېرىپ، تاماققا ھول سوغاق نەرسىلەر بېرىلىدۇ.
مۇقىلنى ئۇرۇڭ مېغىزى يېغىدا سۇرۇپ چېپىش كېرەك.
سوڭغا بوۋاسىرلاردا كورسىتىلگەن شامچىلارنىڭ ماددىلار.
نى تازىلاش تەسىرى بارلىرىدىن بىرى ئىشلىتىلسە بولىدۇ.

XI ماقالا. بورەك كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: بورەكنىڭ مىزاج ئۆزگىرىشلىك ئاغرىقلىرى
بورەك مىزاجىنىڭ ئىسقىتىن بۇزۇلۇشى

ئالامەتلىرى: بورەك مىزاجى مەيلى ماددىسىز ياكى ماددا سەۋىيىسى بىلەن بىرگە ئۇن ئومۇمەن بەدەن قىزىدۇ، تومۇر ھەرىكىتى تېز، تەشەللىق كۆپ بولىدۇ. سۆيىدۈك رەڭگى قىزىل ياكى سېرىق رەڭدە كېلىدۇ. بورەك ساھەسە - دە قىزىقلىق سېزىلىدۇ. كىچىك تەرەت تولا قىستاي - دۇ. يەنى سۆيىدۈكنى ئۇزۇن ساقلاشقا بولمايدۇ. سۆيىدۈك ئۈستىدە يىپتەك لەيلىگەن دۇغ بولىدۇ. بۇ خىلدىكى بورەك مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى قەن سىيىش كېسلى (زىياپەتتۇس) گە ئايلىنىپ قالىدۇ.

داۋاسى: ھول سوغاق نەرسىلەر بېرىشنى ئاساس قىلىش كېرەك. مەسىلەن، ئانار شەرۋىتى (47 - نۇسخە)، زېرىق شەرۋىتى (89 - نۇسخە) ۋە خەشخاش شەرۋىتى (69 - نۇسخە) قاتارلىقلار بېرىلىدۇ. قۇرسى تەبىئىي (112 - نۇسخە) نى ئۇسۇڭ ئۇرۇغى قوشۇلغان سەندەل شەرۋىتى بىلەن بېرىلىدۇ. بەزىلەر بىر ئاز كاپۇر قوشۇپ

بېرىشنى تەشەببۇس قىلىدۇ. چۈنكى بۇ بورەكتىكى ھارا-
رەتنى ئالىدۇ (ئەمما كاپۇرنىڭ مىقدارى كۆپ ئاز
بولسا جىنىنى ئاجىزلىق كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ). غىزاسى
ئۈچۈن ماش، پالەك قوشۇلغان تاماقلار بېرىش كېرەك.

قان سەۋىيىسى بىلەن بورەك مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى

بۇ خىلدىكى بۇزۇلۇش قاننىڭ كۆپلىگى سەۋىيىسىدىن
يولىدۇ. بۇنىڭدىكى ئالامەت بەل، قول، پۇتلارنىڭ ئېغىر-
لىشىشى، بەلنىڭ تېلىپ ئاغرىشىدۇر.

داۋاسى: مىزاجنى ئۆزگەرتىش چارىلىرى كورۇل-
دۇ. چىلان شەرۋىتى، كاسىن سۈيى بېرىلىدۇ (قالغان
چارىلار 1 - قىسىمغا قارالسۇن).

سەپراغالىپلىقى بولسا، ئىسسىقلىقتىن بۇزۇلغانىدىكى
ئالامەتلىر كورۇلىدۇ. بەدەن ۋە سۈيدۈكتە سەپرا ئالامەت-
لىرى بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن فۇنۇس، خىيارى شەنبەر،
تەمرى ھىندىلەرنى ئانار سۈيى، بىنەپشە شەرۋىتى ئېرىتىپ
سۈزۈپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

بورەك مىزاجىنىڭ سوغاقتىن بۇزۇلۇشى

ئالامەتلىرى: سۈيدۈك رەڭگى ئاق، تۆمۈر ھەركىتى
سۇس ۋە بەدەنلىرى ئاق بولىدۇ. بەل تالىدۇ. بورەك
بار جاي (بەلنىڭ تۆۋەن قىسمى) سوغاق سېزىلىدۇ.

داۋاسى: ھەسەل بىلەن تەييارلانغان گۈلقەن،
مەجۈنى جەۋارىش كۆمۈنى (49 - نۇسخە) لەرنى يېدىيان
ئەرەقى بىلەن بېرىلىدۇ. زاراڭزا يېغى، ئاچچىق بادام

يېغى، پىستە ۋە قۇست يېغى بىلەن بورەك ساھەسىنى ياغلاش كېرەك. قۇشلارنىڭ كۈشى ۋە شورپىسىنى بېرىش لازىم. چۈچمەل تەملىك ۋە سوۋۇز، نەرسىلەرنى يېيىش تىن پەرھىز قىلىش كېرەك.

بورەكنىڭ كىچىككەشىپ كېتىشى

سەۋىيى: بورەك مىزاجىنىڭ بۇرۇلۇشى؛ جىنىسى ئالاقىنى كۆپ قىلىش؛ دورا ئىچىپ كۆپلەپ سېيىش ياكى كۆپ ئىچ سۇرۇش.

ئالامەتلىرى: سۆڭەك رەڭگى ئاق، سۈزۈك بولىدۇ. بەدەن ئورۇق بىرلۇپ، ئاردا مېڭىنى بوغلاپ يۇقۇرىدىن تۆۋەنگە قاراپ ئادىش سىزىلىدۇ. جىنىسى كۈچى ئاجىزلىشىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سەۋىيىنى يوقىتىش، ئۇندىن كېيىن بورەكنى سەمىرىتىش چارىلىرىنى قىلىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن، بادام مېغىزى، پىستە مېغىزى، ئۇندۇق مېغىزى، ئارچىل (ئارىيىل) مېغىزلىرىنى شېكەر قوشۇپ، سوقۇپ يېيىشكە بېرىلىدۇ. غىزاسىغا توخۇ ۋە ئۆدەك يېغى بېرىش، ياكى شۇ ياغلار بىلەن تاماق ياساپ بېرىش، ئىسسىق ھالدا بېرىش كېرەك. تەرەنجىۋىلىدىن 30 سەرنى تازىلاپ، 20 سەر كالا سۈتى ۋە بىر مىقدار ئاۋات بىلەن قىيام قىلىپ 2 سەر مىقداردىن يېيىشكە بېرىلىدۇ.

بورەك زەئىپلىگى (زەئفى گۆردە)

بورەك زەئىپلىگى دىگىنىمىز: بورەكنىڭ سۇيدۇك ئىشلەپچىقىرىش خىزمىتىنى تولۇق ئورۇنلىيالماسلىقىنى كۆرسىتىدۇ. بورەك زەئىپلىگى پەيدا بولۇشى توۋەندىكى بىر قانچە سەۋەپلەرگە باغلىق.

سەۋىبى: بورەك مىزاجىنىڭ بۇزۇلىشى، بورەك يوللىرىدىكى ھەر خىل توسالغۇلار؛ بورەكنىڭ تاشقى زەخمىلەرگە ئۇچراپ زەرەرلىنىشى ياكى قوپال قاتناش ۋاسىتىلىرى (ياغاچ ھارۋا، سوكۇلداپ ماڭىدىغان ئات، ئۇلاقلار) نىڭ قاتتىق سىلكىشى بىلەن زەرەرلىنىش قاتارلىقلار.

ئالامەتلىرى: بەلنىڭ بەلۋاغ باغلايدىغان جايى ئاغرىيدۇ، ئولتۇرۇش ۋە قوپۇش قىيىنلىشىدۇ، بەل تولغاندا ئاغرىق تېخىمۇ ئېغىرلىشىدۇ، جىنسى كۈچى ئاجىزلىشىدۇ، سۇيدۇك مىقدارى ئازىيىدۇ، سۇيدۇك گۆش يوغان سۇدەك كېلىدۇ. سۇيدۇك بىر ئاز تۇرغۇزۇلغاندا ئۈستىدە كۆپۈكسىمان لەيلىمە رۇسۇپ پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر بورەك مىزاجىنىڭ بوزۇلىشىدىن كېلىپ چىققان بولسا سەۋىبىنى يوقىتىپ، مىزاجىنى تەڭشەش لازىم. ماددىلاردىن بولسا تازىلاش ۋە سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن مۇناسىپ سۈرگە دورىلارنى بېرىش لازىم. ئىسسىق مىزاجىدىن بولغاندا، خۇنسىياۋشان، ئازار گۈلى، گىلى ئەرمنى، پاقا يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى، سەمغى ئەرەبىدىن باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، تالقان تەييارلاپ

بېرىلىدۇ. ئاق سەندەل، قىزىل گۈل گۈلابى، ئاقاقچا،
ھەببۇل ئاسلارغا سىركە قوشۇپ بەلگە سىرتتىن چېپىش
لازىم. ئەگەر سوغاقتىن بەلسا ئىسسىقلىق دورى
لار قىلىنسا بولىدۇ. ئەمما بورەك زەئبىلىگىگە ئىسسىقلىق
قىلىشتىن ئېھتىيات قىلىش لازىم. بورەكنى كۈچەندۈرۈش
ئۈچۈن مەجۇنى لۇبۇبى سەئىر (151 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.
كالا ياكى تۈگ سۈتلىرىنى يالغۇز ياكى ئانارگۈلى
ۋە گىلى ئارمىنى بىلەن بېرىلسە نەتىجىسى ياخشى.
ئۈزۈم يوپۇرمىغىنى سىيىپ، سۈيىگە تۈز تېمىتىپ 9 كۈن
ئۇدا بېرىلسە، بورەك ئەڭلىكىگە ياخشى مەنپەئەت قىلىدۇ.
غىزاسىغا قۇرۇق ئۈزۈمنى قىيىپ بورەك بېغى ۋە كىيىم
پاقالچەك گۈشلىرى بىلەن بېرىلىدۇ. سۈت تاش ۋە بۇغ
داي، ئارپا شىرىلىرى بىلەن تەييارلانغان ئاشلارغا سىركە
قوشۇپ چۈچمەل قىلىپ بېرىش لازىم.

بورەكنىڭ يەللىك ئاغرىشى (بادى گۈردە)

بورەك ئەتراپىدا پەيدا بولغان قويۇق يىل (بادى
غەلزە) نىڭ بورەك ئىچكى قىسمىغا تەسىر قىلىشى بىلەن
كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: بەل ساھەسىدە ئېغىرلىق ۋە سانجى
لىپ ئاغرىش بولىدۇ. ئاغرىش تۇتقاقلىق تۈردە خۇددى
تارتىشقانداك بولۇپ كېسەلنى بەك ئازايلايدۇ. ئېغىرلىق
پۈتۈن بەل باغلىمى بويىچە سېزىلىدۇ. قوساق ئاچقاندا

ئاغرىپ، تاماق ھەزىم بولغاندىن كېيىن يەڭگىلىشىپ قالىدۇ. ۋە سانجىلىش كەمرەك بولىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى تارقاققۇچى دورىلار بىلەن ھوق

نە قىلىش لازىم. مەسىلەن سېرىق چىچەك، زىرە، سۇزاپ

ئۇرۇغى، بابۇنىلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سۇدا قاين

ىتىپ ھوققە قىلىش. بۇ دورىلارنىڭ تىرىپلىرىنى بەل

ئۈستىگە قويۇش ياكى قۇست يېغى بىلەن بەلنى باغلاپ

بېرىش كېرەك. سۇزاپ يېغىغا ئاق لەيلى، بۇغداي كىيىگى،

تۇزلارنى قوشۇپ بەلگە تېگىپ قويۇش لازىم. ئارپا بېدە

يان، سۇزاپ، قىزىل گۈل، رۇمىيىدىيان، بېدىيان

يىلتىزى پوستى، بىخ كەبىر پوستىنى قاينىتىپ سۈيىگە

ھەسەل سېلىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. شەرۋىتى يۇزۇرى

(130 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

بورەكنىڭ ئاغرىشى (ۋەجەئەلەكە بەد)

بورەك ئاغرىشى ئاساسەن بورەكنىڭ يەللىك ئاغ

رىشى ياكى بورەك زەئىپلىگىدىن پەيدا بولىدۇ. بورەك

نىڭ ھەر خىل ياللۇغلىرى، يارىلىرىدا ئاغرىش مۇھىم

ئالامەتلىرىدىن بىرىدۇر.

داۋاسى: بورەك ئاغرىشىنى پەسەيتىدىغان دورىلار.

نى ئىشلىتىش بىلەن بىللە، ئاغرىش سەۋىيىسى داۋالاش

چارىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ قوللىنىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن

بابۇنە، سېرىق چىچەك، ئاق لەيلى، بەسەيلەرنى قاين

ىتىپ، سۈيى بىلەن بورەك ئۈستىنى (بەلنى) يۇيۇپ بىر -

رىش كېرەك.

2 - پەسىل: بورەك ياللۇغلىرى (ۋەرەمى گۈردە)

بورەكنىڭ ماددىلىق ياللۇغلىنىشلىرى

بورەك ياللۇغىنىڭ ئاساسى سەۋىيىسى ماددا بولغاندا، قان ۋە سەپرانىڭ قويۇقلىشىپ قېلىشى ھەمدە ئىسسىقلىق تەسىرى بىلەن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: قىزىما، تەشئالىق، باش ئاغرىش، ئۇيقۇسىزلىق بىلەن بەلنىڭ تېلىپ ئاغرىشى كۆرۈلىدۇ. سەپرادىن بولغاندا قۇسۇش، سۇيدۇك ئازىيىش، تەشئالىق كۈچلۈك بولۇش بىلەن بىللە، سۇيدۇك رەڭگى ۋە بەدەن سېرىققا مايىل بولىدۇ. ئەگەر قاندىن بولسا، بەل ساھەسىدىكى ئېغىرلىق ۋە ئاغرىشنىڭ زىيادە بولۇشى بىلەن قان غالىپلىقىنىڭ باشقا ئالامەتلىرى بىللە قوشۇلۇپ كېلىدۇ. ياللۇغلىنىش بىر تەرەپ بورەكتە ياكى ھەر ئىككى

كىلا بورەكتە بولىشىمۇ، بورەكنىڭ مەلۇم قىسىملىرىدا، چوڭقۇر قاتلاملىرىدا ياكى ئۈستۈنكى پەردە ۋە سۇيدۇك چىقىرىش باش يولىدا بولۇشى مۇمكىن. بەزىدە بورەك بىلەن دوۋساق ئوتتۇرىسىدىكى يولدا بولغانلىغىمۇ ئۇچرايدۇ. مۇنداق ھاللاردا سۇيدۇك توختاپ قالىدۇ. ياللۇغلىنىش ئوڭ بورەكتە بولسا، ئاغرىش جىگەرگە يېقىن جايىدا ئۈستۈنرەك تەزەپتە، سول تەرەپتىكى بورەكتە بولسا، ئاغرىش ئۈۋەنرەك جايىدا بولىدۇ. ياللۇغلىنىش بورەك پەردىسىدە بولسا ئاغرىش چىدىغۇسىز كۈچلۈك بولىدۇ.

بۇ مىگە پەردىسىگە تەسىر بېرىپ، مىگە پەردىسى غىدىغ
لىنىش ئالامەتلىرى — ئەس — ھۇشنى يوقىتىش، باش
قاتتىق ئاغرىشلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قىزىتما تەرتىپ
سىز بولىدۇ.

داۋاسى: سافىن ۋە ياسلىقتىن قان ئېلىشنى ئوي-
لاپ بېقىش مۇمكىن. ئۇندىن كېيىنلا ئارپا سۈيى، ئىسپۇ-
غۇل لۇئابى، بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇئابىنى بىنەپشە شەرىۋىتى
(74 - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ. بەلگە چېپىش ئۈچۈن
ئارپا ئۇنى، ئىت ئۇزۇمى، ئاق سەندەل، مامشا، كاسىن
سۈيى، بىنەپشە يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ بېرىلىدۇ. ئەگەر
قەۋزىيەت بولسا، مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) ياكى
فۇنۇس شىرىسىگە ئىسپۇغۇل ۋە يادام يېغى قوشۇپ بېرىلىدۇ.
بورەك ياللۇغلىرىدا كېسەللىك ئالامەتلىرىنىڭ بىر-
دىنلا يەڭگىلەشكەنلىكى ماددا پىشقانلىق بەلگىسىدۇر.
بۇنداق چاغلاردا ماددىنى تازىلىغۇچى تەسىرگە ئىگە دو-
رىلارنى بەلگە چېپىلىدۇ. سۇيىدۇكتە يىرىك كورۇلە،
سۇيىدۇك يوللىرىنى تازىلىغۇچى ۋە سۇيىدۇك راۋان قىل-
غۇچى دورىلارنى مەسىلەن، خاڭكا ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى،
قاپاق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزلىرىدىن شىرە چىقىرىپ بېدىيان
سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ. ياكى بىنەپشە شەرىۋىتى بىلەن
سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئې-
خىرلىق ۋە ئاغرىش تۈگىگەنلىكتىن يىرىك تازىلىنىپ
مولغانلىغى بىلىنىدۇ، بۇ چاغدا بورەكتىكى زەخمىنىڭ

ئەسلىگە كېلىشنى تەزلىتىش ئۈچۈن قۇرسى كاكىتىچ (152 - نۇسخە) ۋە بىنادىق بۇزۇرى (153 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئەمما يەنىلا ئاغرىش ۋە ئېغىرلىق بولسا ئۇلارنى بەرمەسلىك كېرەك.

ياللۇغلىنىشنىڭ سەۋىيىسى سۇغاق خىلتىلاردىن بەلغەم ياكى سەۋدا بولسا ئاغرىشقا قارىغاندا بەلدە ئېغىرلىق ئارتۇق بولىدۇ. پۇت - قوللىرى كۈچسىزلىنىدۇ، سۈيدۈك ئاز ۋە قويۇق كېلىدۇ. بۇ ۋاقىتتا بەزىدە سۇلۇق ئىششىق (ئىستىسقا) پەيدا بولىدۇ. ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) بىر قانچە كۈن قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ. ئەگەر بۇنىڭ نەتىجىسى بولمىسا، جۈۋىنە، زىرىنىڭ ھەر بىرىنى 5 مىسقالدىن، مەستىكى 1 مىسقال، سەبە 2 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سۈيۈكۈپ گۈلەپ سۈيى بىلەن ھەب تەييارلاپ كۈنىگە بىر مىسقالدىن بېرىلىدۇ. ھەر كۈنى ئەتىگەندە زىغىر، شۇمشە، خاڭكا ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى قاتارلىقلارنىڭ لۇتاپ ۋە شىرىسىنى چىقىرىپ ئىچكىۈزۈش كېرەك ياكى شەرۋىتى بىنەپشە (2 - نۇسخە) ۋە شەرۋىتى خەشخاش (69 - نۇسخە) دىن بىرىنى تاللاپ بېرىش كېرەك.

كېسەلنىڭ غىزاسىغا قۇش گۆشى شورپىسى ۋە نوقۇت سۈيىگە زىرە، پىننە سېلىپ بېرىلىدۇ. تامىغى، ئېنى تۈزىتىش بولمىسا شەرت. بورەكنىڭ ئاغرىشى بەزىدە ئۈچەي تۈزىتىش (قۇلۇنجى) ئاغرىقلىرى بىلەن ئارىلىشىپ كېلىدۇ.

تىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن كېسەللىكلەردە كورسىتىلگەن پەرق-
لىمىش جەدۋىلىگە ئاساسەن بىر تەرەپ قىلىش لازىم. يەنە
بىر مۇھىم ئايرىش ئۇسۇلى شۇكى: خاتا ھۆكۈم قىلىپ
بۆرەك ياللۇغىدا ھوققە قىلىنسا ئاغرىش ئېغىرلىشىپ كې-
تىدۇ. ئەمما قۇلىنچىدا ھوققەدىن كېيىن ئاغرىش يەڭگىل-
لىشىپ قالىدۇ.

بۆرەك يارىسى

دوۋساق جاراهەتلىرىنىڭ داۋامىدا بارلىققا كېلىدۇ.
ياكى خىلىتلار سەۋەپلىك ئۆز ئالدىغا پەيدا بولىدۇ.
ئالامەتلىرى: بەل ئاغرىدۇ، ئاغرىش سانچىلغاندەك
(بۆرەك ساھەدە) سېزىلىدۇ. سۇيدۇك بىلەن يېرىم ياكى
يېرىڭدەك شىلىملىق نەرسىلەر كېلىدۇ. سۇيدۇك مىقدارى
جەھەتتىن ئالاھىدە ئۆزگىرىش بولمايدۇ. سۇيدۇك رەڭگى
قىزغۇش بولسىمۇ سىڭەندە قىيىنلىش بولمايدۇ. جاراهەت
بۆرەكنىڭ گۆش قىسمىدا بولسا ئاغرىش ئازىراق؛ پەردە
قىسمىدا بولسا ئاغرىش بىلەن ئېچىشىش ئېغىر
بولىدۇ. جاراهەت بۆرەك بىلەن جىگەر ئوتتۇرىسى-
دا بولسا، ئاغرىش ئارقا تەرەپ تاغاقچى تارقىلىپ با-
رىدۇ، بۆرەك بىلەن دوۋساق ئوتتۇرىسىدا پەيدا بولسا،
ئاغرىش ۋە سانچىلىش سۇيدۇك يولى ۋە جىنىسى ئەزا-
لارغىچە بارىدۇ. جاراهەت دوۋساق ياكى بۆرەكتە ئىكەن-
لىكىنى توۋەندىكىچە پەرقلەش كېرەك.

(1) جاراهەت دوۋساققا بولسا، سۇيدۇك ماڭغاندا

ئاغرىش ياكى سانجىلىش بولىدۇ. بۆرەكتە بولسا، سۈيدۈك چىقىرىشتا قىيىنلىق بولمايدۇ.

(2) دوساقتىكى جاراھەتتە يىرىك كۆپ بولۇپ، سۈيدۈك سېسىق پۇرايدۇ. بۆرەكتىكى جاراھەتتە يىرىك مىقدارى ئاز، سۈيدۈكتە پۇراق بولمايدۇ.

(3) جاراھەت دوساقتا بولغاندا پەقەت دوسۇن ئۈستىدىلا ئاغرىش سېزىلىدۇ. ئەمما بۆرەكتىكى جاراھەتتە يارىنىڭ ئورنىغا قاراپ يۇقۇرى - تۆۋەنگە تارايدۇ.

داۋاسى: ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن سۈرگە بېرىش كە بولمايدۇ. ئەمما قەۋزىيەتنى يۇمشىتىش ئۈچۈن يەڭ-گىل سۈرگە بېرىش مۇمكىن. قەي قىلدۇرۇش پايدىلىق. ئەگەر قىزىتما بولسا، بېدىيان يىلتىزى، چىڭسەي يىل-تىزى، ئىزخىز، ئارپا بېدىيانلارنى قاينىتىپ سۈيگە ھە-سەل قوشۇپ بېرىلىدۇ. قىزىتما بولسا، خاڭگا، قوغۇن ئو-رۇغىنىڭ شىرىسى ۋە زىغىرلۇڭاينى ھەسەل ياكى قەن بىلەن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بۆرەك ساھىبىنى تاشقى تە-رەپتىن يۇيۇش ئۈچۈن ئوغرى تىكەن، بابۇنە، پىرسىياۋ-شان ۋە ئەگرى خاڭگا ئۇرۇقلىرى قاينىتىپ بېرىلىدۇ. ھەم مۇنۇ ئۇسۇلدىكى تالقاننى كۈنگە 2 مىسقالدىن 2 سەر ھەسەل سۈيى بىلەن ئىچىدۇ.

نۇسخە: چىڭسەي ئۇرۇغى، كۈندۈر، ئارپا بېدىيان، رۇمبېدىيان، زۇپا ھەر بىرىدىن 2 مىسقالدىن ئېلىپ (مە-رى گىيا، ئەپپۇنلەردىن ئاغرىقنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ قو-)

شۇلا بولىدۇ)، يۇمشاق سۇقۇپ تالقان تەييارلاپ كور-
سەتمە بويىچە بېرىلىدۇ. ئۇندىن باشقا قۇرسى كاكنەج
(152 - نۇسخە) ۋە بىئادىق بۇزۇرى (153 - نۇسخە)
لەر بورەك يارلىرىدا ئۇنۇمى خىلى ياخشى دورىلاردور.
غىزاسىغا تۈزىسىز غىزالارنى بېرىش، جىنى ئالا-
قنى مەنى قىلىش لازىم.

قەن سىيىش كېسلى (زىياىمتۇس) ①

زىياىمتۇس كېسلىدە ئاغرىق كىشى ئىچكەن سۇنى
شۇ پېتى سۇيدۇك بىلەن چىقىرىدۇ. ئىچىلگەن سۇ بەدەن
سەرىپىياتىنى يەنى ئۇسسۇزلۇقنى قاندۇرالمىدۇ. كېسەل كۆپ
ئۇسسايدۇ، كۆپ ئىچىدۇ ۋە كۆپ سىيىدۇ. بۇ كېسەلنى
"دۇلاپ" يەنى سۇ تارتىقچى دەپمۇ ئاتايدۇ.
سەۋىيىگە قاراپ بۇ كېسەل تۆۋەندىكىچە 2 قىسىمغا بو-
لىنىدۇ: 1 - قىسمى: بورەك مىزاجىنىڭ ئىسسىقلىقى بىلەن
زۇلىشى تۈپەيلىدىن ئۇنىڭ ئوزىگە تارتىش (جەزىبە)
قۇۋۋىتى ئېشىپ كېتىپ، تۇتۇش (ماسكە) قۇۋۋىتى تو-
ۋەنلەپ كېتىدۇ. بۇنىڭ بىلەن بورەك سۇيدۇكنى ئوزىدە
تۇتۇپ تۇرالماي تېزلىكتە دوۋساققا ھايدايدۇ. ۋە بۇنىڭغا
ئىگىشىپ جەزىبە قۇۋۋىتى مەندە ۋە جىگەردىن داۋاملىق
سۇ تەلەپ قىلىدۇ (شىمىرىدۇ)، بۇنىڭ بىلەن تەشەللىق
كېلىپ چىقىدۇ. ئىچىلگەن سۇ يەنە دەرھال بەدەن سىر-

① زىياىمتۇس: دوختۇراۋقتا دىياىت دەپ ئاتىلىدۇ.

نىغا چىقىپ كېتىدۇ. بەدەندە قىزىتما كۆرىلىدۇ، سۈيۈك قىزىل بولىدۇ.

داۋاسى: بورەك مىزاجىنى (ئىسسىقلىقنى) تەخشەش چازىلىرىنى قىلىش لازىم. ئانار شەرۋىتى، چۈچىمەل ئانار سۈيى ۋە لىمون شەرۋىتى (47 - نۇسخە) ئىچىشكە بېرىلىدۇ. دورىلاردىن قۇرسى كاپۇر (76 - نۇسخە)، قۇرسى تاباشىر (112 - نۇسخە) ۋە قۇرسى زىياپىتۇس (154 - نۇسخە) لەر بېرىلىدۇ. ئۇسسۇزلۇقنى پەسەيتىش ئۈچۈن، سېمىز ئوت ئۇرۇغى ۋە خاڭكا ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى، ئىس-پۇغۇل لۇتايى بېرىلىدۇ. تاشقى تەرەپتىن بەلگە سۈركەش ئۈچۈن ئاق سەندەل، ئانار گۈلى، ئاقاقىيا، ئارپا شا-كالىرى سوقۇپ بېرىلىدۇ. غىزاسىغا قاتۇرغۇچى ۋە سو-غاق تەبىئەتلىك نەرسىلەرنى بېرىش كېرەك. بەزىلەر باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىشنى مۇۋاپىق دەپ تولىغان.

2 - قىسمى: بورەك مىزاجىنىڭ سوغاقتىن بۇزۇلۇ-شى ياكى پۇتۇن بەدەن مىزاجىدىكى سوغاق كەيپىياتلار-دىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: جاراھەت بولماي، تەشئالىق كۈچ-لۈك بولۇش بۇ كېسەلنىڭ ئالاھىدىلىكىدۇر. باشقا ئالا-مەتلىرى 1 - قىسمى بىلەن ئوخشاش.

داۋاسى: بورەكنى قىزىتىش ئۈچۈن مەشدىرتوس (25 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. قۇست يېغىغا فۇندۇز قەرى، — ئاقا قىيالارنى قوشۇپ بەلگە سۈركەش كېرەك. ئەگەر گۈڭ

گۇرتلۇك ئارشاڭغا چۈشسە مەنپەئى ناھايىتى ياخشى.
مەجۇنى بەللۇت (155 - نۇسخە) بۇ خىلدىكى زىياستۇسقا
بايدىلىق. ئەگەر ماددىلارنى تازىلاشقا ھاجەت بولسا،
قەي قىلدۇرۇش كېرەك. تۇرۇپ (لوبۇ) ئۇرۇغنى قاينى-
تىپ، سۇيىمگە سىركە ۋە كۆپ مىقداردا ئىلمان سۇ قىيى-
شۇپ ئىچىرىلسە قەي قىلىدۇ.

بۆرەكتە تاش پەيدا بولۇش

بۆرەكتە تاش پەيدا بولۇش سەۋىيى بەدەندىكى
خام قالغان سۇيۇقلۇق ماددىلارغا غەيرى تەبىئى ھارارەت-
نىڭ، بۆرەكتىكى يىرىك، قان ۋە شىلىملىق
ماددىلارغا ھارارەتنىڭ تەسىر قىلىشى بىلەن تاش، قۇم-
لار پەيدا بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئۇزۇن ۋاقىت كېرەك.
كىچىك بالىلاردا ھەتتا ئەمچەكتىكى بالىلاردىمۇ ئۇچرايدۇ.
بۇلاردىكى سەۋەپ ئانا سۈتىنىڭ بۇزۇلۇشىدۇر.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن سۈيدۈك قويۇق، ئەمما
سۈزۈك بولىدۇ، بەلدە ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. بۇ ھال بار-
غانسېرى ئېغىرلىشىپ ئاغرىق بېلىگە ئېغىر بىر نەرسە
ئېسىپ قويغاندەك سېزىدۇ. سۈيدۈك سېرىق ياكى قىزىل
رەڭدە، ئاغرىش توتقاقلىق ۋە ناھايىتى قاتتىق بولىدۇ.
بۇنى بەزىدە ئۇچەي توسىلىش ئاغرىقلىرى بىلەن ئارى-
لاشتۇرۇپ قۇيۇشلار ئۇچرايدۇ (بۇ ئىككى كېسەلنى پەرق
ئېتىش ئۇسۇلى قولۇنچىدا تەپسىلى سۆزلەندى). ئاغرىش
بەزىدە يۇقاپ كېتىشى ۋە يەنە بىردىنلا قوزغۇلۇپ قېلى-
شى مۇمكىن.

داۋاسى: بەدەندىن ماددىنى تازىلاشتا قەي قىلىدۇرۇشنى ئاساس قىلىش لازىم. ئەگەر قان غالىپلىق ئالاھىدىلىرى بولسا قان ئالىمۇ بولىدۇ. داۋالاش جەريانىدا بولمىسۇن ياكى ساقايغاندىن كېيىن بولمىسۇن، كېسەل تاش پەيدا بولۇشقا سەۋەپ بولىدىغان نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىش كېرەك. مەسىلەن، كەچتە تاماق يېشى مەنى قىلىنىدۇ. سۈت، تۈگە گۆشى ۋە ھەزىم بولۇشى ناچار يىمەكلىكلەردىن پەرھىز قىلىش لازىم. قەۋزىيەت بولسا مۇۋاپىق دورىلا بىلەن ھوققە قىلىش مۇمكىن ئەمما دورا مىقدارى ئازراق بولۇشى كېرەك. بولمىسا ئاغرىشنى ئېغىرلاشتۇرۇپ قويىدۇ. ئاغرىش بەك قاتتىق بولغاندا تۈۋەندىكى دورىلارنى قاينىتىپ سۈيىدە كېسەلنى ئولتۇرغۇزۇش كېرەك:

بىرىق چىچەك، چىڭگەي، پىئالەك، پىرسىياۋشان، ھېلىلە، زاراڭزا، سېمىز ئوت، كۈنجۈت شېخى. بۇلارنى لازىم مىقداردا ئېلىپ كۆپرەك سۇ بىلەن قاينىتىپ، چوڭ داسقا قۇيۇپ بىر ئاز ئىلماق بولغاندا كېسەلنى ئولتۇرغۇزۇلىدۇ. ھەم بابونە يېغى ياكى بىنەپشە يېغى بىلەن بەل ئەتراپلىرىنى ياغلاپ بېرىش كېرەك.

بۆرەكتىكى تاشنى چۈشۈرۈش چارىسى — بۇ، دورىلار بىلەن تاشنى پارچىلاپ سۇيىدۇك بىلەن سۇيىدۇك يوللىرى ئارقىلىق چىقىرىشتىن ئىبارەت. مەجۇنى ئەقەرەپ (چايان مەجۇنى) (156 - نۇسخە) 2 قۇڭدىن ۋە مە-

جۇنى ھەجەرل يەمۇد — (157 - نۇسخە) 2 مىسقالدىن ئېلىپ بېرلەشتۈرۈپ، كۈنگە 2 قېتىمدىن بېرىلىدۇ. بۇ - ھەيئەت ياندا سۇيىدۇك ھەيدىگۈچى دورىلارنى، كېسەلنىڭ مىزا - ھەيئەت قاراپ يەنى كېسەل ئىسسىق مىزاج بولسا سوغاق تەرەپتىكى دورىلار، ئەگەر سوغاق بولسا ئىسسىق تەرەپتىكى دورىلار بېرىلىدۇ. بۇ دورىلار سۇيىدۇك راۋان قىلىش تەسىرىگە ئىگە ھەم تاشنى پارچىلاپ چۈشۈرۈش كۈچىگە ئىگە. بۇلار تۆۋەندىكىچە:

- (1) ئىسسىق تەرەپتىكى دورىلار - چىڭسەي ئۇرۇغى، رۇمبېدىيان، رەسمى بېدىيان (ئارپا بېدىيان)، تاغ يال بۇرى، سىيادان ۋە ھەلىيۇن ئۇرۇغى.
 - (2) سوغاق دورىلار - خاڭگا، تاۋۇز ۋە قاپاق تۇ - رۇقلىرى، كاكىنەج.
 - (3) مۆتىدىل دورىلار - پىرسىياۋشان، ئوردان، قو - غۇن ئۇرۇغى.
- سۇيىدۇك راۋان قىلغۇچى دورىلارنى داۋاملىق بېرىشكە بولمايدۇ، ئارىلاپ - ئارىلاپ بېرىش كېرەك.

3 - پەسىل: دوۋساق كېسەللىكلىرى

دوۋساق ياللۇغى (ۋەرەمى ماسانە)

دوۋساق ياللۇغىنىڭ سەۋىمى ئاساسەن بۆرەك يال - لۇغىنىڭ سەۋەپلىرى بىلەن ئوخشاش. ئەمما ئىسسىقلىق -

نىڭ تەسىر قىلىشى، بولۇپمۇ قىزىتمىلىق كېسەللىكلەر،
كوپ ئۇچرايدۇ. تاشقى تەرەپتىن زەخمىلىنىش بىلەنمۇ
پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: دوسۇندا ئاغزى ۋە چىڭقىلىش
سېزىلىدۇ. تەشلىق، ھارارەت بولىدۇ. كېسەل جويلىنىدۇ.
تىل ئارامتۇل گەز باغلايدۇ. سۇيۇكنىڭ مېڭىشى بار.
غانىبىرى قىيىلىشىدۇ. تامچىلاپ كېلىدۇ. ھەتتا پۇتۇلەي
توختاپ قالىدۇ. ياللۇغىنىش ئېغىر بولغاندا چوڭ ئۇ-
چەينى بېسىپ قويۇش بىلەن چوڭ تەرەت ماڭمايدۇ.

داۋاسى: تەبىئىيەتتىكى ھەيۋى بىلەن ئىت
ئۇزۇمى قوشۇلغان سۇدا ھۆنە قىلىنىدۇ. ئەمما سۇيۇك
ھەيدىگۈچى دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. بەلكى ئىششىق
قايتۇرىدىغان يەڭگىلەرەك دورىلارنى بېرىش كېرەك. فۇ-
ئۇس، ئىت ئۇزۇمى بىلەن تەرەنجىۋىلىنى بىنەپشە شە-
ئىتى قوشۇپ بېرىش كېرەك. بىنەپشە، ھەمشىۋا، ئاق
ئەيلى گۈلى، ئارپا ئۇنىنى كاسىن سۈيى ۋە ئىت ئۇزۇ-
مى سۈيى بىلەن دوۋساق ئۇستىگە تېگىلىدۇ. ئىششىقنىڭ
قېتىپ قالمايلىقى ئۈچۈن، ھوم يېغى بىلەن دوۋساق
ئۇستىنى ياغلاش كېرەك. كېسەل باشلىنىپ بىر ھەپتە
ئۆتكەندىن كېيىن سوغاقلق دورىلارنى توختىتىپ، ئىش-
شىقنى تارقاقچى دورىلاردىن مۆتىدىل تەبىئەتتىكىلىرى،
بابۇنە زىغىر، پۇرچاق ئۇنىنى چېچىش لازىم. شۇنداق
قىلغاندا ماددا توپلىشىپ يېرىك ھاسىل بولمايلىقى
مۇمكىن. ئەگەر ماددا تارقاپ كەتمەي يېرىك ھاسىل

قىلىپ قالسا، ئۇ چاغدا ماددىنى پىشۇرۇپ ئېغىز ئال-
دۇرۇشقا توغرا كېلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن بىنەپشە، ئەكىلىل
مىلىك، سېرىق چىچەك ئۇرۇغى، شۇمشەلەرنى چالاراق
سوقۇپ ئارپا ئۇنى قوشۇپ، بىنەفشە سۈيى بىلەن نەم-
دەپ دوساق ئۈستىگە ئىسسىقراق ھالەتتە قويۇلىدۇ.
ئۇندىن باشقا چارلىرى بۆرەك ياللۇغى بىلەن ئوخشاش،
ئەگەر ئاغرىش بەك كۈچلۈك بولسا ئەپيۇن، زىغىر يېغى
ۋە بادام يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ سۈركەش كېرەك. سۈي-
دۈك توشۇكىدىن ئىسپۇغۇل لۇئابى ۋە قاراقات سۈيىنى
تامغۇزۇش دوۋساق ياللۇغلىرىدا خېلى ياخشى نەتىجە
بېرىدۇ.

تاشقى زەخمىلىنىش بىلەن بولغان دوۋساق يال-
لۇغلىرىدا دوسۇن ئۈستىدە روشەن كۆتىرىلىپ تۇرغان
ئىششىق بار بولۇپ، سۈيدۈك قىيىنلىق بىلەن ماڭىدۇ.
چوڭ تەرەت توختاپ قالىدۇ. بۇ چاغدا ئالدىراپلا سۈي-
دۈكنى تېز راۋان قىلىدىغان دورىلارنى بەرمەسلىك كېرەك.
ئىششىقنى قايتۇرغۇچى دورىلارغا قوشۇپ مۇۋاپىق ھالدا
بېرىشكە بولىدۇ. چېپىش ئۈچۈن بابۇنە، زىغىر، ئوشەق،
كالا ئىلىكى، مۇقىل، ياپچان يېغى بېرىپ، ئىچىشكە
خاڭگا ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى، ھەلىيۇن ئۇرۇغى، پىر-
سىياۋشان، فۇنۇس، خىيارى شەنبەر چىلانغان سۇغا با-
دام يېغى قوشۇپ جۇلاپ قىلىپ بېرىلىدۇ.

دوۋساق چاراهەتلىرى

سەۋەبى: تىزىن سەرا ماددىسى دوۋساققا چۇشۇش بىلەن ئۇنىڭ ئېپىز يەردىتىرىنى ئازاھەتلىيدۇ. دوۋساق تىكى قۇم - تاشلار سۇركۇلۇپ دوۋساقنى يادا قىلىندۇ. دوۋساق ياللۇغلىرى ئېغىرلىشىپ چاراهەتكە ئايلىنىدۇ. **ئالامەتلىرى:** سۇيۇك قىيىنلىق بىلەن چىقىدۇ، دوسۇن ئېچىشىدۇ، سۇيۇك سېسىق پۇرايدۇ. سۇيۇك ئىچىدە كىپەكتەك ئۇششاق بۇسۇپلار بولىدۇ. دوۋساق ئەسەبلەر بىلەن مۇرەككەپ تىزۈلگەن ئەزا بولۇپ، سەزىش ئەسەبلىرى ئۇرغۇن. شۇنىڭ ئۈچۈن دوۋساق زە-رەلەنگەندە ئاغرىش چىدىغۇسىز دەرىجىدە كۈچلۈك بولىدۇ.

داۋاسى: دوۋساقنى تازىلاش ئۈچۈن ھەسەل ئەشكەر شەرۋەتلىرى بېرىلىدۇ. يىرتىخنى تامامەن چىقىرىش ئۇچۇر، شىافى ئەبىيەزنى ئېرتىپ ياكى ئايالنىڭ سۇ-تىنى سۇيۇك توشۇگىدىن تامغۇزۇش كېرەك. دورىلاردىن يىمىش ئۇچۇن قۇرسى كەھرىبا (71 - نۇسخە) ۋە قۇرسى كاكىنەج (152 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئەگەر قىچىشىش بولسا، بىيە ئۇرۇغى لۇتايى، ئايال سۈتى، بادام يېغىنى ھوققە ئەسۋاۋى ئارقىلىق سۇيۇك توشۇگىدىن ماخغۇ-زۇش كېرەك. ياكى تىلىپ لوڭقا قويۇش كېرەك. غىزا-سىغا سېرىق پۇرچاق سۈيى، توخۇ گۆشى، سۇت ئاش بېرىلىدۇ.

دوۋساققا قان ئۇيۇپ قېلىش

قان سېپىش ياكى تاشقى زەخمىلىنىشتىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: دوۋساق قاتتىق ئېچىلىدۇ، نەپەس قىيىنلىشىش، تىترەش، سوغاق تەر چىقىش بىلەن بىللە دوسۇن ئەتراپلىرى سۈۋۈپ كېتىدۇ. تومۇر ئىنچىكە سالىدۇ. ئېغىر بولغاندا ھۆشىدىن كېتىدۇ.

داۋاسى: ئىسكەنجىبىنىڭ ئۆزىنى يالغۇز ياكى تال (ئۆزۈم دەرىخى) نىڭ كۈلىنى قوشۇپ بېرىلىدۇ. قارا ئەمەن (بەرەنجاسپ)، چىڭسەي ئۇرۇغى، لوبۇ ئۇرۇغىنى قاينىتىپ سۈيىنى يالغۇز ھالدا ياكى ئىسكەنجىبىن قوشۇپ بېرىلىدۇ. توشقاننىڭ ئوغۇز سۈتى ۋە تال كۈلىنى بىرلەشتۈرۈپ سۇيدۇك توشۇڭىدىن كىرگۈزۈلىدۇ. ھەم دوۋساق ئۈستىگە توكۇلىدۇ. بابۇنە يېغى سۇرتۇشمۇ ياخشى پايدا قىلىدۇ. باشقا چارلار نەتىجە بەرمىگەندە بورەك تېشى كېسىلىدە كورسىتىلگەن چاردلارنى ئىجرا قىلىش مۇمكىن.

دوساق ئاغرىش (ۋە جىلمە سانە)

دوۋساقنىڭ ئاغرىشى: دوۋساق ياللۇغلىرى؛ دوۋساقنىڭ جاراھەتلىنىشى: دوۋساققا تاش قېتىش؛ يەل؛ دوۋساق مىزاجىنىڭ ئىسسىق ياكى سوغاقتىن بۇزۇلۇشى قاتارلىق ئەھۋاللاردا كورۇلىدۇ. تۆۋەندە دوۋساق مىزاجى بۇزۇلۇشتىن پەيدا بولغان ئاغرىش ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتۈلۈپ.

تىمىز. باشقىلىرى مۇناسىۋەتلىك كىسەللىكلەردە سۈيۈك
لەندى.

دوۋساقنىڭ ئىسسىقلىق سەۋىيىسىدىن ئاغىرىشى:
سۈيۈك ھەيدىگۈچى دورىلارنى كۆپ ئىستىمال
قىلىش، بولۇپمۇ تېز تەسىر قىلىدىغان ئىسسىقلىق دو-
رىلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىشتىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: دىسۇن ئۇستى ئاغرىدۇ، ئىچىشىدۇ،
سۈيۈك قىزىق بولۇپ، كۆپ دۈرۈپ كېلىدۇ.

داۋاسى: خاڭگا ئۇرۇمى، قاپاق ئۇرۇمى، تەرخە-
مەك ئۇرۇمى، كاسىن رۇزىلىرىنىڭ شىسىنى چىقىرىپ،
بىنەپشە شەرۋىتى (74 - ئۇدخە) ۋە خەشخاش شەرۋىتى
بىلەن (69 - ئۇسۇخە) بېرىلىدۇ. يەنى ئارپا بېدىيان
بىلەن ئىسكەنجىسىن قوشۇپ بېرىلسۇمۇ بولىدۇ. تاشقى
تەرەپتىن ئاق سەندەل، ئارپا ئۇنى، ئىت ئۇزۇمى، كا-
سىن سۈيى قاتارلىقلارنى چىپىش، بىنەپشە يېغى، ئىلۇ-
فەر يېغى ۋە قاپاق ئۇرۇمىنىڭ يېغىنى سۈيۈك توشۇ-
كىدىن كىرگۈزۈش كېرەك. بىنەپشە، ئىلۇفەر، ئاق لەيلى
ۋە ئىت ئۇزۇمىنى قاينىتىپ سۈيىنى دوسۇنغا قويۇش
كېرەك. غىزاسىغا پالەك، تۇخۇم سېرىغى، توخۇ گۆشىنى
ئانار سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ.

ئەگەر دوۋساقنىڭ مىزاجى سوغاقتىن بۇزۇلسا،
ئاغرىش نىسبەتەن يەڭگىل بولىدۇ. سۈيۈك ئاق كې-
لىدۇ. ھەددىدىن ئارتۇق سوغاق دورىلار، مەسىلەن، كا-

پۇر، يۇمغاقسۇت قاتارلىقلارنى ئىشلەتكەنلىك تارىخى بول-
لىدۇ. ئاغرىش بىلەن تەڭ كېسەل توڭغۇپ تۇرۇپ خۇد-
دى سوغاق شامال باردەك سېزىدۇ.

داۋاسى: ئارپا بېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى، پىننە،
رۇمبېدىيان، سەۋزە ئۇرۇقلىرىنى باراۋەردىن ئېلىپ قاي-
نىتىپ سۇيىگە شەرتى دىنارى 1 (129 - نۇسخە) قوشۇپ
بېرىلىدۇ. تاشقى تەرەپتىن سېرىق چىچەك يېغىغا بىرئاز
قۇندۇز قەرى، بىرئاز ھىڭ قوشۇپ سۈركەش كېرەك. يە-
نىشكە ھەسەل بىلەن تەييارلانغان گۈلچىن، ئىترىپىل سەغىر
(5 - نۇسخە)، ئىنجۇر مۇرابباسى بېرىلىدۇ.

بەزىبىر قىزىتمىلىق كېسەللەرنىڭ بوھران كۈنلىرى
مەدەندىن ماددىلار چىقىرىلىشى بىلەن دوۋاساققا كېلىپ
ئاغرىش پەيدا قىلىدۇ. بۇ چاغدا سۇيىدۇك راۋان قىلى-
دىغان دورىلارنى بېرىش كىپايە قىلىدۇ.

دوۋاساق كۆپۈپ قېلىش

دوۋاساققا يەل ياكى يەل بىلەن سۇيۇقلۇقنىڭ تو-
لۇپ قېلىشى، دەۋساقنىڭ ئېسىلىشى يەنى كۆپۈپ قېلى-
شىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئالامەتلىرى: دوۋاساق چىڭقىلىدۇ ۋە ئېغىرلىق
ھىس قىلىدۇ. ئەگەر چىڭقىلىش بىلەن ئېغىرلىق بولماي
يوتكۇلۇپ تۇرسا بۇ - يەلنىڭ ئالامىتى؛ ئېغىرلىق ۋە
چىڭقىلىش بىللە بولۇپ، يوتكەلمەي تۇرسا، بۇ - سۇ-
يۇقلۇق ئارىلاش ئىكەنلىكىدىن دېرەك بېرىدۇ. خۇددى

دوۋساق ياللۇغلىتىشدىكىدەك روشەن ئىشلىق كۆرىلىدۇ.
ئەمما ئاغرىش بولمايدۇ.

داۋاسى: ئاۋال ئىچىشكە بىر ئاز ئەكىلىملىك
يېغى ۋە ئىسسىق خۇسۇسىيەتلىك مائىل ئۇسۇل (121-
نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئىچىشكە يالپۇز سۈيى بېرىلىدۇ. كۈلى
سوسان يېغى، مامشا، ھىڭلارنى دوسۇن ئۈستىگە سۈركەش
ھەم سۇيدۇك توشۇڭىدىن تامغۇزۇش كېرەك. زەپەر يې-
غىنى ئىچىش ياكى دوساققا سۈركەش ياخشى نەتىجە
بېرىدۇ. ئەگەر سۇيدۇك تازىيىش، ياكى قىيىنلىق بىلەن
كېلىش ئەھۋاللىرى بولسا، بورەك كېسەللىرىدە كۆرسە-
تىلگەن چارلار قىلىنىدۇ.

دوساققا تاش تۇرۇپ قېلىش

بورەكتە پەيدا بولغان تاشلار دوساققا چۈشىدۇ.
ياكى بۆرەكتىگە ئوخشاش سەۋەپلەر بىلەن دوۋساقنىڭ
ئۈزىدە قۇم تاشلار پەيدا بولۇش يەنى دوۋساققا يىغىلغان
سۇيدۇكتىكى ماددىلار مىزاج ئۆزگىرىش تەسىرى بىلەن
ئۆزگىرىدۇ (تاش، قۇمدەك قاتتىق ماددىلارغا ئايلىنىپ
قالىدۇ).

ئالامەتلىرى: كىچىك بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ.
ئاياللاردا ئەرلەرگە قارىغاندا ئاز كۆرىلىدۇ. چۈنكى ئا-
ياللار سۇيدۇك يولى ئەرلەرگە قارىغاندا ماددىلارنىڭ
چۆكۈشى ئۈچۈن قۇلايسىز. ئاغرىش دوۋساق ئەتراپىدا
بىردىنلا پەيدا بولىدۇ. بۇ بارغانسېرى جىنى ئىزا سا-

ھەسكە يېتىپ بارىدۇ. جىنى ئىزا تۇۋى سىنگەندە قەد چىشىدۇ ۋە ھەرىكەتكە كېلىدۇ. سۇيدۇك ئوبدان مېڭىپ تۇرۇپ بىردىنلا توختاپ قالىدۇ ياكى تامچىلاپ چىقىدۇ. بۇ تاش دوۋساق توشۇڭگە كېلىپ توسىلىپ قالغانلىقتىن بولۇپ، ئاغرىش مۇشۇ چاغدىلا قاتتىق بولىدۇ. تاش توشۇڭكە كەلمىگەندە ئادەتتە ئاغرىش بولمايدۇ. بەزى كېسەللەر سۇيدۇك كەلمەي ئازاپلانغاندا بىرلا ئورنىدىن تۇرسا ياكى يانغا، ئارقىغا ئاغدۇرۇلسا بىردىنلا سۇيدۇك ھېچىر ئاغرىقسىز مېڭىپ كېتىدۇ. بۇ تاشنىڭ دوسۋاق توشۇڭىدىن يىراقلاشقانلىغىدۇر. بورەكتە پەيدا بولغان تاشنىڭ رەڭگى سېرىق ياكى قىزىل بولىدۇ. دوساقتا پەيدا بولغان تاش ئاق ياكى قىزىل گۈلرەڭلىك كېلىدۇ.

داۋاسى: سوغاق مىزاجلىق كىشىلەردە پەيدا بولىدىغان تاش يوغان ھەتتا تۇخۇمدەك پەيدا بولغانلىقى ھەققىدە يازما خاتىرىلەر بار. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇنداق كىشىلەرگە تاشنى پارچىلاپ چۈشۈرۈش بىلەن دورىلار كۈچلۈك رەك ياساپ يېرىلىشى كېرەك. چايان يېغى (رەۋغىنى ئەقرەپ) (157-نۇسخە) نى ئوغرى تىكەن يېغى ۋە بابۇنە يېغى بىلەن بىللە كېسەلنىڭ پۇتلىرىنى كوتەرتىپ ياتقۇزۇپ سۇيدۇك توشۇش كىدىن تامغۇزۇش لازىم. يېيىش ئۈچۈن مەجۇنى مەش-دىرتۇس (25-نۇسخە) ۋە سەنجىرىنا (33-نۇسخە)

بېرىلىدۇ. بورەكتىكى تاش كېسىلىدە كورستىلگەن جەزىلەر (156-157 - نۇسخە) لەرنى بىرلىشىپ بولىدۇ. ئەگەر بۇ چارە بىلەن ھەل بولسا دەستكارە بىلەن دوۋساقنى يېرىپ تاش ئېلىنىدۇ.

سۇيدۇك كويىگەندەك ئېچىشىپ كىلىش

سەۋىبى: بورەك ياكى دوۋساق ياللۇغى ۋە جاراهەتلىرىدە ئاغرىق سېگەندە خۇددى كويىگەندەك ئېچىشىدۇ. بونى يۇقۇرىدا سوزلەپ ئوتتۇق. توۋەندە جىگەرلىك زەرەرلىنىشى ۋە سەپرا سەۋىبى بىلەن بولىدىغان سۇيدۇك ئېچىشىپ كىلىشنى سوزلەيمىز.

ئالامەتلىرى: سۇيدۇكتە يىرىك ياكى باشقا غەيرى نەرسىلەر بولمىسىمۇ، سېگەندە كويۇپ ئېچىشىدۇ. جىگەر زەرەرلىكەنلىك ياكى بەدەندە سەپرا غالىپلىق ئالامەتلىرى ۋە ھارارەت بولىدۇ.

داۋاسى: ئىسپۇغۇل، بىيە ئۇرۇغى لۇئابى، سېمىز ئوت ۋە خاڭكا، قوغۇن ئۇرۇقلىرىنىڭ شىرىلىرىنى شەرتى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ (74 - نۇسخە) ياكى شەرتى خەشخاش (69 - نۇسخە) بىلەن قوشۇپ بىرىلىدۇ. بىئادىق بۇزۇرى (153 - نۇسخە) نى ئارپا سۈيى بىلەن يېمىشكە بېرىلىدۇ. جىنى ئالاقە ۋە شورلۇق غىزالارنى يېيىش مەنىنى قىلىنىدۇ. بۇ كېسەل ئەگەر ئوزۇن ۋاقىتتا داۋالانمىسا دوۋساق ۋە بورەك جاراهەتلىرىگە ئايلىنىپ كېتىش ئېھتىمالى بار.

سۇيدۇك يوللىرىدىكى جاراھەتلىرىدە سۇيدۇك
كويىگەندەك ئېچىش كېلىدۇ بۇ ھەقتە تەناسىل كې-
سەللىكلەر بابىدا سوزلىنىدۇ.

سۇيدۇك تۇتۇلۇش (ئېھتىياسى بەۋل)

سۇيدۇك تۇتۇلۇپ قېلىش بورەك ياكى دوۋساق-
نىڭ ياللۇغلىنىشلىرى، ھەر خىل
جاراھەتلىرى، تاش پەيدا بولۇش ياكى دوۋ-
ساققا قان ئۇيۇپ قېلىشلار تۈپەيلىدىن بولىدۇ. ئۇلار-
نىڭ سەۋەپ ۋە ئىلاجلىرى مەزكۇر كېسەللىكلەردە سوز-
لىنىدۇ. بۇ يەردە يۇقۇرقلاردىن باشقا، مەسىلەن، بورەك
ۋە دوۋساق يوللىرىغا زىيادە گۆش ئوسۇپ قېلىش، دوۋ-
ساق پەيلىرىنىڭ پالەچلىنىشى، خىلىتلار سەۋىيىدىن كېلىپ
چىققان سۇيدۇك تۇتۇلۇشلار سوزلىنىدۇ.

1) سۇيدۇك يوللىرىغا زىيادە گۆش پەيدا بولۇش:
جاراھەتلىرىدىن كېيىن سۇيدۇك يوللىرىدا تاتۇق قالغان
ھالدا ساقىيىدۇ ياكى سۇيدۇك يوللىرىدا تەدرىجى ھالدا
ئوسمە ئوسۇپ سۇيدۇك يوللىرىنى توساپ سۇيدۇك تۇ-
تۇلۇش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. سەۋەپ كۈچلۈك بولغاندا
سۇيدۇك پۇتۇنلەي توختايدۇ. ئىكەر ئاجىزراق بولسا
سۇيدۇك تامچىلاپ كېلىدۇ. سۇيدۇك يوللىرىدا بۇ خىلدىكى
توسالغۇ ئومۇمەن بورەك بىلەن دوۋساق ئارىلىقىدا ياكى
دوساق بىلەن چىقىرىش يولى ئارىلىقىدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: بورەك بىلەن دوۋساق ئوتتۇرىسىدىكى

توسىلىشلاردا پەل ساھەسىدە ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. سۇيدۇك كۈندىن-كۈنگە ئازىيىدۇ ۋە سۇيدۇك يوللىرىدا باشقا ئالامەتلەر مەسىلەن، سۇيدۇك قىيىنلىق بىلەن كېلىش، سۇيدۇك بىلەن قان يىرىك كىلىشلەر كۆرۈلىدۇ، ئەمما سۇيدۇك يولى ۋە بورەكتە تاش تۇرۇپ قېلىشنىڭ كۆر-سىتىپ ئوتۇلگەن ئالامەتلىرى بولمايدۇ. بۇ ئۇنىڭ مۇ-ھىم ئالامەتلىرىدۇر. ئاغرىقلار بۇ ئەھۋالنى ئۇخايلقچە سەزمەستىن، تىۋىپ ئىنچىكىلەپ تەكشۈرۈپ كۆرگەندىلا سېزىلىدۇ. ئەمما ئۆسمەگۈش - سۇيدۇك چىقىرىش يولىدا يەنى جىنى ئىزادا بولغاندا، كېسەلنىڭ ئۆزىگە سېزىلىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سۇيدۇك يوللىرىدا ياللۇغ-لىنىش ۋە جاراھەت بار-يوقلۇغىنى ئوبدان قاراش لازىم. گۈش ئەگەر يۇقۇرقى سۇيدۇك يوللىرىدا ئۆسكەن بولسا، ئۇنىڭغا يۇمشاتقۇچى دورىلارنى ئىسچكۈزۈش ۋە شۇ دورىلار سۈيىدە ئولتۇرغۇزۇشتىن باشقا چارە يوق. (بورەك ۋە رەملىرىگە قاراڭ). بۇنىڭ نەتىجىسىمۇ ئانچە ياخشى ئەمەس. ئەگەر ئۆسكەن گۈش جىنى ئىزانىڭ سۇيدۇك چىقىرىش يولىدا بولسا ھەم ئۇنىڭ بىردىن-بىر چارىسى جىنى ئەزا تۇۋىدىن ئىككى ئورۇقدان ئارىلىغىدىن تىشىپ ئەنبۇپ (ئىچى كاۋاك كۈمۈشتىن ياسالغان نەيچە) قويۇلىدۇ. بۇ كېسەلنىڭ ھاياتىنى قۇت-قۇزۇپ قالىدۇ.

(2) دوۋساق پەيلىرىنىڭ پالەچلىنىشى، دوۋساقنىڭ

ھەيدەپ چىقىرىش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىشى — بۇنىڭدىن —
كى ئالامەتلەر يۇقۇرقىدەك بولۇپ دوساق ئۈستىگە بار —
ماق بىلەن چىكىپ كورگەندە سۇيىدۇك جىنىسى يولىدىن
تامچىلاپ چۈشىدۇ. قاناتىر ① كىرگۈزگەندە توسالغۇ
ياكى كېسەلدە ئازاپلىنىش بولمايدۇ. دوۋساقنى ئۇۋۇلاپ
بەرسە سۇيىدۇك ماڭىدۇ.

داۋاسى: مۇرەككەپ ئىسسىق دورىلاردىن مەمەجۈنى
مەشدىرتۇس (25 - نۇسخە)، مەجۈنى بالادۇر (29 - نۇسخە) —
خە، تەرياق كەبىر ۋە ماددە تۇلەيات (18 - نۇسخە)
لەردىن بىرىنى ياكى ھەممىسىنى مۇۋاپىق ھالدا بېرىش
لازىم. بۇلارغا مەجۈنى سەنجىرىنا (33 - نۇسخە) قوشۇل —
سىمۇ بولىدۇ. جويۇز يېغى ياكى قۇست يېغى ۋە سۇزاپ
يېغىدىن قايسى بىرى بولسا ئۇنىڭغا دارچىن، سۇمبۇل، سەلىخە،
قەلەمپۇر ۋە بەسباسەلەرنى باراۋەر مىقداردا سېلىپ قايد —
ئىتىپ دوۋساققا چېپىشقا بېرىلىدۇ.

(3) دوۋساققا قورنىغۇچى نەرسىلەر ۋە قۇرۇقلۇقنىڭ
ئارتۇق تەسىر قىلىشى: مەسىلەن، ئېغىر قىزىتمىلار، كۆپ
ئىچى سۇرۇش (بۇ كىچىك بالىلاردا كۆپرەك بولىدۇ)
بىلەن ئۇ سۇيىدۇك توختاپ قالىدۇ. مۇنداق ھاللاردا كور —
سىتىلگەن سەۋەپلەردىن بىرى مەۋجۇت بولۇش بىلەن
بىللە دوۋساق چىڭقىلىدۇ ۋە نەملىكتىن راھەتلىگەنلىك
ھىس قىلىدۇ.

① سۇيىدۇك يولىنى تەكشۈرۈش ئەسۋابى.

داۋاسى: ئىسپۇغۇل ۋە بىيەلۇئابلىرىغا بىيەلەش
شەرىئىتى ۋە گۈل يېغى قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئارپا سۈيىدە
پالەكنى پىشۇرۇپ قاپاق ۋە بادام يېغى سېلىپ بېرىلىدۇ.
ئاق لەيلى، بابۇنە ۋە زىغىرنى قاينىتىپ، سۈيى دۇسۇد -
ھا سىرتتىن قۇيۇلىدۇ.

(4) دوۋساق گۈشلىرىنىڭ تارتىشىۋېلىشى (تەشەنە -
نۇچ) سەۋىيى بىلەنمۇ سۇيىدۇك توختاپ قالىدۇ. بۇ
دوساقتىڭ تاشقى تەرەپتىن زەخمىلىنىشى ياكى ماددىلار
سەۋىيىدىن دوۋساق ئۈزىدە قىسقىرىشىنىڭ كۈچلۈكلىكى
بىلەن توشۇكى قىسىلىپ قېلىپ، سۇيىدۇك ماڭالمايدۇ.
ياكى ئومۇمى بەدەندىكى تارتىشىش كېسلى سەۋەپ
بولىدۇ. بۇنىڭغا تارتىشىش (تەشەنەنۇچ) كېسلىدە كۆر -
سىتىلگەن تەدبىرلەر قىلىنىدۇ.

(5) سۇيىدۇك يوللىرىدىكى قاتتىق ئاغرىش ياكى
باشقا بىرەر سەۋەپ بىلەن ئاغرىق سىيەلمەستىن، كۆپ
مىقداردا سۇيىدۇك دوۋساققا توپلىنىپ قالىدۇ. بۇ ھال
ئۇزۇن داۋام قىلسا سۇيىدۇك توختاپ قېلىش ئەھۋالى
كىلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: شۈمشە، زاراڭزا، ئاق لەيلى ۋە بە -
سەيلەرنى قاينىتىپ دوسۇنغا قويىلىدۇ. دوسۇننى دىققەت
بىلەن ئاستا ئۇۋۇلاپ بېرىش لازىم. ئالاھىدە داۋالاش
ھاجەتسىز. سەۋىيىنى يوقىتىشقا ئەھمىيەت بېرىش لازىم.
مۇنداق كىشىلەر سورۇنلاردا ئۇزۇن تۇرماسلىقى، سۇيىدۇكنى
ساقلىماي پات - پات سىيىپ تۇرۇشى كېرەك.

بۇلاردىن باشقا ئۈچەي، بالىياتقۇنىڭ ياللۇغلىنىپ
ئىشىشى ۋە ئۆمۈرتقا (بىل ئۆمۈرتقىسى) سوغەكلەردە -
نىڭ چىقىپ كېتىشى ياكى باشقا زەرەرلىنىشلەردىمۇ سۈيە -
دۇك تۇتۇلۇپ قالىدۇ. بۇلاردىكى ئالامەتلەر مەزكۇر سە -
ۋەپلەرنىڭ مەۋجۇتلىقى ۋە سۈيدۇك كەمەسلىكتۇر. سەۋەپ -
لەرنى داۋالاش بىلەن تۈزۈلۈپ كېتىدۇ.

سۈيدۇك تامچىلاپ كېلىش

(سىلسۇل بەۋىل)

سەۋىيى: خىلىتلاردىن سەپرا سەۋەپ بولىدۇ ياكى
دوۋساقنىڭ تۇتۇپ تۇرۇش قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىپ كېتىشتىن
بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆپ سىيگىسى كېلىدۇ (قەدەمدە
بىر سىيىدۇ) ئەمما تەرەتكە بارسا بىر - ئىككى تامچە
سۈيدۇك بىلەن توختايدۇ، ئېچىشىدۇ. جىنىسى ئالاقە بىر -
لەن كۆپ شوغۇللانغۇچىلار ۋە ئىسسىقلىق دورا ۋە
غىزالارنى كۆپ ئىستىمال قىلغۇچىلاردا ئۇچرايدۇ. سۈيە -
دۇك قىزىل كېلىدۇ.

داۋاسى: سېسىز ئوت، قوغۇن، خاڭگا، كوكىنار،
قاپاق ۋە تەرخەمەك ئۇرۇقلىرىنىڭ شىرىسى بېرىلىدۇ.
ھەم توۋەندىكى ئۇسۇلدىكى قۇرسى ماسكە بېرىلىدۇ.
نۇسخە: تاباشىر، يۇمغاقسۇت ئۇرۇغى، پاقا
يوپۇرمىغى ئۇرۇغى، گىلى ئەرمىنى، ئاق سەندەل، ئانار
گۈلى، سەمغى ئەرەبى ھەربىرىدىن ياراۋەر مىقداردا ئېلىپ،
سوقۇپ سۇ بىلەن قۇرس تەييارلاپ، كۈنىگە 2 مىسقالدىن
بېرىلىدۇ.

بۇ ئەھۋال ئەگەر، دوۋاساقنىڭ تۇتۇش قۇۋۋىتى تاجىزلىغىدىن بولسا سۇيىدۇك ئاق كېلىدۇ. دوسۇن بىر-شاشقان ھالدا بولۇپ، ئېچىش بولمايدۇ.

داۋاسى: ئىسسىق مەجۇناتلاردىن مەجۇنى مەشەپ تۇس (25-نۇسخە)، ئىترىپىل دەمىر (1-نۇسخە)، جەۋارش كۇندۇر (109-نۇسخە) ۋە سەنجىرنا (33-نۇسخە) لاردىن بىرىنى تاللاپ، مۇۋاپىق كەلگەنلىرى بېرىلىدۇ. سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن ئىنەك پىتى يېغى، بادام يېغى ۋە مومىلار بېرىلىدۇ.

سۇيىدۇك تېئالەسلىق (سېلىل بەۋل)

سۇيىدۇك ئىختىيارسىز مېڭىپ كېتىشى سۇيىدۇك تۇتالماسلىق دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ سەۋەپلىرىگە قاراپ تۆۋەندىكى پىرقانچە تۈرگە بۆلۈنىدۇ:

1) سوغاقلق تەسىرى بىلەن دوسۇن پىلىلىرى ئوشىشىپ كېتىپ سۇيىدۇك دوسۇنغا توپلانماستىن تۇرۇپ چىقىپ كېتىدۇ.

ئالامەتلىرى: بەدەندە سوغاق مىزاجلىق ئالامەت-لىرى مەۋجۇت بولىدۇ. سۇيىدۇك ئاق ۋە ئېچىشىش، ئاغرىش بولمايلا ئىختىيارسىز ھالدا چىقىپ كېتىدۇ. كۆپۈنچە سوغاقتىن بولغان كېسەللەردىن كېيىن پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: قورىغۇچى ۋە ئىسسىق دورىلاردىن كۆندۈر، مەستىكى، سەئىدى كوفى، خولىنجانلار بېرىلىدۇ.

(باراۋەر مىقداردا ئېلىپ تەلەپ قىلغان ھەلىق ياكى قاينىتىپ بېرىلىدۇ). بۇلارغا ئانارگۇلى، جۇپتى بەللۇت ۋە ھەبۇل ئاسلارنى تەڭ مىقداردا قوشۇپ بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى. 2) بەل ئۇمۇرتقىلىرىنىڭ زەرەرلىنىشى ياكى دو- سان پەيلىرىنىڭ ھەرخىل زەخمىلىنىشلىرى سەۋەبىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: بەلدىكى ۋە دوسۇندىكى زەرەرلىنىش روشەن بولۇپ، سۇيدۇك تۇتالمايدۇ.

داۋاسى: ئۇمۇرتقىلارنى ئۆز ئەسلىگە كەلتۈرۈش، سەۋەبىنى يوقىتىش مۇمكىن بولسا داۋالىغىلى بولىدۇ، ئەگەرچە بولغاندا ساقىيىشى تەس، ھىجامەت قويۇش، مۇناسىپ دورىلارنى سىرتتىن چېپىش كېرەك.

3) ئىسسىق كەيپىياتلارنىڭ تەسىرى بىلەنمۇ سۇي- دۇك تۇتالماسلىق پەيدا بولىدۇ. بۇنىڭدىكى ئاساسىي ئالامەت قىزىتما، سۇيدۇكنىڭ قىزىللىغى ۋە سۇيدۇك ھەللىغاندا ئېچىشىش ياكى قىزىق سېزىلىشلەردىن ئىبارەت.

داۋاسى: تاباشىر، ئانارگۇلى، قىزىل گۈل، گىلى ئېرىمىنى، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنى باراۋەر مىقداردا سوقۇپ، سېمىز ئوت سۈيى ياكى سېمىز ئوت ئۇرۇغىنى قايناتقان سۇ بىلەن قۇرس تەييارلىنىدۇ. كۈنىگە 1 — 2 مە- قالدىن يېمىشكە بېرىلىدۇ.

4) دوۋساققا خوشنا ئەزالار مەسلەن، بالىياتقۇ، چوڭ ئۇچەي ئىششىقلىرى دوۋساقنى بېسىپ قويۇشتىنمۇ

كېلىپ چىقىدۇ. بۇنداقلا سەۋەپنى بىرتەرەپ قىلىش كېرەك. سەۋەپ يوقىلىش بىلەن ساقىيىپ كېتىدۇ.

كېچىسى سېيىپ يېمىش (بەۋلى بىلقىراش)

بۇ كېسەل كوپىنچە گۈدەك بالىلاردا ئۇچرايدۇ. بەزىلىرى چوڭ بولغاندا ئۈزلىگىدىن ساقىيىپمۇ كېتىدۇ. دورا بىلەن داۋالاشقا قارىغاندا، ئادەتلەندۈرۈش بىلەن داۋالاش ياخشى نەتىجە بېرىدۇ. مەسىلەن، كېچىلىرى پات-پات ئويغىتىپ سىگۇزۇش، كەچقۇرۇندا سۇيۇق تا-ماق، چاي بەرمەسەك ياخشى. ئەگەر مىزاجى سوغاق بولسا گۈلى سۇسەن دىققەت بىر ئاز پەرىپىيۇن قوشۇپ دوسۇلغا سۈركەشكە بېرىلىدۇ. ھەسەل بىلەن تەييارلانغان گۈل قەنى يېمىشكە بېرىلىدۇ. ھەم مەجۇلى جەنتىيانا بېرىلىدۇ. ئۇسخە: زىرە (سىركىگە چىلاپ سۈزۈپ قۇرۇتۇل-غىنى)، كۈندۈز، ھەببۇل ئاس 5 مىسقالدىن. ھەسەل 40 مىسقال، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆت-كۈزۈپ ھەسەلگە ئېلىشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلاپ كۈنىگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

قان سېيىش: (بەۋلىدەم)

سەۋەبى: بورەك قانتومۇرلىرىنىڭ يېرىلىشى (زە-خىمىلىنىش ياكى تومۇر دىۋارى چۇرۇكلەشكەندە قان مىقدارىنىڭ زىيادە بولۇشىدىن)؛ جىگەر ۋە بورەك زەئىپلىكى نەتىجىسىدە سۇيىدۈكتىن قاننىڭ سۈزۈلۈپ چىقىشى يېتەر-سىز بولۇش، سۇيىدۈك يوللىرى (دوۋساق ۋە جىنى ئىزا)

دىكى زەخمىلىنىشلەردىن قان سېشى كېلىپ چىقىدۇ. ئالامەتلىرى: بورەك قانتومۇرلىرى يېرىلغاندا قان ساپ ھالدا كېلىدۇ. زەرەرلىنىشنىڭ چوڭ كىچىك - لىكىگە قاراپ مىقدارى ئاز ياكى كۆپ بولىدۇ. كېسەلدە تېز تەسىر قېلىدىغان دورىلار ئىستىمال قىلغانلىق ياكى بورەك زەخمىلىنىشلىك ئەھۋاللىرى بولۇپ، بەل ساھەسى ئاغرىپ تۇرىدۇ. جە - گەر زەئىپلىكىدىن بولسا كېسەلدە ئالدى بىلەن جىگەر زەئىپلىك ئالامەتلىرى (جىگەر زەئىپلىك كېسەللىكىگە قاراڭ) بولىدۇ. سۇيىدۇك كۆش يوغان سۈدەك كېلىدۇ. داۋاسى: قۇرسى كەربىيا (71 - نۇسخە): قۇرسى نەفسىدەم ياكى قۇرسى بەۋلىدەم (161 - نۇسخە) لەردىن بىرى بېرىلىدۇ. بورەك ۋە دوسۇن ساھىبلىرىغا سوغاق سۇ قويۇلىدۇ. گىلى ئەرمىنى، ئاقاقىيا، ئاق سەندەل، قىزىل گۈل، ھەمىشۋالارنى سوقۇپ، سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ بورەك ساھەسىگە چېپىشقا بېرىلىدۇ. جىگەردىن بولسا، جىگەر خىزمىتىنى ياخشىلاش چارىلىرى قىلىنىدۇ (جىگەر كېسەللىرى بابىغا قاراڭ).

ئەگەر دوۋساق ياكى جىنىسى ئەزالاردىكى جاراھەت - لەر سەۋىبىدىن قان سىيگەن بولسا، مەزكۇر ئەزالار ئاغرىش بىلەن بىللە، سۇيىدۇك سېسىق پۇرايدۇ، ئۇيۇل - ئۇيۇل قان چۈشىدۇ. بۇنداقتا قۇرسى كاكىنەج (152 - نۇسخە)، قۇرسى تاباشىر (112 - نۇسخە) ۋە كۈندۈر، گىلى ئەرمىنىلەر بېرىلىدۇ.

XII ماقالا. قوساق كىرگىت گۈشلە - رىنىڭ يىرتىلىشى

1 - پەسىل: چوقرىق (قېيىل) كېسەللىكلىرى

بىرەر سەۋەپتىن قوساق كىرگىت گۈش پەردىسى يىرتىلىپ ھاسىل بولغا، ئاۋك جايغا ئىچكى ئەزالاردىن ئۇچەي ۋە چاۋىلار چۈشۈپ سىرتقا يولتۇيۇپ چىقىشى ياكى يەل ۋە سۇ چۈشۈپ قلىشىغا تىبابەتتە "قېيىل" كېسەلى دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ پەيدا بولغان ئورنى ۋە چۈشكەن نەرسىگە قاراپ يەنە باشقا ناملار بىلەنمۇ ئاتىلىدۇ. مەسىلەن، ئۇچەينىڭ دوسۇن ساھىسىغا چۈشىشى "پەتەق"، ئۇرۇقدان خالىتىسىغا چۈشۈشى "قورۇ" دەپ ئېيتىلىدۇ.

پەتەق (چۇقۇق)

چات ئارىلىغىدىكى كىرگىت گۈش پەردىسى قات - تىق ئاۋاز بىلەن ۋاقىراش، ئېغىز نەرسە كېتىرىش ياكى قاتتىق ئىنجىقلاش سەۋىيىسى بىلەن يىرتىلىپ كېتىدۇ. بۇ چاغدا چات ئارىلىغىدا بىر كاۋاك جاي ھاسىل بولۇپ قېلىپ، ئۇنىڭغا ئۇچەي، چاۋا ياكى يەل، سۇ چۈشۈش -

لىدۇ. نەتىجىدە چات (يىرىق) ئارتلىنىشىدا پۇلتۇيۇپ چە-
قپ تۇرغان ئىششىق پەيدا بولىدۇ. بۇ خەلق ئارىسىدا
چوقۇق، پوداق دەپ، تىبابەتتە پەتەق دەپ ئاتىلىدۇ،
ئۇنىڭ توۋەندىكىچە بىرقانچە تۈرلىرى بار.

1) ئۇچەي پەتەقى — يىرتىلغان جايغا ئۇچەي
چۈشىدۇ، ئىششىق ئاستا - ئاستا يوغىنايدۇ. يۇقۇرىغا
قايتۇرۇش قىيىن بولىدۇ. باسقاندا كوكىرايدۇ، بەزىدە
بۇ جايغا چۈشكەن ئۇچەي تولغىشىپ قېلىپ ياكى قە-
سىلىپ قېلىپ ئۇچەي توسىلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن ئۇچەينى ئىچىگە كىرگۈ-
زۇش كېرەك. ئەگەر قۇل بىلەن باسقاندا كىرمىسە،
ئاغرىقنى بىر ئاز ئىسسىق سۇغا ئولتۇرغۇزۇش ياكى بابونە
يېغىنى قىزىتىپ ياغلاش بىلەن ئاسان كىرىپ كېتىدۇ.
ئۇندىن كېيىن توۋەندىكى دورىلارنى پەتەق بار تەرەپكە
دوسۇندىن تارتىپ پۇتۇن چات ئارىلىغىغا سۈركەپ ماتا
بىلەن تېگىپ قويۇلىدۇ.

ئۇسخە: مەستكى رۇمى، ئەلنۇرۇت، كۇندۇر،
جويۇز، قارىغاي يوپۇرمىغى، ئاقاقىيا، گۈلنار، مۇرمەككى،
پىرساۋشان، زەمچە، روسۇت، ئارچا مۇسى، سەپرى،
سوقۇتتىرى 3 مىسقالدىن ئېلىپ سوقۇپ، بېلىق يېغىدىن
6 مىسقال قوشۇپ ياغ دورا تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى: ماتانى ئىت ئۈزۈمى سۈيى
بىلەن ئەمدەپ، دورىنى كورسىتىلگەن جايلارغا سۈركە-

گەلدىن كېيىن ماما بىلەن تېگىپ پەتەق چىققان ھا-
ھا چەمبەر سېلىپ قويۇش لازىم. كېسەلنى ھەركەت قىل-
غۇزماي ئوڭدا ياتقۇزۇلسۇ. ئەگەر كېسەل تاقەت قىلا-
لسا قانچە ئۇزۇن ياتسا شۇنچە ياخشى. ھەركەت قى-
لىش توغرا كەلگەندە، ئاستا ھەرىكەتلىنىش لازىم. يەللىك
تاماملاردىن مەسىلەن، پۇرچاق جىنىسلىق دانلار، قازان
ئېنى، قىيمىلىق تامار، ئاۋۇت قاتارلىقلاردىن پەرھىز
قىلىنىدۇ. قاتتىق ئاۋاز بىلەن سوزلەش، ئىنجىقلاش،
جىنى ئالاقە مەنى ئىلىنىدۇ. ھەر تاماقتىن كېيىن
جەۋارش كۇمۇنى (9 - نەسخە) بېرىلىدۇ. چاي ئور-
نىدا رۇمبىدىيان، چىكسىي ئۇرۇنى، جۇۋىنە ۋە زەنجىۋىل
قاينىتىپ بېرىلىدۇ.

(2) چاۋا پەتەقى - بۇنىڭ ئالامىتى شۇكى با-
قاندا كوكىراش بولمايدۇ، قاتتىق بولىدۇ، ئىچىگە كىر-
گۈزۈش قىيىن. چارسى ئۈچەي پەتەقى بىلەن ئوخشاش.
(3) يىل پەتەقى - سىرتقا چىقىشى تېز ۋە چوڭ-
راق بولىدۇ. سىلىق باسقاندا ئاسانلا يوقاپ كېتىدۇ.
ئەمما تولا كوكىرايدۇ.

داۋاسى: يەلنى سىڭدۇرگۈچى دورىلار مەسىلەن،
جەۋارش كۇمۇنى (49 - نەسخە) يىيىشكە، پەنجى ئەنە-
گۈشت، سۇزاپ، ئىگىر، پىننە، مەرزەلجۇش ۋە جۇۋىنە-
لەرنى قاينىتىپ ئىچىشكە ۋە سۈركەشكە بېرىلىدۇ. ئۈچەي
پەتەقىدىكى تېگىش چارسى بىلەن چەمبەر سېلىپ قو-
يۇلىدۇ.

4) سۇلۇق پەتەق — بۇ ئۇرۇقدانغا چۈشىدۇ. ئۇخۇم قېپىدا سۇنىڭ لىغىلداپ تۇرغانلىقى ۋە تېرىنىڭ سۇزۇكلىكى روشەن بىلىنىپ تۇرىدۇ. قىسقىچى سۇلۇق ئىششىق كېسىلىدە سۆزلەنگەن چارىلار قوللىنىلىدۇ. ئەگەر بۇنىڭ بىلەن ھەل بولمىسا بەزىلى ① بىلەن سۇ ئېلىندۇ. بۇنىڭ قايتا يىغىلماسلىقى ئۈچۈن ئارپا ئۇلى بە- لىن كالا يۇڭى ئېلىشتۇرۇپ ئۇرۇقدانغا چېپىلىدۇ. سۇنى كۆپ ئىچىش مەنىنى قىلىنىدۇ.

5) قاتتىق پەتەق — بۇ خىلدىكى پەتەق "قورۇ- لەھى" دىيىلىدۇ. ئۇرۇقدان خالتىسىغا قاتتىق قويۇق خىلىتلارنىڭ چۈشۈشى بىلەن پەيدا بولىدۇ. كۆرۈنۈشتە ئۇرۇقدان ئىششىغاندەك تۇرسىمۇ، لېكىن ياللۇغلىنىشتىن ئەسەر بولمايدۇ.

داۋاسى: مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بە- لىن ماددىنى تازىلاپ، يۇمشاتقۇچى دورىلاردىن يۇقۇرىدا كۆرسىتىپ ئوتۇلگىنلەرنى تاللاپ سىرتتىن چېپىشقا بېرىلىدۇ.

قوساق پەتەقى

قوساقنىڭ كىرگىت گۆشلىرى ياكى تېرە ئاستىدە- كى پەردە (سەفاق) يۇقۇرىدا سۆزلەنگەندەك سەۋەپلەردىن يىرتىلىپ كېتىدۇ. بۇ بەزىدە كىندىك ئاستىدا، بەزىدە كىندىك ئۈستىدە بولىدۇ. يىرتىلغان جايدىن شۇنىڭ ① بەزىلى: تىبابەتتە بوشلۇقلاردىن سۇ ئېلىش ئۈچۈن قوللى- نىلىدىغان ئەسۋاپ.

تېگىدىكى ئەزالار چىقىپ پۇلتۇيۇپ قوساق تېرىسىنى
كوتىرىپ تۇرىدۇ. بەزىدە بۇ جايغا يەل ۋە سۇمۇ كېلىپ
چۇشۇپ قالىدۇ. يەللىك نەرسىلەرنى ئىستىمال قىلىش
ياكى ھەركەت سەۋەبىدىن ئىششىق تۈگۈنچە بارغانسېرى
چوڭىيىدۇ. بۇ ئەھۋال ئاياللاردا كۆپرەك ئۇچرايدۇ.
داۋاسى: ئۈچەي پەتىغى بىلەن ئوخشاش.

يەل كىندىك

يېڭى تۇغۇلغان بالىلاردا كىندىكنى ياخشى بوغ-
ماسلىق، ئەمچەكتىكى بالىلاردا كۆپ يىغلاش بىلەن
كىندىك سىرتقا پۇلتۇيۇپ چىقىپ قالىدۇ. بەزىدە كىن-
دىك ئاستىدىن ئوشۇق گۆش ئۆسۈپ چىقىش بىلەن
پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: ۋاقتى ئوتتۇپ كەتسە داۋالاش قىيىن.
ئالدى بىلەن كىندىكنىڭ چىقىپ قېلىش سەۋەپلىرىنى
ئوبدان بىلىش لازىم. قوساق كىرگىت پەردىلىرىنىڭ
يىرتىلىشىدىن بولسا پەتەقلەردە كۆرسىتىلگەن تەدبىرلەر
قوللىنىدۇ. سۇ چۈشكەن ئالامەتلىرى بولسا قوساققا سۇ
چۈشۈش كېسەلىدە كۆرسىتىلگەن چارىلەر قىلىنىدۇ.
كىندىك ئاستىدىن گۆش ئۆسۈپ چىققان بولسا،
پۇلتايىغان ئىششىق قاتتىق بولىدۇ. بىر ھالەتتە تۇرىدۇ،
باسقاندا كىرىپ كەتمەيدۇ، رەڭگى قارامتۇل ياكى بىنەپشە
رەڭگىدە بولىدۇ.

داۋاسى: كىندىك ئۈستىگە زۇلۇك قويۇلىدۇ ياكى
دەستكارە بىلەن داۋالىنىدۇ.

XIII ماقالا. قول - پۇت ۋە بەل كېسەللىكلىرى

1 - پەسل: بەل - ئومۇرتقا كېسەللىكلىرى

(1) ئومۇرتقا چىقىپ كېتىش (ھودەبە)

بەل ئومۇرتقىلىرىنىڭ چىقىپ كېتىشى ئومۇرتقىنىڭ ئۆز بوغۇمىدىن ئوڭ ياكى سولغا تېپىپ (سۇرۇلۇپ) كېتىشى ئالدى - كەينىگە چىقىپ كېتىشىدىن ئىبارەت. سەۋىيى: ئومۇرتقا (مەپەل) لىرى ئەتراپىدىكى گۆش ۋە پەيلەرنىڭ ياللۇغلىنىشى؛ بوغۇم بوشلۇقلىرىدا قويۇق يەل تولۇلۇش، بوغۇمنى تۇتۇپ تۇرغۇچى چاڭ دىرلارغا ئەمەلىي سىڭىپ بوشىشىپ قېلىشى؛ ئومۇمىي بەدەن تارتىشىنىڭ بەل گۆشلىرىگە بولغان زور تەسىرى؛ زەخمىلىنىش. بېقىلىش، ئۇرۇلۇشلار.

ئالامەتلىرى ۋە داۋاسى: (1) ياللۇغلىنىشتىن بولغانلىرىدا؛ ئومۇرتقىنىڭ ئۇزاقتىن بۇيان ئاغرىشىغا بىردىنلا قىزىتما ئورلەش ۋە ئاغرىشنىڭ يامانلىشىشى قوشۇلۇپ كېلىدۇ، تومۇر ھەركىتى تېزلىشىدۇ. بەل سا - مىسدە ئېغىرلىق ۋە مىدىرلىغاندا قادىلىپ ئاغرىش يۈز بېرىدۇ.

داۋاسى: شۇمىشە ئۇرۇغى، زىغىرلۇتايى، ئۇشۇق يېغى، ئىلىك، بىنەپشە، ئاق لەيلەرنى ئىشنىق بار جايغا قويۇپ تېگىش كېرەك. خىيالى شەمبەر شىرىسىگە بادام يېغى قوشۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ۋە ھوقنە قىلىدۇ، بۇلارنىڭ سىرتىدا، باشقا ئەزالارنىڭ ياللۇغلىق ئىشلىرىدا كۆرسىتىلگەن تەدبىرلەر قىلىنىدۇ.

(2) بوغۇم بوشلۇقلىرىدىكى يەل سەۋىيىدىن بولغاندا — (بۇنى تىبابەتتە "ھۇدە يە رىياھى فەرەس" دەپ ئاتىلىدۇ)، بەل ئاغرىيدۇ، ئاغرىش بويۇندىن باشلاپ تۈۋەنگە قاراپ يۆتكۈلۈپ تۇرىدۇ، ھازارەت ئورلىيدۇ، بەل سىرتقا ئىگىلىگەن ھالدا بولىدۇ، ئېغىرلىق بولمايدۇ، دەسلەپتە ئاغرىش ئېغىر بولۇپ، كېيىنچە پەسىيىپ قالىدۇ. داۋاسى: مائىل ئۇسۇل (159 - نۇسخە) بىلەن ھەبىي مەنتىن (27 - نۇسخە) بېرىپ، ئارقىدىن بەلگە ھىجامەت قويۇلىدۇ، سوتلەپ، بابۇنە يېغى ۋە پەرىپىيون قاتارلىقلارنى ئارىلاشتۇرۇپ بەلگە چېپىپ تېگىلىدۇ.

(3) چاندىر باغلارغا ئەمەلىك تەسىر قىلىشتىن بولغاندا يۇقۇرىدا كۆرسىتىلگەن ئالامەتلەردىن باشقا، زەرەرلەنگەن جايغا ياغ دورىلارنى سۈركەپ قويىسا تېرىگە سىڭمەي شۇ پىيىتى قالىدۇ.

داۋاسى: 2 - قىسمىدا كۆرسىتىلگەن چارلەر قىلىنىدۇ، ۋە چېپىش ئۈچۈن ئىسسىق كەيپىياتتىكى ياغلار-دىن سۇزاپ يېغى، ئاقىرقەرھە يېغى بېرىلىدۇ.

(4) تارتىش سەۋىيىدىن بولغاندا، ئومۇمىي بەدەن ياكى بەل ساھەسىدە تارتىش ئالامەتلىرى كورلىدۇ. (چارىسى ئۈچۈن تارتىش "تەشەنۈچ" كېسلى بېلىغا قارالغۇ).

(5) سىرتقى زەخىملىنىشتىن بولغاندا سەۋەپنىڭ مەۋجۇتلىقى بىلەن بەلنىڭ قاتتىق ئاغرىشى بىللە بولىدۇ. ھارارەت ياكى باشقا ئەھۋاللار روشەن بولمايدۇ. بەلنىڭ ھەرىكىتى چەكلىنىدۇ.

داۋاسى: قوزغالغان ئومۇرتقا ئۈستىگە ئوت بىلەن ھىجامەت قويۇپ ئەكسىگە كەلتۈرۈش كىپايە قىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن زىقىرىمى، موقۇل ۋە ئاقىرقەرھالەرنى باراۋەردىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، بىر ئاز نەمدەپ بەلگە سۈركەشكە بېرىلىدۇ.

غول ئاغرىش (ۋە جىللەھرە)

غول يەنى ئىككى تاغاقىن بەلگىچە بولغان جاي نىڭ ئاغرىشى كۆپ ئۇچرايدۇ. بۇ كېسەل سەۋەپ ۋە قىسمەن ئالامەتلىرىگە قاراپ توۋەندىكى بىرقانچە تۈر-لەرگە بۆلىنىدۇ.

(1) مىزاجنىڭ ماددىلار سەۋىيىدىن ياكى ماددىسىز ھالدا بۇزۇلىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. كۆپىنچە سوغاقىن بولۇپ، مۇھىم ئالامەتلىرى غول ئاغرىيدۇ، ئېغىرلىق ھىس قىلىنىدۇ. سوغاق نەرسىلەر ياكى سوغاق ھاۋانىڭ تەسىرى ئاغرىشنى ئېغىرلاشتۇرىدۇ. ئەمما يول مېڭىش ياكى

باشقا ھەركەتلەر بىلەن ئاغرىش يەڭگىلەشپ قالىدۇ.
ئۇزۇنغا سۇزۇلىدۇ.

داۋاسى: مزاجنى تەڭشەش ئۈچۈن مائىل ئۇسۇل (159-نۇسخە) بىلەن ھەسەل سۈيى بېرىلىدۇ. مەجۇن دورىلاردىن سەنجىرىنا (33-نۇسخە) ۋە مەشدرتۇس (25-نۇسخە) بېرىلىدۇ. چېپىش ئۈچۈن قۇست يېغى، بابۇنە يېغى، مۇقىل ئۇشەق، شۇمشە، ھەببۇلغارلارنى زىغىرلۇتايى ۋە ئىنەك پىتى يېغى بىلەن غولغا سۈركەشكە بېرىلىدۇ. غىزاسىغا ئۇقۇت سۈيى ۋە قۇش گۆشلىرى بېرىلىدۇ.

2) غول ساھەسىدىكى ئومۇرتقا گۆش ۋە پەيلىرىگە غەيرى تەبىئىي بەلغەم (خام بەلغەم) ياكى قويۇق يەل كىلىشى بىلەن غول ئاغرىش پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: غولنىڭ ئاغرىشى ئاستا-ئاستا كېلىپ چىقىدۇ. ۋاقىت ئۆتكەنسېرى ئاغرىشى ئېغىرلىشىدۇ. بولۇپمۇ ھاياجانلىنىش ياكى روھى قوزغىلىۋىش ۋە جىنى ئالاقىدىن كېيىن ئاغرىش كۈچىيىدۇ. ئادەتتە يەلكە ۋە غول ئىتراپى دائىم ئېغىر سىزىلىدۇ. ئاغرىش ئېغىر بولغاندا كۆزى قاراڭغۇلىشىدۇ، ئاغرىش يۈتكۈلۈپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: بەلغەم ماددىسىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن ھەببى سۇرۇنجان (37-نۇسخە) بېرىلىدۇ. قەي قىلدۇ-رۇشنىڭ مەنپەئىتى زور. مۇنچىغا چۈشۈش، دەم ئېلىش بىلەن بىللە، سىرتتىن گۈل يېغى، بىنەپشە يېغى ۋە ئاق لەيلىلەر چېپىشقا بېرىلىدۇ.

(3) يۈرەك ئاجىزلىقى ياكى خوشنا ئىبزالاردىكى زەرەرلىنىشلەر غول ئاغرىشىغا سەۋەبچى بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: يۈرەك زەئىپلىگىنىڭ ئالامەتلىرى مەۋجۇت بولىدۇ. كۆز ئاغرىقى بار كىشىلەردىمۇ غول ئاغرىش ئۇچرايدۇ. ئومۇمەن بۇ خىلدىكى غول ئاغرىشلاردا ئەرلەردە جىنسى قابىلىيەت تۆۋەنلىنىدۇ.

داۋاسى: يۈرەك ئاجىزلىقىنى داۋالاش ئۈچۈن كېسەللىكلەرگە قاراك. ۋە باشقا سەۋەپلىرىنى ئۆز قاتىبىدى بويىچە داۋالاش ھەمدە يۇقۇرىدا كىيىنىشلىك غول ياغلار بىلەن ياغلاش مۇمكىن.

(4) بالىياتقۇ زەرەرلىنىشى ۋە ھېيىزنىڭ توختاپ قېلىش سەۋىيىسى بىلەنمۇ ئاياللاردا غول ئاغرىش كېلىپ چىقىدۇ. بەزى ئاياللار ھېيىز مەزگىللىرىدە ئاغرىپ ھېيىز كۆرگەندىن كېيىن ساقىيىپ كېتىدۇ.

داۋاسى: بالىياتقۇ كېسەللىگىنىڭ ئالامەتلىرىگە قاراپ تەدبىر قىلىش كېرەك. ئەگەر ھېيىز توختاپ قالغان ياكى قالايمىقانلاشقان بولسا مۇنۇ ئۇسۇلدىكى شەرت ۋەت بېرىلىدۇ:

نۇسخە: چىڭسەي ئۇرۇغى 1 مىسقال، شۇمشە، رۇمبىدىيان، سېرىق چىچەك ئۇرۇغى، جۇۋدە ھەر بىرى 4 مىسقالدىن، خاڭگا، قوغۇن ئۇرۇغى ھەر بىرى 4 مىسقالدىن، ئوردان 2 مىسقال، قەن 8 سەر، دۈربىلارنى چالا سوقۇپ 2 جىڭ سۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى

1/2 قالغىدەك قاينىتىپ، ماتا ئارقىلىق سۇزۇلىدۇ. تىرىپ

لىرىنى سىقىپ، سۈيىگە قەين سېلىپ قىيام قىلىپ تەييارلاپ بىر ھەپتىگىچە بىر پىيالىدىن كۈنىگە 2 - 1 قېتىم ئىچىدۇ.

بەل ئاغرىش (ۋە جىلخاسىرە)

غول ئاغرىشنىڭ سەۋەپلىرى بەل ئاغرىغىنى كەلتۈرۈشى مۇمكىن ئەمما كۆپىنچە بەلغەم ۋە يەل سەۋەپ بولىدۇ. داۋاسى: ئالامەت ۋە سەۋەپلىرىگە قاراپ غول ئاغرىشتىكى چارلار قوللىنىلىدۇ. ھەم توۋەندىكى شامچە قويۇلىدۇ.

نۇسخە: ئوشەق، رۇمبىدىيان، زەنجىۋىل، چىڭسەي ئۇرۇغى، شەھى ھەنزەل، سورۇنجان، ماھى زەھرەج، مۇ-قىللەرنىڭ ھەر بىرىنى بازار ۋە مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، چىڭسەي ئۇرۇغى قاينىتىلغان سۇ بىلەن شامچە تەييارلاپ، سايدا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. گۈل يېغى بىلەن ياغلاپ كۈنىگە بىر قېتىم سۈگىما تىقىپ قويۇلىدۇ.

2-پەسىل: سوغەك ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرى

بۇ يەردە سوغەك ۋە بوغۇملارنىڭ ئاغرىشلىرىلا سوزلىنىدۇ. ئۇلارنىڭ باشقا كېسەللەكلىرى مۇناسىۋەتلىك باپلاردا سوزلىنىدۇ.

تىبابەتتە سىرگەك بونۇملىرىنىڭ ئاغرىشى بوغۇم ئاغرىقى (ۋەجىنىلمو پاسىل)، يانپاش بوغۇم ۋە يانپاش سۆڭەكلىرىنىڭ ئاغرىشى (ۋەجىنىلمۇ ۋەرەك)، يانپاش بوغۇم-دىن تارتىپ تاكى ھوشۇققىچە بولغان سۆڭەك قىسمىنىڭ ئاغرىشى (ئەرقۇننىسا) ۋە ھوشۇقتىن توۋەنگىچە، تاپان، پەنجە بوغۇمى ۋە سۆڭەكلىرىنىڭ ئاغرىشى ئۇقرىس دەپ ئاتىلىدۇ. بۇلاردىن باشقا سۆڭەك ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرىدىن ئومۇملاشتۇرۇپ "موپاسىل" دىگەن ئاتالغۇ بىلەن ئاناش ئادەت بولۇپ قالغان.

بوغۇم ئاغرىقى (موپاسىل) ئىششىقلىق ياكى ئىششىقسىز بولىدۇ. ئىششىقسىز بولغىنى ياللۇغلىنىشتىن، ئىششىقلىق بولغىنى كوپىنچە ماددىلار سەۋىبىدىن كېلىپ چىقىدۇ. ئەمما ئىششىق يىرىك يىغمايدۇ.

يۇقۇرىدا كۆرسىتىپ ئۆتۈلگەن سۆڭەك ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرىنىڭ مەيلى قايسى تۈرى بولسۇن ئومۇمەن بىر قانچە ئورتاق سەۋەپلەرگە ئىگە. ھەم يەنە ئۆز ئالدىغا ئالاھىدە ئالاھىدىلىرىمۇ بار. توۋەندە ئومۇمى سەۋەپلىرىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز.

1) ماددىلارنىڭ بوغۇم ياكى سۆڭەكلىرىگە، ئۇلار-نى ئوراپ تۇرغۇچى گۆش ۋە پەيلەرگە چۈشۈشىدىن بو-لىدۇ. ئەمما ھەركەت چاندىرلىرىغا چۈشمەيدۇ (سىڭمەيدۇ). ئىگەر چاندىرلارغا سىڭىپ قالسا، ئۇنداقتا تارتىشىش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

2) بوغۇملارنىڭ زەئىپلىكى، بۇشاپ قېلىشى ياكى شۇ ئەزا مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى بىلەن ماددىلار بوغۇملارغا كېلىپ يىغىلىدۇ. بۇنىڭ سەۋىيىسى كۆپ يەپ ئاز ھەرىكەت قىلىش تۈپەيلىدىن بەدەندىن چىقىپ كېتىشكە تېگىشلىك كېرەكسىز ماددىلار بوغۇملارغا چۈشىدۇ. مەئىدىنىڭ ھەزىم قىلىش قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىش نەتىجىسىدە يىتىشمىغان خىلىتلار پەيدا بولۇپ بوغۇملارغا چۈشىدۇ.

تەرتىپسىز ئوزۇقلۇنۇش، ئاراقنى كۆپ ئىچىش ۋە ئاچ قوساققا مونچە چۈشۈش ياكى ئىسسىق مەۋجىدىن چىقىپلا سوغاق سۇ ئىچىش بىلەن ماددا بوغۇملارغا چۈشىدۇ.

زۇكام نەزىلىسى بوغۇملارغا چۈشىدۇ. ھېمىز توختاپ كەتكەن مەزگىلدە ئاياللاردا بولىدىغان ئۆزگىرىشلەرنىڭ بىرى شەكلىدە يۈز بېرىدۇ. قوللىنىلغان كېسەللىكلەرنى داۋالاشتا سۈرگە بېرىلسە، ماددىلار سىرتقا چىقىپ كېتەلمەي بوغۇملارغا چۈشىدۇ. ماددىسىز بولغان مۇپاسىللارنى ماددىسىز دەپمۇ بولمايدۇ، چۈنكى مەيلى يەل ياكى باشقا سەۋەپلەردىن بولغان مۇپاسىللاردا ئازدۇر - كۆپتۇر ماددا ئارىلاشقان ۋە ماددىلار يەككە، باشقا ماددىلار بىلەن قوشۇلغان بولىدۇ. بەلغەم بىلەن سەپرانىڭ قوشۇلۇشى كۆپرەك ئۇچرايدۇ. ئەمما بەلغەم، يەل، سەۋدانىڭ بىرىكىشىدىن پەيدا بولغانىنى كام ئۇچرايدۇ.

بوغۇملارنىڭ ئاغرىشى (ۋە جىلەمپاسىل)

بوغۇملار (سۆڭەكلەر بىر - بىرىگە تۇتاشقان ئورۇن) نىڭ ئاغرىشى يۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئوتۇلگەن ئورتاق سەۋەبلەردىن باشقا سەرپ ۋە ئالامەتلىرىگە ئاساسەن تۆۋەندىكىچە ئۆزگە بولىدۇ:

(1) ماددىسىز مىزاج بۇزۇلۇشتىن - ئىسسىق - سوغاق، قۇرۇقلۇقنىڭ غالىپ بولىشىدىن كېلىپ چىقىدىغان بوغۇم ئاغرىشى.

ئالامەتلىرى: بوغۇملاردىكى (ياكى زەرەرلەنگەن بوغۇمدىكى) ئاغرىش تەدرىجى ھالدا پەيدا بولىدۇ، ئېغىرلىق ۋە ئىششىق روشەن بولمايدۇ. سەۋىيىنىڭ كەيپىياتقا مۇناسىۋەتلىك ئالامەتلىرى بولىدۇ. مەسىلەن، ئىسسىقلىقتىن بولسا بوغۇم قىزارغان، ۋە تۇتۇپ كۆرگەندە بەدەننىڭ باشقا جايلىرىدىن قىزىق سېزىلىدۇ. سوغ ۋە قىمىدىن بولغاندا، ئەسلىگە نىسبەتەن ئاقارغان ۋە سوغاق سېزىلىدۇ ۋە باشقىلار.

داۋاسى: مىزاجنى ئۆزگەرتىشنى ئاساس قىلىش كېرەك. ئىسسىقلىقتىن بولسا سوغاقلىق قىلىنىدۇ. يەنى لى - مون شەرۋىتى ۋە ئانار شەرۋىتى (47 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. سۈرگە بېرىش ياكى قان ئېلىشقا بولمايدۇ. قۇرۇقلىق ئالامەتلىرى بولسا بادام يېغى، گۈل يېغى، قاپاق ئۇرۇغى ياغللىرىدىن بىرى ياغلاشقا بېرىلىدۇ. سوغاقلىقتىن بولغان بوغۇم ئاغرىقلىرىدا سوغاقلىقتىن بولىدىغان ياللۇغ -

لىنىيىلاردا كورسىتىپ ئوتۇلگەن ئىسپاتلىق دورىلار تاللاپ ئىشلىتىلىدۇ.

(2) ماددى سەۋەپلەردىن قان كۆپ بولۇشتىن پەيدا بولغان بوغۇم ئاغرىقلىرى كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: زەرەرلەنگەن بوغۇم روشەن ھالدا قەزەرغان بولۇپ، پۈتۈن بەدەن قىزىيدۇ، لوقۇلداپ قاتتىق ئاغرىيدۇ، بوغۇم ئۈستىدىكى تومۇرلار كۆپۈپ قالىدۇ. ئىشقى يوغان ۋە سانچىلىغاندەك سېزىلىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر مەنى قىلىدىغان ئەھۋاللار بولسا قارشى تەرەپ تومۇرىدىن قان ئېلىنىدۇ. ئاغرىش قول بوغۇملىرىدا بولسا ئۆمەل تومۇرىدىن، پۇتتا بولسا ساقىن تومۇرىدىن ئاغرىقنىڭ ئومۇمى ئەھۋالىغا قاراپ بىر قېتىم ياكى بىر قانچە قېتىم ئاز - ئازدىن قان ئېلىشقا بولىدۇ. قان ئېلىش مەنى قىلىنسا ئاغرىش بار جايىنىڭ ئاستىغا ھىجامەت قويۇلىدۇ. 2 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن ئىسكەنجىسىگە سۇ قوشۇپ 2 مىسال قوغۇن سالىپنى تالقىنى بىلەن ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇلىدۇ. ئەگەر سۈرگە بېرىشكە توغرا كەلسە بىنەپشە، گازىۋان، چىلان، سەرىستان ۋە ئىت ئۇزۇمى بىلەن جۇلاپ قىلىپ بېرىلىدۇ. مەلۇم ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى سورۇنجان (160 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھارارەت كۆپ بولسا، ئارپا سۈيى ياكى ئانار سۈيىگە تەمرى ھىندى چىلاپ بېرىش مۇمكىن. ياكى ئىسكەنجەم.

بىن بۇزۇرى (101 - لۇسخە) بەرسىمۇ بولىدۇ. ئاغرىق پەسەيتىش ۋە ئىششىقنى ياندۇرۇش ئۈچۈن (ئەگەر قىزىتما بولسا) ئاق سەندەل، قىزىل سەندەل، پۇپىل، مامشا، ئاقلا-قىيالارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمىلاقۇت ياكى كاسىن بۇيى بىلەن ئاغرىق بار جايغا چېپىلىدۇ. ئاغرىش بەك قاتتىق بولسا ئەپيۇندىن ئاز قوشۇش مۇمكىن. ئاغرىق يىر ئاز پەسەيگەندىن كېيىن ماددىنى يوشىتىش ئۈچۈن بىنەپشە بىلەن ئاق لەيلىنى سوقۇپ (كوك ھالدىكىسى ياخشى) بوغۇم ئۈستىگە تېگىپ قويىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن ماددىنى قايتۇرۇش ئۈچۈن توۋەندىكى دورا تەييارلاپ چېپىلىدۇ.

زىغىر، شۇمشە ھەر بىرى 5 مىقالدىن، بادام يېغى 3 مىقال، ئاق موم 7 مىقال، ئەكىلىل مىلىك، بابو-ئە، گۈل يېغى ھەر بىرى 3 مىقالدىن. تەييارلاشتا ئالدى بىلەن زىغىر بىلەن شۇمشەنىڭ شىرىسى ئېلىنىدۇ. ئەكىلىل مىلىك يۇمشاق سۇقىلىدۇ، ياغ دورىلارنى ئوتتا بىر ئاز قىزىتىپ، موم سېلىپ ئېرىتىپ، ئۈستىگە لۇئاپ ۋە سوقۇلغان ئەكىلىل مىلىك، بابۇنلارنى سېلىپ تازا ئارىلاشتۇرۇپ سىرتتىن سۈركەشكە بېرىلىدۇ.

3) قان بىلەن سەپرا ياكى ئۇقۇل سەپرا سەۋد-بىدىن بولغان بوغۇم ئاغرىقى.

ئالامەتلىرى: قاتتىق ئاغرىش ۋە ئېچىش بۇ تۈردىكى بوغۇم ئاغرىغىغا خاس ئالامەتتۇر. تومۇر ھەر-

كىتەپ تەجرىبە، بوغۇم ئۆزىنى تەقەزۇب قىلىپ بولىدۇ. بىزنى كىشىلەردە سۈيىدەك ساغايىش، كىچىك ئۆيىنىش قاتارلىق مەھۇللار كېلىپ چىقىدۇ. بۇ كىتەپ ئۆزىنى كىشىلەردە كۆپرەك ئۇچرايدۇ. بۇنداق كىشىلەرنىڭ يۈزى ۋە بەدەننى كۆچلەندۈرۈشكە ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك.

داۋاسى: مەتبۇخى ەبلىلە (2 - نۇسخە) ياكى مەتبۇخى ئەپتىمۇن (21 - نۇسخە) دىن بىرى بېرىلىدۇ. مۇمكىن قەدەر ئالاھىدە سۇمگە بەرمەك كېرەك. تازىلىغاندىن كېيىن ئىسسىق سۈيى بىلەن يېمەكلىك بېرىلىدۇ. ئۇنىڭ بىلەن چۈچەك ۋە ئۆلۈپ كېتىش ساقلىنىش لازىم. چىپىش ئۈچۈن ئىسپۇغۇلنى سىركە بىلەن ئېلىشتۇرۇپ ياكى خاڭگا سۈيى، قاپاق سۈيى، ھەمىشە سۈيى قاتارلىقلار بىلەن بىزى بېرىلىدۇ. ئاغرىشى پەسەيتىش ئۈچۈن سورۇنجاننى باراۋەر مىقداردىكى شېكەر قوشۇپ تالان قىلىش كۈنىگە 3 مىنۇت سۇغا قوشۇپ بېرىلىدۇ.

(4) بەلغەمدىن بولغان بوغۇم ئاغرىشى:

ئالامەتلىرى: بوغۇملاردا ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. قاتتىق ئاغرىش ياكى قىزىتما بولمايدۇ. يۈرەك ھەرىكىتى ئاجىز، زەرەرلەنگەن بوغۇم ئىششىغان، سىرتى قوغۇشۇن رەڭلىك بولىدۇ. سوغاقلىق تەس قىلغاندا ئاغرىش كۈچىيىدۇ، ئەمما قىزىتما پەسەيتىپ قالىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بەلغەمگە خاس باشقا ئالامەتلەرمۇ كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: ئاۋال قەي قىلدۇرۇش كېرەك. بۇنىڭ

ئۇچۇق سېرىق چېچەك ۋە چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قاينىتىلغان سۇغا ھەسەل قوشۇپ ئىچكۈزىلىدۇ. قەي قىلدۇرۇش - تىن مەقسەت بىلەن ماددىسىنى بەدەندىن چىقىرىپ تاشلاشتىن ئىبارەت. ئەگەر بۇنىڭ بىلەن نەتىجە كۆرۈلمىسە بىلەنمە پىشۇرۇش ئۈچۈن تۆت كۈن ئۇدا ھەسەل بىلەن تەييارلىغان گۈلچەكنى بېدىيان ئەرەقى بىلەن بېرىلىدۇ ياكى 3 كۈن داۋاملىق مائىل ئۇسۇلغا ئىنەك پىتى يېغى قوشۇپ 4 - كۈنى مەخسۇس مائىل ئۇسۇل (159) - نۇپ - خە) بېرىلىدۇ. ماددا پىشقاندىن كېيىن ھەبىي سورۇنجان (37 - نۇسخە) ياكى ھەبىي مەنتىن (27 - نۇسخە) دىن بىرى بېرىلىدۇ. بۇ دورىلار بىر ھەپتە داۋاملىق بېرىلىپ، بىر نەچچە كۈن ئۆتكۈزۈپ يەنە بىر نەچچە ھەپتە داۋاملىق بېرىلىدۇ. بۇ دورىلار بېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى ۋە خاڭگا ئۇرۇقلىرىنى قايناتقان سۇ بىلەن بىللە بېرىل سە مەلپەئەتى تېخىمۇ ياخشى. سىرتتىن ماددىلارنى تارقاتقۇچى دورا ئىشلىتىشنىڭ پايدىسى يوق. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ خىلدىكى كېسەللەردە بوغۇم ئىششىغىنى قايتۇرۇش ئۈچۈن بېرىلىدىغان سىرتقى دورىلارغا سەبەر، ئاق لەيلى، بابۇنىلەر ۋە ئىنەك پىتى يېغى بېرىش يېتەرلىك. شۇنى ئەستە تۇتۇش لازىمكى، بوغۇم ئاغرىقلىرىنىڭ قايسى خىلدىكىسى بولمىسۇن سورۇنجاننى ئېغىز ئارقىلىق بېرىش ياكى سىرتتىن، يالغۇز ھالدا ياكى باشقا دورىلار بىلەن بىللە چېپىشنىڭ پايدىسى كۆپ، ئەمما مەئىدىنى

بۇزۇش ئېھتىمالى بولغانلىقى، ئۇ-غۇن زەنجىۋىل بىلەن
زىرە قوشۇپ بېرىلىدۇ ۋە بوغۇملارنى موم يېغى بىلەن
ياغلاپ تۇرۇش كېرەك. چۈنكى مورۇنجان بوغۇملارنى
قاتۇرۇپ قويىدۇ.

5) سەۋدا ماددىسىنىڭ، بوغۇملارغا تەسىر قىلىش
دىن بولغان بوغۇم ئاغرىقى

ئالامەتلىرى: زەرەراەلەن بۇغۇمدىكى ئىششىق قات
تىق بولسىمۇ، ئەمما ئاغرىش ياكى سانجىلىش ئانچە
ئېغىر بولمايدۇ. ئىششىق ماشىنىنىڭ كۆككە مايىل بولۇپ،
كېسەلدە ئەسەبى (روھى) ئالامەتلىرى قېشۇلۇپ كېتىدۇ. تا-
ماقنى كۆپ يەيدۇ. ئۆزى ئوراق بولىدۇ. ھۆل نەرسىلەر-
دىن راھەتلىنىدۇ.

داۋاسى: سەۋدانى پىشۇرۇپ بولغاندىن ئۇنى
سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە)
بېرىپ، ئاندىن مەجۇنى جەۋارىش كۇمۇلى (49 - نۇسخە)
بېرىلىدۇ. ئىششىقنى يۇمشىتىش ۋە تارقىتىش ئۈچۈن
بابۇلە، شۇمشە، زىغىر، مۇقىل، جاۋۇشىر، ئۇدخام، ئەد-
جۇرلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ، قوي يېغى،
زەيتۇن يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ سەل قىزىتىپ ئۇستىگە دو-
رىلارنى سېلىپ، ماي دورا تەييارلاپ ئىششىغان بوغۇمغا
سۈركەش ئۈچۈن بېرىلىدۇ. ئەگەر تىۋەنكى نۇسخىدىكى
ياغ دورىنى تەييارلاپ بەرسە بۇ خىلدىكى بوغۇم ئاغرىق-
لىرىدا مەنپەئەتتى بەك ياخشى.

نۇسخە: گۈل سوسەن يېغى، قۇست يېغى، ئىنەك
پىتى يېغى، زاراڭزا يېغى، ھەر بىرى 5 مىسقالدىن. قوي
قۇيرۇق يېغى، توخۇ يېغى، ئودەك يېغى ھەر بىرى 2
سەردىن، ئاق موم 7 مىسقال، بابۇنە، مەرزەنجۇش، ھاشا،
شۈمشە ھەر بىرى 5 مىسقالدىن.

تەييارلاش: ئۇسۇلى ئالدى بىلەن چوپ دورىلارنى بىر
ئاز سۇدا قاينىتىپ، راسا تەمىنى چىقىرىپ مائا ئارقى-
لىق سۈزۈپ، تىرىپىنى سىقىپ، سۇيىگە ياغ دورىلارنى
سېلىپ سۇ تۈگەپ كەتكىچە قاينىتىلىدۇ. ئاندىن ئۈستى-
گە مومنى سېلىپ تازا ئارىلاشتۇرۇپ شىشە قاچىلاردا
ساقلىنىدۇ.

6) يەلدىن بولغان بوغۇم ئاغرىقلىرىدا، ئاساسەن
بوغۇمدىكى ئاغرىق يۈتكىلىپ تۇرىدۇ. ئېشىق يۇمشاق
بولىدۇ، ھارارەت ئالامەتلىرى بولمايدۇ. يەللىك نەرسى-
لەرنى (مەسىلەن، ئارپا، كالا گۆشى، كاۋا، ياڭيۇ قاتار-
لىقلار) ئىستىمال قىلسا ئاغرىق ئېغىرلىشىپ قالىدۇ.

داۋاسى: گۈلچەننى بېدىيان ئەرەقى بىلەن بېرىپ
شەرىتى بۇزۇرى (130 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھەبىي سو-
رۇنجان (37 - نۇسخە) ياكى سۇيۇپى سورۇنجان (35 -
نۇسخە) دىن بىرى بېرىلىدۇ. سىرتتىن چېپىش ئۇچۇن
5 - تۈردىكى ياغلاردىن بىرى بېرىلسە بولىدۇ.

بوغۇم ئاغرىقلىرىدا ئادەتتە كۆپ ئىشلىتىلىدىغان
ئاغرىق (بوغۇم ئاغرىقلىرى ۋە بوغۇم ئاغرىقلىرىنى)
پەسەيتىدىغان تۈۋەندىكى دورىلار بار:

(1) سورۇنجان بىلەن ئاۋاتنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ كۈنگە 3 مىسقالدىن سوغاق سۇ بىلەن بېرىلىدۇ.

(2) ئۈچ مىسقال قۇرۇق يۇمىلاقسۇتنى باراۋەر مىقداردىكى شېكەر بىلەن سوقۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

(3) 2- مىسقال ئاق كۆكتار ئۇرۇغىنى باراۋەر مىقداردىكى شېكەر بىلەن سوقۇپ بېرىلىدۇ.

(4) ئىسپۇغۇلنى قىزىق سۇ بىلەن تازا مىجىپ، گۈل يېغى ئارىلاشتۇرۇپ ئاغرىغان جايغا سۇرتىلىدۇ.

(5) شۈمشۈن سىركىگە قوشۇپ، بوغۇم ئۇستىگە چېپىشقا بېرىلىدۇ.

يانىپاش بوغۇمى ۋە سوغەكلەر ئاغرىش (ۋە جىئىلۇەردىك)

سەۋىيى: ئومۇمى مۇپاسىللار سەۋىيى بىلەن ئوخشاش بولۇپ، بەزىدە تەسادىپى ھاللار، مەسىلەن، ئۇلاققا مىنىش، سەكرەش بالىسى بىلەن ئاغرىش باشلىنىپ كېتىدۇ.

ئالامەتلىرى: يانىپاش تەرەپ بوغۇمىغا قوشۇلاپ، بەزىدە پۈتۈن يانىپاش سەۋىيىلىرى ئاغرىپ كېتىدۇ. ساددا چوڭقۇر قاتلامدا بولغانلىقى ئۈچۈن تاشقى كۆرۈنۈشتە ئىششىق بولمايدۇ. سەۋەبى ماددىلارغا قاراپ يەرلىك ۋە ئومۇمىي بەدەنلىك ئالامەتلىر كۆرىلىدۇ. مەسىلەن، قان غالىپلىقى بولسا، يەرلىك جاي ياكى پۈتۈن بەدەندە

قىزىتىلما بولىدۇ، قاتتىق ۋە سالىنىپ ئاغرىيدۇ. يانپاش
ئېغىر ۋە قىزىرىپ تۇرىدۇ. كېسەللىك ئۇزۇنغا سوزۇلسا
ئېرقۇلىساغا ئايلىنىدۇ.

داۋاسى: مەنى قىلىدىغان ھاللار بولمىسا ئاغرىق
تەرەپتىن قان ئېلىش كېرەك. بولمىسا ھىجامەت قويۇل-
ما بولىدۇ. تاشقى تەرەپتىن چېپىشقا قاتۇرغۇچى دورىلار-
نى ئىشلىتىمەنلىك كېرەك. ھازارەت بولمىسا ئاغرىق پە-
سەيتتىن ئۈچۈن زىمىر، بابۇنە، سېرىق چېچەك ۋە ئاق
لەيلەرنى چېپىش كېرەك. ئىگەر ھازارەت بولسا قاننىڭ
كۆپلىكىدىن بولغان بوغۇم ئاغرىغىدا كورسىتىلگەن چار-
لار قىلىنىدۇ. يېپىشكە ھەببى مەنتىن (27 - نۇسخە) بى-
لەن ھەببى سورۇنجان (37 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇلار
بىلەن نەتىجە ھاسىل بولمىسا گۆڭگۈرتلۇق ئارىشاڭلاغا
چۈشۈش ۋە يانپاش بوغۇم ئۇستىنى داغلاش ① كېرەك.
ياكى بوغۇمغا ئوتلۇق ھىجامەت قويۇش لازىم.

ھوشۇق ۋە تاپان سوغەك بوغۇملىرىنىڭ

تەبىئىي (ئۇقىرىش)

بۇ كېسەللىكتە ئاغرىش ھوشۇقتىن باشلىنىپ ئاياق
تاپان سوغەكلىرى ۋە بارماق بوغۇملىرىغىچە بارىدۇ. ھەتتا
پاقالچەك تەرەپلەرگىمۇ مېڭىپ ئىشىشى مۇمكىن. قىزىق-
① داغلاش: مەخسۇس 3 قىرلىق بىر تومۇر ئەسۋاپ بىلەن
لۇپ ئوتتا قىزىتىپ تۇرۇپ كورسىتىلگەن جايغا يېقىلىدۇ.

بارماق سوغىگى ۋە بوغۇملىرىنىڭ ئاغرىپ ئىشىشى -
تىشىمۇ نۇقرىس دەپ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ھوشۇق، قول بىلىزۈك بوغۇملىرى
ياكى ئاياق، ئالغان پەنچە سۈڭەكلىرىدە چىدىغۇسىز
ئاغرىش پەيدا بولۇپ، بوغۇم ئىشىشىدۇ، ئېغىر ھاللاردا
ئاغرىش ۋە ئىشىق بوغۇملاردىن ئەتراپقا تارقىلىشىمۇ
مۇمكىن. پۇت چوڭ بارمىقى ياكى قول باش بارمىقىغا
چۈشە ئاغرىش تېخىمۇ زىيادە بولىدۇ. بەزىلەر بۇ كېسەلنى
ئاتا-بوۋىلاردىن مىراس قالىدۇ، دەپ قارايدۇ.

داۋاسى: يۇقۇرىدىكىدەك داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ.
ئەمما بۇ كېسەلگە سوغاقلنىق قوللىنىشقا بولمايدۇ، مىڭ
ۋە يۈرەككە تەسىر بېرىدۇ. ئەگەر سوغاق دورىلارنى،
ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلارنى چاپقاندا باش قېيىش
ياكى كوڭۇل ئاينىپ يۈرەك سېلىش قاتارلىق ئالامەتلەر
يۈز بەرسە، بابۇنە ۋە ئاق لەيلى قايناتقان سۇ بىلەن
بوغۇمنى يۇيۇش كېرەك.

3 - پەسىل: ئاياق قانتومۇرلىرى كېسلى

ئاياق قانتومۇرلىرى كېسلى پاقالچەك كوك
تومۇرىنىڭ ئەگرى - بۇگرى كېڭىيىپ كېتىشى (داۋالى)
ۋە ئاياقنىڭ پىل پۈتمەك يوغۇناپ كېتىشى (دائىل پىل)
كېسەللىكلىرىدىن ئىبارەتتۇر. ئۇلارنى تۈۋەندە ئايرىم -
ئايرىم بايان قىلىمىز.

ئاياق كوك تومۇرىنىڭ ئىگىسى - بۇگىرى كېڭىيىپ (داۋالى) كېتىشى

سەۋىيىسى: قاندىكى كۆيگەن سەۋدا ۋە قان ماددىسىنىڭ ئاياق تومۇرلىرىغا كېلىپ توكىلىشى بىلەن پەيدا بولىدۇ. يۈك كۆتەرگۈچى ھامىللار، ئۇزاق سەپەردە پىيادە ماڭغۇچىلار، يارىدارلار ۋە دائىم ئورە تۇرغۇچىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: ئاياققا ئاغرىش تېلىش ۋە ئالامەتلىرى بولۇپ، تەدرىجى ھالدا قان تومۇرلار تېرىدىن كۆتىرىلىپ، چوڭ ئىگىسى - بۇگىرى كۆرۈنۈشكە كىرىپ قالىدۇ. پاقالچەك نىڭ شەكىلىنىمۇ بىر ئاز ئۆزگەرتىدۇ. تومۇرلار كېڭىيگەن ۋە كۆكەرگەن ھالدا بولىدۇ. ئۇزۇنغا سوزۇلسا داۋاسى مۇشكۈل.

داۋاسى: سەۋدا ۋە بەلغەم ماددىلىرىنى تازىلاش ئۈچۈن چارە قىلىش كېرەك. قەي قىلدۇرۇش ۋە ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە) نى يالغۇز ياكى گىلى ئەر - مىنى قوشۇپ بېرىش كېرەك. سۈرگە بېرىپ بولغاندىن كېيىن پاقالچەكنى مائا بىلەن بوشراق قىلىپ تېڭىپ قويۇش لازىم. باشقا تەدبىرلەر دائىل پىل بىلەن ئوخشاش.

پىل پۇتى كېسىلى (دائىل پىل)

كېسەلنىڭ بىر ياكى ئىككىلا پۇتى خۇددى پىلنىڭ پۇتىدەك يوغاناپ كېتىدۇ. يۇقىرىدىكى قان تومۇر ئىگىلىرى - شىپ كېڭىيىشتە ماددا قان تومۇرلاردا بولسا، بۇنىڭدا ماددا

قانتومۇردا، مېشەك كۆش ۋە تاپان گۆشلىرىدە بولىدۇ.

سەۋىيى: قويۇق غەيرى تەبىئى قان ۋە سەۋ - دانىق پۇت تومۇرلىرى ۋە گۆشلىرىگە قۇيۇلشى؛ قويۇق بەلغەمنىڭ ئاياقلاردا يىغىلىپ قېلىشىدىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: پۇت ئېشىشىدۇ، ئىشقى قاتتىق بولۇپ، تۇتۇپ كۆرگەندە ئىسقى سېزىلىدۇ. كېسەل باشلىنىشىدا تېرە قىزغۇش رەڭدە بولۇپ، بارغانسېرى مائىسەرەڭگە ياكى قارامتۇل كۆكۈش رەڭگە كىرىپ قالىدۇ. پاقالچەك تېرىسى بۇزۇلۇپ، كېيىنچە يارىغا ئايلىنىدۇ. ئەمما سەزگۈ ئەسەبلىرىنىڭ بۇزۇلۇشى نەتىجىسىدە جارا- ھەتلەنگەن جاي ئاغرىمايدۇ. بۇ پىل پۇتى كېسىلىنىڭ ئالامەتلىكىدىن بىرىدۇر.

داۋاسى: قان ئېلىش ياخشى چارە ھىساپلىنىدۇ. باسلىق تومۇرىدىن قان ئېلىش كېرەك. سەۋدانى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. سۈرگە ئۈچۈن ئىسسىق كەيپىياتلىق دورىلار بېرىشكە بولمايدۇ. چېپىش ئۈچۈن ئاقاقىيا ۋە ئوسارە لەلەھىيەتتە - تىسلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سۇدا ئېرىتىپ چېپىش، مېڭىشتىن ساقلىنىش كېرەك. دائىم پۇتىنى يۇقۇرى قىلىپ يېتىشىنى ئادەتلىنىش لازىم. يول مېڭىشقا توغرا كەلسە پۇتقا سەمغى ئەرەبى، موزا، داۋا، ئاقاقىيالارنى چېپىپ، ئۈستىدىن ماتا بىلەن تېڭىپ قويۇپ مېڭىش

لازم. ھەركەتتە پۇتقا ئېغىرلىق چۈشۈپ قېلىشتىن ساق
لىنىش كېرەك.

قويۇق بەلغەمدىن بولغان دائىل پىلىدا ئىششىق
يۇمشاق ۋە سوغاق بولىدۇ، ئېغىرلىق بولمايدۇ.

داۋاسى: بىر-ئىككى قېتىم قەي قىلدۇرۇش
كېرەك. ئۇندىن كېيىن ھەر كۈنى سەھەردە ئىتتىرىپىل.
سەغىر (5-نۇسخە) گە بىر مىسقال كۈندۈر، يېرىم مى-
قال زەنجىۋىل قوشۇپ يېرىلىدۇ. بۇ كېسەلدە ئاغرىقنى
ئاچ قالدۇرۇش پايدىلىق. سىرتتىن چاپىدىغان باشقا
چارىلار يۇقۇرقى بىلەن ئوخشاش. بەزىلەر دائىل پىل
ئېغىر بولماي ھەركەتكە تەسىر بەرمىسە داۋالىماسلىقىنى
تەشەببۇس قىلىدۇ.

XIV ماقالا. قىزىتىملار (تەپلەر)

1 - پەسىل: بىر كۈنلۈك قىزىتىملار (تەپى يەۋمى)

بەدەندىكى ھارارەت قانداق ھاسىل بولىدۇ ۋە يۈ - رەك ھەرىكىتى ئارقىلىق بەدەننى ئوز ئېتىدالىدىكى ئىسسىقلىق بىلەن تەمىنلەپ تۇرىدۇ. ھارارەتنىڭ ھەر خىل سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن كېلىپ چىققان غەيرى تەبىئى ھالىتى (يەنى "ھارارىتى غەرىبە") يۈرەكتىكى قۇۋۋەتلەر (روھ) بىلەن بىللە پۈتۈن بەدەن قىزىل تومۇر - لىرى ئارقىلىق ئەزالارغا تارقىلىپ، تەپ يەنى قىزىتما ھالىتىنى پەيدا قىلىدۇ. ئۇلار سەۋەپلىرىگە قاراپ كۈن - لىك قىزىتما (تەپى يەۋمى)، خىلىتلىك قىزىتما (تەپى خىلىتى) ۋە جۈدەتكۈچى قىزىتما (تەپى دىققى) دىگەن 3 چوڭ تۈرگە بولىنىدۇ. ئۇلار يەنە ئوز نوۋىتىدە بىر قانچە كىچىك تۈرلەرگە ئايرىلىدۇ. بىز بۇ پە - سىلدە سوزلايدىغان بىر كۈنلۈك قىزىتما 3 چوڭ ۋە 23 كىچىك تۈرگە بولىنىدۇ. تۈۋەندە ئۇلارنىڭ بەزى مۇھىملىرىنى كۆرسىتىمىز:

(1) تەبىئى قۇۋۋەت (قۇۋۋەيى تەبىئىيە - جىگەردىكى

قۇۋۋەت) نىڭ ھارارىتى غەربىيە بىلەن بىرىكىشىدىن بولىدىغان بىر كۈنلۈك قىزىتما. بۇنىڭدا ھەزىم قىلىشنىڭ ئۇزۇنلىقى، ئىسسىق تاماقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلىش، ئىچ سۈرۈش سەۋەپلىرى بىلەن قىزىتما ھاسىل بولىدۇ.

(2) ھاياتلىق قۇۋۋىتى (قۇۋۋەيى ھايۋانى — يۈرەك — تىكى قۇۋۋەت) بىلەن ھارارىتى غەربىيەنىڭ بىرىكىشىدىن بولىدىغان بىر كۈنلۈك قىزىتما: غەم، قورقۇش، خەشلىق ۋە مونچىغا چۈشۈش سەۋەپلىرىدىن ھاسىل بولىدۇ.

(3) سېزىش قۇۋۋىتى (قۇۋۋىتى نەپسانى — مىڭە — دىكى قۇۋۋەت) بىلەن ھارارىتى غەربىيەنىڭ بىرىكىشىدىن بولىدىغان بىر كۈنلۈك قىزىتما: ئۇيغۇنچىلىق، ۋەھىمە، تولا پىكىر — خىيال قىلىش تۈپەيلىدىن ھاسىل بولىدۇ. ئالامەتلىرى: بىر كۈنلۈك تەپتىكى بەدەن قىزدىنىش، بەزىلەردە بەدەننى تۇتۇپ كورۇش ئارقىلىق بىلىڭىلى بولمايدۇ. بەزىلەردە بولسا قولغا روشەن سېزىلىدۇ. قىزىتما ۋاقتى ئادەتتە بىر كۈندىن ئاشمايدۇ. بەزىدە 3 كۈنگە — چە داۋاملىشىدىغان قىزىتىملارمۇ بار. بىر كۈنلۈك تەپ قاتارىغا كىرىدۇ. كۆپ ۋاقىتلاردا تەبىئىي يەۋىي باشقا تەپلەرگە ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن.

داۋامى: بىر كۈنلۈك تەپلەرنى سەۋەپ ۋە ئالامەتلىرىگە (تومۇر ھەرىكىتى، سۇيدۇك رەڭگىگە) قاراپ سەۋەپنى يوقىتىشنى ئاساس قىلغان ھالدا داۋالىنىدۇ. قان كۆپلىگى سەۋەپ بولمىغانلىرىدا سۈرگە بېرىشنىڭ ھاجىتى

يوق. تەرتىپلىق، مولچىغا چۈشۈش ۋە كېسەللىكلەرنىڭ ئۆزىدە سوزلەپ ئۆتۈلگەن چارىلار قىلىنىدۇ.

2 - پەسىل: خىلمەتلىك قىزىتمىلار (تەبىئىي خىلمەت ياكى ھۇممىياتى خىلمەت)

خىلمەتلىك قىزىتمىلار توت خىلمەت يەنى قان، سەپرا، سەۋدا ۋە بەلغەم سەۋبىدىن پەيدا بولۇپ، ئۇلار بىر خىل خىلمەتتىن ياكى بىردىن ئوشۇق خىلمەتلەر تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. بىر خىلمەتتىن بولغىنى ئاددى (موفرەد) قىزىتما ۋە كۆپ خىلمەتتىن بولغىنى مۇرەككەپ قىزىتما دەپ ئايرىلىدۇ. ئۇلار يەنە مىكروپىلۇق (ئۇفۇنەتلىك) ۋە مىكروپىسىز (ئۇفۇنەتسىز) قىزىتما دەپمۇ پەرقلىنىدۇ.

قان ماددىسىدىن بولغان قىزىتما (تەبىئىي دەمەۋى)

سەۋبى: قان مىقدارىنىڭ ئۆلچەمدىن ئېشىپ كېتىشى ياكى قاندا ئۇفۇنەت (مىكروپ) بولمىغان ھالدا ھارارەتنىڭ پەيدا بولۇشى؛ قاندا ئۇفۇنەت يەنى مىكروپ پەيدا بولۇشى.

ئالامەتلىرى: بەدەندە قان ئېشىپ كېتىش ئالامەتلىرى بولىدۇ. مەسىلەن، يۈز ۋە كۆز قىزىرىدۇ، قانتومۇرلار كۆپىدۇ، بۇرۇن ئىچى ۋە قاشلىرى قىچىش تۇرىدۇ. تومۇر ھەركىتى چوڭ، توم، تېز بولىدۇ.

سۇيۇك قويۇق ۋە قىزىل رەڭدە كېلىدۇ. قىزىتما داۋام
لىق بىر خىل بولۇپ، تەر چىقمايدۇ. ئۇفۇنەت بولسا
بۇ ئالامەتلەرگە تەرەت ۋە سۇيۇكنىڭ سېسىق پۇراقلىق
كېلىشى قوشۇلىدۇ ھەم بەدەنلىرى قۇرغاقلىشىپ قالىدۇ.
داۋاسى: ئەڭ تېز چارە باسلىق ياكى ئوككەل

تومۇرىدىن قان ئېلىشتىن ئىبارەتتۇر. بۇ كېسەلدە ماددى-
نى پىشۇرىشنى كۈتۈشنىڭ ھاجىتى يوق. كېسەللىكنىڭ
7 - كۈنلىرىگىچە، ئەگەر بوھران بولمىسا قان سېلىپ ئالغان-
دىن ياخشى چارە يوق. ئەگەر قان ئېلىشقا توغرا كەلمەيدىغان
ھاللار بولسا غولنى تىلىپ لوڭقا (ھىجامەت) قويۇش
لازىم. ئاغرىق گۈدەك بالا بولسا زۇلۇك سېلىپ قان ئېلىۋەت-
سۇلىدۇ. قاننى سوۋۇتۇش ئۈچۈن ھۇماز، ئوتروچ، لىمون
سۇلىرى بېرىلىدۇ. ئەدەس (ئاچ قىزىل رەڭلىك پۇرچاق)
نى سىركە بىلەن پىشۇرۇپ بەرسىمۇ بولىدۇ.

ئۇفۇنەتلىك قىزىتىمدا، ئۇفۇنەت تومۇرىنىڭ سىرتى-
دا يەنى بىر ئەزادىكى ياللۇغلىنىش ياكى ئىششىق
جاراھەتكە ئالاقىدار بولسا، ئۇنى قوشۇلغان قىزىتما
(تەبىئىي ئارىزى) دەپ ئاتىلىدۇ. بونداقتا سەۋەپ بولغان
ياللۇغلىنىشنى ئىششىق جاراھەتنى ساقايتىش بىلەن قىزىت-
ما قايتىدۇ. ئەگەر ئۇفۇنەت تومۇر ئىچىدە بولسا، قان
ئالغاندا قاننىڭ قىيامى سۇيۇق ۋە سەپرا ئارىلاش چىقسا
(سېرىققا مايىل بولسا)، چىلان شەرىۋىتى ۋە ئانار شەرىۋىتى
(47 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئەگەر قان قويۇق بولسا، ئاددى

ئىسكەنجىۋىل، كاسىن يىلتىزى ۋە جۇجۇكبۇيا يىلتىزى قايىتىلغان سۇ بېرىلىدۇ. ئۇ سىن كېيىن نەمىرى ھىندى ۋە ئەينۇلىنى قاينا قىسۇغا چىپ، تەمىنى چىقىرىپ تىچىت كە بېرىلىدۇ ۋە شەرۋىتى پىنەپشە (74 - نۇسخە) شەرۋىتى خەشخاش (69 - نۇسخە) دىن بېرىلىدۇ. شۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەككى، بۇ خىلدىكى قىزىتىملاردا دەرھال ھارا-رەت چۈشۈرگۈچى سوغاقلق دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. بۇنداق قىلغاندا بەلغەمدىن بولغان سەرسام پىدا قىلىش مۇمكىن، تەرەتتىك دائىم ۋە مەشاق كېلىشكە دىققەت قىلىش لازىم. بوهرالدىن يىنىدۇ 2 سەر كاسىن سۈيىگە بىر يېرىم سەر ئىسكەنجىۋىن قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئەگەر كېسەلدە يوتەل بىللە بولسا چۈچۈمەل دورىلارنى بەرمەسلىك كېرەك. ئۇنىڭ ئورنىغا بىيە ۋە ئىسپۇغۇل لۇئابلىرىنى بىنەپشە شەرۋىتىگە قوشۇپ بەرسە بولىدۇ. ئەينۇلا سۈيى يوتەل موزغىمايدۇ. بۇ خىلدىكى قىزىتىملاردا يوتەل بولسىمۇ ئۇنى بېرىشكە بولىدۇ. دائىم ئىچىپ تۇرۇشقا چىلان سۈيى ياكى چىلان شەرۋىتى بېرىلىدۇ.

سەپرادىن بولىدىغان قىزىتما (تەپى سەپراۋى)

سەپرادىن بولغان قىزىتما ئاددى ۋە مۇرەككەپ دەپ 2 تۈرگە بۆلىنىدۇ. ئاددىسى خاس سەپرادىن بولۇپ، مۇرەككەپى باشقا ماددا ئارىلاشقانلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ. ئالامەتلىرى: بەدەندە سەپرا غالىپلىقىدىن باشقا تۈۋەندىكىچە ئالامەتلەر كۆرىلىدۇ:

(1) ماددا تومۇر ئىچىدە بولسا، قىزىتما بىر كۈن بولۇپ، بىر كۈن بولمايدۇ (يوشۇرىنىدۇ) تىبابەتتە بۇنى "غەيىبى لازىمە" دەپ ئاتىلىدۇ. ئەگەر ماددا يۈرەككە يېقىنراق بىرەر تومۇرلاردا بولسا، ئومۇمى ئالامەتلەر ناھايىتى ئېغىر بولۇپ، بۇنىسى ئادەتتە كېزىك (تەپى مۇھرىقە) دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇلارنىڭ پەرقى مۇنداق:

(1) تەپى مۇھرىقىدە (كېزىكتە) قىزىتما ۋە بەدەن دىكى سانچىق غەيىبى لازىمىگە قارىغاندا زىيادە بولىدۇ.
(2) تەپى مۇھرىقىدە ئومۇمى بەدەن بوشىش كېتىدۇ.

(3) تەپى مۇھرىقىدە تىنچسىزلىنىش، قۇرۇق ھو، ئەقلى-ھۇشى جايىدا بولماسلىق، جويلۇش (ھەزىيان)، تىل قارامتۇل گەز باغلاش، يۈرەك سېلىش ۋە ھۇشىدىن كېتىش ئەھۋاللىرى كورۇلىدۇ. ئەمما غەيىبى لازىمىدە بۇ ئەھۋاللار بولمايدۇ.

(2) ماددا تومۇرنىڭ سىرتىدا بولسا، غەيىبى دائىم-رە دەپ ئاتىلىپ، يەككە بولسا غەيىبى خالىس، باشقا ماددىلار مەسىلەن، بەلغەم قوشۇلۇپ كەلگەن بولسا، غەيىبى غەيرى خالىسە دىيىلىدۇ. ئەگەر بەلغەم بىلەن بىرىكىشى مۇستەھكەم بولمىسا شەتۈل غەيىپ دىيىلىدۇ. غەيىبى دائىرىدە قىزىتما بىر كۈن بولۇپ، بىر كۈن بولمايدۇ. غەيىبى خالىستا بىر كۈن قىزىتما ئېغىر بولسا، ئىككىدە-چى كۈنى بەلگىلى بولىدۇ. ئىككىسى بىرلەشكەندە قە-

ھەتتا ھەر كۈلى بولىدۇ. ئومۇمەن قىلىپ ئېيتقاندا،
شەتەرلۈك غەيىپ بەلغەم ۋە سەپرانىڭ بىرىكىشىدىن ئىبارەت مۇرەككەپ ماددىدىن تۇغۇلغان قىزىتما بىرلۈپ،
ماددىلارنىڭ ئۇقۇنەت ھاسىل قىلغان ئورنى باشقا بولىدۇ. خىلىلار ئۆتۈرسىدىكى پەرقنى قىزىتمىنىڭ
ئالاھىدىلىكىگە قاراپ ئايرىش مۇمكىن. چۈنكى قىزىتما-
مىنىڭ ئۆزگىرىش ۋە ئالاھىدىلىكلىرى - ماددىنىڭ ئاز-
كۆپلىكى، قويۇق - سۇيۇقلۇقى، بىرىكىشنىڭ مۇستەھكەم
ياكى مۇستەھكەم ئەمەسلىكىگە باغلىق بولۇپ، چىكى مۇ-
قىم ئەمەس. بەزىدە غەيىپ دائىرە بەلغەمى دائىمىگە
ئارىلىشىپ كېتىدۇ. بۇ شەتەرلۈك غەيىپ خالىسە دىيىلىدۇ.
دۇ. ياكى غەيىپ لازىمە بەلغەمى دائىرەگە ئارىلىشىپ
كېتىدۇ ۋە ھاكازا. بەزىدە بەلغەم سەپرادىن زىيادە (غالىپ)
بولسا، بەزىدە ھەر ئىككىلا خىلىت باراۋەر بولىدۇ.
روشن بولغان خاسراق ئالامىتى شۇكى، قىزىتما بىر كۈن
ئۇزۇنراق بولسا، ئەتىسى قىزىتما ۋاقتى قىسقا ئەمما ھا-
زارەت ئۆستۈن ۋە بىئاراملىق كۆپ بولىدۇ. بەلغەم
غالىپ بولسا، قىزىتمىنىڭ نوۋىتى ئۇزۇنراق، جۇغۇلداش،
بەدەن تېرىسى قورۇلۇش، ئەسنەش بىلەن كېرىلىش ئاز-
راق بولىدۇ. تومۇر ھەركىتى تەرتىپسىز، قول - پۇتلىرى
سوغاق بولۇپ، تەسلىكتە ئىسىيدۇ، سۇيۇك ئاق كېلىدۇ.
دۇ. سەپرا غالىپ بولسا، قىزىتمىنىڭ تەكرارلىنىش
ۋاقتى قىسقا، تەشلىق زىيادە بولىدۇ. تىترەش ۋە

توڭۇش كوپ بولۇپ، ئاسانلا ئىسىپ كېتىدۇ. سۇيىدۇك رەڭلىك كېلىدۇ. ئەگەر سەپرا بىلەن بەلغەم تەڭ بولسا، ئالامەتلەرمۇ ئوخشاش بولۇشى مۇمكىن.

داۋاسى: سەپرا ماددىسىغا قارىتا سوغاقلق ۋە ھوللۇك تەدبىرلىرى قوللىنىلىدۇ. ئەگەر قەۋزىيەت بولسا سۈرگە بېرىش، ماددا پىشقان بولسا تازىلاش لازىم. ئەمما ماددا تومۇر ئىچىدە بولسا قاتتىق سوغاقلق قەلىشقا بولمايدۇ. بەلكى ماددىنى پىشۇرۇپ چارىلىرىنى قىلىش كېرەك. قىزىتما ئەھۋالغا قاراپ ئۇنى يەسەيتىش چارىلىرىنى قىلىش كېرەك. بولۇپمۇ كېزىكتە شۇنداق قىلىش زورۇر. دەسلەپكى چاغلاردا مونچىغا چۈشۈرۈشكە بولمايدۇ. ئەينۇلىدىن 30 دانە، تەمىرى ھىندىدىن 1 سەر ئېلىپ، قايناقسۇغا چىلاپ، تەمىنى چىقىرىپ ئىسپۇغۇل لۇئابى ۋە ئارپا سۈيى بىلەن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ۋە لىمون شەرىۋىتى بىلەن سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى قوشۇپ بېرىلىدۇ. يۈرەكنىڭ قىزىقلىغىنى پەسەيتىش ئۈچۈن ئاق سەندەلنىڭ سىركە قوشۇپ چۈچە-مەل قىلىنغان شەرىۋىتى بېرىش لازىم. لاتىندەك بىر نەرسىنى سەندەل گۈلابى ۋە ئازراق كاپۇر قوشۇلغان سۇ بىلەن نەمەپ كۈكرەككە قويۇش لازىم. ئەگەر ھارارەت بەك زىيادە بولسا قۇرسى كاپۇر (76 - نۇسخە) بېرىش كېرەك. تەرەتنى يۇمشىتىش ئۈچۈن تەمىرى ھىندىنىڭ تەمى چىقىرىلغان سۇغا سىرخىشت قوشۇپ بېرىش كېرەك. ياكى

خىيارى شەنبەنىڭ تەمى چىقىرىلغان سۇغا يېمىش خۇسۇسىيەتلىرى قوشۇپ بېرىلسە بولىدۇ. ئەمما قاتتىق سۈرگە بېرىشتىن ساقلىنىش كېرەك غىزا تەھەتتىن مىزاج كەينى پىياتىغا مۇۋاپىق بولغان سوغاقلق غىزالارنى بېرىش مۇمكىن. ئەمما كېسەل كىشىنىڭ تەبىئىيەتلىك تەبىئىيەت مۇھىم. قىزىتىملاردا سۈرگە ئۈچۈن تەرەنچىۋىل بېرىشكە بولمايدۇ. چۈنكى تەرەنچىۋىل ھازىر تەسىرى بىلەن ئۆزى گىرىپ سەپراۋى كەينى پىياتىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن تەمىرى ھەندى، ۋە ئەينۇلا سۇلىرىنى قويۇپ ياكى ئۇنىڭ ئورنىغا سىرخىت بېرىلىدۇ. ئومۇملاشتۇرۇپ ئېيتقاندا، قىزىتىملارنى ئاۋلاشتا مەندى ياكى ماددىسىزلىقى، مۇرەككەپ ياكى ئادىللىقنى تەزەركەشلىپ تەدبىر قوللىنىش كېرەك.

سەپرادىن بولغان كېزىك (تەبىئىي مۇھرىقە سەپراۋى) ھەددىدىن كۆپ تەرلەپ كېتىش، ئېغىر دەرىجىدە بۇرۇن قاناش، ئۇيۇقا بېسىش، نەپەس قىيىنلىشىش، تولا چۈشكۈرۈش ۋە ئايلىنىپ كېتىشتەك ئەھۋاللار بىلەن مۇرەككەپلىشىدۇ. بۇنىڭغا ئۆز ۋاقتىدا چارە قىلىش كېرەك. ئەمما بوھران ۋاقىتلىرىدا بولغان تەرلەش ۋە بۇرۇن قاناشلار ئېتىدالدا بولسا، كېسەللىك ئالامەتلىرى يېنىكلىشىدۇ. بۇنى يۇقۇرقلارغا ئارىلاشتۇرۇپ قويماسلىق كېرەك. مۇرەككەپلىشىشلەرگە ئاغرىقنىڭ مىزاجى ۋە كەينى پىياتىغا قاراپ چارە قىلىش لازىم.

(1) كۆپ تەرلەپ كەتكەندە كېسەل ماغدېرىسىزلىق-
نىدۇ. بۇ چاغدا ئۇستىدىكى كىيىملىرىنى يەڭگىلەشتۈرۈپ
رۇش ۋە ئوي ھاۋاسىنى تەڭشەش كېرەك. ئەمما بە-
دەندىكى تەرلەر سۇرتۇپ تازىلانمايدۇ. ئوزى قۇرۇپ
كېتىشىگە يول قويۇلىدۇ. ئەگەر بۇنىڭ بىلەن ھەل بول-
مىسا سەمغى ئەرەبىنى ئىسپۇغۇل ۋە بىيە لۇئابلىرىغا
قوشۇپ بەدەنگە سۇرتىلىدۇ.

(2) بۇرۇن بەك قاناپ كەتسە، باش ۋە پىشانىگە
مۇز قويۇلىدۇ. پۇت، قول، ئەمچەكلەر تېگىلىدۇ ۋە بۇ-
رۇن قاناش كېسىلىدە سوزلەنگەن چارىلار قىلىنىدۇ.

(3) ئۇيىقا بېسىش، دائىم ئۇخلاش ئەھۋاللىرى
ئادەتتىن تاشقىرى بولسا، ھەر خىل چارىلار بىلەن يەنى
ئۇلۇك سوزلەش، شەپە قىلىش، قول - پۇتلىرىنى چىڭ
تېگىش ئارقىلىق ئۇخلاتمايلىق مۇمكىن.

(4) نەپەس قىيىنلىشىش، دەم سىقىش ئەھۋاللىرى
بولغاندا، كۆكرەككە بىنەپشە ۋە موم يېغى سۈركىلىدۇ
ياكى بىنەپشە، ئاق لەيلى، زاراڭزا مېغىزلىرىنى سوقۇپ
موم يېغى بىلەن تارىلاشتۇرۇپ كۆكرەككە چېپىلىدۇ.

(5) چۈشكۈرۈك تولا كېلىپ زادى ئارام بەرمىسە
ئاغرىقنىڭ كوز، پىشانە، بۇرۇنلىرىنى ئۇۋۇلاش كېرەك.
كىكرىك پەيدا قىلىدىغان نەرسىلەرنى بېرىپ كىكىرتىش،
بىنەپشە يېغىنى بىر ئاز قىزىتىپ قۇلاق ئىچىگە بىر تامچە
تامغۇزۇش ياكى گەدەنگە ئىسسىق ئوتكۈزۈش لازىم.

6) ھۇشىدىن كەتكەندە سەدەل، كاپۇرلارنى بۇرۇش رۇتۇش بىلەن ئايلىنىپ كېتىش كېسەللىكىدە سوزۇلۇپ كەن چارىلار قىلىنىدۇ. ئىسكەنجىۋىلىنى قايناقسۇغا تەڭشەپ كېسەللىك بۇرنىنى بىردەم تۇتۇپ تۇرۇپ كېلىگە قۇيۇلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئاغرىق ھۇشقا كېلىپلا قالماستىن، بەلكى مەئدە ئېغىزىغا توپىلىشۋالغان ماددا ئىسكەنجىۋىلىنىڭ ياردىمى بىلەن تۈۋەنگە چۈشۈپ تەرەت بىلەن چىقىپ كېتىشى مۇمكىن.

مۇرەككەپ تەپلىرىدە قۇرسى گۈل II-II (162 - 163 - نۇسخىلەر) نىڭ ئالاھىدە نەتىجىسى كورۇلىدۇ.

بەلغەمدىن بولغان قىزىتما (تەبىي بەلغەمى)

بەلغەمدىن بولىدىغان قىزىتمىنىڭ ماددىسى تومۇر ئىچىدە ياكى سىرتىدا يەنى كاۋاك ئەزالاردىن ئۆپكە، ئۆچمە، مەئىدىلەردە بولىدۇ. ماددا ئۇقۇلەتلىگەندە ئىز باسىدىغان قىزىتما (تەبىي ئائىمە)، ئايلىنىپ تۇرىدىغان قىزىتما (تەبىي دائىمە)، دائىمى قىزىتما (تەبىي مەۋازىيە) لەر پەيدا بولىدۇ. يەنى قىزىتما ئوۋىتى بىر كېچە كۈندۈز بولۇپ، قىزىتما ئاياغلاشماي تۇرۇپ ئىككىنچى دەۋرى باشلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا تۈۋەندىكى ئالاھىدە-لەرمۇ كورۇلىدۇ:

(1) سۇيۇكنىڭ رەڭگى كېسەللىكنىڭ دەسلەپكى چاغلىرىدا ئاق سۇزۇك بولۇپ، ئاخىرقى دەۋرلىرىدە قىزىل ۋە قوبۇققا ئايلىنىدۇ.

(2) تومۇر ھەركىتى سۇس، كىچىك ۋە مۇختەلپ بولۇپ، كېيىن بىر تۇتاش تومۇرغا ئايلىنىدۇ.

(3) تەشئالىق بولمايدۇ. ئەگەر تۈزلۈك بەلغەمدىن بولسا ياكى سەپرا ئارىلىشىپ قالسا، تەشئالىق پەيدا بولىدۇ. لېكىن سەپرادىن بولغان قىزىتمىدىكىدەك بولمايدۇ.

(4) قىزىتما ئالدىدا كۆڭۈل ئاينىدۇ ۋە ھو تۇتىدۇ، ئىشتەي تۇتىلىدۇ. بۇ مەئدە ئاجىزلىقى پەيدا بولغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ.

(5) بەدەن رەڭگى كۆككە (قەلەي رەڭگىگە) مايىل بولۇپ، يۈز، قاپاقلىرى سۇلاشقان ۋە كۆپۈپ قالغاندەك كۆرۈنۈشكە كېلىدۇ. بەدەنمۇ بوشاشقان، كۆكرەك ۋە بەقىنىلاردا سىلچىقىسمان ئاغرىشلار بولىدۇ.

(6) سول تەرەپ قوساقنىڭ يۇقۇرقى قىسمىدا ئېغىرلىق سېزىلىدۇ، تال چوڭىيىدۇ.

(7) ئېغىز ئىچى نەم بولۇپ، تەمسىز (ئاجچىق ئەمەس) بولۇپ قالىدۇ.

(8) قەي قىلغاندا ياكى ئىچى سۈرگەندە بەلغەم بىللە چىقىدۇ. ئادەتتە تەرتىي يۇمشاق بولىدۇ.

(9) تەر چىقىش كەم بولۇپ، تەرلىگەندە ھەممە ئىزا تەكشى تەرلىمەيدۇ. يەنى باشتىن - ئاياققىچە تەر چىقماستىن باش تەرلىگەندە ئاياق تەرەپ تەرلىمەيدۇ، ئاياق تەرلىگەندە باش تەرەپ تەرلىمەيدۇ. پۇت - قولايسىتىق سىقىرايدۇ (بوھران بولغاندا تەر كۆپ چىقىدۇ).

(10) قىزىتىش سەپرادىن بولغان قىزىتىمىدەك ئېغىر ئۆتمەيدۇ، ئەمما ياخشى داۋالانمىسا قىزىتما ئايلاپ سوزۇلۇپ كېتىشى مۇمكىن.

(11) قىزىتما باشلىنىش ئالدىدىكى توغۇش، تىترەش، ئەسنەش ۋە كېرىلىشلەر ماددىنىڭ تۈرىگە قاراپ ھەر خىل بولىشى مۇمكىن. بىرىنى بەزىلىرىدە توغۇش بىلەن تىترەش ناھايىتى قاتتىق بولىدۇ. مۇنداق قىزىتما بەزىگەك (تەپى لەرزە) دەپ ئاتىلىدۇ. بەزىدە تىترەش ۋە توغۇش ئازراق بولىدۇ.

(12) ئادەتتىكى چاغلاردا كېسەل كىشى ئوزىدە قىزىتما بارلىغىنى سەزمەيدۇ. تىۋىپ كېسەلنىڭ بەدىنىگە قولىنى قويۇپ تۇرغاندىمۇ قىزىقلىق سەزمەيدۇ. ئەمما ئۇزۇنراق تۇتۇپ تۇرغاندا ھارارەت بارلىغىنى ۋە قىزىتما مىنىڭ "تېكى - تېگىدىن" چىقىۋاتقانلىغىنى سېزىدۇ.

داۋاسى: بىر ھەپتىگىچە ھەسەل بىلەن تەييارلانغان ئىسكەنجىۋىل ۋە ھەسەل سۈيىگە زۇپا قاينىتىلغان سۇ قوشۇپ بېرىلىدۇ. بىر ھەپتىدىن كېيىن ئىسكەنجىۋىلگە كۆپ مىقداردا ئىلمان سۇ قوشۇپ ئىچكۈزۈپ قۇستۇرىلىدۇ. ئەگەر دەل قىزىتما باشلىنىش (بەزىگەك تۇتۇش) ئالدىدا قەي قىلدۇرۇلسا، مەنپەئەتى بەك ياخشى. خاس ئىسكەنجىۋىل بىلەن ئوبدان قۇسسما، تۇرۇپ ياكى ئۇرۇغنى قاينىتىپ ئىچكۈزىلىدۇ. ئارىلاپ - ئارداپلاپ رۇمبىدىياننى سوقۇپ كۆلگەن بىلەن بېرىلىدۇ. بەد-

زىدە بۇلىڭغا مۇۋاپىق مىقداردا زىرە، پىننە ۋە مەستىكى
 قوشۇلىدۇ. قەۋزىيەت بولسا، داۋائىل تۇرىۇت (164 -
 نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئۇنى ھەر كۈنى ئاخشامدا بىر مەس-
 قالدىن بېرىلسە بولىدۇ. ئەگەر كوپرەك بېرىش لازىم
 بولسا، 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ ۋە ئەتىسى سەھەردە 5
 مىسقال گۈلچەن يىگۈزۈپ ئاشتىدىن كېيىن بىر سە-
 ھەسل بىلەن تەييارلىغان ئىكەنجىۋىل بېرىلىدۇ. مىڭ
 زەئىپلىك ئالامەتلىرى مەسىلەن، باش ئاغرىش، باش
 قېپىش قاتارلىقلار بولسا ئىكەنجىۋىل بېرىشكە بولمايدۇ.
 بەلكى گۈلچەننى يالغۇز ياكى بېدىيان ئەرەقىگە
 قوشۇپ بېرىش كېرەك. بەلغەم سۈرگىسى بېرىپ تازىدۇ.
 لانغاندىن كېيىن، قۇرسى گۈل ۋە قۇرسى غاپەس بېرىدۇ.
 ئەگەر ئېھتىياج بولسا، سۈيدۈكنى ياخشىلاش ئۈ-
 چۈن مائىل ئۇسۇل بېرىش كېرەك. ئاندىن كېيىن بىر-
 دىيان يىلتىزى، چىڭسەي يىلتىزى، ئىزخىر 5 مىسقال-
 دىن، پىرسياۋشان 4 مىسقال، مەستىكى، چىڭسەي ئۇرۇغى
 2 مىسقالدىن ئېلىنىپ، ئۇلارنى 20 سەر سۇ بىلەن
 قاينىتىپ، يېرىمى قالغاندا سۈزۈپ بىر سەر گۈلچەن
 بىلەن ئىچكۈزىلىدۇ. ماددا سۈرگىلىرىدىن كېيىن بەزى
 قۇۋۋەتلىك دورىلار يەنى تەرياقى فارۇق ياكى مەشدرتۇس
 (25 - نۇسخە) دىن بىرى بېرىلسە بولىدۇ. قارىمۇچ،
 قاقىلە ئۇرۇغى ۋە ناۋاتنىڭ ھەربىرىنى 3 مىسقالدىن
 ئېلىپ سوقۇپ يېمىشكە بېرىلسە بەزگەك (تەپى لەرزە)

نى داۋالاشتا زور ئۇنۇم بەرگەنلىكى توغرىسىدا خاتىرىلەر بار. غىزاسى ئۇچۇن ئوقۇت خۇشپۇراق دورىلار بىلەن پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ. ئاقلانغان ماش قايناتمىسىغا زىرە، جۈسەي ۋە بىرئاز سېرىق چىچەك سېلىپ بېرىدۇ. ئۇمۇمەن غىزاسىغا بەلغەمنى كەسكۈچى لەرسىلەر مەسىلەن، سىركە، دارچىن قاتارلىقلارنى قوشۇپ بېرىش لازىم. بەلغەمنى زىيادە قىلغۇچى سۇت ۋە بېلىق گۆشەدىن پەرھىز قىلىنىدۇ.

سەۋدادىن بولغان قىزىتما (تەبىي سەۋداۋى)

سەۋدادىن بولىدىغان قىزىتما خۇددى باشقا قىزىتما-سىلارغا ئوخشاش تومۇر ئىچىدە ۋە تومۇر سىرتىدا ئۇفۇ-تەتلەنگەن قىزىتما دەپ بولىنىدۇ. چۈنكى سەۋدا تومۇر ئىچىدە ئۇفۇنەتلەنگەندە (مېكروپ قوشۇلغاندا) قىزىتما يەڭگىل باشلىنىپ، ھەر 4 كۈندە بىر قىزىتما پەيدا بولىدۇ. بۇ توت كۈنلۈك قىزىتما (تەبىي رۇبىي) دەپ ئاتىلىدۇ. ئەگەر تومۇر سىرتىدا ئۇفۇنەتلەنسە قىزىتما قاتتىق باشلىنىپ ئايلىنىپ تۇرىدىغان توت كۈنلۈك قىزىتما (تەبىي رۇبىي دائىرە) دەپ ئاتىلىدۇ. يۇنان تىلىدا تىرىتا-ۋۇس يەنى قايتىلانما قىزىتما ① دىگەن ئاتالغۇ بىلەن ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: كىتاپنىڭ بىرىنچى قىسمىدا سۆزلەپ ئۆتۈلگەندەك غەيرى تەبىئى سەۋدانىڭ پەيدا بولىشىغا ① قايتىلانما قىزىتما ئادەتتە "ئورە كىزىك" دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

خىلىتلارنىڭ كويۇشى سەۋەپ بولىدۇ. دىمەك غەيرى تەبىئىي سەۋاددىن بولغان كېسەللەردە، جۈملىدىن سەۋاددىن بولمىغان قىزىتىملاردا ئەسلى كويگەن خىلىتنىڭ ئالامەتلىرىمۇ بىللە كېلىدۇ. مەسىلەن:

(1) سەپىرا كويۇشتىن پەيدا بولغان سەۋداۋى قىزىتىملاردا ھارارەت ئۇستۇن، تومۇر ھەركىتى تېز، قاتتىق ۋە بىر تۇتاش، تەشئالىق كۆپ بولۇپ، بەزى كىشىلەردە كوڭۇل ئاينىشىمۇ كۆرىلىدۇ.

(2) قاننىڭ كويۇشىدىن بولغىنىدا — بەدەن كۈندىن-كۈنگە ئورۇقلايدۇ، قارامتۇل رەڭگە كىرىدۇ. سۇيىدۇك قىزىل، ئېغىز ئىچى تاتلىق بولىدۇ.

(3) بەلغەم كويگەندىن كېيىن بولسا — سۇيىدۇك ئاق ۋە قويۇق، قىزىتما ئېتىدالدا، تومۇر ھەركىتى ئاستا بولىدۇ، ئۇيىقسىرايدۇ.

(4) سەۋدا كويۇشتىن بولسا — جويۇلۇش، قۇرۇقۇش قاتارلىق ئەھۋاللار بىلەن بىللە ھارارەت يۈز بېرىدۇ ۋە بەدەن قارامتۇل ياكى كۆك رەڭگە كىرىپ قالىدۇ.

سەۋداۋى قىزىتىملارنىڭ تۆت كۈنىدە قايتىلىنىش دائىرىسىدىن (تەبىي رۇبىئى دائىرە)دىن چىقىپ كەتكەنلىرى بەش كۈنلۈك قىزىتما (تەبىي خەمسە)، 7 كۈنلۈك قىزىتما (تەبىي سەبئە)، 9 كۈنلۈك قىزىتما (تەبىي تۈسسە) ۋە ھاكازا دەپ ئايرىلىدۇ. يەنى قىزىتىمنىڭ پەيدا بولۇش كۈن ئارىلىقلىرىغا ئاساسلىنىپ ئاتىلىدۇ.

داۋاسى: سەۋەبچى خىلىتىلەرگە ئاساسەن داۋالاش

ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئالدى بىلەن ماددا پىشۇرۇلىدۇ، ئاندىن:

(1) قاننىڭ كويۇشىدىن بولغان سەۋداۋى قىزىت-

مىلاردا ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەپتىمۇن

(20-نۇسخە) ۋە مائىل جىيىن بېرىلىدۇ. ياكى سەۋدانى

تازىلىغۇچى ئالچە ئىسسىق بولمىغان دورىلار مەسلەن،

بىنەپشە، شاتەرە، سېرىق ھېلىلە، خىيارى شەنبەر ۋە

تەرەنجىۋىلەر مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىنىپ، قائىدە بويىچە

قاينىتىپ بېرىلسە بولىدۇ. ھارارەت زىيادە بولسا، ئىس-

كەنجىۋىل بىلەن كاسىن سۈيى بېرىش كېرەك. ئۇزاق

بولغان كېسەللەردە قىزىتما بولغان كۈنلەردە 5 مىسقال

گۈلچەن ئىسكەنجىۋىل بىلەن بىللە بېرىلىدۇ. كېسەل

باشلىنىپ 20 كۈن بولغاندىن كېيىن سۈرگە ئۈچۈن

مەتبۇخى ھېلىلە، مەتبۇخى شاتەرە (38-نۇسخە) بېرىش

مۈمكىن. غىزاسىغا قۇش گۆشى شورپىسىغا ئوقۇت بېيلىپ

ماش گۇرۇچ قىلىپ بېرىلىدۇ.

(2) بەلغەم ۋە سەۋدا كويۇشتىن بولغان قىزىتىمدا

ھەر ئەتىگەندە ھەسەل بىلەن تەييارلىغان گۈلچەندىن

بىر سەر، بېدىيان سۈيى $1\frac{1}{2}$ سەر، چىڭگەي ئۇرۇغى

سۈيىدىن بىر سەر ئېلىپ ئۇلارنى قوشۇپ بىر قاينىتىپلا

ئىچىشكە بېرىلىدۇ. قىزىتما تۇتۇش نوۋىتى كەلگەن كۈنى

ھارارەت باشلانغاندا نېرىق چىچەك ۋە لوبو ئۇرۇغىنى

سوقۇپ، ئىسكەنجىۋىل بىلەن بىللە بېرىپ قۇستۇرۇش كېرەك. قۇسۇپ بولغاندىن كېيىن، مەئىدىنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن گۈل قەن بېرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن ياز پەسلى بولسا ئىسكەنجىۋىل بۇزۇرى (101 - نۇسخە)، قىش كۈنى - لىرىدە مەجۇنى فىلاپى (144 - نۇسخە)، مەشدىرتۇس (25 - نۇسخە) بېرىپ، ماددا پىشقاندىن كېيىن، كۈچلۈك سۈرگىلىرىدىن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە)، ھەببى ئەپتىمۇن (14 - نۇسخە) ياكى ئەپتىمۇن سالغان ئىسكەندە - جىۋىللىرىدىن بىرى بېرىلىدۇ. بۇ خىلدىكى قىزىتىملاردا تال ۋە جىگەرنىڭ قېتىپ قېلىشى ئۇچرايدۇ. بۇنىڭغا دىققەت قىلىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن قۇرسى زىرشك (شەرۋىتى زىرشك (89 - نۇسخە) بولسىمۇ بولىدۇ). قۇرسى غاپەس (165 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

3) سەپرا كويۇشتىن بولغان قىزىتما — بۇ قىسمىدا كورلىدىغان چارىلەر ھول - سوغا قلىقتىن ئىبارەت بولۇشى لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن ئالدى بىلەن كاسىن ئۇرۇقى، تۈز ۋە ئەگرى خاڭكا ئۇرۇقلىرىنىڭ شىرىسىنى چىقىرىپ ئىسكەنجىۋىل ياكى ئەينۇلا ۋە تەمرى ھىندى سۇلىرى بىلەن بېرىلىدۇ. ئارپا سۈيى، چىلان شەرۋىتى ۋە سېمىز ئوت شىرىسىنى قوشۇپ بەرسىمۇ بولىدۇ. ئەگەر سۈرگە بېرىشكە ھاجەت بولسا بىنەپشە، ئەينۇلا، سەرپىستان، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، كاسىن ئۇرۇغىنى ئېھتىياجغا لايىق مىقداردا ئېلىپ قايىنىتىپ سۈيىگە

خىيارى شەنبەر سېلىپ، ئېرىگەندىن كېيىن سۈرۈپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. يۇغۇرقى چارلىرىدىن كېيىن مەتبۇخى ھېلىلە (3.8 - نۇسخە) بېرىلۇ. غىزاسغا ماش گۇرۇچنى چۈچمەل قىلىپ بېرىش كېرەك. ئەگەر كېسەل بەزە ئىپ بولسا قۇش گۈشلىرىنىڭ شورپىسى ۋە گۈشى بېرىش مۇمكىن.

جۈدەتكۈچى قىزىتما (تەبى دىق)

ھارارىتى غەرىبەلىك پەي، تومۇر سوۋىكەلىرىگە ۋە باشقا-ۇرغۇچى ئىزا (ئەزايى رەئىسە)لارغا تەسىر قىلىشى بىلەن ئۇلاردىكى 3 خىل سۇيۇقلۇقنى زايا قىلىش نەتىجىسىدە كېلىپ چىققان قاتتىق ئۇرۇقلاش جۈدەتكۈچى قىزىتما دەپ ئاتىلىدۇ. تىبابەت ئىلىمىدە بەدەندە 3 خىل سۇيۇقلۇق مەۋجۇت دەپ ھىساپلىنىپ ئۇلارنىڭ بەدەندىكى ئەھمىيىتى تۆۋەندىكىچە ئىزاھلىنىدۇ. بىرىنچى سۇيۇقلۇق: بەدەندىكى ئۇشاق قان تو- مۇرلار ئارقىلىق پەي، ئەسەپ، سوۋىكەلىرىگە تارقىلىپ تۇرىدىغان سۇيۇقلۇق بولۇپ، بەدەندە ئوزۇق ماددىسى يېتىشمىگەندە ئۇنىڭ ئورنىغا سەرپ بولۇپ ماددا ئالما- شىش (مايە تەھەلللىل)نى ئورۇندايدۇ.

ئىككىنچى سۇيۇقلۇق - بەدەندىكى گۈش ۋە تېرىگە

① دىق: دىققەت دىگەن سۆزدىن ئېلىنغان بولۇپ، سىزىپ كەتكەن، نېپىزلىشىپ كەتكەن ۋە قاتتىق ئۇرۇقلاپ كەتكەن دىگەن مەنانى بېرىپ سىل - تۇپىركۇلۇزنى ئىپادىلايدۇ.

ئارىلاشقان، تېخى قاتمىغان بىر خىل سۇيۇقلۇق. ئۇ ئەزالارنىڭ نەملىكىنى ساقلايدۇ. كۈچلۈك ھارارەت تەسىرى بىلەن تارقاپ كېتىپ ئورنىغا يېڭىسى كېلىپ تۇرىدۇ. ئۈچىنچى سۇيۇقلۇق — پەي تارامۇش، سوغەكلەرگە ئارىلىشىپ كەتكەن سۇيۇقلۇق بولۇپ، مەزكۇر ئەزالارنىڭ تۇتۇپ تۇرۇش خىزمىتىنى ئورۇنلايدۇ.

بىرىنچى سۇيۇقلۇق بەدەندىكى ئاساسىي سۇيۇقلۇق بولۇپ، ئۇنىڭ ئارتۇقچە سەرپ بولۇپ كېتىشى باشقا سۇيۇقلۇقلارنىڭ سەرىپىياتىنى كۈچەيتىۋېتىدۇ. بۇ سەرپ بولۇش كۆپىنچە يۈرەك ئەتراپىدىن باشلىنىدۇ. بىرىنچى سۇيۇقلۇقنىڭ سەرپ بولۇشى جۈدە تېكۈچى قىزىتمىنىڭ باشلىنىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، باشقا قىزىتمىلاردىن پەرق قىلىش قىيىن. بىرىنچى سۇيۇقلۇق تۈگەپ ئىككىنچى سەرپ بولۇشقا باشلىغاندا، جۈدە تېكۈچى قىزىتما 2 - دەۋرگە كىرگەن بولۇپ، كېسەل ئورۇقلاشقا باشلايدۇ. ئىككىنچى تۈگەپ، ئۈچىنچىنىڭ سەرپ بولۇشقا باشلىشى جۈدە تېكۈچى قىزىتمىنىڭ 3 - دەۋرى يەنى ئەڭ يامان دەۋرى ھىساپلىنىدۇ. چۈنكى بۇ دەۋردە كېسەل بەك ئورۇقلاپ كېتىدۇ، تېرىلەر چۈشىدۇ (كېمەكلىشىدۇ)، ھەتتا چاچ، تۈكلەرمۇ چۈشۈپ كېتىدۇ. كېسەل "بىر تېرە - بىر سوغەك" دىن ئىبارەت بولۇپ، گۆش قالماي خۇددى ئۇلۇكتەك ھالغا كېلىپ قالىدۇ. داۋالاش قىيىن. سەۋەپلىرى: (1) ئوتەۋىشتىكى سەۋەپلەر (ئەسۋابى

سابقە) يەنى باشقا كېسەللەرنىڭ ئاقىۋىتى بولۇپ كېلىدۇ. مەسىلەن، كېزىك (تەبىئىي مۇھرىقە)، ئىسسىقلىق بولغان كۆكرەك پەردىسىنىڭ ياللۇغى، بىر كۈنلۈك قىزىتما، بەلغەمدىن بولغان قىزىتما ئاشقازان، بورەك، ئىپكە ۋە جىگەر قاتارلىق ئەزالارنىڭ ئىسسىقلىق بولغان ياللۇغ-لىرىنىڭ ئاسارىتى بولۇپ كېلىدۇ. دىمەك بۇ خىلدىكى ئاغرىقلارنى داۋالاشتا دىققەت قىلىنسا، جۈدە تېكۈچى قىزىتماغا ئايلىنىپ قالىدۇ. ئۇفۇنەتلىك قىزىت-مىلار بورەككە كۆپرەك تەسىر بەرگەنلىكى ئۈچۈن بۇ خىلدىكى قىزىتمىلار ئاسانلا جۈدە تېكۈچى قىزىتماغا ئايلىنىدۇ. كېسەل ئەھۋالىنىڭ ئېغىرلىقىغا ۋە ماغدۇرسىزلىقىغا قاراپ بەزى تىۋىپلار ئىسسىقلىق دورىلارنى (مەسىلەن، داۋائىلمۇشكى، مائۇل لەھمى) بېرىپ خاتا قىلىدۇ-دە، جۈدە تېكۈچى قىزىتما كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

(2) تاشقى سەۋەپلەر (ئەسبابىي بادىسە): غەم، قورقۇنچ، ئاچچىقلىنىش قاتارلىق نېرۋا پائالىيەتلىرى (ھەرىكەت نەفسانى) ياكى ئارتۇقچە چاپا چېكىش، ئاچ قېلىش (بولۇپمۇ قۇرۇق ئىسسىق مىزاجلىقلار ئاچ قېلىش) تىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: (1) تومۇر ھەرىكىتى قاتتىق، زەئىپ بىر تۇتاش بولىدۇ. قىزىتما بوش بولۇپ، سىرتتىن تۇتۇپ كۆرگەندە ئاسان بىلىنمەيدۇ. سۇيىدۇكنى ئىنچىكە-لىپ تەكشۈرۈپ كۆرگەندە ياغ تامچىلىرى بارلىقى بىلە-

نىدۇ. كېسەل ئورۇقلاشقا باشلىغاندىن كېيىن، ھارارەت كۆتىرىلىدۇ. تومۇر ھەركىتى توم ۋە كۈچلۈك بولۇشقا باشلايدۇ. بۇنداق چاغلاردا (ھارارەت ئۈستۈن بولغان چاغلاردا) بەزى كىشىلەر ئۈزۈقلىنىشنى چەكلەپ قويىدۇ. مۇنداق قىلىش خاتا. ئۇلار جۈدە تىكۈچى قىزىتىمدا باشقا قىزىتىملار دەك قۇۋۋەتلىك غىزالار (ئوزۇقلۇققا باي تاماق - لار)نى بەرگەندە قىزىتما كۈچىيىپ كېتىدۇ دەپ قارايدۇ. ئەمما جۈدە تىكۈچى قىزىتىمدا ئۇنداق بولمايدۇ.

(2) جۈدە تىكۈچى قىزىتما ئىككىنچى دەۋرگە بارغاندا كۆز ئالمىسى ئىچىگە كىرىپ كېتىدۇ. ۋە كۆزدە قۇرۇق چاپاقلار پەيدا بولىدۇ. بەدەندىكى سۈڭەكلەرنىڭ قىرغاق - لىرى روشەن چىقىپ قالىدۇ. بۇ ئەھۋال بولۇپمۇ بەل ساھەسىدە كۆپرەك كۆرىنىدۇ، سۈڭەكسىز بوشلۇق جايلار تېخىمۇ چوڭقۇرلىشىپ كېتىدۇ. پىشانە تېرىلىرى قورۇقلى - شىپ، قاپاقلرى ئېغىرلىشىپ كۆزنى ئاچالماي قالىدۇ. بويۇن ئىنچىكىلىشىپ، قاقشار ئۇچلۇق بولۇپ قالىدۇ.

(3) جۈدە تىكۈچى قىزىتما 3 - دەۋرگە كەلگەندە كېسەلنىڭ چېچى چۈشۈپ، تېرىلىرى كېپەكلىشىپ چۈ - شۇشكە باشلايدۇ. بەدەندە تېرە ۋە سۈڭەكتىن باشقا نەرسىنىڭ ئەسرى قالمايدۇ. بۇ ئۆلۈم ئالدىدىكى بەلگىدۇر. **داۋاسى:** جۈدە تىكۈچى قىزىتما ئىككىنچى ئېنقلان -

غاندىن كېيىن دەرھال داۋالاشنى باشلاش، داۋالاش كېسەل بەدنىنى ھۆللەشتۈرۈش ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىشى لازىم.

(1) ئاق سەندەل گۈلابى، قىزىلگۈل گۈلابى، يۇمىلاقسۇت سۇلىرى بىلەن ئەمەللىگەن لاتا كېسەلنىڭ كۆڭرىگىگە قويىلىدۇ. سېمىز ئوت يىرپۇرمىغى، ھەمشۇا سۈيى، گۈل يېغى ۋە بىنەپشە يېغىنى بىرلەشتۈرۈپ كۆكرەك ۋە غولغا قويىلىدۇ. ئەمما بۇلارنى ئىشلىتىشتە كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراش لازىم. ئەگەر كېسەلدە ئىترەش پەيدا بولسا ئەمدەلگەن لاتىنى بىر ئاز ئىستىپ قىيۇش؛ قاپاق مېغىزىنىڭ يېغى، بىنەپشە يېغىنى غول، كەندىك، ئالغان، تاپان، بۇرۇن، قۇلاق ۋە سوڭغا سۈركەش كېرەك.

(2) سۈت، قېتىق بىلەن داۋالاش جۈدە تىكۈچى قىزىتىمدا مۇھىم ئورۇن تۇتىدۇ. سۈت، قېتىق بېرىشتە تۈۋەندىكى بىر قانچە ئىشلارغا دىققەت قىلىش لازىم.

(1) جۈدە تىكۈچى قىزىتىمىدىن باشقا قىزىتىملار بولماسلىقى كېرەك.

(2) ئاغرىقنىڭ بەدىنىدە ئۇفۇنەتلەنگەن باشقا خىلىتلارنىڭ بولماسلىقى كېرەك.

(3) كېسەلدە سۈت ئىچكەندىن كېيىن ئىچى سۇ، رۇپ كېتىدىغان ياكى مەئىدە سۈت ئۇيۇپ قېلىپ، يىشلاق بولۇپ قۇسىدىغان ئەھۋاللىرى بولماسلىقى كېرەك. شۇنىڭدەك كېسەلگە سۈت بەرگەندىن كېيىن سۈتنى ئۇ-يۇتىدىغان دورا ۋە تاماقلارنى بەرمەسلىك كېرەك.

بېرىلىدىغان سۈت ئۈشكە ياكى ئىشەك سۈتىدىن بېرى بولسا بولىدۇ. ئىشەك سۈتى تەجرىبىدىن ئۆتكەن، سۈت بىلەن داۋالاشتىكى ئۇسۇل چارىلار ۋە سۈتنىڭ

مەقدارى توغرىسىدا ئۆپكە سىلىنى داۋالاشتا تەپسىلى
سۆزلەنگەن، شۇنىڭغا قارالسا بولىدۇ. ئەگەر سۇت بەرگەندە
بىرەر غەيرى ئەھۋاللار يۈز بەرسە، سۇت بېرىشنى توختە-
تىپ، تاۋۇز، تەرخەمەك ۋە سېمىز ئوت سۇلىرىنى ئىچ-
كۈزۈش ياكى قۇرسى كافۇر بېرىش كېرەك. ھەم بىنەپشە
شەرۋىتى بىلەن ئەينۇلا سۈيى بېرىپ تەرىتىنى يۇمشىتىش
ئارقىلىق سۈتنىڭ تەسىرىنى چىقىرىپ تاشلاش كېرەك.

قېتىق بەرگەندە ئەگەر ئۇفۇنەتلىنىش ئەھۋاللىرى
بولسا توۋەندىكى قۇرس بىلەن بىللە بەرسە بولىدۇ:

تاياشىر 4 مىسقال، قىزىلگۈل 6 مىسقال، تۈز،
ئەگرى تەرخەمەك ئۇرۇقلىرىنىڭ مېغىزى، قاياق مېغىزى،
سېمىز ئوت ئۇرۇغى 3 مىسقالدىن، گىلى ئەرمىنى، كەھرىبا،
ھەربىرى 2 مىسقالدىن، دورىلارنى يۇمشاق سىوقۇپ،
ئىسپۇغۇل لۇئابى بىلەن خېمىر قىلىپ، قۇرس ياساپ
سايدا قۇرۇتۇپ تەييارلاپ، بىر مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(3) جۈدە تىكۈچى قىزىتمىنىڭ باشقا مۇرەككەپ

دورلىرى:

(1) ھەر كۈنى سەھەردە قۇرسى كافورنى شەرۋىتى
خەشخاش (69 - 76 - نۇسخىلەر) ۋە تاتلىق ئانار
سۈيى بېرىلىدۇ.

(2) كۈن چىققاندىن كېيىن سەرتان (قىسقىچ
پاقا) كاشكاپىغا تاتلىق ئانار سۈيى قوشۇپ بېرىلىدۇ.
4 سائەت ئۆتكەندىن كېيىن چىلان شەرۋىتى ياكى خەش

ئاش شەرۋىتىگە 20 مىسقال قۇرۇق ئۈزۈم قوشۇپ بېرىلىدۇ.

(3) كەچتە ئېسىۋۇل لۇئابى ياكى چىلان، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، شېكەر، بادام يېغى قاتارلىقلار بىلەن جۈلەپ بېرىلىدۇ.

سەرتان كاشكاپنىڭ نۇسخىسى: دەريا قىسقۇچ پاقىسى (سەرتانى تەھرى) نىڭ چىشىنى ئېلىپ، موڭگۈز ۋە پۇتلىرىنى كېسىپ تاشلىغاندىن كېيىن، تۈز ۋە كۈل بىلەن بىر قانچە قېتىم چايقاپ، سېسىق پۇراقلىرىنى چىقىرىۋېتىپ، توغراپ ھول قاپاق سۈيى، ئارپا شىرىسى بىلەن پىشۇرۇپ، ئۈستىگە يالچىلان قاپاق مېغىزى بىلەن بادام مېغىزى سېلىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بۇلارنىڭ مىقدارى جەكەلەنمەيدۇ. كېسەلنىڭ خاھىشىغا قاراپ بەلگىلەن بولىدۇ. سەرتاننىڭ ئۈستىگە يېڭى سانجىغاندا ئاق سۈتتەك بىر نەرسە چىقسا ئۇ چىشى بولىدۇ.

(4) ئەگەر قەۋزىيەت بولماي تەرىتى يۇمشاق بولسا، يۇقۇرقىلاردىن تاشقىرى قۇرسى خەشخاش (168 - نۇسخە)، قۇرسى مەرۋايىت (167 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. قۇرسى مەرۋايىتنى ئەھۋالغا قاراپ بەزىدە شەرۋىتى خەشخاش، ئىشەك سۈتى بىلەن ياكى سۇيۇپى سەرتان (سىل كېسەل - لىكىگە قاراڭ) دىن ئۈچ مىسقال قوشۇپ تەييارلاپ بېرىلىدۇ. ئىچى سۇرۇپ كەتكەن ھاللاردا تۈۋەندىكى نۇسخە بېرىلىدۇ.

نۇسخە: گىلى ئىرمىنى 5 مىسقال، شاھ بەللۇت (قورۇلغان)، ھۇمماز ئۇرۇغى، قىزىلگۈل ھەربىرى 4 مىس-
قالدىن، تاباشىر، قەھرىۋا 3 مىسقالدىن، ئۇرۇغىدىن تازى-
لانغان زىرىق 6 مىسقال، دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئىسپوغول لۇتابى بىلەن قۇرس
تەييارلاپ، ھەر كۈنى ئاخشامدا بىر مىسقالنى ئالما سۈيى
بىلەن بېرىلىدۇ. بەزى نۇسخىلاردا يۇقۇرقىغا سۈمبۇل،
سەرتان بىر مىسقالدىن، سەمغى ئەرەبى 3 مىسقال قوشۇپ
تەييارلاش تەكلىپ قىلىنىدۇ.

(5) يەڭگىل (تېز ھەزىم بولىدىغان) تاماقلارغا
تۇخۇم سېرىغى قوشۇپ بېرىش كېرەك. تۇرۇنجى، زەنجبۇل،
شاپنۇل موراببالىرى بېرىش مۇمكىن. گۆش سۈيى
(مائۇل لەھمى) ھەم غىزا ھەم داۋا سۈپىتىدە بېرىلىدۇ.
گۆش سۈيى (مائۇللەھمى) تەييارلاش ئۇسۇلى:

ياش پاخلان گۆشىنى ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ
ئۇنىڭدىكى ياغلارنى ئېلىپ تاشلاپ خاس گۆش قالغاندا
يۇمشاق قىيما قىلىنىدۇ. قىيىمنى بىر پارچە ماتا ياكى
داكىدەك رەختىن ياسالغان خالتىغا ئېلىپ، پاكىز داستا
ئۈستىگە ئاز - ئازدىن ئىلمان سۇ قۇيۇپ مەجلىدۇ.
بۇنىڭدىن چىققان سۇ باشقا بىر قاچىغا يىغىلىدۇ. تاكى
گۆشنىڭ تەمى قالمىغىچە مەجلىش تەكرارلىنىدۇ. يىغىلغان
گۆش سۈيى كىچىك قازانغا قۇيۇلۇپ ئاستا ئوت بىلەن
قاينىلىدۇ ۋە قايناش ئالدىدا ئۈستىگە يىغىلغان كۆپۈك

ئېلىپ تاشلىنىدۇ. ئۇزاق قاينىتىپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى يوق. قازان بىر - ئىككى ئورلەپ چىقىپ يېتەرلىك. مۇشۇنىڭ بىلەن گۆش سۈيى تەييارلىنىدۇ. بۇنىڭغا قوشىدىغان دورىلار كېسەل ئەھۋالى، مىراجى ۋە بېرىدىغان كېسەلگە قاراپ ھەر خىل بولىدۇ. جۈدە تېگۈچى قىزىتما ئۈچۈن بېرىلگەندە نۇر، قۇرۇق يۇمىلاقسۇت، زىرە، چىشە قوشۇلىدۇ (بىزى كىتاپلاردا گۆش سۈيىنى كاۋاپتىن چىققان سۈيى يىغىۋېلىش ئارقىلىق تەييارلاش كۆرسىتىلىدۇ. ئەمەلىي تەجرىبىلەرگە قارىغاندا يۇقۇرىدىكى ئۇسۇل بىلەن تەييارلاش مۇۋاپىق).

3 - پەسىل: يۇقۇملۇق قىزىتمىلار (تەبىي ۋابائى)

كىشىلەر ئارىسىدا كەڭ تارقىلىپ كېتىدىغان قىزىتەمىلىق يۇقۇملۇق ئاغرىقلار، يۇقۇملۇق قىزىتمىلار دېگەن ئومۇمىي نام بىلەن ئاتىلىدۇ. بۇنىڭ دائىرىسىگە قىزىل، ياۋا چېچەك، ۋابا (خولېرا)، تائۇن (چۇما)، ئەسۈنلىك كېزىك (تەبىي ئەسپە) قاتارلىقلار كىرىدۇ. ئەمما كۆپچىلىك تىبابەت ئەسەرلىرىدە يۇقۇملۇق قىزىتما (تەبىي ۋابائى) دېگەندە تارقىلىشى، ئۆلۈم بېرىشى تېز ۋە دەھشەتلىك بولغان تائۇن (چۇما) كېسەلى كۆزدە تۇتىلىدۇ. يۇقۇملۇق قىزىتمىلارنى تارقىتىدىغان ۋاستىلار:

1) مەھەللە ۋە ئۆي ئىچىدە نەرسىلەر سېسىپ چىرىگەندە ۋە ئېرىق - كۆلچەكلەردىكى تۇرغۇن سۇلار

ھاۋا ئىسسىق سېسىق پۇراق، ئۇفۇنەت (سېسىق پۇراق) جەراسىم (مىكرۇپ) پەيدا قىلىدۇ. ھاۋا داۋاملىق قىزىش بىلەن بۇ ئۇفۇنەتلەر ھاۋاغا ئارىلىشىپ ئەتراپتىكى ھاۋانى بۇلغايدۇ. بۇ خىلدىكى ھاۋا نەپەسلىنىش ياكى باغقا ۋاستە (سۇ، يىمەك - ئىچمەك)لەر ئارقىلىق ئادەم بىلەن نىگە كىرگەندە بەدىنىدىكى خىلىتلەرنىمۇ ئۇفۇنەتلەندۈرىدۇ (خۇسۇسەن تېنى ئاجىز، خىلىت كۆپ كىشىلەرگە ئوخشايدۇ). بۇ خىلدىكى تارقىلىشچان قىزىتىلاردا يۈرەك - تىكى خىلىتلار ئاسان ۋە تېز ئۇفۇنەتلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن يۇقۇملۇق كېسەللەر تارقىلىپ ئادەملەر ئۈچۈن زور دەھشەت ۋە ئۆلۈم كەلتۈرىدۇ. كېسەللىكنىڭ ئەتراپقا تارقاپ كېتىشىدە ساق كىشىلەرنىڭ كېسەللەرگە يېقىن مۇناسىۋەتتە بولۇشى مۇھىم ئورۇننى ئىگەللەيدۇ.

2) يۇقۇملۇق قىزىتىلار ياز ۋە كۈز پەسىللىرىدە كۆپ تارقىلىدۇ. ياز كۈنلىرى ھاۋا بەك ئىسسىق، يامغۇر يېغىنلار كۆپ، ھاۋا بۇلۇتلۇق ۋە تۈتەك بولۇپ تۇرۇشى، شامال، بوراننىڭ كۆپ چىقىشى يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر پەيدا بولۇپ تارقىلىشنىڭ ئەپلىك شارائىتىدىن ئىبارەت.

3) ھەرخىل ھاشاراتلەر، مەسىلەن، پاشا، چىۋىن، بۇرگىلەر ۋە غاجلىغۇچى ھايۋانلار جۈملىدىن چاشقانلارنىڭ كۆپىيىپ قېلىشىمۇ بۇ خىلدىكى يۇقۇملۇق قىزىت - مېلارنىڭ تارقىلىشىدا چوڭ رول ئوينايدۇ. بولۇپمۇ تائۇن (چۇما) كېسەلىدە چاشقانلار كۆپىيىپ قالدىغانلىقى ۋە

جايلاردا سۇغۇر ۋە چاشقان ئولۇكلىرىنىڭ كۆپىيىپ قالدىغانلىقى توغرىلىق خاتىرىلەر بار. يۇقۇملۇق كېسەل-لەردىن تولغاچ (ھەيزە) توغرىسىدا ئۈچەي كېسەللىكلىرىدە، ئەسۋىلىك كېزىك (تەپى ئەسۋە) توغرىسىدا خىلىتلاردىن بولىدىغان تەپلەردە سۆزلەندى. تۈۋەندە چىچەك، قىزىل، تائۇن ①لارنىڭ ئالامەتلىرى ۋە داۋاسى سۆزلىنىدۇ.

تائۇن (چۇما) كېسەلى

ئالامەتلىرى: (1) كېسەللىنىشنىڭ دەسلەپلىك قاتتىق قىزىتما باشلىنىدۇ. قىزىتما كېچىلىرى بەكرەك بولىدۇ. (2) نەپەس ھەرىكىتى بۇزىلىدۇ. بەزىدە نەپەس قىيىنلىشىدۇ. بەزىدە كېسەل تىنىپ ئۆلگۈرتەلەيدۇ. بەزىدە زاھايىتى چوڭ (چوڭقۇر) نەپەس ئالىدۇ. ئېغىر ھاللاردا كېسەلنىڭ چىقارغان نەپەسى بەك سېسىق پۇرايدۇ. بۇ ئۆلۈم ئالدىدىكى ئالامەتلەردىن بولۇپ ھىساپلىنىدۇ. (3) تەرلەيدۇ، تەر سېسىق پۇراقلىق، يېپىشقاق چىقىدۇ.

(4) تومۇر ھەرىكىتى كىچىك ۋە بىر تۇتاش بولىدۇ. (5) سۈيدۈك قارامتۇل قىزىل رەڭدە بولۇپ، ئۇس-

① تىبابەتتە "تائۇن" دىگەندە چات، قۇلۇق ۋە قۇلاق ئارقىسىدىكى چوڭ بەزلەرنىڭ يامان سۈپەتلىك ياللۇغلىنىشلىرى چۈشىنىلىدۇ. چۇما كېسەلى "تائۇنى ۋابائى" دىيىلىپ بەز چۇما-سىنى ئۆقتۈرىدۇ. لېكىن ئوقۇشقا ئاسان بولۇش ئۈچۈن بۇ كىتاپتا چۇما كېسەلى "تائۇن" دەپلا ئالدىق - تەھرىر.

تىدىكى دۇغ قارا رەڭلىك كېلىدۇ. چوڭ تەرەت كۆزىڭلار،
بەترەڭ ۋە بەك سېقى بولۇپ، بەزىدە تەرەتتە قان
كېلىدۇ.

(6) تال چوڭىيدۇ. بەزىدە سۇلۇق ئىشاق
(ئىستىمقا) يۈز بېرىدۇ.

(7) كوڭۇل ئاينىش سەپرا (سېرىق) ئاچچىتىسۇ
قۇسىدۇ. تاماق يېيىشنى خالىمايدۇ. مەندە ۋە يۈرەك
ئەتراپلىرىدا ئاغرىش سېزىلىدۇ.

(8) تەشئالىق قاتتىق، ئېغىز ئىچى قۇرۇق بولۇپ
چىش تۈۋى ئېغىز ئىچى ئىششىيدۇ، قانايدۇ. ئۇيىقىسىزلىق،
چويلۇش ۋە ھۇشىدىن كېتىشلەر يۈز بېرىدۇ.

(9) بەدەنگە قىزىل ئەسۋىلەر چىقىپ قالىدۇ، يەنە
چىقىدۇ. كۆپ ھاللاردا قولىتۇق ۋە يىرىق بەزىلىرى ئىش-
شىيدۇ، ئۇ تېرىدىن خېلى كۆتىرىلىپ تۇرغان چوڭ
قارامتۇل كۆك ياكى قىزغۇش رەڭلىك بولىدەك ئىششىقتىن
ئىبارەت. ئۇ ناھايىتى ئاز ئېغىز ئالىدۇ.

(10) ئېغىر ھاللاردا قان قۇسىدۇ. كۆكرەكتە
سانچىقىسىمان ئاغرىش پەيدا بولۇپ، كۆكرەك پەردە
ياللۇغى ۋە ئۆپكە ياللۇغىنىڭ ئالامەتلىرى كۆرىلىدۇ،
يوتەل پەيدا بولىدۇ. بەلغەم بەزىدە كۆك، قارامتۇل كۆك
ياكى قان - يىرىك ئارىلاش كېلىدۇ.

(11) ئاخىرقى مەزگىلىدە مېڭە پەردە ياللۇغىنىڭ
ئالامەتلىرى يۈز بېرىپ پۇت - قوللار تارتىشىش، گەژگە

قېتىپ قېلىش بىلەن بەدەنلىرى سوۋۇپ ئولۇپ كېتىدۇ. يۇقۇرقى ئالامەتلەر تائۇن (جۇما) يۇقتۇرۇپ ئالغان كېسەللەرنىڭ ھەممىسىدە بىردەك مەۋجۇت بولۇشى ياكى بىر قالچىسىلا بولۇشى مۇمكىن. ھەتتا ھېچقانداق قىزىتما ئالامەتلىرى بولماستىن تۇرۇپ كېسەل بىردىنلا ئاجىزلىشىپ ئولۇپ كېتىشى مۇمكىن.

داۋاسى: تائۇن (تائۇن ۋابائى) پەيدا بولغاندىن كېيىن (ساقلار ئاغرىق بار جايدىن يىراق بولۇش، يېقىن كەلمەسلىك كېرەك)، ئوي ئىچىنى ئۇفۇنەتتىن تازىلاش ئۈچۈن خۇشپۇراق نەرسىلەر بىلەن ئىسرىق سېلىش ۋە سىركە گۈلاپ چېچىش؛ چاشقان ۋە بۇرگىلەرنى يوقىتىش لازىم.

كېسەل يۇقتۇرۇپ ئالغان كىشىگە سۈرگە بېرىشكە ۋە قان ئېلىشقا بولمايدۇ. ھەر كۈنى سەھەردە قۇرسى كاپۇر (76 - نۇسخە)نى بىيە، ئالما، غورا سۇلىرى ياكى لىمون قاتارلىق مەۋە سۇلىرى بىلەن بېرىلىدۇ. ئەگەر بۇلار بولمىسا سىركە بىلەن سوۋۇتۇلغان گۈلاپ بېرىلىدۇ. شۇنىڭغا دېققەت قىلىش لازىمكى، بۇ كېسەلدە ئوسسۇلۇقنى ئاز بېرىش ۋە كېسەلنى ئاچ قويۇش خاتا. قۇشلارنىڭ كۆشىگە ئەينىۋلا، سۇماقلارنى قوشۇپ پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ. كېسەل بار ئۆيگە كاپۇر، سەندەل ۋە گۈلاپلاردىن ئىبارەت پۇراقلىق ئېرىتمىلەرنى چېچىش ۋە خۇشپۇراق ئىسرىقلارنى كۆيدۈرۈش لازىم. ئەمما ئىسرىق كېسەلگە بەك يېقىن جايدا بولۇپ ئۇنىڭ نەپەس ئېلىشىغا دەخلى بەرمەسلىكى

كېرەك. كاپۇر، سەندەل ۋە گۇلاپنى شىندەك نەرسىگە ئېلىپ، كېسەلگە پات - پات پۇرۇتۇپ تۇرۇش، ئىپىز رەخلەرنى ئۇلاردا نەمدەپ كۆكرىگىگە يېپىش كېرەك. تارتىشىپ قېلىش ئەھۋاللىرى يۈز بەرگەندە كېسەلنى ئىسسىق يۈگەش لازىم. داۋالاشتىن ئاساسىي مەقسەت قىزىتمىنى چۈشۈرۈش ۋە يۈرەك، مىڭە قاتارلىق باشقۇر-غۇچى ئەزالارغا، قۇۋۋەت بېرىشتىن ئىبارەت. كاپۇر، سەندەل، گۇلاپلار ۋە باشقا خۇشپۇراقلىق نەرسىلەر بۇ مەقسەتكە ناھايىتى ئۇيغۇن كېلىدۇ. يەنە كاسىن، ئىت ئۈزۈمى سۈيى قاتارلىقلارنى ئىسكەنجىۋىل بىلەن بېرىلىدۇ. سۈت، قېتىق ۋە بېلىق گۆشى قاتارلىق يېمەكلەر بېرىل-مەيدۇ. بەزىلەر ھەر قانداق گۆش بېرىشنى توغرا كۆر-مەيدۇ. ئەگەر بېرىش لازىم كەلسە سىركە بىلەن پىشۇرۇپ بېرىش لازىم. كېسەلنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالى بىرئاز ياخ-شىلانغاندىن كېيىن تەرياقى فارۇق، مەشدىرتۇس (25-ئۇسخە) بېرىش مۇمكىن. بەزىلەر ھىڭ، سەبىرە، مۇرمەككى ۋە زەپەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ ھەسەلگە قوشۇپ يېسە مەنپەئەتنى ياخشى دەپ قارايدۇ.

قىزىل (ھوسبە)

قىزىل كېسىلى بالىلار خۇسۇسەن بوۋاقلاردا كۆپ ئۇچرايدىغان قىزىتمىلىق يۇقۇملۇق كېسەللەرنىڭ بىرى بولۇپ، يىلنىڭ ھەر قانداق پەسلىدە پەيدا بولىدۇ. بولۇپمۇ قىش ۋە ئەتىياز پەسلىلىرىدە كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن بۇرۇن قىچىشىپ كۆز

ۋە بۇرۇندىن تولا سۇ ئاقىدۇ. چۈشكۈرىدۇ، كۆز ئىچى قىزىيدۇ، باش ئاغرىپ پۈتۈن بەدەن ئېغىرلىشىدۇ، ئۇيىقىدا چوچۇيدۇ، قىزىتما پەيدا بولىدۇ. كېسەل بەل ۋە غول ساھىلىرى ئاغرىشىدىن زارلىنىدۇ. تىنىچسىز ۋە بىئارام بولىدۇ. بالىلار بولسا تولا يىغلايدىغان بولۇپ قالىدۇ. يوتەل بولۇپ، سۇيۇق بەلغەم چىقىرىدۇ. بۇ ئەھۋاللار بىر قانچە كۈن داۋام قىلغاندىن كېيىن بەدەن تېرىسىگە قىزىل رەڭلىك ماش چوڭلىغىدا ئەسۋىلەر چىقىدۇ. سۇي دۈكى قىزىل بولۇپ، كۆز، كاناي، ئۆپكە ۋە بىرۋىچىلار زەرەرلىنىدۇ.

داۋاسى: كىچىك بالىلارنىڭ غولغا زۇلۇك قويە-

لىدۇ. بىر ياشقا توشمىغانلارغا زۇلۇك قويۇشقا بولمايدۇ. ئەمما ئەسۋە چىقماستىن تۇرۇپ قان ئېلىش ياكى قاننى سوۋۇتىدىغان دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. بەلكى بەدەن- نىڭ قىزىلىنى سىرتقا تەبىئىي ھالدا چىقىرىشقا ياردەم قىلىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن كېسەلنى ئىسسىق يۈگەش بىلەن ئوي ئىچىنى ئىسسىق تۇتۇش كېرەك ۋە چىلان شەرتى ئىچكۈزۈش لازىم. قىزىل چىقىپ بولغاندىن كېيىن، ئاق سەندەل، گۈلاپ، كاپۇرلارنى پۇرىتىش، رەخنى ئەمدەپ بەدىنىگە يېپىش چارىلىرى قىلىنىدۇ. ئارپا بېدىيان، چىگىسەي ئۇرۇغى، ئىت ئۇزۇمىگە قەن سېلىپ بېرىلىدۇ. كۆپ مىقداردا قايناقسۇ ئىچكۈزۈپ تۇرۇلىدۇ. ئەگەر قەۋ- زىيەت بولسا مۇۋاپىق يەڭگىل سۈرگىلەرنى بېرىش مۇمكىن.

ئەمما قىزىلدىن كېيىن ئىچ سۇرۇپ كېتىش كېسەل بالا ئۇچۇن چوڭ خەتەر تۇغدۇرۇشى مۇمكىن. مۇنداق چاغلاردا ھەببۇل ئاس، سەمغى ئەرەبى ۋە گىلى ئەرەبىلەر ياكى قۇرس تاباشىر (112 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئەگەر قان ئارىلاش ئىچ سۇرسە ئەنجىبار شەرۋىتى (72 - نۇسخە) بىلەن قۇرسى تاباشىر بېرىش كېرەك.

بەزىدە بۇرۇن قانداشلارمۇ ئۇچرايدۇ. ئاززاق قان چىقسا زىيانلىق ئەمەس، ئەگەر بەك قاناپ كەتسە بۇرۇن قانداش كېسەلىدە كورسىتىپ ئوتۇلگەن چارىلار قىلىنىدۇ. قىزىلنىڭ چىقىش مۇددىتى 4 كۈندىن يۇقۇرى بولىدۇ. قىزىلدىن كېيىن بۇرۇن، كاناي، ئوپكە، بوغۇملار - نىڭ زەرەرلىنىشى كۆپ ئۇچرايدۇ. بۇنىڭ ئۇچۇن قىزىل چىقىشى بىلەنلا بۇ ئىزالارنى ساقلاش ئۇچۇن توۋەندىكى چارىلارنى قىلىش لازىم.

(1) بىر ئاز كاپۇرنى ئېرىتىپ بۇرۇلغا تامغۇزۇش، بۇرۇننى ئىسسىق سۇ بىلەن پاكىزلاپ، پۇتۇپ قالما - لىغىغا دىققەت قىلىش كېرەك. ئارقىدىن ھەببۇل ئاس يېغى بىلەن گۈل يېغى تامغۇزۇش كېرەك.

(2) ئانار سۈيىنى ئاز - ئازدىن ئىچكۈزۈپ تۇرۇش لازىم. سىماق، ئاققانغان ماش، قىزىلگۈللەرنى گۈلاپتا قاينىتىپ غار - غار قىلغۇزۇش كېرەك.

(3) قىزىلدىن كېيىن ئوپكە زەرەرلىگەنلىك ئالا - مەتلىرى يۈتەل ئىغىرلىنىش، ھارارەت كۆتىرىلىشتىن ئىبارەت. بۇنىڭ ئۇچۇن مەسكە يېغى بىلەن ئانار شەر -

ۋىتى (4-لۇسخە)، ئىسپۇغۇل ۋە بىيە لۇئابىلىرى
ھەمدە تۆۋەندىكى لۇسخىدىكى دورا تەييارلاپ بېرىلىدۇ:

نۇسخە: قورۇلغان بىدام مېغىزى بىر مىسقال
قەن 3-4 مىسقال، ئىسپۇغۇل لۇئابى 2 مىسقال، سەمىي
تەرەبى، ئىشاستە، خاڭگا ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى
3 مىسقال. سوقۇشقا تېگىشلىك دورىلارنى سوقۇپ،
ئىسپۇغۇل لۇئابى ۋە ئازراق قىيام بىلەن يالايدىغان
دورا (لۇتۇق) تەييارلىنىدۇ. 1-2 مىسقالدىن كۈنىگە
2 قېتىم بېرىلىدۇ.

7) بوغۇملاردا ئاغرىش ۋە ئېچىش يۈز بەرگەندە
كاپۇر، سەندەل ۋە قىزىلگۈل قاتارلىقلارنى سوقۇپ سىركە
قوشۇپ بوغۇملىرىغا تېگىپ قويۇش لازىم. غىزاسىغى
ئارپا، ماش سۇلىرىغا ئازار، بىيە ۋە ئىسپۇغۇل لۇئابى،
لىرى ۋە قاپاق سېلىپ پىشۇرۇپ بېرىلىدۇ. ۋە ھول
سوغاق غىزا بېرىلىدۇ. گال ئاغرىغاندا ۋە بوتەل كۆپ
بولغاندا چۈچمەل نەرسىلەردىن ساقلىنىش كېرەك.

ياۋا چېچەك (جۇدرى)

ئالامەتلىرى: رەسمى چېچەك چىقىشتىن بۇرۇنقى
ئالامەتلىرى قىزىل بىلەن ئوخشاش. ئەمما قىزىتمىنىڭ
يۇقۇرى بولۇشى ۋە كېسەلنىڭ ھۆشىدىن كېتىشى كۆپ
ئۇچرايدۇ. ئەسۋىلەر قىزىلغا قارىغاندا چوڭراق ۋە
رەڭگى توقراق چىقىپ، ئۇلار ئىچىگە ماددا يىغىلىپ
ئۇقۇنەتلىنىپ يېرىڭلايدۇ ۋە سېرىق زەرداپ يىغىلىدۇ.

بۇ ھال تىبابەتتە يىرىڭلىق پۈۋەكچە "ئابلە" دەپ ئاتىلىدۇ. پۈۋەكچىدىكى يىرىڭ ۋە زەرداپلار پىشقاندا كېسەلنىڭ ئەھۋالى يەنىمۇ ئېغىرلىشىدۇ. ئۇلار قۇرۇپ قەقەشلىگەندە يېنىكىلىشىدۇ. قەقەش چۈشكەندىن كېيىن ساقايىماس تاتۇق ئىز (چوقۇر) قالىدۇ. چېچەك كۆكرەك ۋە يۈز قىسمىغا، بۇرۇن ھەتتا كۆز ئىچىگىمۇ چىقىدۇ. بۇ قارغۇلۇق ۋە بۇرۇن پۇتۇپ قېلىشلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. چېچەكنىڭ ئۇفۇنىتى باشقۇرغۇچى ئەزالاردىن بىرى ۋە يۈرەككە ئېغىر تەسىر بەرسە ئۆلۈم بىلەن ئاياغلىشىدۇ.

داۋاسى: ئومۇمى داۋاسى قىزىلغا ئوخشاش (قىزىل كېسىلىگە قارالسۇن) بۇرۇن، گال بولۇپمۇ كۆزنى ئاسراش چارىلىرىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. كۆزگە ئىسپاھان سۇرمىسىنى سىركە بىلەن ئېرتىپ تامغۇزۇش چېچەكنىڭ كۆزىنى خاراپ قىلىشىدىن ساقلايدۇ.

قىزىل ۋە چېچەك تارقالغان چاغلاردا ئاغرىقلارغا چىلان شەرتى، ئىسپۇغۇل، بىيە لۇئابلىرىنى بېرىپ تۇرۇش كېرەك ۋە كېسەل بالىلارغا يېقىن يولاتماسلىق كېرەك.

4- پەسىل: بوھران ① ھەققىدە ئومۇمى چۈشەنچە.

"بوھران" كېسەللىك جەريانىدىكى بىر باسقۇچلۇق ئەھۋالدىن ئىبارەت. تىبابەت ئىلىمىگە ئاساسەن،
① بوھران — كىرىس دىكەنلىك بولىدۇ.

كېسەللىك بىلەن بەدەن ئوتتۇرىسىدىكى كۆرۈنىشنىڭ
2 خىل نەتىجىسى بولىدۇ. يەنە بەدەن غالىپ كېلىپ،
كېسەللىك مەغلۇپ بولۇپ، ئاغرىق ساقىيىدۇ. ياكى
بەدەن مەغلۇپ بولۇپ، كېسەللىك غالىپ كېلىپ كېسەل
ئولىدۇ ياكى ئومۇرلۇك مېيىپ بولۇپ قالىدۇ، يابولمىسا
باشقا كېسەللىككە ئايلىنىپ قالىدۇ. شۇڭا بوھران
يۈز بېرىدىغان كۈنلەر، ئۇنىڭدا كۆرىلىدىغان ئالامەتلەر
ۋە مۇناسىۋەتلىك چارىلارنى بىلىش تىۋىپ ئۈچۈن
بەك مۇھىم. چۈنكى داۋالاشتا بۇ كۈنلەردە ماددىنى
قوزغىتىدىغان چارىلار مەنىنى قىلىنىدۇ.

بوھراننىڭ تۈرلىرى

1) بەدەن كېسەل ئۇستىدىن غەلبە قازىنىدۇ،
سەۋەبى ماددا پۇتۇنلەي بەدەندىن چىقىپ كېتىپ
كېسەل ساقىيىدۇ. ياخشى بوھران (بوھرانى مەھمۇدە)
دەپ ئاتىلىدۇ.

2) كېسەل غالىپ كېلىپ، بەدەن يېڭىلىدۇ، كې-
سەل ئولىدۇ. بۇ تەتۈر بوھران (بوھرانى رەددى)
دەپ ئېيتىلىدۇ.

ياخشى بوھران ئوز ئوۋىتىدە توۋەندىكىچە تار-
ماقلارغا بولىنىدۇ:

1. بەدەن غالىپ كېلىدۇ ئەمما ماددىلارنى

بىردىنلا سۇرۇپ چىقارماي ئاستا-ئاستا ۋە ئاز-ئازدىن چىقىرىپ تاشلايدۇ.

2. بەدەن باشتا غالىپ بولسىمۇ، روشەن بىلىدۇ-مەيدۇ. ماددىلارنى ئاز-ئازدىن چىقىرىپ، ئاخىرىدا بىرلا چىقىرىپ تاشلاپ كېسەللىكنى مەغلۇپ قىلىدۇ. بۇ ئىككى تۈرى تولۇقسىز بوھران (بوھرانى ئىناقسىز) دەپ ئاتىلىدۇ.

تەتۈر بوھرانمۇ توۋەندىكىچە خىلغا بولىنىدۇ.

1. كېسەللىك غالىپ بولسىمۇ، بوھران ياردىمى بىلەن بەدەننى بىراقلا ئاجىزلاشتۇرماي بەلكى تەدرىجى ھالدا ھالاك قىلىدۇ.

2. كېسەللىك غالىپلىق، ئالامەتلىرى روشەن بولمايدۇ.

كېسەللىك ئاخىرىدا بەدەننى بىرلا يېڭىپ ھالاك قىلىدۇ.

3. ماددىلارنىڭ بەدەندىكى ئەھۋالى مەلۇم بىر

مۇددەتكىچە باراۋەر بولۇپ كېلىپ (بەدەننىڭ كۈچلۈك

بولۇشى تۈپەيلىدىن)، كېيىنچە ماددا پىشالماي، باشقۇر-

غۇچى ئەزالارغا تەسىر بېرىپ كېسەللىك ئۇزۇنغا سوزىلىدۇ.

دىغان كېسەللىككە ئۆزگىرىدۇ.

4. كېسەل ئۇزۇنغا سوزۇلۇش ياكى باشقۇرغۇچى

ئەزالارنىڭ بىراقلا قايتۇرۇشى بىلەن ماددا باسقۇچى

ئەزالارغا توكلنىدۇ. بۇ كۈچكەن بوھران (بوھرانى

ئىنتىقالى) دەپ ئاتىلىدۇ.

كىتاپنىڭ بىرىنچى قىسمىدا سۆزلەنگەندەك ھەرقانداق

كېسەللىكنىڭ توۋەندىكىچە تۆت باسقۇچى بولىدۇ:

بىرىنچى كېسەلنىڭ باشلىنىش دەۋرى بولۇپ، بەزىلەر بۇ دەۋر كېسەللىكنىڭ 3- كۈنىگىچە ئۆتكەن دەۋرى دەپ قارايدۇ. بۇ دەۋرىدە بوھران يۈز بەرسە، چوقۇم ئۇ تەتۈر بوھران بولۇپ، ئاغرىق كىشىنى ھالاك قىلىدۇ. چۈنكى بۇ مەزگىلدە بەدەننىڭ كۈچى تۈپەيلىدە - دىن ئەمەس بەلكى كۈچلۈكلىگىدىن بوھران يۈز بېرىدۇ. ئىككىنچى كېسەللىك ئالامەتلىرى روشەنلەشكەن دەۋرى، ئۈچىنچى كېسەللىك ئالامەتلىرى ئېغىرلەشپ بىرخىلدا توختىغان دەۋرى. بۇ دەۋردىكى بوھرادىن ياخشى دىگىلىمۇ - يامان دىگىلىمۇ بولمايدۇ. تۆتىنچى كېسەللىك ئالامەتلىرى تۈۋەنلەشكە باشلىغان دەۋرى. بۇ دەۋردىكى بوھران ئەڭ ياخشى بوھراندۇر.

بوھران كۈنلىرى

قەدىمقى تىۋىپلەر ئۆزلىرىنىڭ ئۇزاق يىللىق كۈزىتىشلىرىگە ئاساسەن، قىزىتمىلىق كېسەللىرىدىكى بوھران كۈنلىرىنى تۆۋەندىكى 3 چوڭ تۈرگە ئايرىغان:

1. تولۇق بوھران كۈنلىرى كېسەللىكنىڭ 4، 7، 14، 20، 21، 24، 27، 31، 34، 37، 40 - كۈنلىرى.
- بوھران ئارىلىقىدىكى كۈنلەر - كېسەللىكنىڭ 3، 5، 9، 11، 13، 17 - نىچى كۈنلىرى. بۇ كۈنلەردە بوھران يۈز بېرىش مۇقىم ئەمەس.

2. تولۇقسىز بوھران (بوھرانى ئاقىس) بولىدىغان كۈنلەر. 6، 8، 10، 12، 15، 16، 18 - كۈنلىرى.

بوھران ھساپلانمايدىغان بوھران 22، 23، 25،
26، 28، 29، 30، 32، 33، 35، 36، 38، 39 -
كۈنلەردە يۈز بەرگەن بوھرانلار.

ئومۇمەن قىزىتىلىق كېسەللەردە بوھران تاق
كۈنلىرى بولىدىغانلىقى كۈزىتىلگەن. ئەمما كۈن ئارىلاي-
دىغان قىزىتىملاردا 11-14-كۈنلىرى بوھران بولۇشى
مۇمكىن. 8-كۈنلىرىگىچە بولغان بوھران قاتتىق
ئوتىدۇ.

بوھران ئالامەتلىرى

بوھران — بۇرۇن قاناش، قوسۇش، ئىچى سۇرۇش،
سۇيدۇك بەك كۆپ كېلىش، تەرلەش قاتارلىق ئالامەتلەر
بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. بۇرۇن قاناش، ئىچى سۇرۇش ۋە قىي
قىلىش تولۇق بوھران ھساپلىنىدۇ. تەرلەش ۋە سۇيدۇك
راۋان بولۇپ كېتىش بىلەن كەلگەن بوھران — تولۇق
بولمايدۇ. چۈنكى بۇنىڭدا ماددىنىڭ سۇيۇق قىسمى
چىقىپ، قاتتىق قىسىملىرى قېپقالىدۇ.

بەزى كېسەللىكلەرنىڭ ئالاھىدە بوھران شەكلى
بولدۇ. مەسىلەن، بەزىگە ۋە ئىككى كۈنلۈك قىزىتىم-
لاردا بوھران تەرلەش ۋە ئىچى سۇرۇشلەر بىلەن
ئىپادىلىنىدۇ. ئەسۋىلىك كېزىك بوھرانى بۇرۇن قاناش
بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.

مىگە پەردە ياللۇغىدا كۆپرەك تەرلەش ياكى
بۇرۇن قاناش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. تۆت كۈنلۈك قىزىتما

بوهرانى تەرلەش بىلەن، ئىچ سۇرۇش بىلەن
ئىپادىلىنىدۇ.

تەجرىبىلەرگە قارىغاندا بوهراننىڭ ياخشى
بۇرۇن قانداش، ئۇندىن قالسا ئىچ سۇرۇش، ئاندىن
قەي قىلىش، سۇيىدۇك راۋان بولۇش، ئەڭ ئاخىرقىسى
تەرلەش بىلەن ئىپادىلانغانلىرى ھىساپلىنىدۇ.

بوهران ئالدىدىكى ئالامەتلەر

بوهران ئالدىدىكى ئالامەتلەر يەنى بوهراندىن
خەۋەر بەرگۈچى ئالامەتلەر ماددىلارنىڭ چىقىپ كېتىشى
ئۇچۇن ھەركەت قىلىشىدىن ئىبارەت. بوهران كۈنلىرى
كېسەلنىڭ ئەسلىدىكى ئالامەتلىرىگە باش ئاغرىش، باش
قېمىش، ئىككى چېكىسى چىققىلىش، قۇلاق غۇڭغۇلداش،
قۇلاق ئېغىرلىشىش، قوساق غۇلدۇرلاش، كۆز خىرەلىشىش
قاتارلىق ئالامەتلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ.

يۇقۇرقى ئالامەتلىرى كېسەلدە كۆرۈلگەندە بەدەنگە
ياردەم بېرىش بىلەن ماددىنىڭ چىقىرىلىشىغا دىققەت
قىلىنىدۇ، مەسىلەن، بوهران تەر بىلەن بولىدىغانلىق
ئالامەتلىرى بولسا كېسەلنى دورا، ھور بىلەن ياكى
قېلىن نەرسىلەر بىلەن ئوراش ئارقىلىق تەرلىتىش
كېرەك. بوهراننىڭ بۇرۇن قانداش بىلەن ئوتىدىغانلىق
ئالامەتلىرى كۆرۈلگەندە باشنى ئىسسىق تۇتۇش، باشقا
ئىسسىق سۇ قۇيۇش لازىم. ئاغرىقنىڭ مىزاجى ۋە
ئەھۋالىغا قاراپ قۇستۇرۇش، سۈرگە ۋە سۇيىدۇك ھەي-

دىگۈچى دورىلارنى بېرىش لازىم. بوھراندا بۇرۇن
قازاش بىلەن ئىچى سۇرۇش ھەددىدىن ئارتۇق بولۇپ
كەتسە بۇنى توختىتىشقا توغرا كېلىدۇ.

بوغۇم، پىۋت-قوللارغا ئاغزىش پەيدا بولۇپ
قالسا ماددىنىڭ بۇ جايلارغا چۈشۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن،
بەدەننى تۇتۇپ ئۇۋىلاش، بوغۇملارنى تېگىش
قاتارلىق چارىلار كورىلىدۇ.

بوھران كۈنلىرىنى ھىساپلاشتا كېسەللىك چۈشتىن
كېيىن باشلانغان بولسا بىركۈن ھىساپلاشقا بولمايدۇ.
چۈشتىن بۇرۇنقىسى بىركۈن ھىساپلىنىدۇ. بوھران
كۈنلىرىدە كېسەلنى ھەركەت قىلدۇرماستىن، روھى
جەھەتتىن ئارام بېرىش لازىم.

۱۷ ماقالە. تاناسىل ئەزالار كېسەللىكلىرى

1- پەسىل: ئەرلەر تاناسىل ئەزا كېسەللىكلىرى

(جىنى ئاجىزلىق زەئىمى باھ)

جىنى ئاجىزلىق — جىنى قابىلىيەتنىڭ ئاجىزلىقى. شى، جىنى قابىلىيەتنىڭ پەقەت بولماسلىقى ۋە ئۇنىڭ يوقىلىشىدىن ئىبارەتتۇر. جىنى ئىنتىلىشنىڭ ئويغىنىشى ۋە ئەرلىك ئەزانىڭ ھەركەتكە كېلىشى تىبابەتتە ئومۇملاشتۇرۇپ "قۇۋۋەتى باھ" دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ قۇۋۋەت جىنى ئالاقە (جىمائى) ھەركىتى بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. ئۇ، باشقۇرغۇچى ئەزالارنىڭ شۇنىڭدەك پۈتۈن بەدەننىڭ ساغلاملىقىغا باغلىق. كىتائۇمىزنىڭ بىرىنچى قىسمىدا كۆرسىتىپ ئۆتكىنىمىزدەك، بەزىلەر باشقۇرغۇچى ئەزالار قاتارىغا جىنى بەزىلەرنىمۇ قوشىدۇ. چۈنكى جىنى بەزىلەر كىشىلەر سالامەتلىكىدە زور ئەھمىيەتكە ئىگە. مىگە، يۈرەك، جىگەرلەرنىڭ جىنى بەزىلەر خىزمىتىگە زور مۇناسىۋىتى بار.

جىنى ئاجىزلىق — جىنى ئىنتىلىش (شەھۋەت) نىڭ بولماسلىقى ۋە جىنى ئەزانىڭ ئىستىرخاسى (بوشىش كېتىشى) دېگەن 2 چوڭ قىسمىغا بولىنىدۇ.

جىنى ئىنتىلىشنىڭ بولماسلىقى

بۇ سەۋەپ جەھەتتىن توۋەلىدىكىچە بىرقانچىغا بولىنىدۇ. (1) باشقۇرغۇچى ئەزالارنىڭ كېسەللىنىشى ۋە - ئوزۇقلۇقنىڭ يېتەرسىزلىكىدىن بولغان تۈرى:

ئوزۇقلۇقنىڭ يېتەرسىزلىكى ۋە بەدەننىڭ زەئىپ بولۇشى تۈپەيلىدىن قان ئازلىق كەلتۈرۈپ چىقىرىپ مەنىنىڭ ئازىيىشىغا سەۋەپچى بولىدۇ. بۇنداقتا جىنى ئىنتىلىش يوقىلىدۇ. بۇ چاغدا بەدەن ئورۇق، ئاجىز، چىرايى سېرىق، تېرە قۇرغاق ۋە ئىشتەي تۇتۇلغان بولۇپ، ئوزۇقلۇقنى ئاچارلىق ئىپادىلىرى كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: بەدەننى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن ئوزۇقلۇق - نۇشنى ياخشىلاش، قۇۋۋەتلىك غىزالارنى بېرىش، دەم ئېلىشنى مۇۋاپىقلاشتۇرۇش، بىرمەزگىل جىنى ئالاقىنى توختىتىش لازىم. دورىلاردىن لوبۇبى كەبىر (171 - نۇسخە) نىڭ مەنپەئىتى ياخشى.

(2) مەنى ئىشلەپچىقارغۇچى ئەزا - ئۇرۇقدان مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشى ۋە زەرەرلىنىشىدىن كېلىپ چىققان دىغان تۈرى:

بۇنداقتا جىنى ئالاقىدا مەنى ئاز ياكى بەك قويۇق چىقىدۇ. ھەتتا چىقماسلىقىمۇ مۇمكىن.

داۋاسى: مىزاجنى ئىسلاھ قىلىش لازىم. ئەگەر قۇرۇقلۇق بەلگىلىرى بولسا، ھوللۇك چارلار قىلىنىشى، مەسىلەن، غىزاسىغا سۇت، گۆش شورپىسى بېرىش،

مەنچىغا پات-پات چۈشۈشكە بۇيرۇش كېرەك. زەنجىر
ۋىل مۇرابباسى مەننى كۆپەيتىش ئۈچۈن ناھايىتى
مەنپەئەتلىك. تامىغى تەركىۋىدە ئوقۇت ۋە ئىسسىق
دەرىلاردىن كاۋاۋىچىن، دارچىن، خولىنجان قاتارلىقلار
بولۇشى لازىم. قۇشقاچ گۆشىنى كاۋاپ قىلىپ يەسە بولىدۇ.
مەجۇناتلاردىن لوپۇبى كەبىر (171- نۇسخە) بېرىلىدۇ.
كۈندە چالا پىشۇرۇلغان بەش دانە تۇخۇم سېرىغىغا
يېرىم مىسقال ھىگنى قوشۇپ يېيىشكە بۇيرىلىدۇ. ئەگەر
بەدەندە ئەمەلىك زىيادىلىق ئالامەتلىرى بولسا، ئۇنداقتا
ئىتتىرىپىل كەبىر (1- نۇسخە)، ئىتتىرىپىل سەغىر
(5- نۇسخە) ۋە مەجۇنى خۇبۇل ھەددىد (100-
نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھوللۇك غىزالاردىن پەرھىز قىلىش
كېرەك.

(3) مەنى ئىشلىنىشى ياخشى بولغان ھالدا غە-
دىغلىنىش (دەغىدە غە لەزىتى) بولماسلىقتىن كېلىپ
چىقىدىغان تۈرى:

بۇخىل ئەھۋال قۇۋۋەتى باھنىڭ بولماسلىقىنى
كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەپيۇن، كوكنار ئىستىمال قىلغۇ-
چىلاردا ۋە نەشە چېكىدىغان بەگگەلەردە كۆپ ئۇچرايدۇ.
دۇ. جىنسى ئالاقىدا لەززەت بولمايدۇ. مەنى كۆپ بول-
سىمۇ قويۇق، سېرىق رەڭدە كېلىدۇ.

داۋاسى: ئىسسىق ۋە قوزغاتقۇچى دورىلار بېرىلىدۇ.
مەجۇنى زەر ئۇنى، مەجۇنى بۇزۇرى (170- نۇسخە) ياكى

لۈبۇبى كەبىردىن بىرى بېرىلىدۇ. ئوغرى تىكەن، زەنجىر
ۋىللەرنى قاينىتىپ سۇيىگە سۇت ۋە ئاقىرقەرھە، ئارچىل
قوشۇپ ھوققە قىلىنىدۇ.

(4) ئۇزۇن مۇددەت جىنسى ئالاقە قىلماسلىقتىن
كېلىپ چىقىدىغان تۇرى:

ئۇزاق مەزگىل جىنسى ئالاقىدا بولمىغان كىشىلەر
بىردىنلا جىنسى ئالاقىدە بولۇپ قالغاندا كېرەككە كەل
مەيدۇ. ھەتتا ئېھتىلاممۇ بولمايدىغان ھالغا كېلىپ قالىدۇ.
داۋاسى: سوسەن يېغى، موم يېغى، كالا ئوتلىرى
نى جىنسى ئەزا ۋە دوسۇنغا سۈركەشكە بېرىلىدۇ. ئۇرۇق
دان خالتىسىغا ئاقىرقەرھە يېغىغا چىگىت يېغىنى قوشۇپ
سۈرتىلىدۇ.

(5) يۈرەك، مىڭە ۋە بورەكلەردىكى زەرەرلىنىشلەر-
دىن كېلىپ چىقىدىغان تۇرى:

مەزكۇر ئەزالار كېسەللەنگەنلىك ئالامەتلىرى بولۇش
بىلەن بىللە، جىنسى ئاجىزلىقمۇ كېلىپ چىقىشى مۇمكىن.
بۇنداقتا سەۋەپ بولغان كېسەلگە چارە قىلىنسا كىپايە
قىلىدۇ.

جىنسى ئەزا بوشاپ پالەچلىنىشى (ئىستىرخاى زەكەر)

جىنسى ئەزا پەيلىرىنىڭ پالەچلىنىشى تۈپەيلىدىن
ئۇنىڭ بوشىشىپ كېتىشى جىنسى ئەزا ئىستىرخاسى دەپ
ئاتىلىدۇ. ئۇ، تۇغما بولۇشى مۇمكىن ۋە بەلدىن توۋەن

كى ئىزالار پالچىلىكىنىڭ ئاقىۋىتى بولۇپ يۈز يېرىمى؛
جىنى ئىزا ۋە يەيلەرگە قاتتىق سوغاق ئوتۇپ كېتىش
ياكى بەلغەم ماددىسىنىڭ تۈكۈلۈشى؛ مىڭە ھەركەت ئىم-
سەپلىرىنىڭ خىزمىتى بۇزۇلۇشلاردىن كېلىپ چىقىشىمۇ
مۇمكىن.

داۋاسى: پالچ بايدا كورسىتىپ ئوتكەن چارلار
قىلىنىدۇ.

مەنى تېز كېتىپ قېلىش (سۈرئەتى ئىنزال)
جىنى ئالاقە ئۈستىدە ھەتتا شەھۋەت قوزغالغان
چاغلاردا مەنىنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى تېز كېتىپ قېلىشى
"سۈرئەتى ئىنزال" دىيىلىپ، توۋەندىكىچە بىرقانچە سە-
ۋەپتىن كېلىپ چىقىدۇ.

1) مەنى ئىشلەش ۋە ساقلاش ئىزالىرىنىڭ تۇ-
تۇش قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىشى، بۇلداقتا مەنى ئاق، سۈيۈك
سۈدەك سوغاق بولىدۇ.

داۋاسى: قەي قىلدۇرۇش بىلەن بەلغەم سۈرگىسى
بېرىلىدۇ. مەجۇنى خۇسۇلەتتە (101-نۇسخە)، سۈرگە
ئۈچۈن ئايارەج پەيقارا (16-نۇسخە) بېرىش مۇمكىن.
توۋەندىكى شەرۋەت (شەرۋىتى پەنجىنۇش) تەييارلاپ
بېرىلسە بولىدۇ:

نۇسخە: ئۈزۈم سۈيى 54 سەر، سۇماق، ھوزا،
كۈلنار، قىزىل گۈل، كۈندۈز، سۈنتەر، سەئىدى كۈيى بىر
سەردىن؛ زەپەر، زەمچى بىر مىسقال. قائىدە بويىچە سىرگە

بىلەن ئىشلىدىكى (مۇدەببەر قىلىنغان). - تومۇرپوقى 3 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، ئۈزۈم سۈيى بىلەن

$\frac{1}{3}$ قىسمى قالغىچە قاينىتىپ ماتار ئارقىلىق سۈزۈپ.

سېقىپ، شىشە ياكى چىنە-قاچىلاردا ساقلىنىدۇ. كۈنىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 3-5 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

(2) قاننىڭ كۆپلىگى ۋە مەنىنىڭ زىيادىلىكىدىن بولىدۇ. بونىڭدا جىنى ئاجىزلىق ياكى جىنى ئىزا پالەچلىگى بولماستىن پەقەت مەنى تېزلا مېڭىپ كېتىدۇ، بەزىلەر بۇنى بىر مەزگىل جىنى ئالاقىدا بولماسلىق-تىنىمۇ كېلىپ چىقىدۇ، دەپ قارايدۇ.

داۋاسى: ئادار شەرۋىتى قاتارلىق قاننى تەڭشەيدىغان شەرۋەتلەر مەسىلەن، ئىسكەنجىۋىل (100-نۇسخە) ۋە ئادار شەرۋىتى (47-نۇسخە) بېرىلىدۇ. قۇۋۋەتلىك غىزالارنى بىر مەزگىل ئازراق ئىستىمال قىلىش، ئاچ-چىق-چۈچۈك نەرسىلەرنى كۆپرەك يېيىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. (3) مەنى تەركىۋىدە سەپرا بولۇشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. جىنى ئالاقىدىن لەززەتلىنمەي تۇرۇپلا مەنى مېڭىپ كېتىدۇ، بۇنىڭ مەخسۇس ئالامىتى شۇكى كەلگەن مەنى قىزىق بولۇپ جىنى ئىزا يوللىرى ئېچىشىپ كۆپ كەلدەك سېزىم بېرىدۇ، مەنى سېرىق كېلىدۇ.

داۋاسى: ھول سوغاقلق نەرسىلەرنى بېرىش

كىپايە قىلىندۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن شەرىئىتى خەشخاش (69-
نۇسخە)، سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى، ماش گۈرۈچ
لەر بېرىلىدۇ.

4) باشقۇرغۇچى ئەزالاردىن بىرىنىڭ ئاجىزلىقىدىن
دىن بولىدۇ. بۇنىڭدا قۇۋۋىتى باھ ئاجىزلىق بىلەن
مەنى تېز كېتىپ قېلىش قوشۇلۇپ كېلىدۇ. بۇ خىل
ئەھۋاللار جىنىنى ئالاقە بىلەن كۆپ شۇغۇللانغان كىشى
لەردە كۆپ كۆرۈلىدۇ.

داۋاسى: جىنىنى ئاجىزلىقنى داۋالاش چارىلىرى
بويىچە داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

جىنىنى ھەۋەسنىڭ كۆپ بولۇشى

مىڭ ۋە سىزگۇ ئەسەرلىرىنىڭ قوزغىلىشچانلىقىدىن
جىنىنى ئالاقىغا كۆپ بېرىلىپ كېتىش دەسلەپتە روشەن
كېسەللىك بەلگىلىرى بەرمىسىمۇ، بارا-بارا باشقۇرغۇچى
ئەزالارنى، شۇنىڭدەك باشقا ئەزالارنى زەرەرلەپ قويىدۇ.

ئالامەتلىرى: جىنىنى ئالاقىدىن كېيىن يۈرەك
سېلىپ كېتىدۇ ۋە ئادەتتىكى چاغلاردا يۈرەك زەئىپلىك
ئالامەتلىرى بولىدۇ. مىڭگە زەرەر يەتكەندە جىنىنى ئا-
لاقىدىن كېيىن باش قاينىدۇ. جىگەر، مەئىدىلەر زەرەرلەپ
سە ئىشتىي تۇتۇلۇپ كۈندىن-كۈنگە ئورۇقلاش كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: جىنىنى ئالاقىنى مەنى قىلىش بىلەن
بىللە ئالامەتلىرىگە قاراپ زەرەرلەنگەن ئەزالار خىزمىتىنى
ئەسلىگە كەلتۈرۈش چارىلىرى قىلىنىدۇ. ئومۇمىي بەدەندىن

كى باشقا ئالامەتلىرىگە قاراپ مەتبۇخى ئەپتىمۇن ۋە سەۋدانى سۈرگۈنچى دورىلارنى بېرىش كېرەك.

قانلىق مەنى كېلىش (مەنەيىدەم)

بۇ خىل ئاغرىقتا جىنىنى ئالاقىدا مەنى بىلەن بىللە قان كېلىدۇ. ياكى پۇتۇنلەي قان كېلىدۇ.

سەۋىيى: ئۇرۇقدان قانتومۇرلىرىنىڭ زەخىملىنىشى ياكى مەنى ئىشلەش ئەزالىرىدىكى كېسەللىك ئوزگىرىشلىرى تۈپەيلىدىن مەنى ئورنىغا قان يىغىلىشى مۇمكىن.

داۋاسى: بورەك ۋە مۇناسىۋەتلىك ئەزالار خىزمىتىنى ياخشىلاش، ئاغرىش ۋە ياللۇغلىنىشلار بولسا مۇناسىپ چارىلارنى كۆرۈش كېرەك. مەنى ئىشلەپچىقىرىش ئەزالىرىدا كېسەللىك بولغان تەقدىردە ئاغرىش ۋە ياللۇغلىنىش ئىپادىلىرى بولماسلىقى مۇمكىن. مۇنداق چاغدا مەستىكى يېغى بىلەن ئۇرۇقدان خالتىسىنى ياغلاشقا بۇيرىلىدۇ.

مەستىكى يېغىنىڭ تەركىۋى ۋە ياساش ئۇسۇلى: 5 سەر مەستىكىنى سوقۇپ، باراۋەر مىقداردا كۈنجۇت يېغى ياكى گۈل يېغى قۇيۇلغان شىشكە سېلىپ، سۇ قۇيۇلغان قاچىدا تۇرغۇزۇپ قاينىتىلىدۇ. مەستىكى ئېرىپ ياغ بىلەن تامامەن ئارىلاشقاندا مەستىكى يېغى تەييار بولىدۇ.

كوپ ئېھتىلام بولۇش (كەسرەتى ئېھتىلام)

سەۋىيى: مەنى تېز كېتىش، جىنىنى ئاجىزلىق ۋە پۇتۇن بەدەندە بوغاقلىقنىڭ غالىپلىقى تۈپەيلىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: مەنى تېز كېتىشتىكى چارىلار قىلىنىدۇ.
زىغىر پاخىلىدىن ياسىغان ياستۇق ۋە كوپىلەردە يېتىش،
سوگىت يوپۇرمىقى ۋە قىزىل گۈلنى چۈشەك قىلىپ يې-
تىش كېرەك. قەدىمقى كىتاپلاردا كۆپ ئېھتىلام بولىد-
خان كىشىلەر قوغۇشۇننى نىپىزلىپ بېلىگە تېگىۋېلىشنى
تەۋسىيە قىلغان خاتىرىلەر بار، سىناپ كورۇش مۇمكىن.
توۋەنكى نۇسخىلاردىكى دورىلاردىن بىرى بېرىلسە بولىدۇ.
نۇسخە: (1) سوزاپ ئۇرۇغى ئۈچ مىقال، بەش
بارماق ئۇرۇغى ① سوسەن يىلتىزى 2 مىقال، ئۇنار گۈلى،
قىزىل گۈل بىر يېرىم مىقالدىن. سوقۇپ تالقان قىلىپ
سۈت ياكى قېتىق بىلەن كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا
2 مىقالدىن بېرىلىدۇ.

(2) سىياداننى قورۇپ باراۋەر ھەسەل بىلەن يې-
يىشكە بېرىلىدۇ.

(3) قۇلدۇزقەرى بىر مىقال، سېمىز ئوت ئۇرۇغى
7 مىقال، سېرىق ھېلىلە 4 مىقال، بەلىلە پوستى
7 مىقال، ئامىلە پوستى 6 مىقال. دورىلارنى سوقۇپ
تالقان ياساپ 2 - 1 مىقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم يېرى-
لىدۇ. بۇلاردىن باشقا جىنسى ئاجىزلىق ۋە بەدەندىكى ئالامە-
تلىرىگە قاراپ، باشقۇرغۇچى ئەزالار قۇۋۋەتلەندۈرىلىدۇ.

① بەش بارماق (پەنجى ئەنگۇش) - ئىسسىق ئىقلىملىق
جايلاردا ئوسىدىغان لىمون جىنىسلىق بىر دەرەخنىڭ مۇسى.
پىشقالدا بىرقانچە پارچىغا ئايرىپ خۇددى بارماققا ئوخشاش
كورىنىدۇ. خەنزۇچە فوشۇ (بۇدا قولى) دەيدۇ.

2 - پەسەل: ئۇرۇقدان ۋە جىنسى ئەزا كېسەللىكلىرى

ئۇرۇقدان ياللۇغى (ۋەرەمى ئۇنسەيىن)

ئۇرۇقدان ياكى ئۇرۇق بېزى مۇرەككەپ تۈزۈلگەن ۋە يەي، قانتومۇر ۋە ئەسەبلەر چىرماشقان بىر ئەزادىن ئىبارەت. شۇنىڭ ئۈچۈن قان سەپرا ياكى سەۋدا خىملىتىرىدىن ياللۇغلىنىپ ئىششىقا قاتتىق ئاغرىيدۇ.

ئالامەتلىرى: ئۇرۇقدان ھەرخىل دەرىجىدە ئىششىيدۇ. بولۇپمۇ قاندىن بولغان ياللۇغلىنىشتا ئىششىق چوڭ بولىدۇ. ئاغرىش قاتتىق، رەڭگى قىزىل ۋە قىزىق بىلەن ئىدۇ، ئېغىرلىق سېزىلىدۇ. بەدەندە قىزىتما ۋە قان غالىپلىق بەلگىلىرى كۆرىلىدۇ. سەپرادىن بولغاندا ئېچىشش قوشۇلۇپ، ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ تېرىسى پاقىراپ تۇرىدۇ. كېسەل ئۇسسايدۇ ۋە ئاغزى ئاچچىق بىلىنىدۇ.

ياللۇغلىنىش ئۇرۇقدان بىلەن تېرە ئارىلىغىدا بولسا ئالامەتلەر يەڭگىلىرەك بولۇپ، بەزىنىڭ ئۆزىدە بولغاندا ئېغىر ئۆتىدۇ. قىزىتما بىلەن تەشەللىق زىيادە بولىدۇ. بەلغەمدىن بولغان ياللۇغلىنىشنىڭ كەيپىياتى سوغاق بولۇپ، ئاغرىش ۋە ئېچىشش ئازراق بىلىنىدۇ، لېكىن ئىششىق چوڭ بولىدۇ.

داۋاسى: ئەگەر قان ئېلىشقا بولمىسا پاقالچەك ۋە غولىغا ھىجامەت قويۇلىدۇ. ماددىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ

سۈرگە ئۈچۈن مەتبۇخى ھېلىلا (38-نۇسخە) بېرىلىپ
ماددا تازىلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن يەرلىك قىزىتىمىنى پە-
سەيتىش ۋە ئىششىق ياندۇرۇش چارىلىرى قىلىنىدۇ.
بۇنىڭ ئۈچۈن بىر پارچە رەخنى سىركە بىلەپ نەمدەپ
ئىششىق جايغا يېپىپ قويۇلىدۇ. گۈلەپ، ئىسپۇغۇل لۇئابى،
كۆك يۇمىلاقسۇت سۈيى ۋە ئىت ئۇزۇم سۈيى چېپىلىدۇ.
ئاغرىش بەك قاتتىق بولسا يۇقۇرقىلارغا تەرخە-
مەك ئۇرۇغى بىلەن كۆكنار قوشۇش كېرەك. ئىششىقنى
قايتۇرۇش ئۈچۈن بابۇنە، ئەكىلىلىملىك، زىرىلەرنى سو-
قۇپ گۈل يېغى ۋە تۇغۇم سېرىغى بىلەن ماي تەييارلاپ،
ئىششىغان بەزگە قويىلىدۇ. زىغىر شىرىسى بىلەن بەسەي
ياپرىغى، شۇمىلىلەرنى سوقۇپ، ئازراق ھەسەل ئېلىشتۇ-
رۇپ چېپىلىدۇ. قەۋزىيەت بولسا مۇۋاپىق سۈرگە بېرىش
مۇمكىن. ئەمما ئالاھىدە سۇيدۇك راۋان قىلغۇچى دۇرد-
لارنى بېرىشكە بولمايدۇ.

بەلغەم ماددىسى غالىپ بولغاندا ماددىنى پىشۇرۇش
ئۈچۈن ئەتە-ئاخشامدا ئارپا بېدىيان ۋە چۈچۈكبۇيا،
ئارپا بېدىيان يىلتىزلىرىنى قاينىتىپ سۈيىگە گۈلەپ
سېلىپ بېرىلىدۇ. سۈرگە ئۈچۈن ھەببى قوقىيا (17-
نۇسخە) ياكى ھەببى ئايارەج (7-نۇسخە) بېرىلىدۇ.
توۋەندىكى دورىلار سىرتتىن چېپىشقا بېرىلىشى كېرەك.
نۇسخە: قارا ئەمەن، سېرىق چىچەك، بابۇنە،
ئەكىلىلىملىك، شۇمشە، زىرە ھەر بىرى 3 مىسقالدىن،

تۇخۇم سېرىقى بىردالە، زىغىر شىرىسى 5 مىسقال، گۈل يېغى 5 مىسقال، ھەسەل 5 مىسقال، پۇرچاق ئۇنى، ئۇقۇت ئۇنى ھەربىرى 2 مىسقالدىن. مەزكۇر دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ زىغىر شىرىسى، گۈل يېغى ۋە ھەسەل بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چاپىدىغان دورا تەييارلاپ ئىششىق ئۇرۇقدانغا قويىلىدۇ. يەل سەۋىبىدىنمۇ ئۇرۇقدانلار ئىششىيدۇ. ئۇ قىزىل-لىق، ئېغىرلىق بولماسلىق بىلەن باشقا خىلدىكى ۋە رەملەردىن پەرقلەندۇ. قوناق ئۇنى، كىپەك تۇزلارنى قىزىتىپ تېگىش بىلەن قايتىپ كېتىدۇ.

ئۇرۇقداننىڭ چوڭىيىپ كېتىشى

ئىككى ئۇرۇقداننىڭ ئۈستىگە ياغ ئۈسۈپ قېلىش بىلەن ئۇلار ئادەتتىكىدىن چوڭىيىپ قالىدۇ. بۇنداق زورىيىش ياللۇغلانغانلىقتىن ھاسىل بولمىغاچقا ئاغرىمايدۇ، ئەمما ئېغىرلىشىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: ئاق تىكەن يىلتىزى، مېھرى گىمىيا، كوكئار پوستى، بولەي تاش (سۇرۇپ)، كوك يۇمغاقسۇت سۈيىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ بەزگە چېپىش لازىم. ياكى گىلى ئەرمىنىگە قوشۇپ چاپسىمۇ بولىدۇ.

بەزىدە بۇنىڭ ئەكسىچە يامان سوغاقلىقنىڭ دە-سىرى بىلەن ئۇرۇق بەزلەر كىچىكلىشىپ قورۇلۇپ قالىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن مونچىغا چۈشۈش، ئىسسىق ياغلار بىلەن ياغلاش لازىم.

**ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ تومۇرلىرى كېڭىيىپ
ئەگرى - بۇگىرى كۆپۈپ قېلىش (داۋالى سەفەن)**

ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ تومۇرلىرى خۇددى پاقەلچەك قانتۇمۇرلىرىنىڭ ئەگرى - بۇگىرلىشىپ كىڭەيگىنى (داۋا - لى كېسىلى) گە ئوخشاشلا كېڭىيىپ ۋە ئەگرى - بۇگىر - لىشىپ قالىدۇ. بۇ كۆپىنچە چەپ تەرەپ ئۇرۇقدان تې - رىسىدە كۆرۈلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ تومۇرلىرى كۆك رەڭدە ئەگرى - بۇگىرى كۆپۈپ تۇرغانلىقى كۆرۈ - لىدۇ. ئېغىر ھاللاردا تارتىشىش ۋە تېلىش بىلەن مېڭىشقا تەسەر بېرىدۇ.

داۋاسى: پاقەلچەك كۆكتومۇرىنىڭ ئەگرى - بۇگىرى كېڭىيىش كېسىلى بىلەن ئوخشاش.

**جىنسى ئەزا ئۇرۇقدان خالتىسىنىڭ
قەچچىشقا كېسىلى**

سەۋىبى: كۆپىنچە سەپرانىڭ زىيادىلىكىدىن ياكى سەپرا بىلەن قان ئارىلاشقانلىقتىن بولىدۇ.

داۋاسى: قان ئېلىشقا توغرا كەلمىسە پاقەلچەك ۋە ساننىڭ ئىچكى تەرىپىگە ھىجامەت قويۇش كېرەك. مەت - بۇخى شېلىندە (172 - نۇسخە) ۋە مەتبۇخى شاتىرە (38 - نۇسخە) بىلەن ماددا تازىلىنىدۇ. ئىسسىق سۇ بىلەن دائىم تازىلاپ ئارقىدىن سىركە، گۈل يېغى ۋە

تۇخۇم ئېقىنى بىرلەشتۈرۈپ چېپىلىدۇ. مامىشانى چىڭ -
سەي ياكى يۇمىاقسۇت سۈيى بىلەن چېپىش كېرەك.

سۇيدۇك يولىنىڭ توسىلىپ قېلىشى

سەۋىبى: سۇيدۇك يولىدا جاراھەت ياكى ئوس -
مە پەيدا بولۇش: قويۇق شىرىلىك خىلىت ماددىلىرىنىڭ
تۇرۇپ قېلىش سەۋەپ بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: سىيگەندە ئاغرىپ، ئېچىشىپ، سىيىش
قىيىنلىشىدۇ. يىرىڭ ئارىلاشقان شىرىلىك ماددىلار ئېقىپ
چىقىدۇ.

داۋاسى: قان غالىپلىقى كورۇلسە ئاياققا شەخەك
قويۇش كېرەك. سېمىز ئوت، قوغۇن ئۇرۇقلىرىنىڭ شە -
رسى ۋە خەشخاش شەرۋىسى (69 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.
سۇيدۇك يولىدا شىرىلىك نەرسىلەر كۆپ بولسا شەر -
ۋىتى بۇزۇرى (132 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بابۇنە، ئەكىلىل -
مىلىك، مەرزەنجۇشلەرنى قاينىتىپ، ئىسسىقراق ھالدا
جىنىسى ئەزاغا قويىلىدۇ. رۇمبېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى،
قوغۇن ئۇرۇغى، ھەلىيۇن ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان قاتارلىق
سۇيدۇك راۋان قىلغۇچى دورىلار بېرىلىدۇ. ئەگەر توسى -
لىش سۇيدۇك يولىدا ئوسمە سەۋىبىدىن بولسا، ئاغرىد -
ماسلىق، قان يىرىڭ بولماسلىق ۋە سۇيدۇك قىيىنلىق
بىلەن كېلىش قاتارلىق ئالامەتلەر كورۇلىدۇ. بۇنىڭ
ئۈچۈن قەدەي كۈشتىسىنى گۈل يېغى بىلەن ئېرىتىپ،
زەكەر توشۇڭىدىن تامغۇزۇش كېرەك. بۇنىڭ بىلەن
نەتىجە بولمىغاندا ئەننوبە (مېتال كاتېتىر) سېلىنىدۇ.

2 - پەسىل: ئاياللار كېسەللىكلىرى

تۇغماسلىق

تۇغماسلىق تىبابەتتە "ئۇقرى" دەپ ئاتىلىدۇ. تۇغماسلىق—ھەقىقى تۇغماسلىق، غەيرى ھەقىقى تۇغماسلىق دەپ ئىككىگە بۆلىنىدۇ. ھەقىقى تۇغماسلىق دەپ تۇغما ھالدىكى تۇغماسلىققا، يەنى شۇ كىشىنىڭ تۇغۇت-لىشىدىكى ئاناسىل ئەزالاردىكى كەمتۈكلەرگە ئېيتىلىدۇ. غەيرى ھەقىقى تۇغماسلىق دەپ تۇغۇلغاندىن كېيىن ياكى بىر قانچىنى تۇغۇپ بولغاندىن كېيىن ھەرخىل كېسەللىكلەر سەۋەبىدىن تۇغماس بولۇپ قالغانلىققا ئېيتىلىدۇ.

تۇغماسلىقنىڭ سەۋەپلىرى ئەر-ئايال ھەرئىككىلا تەرەپتە بولۇشى مۇمكىن. تۇغماسلىقنى داۋالاش ئۈچۈن ئالدى بىلەن، قايسى تەرەپنىڭ سەۋەپچى ئىكەنلىكىنى ئايرىش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن تۇغماسلىق ئايال تەرەپ-تىلىگى ئېنىقلانغاندىن كېيىن توۋەندىكى سەۋەپلەرنى ئىزلەپ شۇ ئاساستا داۋالاش ئېلىپ بېرىلىدۇ.

1) مىزاجنىڭ ماددىسىز بۇزۇلۇشى سەۋەپلىك

مىزاجى قى:

مىزاجنىڭ ماددىسىز بۇزۇلۇشلىرى دېگەنىمىز، بەدەن كەيپىياتىدا، ئىسسىقلىق، سوغاقلىق، قۇرۇقلۇق

ۋە ئەمەلگەلدەردىن بىرىنىڭ ئۆلچەمدىن زىيادە بولۇپ قېلىشىدىن ئىبارەت غەيرى تەبىئىي ئەھۋالنى كورسىتىدۇ. بۇ ئومۇمىي بەدەندە، شۇنداقلا بالىياتقۇ (رەھىم) دە ئۆز ئىپادىسىنى كورسىتىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئومۇمىي بەدەندە بۇزۇلغان ياكى ئۆلچەمدىن زىيادە بولغان مىزاجنىڭ ئالاھىدە ئالامەتلىرى كورلىنىدۇ (بىرىنچى قىسىم مىزاجلارغا قاراڭ).

ئىسسىقلىقتىن بۇزۇلغاندا، ئومۇمىي ئالامەتلىرى بىلەن بىللە ھېيىز قارامتۇل ۋە قويۇق كېلىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن مىزاجىنى ئۆزگەرتىشكە؛ بىنەپشە، ئىلۇفەر، خەشخاش، ئالما سۈيى، ئاق سەندەل، لىموندىن تەركىپ تاپقان شەرۋەت بېرىلىدۇ. ھەم تەمىرى ھېندى، ئەينۇلا ۋە پۇ - نۇس، خىيارى شەنبەرنىڭ تەمى چىقىرىلغان سۈيى بېرىلىدۇ. بالىياتقۇ مىزاجىنى تەڭشەش ئۈچۈن ئوردەك ۋە توخۇ يېغىنى بىنەپشە يېغى بىلەن قوشۇپ يۇيۇپ تازىلاپ ھورلانغان يۇڭدا پىلتە ياساپ جىنىسى يولغا قويۇلىدۇ.

سوغاقتىن بولغانلىرىدا ئومۇمىي بەدەندىكى ئالامەتلىرىدىن تاشقىرى، ھېيىز ئاز ۋە ئۇزۇن مۇددەتتە رەڭگى ئاقۇش ۋە سۇيۇق كېلىدۇ. دوۋسۇندا تۈك شالاڭلىشىپ كېتىدۇ. پۈتۈن بەدەن مىزاجىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن، مەش دىرتۇس (25 - نۇسخە) ۋە داۋائىل مىشكى (22 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. زەپەر، سۇمبۇل، ئەكىلى مىلىك، سازەنجى ھىندى،

قەرەمەننا، ئودەك يېغى، بادام يېغىدىن لازىم مىقداردا ئېلىپ
يۇيۇپ تازىلاپ ھورلانغان قوي يۇڭى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ
جىنسنى يولغا قويۇش كېرەك، ھېسزىدىن كېيىن قىزىل زەر -
نىسخ، مۇرمەككى، جويۇز، سەۋرە، مەنە سائىلە، قۇننە،
ھەبىلغارلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، كويىدۇرۇپ چىق -
قان ئىس بىلەن جىنسنى يول ئىسلىنىدۇ.

قۇرۇقلۇقتىن بولغانلىرىدا، ئومۇمى بەدەندىكى قۇ -
رۇقلۇق ئالامەتلىرىدىن باشقا، ھېيىر كەلمەسلىك، قەۋ -
زىيەت ۋە جىنسنى يول قۇرغاقلىشىشلار بولىدۇ، بەدەن
مىزاجىنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن، دائىم سۇت ئىچىش بى -
لەن شەرۋىتى بىنەپشە ۋە شەرۋىتى ئىملۇفەر (74 - نۇسخە)
بېرىلىدۇ. جىنسنى يولغا يۇقۇرىدا كورسىتىلگەن دورىلار
قويۇلىدۇ.

نەملىك بولغانلىرىدا، ئومۇمى بەدەندىكى نەملىك
ئالامەتلىرىدىن باشقا، جىنسنى يولنىڭ دائىم نەم -
لىشىپ تۇرۇشى ۋە ئاق خۇن كوپىيىشلەر يۈز بېرىدۇ.
بۇنىڭ ئۈچۈن سېرىق چىچەكنى سىركە بىلەن كوپ سۇ -
دا قايىتىپ ئىچكۈزۈپ قەي قىلىدۇرۇش ياخشى نەتىجە
بېرىدۇ. شەھى ھەنزەل، ئەنزىرۇت، شىبىت، سۇماق،
ئۇدەندى، زەپەر ۋە مۇرمەككىلەرنى باراۋەردىن ئېلىپ
سوقۇپ ئېرتىلگەن ھەسەل ئارىلاشتۇرۇپ پۇچۇلانغان قوي
يۇڭى بىلەن جىنسنى يولغا قويۇلىدۇ.

(2) ئومۇمى بەدەن ۋە بالىياتقۇ مىزاجىنىڭ ماد -
دىلىق بۇزۇلۇشلىرىدىن كېلىپ چىققان تۇغماسلىق؛

ئالامەتلىرى: بۇزۇلغان خىلىتلىرى (مەسىلەن، قان.

سەپرا، سەۋدا ۋە بەلغەم) ئۈچۈن خاس بولغان ئومۇمىي بەدەن ئالامەتلىرى كورۇلىدۇ (خىلىتلىرى بايالىمغا قاراڭ).

داۋاسى: قان ئالامەتلىرى بولسا، ئاياق تەرەپ -

لەرگە ھىجامەت قويۇش كېرەك. نوقۇنى تەمرى ھىندى

(55 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بەلغەمدىن بولسا، قەي قىلدۇ -

رۇش، ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) ۋە ئايارەج پەيىقارا

(16 - نۇسخە) بىلەن بەدەن ۋە بالىياتقۇنى بەلغەم ماد -

دەسىدىن تازىلاش كېرەك. سەۋدادىن بولسا مەتبۇخى

ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. سەپرادىن بولغاندا مەت -

بۇخى ھېلىلە بىلەن مەتبۇخى تەمرى ھىندى (115 -

نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(3) ئايال كىشى بەك سەمىرپ كېتىپ، بالىياتقۇدا ياغ

كۆپىيىپ قېلىشىدىن كېلىپ چىققان تۇغماسلىق:

ئالامەتلىرى: قوسىغى يوغان، بەدەنى سېمىز بولۇپ،

ئىش ۋە ھەركەتتە نەپەس قىستايدۇ.

داۋاسى: ئورۇقلىتىش تەدبىرلىرىنى قىلىش

لازم. مەسىلەن، ئىگەك قىلدۇرۇش. ھىجامەت قويۇش

ۋە مىزاجىغا قاراپ سۈرگە بېرىش كېرەك. قۇۋۋەتلىك

غىزالارنى ئاز بېرىش، ئىتتىپاق سەغىر (5 - نۇسخە)،

جەۋارىش كۈمۈنى (49 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. داۋائىل لوك

(173 - نۇسخە) نىڭ بۇ جەھەتتە مەنپەئەتى زور.

(4) ئايال بەك ئورۇق ۋە زەئىپ بولۇش تۈپەي -

لىدىن كېلىپ چىققان تۇغماسلىق:

ئورۇق ۋەزەشپ ئاياللارنىڭ بالىياتقۇسىدا ئورۇقنىڭ تۇتۇلۇشى ناچارلىشىپ ھامىلە بولمايدۇ.

داۋاسى: لوبۇبى گەبىر ۋە سەغىر (171 - نۇم -
(خە)لەردىن بىرى بېرىلىدۇ. تەرەنجىۋىل بىلەن ھالۋا تەييارلاپ يېيىشكە، مېغىزلىق نەرسىلەرنى كۆپ يېيىشكە بۇيرۇپ، سەمىرىتىشكە ئامال قىلىنىدۇ.

(5) ھېيىز توختاپ قېلىش تۈپەيلىدىن تۇغماسلىق:
ھېيىز توختاش (كېسىلىش) يېشىغا بارماستىن تۇرۇپ ھېيىز كەلمەسلىك تۇغماسلىقنىڭ بىر سەۋىيىسى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.

داۋاسى: ھېيىز ماڭدۇرۇش چارىلىرىنى قىلىش لازىم (ھېيىز كەلمەسلىك كېسىلىگە قاراڭ).

(6) بالىياتقۇدا ھەرخىل ياللۇغلىنىش، ئىششىق، جاراھەت ۋە گۆش ئۇلۇش تۈپەيلىدىن بولغان تۇغماسلىق:

(7) بالىياتقۇدا قويۇق يەل ھاسىل بولۇش سەۋىيىسىدىن تۇغماسلىق:

ئالامەتلىرى: دوسۇن ۋە كىندىك ئارىلىقىدا دوم -
باق ئىششىق پەيدا بولۇپ، باسقاندا يەلدەك يوقىلىپ كېتىدۇ. ئاغرىش ياكى باشقا ياللۇغلىنىش ئالامەتلىرى بولمايدۇ. قوساق ئاستىنقى قىسمى كۆپكەندەك سېزىلىدۇ. يەللىك نەرسىلەرنى كۆپ ئىستىمال قىلغانلىق

تارىخى بولىدۇ (بۇنداقلا ئەگەر ھامىلە بولۇپ قالسىمۇ
بالىسى چۈشۈپ كېتىدۇ).

داۋاسى: ھىركۇنى 2 قېتىم (ئەتە - ئاخشام) -
يان ئەرەقى بىلەن گۈلقەن ۋە شەرۋىتى مائىل ئۇسۇل
(105 - نۇسخە) بىلەن ئىنەك پىتى يېغى بېرىلىدۇ.
جەۋارش كۇمۇنى (49 - نۇسخە) بېرىپ يەل تازىلىنىدۇ.
(8) بالىياتقۇ ئاغزىنىڭ مايمىقلىشىپ قېلىشىدىن
تۇغماسلىق.

ئالامەتلەرى: ئاغرىپ ھېمىز كورىدۇ. ئانەتتىكى
چاغلاردا جىنسى يولدىن شىرىلىك سۇيۇقلۇق چىقىپ
تۇرىدۇ. بۇ ئەھۋال بىرىنچى تۇغۇتتىن كېيىن بالىياتقۇ -
نىڭ ئۆز ئورنىغا توغرا كەلمىگەنلىكى ياكى ئۇنىڭ پەي
باغلاملىرىغا زەرەر يەتكەنلىكىدىن بولىشى مۇمكىن.

داۋاسى: سەۋەپلىرىنى تېپىپ ئۇنى داۋالاشنى
ئاساس قىلىش، ئۇنىڭغا قوشۇمچە توۋەندىكى چارلارنى
كورۇش كېرەك.

ئەنجىر، بابۇنە، شۇمشە، زاراڭزا، زىغىرلارنى بارا -
ۋەر مىقداردا ئېلىپ، بىرچوڭ چىنە سۇ بىلەن قاينىتىپ،
بىر ئاز گۈل يېغى قوشۇپ ئىلمان ھالەتتە ھوقنە ئەس -
ۋابى ئارقىلىق جىنسى يولغا كىرگۈزۈپ، بالىياتقۇ چە -
لاندۇرۇلىدۇ. دېڭىزىيا (فادى زەرە ھايۋانى)نى ئىستە -
مال قىلىش ھەر خىلدىكى تۇغماسلىقلار ئۈچۈن ياخشى
مەنپەئەت بەرگەنلىكى توغرىسىدا جاتىرىلەر بار.

ھامىلدارلىق ئالامەتلىرى ۋە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك نىشارلار

ھامىلدار بولغانلىق ئالامەتلىرىدىن مۇھىملىرى — ھېيىز توختىشى بولۇپ، بالىياتقۇ ئاغزى يۇمۇلۇپ قالىدۇ. بۇ چاغدا ھامىلدار ئايال كىندىك بىلەن دوسۇن ئارىلىقىدا يەڭگىل يېقىمىزلىق ياكى ئاغرىش سېزىدۇ. جىنى ئالاقىدىن قاچىدۇ. ئەمچەك تۈگمىسى ئەتراپى قارا رەڭگە كىرىدۇ، كوز ئېقى كۆكۈمتۈل بولۇپ قالىدۇ. كۆڭلى ئاينىش، قۇسۇش، بەزى نەرسىلەرگە ئامراق، بەزى نەرسىلەردىن يىرگىنىدىغان بولۇپ قېلىشقا ئوخشاش ئەھۋاللار كۆرۈلىدۇ. بۇ ئادەتتە سىزىك دەپ ئاتىلىدۇ. بەزى ئاياللار ھەرخىل غەلىتى نەرسىلەر مەسىلەن، سېغىز توپا، گەژ، ساپال قاتارلىقلارنى يېمىشكە ئامراق بولۇپ قالىدۇ. بۇلار ھامىلدارلىقنىڭ دەسلەپكى ئالامەتلىرى بولۇپ، ئۇندىن كېيىن قوساق روشەن ھالدا چۈشىنىدۇ. قوساقتىكى بالىنىڭ سىدىرلىش ھەممىگە ئايان ئالامەتتۇر.

ھامىلدارلىقتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك نىشارلار.

ھامىلدار ئاياللار ھامىل ۋە ئۆزىنىڭ سالامەتلىكىنى ساقلاش ئۈچۈن تۈۋەندىكى نۇقتىلارغا دىققەت قىلىش لازىم:

(1) ھامىل 7 ئايلىق بولۇشتىن بۇرۇن ئېغىر نەرسە كۆتىرىش، سەكرەش، ئېغىر ئەمگەك قىلىش، ئۆزۈك ۋاقىراش، غەم، قايغۇ، غەزەپ، قورقۇپ كېتىش

قاتارلىق ئىشلاردىن ساقلىنىشى لازىم. سۈرگە ئىچىش،
قان ئالدۇرۇش قاتارلىقلار مەنى قىلىنىدۇ. ھامىلدارلىق-
نىڭ دەسلەپكى بىر قانچە ئېيىدا جىنسى ئالاقە چەكلە-
نىدۇ.

(2) 7 - ئايلىقتىن كېيىن، يۇقۇرقلارغا دىققەت
قىلىش بىلەن بىللە غىزاسىغا ئەھمىيەت بېرىش لازىم.
يەللىك تەرسىلەر (پۇرچاق خىلىدىكى دانلار، كاۋا، ياڭيۇ،
جۈسەي قاتارلىقلار) دىن پەرھىز قىلىش كېرەك. ئەگەر
سۈرگە بېرىشكە توغرا كەلگەندە مەجۇنى خىيارى شەنبەر
بېرىلىدۇ. ياكى قان ئېلىش بەك زورۇر بولغاندا، ئۇنىڭ
ئورنىغا ھىجامەت قويىلىدۇ. ھامىلدار ئايال ۋە ھامىل-
نىڭ ساغلام بولۇشى ئۈچۈن داۋائىل مىشكى (22 -
نۇسخە)، مۇقەررىھى ياقۇتى (84 - 85 - نۇسخىلەر) ياكى
مەشدىرتۇس (25 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(3) سىزىك ئالامەتلىرى 4 ئايلىقتىن ئالدىنقى
ۋاقتىدا بولسا توختىتىش ھاجەتسىز. ئۇندىن كېيىن
يەنە داۋاملىق كوڭلى ئاينىش، قۇسۇش يۈز بېرىپ سا-
لامەتلىكىگە تەسىر يەتكۈزسە ئۇنى توختىتىش لازىم.
(مەئىدە كېسەللىكلىرىگە قاراڭ). مەجۇنى كۈمۈنى (49 -
نۇسخە) ۋە سۈپۈپى مۇقەۋۋى مەئىدە (174 - نۇسخە)
بېرىلىدۇ.

(4) ھامىلدارلىقتا ھېمىز مىڭىپ كەتسە دەرھال
چارە قىلىش كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن قۇرىسى كەھرىبا

(71 - نۇسخە) بېرىلمىدۇ. ماشى، ئانار گۈلى، ئانار پوسى،
ئەنجۈرلەرنى سىركە بىلەن قاينىتىپ، تىرىپىلىرىنى قوساق
ۋە دوسۇنغا تېگىش لازىم.

(5) يۈرەك سېلىش، خاپىغان تۇتۇش ۋە پۇت دۈم -
جىسىگە ئىششىق پەيدا بولۇش قاتارلىق يۈرەك، بىرەرەك
ۋە مىڭە زەرەرلەنگەنلىك ئالامەتلىرى كورۇلسە سەۋەپلە -
رىگە قارىتا چارە قىلىنىدۇ.

(6) ئاي كۈنى يېقىنلاشقاندا ھەر كۈنى كەچتە
تاتلىق بادام مېغىزى يىيىش، چۈچىمەل نەرسىلەردىن
پەرھىز قىلىش لازىم. سېرىق چىچەك، بابۇنە ۋە زىغىر
ياغلىرى بىلەن بەل، توققۇز كۈز ئەتراپلىرىنى ياغلاپ
بېرىش لازىم.

كوپ بويىدىن ئاجراش (كەسرەتى ئىسقات)

ھامىلدارلارنىڭ بويىدىن ئاجراش (بالا چۈشۈپ
كېتىش) ئادەتتە تەسادىپى بويىدىن ئاجراش ياكى ئا -
دەتلەنگەن بويىدىن ئاجراش دەپ ئىككى خىلغا بۆ -
لىنىدۇ.

تەسادىپى بويىدىن ئاجراشنىڭ سەۋىۋى تاشقى زە -
خىلىنىش مەسلەن، يىقىلىش، بەلگە زەربە تېگىش
قاتارلىق تەسادىپى ھادىسىلەر تۈپەيلىدىن ۋە ئىچكى
جەھەتتىن ھامىلدارلىق كېسىلى ياكى ھامىلدارلىقتا كۆپ
قان كېتىش، ئىچ سۇرۇش، روھى تەسىراتلار، ھىڭگە
ئوخشاش سېسىق پۇراقلىق نەرسىلەردىن قاتتىق سە -

كىنىش ۋە قوپال جىنى ئالاقە قاتارلىق سەۋەپلەردىن
كېلىپ چىقىدۇ.

ئادەتلەنگەن (كوپ) بويىدىن ئاجراش ھەر قېم -
تىمقى ھامىلدارلىقتا، تۈۋەندىكى سەۋەپلەر تۈپەيلىدىن
بالا چۈشۈپ كېتىشتىن ئىبارەت بولۇپ، بالا چۈشۈپ
كېتىش ئادەتكە ئايلىنىپ قالىدۇ.

مىگە ۋە روھى كېسەللىكلەرگە ئوخشاش ئومۇمى
بەدەن كېسەللىكلىرى؛ بالىياتقۇ مىزاجىنىڭ ماددىلىق ياكى
ماددىسىز بۇزۇلۇشلىرى؛ بالىياتقۇ سۇيۇقلۇقلىرىنىڭ كوپ -
لىكى؛ بالىياتقۇ ئاغزىنىڭ بوشاپ كېتىشى (تەبىئى ياكى
كېسەللىك سەۋەپلىرى بىلەن)؛ بەدەن ئاجىزلاپ كېتىشى
تۈپەيلىدىن بويىدىن ئاجراش كوپ ئۇچرايدۇ.

داۋاسى: تەسادىپى چۈشۈكلەردە كەلگۈسىدىكى
ھامىلدارلىقتا مەزكۇر سەۋەپلەرگە دىققەت قىلىش، ھا -
مىلدارلىقتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلارغا ئەمەل
قىلىش لازىم.

ئادەتلەنگەن بالا چۈشۈپ كېتىشتە:

(1) مىگە، يۈرەكنى كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن مەجۇنى
مۇپەررىھى ياقۇتى (تەركمۇگە ياقۇت سېلىنغىنى يەنى
(84 - نۇسخە، داۋا ئىلمىشكى (22 - نۇسخە)، شەرئىتى
ئەۋرىشىم (86 - نۇسخە)، خەمىرى گازىۋان ئەلبەرى (32 -
نۇسخە) لەردىن بىرى ياكى ھەممىسىنى بېرىش، روھى
جەھەتتىن ئالامىدە دىققەت قىلىپ، ناچار تەسىراتلاردىن

ساقلاش لازىم؛ قۇرۇق - سوغاقلق نەرسىلەردىن پەرھىز قىلىشقا، ھول - ئېسىق نەرسىلەر ئىستىمال قىلىشقا بۇيرۇلىدۇ.

(2) بالىياتقۇ مىزاجى بۇزۇلۇشتىن بولغانلىقى بىلەن سەۋىيىگە قارىتا چارە قىلىش كېرەك (بالىياتقۇ مىزاجى بۇزۇلۇش ماۋزۇسىغا قاراڭ).

(3) بالىياتقۇ ئاغزى بوشاپ كېتىش، بالىياتقۇدا سۇيۇقلۇق كۆپىيىپ كېتىشلەردىن بولسا مائىل ئۇسول (105 - نۇسخە) ۋە شەرئىتى بۇزۇرى (130 - نۇسخە) بىلەن بىللە توۋەندىكى نۇسخە بېرىلىدۇ.

نۇسخە: ئايلىشى دورۇنەج ئەقرەبى ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، تېشىلىمگەن مەرۋايىت كەھرىما، ئۇد ھىندى

3 مىسقالدىن، ئۇشە، سۇمبۇل $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن. مەزكۇر دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، 2 با - راۋەر ھەسەل قوشۇپ مەجۇن ياساپ ھەر كۈندە تاماقتىن كېيىن بىر مىسقالنى قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ.

(4) ئورۇق - ئاجىز ھامىلدارلارغا قارىتا سەھرىتىش چارىلىرى قىلىنىدۇ (تۇغماسلىق بابىغا قاراڭ).

قىيىن تۇغۇت

سېمىز، بالىياتقۇسىنىڭ ئېغىزى سوغاقلق تەسە - رىدىن قورۇلۇپ قالغان، داس سۆڭىكى كېسەللىك ياكى تۇغما ھالدا تار بولغان ئاياللارنىڭ تۇغۇتى قىيىن ئۇ -

تىدۇ. بەزىدە ھامىلە توغرا كېلىپ قالغاندىمۇ تۇغۇش قىيىنلىشىدۇ. بۇنداقلارنىڭ ھامىلدارلىق دەۋرىدە ياكى ئۇنىڭدىن ئىلگىرى مەزكۇر ئالامەتلەر بولىدۇ (تۇغماسلىق بابىغا قاراڭ).

داۋاسى: قىيىن تۇغۇتنىڭ ئالدىنى ئېلىش بەك مۇھىم. چۈنكى نۇرغۇن ئەھۋاللاردا، ھامىلدارلىق مەزگىلىدە داۋاملىق تەكشۈرۈش، تېگىشلىك چارىلەرنى كۆرۈش ئارقىلىق قىيىن تۇغۇتنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. شۇڭا ھامىلدارلىقنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىن باشلاپلا تۇغۇت قوبۇل قىلغۇچىلار، دوختۇرلارغا تەكشۈر-تۈپ تۇرۇش، بالا قوساقتا توغرىسىغا يېتىپ قالغان بولسا، ئۆز ۋاقتىدا سىرتتىن ئايلىندۇرۇپ تۈزۈش؛ ھامىلدارلىقنىڭ كېيىنكى ئايلىرىدا يېتىۋالماي كۆپرەك مېڭىپ ھەركەتلىنىپ تۇرۇش كېرەك.

8 ئايلىقتىن كېيىن، بەدىنى قوبۇل قىلغىدەك مىقداردا سۈت ئىچكۈزۈپ تۇرۇلىدۇ.

ئاي-كۈنلىرى يېقىنلىشىپ قالغاندا مونچىغا چۇ-شۇپ تەرلىنىش، مۇناسىپ ھول-ئىسسىق مايىلار بىلەن ياغلىنىپ تۇرۇش كېرەك.

تولغاق باشلانغاندىن كېيىن، قۇندۇز قەرى بىلەن كۈندۈرنى سوقۇپ بۇرۇنغا تارتتۇرۇپ چۈشكۈرتۈش مۇمكىن. تۇغۇش ئالدىدا چوڭ-كىچىك نەرسە قىلدۇرۇش، ياغلىق تاماق بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش كېرەك.

خىيارى شەنبەر پوستىنى يۇمشاق سوقۇپ، قايناق سۇغا چىلاپ، بىنەپشە شەرۋىتى (74 - نۇسخە) ياكى ئوقۇت سۈيى بىلەن ئىچكۈزۈلسە بالا ئاسان تۇغۇلىدۇ.

بالا ھەمىيى چۈشمەسلىك

بالا تۇغۇلۇپ بولغاندىن كېيىن بالا ھەمىيى چۈشمەسە ياكى بالا ئولۇك بولۇپ، تۇغۇلماي قالسا، بۇنىڭغا دەرھال چارە قىلىش لازىم. بولمىسا ئايالنىڭ ھاياتىغا تەسىر يېتىدۇ.

ئالامەتلىرى: بالا ھەمىيى چۈشمىگەن بولىدۇ. بالا ئولگەن بولسا قۇساققا ھەركەت سېزىلمەيدۇ، قوسىنى سوۋۇپ كېتىدۇ، تومۇرى ۋە نەپسى تېزلىشىدۇ. ئولۇپ قالغان بالا ياكى ھەمىيىنى چۈشۈرۈش تەدبىرلىرى ئوخشاش.

مۈشكى تارامشى 2 مىسقال، پىرسىياۋشان، ئارچا مېۋىسى، تىرمىس، پۈدىنە ھەر بىرى 3 مىسقالدىن ئېلىنىپ، دورىلارنى سوقۇپ 2 مىسقال ناۋات قوشۇپ يېمىشكە بېرىلىدۇ.

كوندۇش، سىيادانلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ بۇرۇنغا تارتقۇزۇش ئارقىلىق چۈشكۈرتىلىدۇ (چۈشكۈرۈك كەلگەندە بۇرۇننى تۇتۇپ تۇرۇلسا، ئىچكى بېسىم قۇۋۋەتتىكى بىلەن ئولۇك بالا ياكى چۈشمىگەن بالا ھەمىيىنى چۈشۈپ كېتىشى مۇمكىن). ئەڭ ياخشى دوختۇرخانىلارغا

ئاپىرىپ، دوختۇرلۇق ئۇسۇللىرى ئارقىلىق تۇغۇتلۇق
 ئايالنىڭ بىخەتەرلىكىنى تەمىن قىلىش لازىم.
 تۇغۇتتىن كېيىن قوساق ئاغرىش ئەھۋاللىرى يۈز
 بەرسە، ئىچىشكە مائىل ئۇسول بۇيرۇپ، ئارپا سۈيى ۋە
 ياغلىق شورپا ئىچكۈزىلىدۇ؛ زىغىر شىمرىسى ھوققە قىلىنىدۇ.
 ئىزخىر، سۈتتەر، سەلىخەلەرنى قاينىتىپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

ھامىلىنى چۈشۈرۈش

ھامىلدارلىق ئايالنىڭ سالامەتلىكى ۋە ھاياتىغا
 خەۋپ يەتكۈزىدىغان ھاللاردا، ھامىلدارلىقنىڭ دەسلەپكى
 ئايلىرىدا تۈۋەندىكى چارىلار ئارقىلىق ھامىلىنى چۈ-
 شۇرۇپىتىشكە توغرا كېلىدۇ. لېكىن بۇ چارنى ھامىلىنىڭ
 ۋاقتى، ھامىلدار ئايالنىڭ سالامەتلىك ئەھۋالىغا قاراپ
 قوللىنىش زورۇر. بولمىسا ئانىنىڭ ھاياتى، سالامەتلى-
 گىگە زىيان يېتىدۇ.

چارىلىرى: ئۈلۈك بالىنى چۈشۈرۈش ۋە بالا
 ھەمىرىنى چۈشۈرۈش چارىلىرىنىڭ ھەممىسىنى بۇ مەق-
 سەت ئۈچۈن قوللىنىشقا بولىدۇ.

ئەپسەننى بىلەن شاتەرەنى بىرقانچە ھەسسە
 مىقداردا (3 - 2 مىسقال مىقدارى) ئېلىپ، قاينىتىپ ئى-
 چىشكە بېرىلسە ھامىلە چۈشۈپ كېتىدۇ.

كۈنجۈتنى سىركە بىلەن سوقۇپ قايناقسۇ قوشۇپ
 ئىچىشكە بېرىلىدۇ. يېرىم مىسقال ھىڭ، بىر مىسقال مور-
 مەككى، ئۈچ مىسقال قۇرۇق سۇزاپنى يۇمشاق سوغۇپ،

ئارچا مېۋىسى قايناتقان سۇ بىلەن ئىتە- ئاخشامدا بىر قېتىمدىن بېرىلە بولىدۇ (پۈتۈن دورا مىقدارىنى بىر كۈندە ئىككىگە بولۇپ ئىچىلىدۇ). 2 سەر گۈنجۈتنى سوقۇپ ئىككىگە بولۇپ ئىتە- ئاخشامدا بېرىلىدۇ. يۇقۇرقى چارىلارنى قىلىشتىن بۇرۇن ئايال موز- چىغا چۈشۈپ، قوسىغىنى ئىنەك پىتى يېغى بىلەن ياغ- لاپ، مايلىق شورپا ئىچىپ تۇرۇشى كېرەك. دورىلارنى بېرىش جەريانىدىمۇ بۇ چارىلار قىلىنىدۇ.

ھامىلدارلىقتىن ساقلىنىش چارىلىرى

جىنىسى ئالاقىدا ئەر كىشى مەنىنى سىرتقا چىقىرىش ئارقىلىق ئەرلىك ئورۇغىنى بالىياتقۇغا چۈشۈر- مەسلىك كېرەك. جىنىسى ئالاقىدىن كېيىن ئايال دەر- ھال ئورۇندىن تۇرۇپ بىرقانچە قېتىم سەكرەپ مەنىنى سىرتقا چىقىرىۋېتىشى مۇمكىن. تۆۋەندىكى شامچىلارنى تەييارلاپ، جىنىسى ئالا- قىدىن كېيىن ئايال كىشى جىنىسى يولىغا (بالياتقۇ بوي- ئىغايتكىدەك قىلىپ) قويۇۋالسىمۇ ھامىلدار بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش مۇمكىن.

ئانزار پوستى ئاستىدىكى گۈشلۈك قىسمى بىلەن زەمچىنى ياراۋەر مىقداردا سوقۇپ، ئازراق سۇدا نەمدەپ، شامچە تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتۇپ قويىلىدۇ. لازىم بولغاندا كۈنجۈت يېغى بىلەن ياغلاپ ئىشلىتىلىدۇ. پىننە بىلەن چاشقان مايىغىنى سوقۇپ، ھەسەل قوشۇپ شامچە تەييارلاپ ئىشلىتىلىدۇ.

جىنىسى ئالاقىدىن كېيىن، سوقۇلغان ساپ پىلا-
پىلنى ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ، پەلگۈچ بىلەن جىنى
يولىدىن كىرگۈزۈش لازىم.

يالغان ھامىلدارلىق (رىجا)

بەزى ئاياللاردا ھېچىز توختاپ كېتىپ، راست
ھامىلدارلىقنىڭ قىمەن بەلگىلىرى پەيدا بولىدۇ. بەزى-
لەردە ھەتتا قوساق چوڭىيىدۇ، قوسىقى تەۋرەيدۇ. بۇ
ئەھۋال يالغان ھامىلدارلىق دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋىبى: يالغان ھامىلدارلىقنىڭ ئەڭ كۆپ ئۈچ-
رايدىغان سەۋىبى بالىياتقۇدا ياكى قوساق ئىچىدە ھەر
خىل چوڭلۇقتا ئۈسمە گۆش پەيدا بولۇپ قېلىشتىن
ئىبارەتتۇر. بەزىدە قوساققا سۇ يىغىلىشۇمۇ يالغان ھا-
مىلدارلىق بەلگىلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

ئالامەتلىرى: يالغان ھامىلدارلىق بەلگىلىرى ھە-
قىقى ھامىلدارلىققا پۈتۈنلەي ئوخشاش بولۇپ كەتمەيدۇ.
مەسىلەن، بالا مىدىرلاش سېزىمى بالا تەۋرەگەندەك بول-
ماي، ناھايىتى سۇس بىلىنىدۇ ئەمما ئايال كىشى ھا-
مىلدار بولۇپ قالدىم دىگەن گۇماندا بولغانلىقى ئۈچۈن
بەزىبىر يوق سېزىملەرنى سەزگەندەك قىلىدۇ. ئەمما ئاي
كۈنى توشۇپ (ھەتتا ئاي يىللار ئوتتۇپ) كەتسىمۇ
تۇغمايدۇ.

يەلدىن بولغان يالغان ھامىلدارلىقتا قوساق
ئېلىگەندەك سېزىلىش، سانچىق پەيدا بولۇش ۋە ئاغ-
راسىمان قوساققا سۇ چۈشۈش ئالامەتلىرى كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: يالغان ھامىلدارلىقنىڭ سەۋەبىنى ئىشقا
ئىشلاش، ئەگەر بالىياتقۇدا گوش ئۇنگەن بولسا دەستە-
كارە (ئوپىراتسىيە) قىلدۇرۇش كېرەك.
ئەگەر قوساققا سۇ چۈشۈش تۈپەيلىدىن يالغان
ھامىلدارلىق بەلگىلىرى كېلىپ چىققان بولسا، قوساققا
سۇ چۈشۈش كېسىلىدىكى چارىلار كورىلىشى لازىم.
ھېيىز كۆپ كېلىش

ھېيىزنىڭ ئادەتتىن تاشقىرى كۆپ كېلىشى "كەسرەتى
ھېيىز"، ھېيىز ئۆز ۋاقتىدا كەلمەي ۋاقتىسىز كېلىشى،
توختاش ۋاقتىدا توختىماسلىقى "ئىستىھازە" دەپ ئاتى-
لىدۇ.

ھېيىز كۆپ كېلىش كېسلى سەۋەپلىرىگە قاراپ
بىرقانچە تۈرگە بولىدۇ:

1) قاننىڭ مىقدارى جەھەتتىن غەيرى تەبىئىيلىكى
تۈپەيلىدىن ھېيىز كۆپ كېلىش: ئالامەتلىرى — ئايالنىڭ
قول تومۇرى كۆپۈشكەن، رەڭگى قارامتۇل قىزارغان
ھالدا بولىدۇ.

داۋاسى: چوڭ يوتىغا ھىجامەت قويۇش، ئەمە-
جەننى چىڭ تېگىپ قويۇش كېرەك، ئىچىشكە قۇرسى
كەھرىبە (71 - نۇسخە) بېرىپ تۈۋەندىكى نۇسخىدىكى
ئاممىپ تەييارلاش جىنىسى يولىغا قويىلىدۇ.

نۇسخە: سۈرمە، ئانار گۈلى، زەمچى، دانىكا، كۈز-
دۇر، موزا، ئاقاقىيا ھەر بىرىدىن 3 مىسقالدىن

ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، قايناقسۇ بىلەن خېمىر قالىپ
شامچە ياساپ قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.

شەرۋىتى ئەنجىبار (72 - نۇسخە) نى يالغۇز ياكى
قۇرسى كەھرىبا بىلەن بىللە بېرىلىدۇ.

(2) ماددىلار سەۋىيىدىن بالىياتقۇ قانتومۇرلىرىنىڭ
ئېغىرى ئېچىلىپ قېلىشىدىن ھېيىز كۆپ كېلىدۇ.

ئالامەتلىرى: سەۋىيى خىلىتلارنىڭ ئالامەتلىرى
بولغاندىن تاشقىرى، بەدىنى ئاجىز، كەمقان بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن
1 - قىسىمدا كۆرسىتىلگەن چارىلەر قىلىنىدۇ.

(3) بەك كىچىك تۇرمۇشقا چىقىرىلسا كېيىنكى
چاغلاردا ھېيىز كۆپ كېلىدىغان بولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: يۇقۇرقىلار بىلەن ئوخشاش.
بۇ چارىلار بىلەن ھېيىز توختىمىسا ئانارگۇلى،

قىزىل گۈل، موزا، شاھى بەللۇتلارنى يۇمشاق سوقۇپ گۈل
يېغى قوشۇپ پاكىز پاختىغا سېلىپ جىنىسى يولىغا

تىقىپ قويۇش كېرەك.

بالىياتقۇ ياللۇغى ۋە جاراھەتلىرى

بالىياتقۇ ياللۇغى ۋە جاراھەتلىرى سىرتقى ئامىل
يەنى زەخمىلىنىش، تۇرۇلۇش ۋە يېقىلىش قاتارلىق

ھادىسىلەردىن؛ ئىچكى سەۋەپلەر - قىيىن تۇغۇت، تۇغۇت -
تىكى زەخمىلىنىشلەر ۋە ئىسسىق خىلىتلارنىڭ بالىيات -

قۇغا چۈشۈشى، پاسكىنىلىق تۈپەيلىدىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: دوسۇن بىلەن كىندىك ئارىلىقى

ئاغرىيدۇ. ئاغرىش بارغانسېرى ئېغىرلىشىپ قىزىتما پەيدا بولۇشى مۇمكىن. دەسلەپ جىنسى يولىدىن قانلىق سۇ - يۇقلۇق كېلىدۇ. بۇ بالىياتقۇ تومۇرلىرى زەرەرلەنگەنلىك ئىپادىسى بولۇپ، كېيىنچە مەزكۇر قانلىق سۇ قويۇقلۇق - شىپ، سېسىق پۇراق ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ياللۇغلىنىشنىڭ ئۇفۇنەتلەنگەنلىكىنى، يىرىك ئارىلاش سۇيۇقلۇق، كەلسە ياللۇغلىنىشنىڭ يىرىك پەيدا قىلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

داۋاسى: كۈشلۈك تاماقلار بېرىلمەيدۇ. قۇرسى

كەربىيا (71 - نۇسخە) بېرىش بىلەن تۈۋەندىكى نۇسخە - خىدىكى دورىنى تەييارلاپ جىنسى يولغا قويۇش ۋە ھوقنە ئۇسۇلى بىلەن بالىياتقۇغا بېرىش كېرەك.

نۇسخە: ئەنزۇرۇت، كۈلدۈر، خۇنساۋشان، مۇر -

مەككى، زەمچى، ئانار پوستى، جويۇز، سەرۋىلەرنىڭ ھەر بىرىدىن 5 مىسقالدىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەل - كەكتىن ئۆتكۈزۈپ، پاقا يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى ياكى ئانار

سۈيى بىلەن سۇيۇقلاندۇرۇپ پاختىغا مىلاپ جىنسى يولغا چوڭقۇر تىقىپ قويۇش كېرەك (بۇ ئۇسۇل تىبابەتتە فەرزىجە دىيىلىدۇ). ئەگەر يىرىك پەيدا قىلغان

بولسا، گۈل يېغى، بىنەپشە يېغى ۋە شېكەر سۈيىنى لازىم مىقداردا ئېلىپ، ھوقنە ئەسۋابى بىلەن بالىيات - قۇغا قويۇپ، يىرىك ۋە ئۇفۇنەت تازىلىنىدۇ. يىرىك

تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، مەلھەمى باسلىقۇن (177 - نۇسخە) ۋە گۈل يېغى بالىياتقۇغا ھوقنە قىلىنىدۇ.

بالياتقۇنىڭ يىرىڭلىق ئاقەمىسى (ناسۇر رەھىمى)

ئالامەتلىرى: بالياتقۇدىن داۋاملىق يىرىڭلىق زەرداپ سۇ كېلىدۇ، ئاغرىيدۇ، تارتىشىپ قېلىش ۋە مىڭگە زەرەر يېتىش خەۋپى بار.

داۋاسى: بالياتقۇ جاراھەتلىرىدىكى دورىلارنى كۆپرەك مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ. بالياتقۇ ئىششغان بولسا، تۆۋەندىكى نۇسخىدىكى شەرۋەت بېرىلىدۇ.

نۇسخە: چىلان 20 دانە، ئەينۇلا 15 دانە نىلۇفەر، ئاق لەيلى 3 مىسقال، شاتەرە، ھۇماما 5 مىسقالدىن، سەندەل، قەسبۇسزەرەرە، قىزىل گۈل ھەربىرى 2 مىسقالدىن، سانا 5 مىسقال. قۇرۇق ئۇزۇم 20 دانە، ئىت ئۇزۇمى، ئوسما ياپرىغى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، خاڭگا ئۇرۇغى، قو-غۇن ئۇرۇغى 5 مىسقالدىن، خىيارى شەنبەر بىر سەر، تەرەنجىبۇل 2 سەر، بادام يېغى 5 مىسقال. تەييارلاش ئۇسۇلى (172 - نۇسخە) بىلەن ئوخشاش.

ئاق خۇن كېسىلى (سەيلانى رەھىم)

خىلىتلار تەسىرى بىلەن بالياتقۇدىن دائىم ھەر-خىل سۇيۇقلۇقلار (قان ۋە سەۋدا، سەپرا، بەلغەمنىڭ كېرەكسىز غەيرى تەبىئى سۇيۇقلۇقلىرى)نىڭ چىقىپ تۇرۇشى ئاق خۇن كېسىلى (سەيلانى رەھىم) دەپ ئاتىلىدۇ.

بەلگىسى: خىلىتلارنىڭ غالىپلىقىغا قاراپ بەلگە-

لىرى، بولىدۇ. بىراق ئاق خۇن كېسلى يار ئاياللارنىڭ
چىرايىدا پاقىراق نۇر ئازىيىپ كېتىدۇ. روھى ئالامەت-
لەرمۇ بولىدۇ.

داۋاسى: قاندىن بولسا خەرنۇپ، جۇبتى بەللۇت،
كويدۇرۇلگەن موزىلارنى ھەببۇل ئاس سۈيى بىلەن
نەملەپ جىنىسى يولغا قويۇلىدۇ. سەۋدادىن بولسا كا-
زىۋان ۋە بالەنگۇ قاتارلىق دورىلار بىلەن ماددىنى
پىشۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، مەتبۇخى تەپتىمۇن بېرىپ
ماددا سۇرۇپ چىقىرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن 3 مىسقال
سەمىغى ئەرەبىنى قورۇپ، تالماكھانا، تەمرى ھىندى مې-
خىزىنى 2 مىسقالدىن ئېلىپ، ھەممىسىنى سوقۇپ كۈندە
2 مىسقالدىن قايناقسۇ بىلەن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بەل-
غەمدىن بولغان بولسا، ئايارەج پەيقارا بېرىپ بەلغەمنى
تازىلاپ بولغاندىن كېيىن - چىغىرتماق يىلتىزى، ئىز-
خىر، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، پاراسىۋىن، قارا ئوقۇتلارنى
ئېھتىياجغا لايىق ئېلىپ، قاينىتىپ تەمىنى چىقىرىپ،
مەزكۇر سۇغا 5 مىسقال ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە)
قوشۇپ جىنىسى يولغا ھوقنە قىلىنىدۇ. ئەگەر بالىيات-
قۇدا ئېچىشىش ئالامەتلىرى بولسا بۇ ھوقنەنى قىلما-
لىق كېرەك. سەۋدادىن بولغاندا مەتبۇخى ھېلىلە (38 -
نۇسخە) بېرىپ ئاندىن كېيىن پاقا يوپۇرمىغى ئۇرۇغى،
سېمىز ئوت، بالەنگۇ، بىيە ئۇرۇغى، ئىسپۇغۇل لۇئاد-
لىرىنى قاينىتىپ جىنىسى يولغا ھوقنە قىلىشقا ۋە ئى-
چىشكە بېرىلىدۇ.

ھېيىز كەلمەسلىك

ھېيىز توختاش يېشىغا بارماستىن تۇرۇپ ھېيىز كەلمەي قېلىش كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەللىك بولۇپ، ئاياللار سالامەتلىكىگە زور تەسىر يەتكۈزىدۇ. سەۋەپلىرىگە ئاساسەن بۇ كېسەل بىر قانچە خىلغا بۆلىنىدۇ:

قان ئازلىقتىن ھېيىز كەلمەسلىك:

سەۋىيى ۋە ئالامەتى: بۇرۇن كۆپ قان كەتكەن، ئىچ سۈرگەن ۋە كۆپ مىقداردا قان ئالغانلىق تارىخى بولىدۇ. ياكى ئۇزاق ئاچ قېلىش ۋە ئوزۇقلىنىش ئال-چارلىقلىرىمۇ سەۋەپ بولۇشى مۇمكىن. مۇنداقلارنىڭ چىرايى سېرىق، ئۆزى ئورۇق ۋە زەپىپ بولىدۇ.

داۋاسى: ئوزۇقلىنىشنى ياخشىلاپ قۇۋۋەتلىك تاماقلارنى بېرىش لازىم. تۇخۇم سېرىغىنى چالا پىشۇرۇپ بېرىش، گۆش ۋە ياغلىق شورپا، سۈت، شېكەرلەرنى ئىستىمال قىلىش ۋە كۆپرەك دەم ئېلىش كېرەك.

قان قويۇقلىشىپ قېلىشى ياكى قويۇق خىللىقلار قانغا قوشۇلۇپ قېلىشتىن ھېيىز كەلمەسلىك.

ئالامەتلىرى: بەدەنلىرى ئاق ۋە سۇس بولىدۇ. كۆكرەپ تۇرغان تومۇرلار تېرىدىن كۆتىرىلىپ تۇرىدۇ. سۈيدۈك كۆپ، ھەزىمى ناچار بولۇپ، تەرىتىدىن بەلغەم-دەك نەرسىلەر كېلىدۇ. كۆپ ئۇخلايدۇ، ھېيىز كەلسە خۇددى ئۆپكىنى قانسىراتقان سۈدەك سۇس قىزىل كېلىدۇ.

داۋاسى: پاقالچەككە ھىجامەت قويۇلىدۇ. ئايارەج

پەيقارا (16- نۇسخە) بىلەن ماددىلار تازىلىنىدۇ ياكى مۇنۇ نۇسخىدىكى دورىلار بېرىلىدۇ.

نۇسخە: چىڭسەي ئۇرۇغى، تىرشە 5 مىسقالدىن، رۇمبىدىيان، پىرسىياۋشان، قوغۇن ئۇرۇغى، پىننە، مۇشكى تارامىشى، ئارپا بېدىيان ھەربىرى 3 مىسقالدىن، گۈلقەن 2 سەر، دورىلارنى چالا سوقۇپ 2 چوڭ چىنە سۇ قۇيۇپ يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ، گۈلقەننى قوشۇپ، مەجۇنى پودىنە بىلەن (126- نۇسخە) بىر كۈندە ئىچىپ بولىدۇ.

باليئاتقۇ تومۇرلىرىنىڭ قېتىپ قېلىشىدىن ھېمىز كەلمەسلىك.

ئالامەتلىرى: تومۇر ھەرىكىتى مۇختىلىپ، بەدەن رەڭگى ئاق بولىدۇ. ئومۇمىي بەدەندە ئېغىرلىق ۋە روھى ئالامەتلىر كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: تۇغىياس كېسىلىدە كورسىتىلگەن چارد-لارنى قىلىش ۋە قۇرسى مۇرى مەككە (176- نۇسخە) بېرىلىدۇ.

قىزلىق پەردە پۈتەي بولغانلىقتىن ھېمىز كەل-مەسلىك: بالاغەتكە يەتكەن قىزلاردا ئۇچرايدۇ. ھېمىز كۈنلىرىدە دوسۇن قاتتىق ئاغرىپ چىقىلىدۇ. تەكشۈر-گەندە قىزلىق پەردە پۈتەيلىگىنى كۆرگىلى بولىدۇ.

داۋاسى: تىخ بىلەن كېسىپ يولنى ئېچىش كېرەك.

باليئاتقۇ چىقىپ قېلىش (خۇروجى رەھىم)

باليئاتقۇ پەيلىرى سوزۇلۇپ كەتكەندە بالىياتقۇنىڭ

بىر قىسمى توۋەلگە چۈشىدۇ. بەزىدە بالىياتقۇنىڭ پۇتۇن قىسمى جىنىسى يولىدىن چىقىپ قالىدۇ.

سەۋەبى: كۆپ بالا تاشلاش، ئىگىز چېيىدىن سەكرەش، ئېغىر يۈك كۈتىرىش، ئەمگەكنىڭ بەدەن قابىلىيەتىدىن ئارتۇق بولۇشى، تۇغۇتتىن كېيىن بالىياتقۇ ئەسلىگە كەلمەستىن تۇرۇپ ھەركەت قىلىش قاتارلىقلار سەۋەپ بولىدۇ. ئوتتۇرا ياشلىق ۋە قېرى ئاياللاردا كۆپ ئۇچرايدۇ. **ئالامەتلىرى:** ئالدى بىلەن بەل ۋە سۆڭ چىڭ.

قىلىش، تېلىش ۋە ئاغرىشقا ئوخشاش سېزىملار تەدرىجى ھالدا ئېغىرلىشىپ بارىدۇ، جىنىسى يولىدا بالىياتقۇ چىڭ قىلىپ سېزىلىدۇ. كېيىنچە روشەن ھالدا سىرتقا چىقىدۇ. ھەركەتكە دەخلى قىلىدۇ. ئىشتانغا سۈركىلىپ يارا ھاسىل قىلىدۇ. كېسەل بەك ئازاپ چېكىدۇ، شەلۋەرەپ تۇرىدۇ. **داۋاسى:** بالىياتقۇنى پىئاسكىنچىلىقتىن تازىلاپ،

توۋەنكى نۇسخىدىكى دورىلاردا يۇيۇپ، گۈل يېغى، ئاز-راق زەپەر ۋە باشقا خۇشپۇراق دورىلار بىلەن بالىياتقۇ يۇقۇرقى قىسمىنى ياغلاپ جىنىسى يول ئىچىگە كىرگۈزۈپ، توۋەندە يېزىلغان جىنىسى يولغا كىرگۈزىدىغان دورا نۇسخىسىنى تەييارلاپ، جىنىسى يولغا قويۇپ پاكىز لاتا بىلەن چىڭ قىلىپ تارتىپ ياغلاپ قويىلىدۇ. بۇ ئىش-لارنى ئايال ئۆڭىدا ياتقان شارائىتتا ئىشلىنىدۇ.

(1) نۇسخە: چىلان 15 دانە، ئاق لەيلى گۈلى 5 مىسقال، بىنەپشە 5 مىسقال، گازىۋان، قىزىلگۈل، ئىت ئۇزۇمى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، قۇرۇق ئۇزۇم

20 دانە، ئەينۇلا 10 دانە، قارا شېكەر بىر سەر، قىزىق زىلچا سۈيى، ئىت ئۇزۇم سۈيى 2 سەردىن، گۈل يېغى بىر سەر، دورىلارنى چالا سوقۇپ، ئېھتىياجغا لايىق سۇ بىلەن قاينىتىپ، تەمىنى چىقىرىپ سۇزۇپ، سۈيىگە شە- كەر، سۇيۇق دورىلار ۋە گۈل يېغى قوشۇپ تەييارلىنىدۇ. سىرتقا چىقىپ قالغان بالىياتقۇنى چايقاشقا ياكى بالىيات- قۇ تېخى سىرتقا چىقىمىغان بولسا جىمىسى يولغا ھوققە قىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ.

(2) نۇسخە: قورنە، مۇمىيا، تەبائىش، خەرنۇپ، پۇپەل، موزا، ئاقاقىيا، داۋا ھەر بىرى 4 مىسقالدىن، دورى- لارنى يۇمشاق سوقۇپ زەمچى سۈيى ياكى رەيھان سۈيى بىلەن سۇيۇلدۇرۇپ (ئوماچ ھالىغا كەلسە بولىدۇ) ئۆشكە تىۋىتى ياكى پاختىغا ئوبدان سىڭدۇرۇلىدۇ. يۇقۇرىدا كورسىتىل- گەن چارلەر بويىچە بالىياتقۇغا كىرگۈزۈلۈپ، ئاندىن مەزكۇر پاختىنى بالىياتقۇ گەۋدىسىگە يېقىن ھالدا جى- سى يولغا قويۇپ، ھېيىز لاتىسى باغلىغاندەك پاكىزە ماتا بىلەن تېگىلىدۇ. ئايال 7 كۈنگىچە ئورنىدىن تۇرماسلىقى ۋە ھەر قانداق ھەركەت قىلماسلىقى، 2 كۈنگىچە ئوڭدا ياتقان ھالىتىنى ئۆزگەرتەلمىگەن كېرەك. 3 - كۈنى يۇقۇرىدىكى دورا قايتا يەڭگۈشلىنىپ، داۋالاش بىر قانچە قېتىم تەكرارلىنىدۇ. ساقايغاندىن كېيىنمۇ ئېغىر نەرسە كۈتىرىشتىن ساقلىنىش لازىم.

يۇقۇرقى چارلەر بىلەن بىللە، توققۇز كۈز ۋە ئەمچەك ئاستىغا قان چىقارماي ھىجامەت قويۇش كېرەك.

بۇ كېسەلگە ئىشلىتىلىدىغان ھوققە دورىسى ياكى
جىنىسى يولغا كىرگۈزىلىدىغان دورىلارغا سېسىق پۇراقلىق
دورا ئەشپاللىرى قوشۇلۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

باليئاتقۇ يامان سۇپەتلىك ئۆسەمسى

(سەرتانى رەھىمى)

باليئاتقۇ ياللۇغى ۋە جاراھەتلىرى ساقايماي سەر-
تان (راك) قا ئۆزگىرىپ قېلىش ھادىسىسى خېلى كۆپ
ئۇچرايدۇ. سەۋىيى — سەۋدانىڭ كويگەنلىگىدۇر.

ئالامەتلىرى: بالىياتقۇدا قاتتىق ۋە ئېغىز ئالماي-
دىغان كۆكۈتمۇل قىزىل ئىششىق كورۇنىدۇ. قان ۋە
زەرداپ چىقىپ تۇرىدۇ، تۇتقانددا ئىسسىق بىلىنىدۇ.
ئېچىشىپ قاتتىق ئاغرىش كېسەلنى بەك ئازاپلايدۇ،
ئاغرىش كۆكرەك تەرەپلىرىگە قاراپ ماڭىدۇ. باش قات-
تىق ئاغرىپ كېتىدۇ. بەزىدە كوزمۇ ئاغرىيدۇ. كېسەل
تېز ئىزىرۇقلايدۇ. ئالدى بىلەن پاخالچەك گۆشلىرى يىگە-
لەپ كېتىدۇ، پۇت دۈمبىسى ئىششىپ، قوساققا سۇيە-
غىلىدۇ. كېيىن پۇتۇن بەدەنلىرى ئىششىپ ياكى ئورۇق-
لاپ قۇرۇپ ئۆلۈپ كېتىدۇ.

داۋاسى: كېسەلنى دەسلەپكى ۋاقتىدا تونۇپ، ئۆز
ۋاقتىدا دەستىكارە (ئوپپراتسىيە) قىلىپ داۋالانسا ھايا-
تىنى قۇتقۇزۇپ قالغىلى بولىدۇ. كېسەل ئازاپلىرىنى
يېنىكلىتىش ئۈچۈن بالىياتقۇ كېسەللىكلىرىدە كورسىتىپ
ئۆتۈلگەن ئاغرىق پەسەيتكۈچى ھوققە دورىلىرى ئىشلى-
تىلىدۇ ۋە ياللۇغلىنىشنى قايتۇرغۇچى دورىلار جىنىسى

يولغا كىرگۈزىلىدۇ. شۇمىشە، بابۇنە، زىغىر، بەسەي ئاتىدا
لەيلى، ھەمىشۋالارنى قاينىتىپ سۈيىدە ئولتۇرغۇزۇلىدۇ.

ھىستېرىيە (ئېھتىناقى رەھىمى)

”ئېھتىناقى رەھىمى“ سوزى بالىياتقۇ بوغۇلۇپ قې-
لىش دىگەنلىك بولۇپ، ئاياللاردا كۆپ ئۇچرايدىغان
ھىستېرىيە كېسەلىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇ تارتىشىپ قېلىش،
ھۇشىدىن كېتىش، بىر مەزگىل سۆزلىيەلمەس، كۆزى
كۆرمەس بولۇپ قېلىشتەك ئالاھىدە ئالامەتلەر بىلەن
ئوتىدۇ. ئۇنى تۇتقاق كېسەلدىن پەرقلىنىدۇرۇش لازىم.
ھىستېرىيىدە گەرچە سەۋەبىچى ماددا ۋە كېسەلنىڭ قوز-
غىلىشى بالىياتقۇدىن باشلانسىمۇ، مىڭە ۋە يۈرەك قاتار-
لىق باشقۇرغۇچى ئەزالارغا تەسىر كۆرسىتىپ يۇقۇرىدا
سوزلىنىدىغان ئالامەتلەر كېلىپ چىقىدۇ.

سەۋەبى: ئاياللار ھېيىز خۇنى كەلمەسلىك بالد-
ياتقۇ ئىچىدە ئۇقۇنەت ۋە بۇخارات پەيدا قىلىدۇ. ئۇلار
بالىياتقۇ تاملارغا تەسىر قىلىپ تارتىشىش ھالىتىنى
كەلتۈرۈپلا قالماستىن، بەلكى مىڭە ۋە يۈرەككە ئورلەيدۇ.
ئالامەتلىرى: كېسەل تۇتۇش ئالدىدا ئاغرىقنىڭ

ئەقلى - ھۇشى قاراڭغۇلىشىدۇ، باش ئاغرىيدۇ، كۆزى
قاراڭغۇلىشىدۇ، ئاغزى، بۇرۇنى ئىختىيارسىز ھەركەت
قىلىدۇ، رەڭگى تاتىرىدۇ، كۆزى ياشاڭغىراپ، دوۋسۇن
ساھەسىدە بىر يېقىمىزلىق پەيدا بولۇپ، يۈرەككە قا-
راپ ماڭغاندەك سېزىلىدۇ. پۇت - قوللىرى بوشىشىپ
كېتىدۇ، نەپەس ۋە تومۇر ھەركىتى تېزلىشىدۇ، كېسەل يە-

قىلىپ ھۇشىدىن كېتىدۇ. بۇ چاغدا رەڭگى ساغرىپ، تومۇر ۋە نەپەس ئېلىشلىرى ئاستىلىشىپ، سېزىملىرى يوقىلىدۇ. ھېستېرىيىنىڭ تۇتقاق كېسەلدىن پەرقلىنىدىغان يېرى شۇكى: تۇتقاق كېسەلدە بالىياتقۇغا مۇناسىۋەتلىك سەۋەپلەر ۋە ئالامەتلەر (ھېيىز كەلمەسلىك، جىنى تۇر - مۇشتىكى ئەھۋاللار ۋە بالىياتقۇ دوۋسۇندىكى يېقىمىز - لىقلار) بولمايدۇ. ئېغىزدىن كوپۇك كېلىپ تۇرىدۇ. ئەمما ھېستېرىيىدە كوپۇك كەلمەيدۇ.

كېسەل ھۇشقا كەلگەندىن كېيىن تۇتقاقلىق تۇت - قان چاغدىكى ئەھۋاللارنى سوزلەپ بېرەلەيدۇ. تۇتقاق كېسەلدە سوزلەپ بېرەلمەيدۇ. تۇتقاق كېسەلدە ھۇشسىز ھالەتتە ياتقاندا ئالاقرا - دىلىك بولىدۇ. قول ئالىقانلىرى ئوچۇق ياتىدۇ. ھىس - تېرىيىدە مۇنداق بولمايدۇ.

داۋاسى: كېسەل تۇتۇش بەلگىلىرى كورۇلگەندە بەدەن ۋە قول - پۇتلىرىنى ئۇۋۇلاش ۋە تېگىش لازىم. تۇز ۋە قىچىنى قاينىتىپ پۇتلىرىنى بۇيۇش، ھۇشسىز بولسا بەدەنگە سوغاق سۇ پۇركۇش لازىم. قۇندۇز قەرى، كۇندۇز، كۇندۇش قاتارلىق دورىلارنى چاۋۇش ۋە شور - پا قاتارلىق ئوتكۇر پۇراقلىق دورىلارنى قوشۇپ، سوقۇپ پۇرتىش لازىم. ياكى مۇقىل، گۇڭگۇرت ۋە بۇك - چۈ - پۇر قاتارلىق سېسىق پۇراقلىق نەرسىلەرنى كويىدۇرۇپ پۇرتىش؛ خۇشپۇراق مايلا، ئىپار، ئەنبەلەرنى يالغۇز ياكى باشقا خۇشپۇراقلىق سۇلاردا ئېرىتىپ، جىنى يول ئارقىلىق بالىياتقۇغا قويۇش كېرەك. كىنىدىك ئاستى،

پاقالچەك، تىز ۋە يوتا قاتارلىق جايلارغا ھىجىمەت قويۇش لازىم. بالىياتقۇنى ھەركەتلىنىدۇرۇش ئۈچۈن يىلىپىل، زەنجىۋىللىرىنى مۇۋاپىقى يىغاڭلار بىلەن جىنىنى يولغا قويۇش كېرەك. ئەھۋالغا قاراپ بۇ چارلىرىنى كېسەل ھۇشغا كەلگىچە تەكرارلاش مۇمكىن. ھۇشغا كەلگەندىن كېيىن، مىزاج ئەھۋالغا قاراپ، ماددىلارنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى ئىستەمخىقۇن (11 - نۇسخە)، ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە)، ئايارەج لۇغانىزىيا (175 - نۇسخە) دىن بىرى بېرىلىدۇ. ئەڭ ياخشى چارە ھەپتىمە بىر قېتىم ئايارەج پەيقارا بېرىپ ئارقىدىن مەجۇنى نۇجا (19 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئارىلاپ داۋاتىل، مىشكى (22 - نۇسخە) بىلەن ھەسەل سۈيى بېرىلىدۇ. ئەگەر تۇتقاقلقتىن كېيىن ھارارەت بولۇپ، كۆز ئىچى قىزىل تۇرسا، ئىسسىق تەبىئەتلىك دورىلارنى بېرىشكە بولمايدۇ. تۇتقاقلق ئوتۇپ كەتكەندىن كېيىن ھىجىمەت قويۇشنى ئويلاپ كۆرۈش مۇمكىن.

بالىياتقۇ سۇلۇق ئىششىقى

ئالامەتلىرى: ھېيىز توختايدۇ، قوساقنىڭ كىندىك ئاستى قىسمى دوۋسۇن ساھەسىدە ئىششىق كۆرىلىدۇ. باسقاندا خۇددى قوساق سۇلۇق ئىششىقىدەك سۇ بارلىق ئالامەتلىرى بولىدۇ، ئاغرىمايدۇ. جىنىنى يول ئارقىلىق تەكشۈرۈپ قارىغاندا، بالىياتقۇ چوڭىيىپ قالغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ. بالىياتقۇدىن سۇيۇقلۇق كېلىپ تۇرىدۇ. داۋاسى: سىقىلىشلىق قوساققا سۇ يىغىلىش چا -

رىلىرىدىن تاللاپ ئىشلىتىش، قەي قىلدۇرۇش، سۇيدۇك راۋان قىلىدىغان دورىلارنى بېرىش مۇمكىن. بەزىلەر خەربەق سەپىتىنى سوقۇپ قابىز دورىلار بىلەن جىننى يولغا قويۇشنى تەشەببۇس قىلىدۇ.

باليئاتقۇ يەلىك ئىشىغى

تىبابەتتە بۇ كېسەل بالىياتقۇنىڭ كوبچۇق قىلىدۇ. شى "نەفخەتى رەھى" دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋىبى: قىيىن تۇغۇت ياكى بالىياتقۇ مىزاجىنىڭ سوغاقتىن بۇزۇلۇشى بولۇپ، ئۇ بالىياتقۇ ھارارىتىنى تۈۋەنلەشتۈرۈپ قەيۇق يەل (بادى غەلىز) تۈپلىشىشقا ئېلىپ كېلىدۇ.

ئالامەتلىرى: كىندىك ئاستىدا دۈگىلەك ئىششىق كۆتىرىلىپ چىقىدۇ. كۆپۈپ ئاغرىيدۇ. ياسقاندا ئاغرىش يانپاش سۆڭىكى ئەتراپىغا ۋە مەئدە تەرەپكە قاراپ ما-ئىدۇ، چېكىپ كۆرگەندە ئاغرىدەك ئاۋاز بېرىدۇ.

داۋاسى: ئايارەج پەيقارا (16 - نۇسخە)نى بېرىپ يەل ماددىسىنى ھەيدەش لازىم. ئۇندىن كېيىن، يەل توپ-لىشىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن جەۋارش كۆمۈنى (49 - نۇسخە)، سىنجىرىدا (33 - نۇسخە) ۋە مائىل ئۇسۇل (105 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئىچىش ئۈچۈن بابۇنە، سېرىق چىچەك، مەرزەنجۇش، سۇزاپ، چىڭسەي ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان، ياۋا ئەمەن، زېرە ۋە جۇۋىنىلەرنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ بېرىلىدۇ. ھەم جىننى يولغا ھوققە قىلىنىدۇ. سېرىق چىچەك يېغى بىلەن سىرتتىن ياغلىنىدۇ.

XVI ماقالا. تاشقى ئەزا كېسەللىكلىرى

1 - پەسىل: تېرە كېسەللىكلىرى

تېرە كېسەللىكلىرى — تېرە ياللۇغلىرى، مودۇرلار، جاراھەتلەر، ھەر خىل يىرىڭلىق جاراھەت ۋە تۇرلۇك ئىششىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

تېرە ئاستى ھوكۇنەك توقۇلما يىرىڭلىق ياللۇغى
(فىلىگىمونى)

سەۋىبى: بۇزۇلغان ۋە بۇفۇنەتلەنگەن (مىكرۇپ-
لانغان) قان سەۋەپ بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: تېرىدىن كۆتىرىلىپ تۇرىدىغان كەڭ يېپىلغان تېرە ئاستى ئىششىقىدىن ئىبارەت بولۇپ، زەرەرلەنگەن تېرە قىزىرىدۇ. تۇتۇپ كۆرگەندە ئىسسىق سېزىلىدۇ. لوقۇلداپ چىدىغۇسىز دەرىجىدە ئاغرىيدۇ. يەرلىك تومۇرلار كۆپكەن ھالدا كۆرىنىدۇ. سۇيىدۇك قىزىل، تومۇ، ھەركىتى تېز بولىدۇ. ئىششىق بار جايغا قولنى قويۇپ تۇرۇلسا، يەرلىك تومۇرلارنىڭ قولغا ئۇرۇۋاتقاندا -

① فىلىگىمونى — ھازىرقى زامان تىبابىتىدە فىلىگىمونا دەپ

ئېيتىلىدۇ.

لىغى سېزىلىدۇ. ماددىنىڭ توپلىشى ئەھۋالىغا قاراپ چىقىلىش بارغانسېرى ئېغىرلىشىدۇ. ھارارەت كۆتىرىدەلىدۇ. مىنگە ۋە يۈرەككە تەسىر بەرگەندە شۇ ئەزالارنىڭ كېسەللىك ئالامەتلىرى كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: قارشى تەرەپتىن قان ئېلىش يەنى ئىششىق بەدەننىڭ ئوڭ تەرەپىدە بولسا سول تەرەپ، قان تومۇرلىرىدىن (قېپالدىن)، سول تەرەپتە بولسا، ئوڭ تەرەپ تومۇرلاردىن قان ئېلىش كېرەك. ئەگەر كېسەللىك يېڭىلا باشلانغان بولسا، يەنى ئىششىق قاتتىق، قىزارغان ۋە بەدەن ھارارىتى، يەرلىك تېرە ھارارىتى يۇقۇرى بولسا، ماددىلارنى قايتۇرغۇچى دورىلار، مەسىلەن، ئاق سەندەل، فوفەل، گىلى ئەزىمىتى، قىزىل سەندەل، مامشا، ئاقاقىيا، قىزىل گۈل، كاسىن ئۇرۇقلىرىنى لازىم مىقداردا ئېلىپ، ئازراق سوقۇپ، كاسىن سۈيى بىلەن (كاسىن ئەرەقى بولسا تېخىمۇ ياخشى) نەمدەپ ئىشىغان جان ئۈستىگە قويۇش لازىم. شۇ نەرسىنى چۈشىنىش كېرەككى بۇ دورىلارنى چېپىشتىن مەقسەت — يەرلىك ئورۇنغا ماددىغا قارشى قۇۋۋەت بېرىش ۋە ماددىلارنىڭ داۋاملىق كېلىشىنى توساشتۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن دورىلارنى قويۇشتا، تېرىنىڭ ساق قالغان چېگرا قىسمىغا كۆپرەك قويۇش لازىم. ئىششىقنىڭ تەرەققى قىلغان دەۋرىدە بولسا، يۇقۇرقىلارغا يۇمشاتقۇچى تەسىرگە ئىگە دورىلارنى — ئارپا ئۇنى كۆك يۇمىغاقسۇت، كۆك ئاق لەيلى، كۆك ھەمشىۋالارنى باراۋەر

مىقداردا ئېلىپ قوشۇش كېرەك. ئاندىن كېيىن پۇرچاق ئۇنى، ئاق لەيلى، ھەمشىۋا، بابۇنە قاتارلىق بوشاشتۇر-غۇچى ۋە تارقاتقۇچى دورىلارنى قوشۇپ چېپىش لازىم. ئىششىق قايتىش دەۋرىگە كەچسە ماددىنى تارقاتقۇچى بابۇنە، ئەكىللى مىلىك، زىغىر، شۇمشە قاتارلىقلارنى چېپىش لازىم. ئەگەر ماددىلار يىغىلىپ (ئىششىق تېخىمۇ كۆتىرىلىپ ئاقىرىپ مىلىقلىسا) زىغىر، ئەنجۇرنى سەقۇپ، ئازراق سۇ بىلەن نەمدەپ ئاغرىق جايغا قويۇپ تېگىلسا، ئېغىز ئېلىپ يىردىن چىقىپ كېتىدۇ. ئەگەر ئوزلىكىدىن ئېغىز ئالمىسا، تىغ بىلەن يېرىپ يىرىڭنى تامامەن چىقىرىۋېتىش لازىم.

تېرە ئاستى ھۆكۈنەك توقۇلما ياللۇغىنى داۋالاشتا ھەم تېرىدىكى باشقا ياللۇغلىنىشلىق جاراھەتلەرنى داۋالاشقا، يۇقۇرىدا كۆرسىتىلگەن تەرتىپ بويىچە چارە قىلىنىدۇ. ئەمما قۇلاق ئارقىسى، قولتۇق، چاتىراق، باش، كۆكرەكتىكى جاراھەتلەرگە قايتۇرغى دورىلارنى چاپقىلى بولمايدۇ. بولمىسا ماددا ۋە ئۇفۇنەتلەر باشقۇر-غۇچى ئەزالارغا ئۆتۈپ كېتىپ خەتەرلىك ئەھۋاللار كېلىپ چىقىدۇ. بۇنداقلاردا يۇمشاتقۇچى ۋە پۇشۇرغۇچى دورىلارنى چېپىپ، ئۆزىچە ئېغىز ئالدۇرۇپ يىرىڭنى چىقىرىش ياكى كېرەك كېسەل كىشىدە قەۋزىيەت بولسا تەمرى ھىندى، پۇنۇس، خىيارى شەتبەرلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، قايناقسۇدا تەمىنى چىقىرىپ ئىچكۈزىلىدۇ ياكى مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

قارا سان كېسىلى (سېقا قىلۇس) ①

تېرە ۋە گۆشنى كەڭ دائىرىدە چىرىتىپ ئولتۇرىدىغان خەۋپلىك كېسەللىك بولۇپ، خەلق ئارىسىدا قاراسان دىگەن نام بىلەن ئاتىلىدۇ.

سەۋىيى: قاننىڭ ئۇفۇنەتلىنىپ بوزۇلۇشى سەۋەپ بولىدۇ. كېسەل ماددىسى قان تومۇرلاردا بولۇپمۇ شىريان تومۇرلىرىدا توپىلىشىپ، گۆش ۋە تېرىلەرنىڭ ئوزۇق ۋە ھاۋا بىلەن تەمىنلىنىشىنى توساپ قويىدۇ. نەتىجىدە شۇ جاي ھاياتلىقتىن مەھرۇم بولۇپ ئولىدۇ. بۇنداق جاي يەنە ئۇفۇنەت ئۈچۈن ماكان بولۇپ، چىرىش تەرەققى قىلىپ ئەتراپقا تارايىدۇ. ھەتتا پۈتۈن بىر ئەزانى (قۇل - پۇتنى) چىرىتىپ، ئادەمنى ھالاك قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: دەسلەپتە زەرەلەنگەن جايدىكى سىزگى ئەسەپلىرى تولۇق زەرەرلىنىپ كەتمىگەنلىكتىن، ئاغرىش سېزىمى بولىدۇ. بەزىدە تېشىلىپ قان زەرداپ ئاقىدۇ. بەزىدە تېرىنىڭ يۈزى ساق كۆرىنىپ، تېرە ئاستى سېسىغان قوغۇندەك چىرىپ ماڭىدۇ، سېسىق پۇرايدۇ. ئەڭ ئالاھىدە ئالامىتى شۇكى، زەرەلەنگەن جاي قارا بولىدۇ. سىرتتىن قارىغاندا ئىشىشىغان، قارامتۇللاشقان تېرە ساق تېرىدىن ئايرىلىپ تۇرىدۇ، ھارارەت يۈز بېرىدۇ. بەزىدە

① سېقا قىلۇس: ھازىرقى زامان تىبابەتتىمۇ كانگرىنا دەپ

ئاتىلىدۇ.

مىڭە كېسەللىك ئالامەتلىرى يۈز بېرىپ مىڭە پەردىسىنىڭ ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشمۇ مۇمكىن.

داۋاسى: كېسەللىك دەسلەپكى دەۋرىدە بولسا ماددا چوڭقۇرلىشىپ، ئۇفۇنەت زىيادە بولۇپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن زەخمىلەنگەن جايغا ھىجامەت قويىلىدۇ. ھىجامە مەنتى ئىلاجىبار كۈچلۈك قويۇپ چوڭقۇر قاتلاملاردىكى بۇزۇق قاننى چىقىرىش كېرەك. ياكى تىغ بىلەن يېرىپ، گۆش ئارىسىدىكى قويۇق ماددىلارنى چىقىرىش لازىم. ئاندىن كېيىن زەخمىلەنگەن جايغا يۇرچاق ئۇنى، سەكە بىنەج ۋە سىرگىنى بىرلەشتۈرۈپ چېپىش لازىم. ياكى گىلى ئېرىمىنى، موزا، زەمچە كۈشتىسى قاتارلىقلارنى ھەسەل بىلەن قوشۇپ چېپىش كېرەك. ئەگەر كېسەل تەرەققى قىلىپ قارىداپ ماڭغان بولسا، ھايال قىلماستىن، مەزكۇر ئەزانى جەزراھلىق ئىلمى ① بويىچە كېسىپ تاشلاش شەرت.

يامان يارا (ھومرە، سۇرخى باد)

تېرە ئۈستىدە كۆتىرىلىپ تۇرىدىغان قىزىل زەڭلىك قاپارچۇقتىن ئىبارەت بولۇپ، سەپرادىن بولغىنى نۇقۇل يامان (خاس سۇرخى باد)، سەپرا ۋە قان بىلەن ئارىلاش بولغىنى نوقۇل بولمىغان يامان يارا (غەيرى خاس سۇرخى باد) دەپ ئاتىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: نوقۇل يامان يارىدا پاقىراپ تۇرغان

① جەزراھلىق ئىلمى — خەنزۇگىيە ئىلمى

توق قىزىل رەڭلىك كەڭ يېيىلغان ئىششىق (تېرە يال-
لۇغى) روشەن ھالدا تېرىدىن كۈتىرىلىپ تۇرىدۇ. قاتتىق
ئېچىشىپ كۆپكەندەك سېزىلىدۇ. بەدەن قىزىيدۇ، تۇتۇپ
كۆرگەندە تېرىمۇ قىزىق بولۇپ، ياسقاندا رەڭگى يوقىلىدۇ.
ئەتراپقا تارايدۇ. نوقۇل ئەمەس بولسا، ئانچە ئېچىش-
مايدۇ، ئەتراپقا كېڭەيمەيدۇ. ياسقاندا رەڭگى ئۈزگەرمەيدۇ.
ھەر ئىككىسىدە سۇيۇك قىزىل، قويۇق، تومۇر ھەركىتى
يوغان ۋە تېز بولىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى
ھېلىكە II (178 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بەدەن تازىلىنىپ
بولغاندىن كېيىن ھول قاپاق تىرىپى، سېمىز ئوت، ئو-
سۇڭ، پاقا يوپۇرمىغىنى بىرئاز يەنجىپ ئىسپۇغۇل لۇئابىنى
بىرلەشتۈرۈپ زەرەرلەنگەن جايغا قويۇش لازىم. تارقاق-
قۇچى دورىلارنى چېپىشنىڭ ھاجىتى يوق. ئەگەر قان
بىلەن سەپرا ئارىلاشقان بولسا ئاۋال قان ئېلىش،
ئاندىن كېيىن گىلى ئەرمىنى، ئاق سەندەل، قىزىل
سەندەللەرنى قايناقسۇ ئىچىدە تاشقا سۇرۇپ، زەرەرلەنگەن
جايغا سۇرتىلىدۇ.

كۆز يارا (جەمە)

گۆش ۋە تېرىنى چوڭقۇرلاپ يېپ ماڭمىغان يەل
كېسەل بولۇپ، بىزىلەر ئۇنى ئاتىشەك (سىفىلس) نىڭ
بىر تۈرى دەپ ئاتىلىدۇ.
سەۋەبى: غەيرى تەبىئى سەپرانىڭ قانغا قوشۇل-
شىدىن بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: يۇمىلاق دانىخۇرەكتەك مۇدۇرچاقلار

دىن ئىبارەت زەخمىلىنىشلەر كۆرسىلىدۇ. ئۇلار بىر ياكى بىرقانچە دانە بولۇشى كۆپىنچە بىر سىزىق ئۈستىدە تارقاق ياكى بىر جايغا غۇژمەكلەشكەن ھالدا تۇرۇشى مۇمكىن. مۇدۇرلار تەرەققى قىلىپ چوڭ جارا- ھەتكە ئايلىنىدۇ. بەدەنگە تاراپىدۇ، قاتتىق ئاغرىيدۇ. يارا تېزلا چوڭقۇرلاپ گۆش قاتلىمىغا يېتىپ بارىدۇ. ئوتتا كويىگەندەك ئېچىشىدۇ. زەخمىنىڭ تېگىدىن قىزىل گۆش كۆرىنىپ تۇرىدۇ. يىرىڭ ھاسىل بولمايدۇ. تولۇق، تەغرا داۋالانسا قەقچ باغلاپ، تېرە كىمەكلىشىپ ساقىيىدۇ.

داۋاسى: سەپرانى سۇرۇپ چىقىدىغان سۈرگە بېرىلىدۇ. سىركە ئالغان قاچىنىڭ تېگىدە قالغان لايىنى ئېلىپ كاپۇر، گىل ئەرمىنى قۇرۇپ جاراھەت ئۈستىگە سۈرتىلىدۇ. بۇ دورىنى كۈنىگە ئىككى قېتىم ئىستىگەن - كەچتە سۈرتۈش كېرەك. ئاچچىق ئانار كىندىگىنى تېشىپ، ئىچىگە ئىازراق سىركە قۇيۇپ، ئوت ئۈستىدە بىرئاز قويۇپ، سۈيىنى سىقىپ جاراھەتكە قويۇلىدۇ.

كۆيدۈرگە (قۇرۇھى ساھىلە)

سەۋىبى: غەيرى تەبىئى سەپرا بىلەن ئۇفۇنەتنىڭ بىرىكىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ. باشقا خىسلىتلارنىڭ كۆپ- كىنىمۇ سەۋەپ بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن يارا چىقىدىغان ئورۇن قاتتىق قىچىشىپ بىر ياكى بىر قانچە (كۆپىنچە بىر دانە)

قاپارتما ھاسىل بولىدۇ. بۇ قاپارتما دەسلەپتە قىزارغان ھالدا بولۇپ، كېيىنچە قارامتۇل رەڭگە كىرىدۇ، ناھايىتى قاتتىق ئاغرىدۇ. خۇددى ھەرە چاققاندىك، كويىگەندەك سېزىم يۈز بېرىدۇ. قاپارتما تېز ۋاقىت ئىچىدە ئويۇلغان جاراھەتكە ئايلىنىدۇ. ئەتراپتىكى ئەزالارغا تەسىر بېرىپ ياللۇغلىنىشلىق دائىرە ھاسىل قىلىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن تىۋىۋەندىكى نۇسخىدىكى مەتبۇخ بېرىلىدۇ:

نۇسخە: تەمرى ھىندى، فۇنۇس، خىيارى شەنبەر ھەربىرى بىر سەردىن. سېرىق ھېلىلە 2 سەر، ئىت ئۇ-زۇمى، كاسىن ئۇرۇغى، شاتىرە، سانا، قىزىل گۈل ھەربىرى 3 مىقالدىن، ئەينۇلا 20 دانە، چىلان 30 دانە، تە-رەنجىۋىل 2 سەر.

تەييارلاش: ئالدى بىلەن تەمرى ھىندى، فۇنۇس، خىيارى شەنبەر ۋە تەرەنجىۋىللەرنى ئايرىم قاچىغا سېلىپ، ئۈستىگە قايناقسۇ قۇيۇپ ئېرىتىپ راسا تەمى چىققاندىن كېيىن، داكا ئارقىلىق سوزۇلىدۇ. قالغان دورىلارنى سو-قۇپ، 2 چوڭ چىمە سۇغا بىر كېچە چىلاپ يېرىمى قالغىدەك دەرىجىدە قاينىتىپ سۇزۇپ، ئوبدان سىقىپ، يۇقۇرقى تەييارلىغان دورىلار بىلەن قوشۇپ بىر پىيالىدىن كۈنىگە 2 - 3 قېتىم ئىچىدۇ.

يۇقۇرقى دورىدىن مامىشا، روسۇت، ئاقاقىيالارنى كاسىن سۈيى بىلەن ئېزىپ جاراھەتكە چېپىلىدۇ. ھەم

تۈۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلار جاراھەتكە چېپىشقا بېرىلىدۇ:

نۇسخە: مۇزا، كۈندۈر، ھەربىرى 7 مىسقالدىن،
زاك، زەمچى، مۇرمەككى ھەربىرى 4 مىسقالدىن، زىرا-
ۋەند 12 مىسقال. دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ رەيھان
شارابى بىلەن سۇيۇقلاندۇرۇپ جاراھەتكە چېپىلىدۇ ياكى
چېپىشقا مەلھىمى ئىسپىداچ (179 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

ئارقا قارىسى

ئالامەتلىرى: ئىچىگە سۇ تولغان قاپارتمىلار پەيدا
بولۇپ، قاتتىق ئېچىشىدۇ، قېچىشىدۇ. كويىگە ئىدەك سې-
زىملەر بولىدۇ. قاپارتمىلار يېرىلىپ قەقەش باغلاپ،
كىپەكلىشىپ ساقىمىدۇ ياكى سېرىق سۇ چىقىپ تۇرىدۇ.
قاپارتمىلار سۇ يىغىشتىن بۇرۇن خۇددى توز (تاۋۇس)
قۇيرۇغىدەك سىزىقچىلار ھاسىل قىلىدۇ. بۇ ئالامەتكە
قاراپ بەزىلەر ئۇنى يەل يارا (سېفىلىس) نىڭ بىر خىلى
دەپ ئاتايدۇ.

داۋاسى: مەتبۇخى ھېلىكە (38 - نۇسخە) ۋە تو-
ۋەندىكى نۇسخىدىكى دورىلار بېرىلىدۇ.

نۇسخە: چىلان 100 دانە، تەمرى ھىندى 2 سەر،
ئانار دانىسى 4 سەر، ئارپا سۈيى، قاپاق سۈيى، ئىسپۇ-
غۇل لۇتابى ھەربىرى بىر شەردىن.

تەييارلاش: چىلاننى پارچىلاپ 3 چوڭ چىنە سۇ
قۇيۇپ، يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، ئۇستىگە ئىسپۇغۇل

لۇئابىدىن باشقىلىرىنى سېلىپ، تەمىنى چىقىرىپ سوزۇپ ئىسپۇغۇل لۇئابىنى قوشۇپ بىر پىمالىدىن كۈنگە 3 - 4 قېتىم بېرىلىدۇ. سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن: قەلەي تۈزى، مەدەستان، ئاق سەندەل 4 مىسقالدىن، كاپۇر، روسۇت ھەربىرى بىر مىسقالدىن، ئىسپۇغۇل لۇئابى 5 مىسقال. پاقا يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى 3 مىسقال، قىزىل گۈل لۇئابى بىر سەر. دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەل-مەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سۇ ۋە لۇئابىلار بىلەن قويۇق ئوماچتەك دورا تەييارلاپ، جاراھەتكە قويۇق چېپىلىدۇ ياكى پاكىز لاتىغا سۈركەپ جاراھەت ئۈستىگە قويۇلىدۇ. يىرىڭلاش ۋە شەلۋەرەشلەر كورۇلسە سۈركەشكە مەلھىمى ئىسپىداچ (179 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

سۇلۇق قاپارتما

ئالامەتلىرى: كويگەندە ھاسىل بولىدىغان پۇرچاق ياكى ئۈنىڭدىن چىڭراق سۇلۇق قاپارتىملار.

داۋاسى: قالنى تازىلاش ئۈچۈن ئىسچىشكە ئانار شەرىۋىتى، چىلان شەرىۋىتى، يىمىشكە سىركە بىلەن پىشۇرۇلغان ماش، چىلان بېرىلىدۇ. پاكىزە يىڭنە بىلەن جا-راھەتنىڭ سۈيىنى چىقىرىۋېتىپ، ئاندىن زەچىۋە، خىنە، قىزىل گۈل 4 مىسقالدىن، زەپەر، كاپۇر يېرىم مىسقالدىن ئېلىپ، سوقۇپ بىرئاز گۈلەپ بىلەن سۇيۇقلاندۇرۇپ قاپارتىملارغا چېپىلىدۇ ياكى مەلھىمى ئىسپىداچ (179 - نۇسخە) بىلەن ياغلىنىدۇ.

يەلتاشما (شەرا)

ياپىلاق قىزىلغا مايىل قاپارتمىلار بولۇپ، ئىشەك يېمى دەپمۇ ئاتىلىدۇ.

سەۋىيى: ئوت، قان ۋە بەلغەم ماددىلىرىدىن ھاسىل بولغان يەللەر سەۋىيىدىن كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆپىنچە تۇيۇقسىز قىچىش ۋە بىئاراملىق بىلەن بەدەندە قىزىل قاپارتمىلار پەيدا بولىدۇ. ئۇلار ياپىلاق شەكىلدە، تېرىدىن ئېنىق ھالدا كۆتىرىلگەن ھەرخىل چوڭلۇقتا بولۇپ، بەزىلىرى تېرىدىن كۆتىرىلىپ چىقىماسلىقى مۇمكىن. بەزىلىرىدىن سۇ ئاقىدۇ. قان ماددىسى سەۋىيىدىن بولسا، بەدەندە باشقا قان غالىپلىق بەلگىلىرى — قىزىتما، نەپەس ۋە تومۇر ھەرىكىتى تېزلىشىش، كۆز ئىچى قىزىرىشتەك ئالامەتلەر بولۇپ بەدەنگە كەڭ تارقىلىپ تۇرىدۇ. سەپرادىن بولغانلىرى ئانچە قىزىل بولماي، ئېچىش ۋە قىچىش ئېغىر بولىدۇ. بەلغەمدىن بولغاندا رەڭگى تېرە رەڭگىدىن ئانچە پەرقلىنىمەيدۇ. ئەمما قاپارتمىلار چوڭ ۋە تېرىدىن خېلى كۆتىرىلگەن ھالدا بولىدۇ. كېچىسى كۆپ قىچىشىدۇ.

داۋاسى: ئانار شەرىتى (47 - نۇسخە)، ئەينۇلا ۋە قارا ئورۇك سۇلىرىنى بېرىش لازىم. ھارارەت ۋە بىئاراملىق زىيادە بولسا قۇرسى كاپۇر (76 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. يەرلىك قىزىتمىنى پەسەيتىش، تېرىنى يۇمشىتىپ تەر توشۇكلىرىنى ئېچىش ئۈچۈن گۈلاپ، سىركە، گۈل

يېغىنى ئارىلاشتۇرۇپ تېرىگە سۈركەشكە بېرىلىدۇ. ياكى پاقا يوپۇرمىقى، پالەك، ئوسۇڭنى يانچىپ سۈركەش ۋە سىركە بىلەن پىشۇرۇپ يىمىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. بەلغەمدىن بولغانلىرىدا ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن مەتبۇخى ھېلىلە (38 - نۇسخە)گە تۇربوت قوشۇپ بېرىلىدۇ. ھەسەل بىلەن تەييارلىغان ئىسكەنجىۋىل بېرىش مۇمكىن. مونچىغا چۈشۈش پايدىلىق.

تېلما (ماشىرا)

خەلق ئىچىدە تېلما ۋە ماش يارا دىگەن نام ئاتىلىدىغان كېسەللىك بولۇپ، كۆپىنچە يۈزدە، باشتا پەيدا بولىدۇ. بەزىلەر بۇنى يۈزدىكى پەلغۇمنى دەپمۇ ئاتىغان.

سەۋىيى: قىزىق قان بىلەن سەپرا بىرىكىپ ئۇ - فۇنەت پەيدا قىلىشىدىن تېرە ئاستىدا يۈز بەرگەن يامان ياللۇغلىنىشتىن ئىبارەتتۇر.

ئالاھىدەلىرى: ئالدى بىلەن يۈز قىزىرىپ قىچىشىغا باشلايدۇ. كېيىنچە يۈز، پىشانە، قۇلاقنىڭ ئالدى - كەينى، ھەتتا پۇتۇن باش قىسمى ئىششىيدۇ. ئوتتا كۆيگەندەك كۇيۇپ، ئېچىشىپ قاتتىق ئاغرىيدۇ. باش، قۇلاق ۋە بويۇنلارمۇ زىڭىلداپ ئاغرىيدۇ. ماددا مىڭە قانتومۇرلىرىغا چۈشۈپ قالسا سەرسام، مىڭە يەردە ياللۇغنىڭ ئالاھىدىلىرى بىلەن كېلىپ، ئېغىر ھاللاردا ئۆلۈمگە ئېلىپ بارىدۇ.

داۋاسى: غول، باش ئارقا قىسمىنى تىلىپ

ھىجامەت قويىلىدۇ. ئىچىنى يۇمشىتىش ئۈچۈن شەرىپى
فەۋاكە (15 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئاق سەندەل، روسۇت،
گىلى ئەرمىنى، كوك يۇمغاقسۇت، سېمىز ئوت، ئىت ئۇ -
زۇمى قاتارلىقلارنى بىرلەشتۈرۈپ ئازراق يەنجىپ، گال،
بويۇن، كۆكرەك ئەتراپىغا سۈركەش ۋە ئېغىز، تاماقنى
چايقاش لازىم. ئازراق كاپۇرنى گۈلاپتا ئىسرىتىپ، توخۇ
پېمى بىلەن يۈزگە چېپىش كېرەك. كېسەلگە دائىم ماش،
چىلان ۋە يۇمغاقسۇتلارنى قاينىتىپ بېرىلىدۇ. بەزىلەر
ياشتى ئوبدان ئوراپ تۇرۇپ يېشىل ماش قاينىتقان
سۇنىڭ ھورى بىلەن يۈزنى تەرلىتىش ۋە يېشىل ماشنى
پىشۇرۇپ ئارپا سۈيى ۋە كوك يۇمغاقسۇت بىلەن ئىچى -
رىشنى تەكلىپ قىلىنىدۇ. ئۈمۈمەن تىلىمنىڭ داۋاسى ھول
سوغاقلىغىنى ئاساس قىلىش لازىم.

بەزىلەر ياللۇغى (مۇغابىن)

قۇلاق ئارقىسى، قولتۇق ۋە چاترادىكى بەزىلەرنىڭ
ياللۇغى بولۇپ، بۇ خىل بەزى ياللۇغى تىئۇن (چۇما)
كېسىلىدىكى بەزى ئىششىقتىن پەرقلىنىدۇ، خەتەرلىك
ئەمەس.

سەۋەپلىرى: (1) باشقۇرغۇچى ئەزالار ئوزىدىكى
ماددىلارنى يېقىن ئورۇنلاشقان چوڭ بەزىلەرگە چۈشۈرىدۇ.
شۇنىڭ بىلەن مەزكۇر جايلاردىكى بەزىلەر ئىششىق روشەن
ھالدا ئىششىق كۆتىرىلىپ چىقىدۇ.

(2) ئەزالارنىڭ بىرىدە (تاشقى تەرەپتە) يىرنىڭ

ۋە ئۇفۇنەتلىك ياللۇغلىنىش پەيدا بولغاندا مەزكۇر جايغا يېقىن بولغان جايدىكى بەزلەردە ئىششىق پەيدا بولىدۇ. بۇ بەدەننىڭ قوغدىنىش چارىلىرىدىن بىرىدۇر.

مەسىلەن، ئاياقلاردىكى جاراھەتلەردە چاتراغا "يۇمشاق" چۈشىدۇ ۋە باشقىلار. بۇنى بەزى كىتاپلاردا "باغىرە" دىگەن نام بىلەن يازىدۇ.

ئالامەتلەرى: مەۋجۇت سەۋەپلەرگە ئاساسەن، چوڭ-كىچىكلىكى ئوخشاش بولمىغان ئىششىقلار كۆرىنىدۇ. ئاغرىيدۇ. بېسىپ كۆرگەندە بەزىلىرى مىدىرلايدۇ، بەزىلىرى مىدىرلىماسلىقى مۇمكىن. ئەمما ياللۇغلىنىش ئالامەتلىرى روشەن بولمايدۇ. كۆپىنچە قۇلاق ئارقىسى، قولتۇق، چات-لاردا كۆرىلىدۇ.

داۋاسى: سۈرگە بېرىش كېرەك. ئېغىر بولمىغاندا ئالامەت سۈرگە بېرىش ياكى قان ئېلىش ھاجەت ئەمەس. بىنەپشە رەڭلىك پارپىنى ئىملىمان سۇدا تاشقا سۇرۇپ ئىششىق ئۈستىگە بىرقانچە قېتىم چېپىش كۇپايە قىلىدۇ (مەسىلەن، ئادەتتىكى يۇمشاقلاردا). ئەگەر باشقۇرغۇچى ئەزالار جۈملىدىن مىڭنىڭ زەرەرلىنىش ئالامەتلىرى بار بولسا، ماددىنى يۇمشاتقۇچى دورىلاردىن بىنەپشە گۈلى، ئاق لەيلى گۈلىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئازراق گۈل يېغى ياكى بىنەپشە يېغى بىلەن ئىششىققا چېپىلىدۇ. شۇنىڭغا دىققەت قىلىش كېرەككى، ماددىنى قايتۇرغۇچى دورىلارنى چاپماسلىق لازىم. چۈنكى مۇنداق قىلغاندا ماددا ئەسلى كەلگەن جايىغا قايتىپ كەتسە يامان ئاقىۋەت كەلتۈرۈپ

چىقىرىشى مۇمكىن. ئەگەر ماددىلار كۆپ يىغىلىپ يىرىك پەيدا قىلغان بولسا، ماددىنى پىشۇرۇپ ئېغىز ئالدۇرىدىغان دورىلارنى ئىشلىتىشكە توغرا كەلسە، يۈرەك، مىڭە ۋە جىگەر قاتارلىق باشقۇرغۇچى ئىزالارنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش چارىلىرىنى بىللە ئېلىپ بېرىش لازىم.

چىققان (دومۇل)

سەۋىيى: غەيرى تەبىئى قان ماددىسى سەۋەپ بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: دەسلەپتە كىچىك، قىزىل رەڭلىك قاپارتما پەيدا بولۇپ، بارغانسېرى چوڭىيىپ ئۇچى ئۇچلۇق، تۈۋى يوغان مۇنەككە ئايلىنىدۇ. شۇڭا خەلق ئارىسىدا "تۈۋى يوغان"، "كوتى يوغان" دەپمۇ ئاتايدۇ. قاتتىق ئاغرىيدۇ، يەرلىك قىزىتما يۈز بېرىدۇ، بەزىدە ئومۇمەن بەدەن قىزىشمۇ مۇمكىن. گايىدا ياپىلاقلىشىپ قالىدۇ، يىرىك زەرداپ يىغىدۇ.

داۋاسى: دەسلەپكى مەزگىلدە پاقالچەككە ھىجامەت قويۇش؛ خىلىت ئەھۋالغا قاراپ سۈرگە بېرىش ئارقىلىق ماددىنى بەدەندىن چىقىرىپ تاشلاش لازىم. ئىچىشكە ئىسكەنجىۋىل بېرىلىدۇ ۋە قۇپەل، كاپۇرنى گۈلاپتا تاشقا سۇرۇپ چىقارغا چېپىلىدۇ. ياكى سېمىز ئوت، ئىسپۇغۇل، لۇئابى، گۈلاپلارنى چېپىش كېرەك. بۇ دورىلارنى قىلىپ 3 كۈندىن كېيىن ئىسپۇغۇل بىلەن تۇخۇم ئېقى چېپىلىدۇ. بۇنىڭدىن مەقسەت ماددىنى يىغىش ۋە پىشۇرۇشتۇر. ماددا

يىغىلىپ پىشقاندا (ئۇچى ئاقارغاندا) پاكىز تىغ بىلەن يېرىپ يىرىڭنى چىقىرىۋېتىش لازىم ۋە گەش ئۇندۇرۇش ئۈچۈن ئانار گۈلى، موزا، سەبزە، زەچچۈنلەرنى سوقۇپ بېسىش كېرەك.

چىقانىنىڭ ھەممىسى ئۈزۈچە ئېغىز ئالمايدۇ. ياكى بىرلا قېتىم بىلەن يىرىك تازىلىنىپ كەتمەيدۇ. ياكى بىرقانچە يەردىن ئېغىز ئېلىپ خېلى ۋاقىتقىچە يىرىك ئېقىپ تۇرىدۇ. شۇڭا ماددىلارنى پىشۇرىدىغان كۈچلۈگرەك دورىلارنى بېرىش لازىم (ئادەتتە كۆپ يەردىن ئېغىز ئالغانلىرى "غەلۋىرەك" دەپ ئاتىلىدۇ).

نۇسخە: ئەنجۈر، مەستىكى، مەرزەنجۇش، گىلى ئەر - مىنىلەرنى 3 مىسقالدىن ئېلىپ دورىلارنى يۇمشاق سۇ - قۇپ بىر ئاز دوغاپ بىلەن نەمدەپ، قىرىتىپ چاراهەت ئۈستىگە قويۇپ تېگىلىدۇ ياكى خېمىرتۇرۇش، تۇز، زىغىر يېغى، ھەسەللەرنى مەلەمدەك قىلىپ يارىغا قويۇپ تېگىلىدۇ. ماددا پىشىپ تەييارلانغانلىقى بىلەن سەبىز ئالمىدۇرۇش ئۈچۈن تۈۋەندىكى دورىلارنى چېپىش كېرەك: خېمىرتۇرۇش، كەپتەر مايىغى، سۇ تەگمىگەن ھاك، تۇ - خۇم سېرىغى، ھەسەللەرنى لازىم مىقداردا ئېلىپ، مەلەم تەييارلاپ چاراهەت ئۈستىگە قويۇش كېرەك. يىرىڭنى تولۇق چىقىرىش ئۈچۈن قائىدە بويىچە يېرىش ئەڭ ياخشى چارە.

چىقان پەيدا بولغان كۈندىلا سۇ تەگمىگەن ھاكى

تۇخۇم ئېقى ياكى كۈنجۈت يېغىغا ئارىلاشتۇرۇپ چاپساق،
ئۇ يوقاپ كېتىدۇ، چوڭىيىپ يىرنىڭ يىغمايدۇ.

بەزى كىشىلەرگە چىققان كۆپ ياكى ھەر يىلى
چىقىدۇ. مۇنداق كىشىلەر ھەر يىلى ياز (باھار) پەسلىدە
مىزاج ئەھۋالىغا قاراپ سۈرگە ئىچىپ بەدەننى تازىلاپ
تۇرۇشى لازىم.

يىرنىڭ خالىتىسى (دۈبەيلى)

ئالامەتلىرى: دەسلەپ كۆرىلىدىغان ئالامەتلىرى
چىققانغا ئوخشاش ئەمما جاراھەتنىڭ رەڭگى تېرە رەڭگە
كىيىن پەرقلىنمەيدۇ، تېرە ئاستىدا كەڭ يېيىلىپ بىلىنمە
مەستىن يىرنىڭ - زەرداپ يىغىلىدۇ. يۇمۇلاق ياكى ياپى-
لاق شەكىلدە تېرىدىن سەل كۆتىرىلگەن ئىششىق ھاسىل
بولىدۇ. باسقاندا ئاغرىيدۇ. يالۋاغلىنىشنىڭ تەرەققى قى-
لىشى ۋە ماددىنىڭ يىغىلىش ئەھۋالىغا قاراپ ھارارەت،
ئاغرىش يۈز بېرىدۇ، يىرنىڭ خالىتا ئۈزە بولسا باس-
قاندا قاتتىق ئاغرىيدۇ ۋە بېسىلغان ئورۇن ئويمانلىشىدۇ.
يىرنىڭ خالىتا بەك چوڭقۇردا بولسا ئويمانلاشمايدۇ،
ئاغرىش ئانچە كۈچلۈك بولمايدۇ، تەرەققى قىلسا گۆشلەر
چىرىپ كېتىدۇ.

داۋاسى: مۇۋاپىق دورىلارنى بېرىپ ماددىلار تو-
مۇردىن چىقىرىلغاندىن كېيىن تېرىنى ئېپىزلىشتۈرۈش،
يىرنى سۈيۈلدۈرۈش ۋە پىشۇرۇش چارىلىرىنى قىلىش
كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن زەيتۇن يېغى، گۈل يېغى، كالى-

نىڭ بۈرەك يېغى، زىغىر ۋە شۇمىشە شىرىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ زەرەرلەنگەن جايغا چېپىش لازىم. ئەڭ ياخشى مەلھىمى داخىلىئون (۱۷۷ - نۇسخە) نى سۈركەش كېرەك. ماددا پىشقاندىن كېيىن تېرە ئاستى يۇمشاپ مېلىقلاپ كېتىدۇ. بۇ چاغدا تىغ بىلەن يېرپ يىرىڭنى چىقىرىش لازىم. ئەگەر يىرىڭ بەك كۆپ بولسا، بىراقلا چىقىرىشقا بولمايدۇ، پاكىزە داكا تىقىپ قويۇپ ئاستا - ئاستا ئېقىتىپ چىقىرىش لازىم. چۈنكى كۆپ مىقداردىكى يىرىڭنى بىراقلا چىقىرىش بىلەن كېسەل كىشى ئايلىنىپ كېتىشى مۇمكىن. يىرىڭ تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن يېڭى گۆش ئۇندۇرۇش ئۈچۈن - مەدەستاندىن 5 مىسقال، گۈل يېغى، سىركىدىن بىر مىسقالدىن، قەلەي كۈشتىسىدىن 5 مىسقال، كاپۇردىن بىر مىسقال ئېلىپ، ئالدى بىلەن مەدەستاننى يۇمشاق سوقۇپ، سىركە بىلەن ياخشى ئارتلاشتۇرغاندىن كېيىن، گۈل يېغى قويىلىدۇ، ياغ بىلەن ئوبدان ئېلىشىپ بولغاندىن كېيىن ئۈستىگە قەلەي كۈشتىسىنى سېلىپ تەييارلىنىدۇ. ۋە جاراھەت ئىچىگە كىرگۈزۈپ ياغلىنىدۇ.

بەندە يىرىڭلىق خالتا بەك چوڭقۇر بولسا، يارغاندا يىرىڭ چىقىماستىن تۇرۇپ قان چىقىشى مۇمكىن، بۇ چاغدا يىرىڭ يوق دەپ ئەمەلنى توختىتىپ قويماستىن ئېھتىيات بىلەن چوڭقۇر يېرىش لازىم. بۇنداق چوڭقۇر يىرىڭلىق خالىملاردا ماددىنى سۇيۇقلاشتۇرۇشنى ئاساس قىلىپ سىرتتىن دورا چېپىش لازىم.

ئاغرىقسىز ئىششىقلار (ۋەزەمى روخۇد)

بەدەندە ئاغرىمايدىغان ۋە ياللۇغلىنىشنىڭ باشقا بەلگىلىرى بولمايدىغان ئىششىقلار بولىدۇ. ئۇلار "روخۇد" ياكى "تۇزما" دەپ ئاتىلىدۇ.

سەۋەبى: مىزاج بۇزۇلۇشى ياكى بەلغەم ماددىسىنىڭ غالىپ بولۇشى ئاساسىي سەۋەپلىرىدىن ئىبارەتتۇر.

ئالامەتلىرى: بەدەندە تېرە ئۈستىدىن خېلى كۆپ تىرىلىپ تۇرغان ھەرخىل چوڭلۇقتىكى ئىششىقلار بولىدۇ. باسقاندا ئوتتۇرىسى ئويما ئېلىشىدۇ، ئاغرىمايدۇ، قىزارمايدۇ. بەدەندە ھارارەت بولمايدۇ. ئەمما شۇ جايدا ئېغىرلىق سېزىلىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن بەلغەم ماددىسىنى پىشۇرىدىغان چارلارنى قىلىپ، سۈرگە ئۈچۈن ھەبىي ئايارەج (7 - نۇسخە) ۋە ھەبىي رەۋەن (128 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. چېپىش ئۈچۈن تۇز بىلەن زەيتۇن يېغى بېرىلىدۇ. ماددىنىڭ قايتا يىغىلماسلىقى ئۈچۈن بورە ئەرەمنى، تال ياغىچىنىڭ كۈلىنى سىركەگە ئارىلاشتۇرۇپ چېپىشقا بېرىلىدۇ. ياكى ئاقاقچا، سەبزە، سەندە، شىپاقى مامشا، زەپەرگىلى ئەرەملىرىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇمىلاق شاق سوقۇپ، سىركە بىلەن ئوماچ ھالىتىدىكى سۇيۇق دورا تەييارلىنىدۇ ۋە داڭغا سۈركەپ روخۇد ئۈستىگە قويۇپ تېگىلىدۇ.

يەل ئىششىق (نەۋىغە)

يۇقۇرىدىكى ئاغرىماسلىق ئىششىق بىلەن ئوخشاش كورۇندۇشتە بولىدۇ، ئەمما قاتتىق ئەمەس. باسقاندا يوقىلىپ كېتىدۇ، قويۇپ بەرسە يەنە ئوز ھالىغا كېلىدۇ. سەۋەبى: قويۇق يەلدىن ئىبارەت.

ئالامەتلىرى: ھەرخىل چوڭلۇقتىكى شاردەك پۇل-تىپىپ چىققان ئىششىقلاردىن ئىبارەت بولۇپ ئاغرىمايدۇ، قىزارمايدۇ ياكى ئېغىرلىق ھىس قىلىنمايدۇ. قول بىلەن بېسىپ كورگەندە ئويما ئاشماي يوقىلىپ كېتىدۇ. قولىنى ئالغاندا ئوز ئەكسىگە كېلىدۇ.

داۋاسى: يەل پەيدا قىلغۇچى ئۇزۇقلارنى مەسىلەن، پۇرچاق خىلىدىكى دانلار، كالا گۆشى، ياڭيۇ قاتارلىقلار چەكلىنىدۇ ۋە توپلانغان يەلنى تارقىتىش ئۈچۈن، زىرە بىلەن قوناق ئۇنىنى قىزىتىپ تېگىش ياكى تال ياغى-چىنىڭ كۈلى، داۋا (يۇلغۇن مەۋسى) ۋە ئارچا مەۋسىنى سوقۇپ سۇ بىلەن سۇيۇلدۇرۇپ چېپىش كېرەك. يېمىش ئۈچۈن جەۋارىش كەمۇنى (49 - نۇسخە)، گۈلگەنلەرنى بېدىيان ئەرەقى (130 - نۇسخە) ياكى شەرۋىتى سۇرۇرى (129 - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ.

پۇقاق (سەلئە)

گالدا ئېسىلىپ تۇرىدىغان ئىششىق بولۇپ قاتتىق يۇمشاقلىقى ۋە چوڭ-كىچىكلىكى ھەرخىل بولىدۇ.

سەۋەبى: قويۇق بەلغەمدىن بولغان بەزى ئىشلىرىدىن ئىبارەت.

تۈرلىرى: تىبابەتتە پوقاق ئاساسەن ۴ خىلغا بۆلىنىدۇ:

(1) ياغ پوقاق (سەلئەي شەھمىيە): ياغلارنىڭ كۆپۈپ قېلىشىدىن كېلىپ چىقىپ، يۇمشاق، ھەرىكىتى ئېرىكەن (مىدىراتسا خالتىسى ئىچىدە مىدىرلايدۇ). ئىچىدىكى ماددىلار ئاساسەن ياغدىن ئىبارەت بولىدۇ.

(2) ھەسەلسىمان پوقاق (ئەسەلسە): ياغ پوقاققا ئوخشاپ كېتىدۇ. ئەمما بەزىلەر ئىچىدىكى ماددا ھەسەل دەك قويۇق ۋە شىرىك كېلىدۇ.

(3) پاتقاقسىمان پوقاق (سەلئەي ئارود خالىيە) ئىشلىتىشكى ماددىلار پاتقاقنىڭ يۇمشاق بولۇپ، باسقاندا مىلىقلاپ تۇرىدۇ.

(4) يۇمشاق پوقاق (شەرازىيە): بەكمۇ يۇمشاق خۇددى ھالۋىدەك بولىدۇ، مىدىرمايدۇ.

(5) بەزى پوقاق (سەلئەي غودۇدى) بەزدەك قاتتىق، تۈگۈن - تۈگۈن بولىدۇ، مىدىرمايدۇ.

داۋاسى: بەلغەمنى سۈرۈپ چىقىرىش ئۈچۈن سۈرگە ئىچكۈرۈپ، تاشقى تەرەپتىن چېپىشقا دورا بېرىلىدۇ. ماددىنى تارقىتىش ئۈچۈن مەلھىمى داخىلىئون (177 - نۆسخە) بېرىلىدۇ. دەسلەپكى دەۋرىدىكى پوقاقلارنى داۋالاش مۇمكىن. ئەمما كونسىراپ كەتكەن پوقاقلارنى جەز -

راھلىق قائىدىسى بويىچە كېسىپ ئېلىپ تاشلاش لازىم، ئاقمۇچ، چىلان دەرىخىنىڭ پورنى باراۋەر مىقداردا قاينىتىپ سۈيىنى ئىچىشكە بېرىدىغان ياكى دېڭىز ئۈسۈملۈكى (خەيدەي) بىلەن ئاقمۇچنى قاينىتىپ ئىچكۈزۈپ دىغان چارىلار بولۇپ، ئۇنۇمى ياخشى.

توپۇق (ئوقدە)

گوش ۋە چاندىردىن تۈزۈلگەن ئۈسمىدىن ئىبارەت بولۇپ، بەدەندە سىڭەك ۋە ئۈزە چايلاشقان ئورۇنلاردا ئۇچرايدۇ.

سەۋىيى: شور ياكى كويگەن ماددىلاردىن پەيدا بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: پىشانە، قول، پۇت، بارماق يانلىرى، قۇلاق ئارقىسى قاتارلىق جايلاردا كۆپرەك، ئالتان ۋە تاپانلاردا ئازراق ئۇچرايدۇ. بەزىلىرى كىچىك ياڭاققەك، بەزىلىرى چوڭ ياڭاققەك كېلىدۇ، ماددىلارنىڭ توپلىنىش ئەھۋالىغا قاراپ بەزىسى ئاغرىيدۇ. باسقاندا بەزىلىرى قاتتىق، بەزىلىرى بىر ئاز يۇمشاق بىلىنىپ، تېرىنى تېگىدىن كۆتىرىپ تۇرىدۇ.

داۋاسى: ئاغرىش بولسا، ئاۋال مۇم يېغى بىلەن بىرقانچە كۈن ياغلاپ يۇمشىتىش ۋە ئاغرىقنى پەسەيتىش مەقسىدىگە يېتىش كېرەك. ئۇندىن كېيىن توپۇقنى قول ياكى باشقا قاتتىق نەرسە بىلەن بېسىپ بىر ئاز زەخمەلەندۈرۈپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە سەبرە، رۇسۇت، ئاقاقىلارنى

باراۋەر مىقدارىدا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ سىركە بىلەن ئەمدەپ، توپىسىدىن قېلىن قوغۇشۇن تاختىسى قويۇپ تېگىپ قويۇش لازىم. ماددىنى قايتۇرۇش تەسىرىگە ئىگە دورىلاردىن گۈلى سوسەن يىلتىزى، ئاق لەيلى، ھەمشىۋا، زىغىر، بابۇنە ۋە زاراڭزىلارنى تەڭ مىقداردا ئېلىپ، سۇدا قاينىتىپ سۈيىنى قىزىق ھالدا تويۇققا قويۇش ۋە تىرىپلىرىنى سۈزۈپ ئۈستىگە چېپىش كېرەك.

يۇقۇرقى چارىلار ئونۇم بەرمىسە، يۇمشاتقۇچى دورىلارنى ياكى مەلھىمى داخىلىئوننى بىرقانچە قېتىم قويۇپ يوشىتىپ بولغاندىن كېيىن تىخ بىلەن كېسىپ، تويۇقنى ئۇيدان قىرىپ ئېلىۋېتىش لازىم. كەسكەندىن كېيىن پەيدا بولغان جاراھەتكە يېڭى گۆش ئۇندۇرۇش ئۈچۈن يىرىك خالتىلىق ئىششىقتا كورسىتىپ ئۆتۈلگەن مەلھەمنى قويۇش مۇمكىن.

چاشتان يارىسى (خانازىر)

بويۇن ۋە كۆكرەك ئۈستى ساھىسىدىكى بەزلەرنىڭ سىل خۇسۇسىيەتلىك ئىششىقى. ۋاقتىدا ۋە توغرا داۋا- لانىما ئېغىز ئېلىپ ئاقما (ناسۇر) شەكىللىنىپ چىقىدۇ. سەۋەبى: قىزىق بەلغەم بىلەن جىراسىم (مىكروپ) بىرلىشىپ پەيدا قىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: كۆپىنچە بويۇن، چاغ ئاستى، ئوقىد رەك ۋە قولتۇق تېرىلىرىدە ئۇچرايدۇ. دەسلەپ تېرە ئاستىدىن كۆتىرىلىپ تۇرىدىغان كىچىك مۇدۇر پەيدا

بولىدۇ. ئاغرىيدۇ، تېرە ئاستىدا مىدىرلاپ تۇرىدۇ. كېيىنچە گۆش ۋە تېرە چاپلىشىپ كېتىدۇ. تېشىلىپ سېرىق زەرداپ سۇ ياكى يىرىك چىقىپ تۇرىدىغان ئاقما جاراھەتكە ئايلىنىدۇ. زەخمىلەنگەن ئورۇندا قاتار تىزىلغاندەك جاراھەتلەر كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. جاراھەت داۋاملىق بولمايدۇ.

داۋاسى: ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن ئىتريپىللەردىن بىرى ياكى ئايارەج پەيقارا (1-5-16- نۇسخىلەر) بېرىلىدۇ. يۇمشاق، تېز ھەزىم بولىدىغان بەدەننى كۈچەيتىدىغان غىزالار بېرىلىدۇ. چۆچىمەل ۋە ئاچچىق نەرسىلەرنى بېرىش مەدئى قىلىنىدۇ. كەچ تەرەپتە تاماقنى بەك كەچ يېيىشتىن ۋە روھى غىمىدىغانلىقلاردىن ساقلىنىش لازىم. ماددىنى تازىلاپ بولغاندىن كېيىن ئىششىق قايتۇرغۇچى دورىلارنى چېپىش كېرەك. ئۇلار: قىچا، ئەنجۈر ئۇرۇغى، كۆپۈكى دەريا، زىراۋەند، مۇقىل، ئوشەق، كونا زەيتۇن يېغى ۋە ئاق مەملەردىن ئىبارەت بولۇپ، مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، مايىسمان دورا تەييارلاپ جاراھەت ئۈستىگە قويىلىدۇ ھەم مەلەمى داخىلىئون (177- نۇسخە) سىرتتىن مايلاشقا بېرىلىدۇ.

يىرىك ۋە زەرداپلار كۆپىيىپ كەتسە، بۇنى چىقىرىپ تاشلاش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن قىزىل لۇبىيا ئۇنى، زەي تۇن يېغى ۋە كىچىك بالا سۈيىدىكىنى بىرلەشتۈرۈپ جاراھەت ئۈستىگە قويۇلسا، يىرىك، زەرداپلارنى ئاققۇزۇپ چىقىرىدۇ. تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن قۇرسى قىلىدۇ.

(46 - نۇسخە) نى سوقۇپ تالقال ھالىدا جاراھەت ئۈستىگە يېپىلىدۇ. بۇ كونا بۇزۇلغان گۆشلەرنى يەپ، يېڭى گۆش ئۇندۇرىدۇ.

چاشقان يارسىنىڭ ئالاھىدە دورىسى ئىترىپىل غۇدودى (180 - نۇسخە) بولۇپ، يۇقۇرقى چارىلار بىلەن بىرلىكتە ئېلىپ بېرىلىدۇ ۋە قوي مۇڭگۈزى ئىچىدىكى پەردە قىسمىنى ئېلىپ كۆيدۈرۈپ كۈلنى كۈنىگە 2 مىسقالنى ئازراق شېكەر بىلەن بىر ھەپتە يېيشكە بېرىلىدۇ.

خانازىر ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان ئاغرىقدۇر. دورىلار بىلەن نەتىجە بولمىسا، جەرراھلىق ئۇسۇلى بىلەن كېسىپ قىرىپ ئېلىنىدۇ ۋە يېڭى گۆش ئۇندۇرىدىغان دورىلار چېپىلىدۇ.

سەرتان (راك)

بەدەننىڭ مەلۇم ئەزاسىدا پەيدا بولىدىغان ۋە قانئومۇرلار ئارقىلىق باشقا ئەزالارغىمۇ كۆچۈپ يامراپ، دېغان بىر خىل سىپىراۋى ئىششىق مۇنەكچە - سەرتان دەپ تاتىلىدۇ. ئۇنىڭ سەرتان دەپ ئاتىلىپ قېلىشىدىكى مۇھىم سەۋەپ، دېڭىزدا بولىدىغان سەرتان بەھرى (دېڭىز قىسقىچ پاقىسى - راك) سۇدا پۇت - قوللىرىنى سوزۇپ تۇرغاندەك بۇ سەرتان ئىششىغىنىڭمۇ بەدەنگە ئۆز تەۋمۇرلىرى بىلەن مۇستەھكەم يامراپ تۇرۇشىدىن ئىبارەتتۇر. چۈنكى سەرتان (راك) ئۆسمىسى چوڭايغاندا

ئۇنىڭ يىلتىزلىرى بەدەن توقۇلمىلىرىغا كەڭ تارقىلىپ
دەرەخ يىلتىزىدەك يامراپ كېتىدۇ.

سەۋىيى: سەرتاننىڭ تۇپ سەۋىيى تازا روشەن
ئەمەس. قەدىمقى ھوكۇمالار ئۇنى سەۋدا ماددىسىنىڭ
ياكى سەپرا ئارىلاش بەلغەم ماددىسىنىڭ كويىشىدىن
كېلىپ چىقىدۇ — دەپ قارايدۇ، كويگەن سەۋدادىن
بولغان سەرتاندا قان بولمايدۇ. سەپراۋى سەۋدادىن
بولسا، ئۇ ئەلۋەتتە ئىششىيدۇ.

ئالامەتلىرى: سەرتان ئوسمىسى دەسلەپتە پەيدى،
بولغاندا مەخپى (يوشۇرۇن) ھالەتتە بولىدۇ. ئۇنىڭ
ئاشكارىلىنىشى كۆپ چاغلاردا ئالامەتلىرىدىن كېيىن بو-
لىدۇ. دەسلەپتە كىچىك پۇرچاق ياكى ئوشكە (بادام)
چىڭلىغىدا، قاتتىق، يۇمۇلاق مۇنەكچە ھاسىل بولۇپ،
ئاندىن كېيىن تېزلا چوڭىيىپ كېتىدۇ. سەرتان ئىششىغى
ۋە ھارارىتى كۈچەيگەنسېرى خۇددى سەرتان (قىسقىچ
پاقا) نىڭ پۇتىغا ئوخشاش قارا، كۆك تومۇرلار پەيدا
بولىدۇ ۋە ئوت يالقۇنىغا ئوخشاش دائىم لاۋۇلىداپ
تۇرىدۇ.

سەرتان جاراھەتلىگەندە قارا ۋە قورقۇنۇشلۇق
جاراھەت ھاسىل بولىدۇ. يارىنىڭ ئاغزى قىزىل ياكى
كۆك رەڭدە ئورۇلۇپ چىقىپ، يىرگىنىشلىك تۇسكە كى-
رىدۇ، سېسىق زەرداپ ئېقىپ تۇرىدۇ. سەرتان ئوسمى-
سىنىڭ ئاغرىشى كويىگەندەك ئېچىشىپ تۇرۇشى تۈپەي-
دىن

لەندىن، بەزى ئاغرىقلار ئازاپلىنىپ ھۇشىدىن كېتىپ قالىدۇ.

خۇلاسە: سەرتان ناھايىتى ئېغىر ۋە خەتەرلىك كېسەللىك بولۇپ، ساقىيىشىدىن ئۈمىت تۇتۇش تەس. ئەمما كېسەلنىڭ باشلىنىشىدا تونۇپ ۋە توغرا تەدبىر-لەر كۆرۈلسە ئۇنى تىخىتىشقا ۋە كۈچۈيۈپ كېتىشىنى توسۇشقا ئىمكانىيەت بار.

داۋاسى: تىبابەتتە سەرتان كېسەلىنى داۋالاش دورا ئىچكۈزۈش؛ سىرتتىن دورا چېپىش ۋە دەستىكارە بىلەن (ئوپىراتسىيە قىلىپ) داۋالاشتىن ئىبارەت 3 چوڭ تارماققا بۆلىنىدۇ. سەرتاننى داۋالاشتا قەدىمقى مەشھۇر تىۋىپلەرنىڭ نۇرغۇنلىغان ئەمىلىي تەجرىبىلىرى توپلانغان. ئاتاغلۇق تىبابەت ئالىمى ئىبنى سىنانىڭ تۆۋەندىكى سۆزلىرى سەرتان كېسەلىنى داۋالاشتا بەلگىلىك ئەزىزىيە ئاساسى بولۇپ خىزمەت قىلىدۇ: "سەرتاننى دەسلەپكى ۋاقتىدا تونۇپ داۋالاش ئېلىپ بېرىلسا ئۇنىڭ كۈچىيىپ كېتىشىنى توساشقا ئۈمىت تۇتۇش مۇمكىن. ھەتتا ئۇنى بىر ھالەتتە تۇرغۇزغىلى ۋە جاراھەتلەندۈر-مىگىلى بولىدۇ. بەزى ھاللاردا سەرتان باشلىنىشىدىلا داۋالانسا، ھەتتا ساقىيىپمۇ كېتىدۇ ئەمما تەلتۈكۈس ساقىيىشى تەس. كۆپىنچە سەرتان ئىچكى ئىداردا ۋە مەخپىي تەرەققى قىلىۋاتقان بولىدۇ. سەرتان بىلەن ئاغرىغانلارغا ئارپا سۈيى، يېڭى بېلىق ۋە تۇخۇم سېرىد-

قىمغا ئوخشاش بەدەننى كۈچەيتىپ يىناخشى قان پەيدا
 قىلىدىغان، سوغاق ۋە ھوللۇك يەتكۈزىدىغان نەرسىلەرنى
 بېرىش، زىيان قىلىدىغان تاماقلاردىن پەرھىز قىلىش مۇ-
 ۋاپىق. ئەگەر سەرتان ئۈسكەن جايدا ھارارەت بولسا،
 ياغ تەركەۋى چىقىرىپ تاشلانغان ئايران ئىچكۈزۈش،
 يېڭى قاپاق يىگۈزۈش لازىم. سەرتان كىچىك بولسا
 دەستىكارە (ئوپىراتسىيە) قىلىپ داۋالسا بولىدۇ. لېكىن
 ئىلاجى بار باشقا ئۇسۇل بىلەن يوقىتىش پايدىلىق.
 چۈنكى كۆپ ۋاقىتلاردا سەرتاننى كەسكەندە ئۇنىڭ يا-
 مانلىشىشى (تەرەققىياتىنىڭ تېزلىشىشى) كورلىنىدۇ. ئەگەر
 ئوپىراتسىيە قىلىپ داۋالاشقا توغرا كەلسە يىلتىزىنى
 قىرىپ تازىلىۋېتىش زورۇر، بەزىدە ئۈسكىنى كېسىپ
 يىلتىزىنى تازىلىۋەتكەندىن كېيىن داغلاشقا توغرا كېل-
 ىدۇ. لېكىن داغلاشتا قاتتىق ئېھتىيات قىلىش لازىم.
 چۈنكى سەرتان يۈرەك، جىگەر، مىڭمەك نازۇك ئەزالار-
 دا بولسا داغلاش خەۋپ - خەتەرگە ئېلىپ بارىدۇ. سەر-
 تاننى ئوپىراتسىيە قىلغاندا ئۈسمىدىن قان ئېقىپ، باش-
 قا تومۇرلار ئارقىلىق بۆلەك ئەزالارغىمۇ يامراپ كېتىش
 ئېھتىمالى بار. شۇڭا بەدەننى تازىلايدىغان سۈرگە بېرىش
 ۋە قان ئېلىش، ئاغرىققا يېڭى، ساپ قان يارىتىدىغان
 تاماقلارنى بېرىپ بەدىننى كۈچەيتىش كېرەك.

ئىبنى سىنا يەنە مۇنداق دەپ كۆرسىتىدۇ: "قە-
 دىمقى ھوكۇمالارنىڭ بايان قىلىشىچە بىر تىۋىپ سەر-

تان كېسىلى بىلەن ئاغرىغان ئايالنىڭ بىر ئەمچىگىنى يىلتىزىدىن كېسىپ تاشلىغان بولسىمۇ، كېيىن ئۇنىڭ يەنە بىر ئەمچىگىدە سەرتان پەيدا بولغان. بىزنىڭ قا- رىشىمىزچە ئىككى ئەمچىگە سەرتان گەردەن ئارقىلىق ئۆتكەن بولۇشى، شۇنداقلا سەرتان ماددىسىنىڭ كۈچى- يىشىدىن كېلىپ چىققان بولۇشى مۇمكىن، بۇ ئېنىق.

ئېنى سىنانىڭ بۇنىڭدىن 1000 يىل ئىلگىرى يازغان سۆزلىرىگە ئاساسەن تىبابەتتە نوۋەندىگىچە دا- ۋالاش چارىلىرى قوللىنىلىپ كەلمەكتە:

1. دورا ئىچكۈزۈپ داۋالاش

سەرتان كېسىلى باشلىنىشىدا تونۇلسا، ئالدى بىلەن سەرتان پەيدا بولغان ئەزادىن قان ئېلىش كې- رەك. لېكىن بۇ چارنى كېسەل كىشىنىڭ قۇۋۋىتى، يېشى، مىزاجى ۋە مۇۋاپىق كېلىدىغان پەسىل قاتارلىق ئەھۋاللىرى يار بەرگەندە ئاندىن قوللىنىش كېرەك. ئە- گەر سەرتان بىلەن ئاغرىغان كىشى ئايال بولسا ھېمىزنى راۋان قىلىدىغان ئىلاجلارنى قوللىنىش كېرەك.

دورا ئىچكۈزۈش جەھەتتە — سەۋدا ماددىلىرىنى تازىلىغۇچى دورا — سۈرگە بېرىش مەسىلىن، ئەپتىمۇن شەرۋىتى، غارقۇن شەرۋىتى بېرىش لازىم. ئۇنىڭدىن باشقا سەۋداۋى خىلىت ۋە قاننى تازىلىغۇچى دورىلارنى بېرىش كېرەك. بۇنداق دورىلارنى بىر ئىككى قېتىم بىلەن توختىتىپ قويماي، تاكى بەدەن تازىلانغىچە تەكرار - تەكرار

ئىستىمال قىلدۇرۇش زورۇر. بۇ مەقسەتتە قارا ھېلىلىدىن 5 مىقال، ئىستېتىمۇندىن 5 مىقال، ئوتتۇخۇددۇس، بىستېپايەج 6 مىقالدىن، ھىندى تۈزىدىن 2 مىقال، قاراخەرىپى 3 مىقال، غارىقۇندىن 5 مىقال، ئېلىپ، سوقۇپ، تاسقاپ سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ كۇمۇلاچ ياسىلىدۇ ۋە كۈندە 2 دانىدىن 3 قېتىمدىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بۇ دورىلارنى قاينىتىپ شەرۋەت قىلىپ ھەر قېتىمدا 4 - 6 مىللىلىتىردىن ئىچىشكە بېرىلىشىمۇ بولىدۇ.

يۇقۇرىدىكى چارىلەر بىلەن بەدەن تازىلانسا مو - تىدىل دورىلارنى بېرىشكە باشلاش، ھوللۇك يەتكۈزگۈچى دورىلارنى بېرىش بىلەن سەۋدا خىلىتلىرىنى پەسەيتىش كېرەك. شۇنداق قىلغاندا بەدەندە ساپ ياخشى قان پەيدا بولىدۇ. تامىغىغا پاققان گۆشى، چۈجە گۆشى، موزاي گۆشى، يېڭى بېلىقلارغا بەقلەتۇلىامانى، قاپاق، پىشمىغان ئۇزۇملەرنى قوشۇپ شورپا قىلىپ بېرىش كېرەك. ھەمدە ئارپا سۈيى، ئايران (مائىلجىيىن) ۋە سەۋە دانى بوشاتقۇچى تالغان دورىلارنى كۆپرەك بېرىش لازىم.

بەزى ھوكۇمالار قارا يىلان گۆشىنى سۇ ياكى رەبھان شەرۋىتىدە قاينىتىپ تۈز سېلىپ ئىچكۈزۈپ بېرىلسە سىرتان ماددىسىنى يوقىتىدۇ، دەپ تەكىتلىنىدۇ.

قانى تازىلاش ئۈچۈن گازىۋان شەرۋىتى، كاسىن ئۇرۇغى، بادىرەنجىبۇيا، چۈچۈكبۇيا يىلتىزلىرىنى قاينىتىپ شېكەر قوشۇپ ئىچكۈزۈلسە بولىدۇ.

يەنە بەزى تىۋىپلار سەرتان كېسەلىنى داۋالاشتا تۈۋەندىكى دورىنى كومۇلاچ ياكى قاينانغان شەرىۋەت شەكلىدە ئىشلىتىشنى تەكىتلەيدۇ: قارا خەنرىبەقنى قوي سۈتىگە 3 كۈن چىلاپ قۇيۇپ، قۇرۇتۇپ ماھى زەرەج (بىر خىل بېلىق - ت)، ھەبۇلخارنىڭ ھەربىرىدىن 3 ھەسسە، ھەشقىپچەك ئۇرۇغى يېرىم دالكا ①، ئىپسەنتىن غارىقۇن 2 داڭدىن، ئايارەج پەيقارا بىر مىقال، ھەنە - دىستان تۇزى، سۇقۇنىيا 1 داڭدىن، مەزكۇر دورىلارنى سوقۇپ كالىك بەسەي ياپرىقىنىڭ سىقىلغان سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ، قارىمۇچ چوڭلىغىدا كومۇلاچ تەييارلىنىدۇ. ياكى قاينىتىپ ھەر قېتىمدا $1\frac{1}{2}$ مىقالدىن ئىچىلىدۇ. ئۇلارنىڭ پىكرىچە، مەزكۇر دورا سەرتان ئۆسمەسىگە تەسىر قىلىپ ئۆسمەنىڭ ھەجىمى كىچىكلەيدۇ ۋە يۇمشايدۇ. ئانداقتا مەزكۇر دورىنى يەنە داۋاملاشتۇرۇش كېرەك.

2. سىرتتىن دورا سۈركەپ داۋالاش.

سەرتاننى سىرتتىن داۋالاشنىمۇ تۈۋەندىكى تۆت مەقسەت كۆزدە تۇتۇلىدۇ: سەرتاننى يوقىتىش (بۇ مەقسەتكە يېتىش تەس)؛ ئەرەققى قىلىشنى توساش؛ جارا-ھەتلەندۈرمەسلىك؛ ئىششىقنى كىچىكلەتتىش.

③ دالكا - 16 دانە ئارپا ئېغىرلىقى بىلەن تەڭ ئىمىرلىق ئۇلچىمى.

سەرتاننى يۇقىتىش مەقسىتىدە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار سەرتاننى بوشىتىدىغان، تەرەققىياتىنى ئاستىلىتىدىغان ۋە ناچار قاننى تۈزىتىدىغان بىرلىشى شەرت، چۈنكى ناچار بۇزۇق قان، يامان خىلىتلار سەرتاننى پەيدا قىلىدۇ. لېكىن دورا بەك كۈچلۈك بىرلەشمەسى كېرەك. چۈنكى قاتتىق غىدىقلىغۇچى كۈچلۈك دورىلار سەرتاننى تېز يامانلاشتۇرىۋېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن كۆيدۈرگۈچى دورىلارنى ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش لازىم. ئادەتتە مەدەندىن ۋە ئوسۇم-لۈكتىن ئېلىنغان دورىلار مەسىلەن، تازىلانغان توتىيا، گۈل يېغى، تۈگۈرمەن تېشى (كوپ خىل ئاشلار بىرىكمە-سىدىن ھاسىل بولىدۇ)، بۇلەي تېشى (بۇلارنى سۇ ياكى سىركە بىلەن بىللە تاشقا سۇرۇپ يۇمشىتىپ ئىشلىتىلىدۇ)، مىس مەدىنى (رودىسى)، قوغۇشۇن، يۇمغاقسۇت سۈيى، پىشىمغان ئۇزۇم، ئىت ئۇزۇمىنىڭ سۈيى، جۈسەي ئۇرۇغى، پاقا يوپۇرمىغى (بىارتەك) سۈيى، سېمىز ئوت سۈيى، كاسىن سۈيى، كاكىنەج (شوخلەك) سۇلىرىنى ئىشلىتىش بەلگىلىك ئۇنۇمگە ئىگە.

(1) توتىيا^①دىن ياسىلىدىغان مەلھەم تەركىمى:
تازىلانغان توتىيا، مۇرداسەنگ، سەپىداپ بىر ھەسسە، موم $\frac{1}{4}$ ھەسسە. مەدەن دورىلارنى سوقۇپ، مومنى گۈل يېغى بىلەن قورۇپ يۇقۇرىدىكى دورىلارغا قوشۇپ مەلھەم قىلىدۇ. بۇ مەلھەمنى سەرتان ئۈستىگە سىرتتىن چېپىلىدۇ.

(2) قوغۇشۇن مەلھىمى: قوغۇشۇن كۈشتىسىنىڭ تالقىنى، قەلەي كۈشتىسى، ئۇيا، توتىيا، پاقا يوپۇرمى - غىنىڭ سۈيى ھەر بىرى 2 مىقالدىن، نىشاستە، شەمغى ئەرەبى 3 مىقالدىن، تەييارلاشتا: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، بىر سەر ئاق مومنى تۈ - مۇر قاچىدا ئېرىتىپ، ئۈستىگە گۈل يېغى قۇيۇپ ئارد - لاشتۇرۇپ ئوتتىن ئېلىنىدۇ. ئۇنىڭغا سىز قۇلغان دورىلارنى سېلىپ تەكشى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، چىنە - قاچىدا ساقلاپ لازىم كەلگەندە سەرتان ئۈستىگە چېپىشقا ئىشلىتىلىدۇ.

(3) گىلى ئەرەمنىنى ئىت ئۇزۇمى سۈيى ۋە كوك يۇمغاقسۇت سۈيى بىلەن ئېزىپ چېپىلىدۇ.

(4) سەرتاننى جاراھەتلىنىشكە قويماسلىق كېرەك. بۇنىڭ ئۈچۈن پىشماغان ئۇزۇمنى سوقۇپ تېگىش، دەر - يادىن تۇتۇلغان قىسقىچ پاقا (سەرتان) نى كويدۇرۇپ سوقۇپ، ئىنقىلىمىيا ياكى ئاق قەلەي كۈشتىسى قوشۇپ چېپىش پايدىلىق.

(5) قوغۇشۇننى كاھو (ئوسۇڭ) سۈيى ياكى ئىسپۇ - غۇل شىرىسىدە ئېزىپ چاپسا ئۇنۇمى ياخشى.

(6) تۈگۈرمەن تېشىنىڭ ئېرىتمىسى، مېس مەدىنى، قوغۇسۇنلارغا گۈل يېغى، يۇمغاقسۇت سۈيى، پىشماغان ئۇزۇم سۇلىرىنى قوشۇپ تېگىش كېرەك.

① توتىيا - زىنك (zn) مەدىنى.

سەرتان چاراهەتلەنگەن بولسا زەرداپ ئاقىدۇ.
مۇنداق چاغدا توۋەندىكى چارىلارنى قوللىنىش كېرەك:
(1) يۇيۇلغان توتىيا، گىلى مەختۇم، قىزىل گۈل،
گىلى ئەرمىنىلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، قەلەي ھاۋان
چىدا گۈل يېغى بىلەن بىللە قوشۇپ ئوبدان سوقۇپ
چاراهەتكە تېگىش لازىم.

(2) دەريادا ياشايدىغان قىسقۇچ پاقنى تۇتۇپ،
يېرىپ ئىچىنى تازىلاپ ئۆسمە ئۆستىگە تېگىش لازىم
(بۇنى كۈندە بىر ياكى ئىككى قېتىم تەكرارلىسا بولىدۇ).
ياكى قىسقۇچ پاقنى كويىدۇرۇپ كۈلنى نېفىت ۋە گۈل
يېغى بىلەن بىللە مەلەم قىلىپ تاغسىمۇ بولىدۇ.

3. دەستكارە (ئوپپىراتسىيە) بىلەن داۋالاش

سەرتاننى ئىمكانىيەتنىڭ بىرىچە باشقا چارىلار
بىلەن داۋالاش لازىم. ئەگەر ئوپپىراتسىيە قىلىپ داۋالاشقا
توغرا كەلگەندە ئۇنىڭ يىلتىزلىرىنى قالدۇرماي تازىلىۋې-
تىش زورۇر. بولمىسا قايتا ئۆسۈپ چىقىشى ياكى باشقا
ئەزالارغا يۆتكىلىشى چوقۇم. لېكىن نازۇك ئەزالاردا بول-
غاندا بۇ چارىنى قوللانغىلى بولمايدۇ. كېسىپ تاشلىغاندىن
كېيىن، ئۆسمە ئۆنگەن جاي ئەتراپىنى داغلاشنىڭ پايدىسى
بار. بىراق چوڭ قانئومۇرلارغا، نازۇك ئەزالارغا يېقىن
جايلىرى داغلاش مۇمكىن ئەمەس. ئوپپىراتسىيەدىن ئىلگىرى
سەرتان ئۆسمەسىنىڭ ئەتراپىنى موم ۋە گۈل يېغى بىلەن
ئەمدەپ، ئۆستىگە قوغۇشۇنغا ئىسپۇغۇل شىرىسى، بىيە

ئۇرۇغىنىڭ شىرىسىنى ئارىلاشتۇرۇپ مەلەم قىلىپ تېگىش لازىم. بۇنى ئۇدا بىر قانچە كۈن داۋاملاشتۇرۇلسا، سەرتاننىڭ ئەتراپىدىكى يىلتىزلىرى ئاشكارىلىنىدۇ. ئاندىن مەزكۇر يىلتىزلارنى داغلاپ ۋە كېسىپ تاشلاش كېرەك. كېسىلگەن ئورۇننى ھول زۇفا سۈيى، بىيە شىرىسى، ھوم، گۈل يېغى، بىنەپشە ياغلىرىنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلانغان سۈيۈك مەلەم بىلەن تېگىپ، تېگىق ئۈستىنى دائىم نەم تۇتۇش ئۈچۈن ئىت ئۇزۇمى سۈيى قۇيۇپ تۇرۇش كېرەك. بەزى ھۆكۈمالار تېگىقنى ئادەم سۈتى بىلەن ھوللەپ تۇرۇش پايدىلىغىراق ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.

ماخاۋ (جۇزام - دائىل ئەسەد)

يۇقۇملۇق ھەمدە ۋاقتىدا توغرا داۋالانمىسا، ئاقىۋىتى ناچار كېسەلدىن ئىبارەتتۇر. "جۇزام" دىگەن سۆز "ئايرىلغۇچى" دىگەن سۆز بولۇپ، كېسەلنىڭ بىر دەسلەپلىرى ئېقىپ، كېسىلگەندە ئاجراپ چۈشۈپ كېتىدۇ. كېسەلنىڭ يۈزى شىرنىڭ يۈزىدەك بولۇپ قالدىغانلىقى ئۈچۈن "شىر كېسىلى" (دائىل ئەسەد) دەپمۇ ئاتىلىدۇ. سەۋەبى: غەيرى تەبىئى كويگەن سەۋدا سەۋەبىچى بولىدۇ.

ئالامەتلەرى: ئالدى بىلەن بەدەن تېرىسىدە قىزىل ياكى قارامتۇلغا مايىل داغلار پەيدا بولىدۇ، ئاندىن كېيىن مەزكۇر داغلاردىن ھەر خىل چوڭلۇقتىكى قاپارتە-مىلار پەيدا بولىدۇ، تېشىلىپ ئاقىدۇ، سېرىق زەرداپ سۇ

چىقىدۇ. مۇنداق ئالامەتلەر بەدەننىڭ كوپ جايلىرىدا پەيدا بولۇشقا باشلاپ پۈتۈن بەدەننى قاپلايدۇ. ئۇقۇنەت يۈرەككە تەسىر بېرىپ توت كۈنلۈك قىزىتما (تەپپى رۇبىنى) پەيدا بولىدۇ. تېرىدىكى جاراھەتلەر بارغانسېرى چوڭقۇرلىشىپ سېسىشقا باشلايدۇ، بۇرۇن ئولتۇرۇشۇپ كېتىدۇ. قۇلاق يۇمشاقلىرى چۈشۈپ كېتىدۇ. جاراھەت-لەردىن سېسىق پۇراق چىقىپ كىشىلەر قاچىدۇ. شەكلى ئۆزگىرىپ يۈزلىرى مۇدۇرلۇق ئىشىپ، خۇددى شىرنىڭ يۈزىدەك قۇرۇنۇچلۇق قىياپەتكە كىرىدۇ، ئاۋاز پۈتىدۇ، چاچ، ساقال، كىرىپىكلەر تۈگۈلىدۇ، بەزىدە ماخاۋ قارا سېرىق كېسەل يۈز بېرىش بىلەن باشلىنىدۇ. ئانداقتا پۈتۈن بەدەن رەڭگى قارىداپ كەتكەندىن كېيىن، ماخاۋ-نىڭ خاس بەلگىلىرى چىقىشقا باشلايدۇ. كېسەل جارا-ھەتلىرىدە ئاغرىش سەزمەيدۇ، كېچىسى ياخشى ئوخلىيال-مايدۇ. قۇرۇنۇچلۇق چۈشلەرنى كۆرىدۇ، كۆزلىرى ياشاڭ-غىراپ ئۇرسىزلىنىدۇ، پۇت ۋە قول بارماقلىرى قىسقىرىپ ئىگىلىپ قالىدۇ، بەزىلەر قارغۇ بولۇپمۇ قالىدۇ، تىر-ناقلىرى يېرىلىدۇ، باشقۇرغۇچى ئەزالارغا تەسىر بېرىشى نەتىجىسىدە نەپەس قىسىلىش، يۈرەك زەئىپلىشىشلەر بىلەن ئۆلۈپ كېتىدۇ.

داۋاسى: ماخاۋ بەدەننىڭ ئەسلى مىزاجىنى ئۆز-گەرتىپ تاشلايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ماخاۋنى بالىدۇرراق، توغرا ۋە سەۋىيچانلىق بىلەن داۋالاش زورۇر. بەدەندە بۇزۇلۇش يۈز بېرىشتىن بۇرۇن دەسلەپكى چاغلاردىلا

داۋالاش ئېلىپ بېرىلسا كېسەلنى جىسمانى جەھەتتىكى ئازاپ ۋە ئولۇمدىن ساقلاپ قېلىش ئىمكانىيىتى بار. مۇۋاپىق دورىلارنى بېرىپ قۇستۇرۇش ئارقىلىق بۇزۇق ماددىلار بەدەندىن چىقىرىپ تاشلىنىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن سېرىق چىچەك ئۇرۇغى، تۇرۇپ ئۇرۇقلىرىنى قايناتقان سۇنى ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇش مۇمكىن.

يەنە مەتبۇخى شاتەرە (172 - نۇسخە) بىر قانچە قېتىم تەكرار بېرىلىپ ئارقىدىن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بىلەن مائىل جىيىن (181 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇرۇنغا بىنەپشە يېغى تامغۇزۇش؛ بىنەپشە يېغى، قاپاق ئۇرۇغى يېغى، سېرىق ماي، ئادەم سۈتىنى پۈتۈن بەدەنگە سۈركەش لازىم. ئەفئائىلىنىڭ گۆشىنى پىشۇرۇپ يېمىشكە بېرىش ۋە تەرياقى قارۇق (186 - نۇسخە) قاتارلىق دورىلار بىلەن مىڭ، يۈرەكنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش ماخاۋ كېسىلىنى داۋالاشتا كۆپ قوللىنىدىغان چارىلاردۇر.

كېسەل تۈزلەنگەن گۆش ۋە كۆندىراپ قالغان يېمەك-ئىچمەك پەرھىز قىلىش شەرت. پالەك، جۈسەي ۋە قىزىلچا سالغان توخۇ شورپىسى، ئارپا نېنى قاتارلىقلار بىلەن ئوزۇقلىنىشى لازىم. چاي ئورنىدا بېدىيان سۈيى بېرىلىدۇ. يېڭى ساققان سۈتنى يالغۇز ياكى ھەسەل قوشۇپ بېرىلىدۇ.

تاز كېسىلى (سۇئىقە)

كۆپىنچە باشنىڭ چاشلىق قىسمىدا، بەزىدە بەدەن تېرىلىرىدە ئۇچرايدىغان كېسەللىك بولۇپ، بالىلار ۋە

ئۇسۇرلەردە كۆپرەك كۆرىلىدۇ. تىبابەتتە تاز ھول تاز (سۇئىقە رەتەپ) ۋە قۇرۇق تاز (سۇئىقە يابەس) دەپ 2 چوڭ تۈرگە بۆلۈنىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن تېرىدە ئۇششاق مۇ. دۇرلار پەيدا بولۇپ ئەتراپقا تاراشقا باشلايدۇ. بۇلار دەسلەپتە قۇرۇق بولۇپ، قىچىشىدۇ. تاتىلاش بىلەن سېرىق سۇ چىقىپ جاراھەتكە ئايلىنىدۇ ۋە قۇرۇق سېرىق قەقىش باغلايدۇ، تاتىلاپ قەقىشلەر ئاجىزلاپ تېگىدىن سېرىق سۇ چىقىپ تۇرغان قىزىل يارا يۈزى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ.

ھول تاز بولسا، دائىم سۇ چىقىپ تۇرىدۇ، بۇ كۆپىنچە كىچىك بالىلاردا كۆپ ئۇچرايدۇ ۋە خۇددى چاشقان سۇيىدۇگىدەك پۇرايدۇ.

قۇرۇق تاز يارىسىدىن سۇ چىقماستىن، تۈزاتىدەك كىيىملىك ئورلەپ تۇرىدۇ. ئۈستى ئاق قوماق باغلاپ تۇرىدۇ. كۆنمىغانسېرى باش تېرىسىدە تۈك ئۈنمەيدىغان تاتۇق قالىدۇ.

داۋاسى: ھول تازلاردا — ئالدى بىلەن ماددىنى چىقىرىپ تاشلاش ئۈچۈن زۇلۇك قوندۇرۇش ياكى ھىجا مەت قويۇش لازىم.

بۇزۇق قان ۋە كېرەكسىز ماددىلارنى تازىلاش ئۇ. چۈن مەتبۇخى ھېلىمە (38 - نۇسخە) بېرىلىدۇ ۋە تۈز. لانغان گۆش، كالا گۆشى، ئاچچىق ئۆتكۈر نەرسىلەردىن

مەزھىز قىلىش، پالەك ۋە چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم سېرىقى بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش لازىم.

تاشقى تەرەپتىن چېپىش ئۈچۈن تۈۋەندىكى نۇسخىلاردىن تاللاپ ئىشلىتىش مۇمكىن.

نۇسخە: زەچىۋە سىرسەر، ئاچچىق بادام مېغىزى 1 سەر، ئانار گۈلى، رال، كۆيدۈرۈلگەن ئاق تۇز، موزا، ھەبئۇل ئاس ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، گۈل سوسەن يىلتىزى 1 سەر، ئاقاقىيا، قەمبىل 2 مىسقالدىن، سىركە، گۈل يېغى 1 سەردىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سىركە ۋە گۈل يېغى بىلەن ئىشلىتىۋېرىپ، قويۇق مايدەك دورا تەييارلىنىدۇ.

نۇسخە: زەچىۋە، ئانار پوستى، مەدەستەن، خېنىمەلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سىركە ۋە گۈل يېغى بىلەن ماي دورا تەييارلىنىدۇ.

قۇرۇق تازدا سەۋدانىڭ غالىپلىقى كۆپرەك ئۇچرايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بىلەن ماددا سۇرۇپ چىقىرىلىدۇ. بەدەندە ئەمەلىي كۆپەيتىش ئۈچۈن ھول تاماقلارنى بېرىش كېرەك. ئالدى بىلەن چاچنى چۈشۈرۈپ تاشلاش لازىم، ئەگەر بۇنىڭغا تاقەت قىلالىمىسا ئاق تۇز بىلەن سىركىنى ئارىلاشتۇرۇپ، ئىلماقراق ھالدا باشقا سۇرتۇپ، كېيىن ئىسسىق سۇدا باشنى سۈيىتىپ.

پۇنلاپ يۇيۇش لازىم، باشنى قۇرۇتۇپ تۈۋەندىكى نۇسخە -
لاردىكى مەلەملەرنى چېپىپ، باشنى ماتا بىلەن ئوراپ
قويۇش كېرەك.

نۇسخە: ئاق لەيلى ئۇرۇغىنىڭ لۇئابى، زىغىر
لۇئابى، بىنەپشە سۈيى، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ يېغى، تاتلىق
بادام يېغى، توخۇ ۋە ئۈدەك يېغى، ئاق موملارنى باراۋەر
مىقداردا ئېلىپ، مومنى ئېرىتىپ، قالغان ياغلارنى ئۇنىڭ
ئۈستىگە قۇيۇپ ياخشى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، بىنەپشە
سۈيىنى قۇيۇپ تەييارلىنىدۇ، پاكىز قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.
نۇسخە: مەدەستان، زەچىۋىنى باراۋەر مىقداردا
ئېلىپ، زەيتۇن يېغى 3 باراۋەر ئېلىنىدۇ. مەدەستاننى
ئايرىم ئېزىپ، زەچىۋىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ زەيتۇن يېغى ئارىلاشتۇرۇپ مەلەم تەييارلىنىدۇ
(زەيتۇن يېغى ئورنىغا كۈنجۈت يېغى بولسىمۇ بولىدۇ).
نۇسخە: زاك، تۇز، گۈڭگۈرت سېرىغى، سىماپ

كۈشتىسى، موزا، زەچىۋە، زىراۋەند، مەدەستان ھەر بىرى
2 مىسقالدىن، سىركە، گۈل يېغى بىر سەردىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ سىركە ۋە گۈل يېغى ئارىلاشتۇرۇپ قويۇق
ھالدىكى ماي دورا تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىشتە، دەسلەپ بىرىنچى نۇسخىدىكى ماي
دورىدىن كېيىن ئىككىنچى ۋە ئۈچىنچى نۇسخىلاردىكىلەردىن
بىرىنى تاللاپ بېرىش كېرەك.

قۇرۇق تازدا: مەتبۇخى شاتەرە (172 - نۇسخە) ياكى مەتبۇخى ئەپتەمۇن (20 - نۇسخە) بىلەن ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش: ئاق لەيلى ۋە ھەمشىۋانى قاينىتىپ سۈيى بىلەن باشنى يۇيۇش كېرەك، ئاندىن كېيىن كوي-دۇرۇلگەن سەدەپ، كۆپۈكى دەريانى سوقۇپ، تۇخۇم ئېقى بىلەن باشقا چېپىش لازىم.

تاز كېسەلى بار بالىلار بىلەن ساق بالىلارنى بىر ئورۇندا ياتقۇزماسلىق، داۋالاش جەريانىدا يېڭى باش كىيىم ئالماشتۇرۇش، تاز كېسەلى تارقىلىشقا سەۋەبچى بولىدىغان سەتراچلىق سايىمانلىرىنى زەمچە سۈيى بىلەن تازىلاپ ئىككىنچى كىشىگە ئىشلىتىش لازىم.

قوتۇر (جەرەپ)

سەۋەبى: بۇزۇلغان قان ۋە شور بەلغەم سەۋەبىدىن پەيدا بولىدۇ. ئازاپلىغۇچى قىچىشىلار بىلەن داۋام قىلىدۇ. كىشىلەرگە بىر-بىرىدىن يۇقۇپ كەڭ تارقىلىپ كېتىش ھادىسىلىرى دائىم كۆرىلىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئالدى بىلەن قول بارماقلىرى ئارد-سدا ئۇششاق مۇدۇر پەيدا بولىدۇ، قاپارنىلار دەسلەپتە قىزىل رەڭلىك بولۇپ تاتىلاش بىلەن بۇزۇلۇپ سېرىق زەرداپ سۇ چىقىدۇ. قاتتىق قىچىشىدۇ. قوتۇرقۇرۇق ۋە ھۆل دەپ ئىككى خىلغا بۆلۈنىدۇ. قۇرۇق قوتۇردىن سۇ چىقمايدۇ. تېرە قېلىنلىشىپ كېپەكلىشىپ تۇرىدۇ. ھۆل تۇرىدىن

تاتىلاش بىلەن سۇيۇقلۇق چىقىدۇ. سۇيۇقلۇقلارنىڭ رەڭگى، سەۋەپچى ماددىسىغا قاراپ ھەر خىل بولىشى مۇمكىن، يەنى گويىگەن سەپرادىن بولسا سېرىق، بەلغەمدىن بولسا ئاق ۋە قاندىن بولغانلىرىدا قىزغۇچ كېلىدۇ. سەپرادىن بولغىنىدا ئېچىش كۆپرەك بېلىنىدۇ. ئۇفۇنەتلەنسە يىرىڭلىق سۇ چىقىپ تۇرىدۇ. قۇرۇق ياكى ھول قوتۇر پەيدا بولغان تېرە ئاستىدا بىر خىل سالىجىدەك ھاشارەت پەيدا بولۇپ ئۇ "سېبان" دەپ ئاتىلىدۇ.

داۋاسى: قۇرۇق قوتۇرلاردا مەۋجىغا چۈشۈپ ياكى ئىسسىق سۇ بىلەن يۇيۇش ھەم بەدەنگە نەملىك پەيدا قىلغۇچى چارىلارنى قىلىش ۋە ھول غىزالارنى كۆپرەك بېرىش؛ قۇرۇقلۇقنى كۆپەيتكۈچى بارلىق نەرسىلەرنى چەكلەش لازىم. سىرتتىن سېرىق پۇزۇچاق ئۇنىنى قىزىلچا سۈيى بىلەن چېپىش لازىم. تېرە نەملىك ياكى يۇمشاقلىق پەيدا قىلغاندىن كېيىن، مائۇل جېيىن (181-نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئارىلاپ بىر قانچە قېتىم سۈرگە بېرىلىدۇ. ئەمما سۈرگە ئارىلىغىدا نەملىك ئوتكۈزۈشنى ئەستىن چىقارماسلىق كېرەك. ئاندىن كېيىن قارائۇرۇك مېغىزى، تەمىرى ھىندى مېغىزىدىن بىر سەردىن، سىماپ كۋىتسىدىن بىر مىس-قال ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، كۈنجۈت يېغى ۋە قېشۇق بىلەن ئۇماچتەك قويۇق دورا تەييارلاپ 3 كۈن ئۇدا سۈرتۈپ ئەتىسى مەۋجىغا چۈشۈپ يۇيۇنۇش، كىيىم-

كېچەكلەرنى يەڭگۈشلەپ، قايناقسۇغا بېسىش، يوقىتىش -
كورپىلەرنى ئاپتاپقا سېلىش لازىم.

ھول قوتۇردا سەۋەپچى ماددىنىڭ ئەھۋالغا قاراپ
سۈرگە بېرىش، ھەسەلەن، ئېچىش كۆپ بولۇپ سېرىق
سۇ ئېقىپ تۇرسا مەتبۇخى ھېلىمە (38 - نۇسخە) تىر -
كۈنگە ئەپسەنتىن ۋە مامۇرائچىن قوشۇپ تەييارلاپ
بېرىدۇ. ياكى مەتبۇخى خىيارى شەنبەر (54 - نۇسخە)
بەرسىمۇ بولىدۇ. كاسىن سۈيىگە تەمرى ھىندىنى بىر كېچە
چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى راسا مەچىپ، ماتادىن ئۆتكۈزۈپ
سۈزۈپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. 3 كۈن ئۇدا تەچىپ، 3 كۈن
ئىچىمەيدۇ. ماددا تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن كۈمۈش
ئىقلىمىياسى ماش ئۇنى 5 مىسقالدىن، سىمىپ كۈشتىدىن
بىر مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ سىركە بىلەن چاپ -
دىغان دورا تەييارلىنىدۇ. ئۇنى قوتۇرغا سۇرتۇپ، 3
كۈندە بىر قېتىم مونچىدا يۇيۇنىدۇ. بۇ چارنى بىر
قانچە قېتىم تەكرارلاش كېرەك. يۇقۇرقى دورىغا يەنە
مەدەستان بىلەن شەھى ھەنزەل قوشۇپ تەييارلانسىمۇ
بولىدۇ. مىزاجنى ھوللەشتۈرۈپ تۇتۇش ئۈچۈن شەرۋىتى
بىنەپشە (65 - نۇسخە) ياكى مەجۈنى بىنەپشە (74 -
نۇسخە) دىن بىرىنى بېرىپ تۇرۇش لازىم.

قۇرۇق قىچىشقاق (ھىككە)

قوتۇر بىلەن قۇرۇق قىچىشقاقنىڭ پەرقى شۇكى،
قۇرۇق قىچىشقاققا زەرەرلەنگەن جايى كەڭ بولىدۇ ۋە

تېرە ئەسلى رەڭگىدىن قىزىرىپ ئۆزگەرگەن بولسىمۇ،
قوتۇردەك روشەن ھالدىكى قاپارچۇق، زەخمىلىنىشلەر
بىرلىشىدۇ. تۈزلانغان بېلىق، تۈزلانغان گۆشنى كۆپ
يىگۈچىلەردە، قان كۆپەيتىدىغان قۇۋۋەتلىك دورىلارنى
زىيادە ئىستىمال قىلىدىغان، مونچىغا بارماي تىرىدىكى
تەر توشۇكلىرى (مىامىلار) ئېتىلىپ قالغان ئادەملەردە
كۆپرەك ئۇچرايدۇ. قېرى كىشىلەردىكى قۇرۇق قىچىشقا
بەدەندىكى تەبىئى ھارارەتنىڭ ئاجىزلىشىشى ۋە جىگىر
خىزمىتىنىڭ بۇزۇلۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ.
جىنىسى ئەزا، مەقەد ۋە جىنىسى يوللاردا شۇ ئەزادىكى
خىلىتلارنىڭ بۇسى — بۇخاراتلىرى ياكى ئومۇمى بەدەن —
دىكى بۇخاراتلار سەۋىيىدىن قۇرۇق قىچىشقاقلار پەيدا
بولىدۇ، كىچىك بالىلار ھەتتا بوۋاقلاردىمۇ پەيدا بولۇپ،
خېلى ئازاپلايدۇ.

داۋاسى: ھىجامەت قويۇش، كىچىك بالىلارغا
زۇلۇك قوندۇرۇش كېرەك (زەرەرلەنگەن تىرىكە قوندۇرۇش —
رۇلسا تېخىمۇ ياخشى). ئاندىن كېيىن مائۇل جىپىن
(181 - نۇسخە) بېرىپ ماددىلار قويۇقلۇغىنى تەڭشەش
ۋە سۈيۈقلەندۈرۈش لازىم. شۇنىڭدەك تەۋەندىكى
نۇسخىدىكى دورا قاينىتىپ بېرىلىدۇ.

نۇسخە: سېرىق ھېلىلە، بەلىلە پوستى بىر سەر —
دىن، قارا ھېلىلە، ئاقلانغان ئامىلە بىر سەردىن، ئۇرۇقسىز
قۇرۇق ئۇزۇم، شائەرە 5 مىسقالدىن، تۇربۇت 4 مىسقال،

خىيارى شەنبەر 7 مىسقال، تەمرى ھىندى، تەدرەنجىۋىل
بىر سەردىن، بادام يېغى بىر مىسقال.

تەييارلاش: ئالدى بىلەن خىيارى شەنبەر، تەمرە
رى ھىندى ۋە تەدرەنجىۋىلنى ئايرىم قاچىغا سېلىپ،
ئۇستىگە بىر ئاز قايناقسۇ قويۇپ ئۇستىنى دۈملەپ
قويۇلىدۇ. قالغان دورىلارنى چالا سوقۇپ، 4 چوڭ
چىنە سۇغا بىر كېچە چىلاپ، ئەتىسى يېرىمى قالغىچە
قاينىتىپ، داكىدىن ئۆتكۈزۈپ تىرىپىنى ئوبدان سىقىپ
بۇلارنىڭ ئۇستىگە دۈملەپ قويغان دورىلارنى ئوبدان
مىچىپ تەمىنى چىقىرىپ سۈزۈپ تازىلىنىدۇ ۋە قايتە-
دىن يەنە بىرلا قاينىتىپ ئېلىپ، بادام يېغىنى قويۇپ
تەييارلىنىدۇ. پۈتۈن دورىنى بىر كۈندە 3 كە بولۇپ
ئىچىپ تۈگىتىلىدۇ. كۆك چىڭگەي سۈيىگە گۈل يېغى،
سىركە ۋە بىر ئاز توغرىغۇ قوشۇپ بەدەنگە سۈركەش
ئۈچۈن بېرىلىدۇ. جىنى ئىزالاردا بولغان قىچىشقاق
ئۈچۈن زەمچە، قەتران ① بىر مىسقالدىن، ھەسەل 2
مىسقال، سوقۇپ ھەسەل ئارىلاشتۇرۇپ قىچىشىدىغان جايغا
چېپىش لازىم ياكى شۇمشە، زىغىرلارنى باراۋەر مىقداردا
ئېلىپ، 3 باراۋەر ھەسەل بىلەن قاينىتىپ پاختا ياكى
داكىغا يۇقتۇرۇپ چاپلاش لازىم. كىچىك بالىلار ياكى
ئەمچەكتىكى بالىلاردا بولسا، قىزىلگۈل، بىنەپشە، نىلۇفەر،
ئاقلاڭغان ئارپىلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ

① قەتران - لاتىنچە نامى پىكس لىكۇندا.

سۈيىدە بەدەنلىرىنى يۇيۇش كېرەك؛ ئەمچەكتىكى بالىلارغا سۈرگە بېرىش لازىم بولسا، ئانىسىغا بەرسە سۈت بىلەن تەسەر كورسۇتىدۇ.

ئىسسىغىلىق (ھەسەپ)

ئىسسىق پەسىللەردە كۆپ ئۇچرايدىغان كېسەل بولۇپ، تېرىگە كەڭ تارقالغان. قىزىل، بەكمۇ ئۇشاق تاش-مىلار چىقىپ قىچىشىدۇ، ئېچىشىدۇ ھەتتا داغرىيدۇ. كۆكرەك، پىشانە قىسىملىرىدا كۆپ ئۇچرايدۇ، نەملىشمەيدۇ، ئۇفۇنەت ھاسىل قىلىپ يىرىڭلىق قاپارتمىلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۈمكىن. مۇھىم ئالامەتلىرى — بەدەن قىچىشىدۇ. تاش-مىلار خۇددى تىكەندەك ئۇچلۇق ۋە كۆپ سانلىق بولىدۇ. گايىدا بوۋاق بالىلارنى ھەددىدىن ئارتۇق ئىسسىق يۈگەپ قويغاندىمۇ ئىسسىغىلىق تېشىپ چىقىشى مۈمكىن.

داۋاسى: سەپرا ۋە قان ماددىسىنى سۈرگۈچى سۈرگىلەر بېرىلىدۇ. ئاندىن تەۋەندىكى نۇسخىدىكى دولانلارنى قاينىتىپ بەدەن يۇيۇلىدۇ.

(1) نۇسخە: يابۇنە، ئەكلىملىك باراۋەر مىقداردا، بۇغداي كىپىگى 2 ھەسسە.

(2) نۇسخە: گۈل يېغى، سىركە بىر ھەسسە، پىننە يېرىم ھەسسە بىرلەشتۈرۈپ بەدەنگە سۈركەشكە بېرىلىدۇ. مۇزا، زەچىۋىلەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، سىركە ۋە گۈل يېغى بىلەن سۇيۇقلاندۇرۇپ تاشمىلارغا سۈركىلىدۇ، سوغاق سۇدا كىپەك شىرىسىنى چىقىرىپ بىر سائەتتىن كېيىن يۇيۇپ تاشلاش لازىم.

قارا تەمرەتكە (قۇبا) ①

تېرە ئۈستىدە پەيدا بولىدىغان قۇرۇق ۋە قارام-
تۇل رەڭلىك تەمرەتكىدىن ئىبارەت.

ئالامەتلەرى: ئالدى بىلەن تېرە ئۈستىدە قىزىل،
قاتتىق قاپارتمىلار پەيدا بولۇپ، قىچىشىدۇ. تېرە بار-
غانسېرى قۇرۇپ ئۈستى قارامتۇل قاسراقلىق شەكىل ئا-
لىدۇ؛ ساق تېرە بىلەن سىزىق تارتقاندا ئايرىلىپ
تۇرىدۇ. ئۇزۇنغا سوزۇلۇپ تېرىنى زەخمىلەيدىغان ياكى
بېلىق تەڭگىسىدەك قاسراقلىشىپ ئاسانلا ساقىيىپ كې-
تىدىغان خىللىرى بولىدۇ. ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان خىلىدا
تېرە زەخمىلىنىپ، زەرداپ سۇ ئېقىپ شەلۋەرەپ تۇرىدۇ.
قۇبانىڭ تەرەققىياتى 3 باسقۇچقا بولىنىدۇ. بىرىن-
چى باسقۇچتا، تېرە ئۈستىدىكى زەخمىلىنىش گۆشكە
يەتمىگەن، قىزغۇچ رەڭدە بولىدۇ، ئاسان داۋالاش مۇم-
كىن؛ ئىككىنچى باسقۇچتا، زەخمىلىنىش تېرىدىن ئوتۇپ
گۆشكە بىر ئاز تەسىر قىلىدۇ؛ ئۈچىنچى باسقۇچتا، ئوت-
كۈرلىشىپ گۆشكە كۆپرەك تەسىر قىلىپ، تېرە رەڭگى
قارىيىپ كېتىدۇ.

داۋاسى: بىرىنچى باسقۇچىدا بۇغداي يېغى
سۈركەشنىڭ ئۈنۈمى ياخشى ياكى يىرىكە، توخۇ يېغى،
موم يېغى، يۇمىلاقسۇت ياكى مەپپە قاتارلىقلارنى يالغۇز
① قۇبانى بەزىلەر چالاش دەپ ئاتايدۇ. ئەمما قۇبا پە-
قەت تېرىدىكى زەرەرلىنىش كوزدە ئۆتۈلمەيدۇ، چالاش بولسا -
ئومۇمىي بەدەن كېسىلىدۇر.

ياكى بىرلەشتۈرۈپ تېرىگە سۈركەش كۇپايە قىلىدۇ،
ئاچچىق ئۇرۇك يىلمى ياكى ھېلىلىنى سىركە بىلەن
سۈرۈپ چېپىشمۇ ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ.

2 - باسقۇچىدا، تېرىگە زۇلۇك قوندۇرۇش لازىم.
ئۇندىن كېيىن ئۇشەق، كۈندۈش، زەچىۋە، قەرەدەنلەرنى
باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، سىركە بىلەن
سۇيۇلدۇرۇپ چېپىشقا بېرىلىدۇ.

3 - باسقۇچىدا يۇقۇرقى دورىلار بىلەن بىللە،
ئىچىدىن ئىچىشكە مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە)نى
مائۇل جىپىن (181 - نۇسخە) بىلەن بىللە بېرىلىدۇ،
تېرە زەخمىلەنگەن بولسا، چېپىشقا مەلھىمى ئىسپىداچ
(179 - نۇسخە) بېرىش بىلەن بىللە، يەدەننى قۇۋۋەت-
لەندۈرۈش چارىلىرىنى قىلىش كېرەك.

بۇغداي يېغى چىقىرىش ئۇسۇلى:

ئاق بۇغدايدىن لازىم مىقداردا ئېلىپ، ئەخلىت
ۋە باشقا ئۇرۇقلاردىن تازىلاپ چوڭراق يايىلاق ۋە تۇز
تاش ئۈستىدە يېيىتىپ، ئۇنىڭ بىلەن تەڭ كېلىدىغان
تاختاي تومۇرنى ئوتتا قىزىتىپ بۇغداي ئۈستىگە قويۇپ
توپىمىدىن يەنە بىر ئېغىر تاش بىلەن باستۇرۇپ قو-
يۇلىدۇ. تاشنىڭ ئەتراپلىرىغا بۇغدايدىن چىققان ياغ
ساقىپ چۈشىدۇ. بۇنى يىغىپ ئېلىپ پاكىز قاچىدا
ساقلىنىدۇ. بۇ ھەرقانداق تېرە تەمرەتكىلىرىگە پايدىلىق.

سوغان (سوبوز)

بەدەندە كېرەكسىز سۇيۇقلۇقلارنىڭ يىغىلىپ قېلى-
شىدىن پەيدا بولىدۇ. كۆپىنچە يۈز تېرىلىرىگە چىقىدۇ.
كۆكرەك ياكى باشقا جايلارىغىمۇ تارايىدۇ. رەڭگى قىزىل
ياكى ئاقۇش بولۇپ، تېرىدىن روشەن كۆتىرىلىپ تۇرىدۇ.
دۇ. باسقاندا رەڭگى ئۆزگەرمەيدۇ؛ ئەگەر ماددىسى ئىس-
سىق بولسا قان غالىپلىق ئالامەتلىرى بولىدۇ.

داۋاسى: مەتبۇخى ھېلىمە (20 - نۇسخە) ياكى
مەتبۇخى ئەپتىمۇن (38 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. سۈرگە ئۇ-
چۇن ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) بېرىش مۇمكىن. سۇ-
زاپ، مۇرمەككىلىرىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ
سىرگە قوشۇپ چېپىش كېرەك.

دانەخۆرەكمۇ سوغاننىڭ بىر تۈرى بولۇپ، "سۇبۇ-
زى لەبەنى" (سۇتلۇك سوغان) دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇ-
چوڭراق قاپارتمىلاردىن ئىبارەت بولۇپ، ئىچىدە ياققا
ئوخشاش ئاق نەرسە تۈلۈپ تۇرىدۇ، قول بىلەن باس-
قاندا ئاق ئۇيۇل نەرسە چىقىپ كېتىپ ئاغرىمايدۇ،
كۆپىنچە پىشانە ۋە يۈز قىسمىلىرىدا پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: ھەببى قوقىيا (7 - نۇسخە) ياكى ھەببى
ئايارەج (17 - نۇسخە) بېرىپ ئىچى سۈرگۈزۈلىدۇ.
بۇنىڭ بىلەن بەدەن ۋە باش تەرەپتىكى ماددىلار تازى-
لىنىدۇ. تاشقى تەرەپتىن پۇرچاق ئۇنى، كۆيدۈرۈلگەن
تۇخۇم شاكىلى، كۆيدۈرۈلگەن سۈڭەك، قىمۇلىلارنى

باراۋەر مىقداردا ئېلىپ بۇمشاق سوقۇپ، قاينىتىپ سۈيى بىلەن يۈز يۇيۇلىدۇ ۋە خەربەق سەپىت ۋە چىغىرتماق بىلىتىنى سىركىدە سۇرۇپ دانىخورەككە چېپىش كېرەك ياكى زىغىر، قىزىل لوبىيا، سىيادان، ئۈزۈم ياغاچنىڭ كويىدۇرۇلگەن كۆلىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ سىركە قوشۇپ چېپىشقا بېرىلىدۇ.

سوگەل (سالىل)

كوپىنچە تېرە رەڭگىدىكى تېرىدىن كوتىرىلىپ تۇرىدىغان قاپارتمىلار بولۇپ، ئۇچى يۇمشاق، تۈۋى ئىنچىكە بولغانلىرى "مىمارى"، ئۇزۇن ساڭگىلاپ تۇرىدىغانلىرى "قىرۇنا" دەپ ئاتىلىدۇ. كېيىنكى خىلى تەتۈرىگە يانغان، ئەگرى مىخەك شەكىلدە كورۇنىدۇ. بەزىلەرى مۈگۈغا ئوخشاپ كېتىدۇ. سوگەلنىڭ نەملىشىپ تۇرىدىغانلىرى، كوپىنچە دائىم سۈركۈلۈپ تۇرىدىغان جاي-لاردا، مەسىلەن: بارماق ئارىلىقلىرى، قۇلتۇق قاتارلىق جايلاردا ئوسۇپ چىقىدۇ.

سەۋەبى: قويۇق خىلىتلارنىڭ كىچىك قانتومورلارغا قويۇلغانلىقىدىن، مەسىلەن: سەۋدا بىلەن بەلگەمنىڭ بىرىكىشىدىن پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى پىشۇرۇش ئۈچۈن ھائىل ئۇسۇل (105 - نۇسخە) بادام يېغى قوشۇپ ئىچكىۈزۈلىدۇ. سۈرگە ئۈچۈن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

ئوۋەندىكى سۈگەل چۈشۈرىدىغان دورىلارنى بىر قانچە كۈن سۈگەلگە چېپىلىدۇ:

(1) بۈرە، كەھرىبا، بۈرە ئەرمىنى، بۈرە، خەرنۇپ -
لاردىن بىرىنى ياكى ھەممىنى بىرلەشتۈرۈپ، سىركە بىلەن سۇيۇلدۇرۇپ سۈگەلگە چېپىلىدۇ. مۇشۇ دورىنى بىر قانچە قېتىم تەكرار سۈركەش بىلەن چۈشۈپ كېتىدۇ.

(2) سىيادان، ئاق تۇزلارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئوتكۈر سىركە بىلەن ئۇماچتەك ھالغا كەلتۈرۈپ سۈگەلگە چېپىپ قويۇلسا، سۈگەل ئۈزىچە چۈشۈپ كېتىدۇ.

(3) داۋا (يۇلغۇن مەۋىسى) نى سوقۇپ، سىركە بىلەن سۈگەلگە قويۇق ھالدا چېپىلىسمۇ سۈگەل چۈشىدۇ.

(4) تۇخۇمەك ئۈزۈمى، شەترەنجى ھىندىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ سىركە بىلەن يۇقۇرقىدەك ئىشلىتىلسا، سۈگەل بولىدۇ.

(5) گۇڭگۇرت پوقى، بورىق (ئورنىغا توغرىغۇ ئىش -
لىتىش مۇمكىن) باراۋەر مىقداردا، كۈندۈش يېرىم ھەسسە ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ سىركە بىلەن يۇقۇرقىدەك ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭغا زەرنىخ بىلەن زىراۋەندىن توغرىغۇ بىلەن تەڭ مىقداردا ئېلىپ قوشۇلسا نەتىجىسى تېخىمۇ ياخشى.

پاقالچەك يارىسى (بەتەم)

پاقالچەكلەردە خۇددى ئوسما ئۇرۇغىدەك مۇدۇر قاپارتمىلار پەيدا بولۇپ، كېيىنچە قاپارتمىلاردىن قارام -

تۈل كوكۇش رەڭلىك زەرداپ سۇ ئاقىدۇ ۋە ساقىيىشى تەس بولغان، ئۇزۇن مۇددەت داۋام قىلىدىغان جاراھەت شەكىللىنىپ چىقىدۇ. بۇ سەۋدا ماددىسىنىڭ پۈتۈن بەدەندىن ئاياققا تۈكۈلگەنلىكىدىن پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: قان ئېلىشقا مۇمكىن بولمىسا، تەكرار-تەكرار ھىجامەت قويۇش، زۇلۇك قوندۇرۇش، ئىلاجى بار قاپارتمىلار ئىچىدىكى ماددىلارنى چىقىرىپ تاشلاش لازىم. قەي قىلدۇرغۇچى دورىلارنى بېرىپ قۇستۇرۇش كېرەك. ئۇندىن كېيىن كۆيدۈرۈلگەن خىنا، داۋا، ئۇزۇن زىراۋەند، بىخ كەبىر پوستى، مامىرانچىنلارنى تەڭ مىق-داردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ 2 ھەسسە سىركە، بىر ھەسسە زىتۇن يېغى قوشۇپ، مايىمان قويۇق دورا تەييارلاپ سىرتتىن چېپىش كېرەك. ئۇزۇنغىچە ساقايمى-غان پاقالچەك يارىسىغا يېڭى سەۋزىنى قىرىپ، سىقىپ سۈيىنى چىقىرىپ داكنى چىلاپ تېڭىپ بەرسە ياكى شوخلىنىڭ سۈيىگە داكنى چىلاپ تېڭىپ بېرىلسە سا-قىيىشى تېزلىشىدۇ.

ئۇرۇمىسمان ئۆسمە (تۆتى)

شەكلى ئۆرمە (جۈجەم)گە ئوخشايدىغان كۈل رەڭ-لىك، جاراھەتلىنىپ تۇرىدىغان ئۆسمىدىن ئىبارەت بو-لۇپ، كۆپىنچە سوڭ توشۇكى يانلىرىدا، جىنسى لەۋلەردە ۋە ئەرلەر ئۇرۇقدان خالتىسى ئاستىدا پەيدا بولىدۇ. بەزىدە يۈز قىسىملىرىدىمۇ (ئىگەك، كالىپۇكلار) ئۇچرايدۇ.

پەيدا بولغان جايلارغا قاراپ ھوللەشكەن (مەقەت ۋە جىنسى لەۋلەردە) ياكى قۇرۇق (يۈزدە) بولۇشى مۇمكىن. **داۋاسى:** مەلھەمى زاڭگارنى ئۈسمە ئۈستىگە قو- يۇق سۇرتۇپ قويۇلسا، بىرقانچە ۋاقىت ئۆتكەندىن كې- يىن چۈشۈپ كېتىدۇ. تېگىدىن پەيدا بولغان جاراھەتكە يېڭى گۆش ئۇندۇرغۇچى دورىلار چېپىلىدۇ. زاڭگارنى چاپقاندا بىدەندە قىزىتما پەيدا قىلىشى مۇمكىن. شۇنىڭ ئۈچۈن جاراھەت بار چاغلاردا ئىشلەتمەسلىك لازىم.

تېرە ئاستىغا قان چۈشۈش (ئوبۇرسىما)

سەۋەبى: تاشقى زەخمىلىنىش (يىقىلىش، ئۇرۇ- لۇش) بىلەن تېرە ئاستى ئۇششاق قان تومۇرلىرىنىڭ زەرەرلىنىشى نەتىجىسىدە تېرە ئاستىغا قان چۈشىدۇ ياكى قان تەركىمىنىڭ بۇزۇلۇشى بىلەن تېرە ئاستىغا چېكىتىلغان قان چۈشۈشى مۇمكىن.

ئالامەتى: تېرە ئاستىدا كۆك رەڭدە تېرىدىن كۆ- تىرىلمىگەن ھەر خىل چوڭلۇقتىكى قانلىق چېكىت ۋە داغلار كۆرۈنىدۇ. بۇلارنى دىققەت بىلەن قارىغاندا ياكى قەل بىلەن بېسىپ تۇرغاندا، تومۇر كېڭىيگەندە كۆتىرىد- لىدۇ، تارايغاندا توۋەنلەيدۇ، باسقاندا ئويمانلىشىدۇ. قو- يۇپ بەرگەندە دەرھال ئەكسىگە كېلىدۇ.

داۋاسى: شاھ بەللۇت، موزا، ئاقاقىيا قاتارلىق قورنىغۇچى دورىلارنى مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ سوقۇپ سۇ بىلەن سۇيۇق ئۇماچ ھالەتكە كەلتۈرۈپ، قانمىغان نۇقتا

ئۇستىگە چېپىپ مەدكەم تېگىپ قويۇش، ھەركەتنى بىر مەزگىل چەكلەش لازىم.

يەل يارا (ئايىلە فەرەڭگى، ئاتەشەك) ①

يۇقۇمچان ۋە كېسەلنىڭ ئوز بەدىنىدە ئېغىر جىسمانى كەمتۈكلەكلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يارىلىق كېسەللىك بولۇپ، جىنسى ئالاقە، قاچا - قۇچىلار ئارقىلىق يۇقۇپ، ئەر - ئاياللارنىڭ جىنسى ئەزاسىدا، كالى پۈكتا قاتتىق مۇنەكچە پەيدا بولۇش بىلەن باشلىنىدۇ. مۇنەكچە بىر مەزگىلدىن كېيىن يوقىلىپ كېتىپ قايتا پەيدا بولغاندا جاراھەت ھاسىل قىلىدۇ. جاراھەتتىن زەرداپ سۇ ئېقىپ تۇرىدۇ، بارغانسېرى يوغانايدۇ، ئەگەر ۋاقتىدا توغرا تولۇق داۋالانمىسا، يارا ھاسىل بولغان ئەزالاردا بۇزۇلۇش كېلىپ چىقىدۇ. مەسىلەن، بۇرۇن ئولتۇرۇشۇپ كېتىدۇ، سۈڭەككە تەسىر قىلغاندا سۈڭەك قايناپ چىقىدۇ، ھەركەت دەخلىگە ئۇچرايدۇ؛ ئەڭ مۇھىمى مېڭە، يۈرەك قاتارلىق باشقۇرغۇچى ئەزالاردا ئۈزگە - رىش پەيدا قىلىدۇ. يەل يارا ئۇفۇنەت (مىكروپ) لىق كېسەللىك بولۇپ كېسەللىك يۈز بېرىشكە شارائىت تۇغدۇرۇپ بەرگەن خىلىتلارنىڭ ئالامەتلىرىگە ئاساسەن، ئۇنىڭ تۈۋەندىكى خىللىرى بار:

① ئايىلە فەرەڭگى — فرانسۇز يارىسى دېگەنلىك بولۇپ، سىغىلى كېسىلىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ كېسەل دەسلەپتە ئىسپانىيەلىكلەر ئارقىلىق فرانسىيىگە، ئاندىن ئۇلاردىن ياۋرۇپاغا تارقالغاچقا قەدىمقى كىتاپلاردا، فرانسۇز يارىسى، دەپ يېزىلغان.

(1) قان ئالامەتلىرى غالىپ بولغان تۈرى خەش
باش ئېغىر بولۇپ، باشتىكى قىزىل تومۇرلار قان بىلەن
تولۇپ، كۆپكەندەك كورۇنىدۇ. يۈزى قىزىل، كۆز چانە-
خىدا ئېغىرلىق سېزىدۇ. بۇ تۈرىدە جاراھەت قىزىل قال-
پارتىمىلاردىن ئىبارەت بولۇپ، كۆپىنچە ئەمەلىيەتتە بىر-
زىدە سۇلۇق قاپارتىمىلارغا ئايلىنىدۇ.

داۋاسى: ھىجامەت قويۇلىدۇ. مەتبۇخى سانا
(183 - نۇسخە) ياكى توۋەندىكى نۇسخىدىكى سۈرگە
بېرىلىدۇ.

نۇسخە: سانا 7 مىسقال، قىزىل گۈل 4 مىسقال،
سېرىق ھېلىلە پوستى، قارا ھېلىلە ھەر بىرى 5 مىس-
قالدىن، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، ئارپا بېسىدىيان، شاتەرە
گازىۋان، بادىرەنجىبۇيا، بىنەپشە، نىلۇفەر 3 مىسقالدىن،
سەرپىستان 60 دانە، ئۇرۇقسىز ئۇزۇم 60 دانە.

تەييارلاش: سانا، قىزىلگۈل، نىلۇفەر بىنەپشە ۋە
ئۇزۇمدىن باشقىلىرىنى چالا سۇقۇپ ھەممە دورىلارنى 2
چوڭ چىنە سۇغا بىر كېچە چىلاپ ئەتىسى يېرىمى قال-
خىچە قاينىتىپ، سىقىپ، سۇزۇپ 3 كە بولۇپ بىر
كۈندە ئىچىپ بولىدۇ. چىلان سۈيى بىلەن كۈنىگە 3
مىسقال مەجۇلى شاتەرە بېرىلىدۇ. جاراھەتكە سىرتتىن
چىپىش ئۇچۇن توۋەندىكى مەلەم ئىشلىتىلىدۇ:

(1) **نۇسخە:** ئۇزۇن زىراۋەند 2 مىسقال، كۈندۈش
بىر مىسقال، ئاچچىق ئۇرۇك مېغىزى بىر سەر، سىماپ
كۈشتىسى 2 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، سىركە ۋە گۈل يېغى بىلەن قۇيۇق ماي دورا تەييارلىنىدۇ.

(2) سەپرا ئالامەتلىرى غالىپ بولغان تەبىئىي بەدىنى ئۇرۇق سېرىققا مايىل، ئاغزى ئاچچىق ۋە تەش-ئاللىق كۆپ بولىدۇ. تۆمۈر ھەركىتى تېزلىشىش ۋە داش ئاغرىش، ئاچچىغى يامان بولۇپ قېلىش، ئۇيقا كەلمەس-لىكتەك روھى بەلگىلەر قوشۇلۇپ كېلىدۇ. سۇيىدۇكى قە-زىل كېلىپ، كوز ئالدىدا يوق نەرسىلەر - پاشا، كومۇ-تىلار ئۇچقاندەك كۆرۈنىدۇ. بەدەندىكى يارىلار ھۆل قا-پارتىملار بولۇپ، دائىم سېرىق سۇ چىقىپ تۇرىدۇ، جاراھەت يۈزى تەكشى ۋە چوڭقۇر بولىدۇ.

داۋاسى: ئىسكەنجىۋىل بۇزۇرى (100 - نۇسخە)، ئانار شەرۋىتى قاتارلىقلارنى بېرىپ سەپرانى پەسەيتىش كېرەك. ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن سۈرگە بېرى-لىدۇ.

نۇسخە: سېرىق ھېلىلە پوستى، سانا ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، شاتىرە 5 مىسقال، تەمىرى ھىندى، تەينۇلا 15 مىسقال، كاسىن ئۇرۇغى، ئاق لەيلى، ئىت ئۇزۇمى، زىراۋەند، قىزىل گۈل ھەر بىرى 3 مىس-قالدىن، چىلان 9 دانە، سەرىپىستان 9 دانە، تەرەنجە-ۋىل بىر سەر.

تەييارلاش: تەرەنجىۋىل، تەمىرى ھىندىلەردىن باش-قىلىرىنى چالا سوقۇپ 2 چوڭ چىنە سۇغا بىر كېچە

چىلاپ، يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، ئېرىتىپ سىقىپ سۇزۇلىدۇ، باشقا دورىلارنى قايناقتۇرۇپ چىلاپ ئوبدان تەمىنى چىقىرىپ سۇزۇپ يۇقۇرىدىكى دورىلارغا قوشۇلىدۇ. تەييار بولغان دورىنى بىراقلا ياكى بىرقانچە چىگە بولۇپ بىر كۈندىلا ئىچىپ بولۇش لازىم. يارىغا سىرتتىن ئىشلىتىش ئۈچۈن:

(1) نۇسخە: شادىنەج ئەدەسى، كۈندۈش، ئەنزۇرۇت ھەر بىرى بىر مىسقالدىن، گۈل يېغى 12 مىسقال، ئاق موم $1\frac{1}{2}$ سەر. تەييارلاش ئۇسۇلى: شادىنەج

ئېزىلىدۇ. باشقىلىرىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتە- كۈزۈپ، ئاۋال گۈل يېغىنى بىر ئاز قىزىتىپ بولغاندىن كېيىن، ئۈستىگە ئاق موم سېلىپ ئېرىتىپ، باشقا دورىلارنى قوشۇپ ماي دورا تەييارلىنىدۇ.

(2) نۇسخە: ئەنزۇرۇت، شادىنەج، ئاقاقىيا، ئانار گۈلى، خۇنسىياۋشىيان، زىراۋەندە ھەربىرى 2 مىسقالدىن، بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈ- زۇپ، تالقان دورا تەييارلاپ، جاراھەت ئۈستىگە سېپىشكە بېرىلىدۇ.

(3) بەلغەم ماددىسى غالىپ بولغان تۈرى: بەلغەم ئۇفۇنەتلەنگەن بولۇپ، بوغۇملار ئاغرىيدۇ. تېرە ئۈستى سوغاق، جاراھەت ھول، ئەتراپى ئاقۇش رەڭدە كېلىدۇ. ئېغىز- بۇرۇندىن سۇ ئېقىپ تىۋرىدۇ. سوغاق ھاۋا ۋە سوغاقلىقلار كېسەلنى ئېغىرلاشتۇرۇپ قويىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن ھەبىي ئىستىمىخقۇن (11- نۇسخە) ياكى ھەبىي قوقىيا (17- نۇسخىلار) بېرىلىدۇ. ھەپتىدە بىر كۈن ئىسكەنجىۋىل، ئەيكامە، سىركە، ئاقىرقەرھە بىلەن قۇستۇرۇش كېرەك. ماش، قىزىل گۈل، شۈمشە ئۇرۇغى، شەھى ھەنزەللەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، قاينىتىپ ئۇنىڭغا چىڭسەي سۈيى قوشۇپ سۇيىدە يارىنى يۇيۇشقا بۇيرۇلىدۇ. گۈل يېغى ۋە كالا- پاقالچەك يىلىڭى بىلەن ئاقىرقەرھە، قۇست، مەدەستان، ئەنزۇرۇت خۇنسىياۋ- شىيانلارنى ئارىلاشتۇرۇپ، ماي دورا تەييارلاپ چېپىشقا بېرىلىدۇ ياكى مۇنۇ نۇسخىدىكى دورا تەييارلاپ بېرىلىدۇ. نۇسخە: كۈندۈش 2 مىسقال، زىراۋەند، زەچچە، - سىماپ كۈشتىسى 2 مىسقال، سىركە، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ يېغى يېتەرلىك مىقداردا.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، ياغنى بىرئاز ئىسسىتىپ ئارىلاشتۇرۇپ ئۇستىگە سىركىنى قويۇپ، قويۇق ئۇماچتەك دورا تەييارلىنىدۇ. سىرتتىن سۈركىلىدۇ. (4) سەۋدا غالىپ بولغان تۈرى: بەدەن رەڭگى قارامتۇل، ئىلاشقان دەك بولۇپ قالىدۇ. بەدەن ئېغىرلى- شىدۇ، تومۇر ھەركىتى ئاستا ۋە كىچىك بولۇپ، سۇيىدۇك ئاق كېلىدۇ. جاراھەت ئويۇلۇپ كەتكەن ياكى قايناپ چىققان دەك بولۇپ، ئىچى قارامتۇل قىزغۇش رەڭدە، قۇرغاق كورۇنىدۇ. بەرلىرىنىڭ ئۈستى كىپەكلە-

شىپ، قارامتۇل قاسراق باغلايدۇ، روھىي ئالامەتلەر ئېچىلىشقا باشلايدۇ. غەزەپلىنىدۇ. ئۇيغۇر، خام خىيالچان، كىشىلەردىن قانچىلىغان بولۇپ قالمايدۇ. جاراھەت چوڭقۇرلىشىپ، سۆڭەكلەرگىچە يېتىپ بېرىپ ئېغىر ئازاپ كەلتۈرىدۇ. ساقايماي ئۇزۇن داۋام قىلىدۇ.

داۋاسى: ماددىنى سۇرۇپ چىقىرىش ئۈچۈن مەت-
بۇخى ھېلىلە (38- نۇسخە) ۋە مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20- نۇسخە) بېرىلىدۇ. ھېلىلە مۇرايىياسى بىلەن، تەركىۋىدە بىخ كەبىر بولغان ئىسكەنجىۋىل ھەسلىنى داۋاملىق بېرىش كېرەك. ئايارەج پەيشارانى ھەسەل سۈيى بىلەن بەرسىمۇ بولىدۇ. ئارىلاپ توۋەندىكى سۈرگە بېرىلىدۇ:

نۇسخە: سېرىق ھېلىلە پوستى 15 مىسقال، سانا، شاتەرە 5 مىسقالدىن، كاسىن ئۇزۇغى، بىتىپايەج، ئەپسەنتىن 3 مىسقالدىن، ئەپتىمۇن 5 مىسقال، خىيارى شەنبەر 1 سەر، تەرەنجىۋىل 1 سەر، بادام يېغى بىر مىسقال.

تەييارلاش: ئادەتتىكى قاينانما ئۇسۇلىدا تەييار-
لىنىدۇ. جاراھەتكە سىرتتىن سۈركەش ئۈچۈن:

كۈندۈش، كۈمۈش ئىقلىمىياسى ھەربىرى 2 مىس-
قالدىن، گۈڭگۈرت 3 مىسقال، زىراۋەندى، زەچەسۋە،
سىماپ كۈشتىسى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، سىركە، گۈل
يېغى يېتەرلىك مىقداردا.

تەييارلاش: يۇقۇرقىدەك ئۇسۇل بىلەن تەييار-
لىنىدۇ.

قىزىل گۈل، ئەنزۇرۇت، باراۋەر مىقداردا
ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ چاراهەتكە سېپىش
لازىم. بۇلار بىلەن توۋەندىكى مەجۇن بېرىلىدۇ:
ھېلىكە پوستى، ئامىلە، تۇربۇت، زەنجىۋىل،
شاتىرە ھەر بىرى 5 مىقالدىن، قەنبىل 4 مىقال،
ئەپتىمۇن 3 مىقال، قەن 10 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، قەندىنى قىيام قىلىپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

2- پەسەل: تېرە رەڭگى ئۆزگىرىش كېسەللىكلىرى ئاق كېسەل (بەرەس)

ئاق كېسەل — بەرەس، ئاۋلاق، پەسە دىگەن ناملار
بىلەن ئاتىلىدىغان كېسەللىك بولۇپ، تېرىدە ھەر خىل
چوڭلۇقتىكى ئاق داغلار چۈشۈش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ.
داغنىڭ خۇسۇسىيىتىگە قاراپ تىبابەتتە ئاق بەرەس
ۋە ئاق يەھەق دەپ 2 تۈرگە ئايرىلىدۇ.

سەۋىيى: ئاق كېسەلنىڭ مۇتلەق سەۋىيى ئېنىق
ئەمەس. بىراق تىبابەتتە بەدەندە قويۇق بەلغەم (بەلغە-
مى غەلىز) نىڭ غالىپلىغىدىن پەيدا بولىدۇ دىگەن كوز
قاراش مەۋجۇت.

ئالامەتلىرى: تېرە ئۈستىدە ھەرخىل چوڭلۇقتىكى

ئاق داغلار پەيدا بولىدۇ. ئۇنداق داغلار بەدەننىڭ مەلۇم خايلىرى بىلەن چەكلىنىشى مۇمكىن. بۇ "بەھق" دىيىلىدۇ. ئەگەر داغلار بەدەننىڭ كۆپ يېرىگە تارغان ۋە ئوزۇنلار بىرىكىپ يېيىلغان بولسا ئۇ "بەرەس" دىيىلىدۇ. داغلار ئاغرىمايدۇ. ئەمما كېسەلنىڭ تېرىسىدىكى تەبىئىي ئاق رەڭنى ئۆزگەرتىۋېتىپ، يۈز ساھەسىدىكى داغلار قىياپەتتىن قىسمەن ئۆزگەرتىۋېتىدىغانلىقى ئۈچۈن، كېسەل كىشى روھىي ئازاپ چېكىدۇ.

بەرەس بىلەن بەھقنى تۈۋەندىكى نۇقتىلارغا قاراپ بىر بىرىدىن پەرىقلەندۈرۈش مۇمكىن:

(1) بەھق كۆپىنچە چەكلىك دائىرىدە بولىدۇ. بەرەس كەڭ يامراشقا مايىل كېلىدۇ. بەھق تۈستىن بىلىنىپ، داۋالاش بىلەن تېزلا ساقىيىپ كېتىدۇ؛ بەرەس ئاستا پەيدا بولۇپ، تەدرىجى كېڭىيىپ يامرايدۇ، ئۇزاق مۇددەت داۋالاش تەلەپ قىلىنىدۇ.

(2) بەھق مەيلى قانچە كۈن بولسۇن، تېرىگە يېڭى سانچىغاندا قان چىقىدۇ. بەرەسنىڭ دەسلەپكى دەۋرلىرىدە قان چىقىمۇ كېيىن قان چىقىماستىن ئاقۇش سۈيۈقلۈك چىقىدۇ (تېرىگە يېڭى سانچىپ كۆر-گەندە گۆشكە سانچىپ تاشلاشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، تېرىنى كۈتىرىپ تۇرۇپ سانچىش كېرەك).

(3) بەھقتە داغ چۈشكەن تېرە سېرىققا مايىللىشىپ قالىدۇ، داغ ئورنىدىكى تۈكلەر ئاقارمايدۇ. بەرەستە

ئاقارغان تېرە ئۈستى پارقىراپ تۇرىدۇ، تۈكلەرمۇ ئاقىپ
رېپ كېتىدۇ.

(4) بەھەقتە تېرىنى ئۇۋىلىسا قىزىرىدۇ، بەرەستە
ئانچە ياخشى قىزارمايدۇ.

بەرەس بىلەن بەھەق يۇقۇرىدىكىدەك پەرقلەنسۇمۇ،
كۆپ ھاللاردا ئېنىق ئايرىۋېلىش تەس. شۇنىڭدەك ھەر
ئىككىسىنىڭ داۋاسى، پەرھىز قىلىدىغان ئىشلار ئاساسەن
ئوخشاش.

داۋاسى: ئاق كېسەلنى داۋالاش سەۋرىچانلىق ۋە
كېسەل كىشىلەرنىڭ روھى، ماددى جەھەتتىن ھەمكار-
لىشىشنى تەلپ قىلىدىغان ئىش. شۇڭا ئۇنى تەرتىپلىك
ھالدا ئېلىپ بېرىش لازىم، داۋالاشتا ھەرخىل سۈرگىلەر
ياردىمى بىلەن سەۋەبچى ماددىنى چىقىرىپ تاشلاش،
ئىچىدىغان دورا بېرىش، سىرتتىن دورا چېپىش، كۈن
نۇرىغا قاخلاش ۋە ئۈمۈمىي بەدەننى كۈچەيتىش، پەرھىز
قىلىش چارىلىرىنى كورۇشتىن ئىبارەت بىر قاتار
مۇرەككەپ داۋالاش ئۇسۇلى قوللىنىلىدۇ. ئۇنىڭ بىر
تارمىقى كەم بولسا، داۋالاش ئۈنۈمى كۈڭۈلدىكىدەك
بولماسلىقى مۇمكىن.

بۇزۇق بەلغەمنى چىقىرىپ تاشلاش ئۈچۈن، داۋا-
لانىڭ دەسلەپكى سەۋىيەسى ۋە بەلغەم سۈرگىسى بىرلىك-
دۇ. شۇنىڭدەك داۋالاش داۋامىدىمۇ بىرقانچە قېتىم
سۈرگە دورىلىرى بېرىپ تۇرۇلۇشى لازىم.

دەسلەپكى سۈرگىدىن بىر كۈن كېيىن، ئىچىش

ئۈچۈن تۆۋەندىكى دورىلاردىن بىرىنى تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك. تەجرىبىلەرگە قارىغاندا ئەتىرلار مەجۇنى ئاق كېسەلنى داۋالاشتىكى ئاساسى دورا ھىساپلىنىدۇ. تۆۋەندە دە ئىچىلىدىغان دورىلارنىڭ بىر قانچە نۇسخىسىنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز:

(1) بىر كېچە سىركىگە چىلاپ قۇرۇتۇلغان ئەتىرلار، ئاقىرقەرھار، بىخىكەبىر، شەترەنجى ھىندى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، ھەسەل 24 مىسقال، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ قائىدە بويىچە كۆپۈڭى ئېلىنغان ھەسەل بىلەن مەجۇن قىلىنىدۇ. كۈندە $1 \frac{1}{2}$ مىسقالدىن 10

كۈن ئىستىمال قىلىدۇ. كېيىن 2 مىسقالدىن 10 كۈن بېرىلىدۇ. مۇشۇنداق مىقدارنى ئاشۇرۇپ چوڭ كىشىلەرگە ئەڭ يۇقۇرى كۈنلۈك مىقدار بىرسەرگە يەتكۈزۈلىدۇ.
(2) نۇسخە، ئەتىرلار بىر ھەسە، ئاقىرقەرھار،

تۇرىيۇت، توم زەنجىۋىل ھەربىرى $\frac{1}{5}$ ھەسە، ھەسەل ئومۇمى دورا مىقدارىدىن 3 ھەسە.

تەييارلاش ئۇسۇلى ۋە ئىچىش مىقدارى يۇقۇردىكى بىلەن ئوخشاش.

(3) مەجۇنى بەرەس: تەركمۇي — قىزىل گۈل 8 سەر، ئوغرى تىكەن ئۇرۇغى 6 مىسقال، ئاقىرقەرھار 2

سەر. توم زەنجىۋىل $\frac{1}{2}$ سەر، ئاق تۇرپۇت 2 سەر،

تاغ زىرىسى 3 سەر. كۈپۈگى ئېلىنغان ھەسەل 60 سەر،
تەييارلاش ئۇسۇلى: تاغ زىرىسىنى بىر كېچە
سىزگىگە چىلاپ، سۇزۇپ قۇرۇتۇپ سۇقۇلىدۇ. باشقا
دورىلارنىمۇ سۇقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، كوپۈگى
ئېلىنغان ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن قىلىنىدۇ.
دەسلەپ ھەركۈندە يېرىم سەردىن يېنىشكە باشلاپ،
بارغانسېرى مىقدارىنى ئاشۇرۇپ كۈندە 2 سەرگە
يەتكۈزۈلىدۇ.

يۇقۇرىدىكى دورىلاردىن بىرىنى ئىچىشكە باشلاپ،
2-3 كۈندىن كېيىن ئاغرىق كىشى داغ چۈشكەن
جايىنى كۈن نۇرىغا قاقلاشقا باشلايدۇ. كۈن نۇرى تېرى-
گە تىك چۈشۈشى، قاقلاش ۋاقتى كۈندە ئاز-ئازدىن
ئۇزارتىلىشى لازىم. كۈن نۇرىغا قاقلانغاندىن كېيىن
تېرىنىڭ داغ چۈشكەن جايلىرى سۇ كۆتىرىپ چىقىشى،
قەقەش باغلىشى مۇمكىن. بۇ چاغدا كۈن نۇرىغا
قاقلاشنى توختاتسىمۇ بولىدۇ (بەك ئېغىر ياراللارنى
توختىتىش كېرەك).

دورا ئىچىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، داغلارغا تۈۋەن-
دىكى دورىلاردىن بىرىنى سۈركەش لازىم.

(1) قىزىل لوبيا، بىخكەبىر بىر ھەسسە، شەترەنجى
ھىندى، ئاقىرقەرەل، تۇرۇپ ئۇرۇغى، كۈندۈش، قىچا

يېرىم ھەسسە. قۇرۇق دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىككى كەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سىرگە قوشۇپ ئۇماچ ھالىغا كەلتۈرىدۇ. داغ چۈشكەن چاغدا سۈركەلەپ تېرىنى قىزارتىش تەسىرىنى كۆرسىتىدۇ.

(2) زەمچە، شورا، ئوردان، گىلىسى ئەرمىنى، شەترەنجى ھىندى، تومۇر دېتى، ئوسمانىل بويىغىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ سىرگە بىلەن سۇيۇق-لاندۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. بۇ دورا تېرىدىكى ئاقارغان جايىنىڭ رەڭگىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش تەسىرىنى كۆرسىتىدۇ. بۇنى دورا ئىچىپ، كۈن ئۇرغا قاقلاپ سۈكۈتىرىپ چىققان (پۈتۈنلىكى بۇزۇلغان) تېرىگە سۈركەسە ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ.

سىرتتىن چاپىدىغان دورىلارنى ئىشلىتىۋاتقان جەرياندا مۇزا قايىنىتىلغان سۇ ياكى زاك سۈيى بىلەن ئالدىنقى قېتىم چېپىلغان دورىنى يۇيۇپ تاشلاپ، (2) نۇسخىدا كۆرسىتىلگەن بويىچە دورىنى چېپىش لازىم.

ئومۇمەن داۋالاش جەريانىدا ئارىلاپ سۈركەپ بېرىپ ماددىلارنى سۇرۇپ چىقارغاندىن تاشقىرى، ئىتتىرىپىل كەب (1-نۇسخە)، ئىتتىرىپىل سىغىر (5-نۇسخە) لەرنى بىر تەمىزلىنىپ تەكشۈپ تۇرۇش، شۇنىڭدەك مەدجۇنى كەلگىلەندەج (132-131-نۇسخىلار)، قۇرسى بەرەڭگى، تەرياق ۋە مەدجۇنى مەشىدىر تۇس (25-نۇسخە) لەردىن بىرىنى بېرىش لازىم.

بەرەسنى داۋالاش جەريانىدا ۋە داۋالاشتىن كېيىن خېلى بىر مەزگىلگىچە قۇۋۋەتلىك تاماقلارنى بېرىش. ياۋا قۇشلار (ئۇلا كەكلىك، كۆك كەپتەر باچكىلىرى) نى كاۋاپ قىلىپ بېرىش. سۇت، قېتىق ۋە بېلىق گۆشى، تۇزلانغان گۆشلەر ھەمدە بەلغەم كۆپەيتىدىغان پۇرچاق خىلدىكى دانلىق ئاشلىقلار، ھول مەۋە بەزى كۆكتاتلار لاردىن پەرھىز قىلىش لازىم.

يۇقۇرىدا كۆرسىتىلگەن دورىلاردىن تاشقىرى، تۆۋەندىكى بىر قانچە خىل چارلەرمۇ بەرەس كېسىلىنى داۋالاشتا مەلۇم ئۈنۈمگە ئىگە. سىناپ ئىشلىتىش مۇمكىن: (1) قارا يىلاننى تۇتۇپ، ئۇنىڭ قېنىنى بەرەس دېغىغا قايتا-قايتا سۈركەش لازىم. ئاندىن يىلاننىڭ قوسىغىنى يېرىپ، ئىچىگە بەلگىلىك مىقداردا شاتەرە چۆپىنى تىقىپ، يىلان قوسىغىنى قايتا تەكىپ. ئاستا ئوتتا كاۋاپ قىلىنىدۇ، ئاندىن شاتەرەنى چىقىرىپ ئىلىپ، داغ چۈشكەن تېرىگە سۈركەپ بېرىش لازىم.

(2) زىڭىتى رۇمى، شورپا، قىزىل قىچا، ئاق ۋە قارا خەربەق، تۇخۇمەك ئۇزۇمى، ھاك، زەرىنىخ، قارا تۇغرىغۇ، ياۋا پىياز (ئەنەسەل)، شەتەرەنج ھىندى، ئاقىر قەرھا، سىمادان، بىخ كەبىر پۈستى قاتارلىق دورىلارنى يالغۇز ياكى بىر قانچىسىنى بىرلەشتۈرۈپ، كونا سىركە (قانچە كونا بولسا شۇنچە ياخشى) دە تاشقا سۇرۇپ (ياكى ئېرىتىپ) ئاق داققا چېپىلسا بولىدۇ.

قارا داغ (بەرەس ئەسۋەد)

تېرە يۈزىگە قارا داغ چۈشۈشتىن ئىبارەت كېسەللىك بولۇپ، 2 خىلغا بۆلىنىدۇ:

بىر خىلدا، داغ ئۈستىنى قول بىلەن سۈرتۈل-
سە قارا كېپەك چۈشىدۇ. بۇ ياشلاردا ئۇچرايدۇ.
يەنە بىر خىلدا تېرە قارامتۇل رەڭگە كىرىش
بىلەن قۇتۇردەك قېلىنلىشىپ قالىدۇ، قىچىشىدۇ.

داۋاسى: ئالدىنقى تۈرىنى داۋالاشتا مەتبۇخى
ئەپتىمۇن (20 - نۇسخە)، مائۇل جىيىن (181 - نۇسخە)
لار بېرىلىدۇ. مىزاجى تەڭشەش ئۈچۈن مونچىغا كىرىش
ۋە ھوللۇك نەرسىلەرنى ئىستىمال قىلىش، سىرتتىن مونۇ
دورلارنى چېپىش كېرەك. قارا خەرىق، زەرىنخ، زاك،
گۈڭگۈرت، تۇرۇپ ئۇرۇغى، بىتىپايەج، كۈندۈش، قۇستە
تەلخى، زاغۇنلارنى سۇقۇپ، سىركە بىلەن سۇيۇلدۇرۇپ
چېپىلىدۇ.

كېيىنكى تۈرىنى داۋالاش ئۈچۈن، ئاۋال سۈرگە
بەرگەندىن كېيىن، سىرتتىن يۇقۇرقى دورىلار چېپىلىدۇ.

داغ (كەلەق)، سەپكۇن (نەمەش)

يۈز تېرىسىدە پەيدا بولىدىغان تار ياكى كەڭ
دائىرىلىك قارا داغ "كەلەق" دەپ ئاتىلىدۇ. چېكىتىسمان
داغلار — سەپكۇن (نەمەش) دىيىلىدۇ. ئۇلارنىڭ پەيدا
بولۇشىغا تېرە ئاستىغا چۈشكەن غەيرى تەبىئىي ماددىلار
(قان، سەۋدا) نىڭ بۇخاراتلىرى سەۋەپ بولىدۇ. بەزى

قىزىتىملار (مەسىلەن، توت كۈنلۈك قىزىتما) ھامىلدارلىق، ھېيىز توختاپ قېلىش، كۈن نۇرىدا كويۇش، جىگەر كېسىلىدىن كېيىن پەيدا بولۇپ چىقىدۇ. سەپكۈن ئاتا-ئانىدىن مىراس بولۇپ قېلىشىمۇ مۇمكىن.

ئالامەتلىرى: پىشائە، مەخزى ۋە ئىگەك تېرى-سىدە چەكلىك دائىرلىك ياكى-كەڭ تارقالغان ھالەتتىكى ساغۇش، قارامتۇل داغلار پەيدا بولىدۇ. بەزىدە كېسەل ساقىيىپ، ھامىلە تۇغۇلغاندىن كېيىن تەدرىجى يوقىلىپ كېتىدۇ. ئەكسىچە بەزى كىشىلەردە مەڭگۈگە تۇرۇپ قالىدۇ، كۈن نورى ئاستىدا يۈرگەندە بارغانسېرى قىمىقلىشىپ كېتىدۇ.

سەپكۈن تۇلاراق بۇرۇن ئۈستى زە كوز ئەتراپىدا ئورۇنلىشىدۇ، قىسمەن كىشىلەرنىڭ يۈز تېرىسىنى پۇ-تۈنلەي قاپلاپ كېتىشى مۇمكىن.

داۋاسى: قان ۋە سەۋدا ماددىسىنى بەدەندىن چىقىرىپ تاشلاش ئۈچۈن ئەپتىمۇندىن 7 مىسقال، تۇر-بۇت، غارىقۇن بىر مىسقالدىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ تاللانلاپ 2 قېتىمدا ئەسكەنجىۋىل بىلەن يېمىشكە بېرىلىدۇ. سىرتتىن چېپىش ئۈچۈن: توغرىغۇ، قارىمۇچ 2 مىسقال-دىن، قوغۇن ئۇرۇغى، قىزىل لوبىيا كۈنجۈت، تۇرۇپ-ئۇرۇغى 4 مىسقالدىن، كۈندۈش بىر مىسقال، بادام مە-خىزى، گۈل سوسەن يىلتىزى، قىچا، تۇخۇمەك ئۈزۈمى، ئانار گۈلى، قىزىل گۈل 5 مىسقالدىن، مامۇرائىچىن (زە-

چىۋە) 2 مىسقالدىن، ئوقۇت، كەتدا 1 مىسقال، گىزۇرۇچ،
بۇغداي كىپىكى 2 سەر، ئايال سۇتى 15 مىسقال، 6 دانە
تۇخۇمنىڭ ئېقى، ئەنجۇر شىرسى 5 مىسقال، تەييارلاشتا
دورلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سۇت،
تۇخۇم ئېقى ۋە ئەنجۇر شىرسى بىلەن قويۇق ھالدىكى
دورى تەييارلىنىدۇ. ھەركۈنى كەچتە يۈزلى ئىسسىق سۇ
بىلەن يۇيۇپ، ئارقىدىن مەزكۇر دورىلارنى، قويۇق چېپىپ
ئەتىسى سۇ بىلەن يۇيۇۋېتىلىدۇ. داغ كونا بولسا بۇ
دورلارغا سىماپ كۈشتىسىدىن 2 مىسقال قوشۇش كېرەك.
ئەنجۇر شىرسى مۇنداق تەييارلىنىدۇ: ئوبدان پىشقان
ئەنجۇردىن بىر قانچىنى ئېلىپ، تازا مېچىپ داكىدىن
سۇزۇپ ئۆتكۈزۈپ سىقىپ قايناتسا ئاق رەڭلىك شرە
ھاسىل بولىدۇ. بۇ دائىم يۈزگە سۈركەپ يۈرسە بولىدۇ.
ھول ئەنجۇر بولمىسا، ئەنجۇر قىيىقىنى بىر كېچە قاي-
ناقسۇغا چىلاپ قويۇپ قاينىتىپ تەمى چىقىرىلسا بولىدۇ.

مەك (خەلەل)

تۇغما مەڭنى داۋالاپ ساقايتقىلى بولمايدۇ. مەڭنىڭ
بەزىلىرى كىشىلەر، بولۇپمۇ ئاياللار ئۈچۈن زىننەت بولىدۇ.
داۋالاش ھاجەتسىز. ئەگەر كۆپ بولۇپ ياكى جاراھەت-
لەتسە، ئالدى بىلەن بەدىنىنى سەۋدا ۋە غەيرى تەبىئى
قانىنى تازىلاش ئۈچۈن سۈرگە بېرىلىپ، مەڭنى كىيىدۇ-
رۇپ چۈشۈرۈش ئۈچۈن، ئاق كېسەلدە كۆرسىتىلگەن
زەرىئە، گۈڭگۈرتنى سىركە بىلەن چېپىش چارىسىنى

قوللىنىپ، بەرمەستە كورسەتكەن كونا سىركە بىلەن
يۇيۇلىدۇ ۋە سەپكۈن داغدا كورسەتكەن دورا سورتىلىدۇ.

تېرە كوكۇرۇپ قېلىش

يېقىلىش، ئۇرۇلۇش ياكى سوقۇلۇشلار بىلەن تېرە
ئاستىدىكى ئۇشاق قان تومۇرلاردىن چىققان قان تېرە
ئاستىغا يېغىلىپ قالىدۇ ياكى قان ئالغاندا كۆپ مىقدار
داردىكى قان سىرتقا چىقىستىن تېرە ئاستىغا چۈشۈپ
قالىدۇ.

داۋاسى: كالىك بەسەي ياكى چەلەك قۇلىغى (يو-
پۇرمىغى)، پىننە، زەرىنخ ۋە سىركە قاتارلىقلارنى بىر-
لەشتۈرۈپ سوقۇپ تېرىگە قويۇش كېرەك.

تېرە رەڭگىنىڭ بۇزۇلۇشلىرى

تېرە رەڭگىنىڭ ئېسىلىدىكى تەبىئى ھالىدىن ئۆز-
گىرىپ كېتىشى تۆۋەندىكى بىرقانچە قىسىمغا بۆلىنىدۇ.
(1) بەدەندە كۆپىيىپ قالغان كېرەكسىز ماددىلار
تېرە ئارقىلىق سىرتقا چىقىرىلىش تۈپەيلىدىن تېرىنىڭ
رەڭگى ئۆزگىرىدۇ، بۇنداقلار داغ كېسىلىدىكى چارە بە-
لەن ساقىيىپ كېتىدۇ.

(2) بەدەندە مەۋجۇت خىلىتلار بىرەرسىنىڭ غالىپ
بولۇشى تۈپەيلىدىن تېرىنىڭ رەڭگى ئۆزگىرىدۇ. مەسىلەن:
قان غالىپ بولسا تېرە قىزىرىدۇ، سەپرا غالىپ بولسا
ساغىرىدۇ، بەلغەم غالىپ بولسا ئاقىرىدۇ. سەۋدا غالىپ
بولسا تېرە قارىيىپ كېتىدۇ. بۇنداق ئەزالاردا خىلىت-
لارغا مۇناسىۋەتلىك زەرەرلىنىش ئالامەتلىرىمۇ روشەن

بولىدۇ. بۇخىل تېرە رەڭگى ئۆزگىرىشلەرنى داۋامسىيەت
يۈرەك، تال، جىگەر شۇنىڭدەك مەئدە كېسەللىكلىرىدەك
مەدەپچى كېسەللىكلىرىنىڭ ساقىيىشى بىلەن يوقىلىپ
كېتىدۇ.

(3) كۈن ئوردا ئۇزۇن ۋاقىت تۇرۇشتىن تېرە
رەڭگى بۇزۇلۇش: بۇنىڭدا تېرە رەڭگى قىزىرىپ كۆي-
گەندەك ئېچىشىدۇ، ئۇنى داۋالاش ھاجەتسىز. ئېغىر
بولسا ماش ئۇنى، تۇخۇم ئېقى، ئاچچىق بادام شاكىلى
(يۇمشاق سوقۇپ)، نىشاستىلەرنى سۇت بىلەن ياكى موگو
سۈيى بىلەن سۇيۇق ئۇماچتەك ھالغا كەلتۈرۈپ سورتىلىدۇ.
(4) بەدەن رەڭگىنى ئۆزگەرتىش تەسىرىگە ئىگە
دورىلاردىن جۈۋىنە زىرە ۋە باشقىلارنى كۆپ ئىستىمال
قىلىش بىلەن بەدەن رەڭگى ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. دورىلار
توختىتىلغاندىن كېيىن ئاستا-ئاستا ساقىيىپ كېتىدۇ.

(5) ئۇزاق كېسەل بولغۇچىلار ۋە بەدەننى ئورۇق-
لاپ كەتكەنلەرنىڭ رەڭگىمۇ ئۆزگىرىپ كېتىدۇ. بۇنداق-
لارغا ئوزۇقلۇققا باي تاماقلارنى بېرىش، ماۋۇل لەھمى
بېرىش لازىم ("جۈدەتكۈچى ئىستىما" غا قاراڭ). تۇخۇمنى
چالا پىشۇرۇپ قەن ۋە سۇت بىلەن بېرىش كۇپايە
قىلىدۇ.

ئومۇمەن بەدەن رەڭگى بۇزۇلۇشنىڭ قايسى تۈرى
بولسۇن ئىترىپىل كەبىر بېرىلسە نەتىجىسى ياخشى.

3 - پەسىل: تېرىنىڭ باشقا كېسەللىكلىرى

باش كېسەللىكلىرى (ھۇزاز)

باش تېرىسىدىن خۇددى بۇغداي كېسكىدەك
لەرسىلەر ئاجراپ چۈشىدۇ.
داۋاسى: ئالدى بىلەن، بەدەندە قايىسى ماددا
ھالىپلىق ئالامەتلىرى بولسا شۇلارغا قاراپ سۈرگە بېرە-
لىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن قاپاق مېغىزىدىن چىقارغان ياغ،
بادام يېغى ۋە بىنەپشە ياغلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ باشقا
سۈركەش كېرەك ياكى ئاق لەيلى، پۇرچاق، نوقۇت ئۇنى،
ئىسپۇغۇل لۇئابى قاتارلىقلارغا سىركە قوشۇپ باشقا
سۈركەش كېرەك.

تېرە يېرىلىش

تاشقى تەرەپتىن كۈن نۇرى، قۇرغاق ھاۋا، شامال،
توپا - چاڭ، سىرتتىن ئىشلىتىلگەن زاك، زەمچىلەرنىڭ
تەسىرى بىلەن قول، پۇت، يۈز تېرىلىرى يېرىلىپ
كېتىدۇ؛ ئىچكى سەۋەپلەردىن بەدەندە قۇرغاقلىقنىڭ بەك
ئېشىپ كېتىشى، چالاش، جىگەر خىزمىتى بۇزۇلۇش قا-
تارلىقلار تۈپەيلىدىن ئوچۇق تۇرىدىغان قىسىملار (يۈز،
قول، پۇت) تېرىلىرى يېرىلىشى مۇمكىن.

داۋاسى: ھوللىلىدۇرۇش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە
مايلار بىلەن بىنەپشە يېغى، بادام يېغى، گۈل يېغى، توخۇ،

ئودەك ياغلارنى كالا يىلىگى قاتارلىقلار بىلەن ياغلاش كۇپايە قىلىندۇ. ئىچكى سەۋەپلەردىن بولسا، يىمەك-ئىچمەكلىرىدە بەدەننى ھولەندۈرۈشتە دىققەت قىلىش لازىم. دورىلاردىن بىرە ئىسكەنجىيىنى ۋە ئىسكەنجىۋىل تەپتىمۇن (88-نۇسخە) بېرىلىدۇ. مەستىكى، قەلەي كۈشتىسى ۋە ئىشاستىلەرنى سوقۇپ گۈل يېغى، بادام يېغى، موم يېغى ۋە تۇخۇم ئېقى بىلەن ئېلىشتۇرۇپ يېرىلغان جايغا سۈركەش لازىم. سۇنچاق (پۇت ئارقىسى) ۋە ئالغانلار يېرىلغاندا موزا، كەتىرانى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئوتكۈزۈپ ئۈچكە يېغى بىلەن ئېلىشتۇرۇپ چېپىشقا بېرىلىدۇ. يېرىق گۆشكە يەتكەن بولسا گۈل يېغى ياكى زەپتۇن يېغى بىلەن داغلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن مەدەستانى خېنە سۈيىدە سۈرۈپ چېپىلىدۇ.

چالاش (قۇبا)

غەيرى تەبىئى سەۋدا ۋە قاندىن پەيدا بولىدىغان كېسەللىك بولۇپ، ئادەتتە قۇرۇق ئىسسىق كېسەلى دەپ ئاتىلىدۇ. بۇنىڭ ۋۇجۇتقا كېلىشىدە ئوزۇقلىنىشنىڭ ناچار-لىغىنىنىڭ ئالاھىدە تەسىرى بار. خىلىتلارغا قاراپ تېرە قارامتۇل ۋە قىزغۇچ رەڭگە كىرىدۇ، بۇ خىل ئۆزگىرىش كۆپىنچە گەردەن، بويۇن، كۆكرەك، قول، پۇت دۈمبىلە-لىرىدە كۆرىلىدۇ. تېرە قۇرغاقلىشىپ بېلىق قاسراقلىرىدەك قاسراقلىشىپ، قېلىنلىشىدۇ. بۇنىڭغا ئەگىشىپ

ئومۇمىي بەدەندە ئۇيقۇسىزلىق، ئويچانلىق، ھەر خىل يامان خىياللارنى قىلىش، جويلىش ھادىسىلىرى كېلىپ چىقىدۇ، ئىس-ھۇشى جايىدا بولمايدۇ، تىلى ئاق ياكى قىزىق رەڭدە ۋە يېرىلغان بولىدۇ. سەپرا غالىپ بولسا كۆپ ئۇسسايدۇ، ئاغزى ئاچىق بولىدۇ. سۇيدۇكى قىزغۇچ سېرىق رەڭدە كېلىدۇ، تومۇر ھەركىتى تېز ۋە كىچىك بولىدۇ، ئىشتەي تۇتۇلىدۇ، قوسىغى ئاغرىپ، ئىچى سۇرىدۇ.

داۋاسى: بىيە ئىسكەنجىۋىلى (88-نۇسخە) ۋە مائۇل جىبىن (181-نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئىچىش ئۈچۈن كاسىن ئىرەقى ۋە بىدىمۇشكى ئىرەقى بېرىلىدۇ. كۆك قاپاق بىلەن ئاش قىلىپ كۆك يۇمىلاقسۇت، پالەك سېلىپ، بىرئاز بادام يېغى قوشۇپ بېرىش لازىم. بېرە-لىدىغان نان ئۈچۈن كىپەكلىك ئۇندا ياققان نان، چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم، مائۇللەھى ("جۈدەتكۈچى ئىستما"غا قارالغۇ)، مائۇل جىبىن (181-نۇسخە) بېرىلىدۇ. سىرتتىن چېچىش ئۈچۈن توۋەنكى ئۇسخىدىكى دورا ماددىنى سۇرۇپ تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (184-نۇسخە) بېرىلىدۇ.

نۇسخە: توخۇ يېغى، ئودەك يېغى، كالا يىلىگى ھەر بىرى 4 سەردىن، ئاق موم بىر سەر، زىغىر، قاپاق ئۇرۇغى مېغىزى بىر سەر، كۈنجۈت يېغى تۆت سەر، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، شۈمە ئۇرۇغى، زىغىر، ئىسپۇغۇل، بىيە

تۇرۇغى بىر سەر، كەتبرا، نىشاستە ھەربىرى ئىككى مىسقالدىن.
تەييارلاش: ئالدى بىلەن زىغىر، ئىسپۇغۇل، ئاق
لەيلى تۇرۇغى ۋە شۇمىلارنى سۇغا چىلاپ شىرىسى
(لۇئابى) چىقىرىلىدۇ. كەترانى سوقۇپ نىشاستە بىلەن
ئارىلاشتۇرۇپ ئەلگەكتىن ئوتكۇزىلىدۇ. ياغلارنى تومۇر
قاچىدا قىزىتىپ، ئۈستىگە ئاق موم سېلىپ ئىبرىگەندە
لۇئابلار قويۇلىدۇ. لۇئابلارنىڭ سۈيى قالمىغاندا سوقۇل-
غان دورىلارنى سېلىپ، ياخشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلاپ
شەشە قاچىلاردا ساقلاپ ئىشلىتىلىدۇ.

4- پەسىل: چاچ كېسەللىكلىرى

چاچ چۈشۈش (دائىل سۆڭەك)

چاچ چۈشۈش — چاچ ئوزى چۈشۈش ۋە تېرە
قوشۇلۇپ چۈشۈش دەپ 2 گە بۆلىنىدۇ. دائىل سۆڭەك دىگەن
سۆز "تۈلكە كېسىلى" دىگەن مەنانى بىلدۈرىدۇ. تۈلكە-
لەرنىڭ تۈكى چۈشۈشكە ئوخشىتىپ شۇ نام بېرىلگەن.
تېرە بىلەن قوشۇلۇپ چۈشۈش "دائىل ھەييە" (يىئان
كېسىلى) دىگەن سۆز بولۇپ، خۇددى يىئان تېرە تاشلى-
غاندەك ئادەم تېرىسىنىڭ چاچ - تۈكلەر بىلەن توكۇلۇشىنى
ئىپادىلەيدۇ. بۇ ئىككى كېسەلنىڭ قايسى بىرىدە بولسۇن
چاچ. ساقال - بۇرۇن ۋە قاش - كىرىپىكلەر چۈشۈپ كېتىدۇ.
سەۋەبى: غەيرى تەبىئى خىلىتلارنىڭ تېرە ۋە

چاچ يىلتىزلىرىغا تەسىر قىلىشى يەنى بەلغەم ياكى قاننىڭ كويۇشى سەۋەپ بولىدۇ. چاچ چۇشۇشنى داۋالاش مۇمكىن. تېرە قاسراقلىشىپ چۇشۇش كېسلىنىڭ ① ساقىيىشى تەسىرەك.

ئالامەتلىرى: چاچلار (تۈكلەر) چۇشۇش بەلغەم سەل مەخىل ئىسلىتلار غالىپلىق ئالامەتلىرى ئىپادىلىنىشى مۇمكىن. مەسىلەن، بەلغەم غالىپ بولسا يەرلىك ئورۇن ئاق، بۇمشاق بېرىلىدۇ؛ بەدەندىمۇ بەلغەم ماددىسى كۈچ-لۈك ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. سىپاردىن بولغانلىرىدا بەدەن سېرىق ۋە ئورۇق، تېرە يىرىك بولىدۇ؛ قاندىن بولغاندا سىرىدا باش ئېغىر، ئاغزى تاتلىق، كوزى قىزىل ۋە چاچ چۇشكەن جاينىڭ رەڭگىمۇ قىزىل كېلىدۇ؛ سەۋدادىن بولغانلىرىدا تېرە قارامتۇللىشىدۇ ۋە روھىي ئالامەتلىر مەۋجۇت بولىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن ماددىلارنى پىشۇرىلىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن سۈرگۈچى دورىلار بېرىلىدۇ. مەسىلەن، بەلغەم ماددىسى غالىپ بولغاندا مائىل ئۇسۇل (105 - نۇسخە) بېرىپ ئارقىدىن ھەببى قوقيا (17 - نۇسخە) بۇيرۇلىدۇ ياكى ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) ۋە ھەببى شەبىيار (82 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ماددىلار تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، ياۋا پىياز سۇيىنى سۈركەش، قىچا، ئاقىر

① تېرە قاسراقلىشىپ چۇشۇش كېسلى دوختۇرلىقتا تېرە چۇشىدىغان تېرە ياللۇغى دەپ ئاتىلىدۇ.

قەرە، پەرىپىيون ۋە كالا ئوتى سۈكەش؛ گۈل يېغى، شاھى بەللۇت، ئاق موم، گۈل سۈسەن يوپۇرمىغىنىڭ سۈلىرىنى تۇخۇم سېرىغىغا ئارىلاشتۇرۇپ سىرتتىن سۈركەش كېرەك.

(2) سەپرا ماددىسى غالىپ بولغاندا، مەتبۇخى ھېلىلا (38 - نۇسخە)، مەتبۇخى خىيارى شەنبەر 54 - نۇسخە بېرىلىپ، سىرتتىن سىركە بىلەن گۈل يېغى ياكى ئوزۇر كوپۇكى دەريا، ھەببۇل ئاس سۈيى، ئاق لىلى گۈلى، بۇغداي كىپىكى شىرىلىرىنى ئارىلاشتۇرۇپ سۈركەش كېرەك. قان ماددىسى غالىپ بولغاندا، ھىجامەت قويۇش، ئىلۇفەر، بىنەپشە، كاسىن ئۇرۇغى، ئىت ئۇزۇمى، تەمرى ھىندى قاتارلىقلارنى چىلان شەرۋىتى بىلەن بېرىپ، سىرتتىن سۈركەشكە سەۋدا ماددىسى غالىپلىقتىكى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ.

سەۋدا ماددىسى غالىپ بولغاندا، مەتبۇخى ئەپتە - مۇن (20 - نۇسخە) مائۇل جىبىن (181 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. مونچىغا چۈشۈش، بادام يېغى، بىنەپشە يېغى بىلەن ياغلاش لازىم. بۇ خىلدىكى چاچ چۈشۈشلەرگە مەخسۇس سىرتتىن سۈركەش ئۈچۈن:

- (1) ياۋا پىياز سۈيى، خوراز يېغى، يولۋاس يېغىنى باراۋەر مىقداردا ئارىلاشتۇرۇپ بېرىلىدۇ.
- (2) پەرىپىيون، قومۇش يىلتىزى، مېھرىگىيا گۈلى، تۇرۇپ سۈيىنى كونا زەيتۇن يېغى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ بېرىلىدۇ.

چاچ سۇنۇپ چۇشۇش (تەساقۇتى شەئىر)

چاچلار چۇشكەندە سۇنۇپ چۇشۇشتىن ئىبارەت بولۇپ، بەدەندە چاچلارنىڭ ئۇ سىشىگە ياردەم بەرگۈچى قۇۋۋەتنىڭ يېتەرسىزلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ. جۇدە تىكۈچى قىزىتما، ئۇزۇنغا سوزۇلىدىغان كېسەللىكلەر، يەل يارا (سفىلىس) لەردە ئۇچرايدۇ. تاز كېسىلىدىمۇ چاچلار سۇنىدۇ. ئالامەتلىرى: بەدەن ئورۇتى، ئىشتەي تۇتۇلغان بولۇپ، چاچ، ساقاللار سۇنۇپ چۇشىدۇ، چاچ چۇشكىن جاي تېرىسى يۇمشاپ قالىدۇ.

داۋاسى: بەدەننى ھوللەندۈرۈش تەدبىرلىرىنى كۆرۈش بىلەن ئوزۇقلىنىشنى ياخشىلاش، ياخشى دەم ئالدۇرۇش كېرەك. ئاچچىق بادام يېغى بىلەن چاچنى ياغلاش ياكى ئامىلە يېغى سۈركەش كېرەك. ئامىلە يېغى تەييارلاش ئۇسۇلى مۇنداق:

ئامىلە پوستى، ئاس يوپۇرمىغى، سەنۇبەر دەرىخىنىڭ يىلتىزىنى باراۋەردىن ئېلىپ، يېتەرلىك مىقداردىكى سۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى قاينىتىپ سۇزۇپ، سۈيىگە باراۋەر مىقداردا كۈنجۇت يېغى قۇيۇپ قاينىتىلىدۇ. سۇ تۇگەپ ياغ قالغاندا شىشىگە ئېلىپ ساقلىنىدۇ ۋە كېرەك بولغاندا ئىشلىتىلىدۇ. تازدىن بولغانلىرىدا تازنى داۋالاش بىلەن بىللە ئاق لەيلى ئۇرۇغىنىڭ شىرىسى ۋە ھەمشۇا سۇلىرىنى سۈركەش كېرەك.

چاچنىڭ يېرىلىپ كېتىشى (تەشەققۇقى شەبىر)

بۇ كېسەلدە چاچ ئۇچى تالا-تالا بولۇپ ئېتىلىپ (يېرىلىپ) كېتىدۇ، چاچ ئوسۇستىن توختايدۇ، پاقىرىماي قالىدۇ. بۇنى ئادەتتە بىردىنلا بايقىغىلى بولمايدۇ، ئىنچىكىلىپ قارىغاندىلا كورۇش مۇمكىن.

داۋاسى: قان كوپلۇك ئالامەتلىرى بولسا ھىجا-مەت قويۇش، ماددىنى تازىلاش ئۈچۈن مەتبۇخى ئىپتى-مۇن (20-نۇسخە) بېرىش كېرەك. ئەگەر قۇرۇقلۇق بولسا سۈركە بېرىشكە بولىدۇ. بەدەم يېغى، پىنەپشە يېغى بىلەن ياغلاش لازىم.

باشتىن ياغ تەپچۈرەپ چىقىش

بۇ كېسەلدە چاچنى ياغلاپ قويغاندەك ياغ چىقىپ تۇرىدۇ، باش كىيىملىرى، ياستۇقلار دائىم ياغلىشىپ كېتىدۇ. سەۋىيى، باش تېرىسىدە ياغ ماددىلىرى زىيادە بولۇپ كېتىشىدۇر.

داۋاسى: ھەببى ئايارەج (7-نۇسخە) ياكى ھەببى قوقيا (17-نۇسخە) بىلەن ماددىدىن تازىلاپ بولغاندىن كېيىن، ئىتتىرىپىل كەبىر (1-نۇسخە) ياكى ئىتتىرىپىل سەغىر (5-نۇسخە) بېرىلىدۇ. تۈز، ئوسما، پىننىلەرنى قوشۇپ قايناتقان سۇ ياكى بۇغداي كېپىكى، ئاق ئەيلى قايناتقان سۇ بىلەن باشنى يۇيۇش كېرەك. باشقا ئاچچىق بەدەم يېغى سۇرۇش لازىم.

چاچنىڭ بۇرۇن ئاقىرىپ كېتىشى

ياشاغاندا چاچنىڭ ئاقىرىشى تەبىئىي ئەھۋال. ئەمما قان ئۆزىنىڭ ئېتىدالدىكى قويۇقلۇقى، شېرىسى ۋە ھارارىتىنى ساقلاپ قالالسا چاچ ئاقارمايدۇ. ۋاقىتسىز ئاقىرىشنىڭ سەۋىيى قاننىڭ يۇقۇرىدىكى خۇسۇسىيەتلىرىنىڭ بۇزۇلۇشىدىن ئىبارەت. چاچنىڭ ۋاقىتسىز ئاقىرىشى ئاتا-ئانىدىن مىراس بولۇپ قالىدۇ (ئىرىسى بولىدۇ) دېگۈچىلەرمۇ بار؛ چاچنىڭ ۋاقىتسىز ئاقىرىشى زىچى ئامىل ۋە تەسىراتلارغا باغلىقلىقى ئېنىق.

داۋاسى: ھەپتىدە بىر قېتىم بەلغەم سۈرگىسى بېرىلىپ، ھەر ئايدا بىر ھەپتە ئىتتىرىپىل سەغىر (5-نۇسخە) ئىچىشكە بۇيرۇلىدۇ. ھەر كۈنى ئاشتىدا بىر دانە ھېلىك مۇرابباسى بېرىلىدۇ. چاچ ۋاقىتسىز ئاقىرىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە چاچنىڭ قارىلىغىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن، مەجۇنى ئالادۇر (185-نۇسخە)، جەۋارىسى جال-مۇس (3-نۇسخە)، مەشدىرتۇس (25-نۇسخە) قاتارلىق لاردىن بىرىنى دائىم ئىچىپ يۈرۈشكە بۇيرۇلىدۇ. بۇ جەھەتتىن توۋەنلىدىكى نۇسخە مەخسۇس چارە ھىساپلىنىدۇ:

نۇسخە: سېرىق ھېلىك پوستى 1 سەر، قارا ھېلىك 1 سەر، كۈندۈر، لۇبان، تاباشىر ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، پىلىپىل $2\frac{1}{2}$ مىسقال، زەنجىۋىل، ئىگىر، قىزىل

كۈل ھەر بىرى $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، ئاق سەندەل، كاسىن

ئۇرۇغى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، ھەسەل $7\frac{1}{2}$ سەر،

ھېلىلە مۇرابباسى $7\frac{1}{2}$ سەر، تەييارلاش: دورىلارنى يۇم

شاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ھەسەلنى بىر قاچىغا
ئېلىپ، چىرىق-راق قاچىغا سۇ قۇيۇپ، ھەسەل قاچىلار
خان قاچىنى ئۇنىڭغا سېلىپ ئوتتا ئېرىتكەندىن كېيىن،
ئۈستىگە ھېلىلە مۇرابباسى سېلىنىپ، ياخشى ئارىلاشتۇرۇل-
دۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن سوقۇلغان دورىلارنى سېلىپ
ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ، كۈنگە 3 مىسقالدىن
يىيىشكە بېرىلىدۇ.

چاچنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۇسۇللىرى

چاچنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈن ئۇمۇمىي بەدەن
نىڭ سالامەتلىكىنى ساقلاش بەك مۇھىم، ئۇمۇمىي بەدەن
ساق بولسا، چاچمۇ ساغلام ئۆسىدۇ. باش تېرىسىنى تەز-
تېپىك ھالدا تىرناق ياكى تاغاق بىلەن غىدىغلاپ،
ئۇنىڭ قارشىلىق كۈچىنى ئۆستۈرۈش بەلگىلىك ئەھمىي-
يەتتە ئىكەن. چاچنى شۇلتىسى ئاز سۇ بىلەن يۇيۇش
پايدىلىق. يالاڭباش يۈرۈش چاچ چۈشۈشكە مەلۇم دەرىجە
جىددە سەۋەبچى بولىدۇ. چاچنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈن
تۆۋەندىكى دورىلارنىڭ ئۇنۇمى خېلى ياخشى:

(1) قارا ھېلىلىنى قايناتقان سۇ، تىرمىس سۈيى، تاتلىق ياڭيۇ (خۇڭشۇ - چۇقۇندەز) سۈيى، ئامىلە سۈيى (قۇرۇق ئامىلە قايناتقان سۇ) قاتارلىقلار بىلەن چاچنى يۇيۇش كېرەك.

(2) لادەن يېغى بىلەن چاچنى ياغلاپ تۇرۇش لازىم، لادەن يېغى تۈۋەندىكىچە تەييارلىنىدۇ:

نۇسخە: لادەن 2 مىسقال، كۈنجۈت يېغى 4 سەر، قارا ھېلىلە 10 مىسقال، تاتلىق ياڭيۇ سۈيى 10 مىسقال، قىزىل لوبىيا سۈيى 10 مىسقال. تەييارلاشتا قارا ھېلىلە بىلەن لادەننى سوقۇپ يۇقۇرىدىكى سۇلارغا بىر كېچە - كۈندۈز چىلاپ، ئەتىسى كۈنجۈت يېغى قۇيۇپ قاينەتسە، سۈيى تۈگەپ يېغى قالغاندا ئېلىپ شىشە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ، لازىملىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

(3) چاچنى ئۇزارتىش ئۈچۈن، باشنى دائىم ئامىلە قايناتقان سۇ بىلەن يۇيۇش پايدىلىق (نۇشدارى تەييارلاش جەريانىدا ئامىلەنى يۇغان سۇ بولسا ناھايىتى ياخشى). ئاس يوپۇرمىغى، قىزىل گۈللەرنى يۇمشاق سوقۇپ، ئامىلە سۈيىگە ئارىلاشتۇرۇپ باشقا چېپىش كېرەك ياكى تاتلىق ياڭيۇ سۈيىگە سوقۇلغان قىچىدىن ئازراق ئارىلاشتۇرۇپ سۈركىسىمۇ بولىدۇ.

(4) چاچ ئۇندۇرۇش ئۈچۈن، كونا زەيتۇن يېغى، قەيسوم چوپىنىڭ كۆل ۋە كوپۇكى دەريالارنى ئارىلاش تۇرۇپ سۈركەش ۋە چاچ چۈشۈش ماۋزۇسىدىكى چارىلارنى قوللىنىش لازىم.

ئەگەر داۋالاش مەخسەتدە چاچنى چۈشۈرۈشكە توغرا كەلسە، مۇنۇ چارلاردىن بىرىنى قوللىنىش مۇمكىن:

(1) سۇ تەگمىگەن ھاك، زەرەخ 4 مىسقالدىن، كۆيدۈرۈلگەن سەدەپ، كۆپۈكى دەريا، گەجىدىن 2 مىسقالدىن ئېلىپ، سوقۇپ ئۈچ دانە تۇخۇم ئېقىغا ئارىلاش تۇرۇپ تەييارلىنىدۇ، ئۇنى باش تېرىسىگە چېپىپ بىر قانچە سائەت يوقىپ قويۇل، چاچ چۈشۈپ قېلىدۇ.

(2) مىڭ تىۋانە ئۇرۇ، ئۇيۇن، شىكران، مېرى گىيا كۈلى قاتارلىقلارنى سىركە بىلەن ئېلىشتۇرۇپ چېپىلىمۇ بولىدۇ.

(3) موزا بىلەن چۈمۈلە تۇخۇمنى سوقۇپ تاشپاقا قېنى قوشۇپ چېپىش كېرەك.

ئەگەر چاچ (تۈك)نى چۈشۈرۈپ مەزكۇر بولۇپ، دورىلارنى چاپسا شۇ ئورۇنغا قايتا تۈك ئۆتمەيدۇ.

5- پەسىل: تىرناق كېسەللىكلىرى

تىرناققا ئاق چۈشۈش

غەلىز بەلغەمنىڭ تىرناققا چۈشۈشىدىن كېلىپ چىقىپ، تىرناققا ھەرخىل چوڭلۇقتىكى ئاق چېكىتلەر پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: بەلغەمنى سۇرۇپ چىقارغاندىن كېيىن، ئۈزۈچە ساقىيىمۇ كېتىدۇ، ئەگەر يەنىلا شۇ يېتى تۇرسا،

زىغىر بىلەن شۇمشىنى سوقۇپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ
تىرناققا چېپىلىدۇ ۋە زوپىتى رە تەپ، ئۆشكە تۇۋىغىنىڭ
كۈلى ۋە قومۇش يىلتىزلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ سوقۇپ چېپىش كېرەك.

تىرناق سارغىيىپ قېلىش

تىرناقلارغا سېرىق رەڭلىك داغلار چۇشۇپ تىرناق
رەڭگىنى ئۆزگەرتىپ قويدۇ. قان ئازلىق ئېغىر كىشىلەردە
ۋە سەپرا غالىپ كىشىلەردە كۆپرەك ئۇچرايدۇ.

داۋاسى: قان ئازلىق روشەن بولسا كۆپەيتكۈچى
دورملارنى بېرىش كېرەك. بەدەننى سەپرادىن تازىلاش
ئۈچۈن، مەتبۇخى ھېلىلا (38-نۇسخە) بېرىلىدۇ. زاغۇن
نى يۇمشاق سوقۇپ سىركە قوشۇپ سىرتتىن چېپىلىدۇ.

پور تىرناق

تىرناق قېلىنلىشىپ يېرىلىپ كېتىش "پور تىرناق"
دەپلىنىدۇ. بەزىلەر بۇنى تىرناقنىڭ جوزام كېلى دەپ
قارايدۇ. ئەمەلىيەتتە ئۇ تىرناقنىڭ تاز كېسىلىدىن ئىبارەت
بولۇپ، تىرناق چۈكۈلۈش سۈندۈ. كۆپىنچە تاز كې.
سىلى بارلاردا بولىدۇ.

داۋاسى: مەۋدانىڭ كۆيۈشى سەۋەپ بولغانلىقى
ئۈچۈن، ئالدى بىلەن مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20-نۇسخە)
بېرىلىدۇ. بەدەننى ھوللەندۈرۈشكە تىرىشىلىدۇ؛ موم يېغى،
ئودەك ياغلىرى بىلەن ياغلاش ۋە مەلھىمى داخلىئون
(177-نۇسخە) مايلاش كېرەك. بۇنىڭ بىلەن ئەسلىدىن

كى زەرەرلەنگەن تىرناق يۇمشاپ ئاخراپ تېگىدىن يېنى ساغلام تىرناق ئۈسىدۇ، بەزىدە ساق تىرناقلارنىڭ ئاغرىشى ئۇچرايدۇ، ئۇنى داۋالاش ئۈچۈن قاپاق يوپۇرمىغى، ئاس يوپۇرمىغىنى سوقۇپ، تىرناققا قويۇپ ئۈستىنى تېگىپ قويۇش كېرەك ياكى خام ئانارنى مۇسەللەستە قاپىتىپ، پىشۇرۇپ، ئانارنى يانچىپ تىرناق ئۈستىگە قويسا بولىدۇ.

تىرناقنىڭ باشقا زەخمىلىنىشلىرى

(1) تىرناق يانچىلىپ كېتىش - ئۇرۇلۇش، سوقۇ-لۇشلار بىلەن تىرناقنىڭ يانچىلىپ كېتىشى كۆپ ئۈچ-رايدۇ، مۇنداق چاغلاردا ئاغرىش قاتتىق بولىدۇ. **داۋاسى:** ئاغرىشنى توختىتىش ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ئانار يوپۇرمىغى ياكى ئاس يوپۇرمىغىنى سوقۇپ تىرناق ئۈستىگە قويۇش لازىم. ئاغرىش پەسەيگەندىن كېيىن، بۇغداي ئۇنىغا زەيتۇن يېغى قوشۇپ تىرناققا قويۇش ياكى چەلەڭنى سوقۇپ، ئېرتىلىگەن ئۈشكە يېغى قوشۇپ قايىنىتىپ، سۈيى قىلغاندا ئېلىپ تىرناققا چې-پىش لازىم. بۇ تىرناقنى مۇھاپىزەت قىلىدۇ. ئەگەر تىرناق جاراھەتلىگەن بولسا، ئەنزۇرۇتنى سوقۇپ جارا-ھەت ئۈستىگە سېپىش كېرەك.

(2) تىرناق تۈۋىنىڭ قىچىشى - تىرناق تۈۋى قىچىشقاندا ماش، پۇرچاق قايىنىتىلغان سۇ بىلەن تىر-ناقنى ۋە تىرناق تۈۋىلىرىنى يۇيۇش، زىنقى رۇمىنى

سۇ بىلەن چېپىش ياكى ئەنجۇرنى سوقۇپ چېپىش لازىم.
(3) تىرناقنىڭ سۇنۇشى: تىرناق خۇددى سىڭىر
بېشىدەك قات-قات بولۇپ سۇلىدۇ بۇ كۆپىنچە قان
ئازلىقتىن كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: گۈلگەن بىلەن ئىسكەنجىۋىل ۋە مائىل
ئۇسۇل (105-نۇسخە) بېرىپ، ماددا پىشۇرۇلغاندىن كېيىن
مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20-نۇسخە) بۇيرۇلىدۇ. سىرتىدىن
بادام يېغى بىلەن قوي چاۋىسىنى بىرلەشتۈرۈپ
تىرناققا داۋاملىق چېپىش كېرەك.

(4) تىرناق ئاستىدا قان ئۇيۇپ قېلىش: تاشقى
زەخمىلىنىش تۈپەيلىدىن تىرناق ئاستىغا قان چۈشىدۇ.
داۋاسى: زىنقىرۇمى، قىزىل زەرىخ، پەتەرسالىيون،
بىنەپشە قاتارلىقلارنى سىركە بىلەن قوشۇپ چېپىش لازىم.

سوينەك (داخەس)

تىرناق ئەتراپى گۆشنىڭ يىرىڭلىق ياللۇغى سۈيى-
مەك، كۆكسە (ئەرەپچە داخەس) دەپ ئاتىلىپ، خېلى
كۆپ ئوچرايدىغان، كېسەللىكتۇر. بارماق ئېرىقچىسى تېرە
ئاستى گۆشلىرىنىڭ ئۇفۇنەتلىنىشىدىن كېلىپ چىقىدۇ.
مەزكۇر جاي قىزىرىپ ئىششىيدۇ، لۇقۇلداپ قات-
تىق ئاغرىيدۇ، ياللۇغلىنىش پۈتۈن بارماقنى قاپلايدۇ،
بەدەن ھارارىتى يۇقۇرى كۆتىرىلىدۇ، شۇ تەرەپ قولتۇق-
قا يۇمشاق چۈشىدۇ، ۋاقتىدا داۋالانمىسا تىرناق كۆ-
چۈپ چىقىپ كېتىدۇ.

داۋاسى: سۈرگە بېرىلىدۇ، ئارپا سۈيى ئىچىشكە بۇيرۇلىدۇ. دەسلەپكى مەزگىلدە بىر چىنىگە قايناقسۇ قويۇپ، سوينىڭ بار بارماقنى سۇغا تىقىپ تارتىۋېلىپ داغلاش، بۇنى ئاغرىش پەسەيگىچە داۋاملاشتۇرۇش كېرەك. موزىنى سوقۇپ، تومۇر دېتى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئاغرىق جايغا قويۇلىدۇ؛ پىيازنى ئوتقا كومۇپ پىشۇرۇۋېلىپ، قىزىق ھالدا بارماقنى پاتۇرۇلىدۇ. بارماقنى شۇ جايغا تىقىپ تۇرۇپ بارماق تېگىپ قويسىدۇ ياكى كالا ۋە قوينىڭ يېڭى ئوت خالتىسىغا زەرەرلەنگەن بارماقنى تىقىپ تۇرۇش كېرەك.

ئەگەر تىرنىقنى چىقىرىۋېتىشكە توغرا كەلسە، ئالدى بىلەن مەلۇمى داخلىيئون (177-نۇسخە)نى تىرنىق ئۈستىگە قويۇپ ئارقىدىن زەربىخ، جاۋۇشىر ۋە ئاچ چىق بادام يېغى قوشۇپ تىرنىققا قويۇلسا تىرنىق چۈشۈپ كېتىدۇ. ئۇندىن كېيىن بارماقنى ۋە تىرنىقنى مۇھاپىزەت قىلىش چارىلىرى بىلەن يېڭى تىرنىق ئۆسۈپ تۇرىلىدۇ.

6 - پەسىل: تەر كېسەللىكلىرى

كوپ تەرلەش

كوپ تەرلەش تەۋەندىكى بىرقانچە سەۋەپلەردىن بولىدۇ:

(1) بەدەندىكى سۇيۇقلۇق ھەددىدىن زىيادە كۆپ-

يېپ، بەدەن ئۇنى سىرتقا ھەيدىشى؛ بەدەندە تىارتىش ۋە تۇتۇش قۇۋۋىتىنىڭ ئاجىزلىشىشى؛ قىزىتمىلىق ئاغ رىقلاردا بوھران كۈنلىرىدە بەدەن كېسەللىك ئۈستىدىن غەلبە قىلغاندا سەۋەبچى ماددىنىڭ تەرلەش يولى بىلەن سىرتقا چىقىرىلىشى؛ يۇقۇرى ھارارەتلىك شارائىتلاردا ئەمگەك قىلىش.

ئالامەتلىرى: يۇقۇرقى سەۋەپلىرىدىن بىرى مەۋجۇت بولۇش بىلەن بىللە، ئادەتتىكىدىن كۆپ تەرلەپ كېتىش كۆرۈلىدۇ. مەسىلەن، بەدەننىڭ تارتىش ۋە تۇتۇش قۇۋۋىتى ئاجىز بولغاندا، كۆپ تەرلەش تۈپەيلىدىن كۈندىن-كۈنگە ئورۇقلاپ ماغدۇرسىزلىنىدۇ ۋە ئاسانلا چارچايدىغان بولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: تاماقنى قۇۋۋەتلىك، ئەمما مىقدارىنى ئاز بېرىش، تۇزلۇق گۆش بىلەن ئوزۇقلاندۇرۇش، ئەمگەكنى كۆپرەك قىلىش، گۈرۈچ، سىماق، يۇمىغاقسۇت، ماش، چىلانلارلىق قايىنىتىپ ئىچىشكە بۇيرۇش، ئاز-ئازدىن بىرقانچە قېتىم شەۋىتى خەشخاش بېرىش لازىم. تاشقى تەرەپتىن چېپىش ئۈچۈن توۋەندىكىلەردىن بىرى بېرىلىدۇ:

(1) موزا، قەلەي كۇشتىسىنى گۈلەپ بىلەن سۇرۇپ چېپىش؛

(2) ئانار گۈلى، ھەببۇل ئاس، قىزىل گۈل، رۇسۇت، ئاقاقىيا ۋە كوندۇرلاردىن بىر قانچىسىنى ياكى بىرىنى گۈل يېغى بىلەن قوشۇپ چېپىش كېرەك.

(3) كالىك بەسەي سۈيى، لىمون سۇلىرىنى كافۇن بىلەن چېپىش مۇمكىن.

(4) بىچە ئۇرۇغنىڭ لۇئابى، ئىسپۇغۇل لۇئابى بەدەنگە چېپىلىدۇ.

(5) چىڭسەي سۈيىنى بىر ئاز گولاپ ۋە سىركە قوشۇپ بەدەنگە سۇ كىلىدۇ. تەرلەشنى توختىتىش ئۈچۈن توۋەندىكى نۇسخە تەجرىبىدىن ئۆتكەن:

نۇسخە: ئالما سۈيى، لوبۇ سۈيى، قىزىل گۈل ئىرمەقى، گۈل يېغى، كۈنجۈت يېغىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، ئاستا ئوتتا قاينىتىلىدۇ. سۈيى تۈگەپ خاس ياغ قالغاندا شىشكە ئېلىپ قويۇپ، ھاجەت بولغاندا بەدەنگە سۈركىلىدۇ، ئىچىشكە ئىككىنچىل بېرىلىدۇ.

سىپىق تەرلەش

بۇزۇلغان خىلىتلارنىڭ ئۇفۇنەت ھاسىل قىلىشىدىن (ئومۇمىي بەدەندە ياكى قولتۇق ۋە پۇتتا) پەيدا بولىدۇ. بولۇپمۇ ھەركەتتىن كېيىن، ياكى جىنىس ئالاقىدىن كېيىن ئالاھىدە سېزىلىدۇ (سىپىق پۇرايدۇ). بەزىدە سېسىق دورىلار — ھىڭ ۋە ئۇنىڭ يىلتىزى، سامساق قاتارلىقلارنى كۆپ ئىستىمال قىلغۇچىلاردا ئۇچراپ، كۆپىنچە سۈركىلىپ تۇرىدىغان ئەزالار يەنى قولتۇق، چاتىراق، ئۇرۇقدان خالىتىسىنىڭ ئاستى قاتارلىق جايلاردا بىلىنىدۇ.

داۋاسى: سۈزگە بېرىش ئارقىلىق بەدەننى كېرەك-

سىز ماددىلاردىن تازىلاش ۋە مىراجنى ئېتىدالغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئىسكەنجىۋىل بېرىش، پات-پات يۇيۇنۇپ تۇرۇش لازىم. ماش، سېرىق چىچەك ئۇرۇغى ۋە گۈلى، چىغىرىتماق يىلتىزى، يوپۇرمىغى، ئاق سەندەللەرنى قاينىتىپ بەدەننى يۇيۇش كېرەك. ئۈششە، قىزىل گۈل، سۈم-بۇل، زەمچەلەرنى يۇمشاق سوقۇپ كۆپ تەرلەيدىغان جايلارغا سېپىش لازىم. بۇلاردىن تاشقىرى، يوقۇرىدا كورسىتىپ ئۆتۈلگەن تەر توختاتقۇچى دورىلاردىن تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك.

7-پەسىل: سېمىزلىك ۋە ئورۇقلاش كېسلى

ھەددىدىن زىيادە سېمىزلىك ۋە ئورۇقلاش غەيرى تەبىئىي ئەھۋال يەنى كېسەللىك بولۇپ، ئۇلارنى ئوزۇقتىدا داۋالاش ئارقىلىق ساقلىقنى ساقلاش لازىم. ئورۇقلاپ كېتىش:

سەۋىيى: 1) ئوزۇقلىنىش بۇزۇلۇش بىلەن بەدەندە ماددا ئالمىشىش (مايە تەھەللۇل) ناچارلىشىپ ئورۇقلايدۇ. 2) قوبۇل قىلغان ئوزۇقلۇق يېتىرلىك بولماستىن، ئۇنى سىڭدۈرۈش ناچارلىغىدىن كىشى ئورۇقلايدۇ. بۇنداق كىشىلەر يىگەن قۇۋۋەتلىك نەرسىلەر چوڭ تەسەۋۋۇت بىلەن چىقىپ كېتىدۇ-دە، بەدەن بەھرىمەن بولالمايدۇ. 3) تاماقتا ئوزۇقلۇق ناچار بولۇپ، بەدەن

ئۇنى قوبۇل قىلىمىغاندىمۇ كىشى ئورۇقلايدۇ. (4) مىزاجىنىڭ بۇزۇلۇشلىرى ئىشتەينى تۈتىدۇ، ھەزىمىنى بۇزىدۇ، بۇلارمۇ ئورۇقلاشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. (5) باشقۇر-غۇچى ئەزالارنىڭ، بولۇپمۇ جىگەرنىڭ زەرەرلىنىشى ۋە چاۋا قانتومۇرلىرىدىكى غەيرى تەبىئىي ئەھۋاللار ئوزۇق-لۇقلارنىڭ ئوز يولى بىلەن شىمىرىلىشكە تەسىر بېرىپ، بەدەندە ئورۇقلاش كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. (6) روھى ئامىللار-غەزەپلىنىش، قورقۇش، روھى زەربە، ۋە ھەددىدىن زىيادە جىنسى ئالاقىلاردىمۇ ئورۇقلاش كېلىپ چىقىدۇ.

ئالامەتلەر: ئاغرىق كىشىلەر بارغانسېرى ئو-رۇقلاۋاتقانلىغىنى ھىس قىلىدۇ، تېرە قۇرغاقلىشىپ، قارىيىپ، ساغۇش تۇس ئالىدۇ، كىشى ماغدۇرسىزلىنىدۇ، ئوتتۇرا ياشتىن ئاشقان كىشىلەردە ھېچقانداق كېسەللىك ئالامەتلىرى بولماي تۇرۇپ، سەۋەپسىز ھالدا ئورۇقلاش ئېغىرلىشىۋەرسە سەرتان كېسەلدىن گۇمان قىلىپ تەك-شۇرتۇش لازىم.

داۋاسى: ئالدى بىلەن سەۋىيىنى يوقىتىش، ئو-رۇقلۇقلاردىن ھول ۋە ياغلىق نەرسىلەر بېرىشنى ئاساس قىلىش كېرەك. مونچىغا كىرىش، بەدەننى ھوللەندۈرۈش خۇسۇسىيەتلىك ماي دورىلار بىلەن مۇۋاپىق مايلاپ تۇ-رۇش، يېتەرلىك دەم ئېلىش لازىم. تۈۋەندىكىلەرنى تاللاپ ئىشلىتىلسە بولىدۇ:

(1) پۇرچاق جىنىدىكى دانلار، بادام مېغىزى، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى، ئارپا سۈيى، ئانار سۇلىرىنى يالغۇز ياكى بىرىكتۈرگەن ھالدا ئىستىمال قىلدۇرۇلسا تېز سەمىرىشكە ياردەم بېرىدۇ.

(2) چىلان بىلەن قۇرۇق ئۇزۇمنى لازىم مىقداردا ئېلىپ يېتىرلىك سۇ بىلەن ياخشى قاينىتىپ، سۇزۇپ، سىقىپ ئېلىنىدۇ. بادام مېغىزى، كۆكنار ئۇرۇغى، سەمىي ئەرەبىنى ئوتتا بىر ئاز قۇرۇتۇپ، يۇمشاق سوقۇپ چىلان ۋە ئۇزۇم سۈيىگە سېلىپ قاينىتىلىدۇ. تازا قايناپ سۈيى قالماي ھالۋىدەك بىر نەرسىگە ئاي-لانغاندا ئۈستىگە بىر ئاز بىنەپشە يېغىنى قوشۇپ رەس-مى ھالۋا تەييارلاپ يېمىشكە بېرىلىدۇ.

(3) ئوقۇتنى ئاخلاپ، يېڭى سۈتكە چىلاپ، سۈتنى تامامەن ئېچىپ بولغاندا ئوقۇتنى قۇرۇتۇپ قويىلىدۇ. ئاقلىغان ئارپا، گۈرۈچ، بۇغدايلاردىن بىر ھەسسە، چە-لانغا ئوقۇت 10 ھەسسە ئېلىپ يېتىرلىك مىقداردىكى سۈت ۋە قەن بىلەن قاينىتىپ، ئۈستىگە بىر ئاز قۇرۇق ئالنى يۇمشاق سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ ھالۋا تەييارلىنىدۇ. بۇ سەمىرىشنىڭ ياخشى چارىسىدۇر. تېز كۈندىلا روشەن نەتىجە بېرىدۇ.

ئۇسخە: ئاق تۇدرى، قىزىل تۇدرى، كۆكنار ئۇ-رۇغى ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، ھەببى مۈھلەپ، زەد-جىۋىل، گۈلدارچىن، دارچىن، شاقاقۇل، سىيادان، بوزىدان ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، زەپەر 3 مىسقال، بادام مېغى-

زى 16 سەر، ئورمان ياغىنى (پىندۇق) 5 مىڭ،
كۈنجۈت يېغى 2 سەر، شېكەر 16 سەر، گۈلەپ بىر
چوڭ چىنە.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ (بادام مېغىزىنى ئايرىم ئوبدان يانچىپ سالا
بولىدۇ) گۈلەپ، شېكەر قوشۇپ يۇمشاق ئوتتا قاينىتىپ،
كۈنجۈت يېغىنى ئاز-ئازدىن قاينىتىپ قوچۇپ بېرىلە
ھالۋىدەك بىر نەرسە تەييار بولىدۇ. شۇنى يېمىشكە
بېرىلىدۇ.

(2) سېمىزلىك: ھەددىدىن زىيادە سېمىزلىك تو-
ۋەندىكىدەك ھەرخىل غەيرى تەبىئى ھاللارغا، كېسەللىككە
دۇچار قىلىشى مۇمكىن. نەپەس قىيىنلىشىشنى
كەلتۈرىدۇ، بەدەندىكى سۇيۇقلۇقنىڭ تۇتۇلۇپ قېلىشى،
تومۇرلارنىڭ توسىلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، ئايلىنىپ
كېتىش (غەشە) كېسەللىككە سەۋەبچى بولىدۇ.

قانتومۇرلار ئاسانلا قانايدىغان، قان توختىمايدىغان
ۋە تېرە ئاستىلىرىغا قان چۈشىدىغان ئەھۋاللارنى پەيدا
قىلىدۇ. يۈرەك ئەتراپىغا ياغ توپلىشىپ، يۈرەك سېلىش،
خاپقان كېسەللىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، ئەر ياكى ئا-
يالىنىڭ پەرزەندىسىزلىكىگە سەۋەبچى بولىشى مۇمكىن.
پالەچلىككە ئېلىپ بېرىشى، مەئدە سەۋىيىدىن بولىدىغان
ئىچ سۇرۇشكە سەۋەب بولىشى ئىھتىمال، بۇلاردىن باشقا،
سېمىزلىك ئادەمنىڭ كېسەللىككە ئاسان باھا بەرگىلى

بولمايدۇ، چۈنكى زەرەرلەنگەن ئەزانى بىلىش تەس ھەم سېمىز كىشىلەر تەسادىپى ھاللارغا مەسىلەن، رىيازەت، ئاچلىق، تەشلىق ۋە قىزىتمىلىق كېسەللەرگە دىگەندەك چىداشلىق بېرەلمەيدۇ.

داۋاسى: سۈرگە ۋە سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورى-
لارنى بېرىش؛ ئوتتۇرا دەرىجىلىك ئۇزۇقلۇق قىممىتىگە
ئىگە تاماقلارنى بېرىش؛ كۆپرەك ئەمگەك ۋە ھەرىكەت
قىلىش، ئاز دەم ئېلىپ، ئاز ئۇخلاشقا بۇيرۇش كېرەك.
مونچىغا كىرىپ كۆپ تەرلىنىش، قۇرۇقلۇق خۇسۇسىيە-
تىگە ئىگە ياغلارنى مەسىلەن، قۇستە يېغى، پەرفىيون يې-
غى، سېرىق چىچەك يېغى قاتارلىقلارنى بەدەنگە سۈر-
كەشكە، ئىتتىرىپىل كەبىر (1 - نۇسخە) ۋە ئىتتىرىپىل سەغىر
(5 - نۇسخە) لەرنى دائىم ئىچىشكە بېرىش، ئارىلاپ مەجۇ-
لى جەۋارش كۈمۈنى (49 - نۇسخە)، سەنجىرىنا (33 -
نۇسخە) لەردىن بېرىپ تۇرۇش كېرەك. ئەفئا يىلىنىنىڭ
گوشىنى يىيىشكە بېرىلسە سېمىزلىك كېسىلىدە بەك ياخ-
شى نەتىجە بېرىدۇ. توۋەندىكى نۇسخىمۇ سېمىزلىك كې-
سىلىنى داۋالاشتا (ئورۇقلىتىشتا) كەڭ قوللىنىلىدۇ:

نۇسخە: جۇۋىنە، بېدىيان، سۇزاپ، زىرە ھەربىرى
3 مىسقالدىن، مەرزەنجۇش بىر مىسقال، بىورە ئەرمىنى،
لەكى مەغۇل ھەربىرى 2 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ ئالغان تەييارلاپ كولىگە 1 - 2 قېتىم، 1 - 2
مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

8- پەسىل. ئۇششۇك ۋە كويۇك

ئوششۇك

سوغاق تەسىرى بىلەن بەدەننىڭ قىسمىلىرى (قول، پۇت، بۇرۇن، قۇلاق) نىڭ ئۇششۇپ قېلىشى، چىرىش ۋە ئۇفۇنەتلىنىشى ئۇششۇك يارىسى دىيىلىدۇ.

داۋاسى: ئۇششۇك جاي كۆكرەگەن ھالىتىدە تۇرۇپ تېخى ئۇفۇنەت ھاسىل قىلىن (قارا رەڭگە كىرمىگەن) بولسا زەيتۇن يېغى، كىچىك يېغى، ياسمەن ياغلىرىنى قوشۇپ ياغلاشقا بېرىلىدۇ. ئەگەر ئۇششۇك قاراغان بولسا بۇغداي سامىنى، سېرىق چىچەك، گۈلى سوسەن، چامغۇر، بەسەي، يالىپۇز، ئەنەن، مەرزەنجۇش، شۇمشەك، زىغىز، بابونە، ئەكىلىل، لىكلىرىدىن بىرىنى ياكى بىرقانچىسىنى بىرلىكتە قاينىتىپ، سۇيىنى ئۇششۇك گەن جايغا قويۇش، ماشىنى يۇمشاق سوقۇپ ھاراق بەلەن يۇغۇرۇپ ئۇستىگە قويۇش، ئەگەر ئۇششۇق بولسا، ئۇستىگە ھىجامەت قويۇش كېرەك. ھىجامەتتىن كېيىن گىلى ئەرمىنىنى ھەسەل ۋە سىركە بىلەن قوشۇپ چىرىپ، بىر سائەتتىن كېيىن ھاراق ۋە سىركىنى بىرئاز قىزىتىپ قويۇش مۇمكىن. ئۆلگەن گۆشلەرنى چۈشۈرۈش ئۈچۈن تاتلىق ياڭيۇ يوپۇرمىغى ياكى ئوزى ۋە كالىدەك بەسەينى باراۋەردىن ئېلىپ، سوقۇپ بىرئاز سۇغا چىلاپ

ئېلىپ، كالا يېغى ۋە مەشكە ماي بىلەن ئېلىشتۇرۇپ زەرەرلەنگەن جايغا تەكرار قويۇش، ئۆلگەن گۆشلەر چۈ- شۈپ كەتكەندىن كېيىن، يېڭى گۆش ئۇندۇرۇش ئۈچۈن تەدبىر قىلىش كېرەك. ئەگەر بۇنىڭ بىلەن ھەل بول- ماسا يېرىپ زەرداپ ۋە بۇزۇلغان ماددىلارنى چىقىرىپ تاشلاپ، جاراھەتكە تېگىشلىك تەدبىر قىلىش؛ ئەگەر ئۇششۇك ئېغىر بولۇپ ئەتراپىغا كېڭىيىپ، قارىداپ ماڭسا، باشقا چارە تەدبىرلەر كار قىلسا شۇ ئەزانى قارايدىغان جاينىڭ يۇقۇرىسىدىن كېسىپ تاشلاش ۋە جەر- راھىيە تەدبىرلىرىنى قوللىنىش كېرەك.

كۈيۈك

كۈيۈش — ئوتتا، سۇدا، قىزىق تومۇر، كۈن نۇرى، قىزىق ماي تەسىر قىلىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. دورىلار بىلەن كۈيۈش چاقماق نۇرى بىلەن كۈيۈش ئاز ئۇچرايدۇ

(1) توتتا كۈيۈش: يەڭگىل ھاللاردا سۇ كۈتە- رىلىپ چىقمايدۇ. بۇنداق ھاللاردا يەرلىك ھارارەتنى پەسەيتىش يېتەرلىك، مەسىلەن، داكىدەك بىر نەرسىنى سوغاق سۇ بىلەن ھۆلدەپ سوغاق ئۆتكۈزۈلىدۇ، ياكى مۇزدەك سۇغا تەكرار- تەكرار چىلاپ تۇرىلىدۇ، بۇنىڭدا دەسلەپ ئاغرىيدۇ، كېيىن ئاغرىش توختايدۇ. گىلى ئەر- مىنى سۇ ياكى سىركە بىلەن ئىزىپ سۈركىلىدۇ، ئەگەر ئېغىر بولمىسا، قارا سىيا، سەمغى ئەرەبلىرىنى يۇمشاق

سوقۇپ، تۇخۇم ئېقى ئېلىشتۇرۇپ چېپىش، قېتىق سۇت، تۇخۇم ئېقىنى قايتا-قايتا چېپىش بىلەن سۇ كۈتە-رىشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ. كويگەن جايىنى بۇزۇشتىن ساقلىغىلى بولىدۇ. شۇنىڭدەك تۈۋەندىكىلەردىن قايسى بىرى بولسا شۇنى كويگەن جايغا سۈركەش كېرەك.

تۇخۇم ئېقىنى يالغۇز ياكى گۈل يېغى بىلەن قوشۇپ چاپسىمۇ بولىدۇ. بىر مىسقال كافۇرنى سوقۇپ بىر پىمالە قېتىققا ئېلىشتۇرۇپ چېپىش مۇمكىن. ماشىنى ئاقلاپ قىزىل گۈل بىلەن قاينىتىپ، ماش ئوبدان پىش-قاندىن كېيىن، بىر ئاز ئارپا ئۇنى ۋە گۈل يېغى قو-شۇپ چېپىلىدۇ. ئاقلانغان ئارپا، ئاق لىيلى گۈلى ۋە غولى، ھەمىشۋالارنى سوقۇپ، بىر ئاز سۇ بىلەن قاينىتىپ پىشۇرۇپ، سىقىپ سۇيىگە بىر ئاز كۆك يۇمىلاقسۇت سۇيى، قەلەي كۈشتىسى ئارىلاشتۇرۇپ، قويۇق ئوماچتەك دورا تەييارلاپ كويگەن جايغا سۈركەش مۇمكىن. كويگەن جاي سۇ كۈتۈرپ قېتىپ قارا قەقەش باغلاپ قالغان بولسا مەلھىمى ئىسپىداج (179 - نۇسخە) چېپىشقا بېرىلىدۇ ياكى تۈۋەندىكىلەردىن بىرى ئىشلىتىلىدۇ.

(1) ھاك مەلھىمى: يۇيۇلغان ھاكتىن گۈل يېغى ياكى كۈنجۈت ياغلىرى بىلەن ماي دورا تەييارلاپ، ئۇنىڭغا گىل، قىمۇلىيا قوشۇپ، كويگەن يەرگە چېپىش كېرەك. ھاكتى يۇيۇش ئۇسۇلى مۇنداق: ئادەتتىكى ھاك-نى ماتادىن تىكىلگەن كىچىك بىر خالتىغا ئېلىپ، سۇ

ئالغان قاچىغا سېلىپ تازا مالتىلاپ ھەركەتلەندۈرىلىدۇ.
قاچىنىڭ تېگىگە ئورناپ قالغان ھاك يۇيۇلغان ھاك
بولىدۇ. بۇنى يەنە قايتا 7 قېتىم سۇ بىلەن چايقىغاد-
دىن كېيىن ئىشلىتىلىدۇ.

(2) توخۇ سوڭىكى بىلەن تۈزنى ئومۇر قاچىغا
سېلىپ، كويدۇرۇپ، ئۇلارغا يۇمشاق سوقۇلغان گۈرۈچ،
ئۇپىلارنى قوشۇپ تۇخۇم ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ
چىپىش كېرەك. بۇنىڭغا بىنەپشە يېغى قوشۇلسا تەسبىرى
تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

(2) قايناقسۇ بىلەن كويۇش: بۇنىڭدا ئۇقتا
كويگەندىكىگە ئوخشاش چارە قىلىنىدۇ. سوغاق سۇ قۇ-
يۇش ياكى داكىدەك بىر نەرسىنى مۇز سۈيى (ياكى كول
سۈيى) بىلەن نەمدەپ كويىگەن جايغا قويۇش لازىم.
كۈل سۈيىنىڭ ئوزۇننى كويىگەن جايغا توكۇش كېرەك.
كۈل سۈيى تەييارلاش ئۈچۈن ئوتۇن كۈلىدىن مەلۇم
مەقداردا ئېلىپ، ئۈستىگە سۇ قويۇپ تازا ئارىلاشتۇرۇپ
تىندۈرۈلىدۇ ئۈستىدە سۈزۈلۈپ چىققان سۈنى باشتا بىر
قاچىغا توكۇۋېلىپ، ئۇنىڭغا يەنە كۈل سېلىپ ئاۋالغى-
دەك تەكرارلىنىدۇ (2 - 3 قېتىم ياكى كۆپرەك). شۇنىڭ
بىلەن كۈل سۈيى تەييار بولىدۇ. چاچنى كويدۇرۇپ،
تۇخۇم ئېقى ئارىلاشتۇرۇپ كويىگەن جايغا سۈركەشمۇ
مۇمكىن.

(3) كۈن نۇرى بىلەن كۇيۇش: كافۇر مەلەمى

ۋە سىركە مەلەمى سۈركەشكە بېرىلىدۇ. سىركە مەلەمى تەييارلاش ئۇسۇلى:

مەدەستان 9 سەر، كونا زەيتۇن يېغى 18 سەر، ئۆتكۈر سىركە 27 سەر. بۇلارنى تومۇر قاچىغا سېلىپ، ئاستا ئوت ئۈستىدە قويۇپ تۇرۇپ قاينىتىش كېرەك. مەدەستان ئوبدان ئارىلىشىپ بولغاندىن كېيىن، يەنە قاينىتىپ، قويۇق ھالغا كەلتۈرۈپ تەييارلىنىدۇ. ئەگەر كويگەن يەر سۇلۇق جاراھەتكە ئايلىنىپ قالغان بولسا بىرنەرسە زەنجىۋىلىنى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇش كېرەك.

(4) دورىلار بىلەن كۇيۇش: تىبابەت دورىلىرى

ئىچىدە بالادۇر سۈيى بىلەن كۇيۇش ئۇچرايدۇ. بونىڭ ئالامىتى قايناقسۇ بىلەن كويگەنگە ئوخشاش بولۇپ، سۇ كۆتىرىپ چىقىدۇ ۋە ئېغىر جاراھەتلىنىدۇ. سېرىق زەر-داپ سۇ ئاقىدۇ. بۇنداق ھاللاردا ئالدى بىلەن سۇلۇق قاپارتمىنى يېرىش ۋە زەخمىلەنگەن جايىدىكى يىغىلغان زەرداپنى چىقىرىش ئۈچۈن ھىجامەت قويۇش ياكى گوشنى تىلىش بىلەن زەخمىلەنگەن جايغا سىركە مەلەمى قويۇش كېرەك. يەنە ھەر خىل تىزىپلار بىلەنمۇ كۇيۇش مۇمكىن، بۇنداق چاغدا دەرھال شۇتلىق سۇ بىلەن زىرىكمەي يۇيۇش، ئاندىن يۇقۇرقىدەك چارىلارنى كۆرۈش لازىم.

9- پەسىل: جاراھەت ۋە يارا

جاراھەتلەر

تېرە ياكى تېرە، گۆش ۋە سۆڭەك پۈتۈنلىگىنىڭ بىردەك بۇزۇلۇشى جاراھەت دەپ ئاتىلىدۇ. جاراھەت يېرىڭسا يېرىڭلىق جاراھەت (قۇرۇھ) دەپ ئېيتىلىدۇ. جاراھەتلەر كىچىك، چوڭ، ئاددى (بەدەن مىزاپ-لىرى بۇزۇلمىغان)، مەركىزى قىسمى ئولتۇرۇشۇپ كەتكەن (جاراھەتتى غايرى)، جاراھەت مەركىزىدىن بۇزۇلغان تو-قۇلىلار ئاجراپ چۈشۈپ تۇرىدىغان (جاراھەتتى مۇنخىلە) ۋە ئىككى گىرۋىگىنى يېقىنلاشتۇرغىلى بولمايدىغان دد-گەندەك تۈرلەرگە بۆلىنىدۇ.

جاراھەتلەر ئەسلىدە تاشقى كېسەللەر ئىلمى (ئىلمى جەدراھىيە)گە مۇناسىۋەتلىك بولسۇمۇ كىتائۇمىزدا بۇ ھەقتە قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمىز.

باشقۇرغۇچى ئەزالاردا بولىدىغان جاراھەتلەرنىڭ ئاقىۋىتى ياخشى ئەمەس، مەسىلەن: يۈرەك، مىڭە جارا-ھەتلىرى كۆپرەك ئېغىر ئاقىۋەتلەرگە سەۋەپچى بولىدۇ. جىگەر جاراھەتتى گەجە قۇرۇقچىلۇق بولسۇمۇ، ئەمما ساقىيىشىغا ئۈمىت باغلاش مۇمكىن، باشقا ئەزالاردىن چوڭ قانتومۇر ۋە ئەسەپ (نېرۋ) مول جايلاردىكى جاراھەتلەر خەتەرلىك. كۆكرەكتىكى جاراھەتلەرگە ھىق تۇتۇش ۋە

كوڭۇل ئاينىش قوشۇلۇپ قالسا خەتەردىن دېرەك بېرىدۇ.
توۋەندە جاراھەتلىرىنىڭ ئومۇمى چارىسى ھەققىدە قىسقىچە
سوزلەپ ئۆتىمىز.

جاراھەت يېڭى بولسا، ئۇنىڭغا كىرىپ قالغان يات
نەرسىلەرنى ئېھتىيات بىلەن ئېلىپ تاشلاش، ئەگەر قان
چىقىپ تۇرسا، دەرھال 3 بۇرجەك تىبىئىي بىلەن چىڭ
تېگىش كېرەك. جاراھەت ئىچى تازىلىنىپ بولغاندىن
كېيىن، جاراھەتنى ئوتتۇراھال چىڭلىقتا تېگىلىدۇ. بەك
چىڭ بولۇپ كەتسە قاننىمۇرلارنى توپاپ قويۇپ گۆش-
لىرىنىڭ ئولۇشى (چىرىشى) نى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بوش
بولۇپ قالسا پاسكىنىلىشىپ ئۇفۇنەتلىنىدۇ. جاراھەت كونا
ئەمما يىرىڭسىز بولسا، ئۆلگەن ياكى ئاچرىغان گۆشلەرنى
ئېلىۋېتىش، ھەمدە ماددا يىغىلىپ قالمىسۇن ئۈچۈن،
ئاق سەندەل، قىزىل سەندەلنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ،
كاسىن ياكى يۇمىاقسۇت سۈيىدە سۇرۇپ جاراھەتكە ۋە
جاراھەت ئەتراپىغا چېپىلىدۇ ۋە سەندەل گۈلابى بىلەن
ئەمدەلگەن داكا پارچىسىنى قويۇپ تېگىلىدۇ. يېڭى گۆش
ئۇندۇرۇش ئۈچۈن، خۇنسىياۋشان 2 ھەسسە، مۇرمەككى،
سەبزە، كۈلدۈر بىر-ھەسسىدىن ئېلىنىپ، يۇمشاق سوقۇپ
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، جاراھەتكە تەكشى سېپىلىدۇ. ئەگەر
جاراھەتنىڭ ئاغزى چوڭراق بولسا ئىلاجى بار 2 قىرغاقنى
بىرلەشتۈرۈش، ئامال قىلىپ تېگىش ياكى ئەۋرىشم
(ئىپەك يىپ) بىلەن تىكىپ ئۈستىگە گۆش ئۇندۇرگۈچى
دورىلارنى سېپىپ تولدۇرۇلىدۇ.

ئەگەر جاراهەت يۈزى كەڭ ھەمدە يىرىڭلىغان بولسا، يىرىڭنى قۇرۇتقۇچى، نەملىكنى يوقاتقۇچى ۋە تازىلىغۇچى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلەن، كۈندۈز، سەبىرى، زىراۋەند، ئىرسا (چىغىرتماق يىلتىزى)، كۆمۈش ئىقلىمىياسى، توتىيالارنى يۇمشاق سوقۇپ، موم يېغى قو- شۇپ جاراهەتكە قويۇش ياكى قۇرۇق ھالدا سېپىش كېرەك. تېڭىقنى كۈندە بىر ياكى 2 قېتىم يوتكەپ تۇ- رۇش، جاراهەت ئۈستىگە زەرداپلارنى شىمىرىش ئۈچۈن ياغسىز پاختا قويۇپ تېڭىش كېرەك. يىرىڭ زەرداپلار تۈگەش بىلەن كورسىتىپ ئوتكەن گۆش ئۇندۇرگۈچى دورىلارنى سېپىش لازىم. بۇ دورىلار قۇرۇتقۇچى خۇسۇ- سىيەتلىك ۋە ئېچىشتۇرمايدىغان بولىشى لازىم. جۈملىدىن مەدەستەن، كويدۇرۇلگەن ئەمەن، موزا، ئانار گۈلى، سەبىرى ۋە زەمچىۋىلەرنى ئىشلىتىش مۇمكىن. بۇنىڭغا سېرىق ھېلىلە پوستى ۋە گۈل سوسەن ياپرىغىنى قوشسا تېخىمۇ ياخشى.

يېقىلىش ياكى باشقا سەۋەپلەردىن بولغان سۇنۇش- لاردا سۇنۇقلارغا چارە كورۇش تەرتىبى بويىچە چارە قىلىش؛ جاراهەت قاناۋاتقان بولسا قان توختىتىش چارىلىرى بويىچە بىر تەرەپ قىلىش لازىم.

جاراھەتلەردىن قان ئېقىش، شۇ جايدىكى چوڭراق كوكتومۇر (ۋەرىد) ياكى قىزىلتومۇر (شىريان)لارنىڭ زەخمە- لىنىشىگە باغلىق. ئادەتتە جاراهەتلەرنىڭ كوپچىلىكىدە

ئازدۇر. كويۇتۇر قاناش بولۇپ، ئاددى چارلار بىلەن ياكى ئەلگىدىن توختاپ قالىدۇ. لېكىن داۋاملىق قاناش كېسەل ئۈچۈن خەۋپلىك بولۇپ، توۋەندىكى چارلاردىن بىرىنى مۇۋاپىق قوللىنىش لازىم.

(1) سىركە ۋە گۈلاپقا چىلانغان رەخ (داكا) پار-چىسى جاراھەت ئىچىگە تىقىلىدۇ. (سىركە قانچە كۈچ-لۈك بولسا شۇنچە ياخشى).

(2) قىزىلتومۇردىن چىققان (يۈرەكتىن كەلگەن قان) بولسا يارىلانغان جاي يۇقۇرسىدىن؛ كوكتومۇردىن چىققان (يۈرەككە بارىدىغان قان) بولسا جاراھەت ئاستىدىن باغلام سېلىپ قويۇش كېرەك. قاننىڭ قايسى تومۇردىن چىقىۋاتقانلىغىنى توۋەندىكى بەلگىلەرگە قاراپ بىلىۋېلىش مۇمكىن. قان سۇزۇك، قىزىل رەڭدە ئېتىلىپ چىققا (چوڭراق تومۇر قانغاندا) ۋە جاراھەتلەنگەن كىشى (مەجرۇھ) تېزلا ماغدۇرسىزلىنىپ ھۇشىدىن كەتسە، قاننىڭ قىزىلتومۇر (شىريان)دىن چىقىۋاتقانلىغىنى بىلدۈرىدۇ. قان قويۇق، قارامتۇل رەڭدە ئاستا چىققا ۋە مەجرۇھ ئاسان ھالىسىزلاڭسا، دىمەك قان كوكتومۇر (ۋەرىد)دىن چىقىۋاتقان بولىدۇ.

(3) توۋەندىكى قان توختاتقۇچى دورىلار ئىشلىتىلىدۇ:

(1) پۇرچاق ئۇنى، خۇنسىياۋشان، سەبرى، كوي-دۈرۈلگەن موزىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈ-

زۇپ، سىركە، توخۇم ئېقى بىلەن ئېلىشتۇرۇپ جاراھەت يۈزىگە قويۇلىدۇ.

(2) سەمغى ئەرەبى، خۇنسياۋشان، ئەلزۇرۇت، كۈلدۈر قاتارلىقلارنى يۇمشاق سوقۇپ، سەمغى ئەرەبى سۈيى ياكى سىركە بىلەن ئەمدەپ جاراھەت يۈزىگە قويۇلىدۇ. يۇ-قۇرقى دورىلارنى جاراھەت يۈزىگە قويۇش بىلەن جارا-ھەت ئۈستى چىڭ قىلىپ تېخىلىشى لازىم. مۇمكىن بولسا تېخىق بىر ھەپتىگىچە شۇ ھالدا تۇرۇش كېرەك. بۇ چارىلەر بىلەنمۇ قان توختىماي ئېقىپ تۇرسا سۇ تەمگىگەن ھاك بىلەن زاكىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ جاراھەت يۈزىگە سېپىش كېرەك. بۇ قان تومۇر-لىك ئۈزۈلگەن ئاغزىنى كويىدۇرۇش ئۇسۇلىدىن ئىبارەت. بەزىلەر ئالتۇن زىخنى ئوتتا تازا قىزىتىپ، قان چە-قىۋاتقان تومۇرنى داغلاشنى كورسىتىدۇ. ئەمما بۇ چارىلار باشقا ئۇسۇللار ئۇنۇم بەرمىگەندە، كېسەلنىڭ ھالى ئېغىرلاشقاندىلا قوللىنىلىدۇ. ئادەتتىكى ھاللاردا كونا ۋە ئوتكۇر سىركە ئەك ياخشى قان توختاتقۇچى ھىساپلىنىدۇ.

يارىلار

تىبابەتتە يارىلار "قۇرۇھ" دەپ ئاتىلىپ بەدەننىڭ كۈشلۈك تىسمىغا پەيدا بولىدىغان چاقلاردىن ئىبارەتتۇر. ئالامەتلىرىگە قاراپ يارىلار بىر قانچە خىلغا ئايرىلىدۇ. (1) ئاددىي يارا (قۇرۇھى بەست): ئاغرىش، زەرداپ ئېقىش ۋە ئېچىش قاتارلىق ئالامەتلەر ئاز

بولىدۇ. بۇنداق يارلار كىچىك بولسا، سىركە ۋە ھەم سەل سۈيى بىلەن كۈلگە بىرقانچە قېتىم يۇيۇپ تۇرۇش كېرەك. قېتىشقا باشلىغاندا گۈل يېغىغا چىلانغان پاختا قويۇلىدۇ. ئەگەر دائىرىسى كەڭ بولۇپ زەرداپ سۇ ۋە يىرىك يىغىش ئەھۋاللىرى كورۇلسە، مەدەستان، زەچىۋە- لەرنى باراۋەر ئېلىپ، سوقۇپ، سىركە ۋە زەيتۇن يېغى (كۈنجۈت يېغى بولسىمۇ بولىدۇ) بىلەن ماي دورا تەييارلاپ يارىغا قويۇلىدۇ. ئەگەر يارا قاتتىق بولسا يۇقۇرقى دورىلارغا موزا، ئانار گۈلى، زەمچى ئىقلىمىيا، سوسەن يوپۇرماقلىرى ۋە ئازراق زامگار ئارىلاشتۇرۇش كېرەك. يارىلارغا گۆش ئۈندۈرگۈچى دورىلارنى ئىشلەت- كەندە ئېغىزى ئاسانلا پۈتۈپ قېلىپ تېگى كاما بولۇپ قالىدۇ. بۇنىڭغا دىققەت قىلىپ، گۆش ئۈندۈرگۈچى دو- رىلارنى يارىنىڭ تېگىدىن قويۇش كېرەك. بۇ خىلدىكى جاراھەتلەر ئۈچۈن توۋەندىكى نۇسخىدىكى مەلەم بېرىلىدۇ.

نۇسخە: مەدەستان 3 سەر، زەيتۇن يېغى 9 سەر (كۈنجۈت يېغى بولسىمۇ بولىدۇ) ئەنزۇرۇت، خۇنسىياۋشان، كۈندۈر، زۇقتە ھەربىرى 2 مىسقالدىن.

تەييارلاش: ئالدى بىلەن مەدەستاننى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ياغدا پىشۇرۇش كېرەك. ياغ يېتەرلىك دەرىجىدە قويۇقلاشقاندا قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ياغ بىر ئاز ئىلمان بولغاندا ئۈستىگە سېلىپ تازا ئارىلاشتۇرۇپ مەلەم تەييارلىنىدۇ.

(2) مۇرەككەپ يارىملار: باشقا ئەزادىكى كېسەللىكلەر بىلەن قوشۇلۇپ كەلگەن يارىملاردىن ئىبارەت بولۇپ، قاتتىق ئاغرىش ۋە ئىششىق بىلەن ئوتىدۇ. داۋاسى: يۇقۇرقلار بىلەن ئوخشاش.

(3) ساقىيىش تەسى بولغان يارىملار: بۇ خىلدىكى يارىملار ياشانغانلاردا كورۇلۇپ يىلاپ سوزۇلۇپ كېتىدۇ. ئۇنداق بولشنىڭ سەۋىيى: قان ئازلىق؛ قانغا تۇرلۇك غەيرى تەبىئى خىلىتلارنىڭ ئارىلىشىشى؛ ئومۇمى بەدەن مىزاجىنىڭ بۇزۇلىشى؛ يارا ئىچىدە بىخلىما گۈشلەر ئوسۇپ قېلىپ، يارنىڭ ساقىيىشىغا تەسىر بېرىشى؛ يارىغا چاپقان دورىلارنىڭ توغرا بولماسلىقىدىن ئىبارەتتۇر.

داۋاسى: ئوزۇقلىنىشنى ياخشىلاپ، يارا ئەتراپىنى دائىم قول بىلەن بېسىپ يەرلىك ئورۇننىڭ قان بىلەن تەمىنلىشىنى ياخشىلاش؛ پاكىز داكنى قايناقسۇغا چىلاپ يارىغا ئىسسىق ئوتكۈزۈش كېرەك. مەتبۇخى ھېلىلە (38-نۇسخە)، مەتبۇخى ئەپتىمۇن (20-نۇسخە) بېرىپ، بەدەندىكى بۇزۇق خىلىتلارنى تازىلاش ۋە سىرتتىن تو-ۋەندىكى مەلەملەرنى ئىشلىتىش لازىم.

(1) مۇرداسەڭ مەلەمى: تەركىبى مەدەستان، سىركە ھەربىرى 3 سەردىن، زەيتۇن يېغى 9 سەر، ئانار گۈلى، موزا، زەچچۈ، كۆيدۈرۈلگەن مىس، سىرەنجى ئىقلىمىيا، زەمچى ھەربىرى 3 مىسقالدىن، مەدەستاننى يۇمشاق سو-قۇپ، ئەلگەكتىن ئوتكۈزۈپ، سىركە ۋە ياغ بىلەن

ئارىلاشتۇرۇپ، سىركە تۈگەپ ياغ قالغىچە سۇس ئوتتا قاينىتىلىدۇ (دېققەت قىلىپ مالتىلاپ تۇرمىسا مەدەستان كالىكلىشىۋالىدۇ)، ئۇنىدىن كېيىن قالغان دورىلارنى يۇم-شاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ياغ ئىلىمان بولغان چاغدا قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ مەلەم تەييارلىنىدۇ. يارا دائىم ئەملىشىپ تۇرىدىغان ھاللاردا يارىغا سۈركەشكە بېرىلىدۇ.

(2) يارا ئىچىدە ئۈلۈك گۆشلەر پەيدا بولۇپ، يارىنىڭ ساقىيىشىغا تەسىر بەرگەندە مەلەمنى زەڭگار (182 - نۇسخە) بىلەن تازىلىغاندىن كېيىن يۇقۇرىدا كورسىتىپ ئۈنۈلگەن مەلەم بېرىلىدۇ.

(3) مەلەمنى ئىسپىداچ (179 - نۇسخە) ئىشلىتىش مۇمكىن.

4. ئاقما يارا (ناسۇر): — بەزىلەرنىڭ قارىشىچە، ئېغىز ئالغان يىرىڭلىق جاراھەت 40 كۈندىن ئېشىپ كەتسە ئاقما يارىغا ئايلىنىدۇ. ئومۇمەن قىلىپ ئىيتقاندا ئاقما يارا دائىم سېرىق زەرداپ، يىرىڭ، قان ئارىلاش سۇيۇقلۇقلار ئېقىپ تۇرىدىغان، تېرە ئاستىغا يىلتىز تارتىپ ھەر تەرەپلەرگە يول ئېلىپ ماڭىدىغان ئۇستى قاتتىق يارىدىن ئىبارەت. ئاغرىش ئانچە كۆپ بولمايدۇ. بەزىدە يارىنىڭ ئاغزى پۈتۈپ قېلىپ ساقايغاندەك قىلىسىمۇ. يەنە جايىدىن ياكى باشقا بىر تەرەپتىن تېشىلىپ ئاقىدۇ. ئاقما يارا ھاسىل قىلغان يول بەزىدە

تۇز، بەزىدە ئىگىرى بولىدۇ. ھەتتا بەزى ئاقىملار گوشنىڭ قېلىن قاتلاملىرىدىن ئوتۇپ سۆڭەككە يېتىپ بېرىشى مۇمكىن. مۇنداق ھاللاردا ئاقىمنىڭ توشۇڭىدىن سىم تىك قىپ تەكشۈرۈپ كۆرگەندە قاتتىق بىر نىمىگە تاقىلىدۇ، ئەنە شۇ سۆڭەكتىن ئىبارەتتۇر. ئاقما يارا بىر جايىدا بىر توشۇڭلۇك ياكى بىر قانچە توشۇڭلۇك بولۇشى مۇمكىن. كۆز بۇرجىڭىدىكى ئاقما يارا "غەرەپ" دەپ ئاتىلىپ، ھەمىشە يىرىڭ توپلىنىپ قېلىشى، سىققاقدا يىرىڭ چىقىپ كېتىشى مۇمكىن. كۆكرەك ئەتراپلىرىدىكى ئاقىملار كۆكرەك پەردىسىگە قەدەر يول ئالىدۇ.

داۋاسى: ئالدى بىلەن ئاقما ئىچىدىكى زەرداپ ۋە يىرىڭلارنى تازىلاپ چىقىش ئۈچۈن، تۆۋەندىكى سۇلار بىلەن كۈندە بىر ياكى بىر قانچە قېتىم يۇيۇش كېرەك:

(1) تال (ئۈزۈم) كۈلىنى تەكرار چىقارغان گۈ-لاپقا چىلاپ، سۇزۇپ، تەييارلانغان سۇ بىلەن يۇيۇش كېرەك.

(2) زەرىخ بىلەن ئوشىدىر باراۋەر مىقداردا ئارلاشتۇرۇلغان قايناقسۇنى بىر ئاز ئىلمان قىلىپ سۇيۇدلاپ يۇيۇش كېرەك. مەزكۇر 2 خىل سۇنىڭ كۈندە بىر خىلىنى ئالماشتۇرۇپ يۇيۇلسا تەسىرى تېز بولىدۇ. ئاقما يارا بىر قەدەر تازىلىنىپ بولغاندىن كېيىن، ئەنئەنىۋىي سەبىرى، كۈندۈر، خۇنسىياۋشيان، ئەپيۇن، زەپەر قاتارلىق

دورلارنى يۇمشاق سوقۇپ، بۇغداي ھارىغغا چىلانغان پاختىنى مەزكۈر تالقان دورىلارنى مىلەپ ئاقما ئۈستىگە قويۇش كېرەك. بۇلار نەتىجە بەرمىسە كېسىش، ئاندىن كېيىن گۆش ئۈندۈرگۈچى دورىلارنى قويۇش لازىم.

چاچراتقۇ (قۇرۇھى سائىيە)

ئەتراپقا چاچرىغۇچى يارا بولۇپ، دائىم سېرىق سۇ چىقىپ تۇرىدۇ. مەزكۈر سۇيۇقلۇق تەككەنلا يەرگە يەنسە يارا چىقىدۇ. يارىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ كېسەل كىشى قىزىدۇ. يۈرەك سېلىش قاتارلىق ئالامەتلەرنى بېرىدۇ. ۋە كۆپىنچە ئۇفۇنەت پەيدا قىلىدۇ (يۇقۇملىنىدۇ).

داۋاسى: سەپرا سۈرگىسى بېرىلىدۇ. مىزاجى تەڭ شەش ئۈچۈن ئانار شەرۋىتى (47 - نۇسخە) ۋە تەمىرى ھىندىنىڭ چىلانما سۈيى ئىچىشكە بېرىلىدۇ. يارا ئۈس-ئىگە تۇتتيا، مەدەستان، كويدۇرۇلگەن قەغەز، كۈمۈش ئىقلىمىياسى، مىس سۈيى، مىس ئۇپىسى، مامىران چىنە-لەرنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ ياكى ھاراق بىلەن سۇيۇقلاندۇرۇپ چېپىلىدۇ. غىزاسغا پالەك، سىماق، توخۇ گۆشى ۋە شورپىسى بېرىلىدۇ.

10 - پەسەل يىقىلىش ئۇرۇلۇشى (زەرەبە)

يىقىلىش ياكى ئۇرۇلۇش بىلەن تاشقى ئەزالار زەخمىلىنىپلا قالماستىن بەلكى ئىچكى ئەزالارمۇ زەردەرلە-

ئىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن مۇنداق ھاللاردا ئومۇمىي بەدەن
ۋە باشقۇرغۇچى ئەزالارنىڭ ئەھۋالىغا دىققەت قىلىش ھەم
دە ئۇلارغا قۇۋەت بېرىش كېرەك.

(1) قاناش ۋە قىزىتما بولسا گىلى ئەرمىنىنى
تۇخۇم ئېقىغا ئارىلاشتۇرۇپ زەرەرلەنگەن جايغا سۈركەش؛
مۇغاس، ئاقاقىيا، سەرۋە يوپۇرمىقى، سەبزە، ئاقلانغان
ماش، ۋە ئاس سۇلىرىنى بىللە چېپىش كېرەك. زەرە
تەككەن جايغا دەرھال ھىجامەت (لوڭقا) قويۇلسا ئەتىجە
سى ياخشى بولىدۇ. ئەگەر قىزىتما بولسا ۋە يەرلىك قە-
زىش ئىششىق ئەھۋاللىرى كورۇلسە قىزىلگۈل، ماش، گە-
لى ئەرمىنى، ئاق سەندەل، پوپىل (سۇپارى) لارنى يۇم-
شاق سوقۇپ، گۈلاپ ئارىلاشتۇرۇپ، زەرەرلەنگەن جايغا
چېپىش كېرەك. غىزاسىغا ماش، نوقۇتلار بىلەن ماش
گۈرۈچ ئاش قىلىپ بېرىش لازىم. بىر ھەسسە رەۋەن،
يېرىم ھەسسە ئوردان، گىلى ئەرمىنىنى يۇمشاق سوقۇپ،
نوقۇت چىلانغان سۇ بىلەن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. يىقىلىش
ئۇرۇلۇش قاتارلىق زەرەپلىرىدە مەيلى ئىچكى ئەزا ياكى
تاشقى ئەزا زەخمىلەنگەن بولسۇن ياكى سوغىگەلەر زەخمى-
لەنگەن بولسۇن، مەدەندىن چىققان مۇمىيانى گۈلاپ ياكى
سىركىدە تاشقا سۈركەپ سىرتتىن چېپىشقا ياكى يالغۇز
ئوزۇنى يېمىشكە بېرىش ناھايىتى تېز مەلپەت قىلىدۇ.
قانغان بولسا جاراھەتلەر بايىدا كورسىتىپ ئوتۇلگەندەك
چارە قىلىنىدۇ.

(2) قاتتىق ئۇرۇلۇش ياكى يىقىلىشتىن باش زەربە يىگەندە دەرھال قىپال تومۇرىدىن قان ئېلىنسا مېڭە ئىششىپ قېلىشى ۋە قان ئۇيۇپ قېلىشتىن ساقلاڭلىقى بولىدۇ. لېكىن بۇنى كېسەل ئەھۋالغا قاراپ قوللىنىش شەرت. ئۇندىن كېيىن يۇمشاتقۇچى دورىلار بىلەن ھوققە قىلىش ياكى تەمرى ھىندىنى قايناقسۇغا چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ بېرىش كېرەك. باش سانسىگە گۈل يېغى ۋە گۈلاپ سۈركەش. ئانار گۈلى، ئانار پوستى، ئاس يوپۇر-مىغىنى ئازراق سوقۇپ، سىركە بىلەن قاينىتىپ باشقا چېپىش كېرەك. بۇنىڭغا ئۇ ۋە قەسبۇسزەربە قوشۇلما ئۇلۇمنى تېخىمۇ يۇقۇزى كوتىرىدۇ. 3 - كۈنىگىچە يەمىشكە خوراز مىڭسى بېرىلىدۇ.

(3) كۆكرەك زەربە يىگەندە بەزى ئېغىر چاغلاردا كۆكرەك پەردىسى زەخمىلىنىدۇ ۋە قانلىق بەلەم تاشلايدۇ. بۇنداق چاغدا كەھرىبا، ئانار گۈلى، گىلى ئىرمىنى خۇنسىياۋشيان، لوك لارنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، يۇم-شاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ سېمىز ئوت سۈيى (ياكى ئۇرۇغنى قايناتقان سۈيى) بىلەن؛ ئەگەر ئاغرىش بەك قاتتىق بولسا ئوقۇت چوڭلۇغىدا ئەپيۇن قوشۇپ، كۆكرەك قىسمىغا قويۇلىدۇ. يىغىش ئۈچۈن قۇرسى كەھرىبا (71 - نۇسخە) ۋە ئەنجىبار شەرۋىتى (72 - نۇسخە) بېرىلىدۇ.

(4) مەئدە زەربە يىگەندە، ئەھۋال ئېغىر بولسا.

مەئدە قان تومۇرلىرى زەرەرلىنىپ قان قۇسۇش كېلىپ چىقىدۇ. قان توختىتىش ئۈچۈن كويدۇرۇلگەن مارجان، كەربىنى باراۋەر مىقداردا ئېلىپ، سوقۇپ گۈلقەنگە ئارىلاشتۇرۇپ يېيىشكە بېرىلىدۇ. ئاقاقىيا، مەستىكى قىزىل-گۈل، سۇمبۇلنىڭ ھەر بىرىدىن 5 مىسقالدىن، زەپەر، سەبرە، قارىغاي مۇسسىنىڭ ھەر بىرىدىن بىر مىسقالدىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، پاقا يوپۇرمىغى سۈيى بىلەن قويۇق ئوماچتەك دورا تەييارلاپ، مەئدەگە تاشقى تەرەپتىن چېپىلىدۇ (ئۇلارنى مەجۇندەك قىلىپ يېيىشكە بىر-سىمۇ بولىدۇ).

5) تال، جىگەرگە زەربە تەككەندە: — جىگەر ياكى تال بار تەرەپتە قاتتىق ئاغرىش بولىدۇ. بۇ چاغدا رەۋەن، ئوردان 5 مىسقالدىن، لوك، تاباشىر ھەر بىرى 3 مىسقالدىن ئېلىنىپ، يۇمشاق سوقۇپ گۈللاپ ياكى كاسىن ئەرەقى بىلەن يېيىشكە بېرىلىدۇ. تاشقى تەرەپتىن چېپىش ئۈچۈن: ئاق سەندەل، قىزىل گۈل، بىنەپشە 5 مىسقالدىن، ئارپا ئۈندىن 7 مىسقال، زەپەردىن بىر مىسقال، كافۇردىن يېرىم مىسقال ئېلىپ، گۈللەپ، گۈل يېغىدىن يېتەرلىك مىقداردا قوشۇپ چېپىش كېرەك. ئىگەر يەرلىك جايدا قىزىتما بولسا قىزىل گۈلدىن 5 مىسقال، سۇمبۇل، مەستىكى، دارچىن، لادەننىڭ ھەر بىرىدىن 2 مىسقالدىن، ھەبۇل ئاسدىن 3 مىسقال ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، گۈل يېغىنى بىر ئاز قىزىتىپ، ئارىلاشتۇرۇپ سوۋۇتۇپ ياغلاشقا بېرىلىدۇ.

(6) ئۇرۇلۇش ۋە يېقىلىش بىلەن تارامۇش - پەيدا
لەر زەرەلەنگەندە زەرەلەنگەن جايىنىڭ ھەركىتى توخ-
تايدۇ، روشەن ئىششىق ۋە قاتتىق ئاغرىش بولىدۇ. بۇنى
داق ھاللاردا ئالدى بىلەن ئاغرىقنى پەسەيتىش ئۈچۈن
ماش ئۇنىدىن 1 سەر، گىلى ئەرمنى دىن $\frac{1}{2}$ 3 مىس-

قال، سەبەرە، زەپەر سوكلەردىن بىر يېرىم مىسقالدىن
ئېلىپ ئۇلارنى يامغۇر سۈيى، گۈل يېغى بىلەن قوشۇپ
چىپىش لازىم (يامغۇر سۈيى ئورنىغا گۈلپ بولسىمۇ مەي-
لى). ئۇنىدىن كېيىن يەرلىك ئورۇندىكى ماددىلارنى تار-
قىتىش ئۈچۈن: ئاق لەيلى، بىنەپشە، ئەكىلىملىكلەرنى
يۇمشاق سوقۇپ گۈل سۈسەن يېغى، سېرىق چىچەك يېغى
ياكى بابۇنە يېغىنىڭ بىرى بىلەن قوشۇپ چىپىش كېرەك.

(7) بوغۇملارغا زەربە تەككەندە: كۆپىنچە يىقىلىش
سەۋىيى بىلەن يۈز يېرىپ تېز ۋە جەينەك بوغۇملىرىدا
ئۇچرايدۇ، ئاغرىيدۇ، ئىششىدۇ، ھەركەت قىيىنلىشىدۇ.
بۇنداق ئەھۋاللاردا ئالدى بىلەن، گۈل يېغىنى ياكى ئاق
لەيلى يىلتىزنى (كۆك بولغىنى ياخشى) سوقۇپ يالغۇز
ھالدا ياكى ئىككىسىنى قوشۇپ بوغۇم ئۈستىگە قويۇپ
ئۈستىدىن ماتا بىلەن تېگىپ قويىلىدۇ. ئەتىسى ۋاك
(ئىت ياڭغى) نى قوي مېيى ئىچىدە تاشقا سۇرۇپ چې-
پىپ قويۇش كېرەك.

(8) تاياق تېگىش ياكى يىقىلىش بىلەن كۈشلەر

بولۇنۇپ كېتىدۇ؛ قاتتىق تاياق زەربىسى بىلەن كوپىنچە پەللەك ۋە پاقالچەك گۈشلەرى يېرىلىپ كېتىدۇ، ئاغرىش ۋە روشەن ھالدىكى غەيرى تەبىئى ئۆزگىرىشلەر بولىدۇ. بۇنداق چاغدا ئالدى بىلەن دەرھال بولۇنۇپ كەتكەن جايلىرىنى قولدا ئۆگىلەپ ئۆز ئەكسىگە كەلتۈرۈش كېرەك. ئۇندىن كېيىن زىغىر پاخىلىدىن توقۇلغان رەخنى گۈلەپ قا چىلاپ ئارقا - ئارقىدىن قويۇش كېرەك. يېڭىلا سويۇلغان قوي تېرىسى بىلەن زەخمىلەنگەن جايىنى يۈگەش بەك ياخشى ئونۇم بېرىدۇ.

11 - پەسىل: باشقا تېرە كېسەللىكلىرى

پىتلاپ كېتىش (قەمىل، سىپەش)

پىتلاپ كېتىش - پات - پات يۇيۇنۇپ تۇرماسلىق، كىيىملەرنى يۈتكىمەسلىك قاتارلىق پاسكىنچىلىقتىن پەيدا بولىدۇ.

داۋاسى: كىيىم - كېچەك ئالماشتۇرۇش ۋە ئورۇن - كۆرپە، بەدەننىڭ تازىلىغىغا رىايە قىلىش پىتلاپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتىمۇ، داۋالاشتىمۇ مۇھىم چارىدۇر. بەدەننى شور سۇ بىلەن يۇيۇش كېرەك. دىقلى يوپۇرمىغى، مېۋىزەج، كۈمۈش پوقى، ئاچچىق باداملارنى سوقۇپ ئېلىشتۇرۇپ، بەدەنگە سۈركەش لازىم ياكى قىل يۇرغا (سۇس-مار) مايىغى، نوشىدىرلەرنى سۈركە بىلەن ئىزىپ

بەدەنگە (پىت كۆپ جايلارنى ئاساس قىلىپ) سۈركەش كېرەك. ئەگەر بۇنىڭ بىلەن نەتىجە بولمىسا قۇستە تەل خى، زىراۋەند، زەرىنخەلەرنى سىركە ۋە كالا ئوتى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ بەدەلگە سۈركەش كېرەك. ئەگەر پىت بەدەنگە سالجىدەك قاندىلىپ ئالغان بولسا، مەنە سائىلە، ئاقمۇچ، ئانار پوستىنى قاينىتىپ يۇيۇش كېرەك. بىر مىسقال سىمپنى 5 مىسقال ئۇزۇم بىلەن ئولتۇرۇپ (ئۇ-زۇم بىلەن سىمپنى ھاۋانچىدا بىردەم يانچىلا سىپا ئۇزۇم بىلەن ئېلىشىپ كېتىدۇ. بۇ سىمپنى كۈشتە قىلىشنىڭ بىر خىل ئۇسۇلى)، بىر قانچە تال توم يېپقا سۇۋاپ، پىتلاپ كەتكەن ئادەمنى يۇيۇندۇرۇپ، كىيىملىرىنى ئالماشتۇرغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ بويىنى، قولتىغى ۋە بېلىگە بىر قانچە كۈن ياغلاپ قويۇلسا پىت يوقاپ كېتىدۇ.

يۈز، پىشانە تېرىسىگە قورۇق چۈشۈش

قېرىلىقتىن قورۇق چۈشۈش بىر تەبىئىي ھادىسىدىن ئىبارەت. ئەمما بەزىدە بەدەندىكى خىلىتلار، بولۇپمۇ مىڭدىكى خىلىتلار سەۋىيىسى بىلەن ياكى بەدەندە قۇرۇقلۇق كۈچىيىپ كېتىشى تۈپەيلىدىن تېرىگە ئوڭايلا قورۇق چۈشۈپ قالىدۇ.

داۋاسى: بىنەپشە يېغى، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ يېغى، ئايال سۈتىنى ئايرىم ياكى ئارىلاش ھالدا سىرتتىن چېپىشقا بۇيرۇلىدۇ. مىڭدىكى ماددىلارنى تازىلاش ئۈچۈن ھەببى ئايارەج (7 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. زۇفانى تۇخۇم ئېقى بىلەن چېپىش ۋە موم يېغى بىلەن ياغلاپ تۇرۇش كېرەك.

ياتاق يادىسى (كورپە يادىسى)

ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئاغرىقلار جۇدە كەتكەندە بەل، ساغرا (پەللەك) ۋە توققۇزكۆز ساھەسىدە يارا ھاسىل بولىدۇ. ئۇزۇن ۋاقىت بىر تەرەپ بىلەنلا يېتىش تۈپەيلىدىن ئورۇن - كورپىلەر سۇرۇپ، يېتىپ تېرىنى يارا قىلىدۇ. بۇ دەسلەپتە تېرىنىڭ ئاقىرىپ كېتىشى ۋە قىزىرىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، كېيىنچە تېشىلىپ ئاسان ساقايىماس جاراھەتكە ئايلىنىپ ئاغرىق ئازاۋىنى ئېغىرلاشتۇرىدۇ ۋە كېسەلنى يامانلاشتۇرۇپ قويدۇ.

داۋاسى: ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئاغرىقلار ۋە بەدىنى ئاجىز، ئورۇق كىشىلەرنىڭ ئورۇن - كورپىلىرىگە دائىم دىققەت قىلىپ كېسەلنىڭ تېرىسىنى زەرەرلىنىشتىن ساقلاش لازىم. ئەگەر بەل ۋە پەللەك ساھەسىدە قىزىرىپ قالغان جايلىرى بولسا، روسۇت، ئاقاقىيا، گىلى ئەرەمىنى، موزا، ئانار گۈلى قاتارلىقلارنى سوقۇپ ماي قوشۇپ چېپىش كېرەك. سىركە بىلەن گۈلاپنى مۇز ياكى قار بىلەن سۈۋۈتۈپ سۈركەش كېرەك. ئەگەر تېشىلىپ يىرىڭلاش ھادىسىلىرى كورۇلسە سىرتتىن چېپىشقا مەلھىمى ئىسپىداچ (179 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. كېسەلنىڭ تېگىدەكى بارلىق قاتتىق نەرسىلەرنى ئېلىپ تاشلاپ يۇمشاق كورپە سېلىپ بېرىش، جاراھەتلىگەن جاي يوتقان - كورپىگە تەگمەيدىغان قىلىپ ئورۇن سېلىپ بېرىش كېرەك.

XVII ماقالا. سۇنۇق ۋە چىقىقلار

1 - پەسىل: سۇنۇق ①

تېرە زەخمىلەنگەن سۇنۇق (يېپىق سۇنۇق)

سوڭەكلەر سۇنغاندىن كېيىن ئەگەر گۆش ۋە پەي-
لەر ئۇزۇلگەن ياكى بولۇنۇپ كەتكەن بولسا، ئەزادىكى
غەيرى تەبىئىي ئەھۋال روشەن كۆرىنىدۇ. ئۇنداق بولسا
خاندان پەقەت مەزكۇر ئەزا ھەركەتسىزلىنىپلا قالمايدۇ. ساق
ئەزاغا قارىغاندا ئۇزۇن - قىسقىلىقتا پەرقلەنىدۇ. قول بىن-
لەن بېسىپ كۆرگەندە سوڭەك سۇنغانلىقى بىلىنىدۇ.
داۋاسى: سۇنغان ئەزانى تەكشۈرۈپ، سۇنغان
سوڭەكنىڭ ئىككى ئۇچى ئۇدۇللاشتۇرۇلىدۇ. ئەزانى تارت-
قاندا ئىككى كىشى بىرسى ئارقىدىن، بىرسى ئالدىدىن
تارتىش كېرەك. ئەمما بەك كۈچەپ تارتىماسلىق لازىم.
ئەزا ئەسلىدىكى شەكلى ھالىتىگە كەلسە ۋە ساق ئەزا
بىلەن تەڭلەشسە كۇپايە قىلىدۇ. بۇ ھالەتنى ساقلاپ

① تەبىئەتتە سۇنۇقلار توغرىسىدا ئالاھىدە ساۋاتلار بار.
بۇ يەردە سۇنۇقلار توغرىسىدىكى ئاددى ۋە ئوڭاي چارلار ئۇس-
تىدلا توختىلىمىز.

تۇرۇپ دەرھال تېگىشقا باشلاش كېرەك. ئالدى بىلەن سۇنغان جاينىڭ ئەھۋالىغا قاراپ مومىيانى سوقۇپ ② (ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ) تۇخۇم ئېقىغا ئارىلاشتۇرۇپ سۈن-
خان ئەزا دائىرىسىگە سۈركەش كېرەك. تېگىش بەك بوش ياكى ھەددىدىن زىيادە چىڭ بولۇپ كەتمەسلىكى لازىم.
تېگىش ئۇسۇلى: سۇنغان ئەزانىڭ چوڭ - كىچىك -
لىنىكىگە قاراپ تېگىش ماتېرىيالى (ئوسابە) نىڭ كەڭ - تار
ۋە ئۇزۇن - قىسقىلىقى بەلگىلىنىدۇ. كەڭلىك جەھەتتىن
كۆكرەك قىسمى ئۈچۈن بىر غىرىش؛ يەنە، قول - پۇتلار
ئۈچۈن 4 - 3 ئىلىك كەڭلىكتە بولسا كۇپايە. ئالدى بىلەن
سۇنغان جايدىن باشلاپ 3 قەۋەت تېگىپ يۇقۇرىغا مە-
ئىش كېرەك. يەنە بىر لاتا بىلەن سۇنغان جاينىڭ ئاس-
تىدىن ئۈستۈنگە قاراپ تېگىلىپ، توت قات قىلغاندىن
كېيىن قايتۇرۇپ يەنە تۈۋەنگە چۈشۈرۈلىدۇ. لاتىنى ئو-
راشتا سۇنغان ئورۇننىڭ چىگراق ۋە باشقا جايلار بوش-
راق تېگىلىشىغا دىققەت قىلىش لازىم. تەكشى تېگىلىشى،
ئىگىز - پەس ياكى چوڭقۇر بولۇپ قالماسلىقى كېرەك.
ئەگەر تەكشىسىزلىك ئەھۋاللىرى بولسا مۇۋاپىق ھالدا
داكا پارچىلىرى قويۇپ تۈزلەش كېرەك. ئاندىن كېيىن،
ياغاچتىن سۇنغان ئەزاغا لايىق تۈز تاختاي تەييارلاپ،
تېگىش ئۈستىگە قويۇپ يەنە بىر قات تېگىپ قويىلىدۇ.

② مومىيانى تۇخۇم ئاق سېرىقى بىلەن تاشقا سۇرۇپ چاپ

سىمۇ بولىدۇ.

بۇ خىل تاختاي تىبابەتتە "جەبرە" دەپ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ سۇنغان جايغا ئۇدۇل كېلىدىغان قىسمى باشقا قىسمىدىن قېلىنراق بولىشى كېرەك. ئاستى - ئۈستى ۋە ئىككى يالغا يەنى توت تەرەپكە قويۇلىدۇ.

تېخىقتىن كېيىنكى ئىشقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئەھۋالغا قاراپ يەڭگىل سۈرگە بېرىش كېرەك. ئوڭاي سىڭىدىغان تاماقلار بېرىلىدۇ. تۇخۇ شورپىسى چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم، كالاپاقالچەك، چۈجە گۆشلىرىنى يالغۇز ياكى موميا قوشۇپ بېرىش لازىم. تاختاينى 3 كۈندىن بۇرۇن ئېلىۋېتىشكە بولمايدۇ. ئەگەر بەك ئىلچەك رەپ ياكى قىچىش كەتسە ئەھۋالغا قاراپ تېخىقنى يېپىشپ ئەزانى ئىلمان سۇ بىلەن چايقاپ، تېخىق ماتىرىپ يالىنى سىركە، گۈلاپ ۋە گۈل يېغى ئارىلاشمىسىغا چىلاپ، قايتا چىگراق تېخىش كېرەك. تېخىق ئۈستىدىن مۇغاس، گىلى ئەرمىنى، ئاقاقىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئاس سۈيى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ چېپىلىدۇ. ياكى تېخىق ماتىرىپاللىرىنى سوقۇلغان سەبەز، مۇرمەككى، ئاق لەيلى، ئاقاقىيا، قىزىلگۈل، گىلى ئەرمىنىلەرنى سۈكۈپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تۇخۇم ئېقى بىلەن تەييارلانغان ئېرىتمىگە چىلاپ تېگىلىدۇ. 7 كۈندىن كېيىن ئەگەر ئاغرىش، ئىششىق ۋە يەرلىك قىزىتما قاتارلىقلار بولمىسا تېخىقنى قايتىدىن چىڭ قىلىپ تېگىلىدۇ. سۇنغان ئەزانىڭ ھەركەتلىنىشىنى ئالدىراپ تەشەببۇس قىلماسلىق.

بەلكى ئاستا - ئاستا ئۆزىنىڭ ئەسلى ھەركەت دەرىجىسىگە يەتكۈزۈش لازىم. سۇنۇقنىڭ ئەكسىگە كېلىشى (تۇتۇشى) قېرىلاردا ئاستا، ياشلاردا تېزراق بولىدۇ. قول، بىلىك ۋە ئوخشەك سوڭەكلىرىنىڭ تېگىشىنى 40 - 30 كۈن ئەتراپىدا؛ يانپاش ۋە پاخالچەك سوڭەكلىرىنىكىنى 50 كۈندىن 3 - 2 ئايغىچە تۇرغۇزۇش لازىم. بەزىدە سوڭەك تۇتماي قالسا، سۇنغان جاي بۇزۇلۇپ زەرداپ يىرىك يىغىدۇ، ئىششىق پەيدا قىلىدۇ. مۇنداق ھاللاردا سۇنغان جايىنى يېرىپ، يىرىك، زەرداپلارنى پۇتۇنلەي تازىلاپ، جاراھەتكە چارە كۆرۈش ئۇسۇللىرى بويىچە باشقۇرۇلىدۇ.

تېرە - گۆشنى بۇزغان سۇنۇق (ئوچۇق سۇنۇق)

سۇنغان سوڭەكنىڭ پارچىلىرى ياكى بىر قىسمى سۇنغان جايىنىڭ تېرە ۋە گۆشلىرىنى بۇزۇپ تېشىپ چىقىدۇ. ياكى تېرە - گۆشلەر زەخمىلىنىپ، ئاندىن سوڭەككە زەربە يېتىپ سۇنغان بولىدۇ. ھەر ئىككى ئەھۋالدا سۇنغان جايدا جاراھەت بولىدۇ.

چارىسى: قان ئېقىۋاتقان بولسا جاراھەتلەردە كورسىتىلگەن چارە بويىچە قاننى توختىتىش لازىم. سوڭەك سىرتىغا چىقىپ قالغان بولسا، بىر تەرەپتىن قول بىلەن ئىتتىرىپ جايىغا كىرگۈزۈش، يەنە بىر تەرەپتىن ئىككى كىشى تارتىپ تۇرۇپ سۇنغان ئەزانى جايىغا چۈشۈرۈش ۋە قائىدە بويىچە تېگىش، ئەمما جاراھەتنىڭ يۈزىنى ئوچۇق قالدۇرۇش كېرەك. تاختاي

قويغاندىمۇ جاراھەتنى ئوچۇق قالدۇرۇپ تېگىش لازىم. جاراھەتنىڭ داۋاسى جاراھەتلىك باياندا كورسىتىپ ئوتۇلگەندەك تەدبىر بويىچە ئېلىپ بېرىلىدۇ. ئەمما سۇنغان سوڭەكلەر بەك پارچىلىنىپ كەتكەن بولسا، سوڭەك پارچىلىرىنى پۇتۇنلەي ئېلىپ تاشلاش كېرەك. بەزى ھاللاردا، ئەگەر سوڭەكنىڭ سۇنۇشى بەك ئېغىر دەرىجىدە بولۇپ، سوڭەك ئەسلىگە كېلىش ئىمكانىيىتى بولمىسا، لازىم كەلگەندە مەزكۇر ئەزانى ئىلمى جەببارى ① قائىدىلىرى بويىچە كېسىپ تاشلىنىدۇ ۋە كېسىلگەن جاي جەراھەتلىق قائىدىلىرى بىلەن باشقۇرۇلىدۇ.

چىقىقلار (خۇلى)

سوڭەكلەر ئۆز ئارا تۇتىشىدىغان بوغۇم (مەفەل) لەردىن چىقىپ كېتىشى "چىقق" (خۇلى) دەپ ئاتىلىپ، بوغۇم شەكلىنىڭ ئۆزگىرىشى يەنى بىر تەرەپ ئويما، يەنە بىر تەرەپ كۆتىرىلىپ قېلىش بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. بوغۇم ھەركىتى چەكلىنىدۇ. قارشى تەرەپتىكى ساق ئەزادىن شەكلى، قىياپىتى، ئۇزۇن - قىسقىلىقى ۋە ئەگرى تۈزلىكى جەھەتتىن پەرقلىنىدۇ. ئوخشەك، يەلكە سوڭەك - لىرىنىڭ چىقىقلىرىنى پەرق قىلىش تەسبىرەك. تۈۋەندە بىر قانچە خىل چىقىقلارنىڭ ئومۇمى چارۋىسى ۋە ئاي - رىم چىقىقلارنىڭ چارۋىسى ئۈستىدە توختىلىمىز:

① ئىلمى جەببارى - سۇنۇق تېگىش ئىلمى. تېخىچى، "جەببار" دەپ ئېيتىلىدۇ.

(1) ئومۇمەن قانداقلا چىققىلار بولمىسۇن، بوغۇم بوشلۇغىغا ماددا چۈشۈپ قېلىپ، كېيىنكى ۋاقىتلاردا ئاغرىشنى زىيادە قىلىپ قويىشى مۇمكىن. بۇنىڭ ئال-دىنى ئېلىش ئۈچۈن بىر مىسقال گىلى ئەرمىنى قەن سالغان گۈلاپ بىلەن ئىچكۈزىلىدۇ. پۇنۇس، خىيارى شەنبەر، تەرەنجىۋىل ۋە تەمرى ھىندىلەرنى قايناقسۇغا چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ سۈزۈپ قەن قوشۇپ ياكى باشقا ھەرخىل مەۋە سۇلىرى بىلەن ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بۇ يەڭگىل سۈرگىلىك خىزمىتىنى قىلىدۇ.

(2) چىققىلارنى ئوز جايىغا سېلىشتىن بۇرۇن ئەگەر ئىمكانىيەت يار بەرسە كېسەلنى مونچىدا يۇيۇندۇرۇپ، زەرەرلەنگەن ئەزانى بىسنەپشە يېغى ۋە گۈل يېغى بىلەن ياغلاپ بوغۇم ئاسانلىقچە جايىغا چۈشۈشنى قولغا كەلتۈرۈش كېرەك.

(3) چىققىلار زەربە ۋە يىقىلىشدىن بولۇپلا قالماي، بەلكى بوغۇملاردا بار بولغان كېسەللىك ئوزگىرىشلىرىدىنمۇ كېلىپ چىقىدۇ. ئالدى بىلەن ئۇنى ئېنىقلاش، چىققىلار ئادەتتىكى كىچىك بوغۇملاردا بولسا سەۋەبىنى داۋالاشنى ئالدىن ئېلىپ بېرىش؛ ئەگەر چوڭراق بوغۇملاردا بولسا، بوغۇمنى جايىغا چۈشۈرۈپ، ئاندىن سەۋەپ-چىسىنى داۋالاش لازىم.

(4) چىقىپ كەتكەن بوغۇمنىڭ ھەركەت يولۇلۇشىگە ۋە قارشى يولۇلۇشىگە قارىتىپ تولغاش، ئالدى-كەينىگە

قارىتىپ ھەركەت قىلدۇرۇش بىلەن بوغۇم ئوز جايغا چۈشۈدۇ. بۇ چاغدا بوغۇمدىن ئالاھىدە ئاۋاز چىقىدۇ. قايتا چىقىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن بوغۇم ئوز ئالاھىدە-لىكىگە ئاساسەن تىگىلىدۇ. تاختىدىغان لاتىنى موغاس ۋە گىل ئەرمىنى ئېرىتكەن ئاس سۈيگە چىلاپ تېگىلىدۇ. چېپىش ئۈچۈن، ئارپا ئۇنى بىلەن ئاس سۈيى ياكى تۇخۇم ئېقى قوللىنىلىدۇ. تاختاي قويۇپ تېگىش بوغۇم-نىڭ قايتا چىقىپ كەتمەسلىكىنى تېخىمۇ ياخشى كاپا-لەتكە ئىگە قىلىدۇ. ھەركەتنىڭ تېز ئەكسىگە كېلىشكە ياردەم بېرىدۇ. ئەگەر ۋاقىت ئوتتۇپ كەتكەن بولسا، كېسەلنى تەكرار مونچىغا ئەپكىرىپ سەپشە يېغى بىلەن ياغلاش ۋە سېرىق ماي ئىچكۈزۈپ بوغۇمنى يۇمشىتىش كېرەك.

كوپ ئۇچرايدىغان چىقىقلار

(1) ئىگەك بوغۇمىنىڭ چىقىقى: تۈۋەنكى ئىگەك چۈشۈپ كېتىپ ئېغىز ئوچۇق ھالەتتە تۇرۇپ قېلىپ يۇمۇلمايدۇ. چىشلار بىر بىرىگە ئۇدۇل كەلمەيدۇ. سوز-لەش ۋە چايناشقا ئىمكانىيەت بولمايدۇ. يەڭگىل ھاللار-دا ئېغىزنى يۇمغىلى بولسىمۇ، يەنىلا چىشلار ئۇدۇل-لىمىشالمايدۇ.

ئورنىغا چۈشۈرۈش ئۇسۇلى ئىككى خىل: (1) تىۋىپ كېسەلنىڭ ئارقا تەرىپىگە ئوتتۇپ، 2 قولى بىلەن ئىگەك-نى كۈچ بىلەن تۈۋەنگە بېسىپلا دەرھال ئارقىغا قارىتىپ

تارتىدۇ، بۇ چاغدا جالاقلىغان ئاۋاز ئاڭلىنىپ، ئىگەك جايغا چۈشۈپ ئېغىز يۇمۇلىدۇ. ئورنىغا چۈشكەندىن كېيىن بىر قانچە كۈنگىچە قاتتىق نەرسە چايناش، ئېغىزلى چوڭ ئېچىپ ئەسنىشتىن ئېھتىيات قىلىش كېرەك. (2) ياردەمچى كېسەلنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ كېسەلنىڭ بېشىنى چىڭ تۇتۇپ بېرىدۇ. تىۋىپ ئالدىدا تۇرۇپ ئىككى قولىنىڭ باشبارمىغىنى ئېغىزغا تىقىپ، ئىگەكنى تۈۋەنگە، ئالدىغا باسىدۇ. ئالدىن يۇقۇرىغا-ئارقىغا ئىتتىرسە بوغۇم جايغا چۈشىدۇ.

(2) مۈرە بوغۇمىنىڭ چىقىغى

ئالامەتلىرى: قاتتىق ئاغرىيدۇ، قولى ئىگىز كۆ-تىرىشكە، باشقا يەتكۈزۈشكە بولمايدۇ. قول يانپاشتىن يىراقلاشقان ھالەتتە تۇرىدۇ. ئەگەر كۈچ بىلەن يېقىنلاش-تۇرۇلسا قاتتىق ئاغرىيدۇ. مۈرە قىسمى ساق تەرەپكە ئىسەتەن مايماق بولۇپ قالىدۇ. قولتۇق كاتىگى چوڭ-كىچىك، بەزىدە بوغۇم ئۇچى (قولتۇق ئويىمىنى ئىچىگە) پۇلتىيىپ چىقىدۇ.

ئورنىغا چۈشۈرۈش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن مۈرە-چىغا چۈشۈرۈش، ياغلاش قاتارلىق ئومۇمىي چارىلار كۆرۈلگەندىن كېيىن كېسەل ئوڭىدىغا تاختاي ئۈستىدە تۇرۇپ ياتقۇزۇلىدۇ. يۇمشاق رەختىن تۈپتىن چوڭ-راق يۇمۇلاق تۈگۈنچە ياساپ، قولتۇق ئىچىگە قويۇپ تىۋىپ تاپىنى بىلەن (قايسى تەرەپ چىققان بولسا شۇ تەرەپ پۇتى بىلەن) باسىدۇ ۋە ئىككى قولى

بىلەن كېسەلنىڭ قولىدىن چىڭ تۇتۇپ ئۆز تەرىپىگە ئايلىنىپ تىمدۇ. بۇ ۋاقىتتا بىر خىل ئاۋاز ئاڭلىنىدۇ ۋە بوغۇم جايىغا چۈشىدۇ.

(3) بىلەيزۇك بوغۇمىنىڭ چىقىشى

ئالامەتلىرى: بىلەيزۇك بوغۇم شەكلى قىڭغىر بولۇپ، سىرتقا (يانغا) چىقىپ قالىدۇ ۋە قاتتىق ئاغرىدۇ.

ئورنىغا چۈشۈرۈش ئۇسۇلى: ئالغانى ئېچىپ تۇرۇشقا بۇيرۇلىدۇ. ياردەمچى ئارقا تەرەپتىن بىلەكنى چىڭ تۇتۇپ تۇرىدۇ. تىنىپ ئىككى قولى بىلەن ئالقادىن تۇتۇپ ئالدىغا تارتىپ، بوغۇمنىڭ ھەركەت يۈزىگە قاراپ (ئوڭ، سول، ئىچكى، تاشقى تەرەپكە) ئايلاندۇرۇپ قويۇپ بېرىدۇ. بوغۇم شەكلى توغرىلىنىپ جايىغا چۈشىدۇ، ۋە تېگىپ بويۇنغا ئېسىپ قويۇلىدۇ.

(4) جەينەك بوغۇم چىقىشى

ئالامەتلىرى: جەينەك غەيرى تەبىئى ھالدا ئالدىغا ئىگىلىپ، جەينەك ئارقىسىدا چوڭقۇرلۇق پەيدا بولۇپ قالىدۇ. جەينەكنى ئىگىش مۇمكىن بولمايدۇ. ئورنىغا چۈشۈرۈش ئۇسۇلى: ياردەمچى كېسەلنىڭ ئارقا تەرەپىدە، يۇقۇرقى بىلەكتىن تۇتۇپ تۇرىدۇ. تىنىپ بىلەيزۇك قىسمىدىن تۇتۇپ ئالدىغا تارتىپ، بىلەكنى ئىچكى تەرەپكە كەتكەن ھالدا قويۇپ بېرىدۇ. قولىنى ئىگىپ بويۇنغا ئېسىپ قويۇلىدۇ.

(5) بەل ئومۇرتقىلارنىڭ چىقىشى

ئالامەتلىرى: ئالدىغا ياكى كەينىگە ئەككىلى بولمايدۇ. قاتتىق ئاغرىيدۇ، ئېغىرلاردا ئولتۇرۇپ قوپۇشقا ۋە مې-كۇشقا بولمايدۇ. بەل ساھەسىدە كوتىرىلىپ چىققان ئومۇرتقا ۋە ئۇنىڭ ئاستىدا غەيرى تەبىئى چوڭقۇر جاي كۆرىنىدۇ.

ئورنىغا چۈشۈرۈش ئۇسۇلى: بوقرات (ھىپپوكرات) ئۇسۇلى: كېسەلنى ئالدى بىلەن مەۋجىغا چۈشۈرۈپ، ئىسسىق ئۇتۇپ ياغلىنىدۇ. كېسەل بىلەن تەڭ ئۇزۇد-لۇقتا ياغاچ تاختاي تەييارلىنىدۇ. كېسەلنىڭ قوساق قىسمىغا يۇمشاق تەكىيە قويۇپ دۇم ياتقۇزۇلىدۇ. كېسەل-نىڭ كۆكرەك قىسمىدىن پوتا بىلەن 2 - 3 قەۋەت باغ-لاپ، پۇتىنىڭ ئىككى ئۇچى كېسەلنىڭ 2 قولتىغىدىن چىقىرىلىدۇ ۋە يېرىم غۇلاچ ئۇزۇنلۇقتىكى ياغاچنىڭ 2 ئۇچىغا چىكىلىدۇ. ياغاچقا ئېغىر تاش باغلىنىدۇ. شۇنىڭدەك بىر تېگىنى كېسەلنىڭ ئىككى پۇتىنى تىزدىن بىر يۇقۇرى جايىدىن باغلىنىپ يۇقۇرقىدەك ئۇسۇل بىلەن تۈۋەنگە قاراپ تارتىپ تاشقا باغلىنىدۇ. بۇ چاغدا تىۋىپ ئالقىنى بىلەن بەلنى بېسىپ تۇرۇپ كېسەلنى كۈچ بىلەن پىرىتىغا باغلانغان تاشنى ئوز تەرىپىگە تارتىشقا بويرۇيدۇ ۋە ئالقاننى بېسىپ ئومۇرتقىنى جايىغا چۈشۈرىدۇ. سوقۇلغان ماش، گىلى ئەرمىنى، سەبرى، مۇ-غاس، زەپەر قاتارلىقلارنى گۇلاپ ۋە تۇخۇم سېرىغى بىلەن قوشۇپ چېپىپ تېگىپ قويۇلىدۇ.

6) سان (يوتا) بوغۇمىنىڭ چىقىشى

ئالامەتلىرى: ئىچ تەرەپكە چىقىپ كەتكەن بولسا، ساق پۇتقا نىسبەتەن ئۇزۇرۇپ قالىدۇ، تىز بوغۇمىنى يىغىشقا بولمايدۇ. بوغۇم بېشى سىرتقا چىقىپ، ئىشىق-تەك، كورۇنىدۇ تاشقى تەرەپكە چىقىپ كەتكەندە ئەكس-چە پۇت قىسقراپ قالىدۇ.

ئورنىغا چۈشۈرۈش ئۇسۇلى: ئېسەلنى ئوڭدىسىغا ياتقۇزۇپ، ياردەمچى كىشى كېسەلنىڭ ساغرىسىنى چىڭ بېسىپ بېرىدۇ. تىۋىپ ئورە تۇرۇپ، ئېسەلنىڭ تىزى ئارقىسىدىن بىلىگىنى چىقىرىدۇ. يەنى سىرتقا كېسەلنىڭ پاقالچىكىدىن تۇتۇپ توۋەنگە تارتىدۇ. سىم كېسەلنىڭ ئىگىلىگەن تىزىدىن ئۆتكۈزۈلگەن بىلىگى بىلەن ئۈستۈنگە داۋاملىق تارتىدۇ ۋە ئىچكى، سىرتقى تەرەپ-كە تولغايدۇ. بۇ چاغدا بىر ئاۋاز چىقىدۇ. بوغۇم جايىغا چۈشىدۇ، پۇت تۈزلىنىدۇ. بوغۇمنىڭ ئايتا چىقىپ كەت-مەسلىگى ئۈچۈن يۇقۇرىدا كورسىتىپ ئۆتۈلگەن مايىلارنى چېپىپ بوغۇم تارتىپ قويىلىدۇ. يەنى پوتىغا ئوخشاش مەھكەم بىر نەرسە بىلەن تاپنىغا ئۈزەڭگە سېلىپ، پۈتۈن پاقالچەك ۋە ساننى چىڭ ئوراپ، بىر تەرىپىنى مورىگە (ئارقا تەرەپتىن) ئېلىپ، قولتۇقنى ئايلاندۇرۇپ، بەل باغلايدىغان يەرگە كەلتۈرۈپ سانغا چىكىپ قويى-لىدۇ ۋە بىر ھەپتە ھەركەتلەنمەي ياتىدۇ. بۇ خىلدىكى تېڭىق تىبابەتتە "ئاۋاتىرى" دەپ ئاتىلىدۇ.

7) ئۆكچە (ھوشۇق) بوغۇمىنىڭ چىقىقى

ئالامىتى: ئۆكچە ئورنىدا ئىششىق پەيدا بولىدۇ. يەرگە دەسەشكە بولمايدۇ. بوغۇم ئورنى ئويمانلىشىپ قالىدۇ. ئورنىغا چۈشۈرۈش ئۇسۇلى: ئۆكچە بوغۇمىنىڭ جايىغا چۈشۈشى تەس. كېسەلنى تۈز تاختايدا ئوڭدىسە - خا ياتقۇزۇلىدۇ. ياردەمچى كېسەلنىڭ پاقالچەك سۆڭىكىدىن تۇتۇپ، چىڭ تارتىپ تۇرغان ھالدا تىۋىپ كېسەلنىڭ تاپىنىدىن تۇتۇپ زور كۈچ بىلەن ئوز تەرىپىگە تارتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا قاراسلىغان ئاۋاز بوغۇمىنىڭ جايىغا چۈشكەن - لىكىنى ئۇقتۇرىدۇ. دەرھال مايلاپ ئۆكچىدىن تاپانغا قاراپ چىڭ تىگىلىدۇ ۋە 3 - 4 كۈن ھەركەت قىلىنمايدۇ.

8) قايرىلىپ كېتىش

ئالامەتلىرى: يىقىلىش ياكى يېرىم يىقىلىش بە - لىن پۇت ھوشۇق بوغۇمى ياكى يەرگە تايىنىپ قالغاندا قول بىلەيزۇك بوغۇمىدىكى پەيلەر سوزۇلۇپ كېتىدۇ. ھەركەت قىلغاندا قاتتىق ئاغرىيدۇ، ئىشىشىدۇ.

داۋاسى: يەڭگىل بولسا، كۈچلۈك سىلكىۋېتىش

كۇپايە قىلىدۇ. ئەگەر ئىششىق پەيدا بولۇپ ئاغرىش كۈچىيىپ كەتسە ھىجامەت قويۇش، تۇخۇمنىڭ سېرىغىنى ئارىلاشتۇرۇپ چېپىش، شاكاراپ سۇغا پاختا چېلاپ، پاختا - تىنى سىقىۋېتىپ شور پاختا بىلەن تېڭىش كېرەك. ئاق لەيلى يىلتىزى، ئانار گۈلى، سۈگەت يوپۇرمىغى، ئاقاقىيا، ماش ئۇنى، سۇپارى قاتارلىقلارنى سوقۇپ، تۇ - خۇم ئېقى ئارىلاشتۇرۇپ چېپىش مۇمكىن.

XVIII زەھەرلىنىشى ۋە ئۇنىڭغا قارشى چارىلار

1 - پەسىل: دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش

دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش — ئوسۇملۇك دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش ۋە مەدەندىن ئېلىنغان دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش دەپ ئايرىلىدۇ ①. بۇ خىلدىكى زەھەرلىنىش ئادەتتە ئىستىمال قىلىش مەنىسى قىلىنغان زەھەرلىك دورىلارنى تەسادىپى ياكى قەستەن ئىستىمال قىلىش، تەسىر كۈچى پەۋقۇلئاددە كۈچلۈك ۋە تەسىر كۈچى نىسبەتەن زىيادە بولغان دورىلارنى ئوز ئېتىدالدىن كۆپ ئىستىمال قىلىشتىن كېلىپ چىقىدۇ. تۈرلۈك زەھەرلىك دورىلارنى ئىستىمال قىلىش (يېيىش، ئىچىش) بىلەن كېلىپ چىققان ئالامەتلەرنىڭ ئوز ئالاھىدىلىكىگە ئاساسەن قوللىنىلىدىغان چارىلىرى بار ھەم توۋەندىكىچە ئومۇمى چارىلارمۇ بار.

① بۇلاردىن باشقا تىبابەتتە زەھەرلىك ھاشارەتلارنىڭ زەھەرلىرىمۇ دورا سۈپىتىدە قوللىنىلىدۇ. بۇلار بىلەنمۇ زەھەرلىنىشلەر ئۇچرايدۇ. مەسىلەن، ئەفئا زەھىرى.

(1) زەھەرلىك دورا يىگەنلىكى مەلۇم بولغان ھامان دەرھال قەي قىلدۇرۇش (قۇستۇرۇش) لازىم. قۇستۇرۇش قانچە كۆپ ۋە قانچە بالدۇر بولسا ئەتىجىسى شۇنچە ياخشى. قۇستۇرۇش چارىلىرى مۇنداق:

(1) كۆپ مىقداردا ئىلمان سۇ بىلەن كۈنجۈت يېغى ئىچكۈزۈلسە ئۈزلىگىدىن قەي قىلىشى مۇمكىن يا - كى گالغا بىرنەرسە تىقسا كۈڭلى ئېلىشىپ قۇسىدۇ.

(2) سېرىق چىچەكنى قاينىتىپ سۈيىگە تۈز بىلەن توغرىغۇ قوشۇپ كۆپرەك ئىچكۈزۈش لازىم. بۇنىڭ بىلەن قەي يېتەرلىك يانمىسىمۇ زەھەرنىڭ تەسىرى سۈنىدۇ.

(2) كۆپلەپ قەي يېنىپ بولغاندىن كېيىن، كالا سۈتى ئىچكۈزۈلىشى ۋە ئىمكانىيەت دائىرىسىدە كۆپرەك بېرىلىشى كېرەك. ئەگەر سۇت ئىچىپ تۇرۇپ قەي قىلسا تېخىمۇ ياخشى.

(3) تەرياق فارۇق (186 - نۇسخە)، تەرياقى گىلى مەختۇم (187 - نۇسخە) ۋە مەشدرتۇش (25 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. بۇ دورىلار ھەرخىل زەھەرلەرنى قايتۇرۇش تە - سىرىگە ئىگە.

(4) ئىچ ئەزاسى قىزىپ كەتسە، سېرىق مايغا سو - غاق سۇ قوشۇپ بېرىلىدۇ.

(5) زەھەرلەنگەن كىشىنى ئۇخلا تىماسلىق لازىم. قو - سىغىنى ئاچ قويۇش زەھەرنىڭ تەسىرىنى كۈچەيتىپ قويىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن زەھەرلەنگۈچى كىشى غىزا خالى - سا توپىغىچە بېرىش كېرەك.

6) يۇقۇرقىلاردىن باشقا زەھەرنىڭ كەيپىياتىغا قارى-
شى دورىلارنى بېرىش كېرەك. مەسىلەن: ئىسسىق نەرسىلەر
(دورىلار) بىلەن زەھەرلەنگەندە (ئالامىتى) ئېغىز، مەندە،
ئۇچەيلەردە ئېچىش، كۆيگەندەك سېزىملارنىڭ بول-
شى، يۈرەك، مىڭنىڭ زەرەرلىنىشى قاتارلىقلار) سوغاق
دورىلاردىن كافۇر، يۇمىقاسۇت، گۈلپ قاتارلىقلارنى بې-
رىش كېرەك. سوغاق خۇسۇسىيەتلىك زەھەرلىك دورىلار
مەسىلەن، ئەپيۇن، بەزۇرۇلبەنجىلەر بىلەن زەھەرلەنگەن
بولسا ئىسسىق دورىلار (شېرىلىك سۇ بىلەن ھىڭ ياكى
داۋاتلىشىشكى ھار) نى بېرىش كېرەك.

7) زەھەرلەنگەن كىشىلەر توۋەندىكى ئالامەتلەر-
گە قاراپ ئېنىقلىنىدۇ: زەھەرلەنگۈچىنىڭ ئاغزىدىن غەي-
رى تەبىئىي پوراق كېلىدۇ؛ زەھەرلەنگەن كىشى بىردىنلا
قۇسىدۇ. قۇسقان ماددىنىڭ رەڭگى ھەرخىل بولىدۇ؛ بە-
دىنىدە زەھەرلىگەن دورىغا خاس بولغان ئالاھىدە ئالا-
مەتلەر كۆرىنىدۇ. توۋەندە ھەرخىل زەھەرلىنىشلەردىكى
ئالاھىدە ئالامەتلەر ۋە قۇتقۇزۇش چارىلىرى تونۇشتۇرۇ-
لىنىدۇ:

مەندەن جىنىسلىق دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش

1) سىناپ بىلەن زەھەرلىنىش: تىرىك سىناپ
زەھەرلىمەيدۇ بەلكى تىرىكلا چىقىپ كېتىدۇ. ئەمما سى-
ناپ كۈشتىسى (ئولتۇرۇلگىنى) بىدەنگە سىڭىپ ئېغىر
ھالدا زەھىلەيدۇ.

ئالامەتلىرى: قوساق قاتتىق تولغاقتىن ئاغرىيدۇ. مەئىدە ئېغىرلىق سېزىلىدۇ، ئېغىز قۇرۇيدۇ، كۆپ شول گىمىي ئاقىدۇ، ئېغىز ئىچى ئاغرىيدۇ، سۇيدۇك توختايدۇ. **داۋاسى:** ھەسەل سۈيگە توغرىغۇ قوشۇپ تەييارلى. خان سۇدىن كۆپلەپ ئىچكۈزۈپ قۇستۇرۇش ھەم ھوقنە قىلىش كېرەك. بۇنىڭغا 3 مىسقال مۇرمەككى قوشۇلسا تەستىرى تېخىمۇ ياخشى. ئۇندىن كېيىن، كالا سۈتىگە زىغىر لۇئابى، ئاق لەيلى لۇئابى، بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇ-ئابى ۋە مۇرمەككىنى قوشۇپ بېرىش ۋە يۈرەكنى قۇۋۋەت-لەندۈرگۈچى دورىلار بېرىش لازىم.

(2) مەدەستان (موردارسەنگ) ① بىلەن زەھەرلە. - ئىش: ئادەتتە مەدەستان تاشقى تەرەپتىن ئىشلىتىلىدۇ. ئۇنى يەپ سالسا زەھەرلەيدۇ.

ئالامەتلىرى: بەدەن ئىششىيدۇ، ئىششىقلار ئاغ-رىيدۇ. تىل قۇرۇپ ئېغىرلىشىدۇ. ئۆچەي توسىلىش ئالا-مەتلىرى پەيدا بولۇپ، قوساق قاتتىق مۇجۇپ ئاغرىيدۇ، قانلىق تەرەت كېلىدۇ (بۇ خۇددى قان تولغاقتى ئەسلە-تىدۇ)، قۇسىدۇ. قوسقان ماددا قوغۇشۇن پۇراپ، قارام-تۇل، كۆكۈش رەڭدە بولىدۇ.

داۋاسى: ئەنجۈر، سېرىق چېچەك ۋە توغرىغلارنى قاينىتىپ بىر ئاز سېلىپ كۆپ مىقداردا ئىچكۈزۈپ قەي-قىلدۇرۇش. كۈچلۈك دورىلارنى ھوقنە قىلىش ياكى ① مەدەستان: كۆيدۈرۈلگەن قوغۇشۇن.

مىزاجىغا قاراپ سۇرگە بېرىش لازىم. ئارقىدىن زەھىرىيلى
مۇرەببەسى يېمىشكە بېرىپ مۇنچىدا تەرلىتىش كېرەك.
مۇرەببەدىن 3 مىسقال، سۇمۇلدىن 2 مىسقال، ھەسەل -
دىن 15 مىسقال ئېلىپ، قاتتىق دورىلارنى يۇمشاق
سوقۇپ، ھەسەل بىلەن ئېلىشتۇرۇپ 4 گە بۆلۈپ بىر كۈندە
يېمىشكە بېرىلىدۇ، توخۇ شورپىسىدا ئوقۇت پىشۇرۇپ
بېرىش كېرەك.

(3) قەلەي كۈشتىسى (قەلەي تۈزى) بىلەن زە -
ھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: تىلى ئاقىرىپ كېتىدۇ، ھىق تۇتە -
دۇ، كوڭلى ئاينىدۇ. يوتەل ۋە گالنىڭ قۇرۇشى كېسەلنى
ئازاپلايدۇ. مەئدە تاغرىمىدۇ، ئەس - ھۇشى جايىدا بولمايدۇ،
جويلىمىدۇ. بەزىدە سۇيىدۇك كەلەيدۇ، ئۇيقا باسىدۇ.

داۋاسى: ھەسەلگە سۇ قوشۇپ بىر ئاز ئەنجىر
سېلىپ قاينىتىپ ئىچكۈزۈش ئارقىلىق قەي قىلىدۇ -
رۇلىدۇ. 2 يېرىم پۇڭ مەھمۇدە (سوقمۇنىيا) نى ھەسەل
سۇيى بىلەن بېرىپ ئىچى سۇرگۈزۈلمەدۇ ياكى مۇناسىپ
دورىلار بىلەن ھوقنە قىلىنىدۇ. سۇيىدۇك تۇتۇلغاندا شەر -
ۋىتى ئەپسەنتىن (91 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. ئۇخلا تەسلىققا
تېرىشلىدۇ.

(4) مەرگىمۇش (سىمولىقار - چاشقان زەھىرى) دىن
زەھەرلىنىش:

ئالامىتى ۋە داۋاسى: (3) بىلەن ئوخشاش.
كېپەك شىرىسى ئىچكۈزۈلىدۇ.

(5) زەرنىخ بىلەن زەھەرلىنىش:

ئالامىتى: قوساق قاتتىق ئاغرىيدۇ، ئۈچەيلەر جاراھەتلىنىپ، قان تولغاقتەك ئىچى كېلىدۇ، يوتەل ۋە سۈيىدۈك قىيىنلىشىدۇ، بەدىنى سوۋۇپ كېتىدۇ ۋە سىماپ بىلەن زەھەرلەنگەندەك بەزى ئالامەتلەر كۆرىلىدۇ. قۇس-ھى سېرىق بولۇپ، زەرنىخ پۇرايدۇ.

داۋاسى: سىماپ بىلەن زەھەرلەنگەنگە ئوخشاش بولۇپ، كۆپ مىقداردا سۇت ئىچكۈزىلىدۇ.

(6) تومۇر دېتى ۋە تومۇر كۈشتىسىدىن زەھەر-

لىنىش:

باش قاتتىق ئاغرىيدۇ، قۇسىدۇ، ئېغىزدىن تومۇر دېتىنىڭ پۇرىغى كېلىدۇ. قوساق ئاغرىپ قارامتۇل ياكى پور رەڭلىك سۇيۇق تەرەت كېلىدۇ.

داۋاسى: قەي قىلدۇرۇش، كۆپ مىقداردا سۇت بىلەن مەشكە ماي ياكى سېرىق ماي ئىچكۈزۈش كېرەك. گۈل يېغى، بىنەپشە يېغى ۋە بادام يېغى بىلەن باشنى ياغلاپ بېرىش لازىم. شۇنىڭ بىلەن بىللە، كۈنىگە بىر مىقال-دىن ئاھانرەباتاش (ماگىنت تېشى) تالقىنى ئىچكۈزۈپ، ئارقىسىدىن سۈرگە بېرىش ياكى قۇستۇرۇش لازىم.

(7) ھاك بىلەن زەھەرلىنىش:

ھاك تۈزۈندىلىرىنىڭ ئېغىز ۋە بۇرۇندىن كۆپ كېرىپ كېتىشى ياكى قەستەن ھاك سۈيى ئىچىۋېلىشتىن كېلىپ چىقىشى مۇمكىن.

ئالامەتلىرى: يۈتەل، باش ئاغرىش، كۆزلىرى قىزىش، كۆڭلى ئاينىش، سۈيىدۈكى قىزىل كېلىشتەك بەلگىلەر يۈز بېرىدۇ.

داۋاسى: بادام يېغى، سېرىق ماي ۋە مەشكە مە - يىنى كۆپ مىقداردا ئىچكۈزۈپ (بىر ئاز ئىسسىق سۇ بىلەن) قۇستۇرىلىدۇ. ئۇندىن كېيىن ياغلىق شورپا ۋە زىغىر، بىيە ئۇرۇغىنىڭ شىرىلىرى بېرىلىدۇ.

(8) **زەمچى ۋە زاكتىن زەھەرلىنىش:** ئالامەتلىرى: ئاساسەن ئۆپكە زەھەرلىنىدۇ، يۈتەل بىلەن قان تۆكۈرىدۇ، سوزۇلما زەھەرلەنگەندە ئۆپكەنىڭ جاراھەتلىك كېسەللىكلىرىگە سەۋەپ بولىدۇ.

داۋاسى: دەرھال سەزگىلى بولغاندا قەي قىلدۇ - رۇش لازىم. ئۇندىن كېيىن كۆپ مىقداردا سۇت ۋە مەشكە ئىچكۈزىلىدۇ. شەرۋىتى بىنەپشە (74 - نۇسخە)، چالا پىشۇرۇلغان تۇخۇم سېرىقى ۋە توخۇ شورپىسى بېرىلىدۇ.

(9) **زەڭگەر بىلەن زەھەرلىنىش:** ئالامەتلىرى: توختىماي قۇسىدۇ. قۇسقى كۆك رەڭدە بولۇپ، مىس دېتى پۇراپ تۇرىدۇ. سۈيىدۈكى يېشىل كېلىدۇ، مەئىسى ئاغرىيدۇ. **داۋاسى:** زەرنىخ بىلەن ئوخشاش.

ئوسۇملۇك دورىلار بىلەن زەھەرلىنىش

(1) پارپا (فارفى) دىن زەھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: پارپا ئادەتتە ئاق ۋە قارا ئىسسىق خىل رەڭدە بولۇپ، داۋالاشتا قارىسى قوللىنىلىدۇ. ئات پارپىنىڭ زەھەرلىكى بەك ئوتكۇر بولغانلىقى ئۇچۇر، مەيلى ئىچتىن ياكى سىرتتىن ئىشلىتىلىشى مەنى قىلەندۇ. قارا پارپىنىڭ ئوزىنى يالغۇز ئىشلىتىش قەتئىي چەكلىنىدۇ. چۈنكى دىققەتسىزلىك بىلەن ئازراق ئارتۇق ئىچىۋەتسە زەھەرلەيدۇ. مەسىلەن، كالىۋكى، تىلى ئىشەيدۇ، نەپەس ئېلىشى تېزلىشىدۇ. بوغۇلۇپ ھۇشسىز كېتىدۇ. ئېغىر ھاللاردا ئولۇپ كېتىدۇ. ئىگەر قۇتۇلۇپ قالغان تەقدىردىمۇ ئوپكە زەھەرلىنىشكە دۇچار بولىدۇ.

داۋاسى: دەرھال چامغۇر ئۇرۇغىنى قاينىتىپ سۈيىنى ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇش، كۆپ مىقداردا مايلىق (سېرىق ماي) سۇ ئىچكۈزۈپ تەكرار قۇستۇرۇپ، ئارقىدىن كۆپلەپ سۇت ئىچكۈزۈش لازىم. ئۇنىڭدىن كېيىن شاھ بەللۈتنى قاينىتىپ، سۈيىگە بىر مىسقال داۋائىل مىشكى (22 - نۇسخە) قوشۇپ بېرىلىدۇ. ئىمكا-نەمەت بولسا، تەرباق، فارۇق (186 - نۇسخە) مەشدر-تەسر (25 - نۇسخە) ياكى فادى زەھرە ھايۋانى (دېڭ-زىيا) تېرىش كېرەك (بەزىلەر بىخ كەبىر پوستى سېرىق تەن مۇشەك گۆشى بىلەن پىشۇرۇپ بېرىشنى كۆرسەتىدۇ).

2) پەرىپىيەندىن زەھەرلىنىش:
ئالامەتلىرى: مەئدە، قوساق چىشلەگەندەك ئاغرىپ،
قاتتىق ئېچىشىدۇ، ھىق تۇتىدۇ.
داۋاسى: قەي قىلدۇرۇپ بولغاندىن كېيىن كۆپ
مىقداردا سۇت ۋە مەشكە بېرىلىدۇ.
3) بالادۇردىن زەھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: بالادۇرنىڭ قىزىتىپ چىقىرىلغان
مېيى تەككەن يەردە سۇلۇق قاپارتما پەيدا قىلىدۇ. ئىم-
غىر بولسا ئويۇلۇپ كېتىدۇ. بۇنداق ھاللاردا چارەت-
لەر ۋە كويۇكلەر قاتارىدا چارە قىلىنىدۇ. 2 مىسقالنى
يىگەندە ئادەم ئولتۇرىدۇ. بىر مىسقالغا يەتمىگەن مىق-
دارمۇ زەھەرلەيدۇ. مەسىلەن، ئېغىز ئىچلىرىدە سۇلۇق
قاپارتىمىلار پەيدا بولىدۇ، بەدەن قىزىيدۇ، پۇتۇن ئىچ
ئىزالار كويگەندەك ئېچىشىدۇ. بولۇپمۇ مەئدە ۋە قوساق
ساھەسىدە ئېچىشىش روشەن كۆرىنىدۇ. كېسەل بەك
قورقۇپ كېتىدۇ. ساقايغاندىن كېيىنمۇ بىر قانچە ۋاقىتتە-
چە قورقۇپ يۇرىدۇ.

داۋاسى: قەي قىلدۇرۇشقا دائىم ئۈلگۈرەلمەيدۇ.
ئىچ ئىزنى (ئېغىز ئىچى، گال ۋە مەئدەنى) كويىدۇرد-
ۋە تەكەندىن كېيىن قەي قىلدۇرۇش، ئەكسىچە زەھەرلىك.
بۇنىڭ ئۈچۈن، سوۋۇق ياغلاردىن قاياق ئۇرۇغى مېغە-
زىنىڭ يېغى، بادام يېغى ئىچكۈزۈش ۋە ئەنە شۇ ياغلار
قوشۇلغان ئىلمان سۇ بىلەن ھوققە قىلىش لازىم. مە-

ھىزلارنى سوقۇپ يىگۈزۈلسە مەسىلەن، ياڭاق مېغىزى بەرسە بولىدۇ. دېڭىزىيا بېرىشنىڭ ئۇلۇمى ياخشى. بىر دەنگە بالادۇر شىرسى (بالادۇر ھەسلى) تېگىپ كەتسە دەرھال قېتىقنى دۈغ قىلىپ چايقاش كېرەك (قېتىق قانچە ئاچچىق بولسا شۇنچە ياخشى). ئۇندىن كېيىن ياڭاق مېغىزى، ئورمان ياڭىقى (پىندۇق) مېغىزى ۋە بادام مېغىزلىرىنى سۇقۇپ يارا ئۈستىگە قويۇش، 4 - 5 سائەتتىن كېيىن يەنە دۈغ بىلەن يۇيۇش كېرەك.

(4) ئاق خەربەقتىن زەھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: ئىچى سۈرىدۇ، قوساق ئاغرىدۇ. بۇغۇلۇپ قالىدۇ. يۈرەك قوزغىلىپ ھۈشدىن كېتىدۇ. سۈيىدۈكى قىزىل كېلىپ، كۆيگەندەك سېزىلىدۇ.

داۋاسى: كالا سۈتى ۋە مەشكە بېرىلىدۇ. كالا - نىڭ ئوغۇز سۈتى بىلەن ھەسەل قوشۇپ بېرىلسە مەنپەئەتى ياخشى. ئىچ سۇرۇشنى توختىتىش ئۈچۈن ئانار ۋە ئالبا شەرۋەتلىرى (47 - 48 - نۇسخىلەر) بېرىلىدۇ.

(5) قۇندۇز قەرىدىن زەھەرلىنىش:

ئادەتتە قۇندۇز قەرىنى يالغۇز ھالدا يىيىشكە بېرىلمەيدۇ. دورىلار بىلەن بىرلىكتە قوشۇپ بېرىلگىنى ئانچە زەھەرلىك ئەمەس. قارامتۇل كەلگەن قۇندۇز قەرىنىڭ زەھەرلىك كۈچى بەك ئۈستۈن بولۇپ، يالغۇز ياكى باشقا دورىلار بىلەن قوشۇلغىنىدىن 2 - 3 مىسقال يىپىلسە زەھەرلىيدۇ.

ئالامەتلىرى: بەدەن قىزىيدۇ، قۇسۇش،
باش قاتتىق ئاغرىش، يۈز، كۆزلىرى قىزىرىش، قىزىل
رەڭدە سېىش، چويلۇش، تارتىشىپ قېلىش ئالامەتلىرى
كۆرۈلۈپ خۇددى مىڭە يەردە ياللۇغنىڭ تىلەكلىرىنى
بېرىدۇ.

داۋاسى: سېرىق چىچەك، سەرىستان قايناتقان
سۇ ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇلىدۇ. ئۇندىن كېيىن لىمون
شەرىتى، ئاچچىق دوغلارنى ئىچكۈزۈپ، ئارقىدىن سېىز
ئوت شىرىسى ۋە بىيە لىۋاڭلىرى بېرىلىدۇ؛ بەزىلەر
تۇرۇنچى ۋە پاقا يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى ياكى ئۇزۇغىنىڭ
سۈيىنى بېرىشنى كورستىدۇ.

(6) ياۋا پىياز (ئەسەل) دىن زەھەرلىنىش:
ياۋا پىيازنى تىبابەتتە ئوتقا (چوققا) تۇتۇپ پە-
شۇرۇپ، تاش پوستى تازىلاپ بېرىلىدۇ. ئەگەر مۇنداق
قىلماي بېرىلسە، ئاز مىقداردا بولسا قوساق ئاغرىپ
ئىچى سۇرۇپ كېتىدۇ؛ كۆپرەك بولسا، چىش مۈلۈكلىرى
ئاغرىش، كۆكرىگى ئاغرىش ۋە قانلىق ئىچ سۇرۇشلەر
كېلىپ چىقىدۇ.

داۋاسى: تومۇر پارچىسىنى ئوتتا قىزىتىپ، سۈتكە
تاشلاپ سۇ ئىچكۈزىلىدۇ. تۇخۇم سېرىغىنى چالا پىشۇ-
رۇپ يېيىشكە بېرىلىدۇ. ئىسپۇغۇل لۇئابى بىلەن قۇرس
كەھرىيا (71 - نۇسخە) يەرگەندە ئىچ سۇرۇش توختايدۇ.
(7) رەۋەندىن زەھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: يەرلىك رەۋەننىڭ رەھبەرلىك خۇسۇسىيىتى ئاز. رەۋەن چىنى (ئات تۇۋىغى رەۋەن) رەھبەرلىك تەسىرىگە ئىگە. كۆپ ئىچىپ قويسا توختاۋسىز ئىچسۇرىدۇ. قوساق مۇجۇش ۋە ئىنجىقسىمان ئاغرىشلار كېسەلنى ئازاپلايدۇ، تارتىشىپ قالىدۇ.

داۋاسى: كۆپ مىقداردا سۇت ۋە مەشكە بېرىلىدۇ. ئالما شەرىتى ۋە جىيە، ئانار شەرىتلىرى (47 - 48 - نۇسخىلار) بېرىلىپ بەدەن سوغاق سۇ بىلەن يۇيۇلىدۇ. (8) ئەپيۇندىن زەھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: بىر قېتىملىق مىقدارى 2 مىسقالدىن ئېشىپ كەتسە ئۆلتۈرىدۇ. 2 مىسقالغا يەتمىگەن مىقداردىكىسىنى كۈنجۈت يېغى بىلەن يىسە ئۆلۈم بېرىدۇ. ئادەتتە زەھەرلەنگەندە كۆرىلىدىغان ئالامەتلىرى: ئۇيقا بېسىش، ئۇخلاپ ئويغانماسلىق، سۆزلىمەسلىك قاتارلىق بەلگىلەر كۆرۈلۈپ، سوغاق تەرلەپ كېتىدۇ. كۆزلىرى ئۆلتۈرۈشۈپ كېتىپ، نەپەس قىيىنلىشىدۇ، كۆزى قاراڭ-خۇلىشىدۇ. ھىق تۇتىدۇ. ئاغزىدىن ئەپيۇن پۇرىغى كېلىدۇ.

داۋاسى: سېرىق چىچەك، تۇرۇپ ئۇرۇغى، دار-چىنلارنى سوقۇپ، قاينىتىپ سۈيىنى ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇرۇلىدۇ. ئۇندىن كېيىن تەرياقى ئەرپە (188 - نۇسخە) ياكى ئاقىر قەرە، قۇندۇز قەرى، پىلىپىل، ھەتەك، ئارچا مېۋىسى (ئۆنەل) لەرنى سوقۇپ، ھەسەل ئارىلاش-

تۇرۇپ غەپىرىدەك قىلىپ ئۇرۇك مېغىزىدەك يېيىشكە
بېرىلىدۇ ۋە قوست يېغى بەدەنگە سۇرتىلىدۇ.
(9) يۇمىماق سۇتتىن زەھەرلىنىش:

كوك يۇمىماق سۇتنى 5 سەر مىقدارىدا يېسە زەھەر-
لەيدۇ. 4 سەر مىقداردىكى سۇيىنى ئىچسە ئولۇم بېرىد-
دۇ. ئەگەر سۇت بىلەن ياكى باشقا كوكتاتلار بىلەن
بىرگە يېسە زەھەرلىك تەسىرى توۋەن بولىدۇ.
ئالامەتلىرى: پۇتۇن بەدىنىدىن يۇمىماق سۇت پۇرىغى
كېلىدۇ، باش قايىدۇ. ئاۋازى پۇتۇپ قالىدۇ، ئۇيىقا
باسىدۇ.

داۋاسى: سېرىق چىچەك بىلەن توغرىغۇ قاينىتىلغان
سۇغا زەيتۇن يېغى ياكى گۈل سوسەن يېغىدىن بىر ئاز
قوشۇپ ئىچكىزۈپ قەي قىلدۇرۇش لازىم. ئۇندىن كېيىن
تۇخۇم سېرىغىنى چالا پىشۇرۇپ، قارىمۇچ، پىلىپىنى
سوقۇپ ئېلىشتۇرۇپ يېيىشكە بېرىلىدۇ.

(10) سوقۇلغان ئىسپۇغۇلدىن زەھەرلىنىش:
ئادەتتە ئىسپۇغۇلنى سوقماستىن پۇتۇن ھالدا ياكى
لۇئابىنى چىقىرىپ بېرىلىدۇ. ئەگەر ئۇقۇشمايلىقتىن
باشقا دورىلار بىلەن قوشۇپ سوقۇلۇپ قالسا زەھەرلىك
تەسىر كۆرسىتىدۇ.

ئالامەتلىرى: مەئدە ئېچىشىدۇ، نەپەس قىيىنلىق-
شىدۇ. بەدەن ماغدىرىسىزلىنىپ تومۇر ھەركىتى ئاجىز-
لىشىدۇ. پۇتۇن بەدەن سۈۋۇپ كېتىپ، ھۇشىدىن كېتىدۇ.

داۋاسى: سېرىق چىچەك بىلەن توغرىغۇ قاينىتىلغان سۇنى كوپرەك ئىچكۈزۈپ قەي قىلدۇ. رۇلغاندىن كېيىن، ئارقىدىن رەبەن شەرۋىتى، تەرياق فارۇق (186 - نۇسخە) بېرىش كېرەك ۋە ھەببى جەدۋار (26 - نۇسخە)، تۇخۇم سېرىغىنى چالا پىشۇرۇپ بېرىش لازىم. ئىچىشكە سېمىز ئوت شىرمى ياكى خاڭگا، سېمىز ئۇت، كاسنى ۋە قوغۇن ئۇرۇقلىرىنىڭ شىرىلىرى بېرىلىدۇ.

(11) ۋاڭنىڭ ئۇرۇغى (جەۋزى ماسىل) دىن زە- ھەرلىنىش:

ئالامەتلىرى: سوغاقتىن بولغان سەرسامنىڭ ئالا- مەتلىرى كورىلىدۇ، جويلۇيدۇ، بېشى قاينىدۇ. كوزىگە ھەر خىل نەرسىلەر (خىيالىت) كورىنىدۇ، تارتىشىپ قې- لىپ ھۇشىدىن كېتىدۇ.

داۋاسى: قەي قىلىدۇرۇش ۋە ھوقنە قىلىش كېرەك. ئەپسەنتىن، سۇتتىر قاينىتىلغان سۇ ئىچىشكە بېرىلىدۇ. سۇت ئىچكۈزۈش (مەشكە، سېرىق ماي قوشۇپ بېرىلسە تېخىمۇ ياخشى). گۈل يېغى، سىركە گۈللەرنى بىرلەشتۈرۈپ باشقا چېپىلىدۇ، تەرياق فارۇق (186 - نۇسخە) يىگۈزۈلىدۇ.

(12) كۈچۈلا (ئازاراقى) دىن زەھەرلىنىش: كۈچۈلنىڭ زەھەرلىشى ئادەتتە بىردىنلا يۈز بېرىدۇ. ئالدى بىلەن گەژگە (گەدەن)، كېيىن پۈتۈن بە-

دەن تارتىشىپ، كوز قارچۇغىمۇ ئارقىغا تارتىشىپ كېتىدۇ.
كۇچۇلا بىلەن ئېغىر زەھەرلەنگەندە ئولۇم بىلەن ئاياغلىشىدۇ.
كۇچۇلنىڭ زەھەرلىك قىسمى ئۇنىڭ ئىچىدىكى
تىلى بولۇپ، كۇچۇلدىن مەجۇن ياكى تالقان ياساشتا،
ئىچىنى يېرىپ تىلىنى قاتتى ئېلىۋېتىش شەرت. ئاندىن
ئۇنى سۈتكە چىلاپ قاينىتىش چارىسىنى ئەلۋەتتە توغرا
تولۇق ئىشلەش لازىم. شۇنىڭدەك كۇچۇلا قوشۇلغان دو-
رلارنى تېگىشلىك مىقداردىن ئاشۇرماي يېمىش ۋە 20 -
30 كۈن ئىستىمال قىلىپ، يېرىم ئايچە توختىتىپ،
قايتا بىر ئاي ئىستىمال قىلىش كېرەك.

داۋاسى: قۇستۇرۇش ۋە كۆپ مىقداردا سۈت
ئىچكۈزۈش، خوشبۇي دورىلار بىلەن ھەسەل ياكى قەن
سۈيى بېرىش كېرەك.

يۇقۇرقىلاردىن تاشقىرى، تىبابەتتە يىلان قاتارلىق
زەھەرلىك ھاشارەتلەرنىڭ زەھەرلىرىمۇ دورا سۈپىتىدە
قوللىنىلىدۇ (ناھايىتى كەم ھاللاردا ئىشلىتىلىدۇ).
ئۇلاردىن كۆپرەك ئىشلىتىدىغىنى ئېفئايلىنىنىڭ زەھىرى
بولۇپ، ئۇنىڭدىن زەھەرلەنگەندە باش قېيىش، كۆڭلى
ئاينىش، قۇسۇش بىلەن كېسەل تېزلا ھۇشىدىن كېتىدۇ.
كۆپىنچە ئولۇپ قېلىشى مۇمكىن. مۇنداق ھاللاردا، ئاۋال
سېرىق ماي بىلەن مەشكە ۋە كۈنجۈت يېغى ئىچكۈزۈپ
قۇستۇرۇپ ئاندىن كېيىن تەرياق فارۇق (186 - نۇسخە)
ۋە داۋائىل مىشكى (22 - نۇسخە) بېرىلىدۇ. مائۇل

لەھمى ① ۋە ياغلىق شورپىلار بېرىلسە زەھەرنىڭ كېيىنكى
تەسىرىنى يوقىتىشقا ياردىمى بار.

2 - پەسىل: زەھەرلىك ھاشارەتلەر چېقىش ۋە ئۇلارنى داۋالاش

زەھەرلىك ھاشارەتلەرنىڭ زەھەرلىرى ئادەم ئۈچۈن
بەزىدە ئۆلۈم بىلەن ئاياغلىشىدىغان ئەھۋاللارنى كەلتۈر
رىدۇ. ياكى سالامەتلىكىگە بىر مۇددەت خېلى ئېغىر
تەسىر بېرىدۇ. زەھەرلىك ھاشارەتلەر زەھەرنى قايتۇرۇش
ئۇسۇل چارىلىرى ھەرقايسى ھاشارەتنىڭ ئۆزىگە خاس
بولىدۇ. بۇ يەردە شۇ تۈرلەردىكى ئومۇمى تەدبىرلەر
ئۈستىدە توختىلىپ ئۆتىمىز:

ئومۇمى چارىلەر

(1) زەھەرلىك ھاشارەتلەر چاققان جايدىكى زەھەر
تەسىر قىلغان بەدەن سۇيۇقلىقىنى چىقىرىۋېتىش كېرەك.
چۈنكى بەدەندىكى سۇيۇقلۇقلار زەھەرنى پۈتۈن بەدەنگە،
جۈملىدىن باشقۇرغۇچى ئىزالارغا تارقىتىۋېتىش ئامىلى بولۇپ
قالىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن قەي قىلدۇرۇش ۋە سۈرگە بېرىش
ئارقىلىق بۇ مەقسەتكە يېتىش كېرەك. سۇيۇك ماڭدۇ -
رۇش رولىمۇ چوڭ. يەنى كۆپ مىقدارىدا سۇ ئىچكىزۈپ
قەي قىلدۇرۇش، ھوقىدە دورىلىرىدىكى سۇنىڭ مىقدارىنىمۇ
① "جۈدە تېخى ئىستىما" غا قاراڭ.

ئەلۋەتتە ئادەتتىكىدىن ئارتۇغراق قىلىش كېرەك. قىسقىسى
يىللار چاققاندىن باشقا ھاللاردا قان ئېلىشقا بولمايدۇ.
(2) بەدەندىكى خىلىتلارنى ھەركەتلەندۈرۈپ ئۇ -

لارنىڭ زەھەرنى سىرتقا ھەيدىشىگە ياردەم بېرىش،
مەسىلەن، تەرلىتىش لازىم.

(3) بەدەندىكى تەبىئى كۈچنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق
بەدەننىڭ زەھەرگە قارشى تۇرۇش قۇۋۋىتىنى كۈچەيتىش
مەقسىدىدە تەبىئىي قارۇق (186 - نۇسخە) مەشدرتۇس
(25 - نۇسخە) فادزەھەرە ۋە لۇئىبەتى بىر - بىرى قاتار -
لىقلارنى بېرىش كېرەك.

(4) چاققان ھاشارەت زەھەرنىڭ تەبىئىتىگە قاراپ
ئۇنىڭغا قارشى تەسەرلىك دورىلارنى قوللىنىش لازىم.
مەسىلەن، چايان زەھەرنىڭ قارشىسى ھىك ھىپلىنىدۇ.
بەزىدە شۇ زىيانداشلارنىڭ ئۈزىمۇ داۋا بولىدۇ. مەسىلەن،
ئەقنا يىلان چاققاندا زەھەر پۈتۈن بەدەنگە تاراپ كەتكەن
بولسىمۇ، شۇ خىل يىلاننىڭ گۆشى بېرىلسە زەھەرنى
قايتۇرىدۇ. لەھەڭ (ئىت بېلىغى) نىڭ زەھەرنى ئۈزگۈشى
قايتۇرىدۇ ۋە ھاكازا.

(5) زەھەرنىڭ تاراپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن چارە
كۆرۈش ئالدىنقى شەرت ھىپلىنىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن،
زەھەرلىك ھاشارەت چاققان جاينىڭ يۇقۇرقى تەرىپىدىن
ئولغام سېلىپ باغلاش، كېشى، زۇلۇك قويۇش، ھىجا -
مەت قويۇش ۋە ئەتراپنى قىزىتىلغان پولات، تومۇر، زىخ
بىلەن داغلاپ مۇھاسىرە قىلىش قاتارلىق چارىلەرنى

ئەھۋالغا قاراپ قوللىنىش كېرەك. ئەڭ بولمىغاندا ئېغىز بىلەن شۇراش لازىم ئەمما شورىغۇچى كىشىنىڭ قوسىقى توق ۋە ئېغىز ئىچىنى گۈل يېغى بىلەن چايقاپ ئالغان بولۇشى كېرەك.

(6) زەھەر قايتۇرغۇچى مەخسۇس دورىلارنى تاللاپ بېرىش كېرەك (بەزى ئالدىراش چاغلاردا قايسى مەۋجۇت بولسا شۇنى بېرىشكىمۇ توغرا كېلىدۇ. زەھەر قايتۇرغۇچى دورىلار مۇنۇلاردىن ئىبارەت):

(1) تورۇنجى (پىشقان جۈيزە) ئۇرۇغىدىن 2 مىسقال يىگۈزۈلسە زەھەرلىك ھاشارەتلەر زەھىرىنى قايتۇرىدۇ.
(2) چىنار دەرىخىنىڭ مۇسنى يېيشكە بېرىلسىمۇ يۇقۇرقىدەك تەسىر كۆرسىتىدۇ.

(3) قورۇلغان قۇرۇق يۇمىلاقسۇت ئۇرۇغىنى قايمىتىپ، سۈيىنى ئىچكىزۈش ياكى سوقۇپ تالقان قىلىپ يىگۈزۈش كېرەك.

(4) غۇلجاڭ (ئولجاڭ — ھىڭنىڭ يىلتىزى) ۋە فادزەھرە زەھەر قايتۇرۇشتا ياخشى تەسىرگە ئىگە.

(5) ئۆشكە مايىغى چېپىش (بەزىلەر يېيىشنىمۇ كۆرسىتىدۇ). تاغ پىننىسىنى يېيىش ۋە سوقۇپ سىرتتىن چېپىش؛ خام قايماق، مەشكە ماي چېپىش زەھەر قايمى تۇرۇشتا ئۇنۇم بەرگەنلىكى توغرىسىدا خاتىرىلەر بار.

(6) مۇرەككەپ دورىلاردىن تەرياق 1، II (189) — 190 نۇسخىلەر ئىشلىتىلىدۇ.

مەخسۇس چارىلار

(1) يىلان، چايان چېقىش: ئالامەتلىرى: كۆيگەندەك ئېچىش، چىدىغۇسىز فاتتىق ئاغرىش سېزىلىدۇ. چاققان يەر قىزىرىپ قاتتىق تۈگۈن بولۇپ قالىدۇ. ئەگەر قىزىلتومۇرلارغا چاققان بولسا تېزلا ھۇشىدىن كېتىدۇ. ئېغىر ھالدا ئۆلۈپمۇ قالىدۇ. ئەگەر ئەسەپ (نېرۋا) غا تېگىپ قالسا تۇتقاق كېسەل ۋە مىڭ پەردە ياللۇغىدىكىدەك ئالامەتلىر كۆرىلىدۇ. قۇتۇلۇپ قالغاندىمۇ باش ئاغرىغى قالىدۇ.

داۋاسى: دەرھال چاققان جايىنىڭ يۇقۇرىسىدىن ئوڭام سېلىپ، چاققان يەرنى تىلىپ ھىجامەت قويۇش ۋە ئەتراپىغا چۆرەدەپ زۇلۇك قوندۇرۇش كېرەك. بابۇنى، بەزەلجا سەپ (ئاددى ئەمەن)، بۇغداي كېپىگىنى قاينىتىپ يۇيۇلىدۇ. ھىندىستان ئورمان ياڭىغى (پىندۇق) نى ئېغىزغا سېلىپ شۇمۇش ۋە يۇمشاق سوقۇپ چاققان جايغا بېشى كېرەك. چاققان جايغا تۈۋەندىكىلەردىن بىرىنى چېپىش لازىم:

- (1) پىننە، ئارپا ئۇنىنى سۇزاپ سۈيىگە ئارىلاش- تۇرۇپ چېپىش.
 - (2) گۇڭگۇرت پوقى، زىغىر، مەستىكى، قۇندۇز قىرى ۋە سامساق قاتارلىقلاردىن بىرى ياكى بىرقانچە چىسىنى بىرلىكتە زەيتۇن يېغى بىلەن ئېلىشتۇرۇپ چېپىش.
 - (3) ھەك بىلەن سامساقنى ھاراققا قوشۇپ چېپىش.
- يېشى ئۈچۈن مۇرەككەپ دورىلاردىن تەرياقى

ئەربەتە (188 - نۇسخە)، سەنجىرىنا (33 - نۇسخە)،
مەجۇنى سۇم (191 - نۇسخە)لەردىن بىرى بېرىلىدۇ.
(2) ھەرە چېقىش:

ئادەتتىكى ھەرلەر چاقا بىر مەزگىل ئاغرىش ۋە
ئىشىش بىلەن ساقىيىپ كەتسەمۇ، قارا ھەرە چاقا ئا-
دەمنى ئولتۇرۇپ قويىشى مۇمكىن.

ئالامەتلىرى: كۈچلۈك ئاغرىيدۇ، ئىشىش كېتىدۇ.
پۈتۈن بەدەن ئىشىش نەپەس تۇتۇلۇپ ئولۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: دەرھال بىر سىقىم كوك يۇمغاقسۇتنى
يىگۈزۈش، ئاق لەيلى، ھەمشىۋا، ئىت ئۇرۇمى، بىنەپشە
كاسىنى، كاكىنەجلەرنى سوقۇپ ھەرە چاققان يەرگە قويۇش
كېرەك. داكىنى سىركىگە چىلاپ مۇز بىلەن سوۋۇتۇپ
ھەرە چاققان يەرگە قويۇلما بولىدۇ. ئاچچىق ئانار سۈيى،
ئالما شەرىۋىتى (48 - نۇسخە) ياكى ئىسكەنجىۋىل بېرىد-
لىدۇ. كاسىن سۈيى، خاڭگا سۇلىرىنى بېرىش مۇمكىن.
ئادەتتىكى ھەرە چاققاندا چىۋىنىنى ئولتۇرۇپ ھەرە چاققان
جايغا سۈركەش ۋە ھەرە كۈنىگىنى سىركىدە ئىزىپ
چېپىش ياكى كوك يۇمغاقسۇتنى سوقۇپ چېپىش كېرەك.
(3) دو (چوك ئومچۇك) چېقىش:

ئۇلار بىر قانچە خىل بولۇپ، ھەر بىرى ئۆز
ئالدىغا ئالاھىدە كېسەللىك ئالامەتلىرى يەيدا قىلىدۇ.

(1) رەڭگى قارا، پاچاقلىرى قىسقا، ئۈستىدە تۈك
بولمايدىغانلىرى (قارا قۇرۇت) چاقا پۈتۈن بەدەن قىچىد.

شىپ كېتىدۇ. قىزىتما يۈز بېرىپ نەپەس سىقىلىدۇ، بوغۇلۇپ تۇلۇپ قالىدۇ.

داۋاسى: چاققان ئورۇننى بىلگىلى بولسا دەرھال تىلىپ ھىجامەت قويۇش ياكى بىلەك تومۇردىن قان ئېلىش لازىم. ھەتتا چاققان يەردىن قان چىقىرىش ئۇ-چۇن ئازراق كېسىپ تاشلاشنى كۆرسەتكەنلەرمۇ بار. جاراهەت ئورۇنىنى كېسەل ئېغىر ئەھۋالدىن قۇتۇلغاندىن كېيىن، جاراهەتلىرىگە چارە قىلىش ئۇسۇلى بويىچە بىر تەرەپ قىلىش مۇمكىن. تەمرى ھىندى، چىلان، ئەينۇلا ۋە خىيارى شەنبەرلەرنى قايناقسۇغا چىلاپ تەمىنى چىقىرىپ ئىچكۈزۈش لازىم.

(2) رەڭگى ئاق قازا يوللۇقلىرى چاقسا: قوساق ئىستىلىدۇ، چاققان يەر قاتتىق ئاغرىيدۇ، تىترەك باسىدۇ، بەدەنلىرى سوۋۇپ كېتىدۇ.

داۋاسى: چاققان جايغا ھىجامەت قويۇپ زەھەرنى شوراپ ئېلىش. ئىسسىق سۇغا بىرتاز ئۇز قوشۇپ بەدەننى يۇيۇش كېرەك. ئەڭ ياخشىسى كېسەلنى بىر مەزگىل ئىسسىق سۇغا چۈشۈرۈش كېرەك. ئۇنىدىن كېيىن ئۇز بىلەن مۇرمەككىنى ئىسسىق سۇدا ئېرىتىپ بەدەنگە سۈركەش لازىم. سىياداننى تالقان قىلىپ يېمىشكە بېرىش ياكى تەدرياق (189 - 190 - نۇسخىلەرنى) بېرىش لازىم.

زىيانلىق ھاشارەتلەرنى يوقىتىش چارىلىرى

(1) بۇغا مۇڭگۈزىنى يالغۇز ياكى ئۈشكە مايىغى. گۇڭگۈرت، سەكېنەج، مۇقىل، ئانار ياغىچى بىلەن كودى-

دۇرسە يىلان، سېرىق ئىشەك (چايان) قاتارلىق زىيانداشلار قاچىدۇ. ئۇۋىسى ئىسلانسا ئولىدۇ.

(2) ئۇشىدىرىنى سۇزاپ سۈيىدە ئېرىتىپ ئويىگە چاچسا ھەر خىل زىيانداشلار قاچىدۇ، ئۇۋىسىغا توكۇلسە ئولىدۇ.

(3) زەرنىخ، نوشىدىرىنى كالا يېغى بىلەن قوشۇپ كويىدۇرۇلسە پاشا، ھەرە قاچىدۇ (ئولىدۇ).

(4) سېرىق زەرنىخنى سوقۇپ، سۈتتە ياكى سۇدا ئېرىتىپ تەخسىگە ئېلىپ قويىسا چىۋىنىلەر ئۇنىڭغا قونۇپ ئولىدۇ (لېكىن بالىلار، چوڭلار ئىچىۋېلىپ زەھەرلىنىشتىن ساقلىنىش لازىم).

(5) مەدەستان، تومۇر پوقى، مىڭ دىۋانە (بەزۇرۇل-بەنجى)نى باراۋەردىن ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ سۇ بىلەن كۈمۈلەچ قىلىپ چاشقان توشۇڭگىگە قويسا سىرتقا چىقالماي قالىدۇ. خېمىر ۋە مېغىز ئېلىشتۇرۇپ قويۇلسا ئۇنى يەپ چاشقان ئولىدۇ. سەڭگىيانىڭمۇ شۇنداق تەسىرى بار.

(6) ھىڭ بىلەن چۈمۈل ئۇۋىسى ئىسلانسا چۈمۈل قاچىدۇ.

(7) ئەمەنى كويىدۇرۇپ ئىسلاش ياكى قۇرۇتۇپ سوقۇپ ئويىگە چېچىش بىلەن تۇرلۇك زىيانلىق ھاشا-رەتلەر يوقىلىدۇ.

غالىجر ئىت چىشلەش (غالىجر كېسلى)

غالىجر (ساراڭ) ئىت چىشلىگەندە، ئەگەر جىددى تەدبىرلەر كورۇلمىسە، چىشلىگەن ئادەممۇ خۇددى ئىت ئاغرىغا شەك. غالىجر كېسلىگە دۇچار بولىدۇ.

ئالامەتلىرى: ئىت چىشلىگەندىن كېيىن ئوخشاش بولمىغان ۋاقىت ئىچىدە تۈۋەندىكى ئالامەتلەر كورىلىدۇ:

(1) ئەس - ھۇشى جايىدا دەلىللىق ئەيدىسە، قورقۇلۇش ئىچىدە قېلىپ دائىم قورقۇپ يۈرۈش، ئادەم - لەردىن پىراقىلىشىپ يالغۇزلۇقنى خالاش قاتارلىق كۈندەلىك ھەرىكىتىدە غەيرى تەبىئىي ئەھۋاللار يۈز بېرىدۇ.

(2) بەدەنلىرى قىچىشىدۇ، قاتتىق قاشلاش نەتە - جىسىدە يارا پەيدا بولىدۇ.

(3) سۇدىن قورقىدىغان بولۇپ قالىدۇ. سۈنى كورسلا قاتتىق ۋاقىراپ قاچىدۇ، سوغاق تەرلىيدۇ، تارتىشىپ ھۇشىدىن كېتىپ ئولۇپ قالىدۇ. بەزىدە يۇقۇرقىدەك ئەھۋاللار ئېغىرلاشماي ئولۇپ كېتىشى مۇمكىن. بەزىدە بولسا مۇنداق ھاللار ئېغىرلىشىش بىلەن بىللە ئىتتەك قاۋاش، كىشىلەرنى چىشلەش ئەھۋاللىرى يۈز بېرىدۇ، ئاغزىدىن شۈلگەي ئاقىدۇ، باشقىلارغا ھۇجۇم قىلىدۇ. مۇنداق چاغلاردا ساق ئادەملەرنى چىشلەپ سالسا ئۇلارغا غالىجر يۇقتۇرۇپ قويىدۇ. غالىجر ئىت چىشلىگەنلەردە غالىجرلىق ئالامەتلىرى پەيدا بولۇش ۋاقتى ئوخشاش بولمايدۇ. 40 كۈندىن 6 ئاي ۋاقىت ئىچىدە يۈز بېرىشى

مۇمكىن. ئەمما بەزى قەدىمقى تىبابەت ئەسەرلىرىدە 7 يىل ھەتتا 40 يىل بۇرۇن غالجىر ئىت چىشلىگەندە شۇنچە يىلدىن كېيىن غالجىرلىق ئالامىتى يۈز بەرگەنلىكى ھەققىدە خاتىرىلەر بار. خاتىرىلەرگە قارىغاندا ئەس-ھۇشى پۈتۈنلەي جايىدا بولغان بىر كىشى بىر-دېنلا سۈنى كۆرسە تىترەيدىغان ۋە ۋەھشەت باسىدىغان بولۇپ قېلىپ، ئەبۇئەلى ئىبنىسىنانىڭ قېشىغا كەلگەندە، ئۇنىڭغا سۇ بېرىلگەندە سۈنى كۆرۈپ ۋاقىراپ، سۈنى توكۇپ تاشلاپ، غالجىرلىق ئالامەتلىرى يۈز بەرگەن ۋە ئەھۋالى تەدرىجى ئېغىرلىشىپ، ھۇشسىز كېتىپ يېرىم كۈلدىن كېيىن ئولۇپ قالغان. سۈرۈشتۈرگەندە 40 يىل بۇرۇن غالجىر ئىت چىشلىگەن بولۇپ، ئۇ چاغدا تىۋىپ ئۇنىڭغا چىشلىگەن غالجىر ئىتنىڭ جىگىرىنى يىگۈزگەنلىكتىن، 40 يىلغىچە كېسەللىك ئالامىتى يۈز بەرمەي يۈرگەنلىكى مەلۇم بولغان. ئۇندىن باشقا غالىجىر ئىت چىشلىگەن ئادەمدىن ئېشىپ قالغان تاماقنى يەپ غالجىر كېسەلىگە دۇچار بولۇپ قالغانلىقى ھەققىدە تەپسىلى خاتىرىلەر بار.

داۋاسى: غالجىر كېسەلنى داۋالاش قانچە بالدۇر بولسا (روھىن ئالامەتلىرى كۆرۈنۈشتىن ئىلگىرى) شۇنچە ياخشى. شۇنىڭ ئۈچۈن كىشلەرنى ئىت چىشلىگەندە تىۋىپ ئالدى بىلەن چىشلىگەن ئىتنىڭ غالجىر ياكى غالجىر ئەمەسلىكىنى ئېنىقلىشى كېرەك. ئېنىقلاش چارىلىرى تۆۋەندىكىچە:

ئىت غالجىرلاشقانلىق ئالامەتلىرى:

(1) ھىچنەرسە يىمەيدۇ. بىر جايدا تۇرۇپ چوگ لەيدۇ، سۇ ئىچمەيدۇ، سۇنى كۆرسە قاچىمىدۇ، تىترەپ تۇرىدۇ، تىلى دائىم سىرتقا چىقىپ تۇرىدۇ (بۇ تەش-ئاللىقىنىڭ ئالامىتى). بۇ غالجىر ئىتنىڭ دەسلەپكى ئالامەتلىرى بولۇپ، بۇ ھال بارغانسېرى ئېغىرلىشىدۇ.

(2) كۆزلىرى قىزىرىپ ئاغزى - بۇرنىدىن دائىم شۇلگەي ئېقىپ تۇرىدۇ. قۇيرۇغىنى ئىككى پۇتى ئارىلى-غىغا تىقىۋالىدۇ، ماڭغاندا سىرتى (ئۆمۈرتقىسى) كۆتە-رىلىپ دەلدەڭشىپ تۇرماڭلايدۇ. ئالدىغا ئۇچرىغانلا نەرسىگە ئېتىلىدۇ ۋە چىشلەيدۇ. ئاۋازى چىقمايدۇ، ئىككى يانغا قارالمايدۇ ۋە يانغا بۇرۇلماي دائىم ئۇدۇللا ما-گىدۇ، قۇلغى ساڭگىلىغان بولىدۇ، ساق ئىتلار ئۇنىڭدىن قاچىدۇ. چىشلىگەن ئىتنىڭ غالجىر ئىكەنلىكى بىلىنگەندىن كېيىن تۆۋەندىكى چارىلەرنى قىلىش لازىم.

(1) غالجىر ئىت چىشلىگەن جايدىكى جاراھەتنى ئىلاجى بار چوڭايتىپ كۆپرەك قان ۋە زەرداپ چىقىرىپ ۋېتىش كېرەك. ئۇنىڭ ئۈچۈن تىلىپ ھىجامەت قو-يۇش ياخشى ئۇسۇلدۇر. پېشقەدەم تىۋىپلارنىڭ بىردەك كورسەتتىنچە، جاراھەت ئاغزىنى 40 كۈندىن كەم پۇت-كەزمەسلىك لازىم. ئەگەر پۇتۇپ قالاي دېسە تىۋەنكى نۇسخىدىكى مايىنى چېپىپ تۇرسا بولىدۇ.

نۇسخە: زۇفت 3 مىسقال، نوشىدىر 6 مىسقال، تازاب

لانغان ئاق تۈز 6 مىقال، جاۋۇشر 9 مىقال.
تەييارلاش ئۇسۇلى: ئالدى بىلەن جاۋۇشرنى
سىركىدە ئېرىتىپ، قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ
ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

(2) سەۋدا ماددىسىنى بەدەندىن چىقىرىپ تاشلاش
ئۈچۈن مەتبۇخى تەپتىمۇن (20 - نۇسخە)گە ئوخشاش
سەۋدا سۈرگىلىرىنى داۋاملىق بېرىپ تۇرۇش كېرەك.
غالجرىنىڭ زەھىرى بەدەلگە تاراپ كەتكەندىن
كېيىن تەرياقى فارۇق، تەرياقى ئەرەبىيە ۋە تەرياقى
سەرتانلار (189 - 190 - 192 - نۇسخىلار) بېرىلىدۇ.
(3) ئېغىزدىن دورا بېرىش مۇمكىن بولمىغاندا،
ماھۇدانە، جېنتىيانادىن بىر ھەسسىدىن، قۇندۇز قەرىندىن
يېرىم ھەسسە ئېلىپ يۇمشاق سوقۇپ، گۈل يېغى بىلەن
شامچە تەييارلاپ ئارقا يولدىن كىرگۈزۈش لازىم. جېنتىيا-
نا بۇ ھەقتە ئالاھىدە تەسىرگە ئىگە دورا.

(4) باشقا چارىلار ئالامەتلىرىگە قاراپ بەدەننى
ھۆللىنىدۇرۇش خۇسۇسىيەتلىك بولىشى لازىم.
بىر ئامال قىلىپ كېسەلگە كۆرسەتمەي سۇ ئىچكۈزۈش
چارىسىنى قىلىش مەسلىن، ئۇزۇن قۇمۇچ نەيچە ئارقى-
لىق شوراپ ئىچكۈزۈشنى ئويلاپ بېقىش كېرەك. شۇ
يول بىلەن ئىسپۇغۇل لۇئابى، بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇئابى،
بالەنگۈلۇئابىنى بېرىش مۇمكىن.

چىشلەگەن ئىتنىڭ غالجرلىغى بىلەن ئىگەندىن كېيىن،

دەرھال ئۇنى ئولتۇرۇپ جىگىرىنى يىناچىپ قانلىرى بىلەن قوشۇپ غالجىر چىشلىگەن كىشىگە يىگۈزۈلسە غالجىرنىڭ زەھىرى تەسىر قىلالمايلىقى مۇمكىن. ئۇنىڭغا قوشۇمچە تۇۋەندىكى تالقامۇ يېرىلسە بەدەننىڭ زەھىرىگە قارشى تۇرۇش كۈچىنى ئاشۇرىدۇ.

فۇسخە: سەرتان نەھرى (قائىدە بويىچە كويىدۇرۇل كىنى) 5 مىسقال، جېنتىيانا 5 مىسقال، كۈندۈر، پىننە 3 مىسقال، گىلى مەختۇم 1 سەر، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان دورا تەييارلىنىدۇ. كۈنىگە 2 قېتىم 2 مىسقالدىن قاينا قىپ بىلەن يېرىلىدۇ.

قوشۇمچە:

مەدەن دورىلارنى كۈشتە قىلىش ئۇسۇلى ۋە تەشلىتىلىشى

“كۈشتە” پارسچە ئۇلتۇرۇلگەن دىگەن سۆز بولۇپ، ھەرخىل مەدەنلەر مەسىلەن، ئالتۇن، كۈمۈش، مىس، قەلەي، سىمپ، تومۇز، پولات، زەرىنخ، سىر، سەڭگىيالارنى كۈشتەگەرلىك ئۇسۇلى بويىچە يۇقۇرى ھارارەت ۋە ھەرخىل تېز تەسىرلىك ئېرىتمىلار (ئوسۇملۇك ئېرىتمىلىرى) نى تەسىر قىلدۇرۇش ئارقىلىق ئەسلىدىكى شەكلى، يەنى دەلگە زىيانلىق بولغان قىسىملىرىنى ئۆزگەرتىپ بەدەنگە ئۈزلۈشۈپ ئاغرىقلارنى داۋالايدىغان ھالغا يەتكۈزۈلىدۇ. كۈشتە قىلىش جەريانىدا قائىدىلارغا تولۇق دىئالەكت

لەننىسا ياكى ئەمەلىيەت ئوغرا بولسا ئۇلارنى ئىش-
 لەتكەدە ئەكسىچە زەھەرلەپ قويدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن
 كۈشتەگەرلىكتە تەجرىبىسى يوق كىشىلەرنىڭ قىلغان
 كۈشتىنى ئىستىمال قىلماسلىق ياكى كۈشتە قىلدىم
 دەپ ئويلاپ بۇ خىلدىكى دورىلارنى قالايمىقان ئىستىمال
 قىلماسلىق كېرەك. مۇنداق قىلىش مېھىپىلىق كەلتۈرۈپ
 چىقىرىدۇ ياكى ھاياتقا خەۋپ يەتكۈزىدۇ.
 كۈشتە قىلىشتا تېۋەندىكى نۇقتىلارغا دىققەت
 قىلىش لازىم:

(1) ئالدى بىلەن كۈشتە قىلىنغان مەدەنى تازە-
 لاش كېرەك. بۇ تېبابەتتە "ساپ قىلىش" دەپ ئاتىلىدۇ.
 ئوخشاش بولمىغان مەدەنىلەرنى تازىلاشنىڭ ئالاھىدە
 ئۇسۇللىرى بار. مەسىلەن: (1) ئالتۇن، كۈمۈش ۋە
 مىنى ئوتتا راسا قىزىتىپ، ئۇنى كۈنجۈت يېغىدا 7
 قېتىم، كالا (تۇغمىغان ياش غۇناچىن) سۇيىدۇگىدە 7
 قېتىم، ئامىلە، بەلىلە، ھېلىلىلەرنى بازارە مىقداردا ئېلىپ
 قاينىتىلغان سۇدا 7 قېتىم، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قاينى-
 تىلغان سۇدا 7 قېتىم سۇغۇرۇلىدۇ. بەزىلەر ئامىلە،
 بەلىلە، ھېلىلە سۈيى ئوردىغا سىركە تىزايى ئىشلىتىشنى
 ۋە ئاز بولغاندا ھەربىر سۇدا 3 قېتىمدىن سۇغىرىشنى
 كۆرسىتىدۇ.

مىنى ئېرىتىپ سۇمىيىدا 3 قېتىم، قېتىق (دوغ)
 دا 3 قېتىم سۇغىرىپ تازىلاش ئۇسۇلىمۇ بار.

- (2) قوغۇشۇننى ساپ قىلىش يۇقۇرقىدەك ئىشلىتىدۇ.
(3) سىمچىنى قېلىن رەخ (ماتا) غا سېلىپ بىرقانچە قېتىم سىقىپ ئۆتكۈزۈلسە ساپ بولىدۇ.
(4) تومۇر، پولاتنى تۈز ۋە سۇ بىلەن سالايسە قىلىنسا ساپ بولىدۇ.

(2) گىلى ھىكمەت قىلىش — كۈشتە قىلىنىدىغان نەرسىلەرنىڭ كوپچىلىكى گىلى ھىكمەت (ھىكمەت لېيى) كە ئوراپ ئوتقا سېلىنىدۇ. ھىكمەت لېيىنىڭ تەركىبى:
قىزىل گىل (سېغىز) دىن يىتەرلىك مىقداردا ئېلىپ، بىر مەزگىل سۇغا چىلاپ يۇمشىغاندىن كېيىن، تۇخۇم ئېقى، ئۆشكە چۆپۈرى، ئادەم چېچى، كونا مازلارنى با- راۋەردىن قىشۇپ، گىلگە ئارىلاشتۇرۇپ، تازا سوققاندا تەييار بولغان لاي گىلى ھىكمەت بولىدۇ. ئادەتتە كۈشتە ئۇچۇن ساپال (ئوبدان پىشقان) ياكى ئوتقا چىداشلىق شىشە (ئاتىشى شىشە) ئىشلىتىلىدۇ. يىقىلغۇ ئۇچۇن سايدا، قۇملۇقلاردا قۇرۇپ قالغان كالا تېزىگى ئىشلىتىلىدۇ.

(3) كۈشتىلەرنىڭ سۈپىتىنى باھالاش:
كۈشتىلەرنى باھالاشتا، ئاساسەن ئۇلارنىڭ رەڭگىنىڭ ئۆزگەرمەسلىكىگە ۋە بەزىلىرىنىڭ سۇغا چۆكۈش- چۆكمەسلىكىگە قارىلىدۇ.

ئالتۇن كۈشتىسى ياخشەك رەڭگىدەك كۆمۈش، قە- لەي كۈشتىسى ئاق رەڭدەك تومۇر، پولات كۈشتىسى ئىس

رەڭگىدە، مېس كۈشتىسى ئىل رەڭگىدە بولسا تەلەپكە لايىق كۈشتە ھىساپلىنىدۇ.

(4) ئىشلىتىش دائىرىسى:

كۈشتىلەرنىڭ ئىشلىتىلىش دائىرىسى بەك كەڭ. ئومۇمەن تىبابەتتە باشقا ئۇسۇللار بىلەن داۋالىغىلى بولىدىغان كېسەللىكلەرنىڭ ھەممىسىگە ئىشلىتىلىدۇ. ئەمما ئىشلىتىش جەريانىدا پەرھىز ۋە كۈتۈشكە ئالاھىدە ئەھمىيەت بېرىش زورۇر. مۇنداق قىلىش داۋالاش ئۈنۈمىگە ۋە زەھەرلىك تەسىرلەرگە بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك.

ئالتۇننى كۈشتە قىلىش

(1) ئىكەكلەنگەن ساپ ئالتۇن بىر ھەسسە، تازىلانغان سىمپ 2 ھەسسە، ئالدى بىلەن بۇلارنى قوشۇپ سالاھىيە ① قىلىنىپ، ئالتۇن بىلەن سىمپ بىرلىشىپ كەتكەن ھالغا كېلىدۇ. بۇ چاغدا يەنە لىمۇن سۈيىنى تامغۇزۇپ تۇرۇپ، پۈتۈنلەي بىر جىسىم بولغانغا قەدەر سالاھىيە قىلىنىدۇ ۋە بۇنىڭدىن بىر دانە كۇمۇلاچ تەييارلىنىدۇ. كۇمۇلاچتىن 2 باراۋەر ئۆلچەمدە تازىلانغان گۈڭ - كۇرت (ئامىلەسارا) نى لىمۇن سۈيىدە سالاھىيە قىلىپ بۇلماق ھالغا كەلگەندە، يېرىمنى ساپال قاچىغا سېلىپ ئۈستىگە كۇمۇلاچنى قويۇپ، ئۇنىڭ ئۈستىگە قالغان ① سالاھىيە - ھاۋانچىدا سوققانداك ئەمەس، بەلكى ھاۋانچا تېشىنى چوڭىلىتىپ، يەنىچىپ تالقانلاش.

تازىلانغان گۆڭگۈرتنى سېلىپ ئاغزىغا يەلە بىر سايىلىق
قاچىنى دۇم كۆمتۈرۈپ، ئەتراپىنى گىلى ھىكمەت بىلەن
ئوبدان ئوراپ تېگىدىن 30 دانە كالا تېزىگى تىزىپ
ئوت يېقىلىدۇ. ئوت تۈگەپ ساپال قاچا سوۋغاندا قاچى
نى ئېچىپ كۇمۇلاچىنى ئاۋايلاپ ئېلىپ قايتا يۇقۇرقىدەك
ئۇسۇل بىلەن قاچىلاپ، لايغا ئوراپ ئوتتا كۆيدۈرىلىدۇ،
مۇشۇ ئۇسۇل 3 قېتىم تەكرارلانسا ئالتۇن كۈشتىسى
ھاسىل بولىدۇ.

(2) ئۇسۇل ئىكەكلەنگەن ساپ ئالتۇننى يازاۋەر
مىقداردىكى قەلەي بىلەن تومۇر قاچىغا سېلىپ، كومۇر
ئوتىدا قىزىتىلىدۇ. ئۈستىگە تۇز سۈيى قۇيۇلىدۇ. قاچى
ئاپ سۇ تۈگەپ ئالتۇن ۋە قەلەي بىر جىسىم بولۇپ
قالغاندا كۈشتە بولىدۇ. سالاھىيە قىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.
ئىشلىتىلىشى: بەدەننى ساغلاملاشتۇرىدۇ. باشقۇر-
غۇچى ئەزالارنى كۈچلەندۈرىدۇ، بەدەن قۇۋۋەتلىرىنى
ئاشۇرىدۇ. بولۇپمۇ يۈرەك ۋە مىڭىگە قۇۋۋەت بېرىش
ئۇنۋىمى ياخشى.
مىقدارى: يېرىم ئارپا چوڭلىقىدا مەشكە ماي بىر
لىن يېمىشكە بېرىلىدۇ.

كۈمۈشنى كۈشتە قىلىش

(1) ئۇسۇل: ئىكەكلەنگەن كۈمۈش، زەرىنخ باراۋەر
مىقداردا ئېلىنىپ، ئاۋال زەرىنخنى ئىزىپ، لىمون سۈيى
بىلەن بىر سائەتكىچە قايتا-قايتا سالاھىيە قىلىنىدۇ. ئۇن

دىن كېيىن كۈمۈش ۋە زەرىمخنى بوتتا (زەرگەرلەر ئال-
تۇن-كۈمۈش ئېرىتىدىغان ئوتقا چىداملىق قاچا) غا
سېلىپ ئۈستىگە يەنە بىر بوتىنى دۇم كومتۇرۇپ، ئۈستى-
دىن گىلى ھىكمەت بىلەن ئوراپ، 30 دانە قۇرۇق كالا
تىزىكى ئوتتۇرىسىغا قويۇپ ئوت يېقىلىدۇ. تىزەك كويۇپ
سوۋۇغاندىن كېيىن ئېچىلسا كۈمۈش كۈشتىسى تەييار
بولىدۇ.

(2) ئۇسۇل: لازىم مىقداردىكى كۈمۈشنى ئىككە كېلىپ
گۈلاپ بىلەن سالاىە قىلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن توقە-
چاق قىلىپ، قىزىل گۈلنى يانچىپ خېمىردەك ھالغا
كەلتۈرۈپ، مەزكۈر توقچاقنى ئارىسىغا ئېلىپ گىلى ھىك-
مەت بىلەن ئوراپ 20 دانە تىزەك ئارىسىغا قويۇپ
ئوت قالاپ تەييارلىنىدۇ.

(3) ئۇسۇل: نېپىز ياۋاپاق كۈمۈشنى ئىككە پىتى
(ھەببۇلمۇلۇك) يوپۇرمىغىنى سوقۇپ تەييارلانغان خېمىرغا
يۈگەپ، ئۈستىدىن گىلى ھىكمەت بىلەن ئوراپ، 20
دانە تىزەك ئارىسىغا قويۇپ ئوت قالاپ كويۇپ كۈشتە
تەييار بولىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: مىڭە، يۈرەك ۋە جىگىرنى قۇۋۋەت-
لەش، جىسمانىي قابىلىيەتنى ئاشۇرۇش، مەنىنى تۇتۇش
ئۈچۈن ئوزۇننى يالغۇز ياكى باشقا دورىلار بىلەن بىللە
(193-نۇسخە) بېرىلىدۇ.

مىقدارى: يالغۇز بېرىلگەندە يېرىم فۇڭ مىقدارىنى

قايماق ياكى مەشكە ماي بىلەن بېرىلىدۇ. تەسەللىق پەيدا بولسا سۈت ئىچىشكە بۇيرۇلىدۇ.

تومۇر، پولاتنى كۈشتە قىلىش

(1) ئۇسۇل: ئىكەكلەنگەن پولات (ياكى تومۇر)نى يېمەكلىك مىقدارىدا ئېلىپ، چىنە پىيالىگە سېلىپ ئۈستىگە جامەن يوپۇرمىغىنىڭ سۈيىنى پولات چوڭكىدەك دەرىجىدە قۇيۇپ، 7 كۈنگىچە ئاپتاپتا قويۇلىدۇ. كۈن نۇرى كۈچلۈك بولسا 11 كۈن ئاپتاپتا تۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن پولات سۇسۈنرەڭلىك پاقىراق ھالىغا كېلىپ كۈشتە بولىدۇ.

(2) ئۇسۇل: زەنجىۋىلىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكە تىن ئۆتكۈزۈپ، ساپال قاچىغا زەنجىۋىلىنىڭ يېرىمى سېلىنىدۇ. ئۈستىگە 12 مىقال ئىكەكلەنگەن پولاتنى توكۇپ، توپىسىگە زەنجىۋىلىنىڭ قالغان يېرىمىنى سېلىپ، بىر ئاز لىمون سۈيىنى قۇيۇپ ئاپتاپتا قويىلىدۇ. 21 كۈنگىچە داۋاملىق لىمون سۈيى بىلەن ئەمە دەپ تۇرۇلىدۇ. مۇددەت تولىغاندا ھەممىسى بىرىكىدۇ. ئاندىن ئۇنى چويۇن قازانغا سېلىپ، 6 سەر ئاچچىق قېتىق بىلەن سۇس ئوتتا قىزىتىلىدۇ. قوشۇلغان باشقا تەركىبلىرى كۆيۈپ تۈگەپ، پولات قازانمۇ قىزغۇچ رەڭدە كۈشتە بولۇپ چىقىدۇ، سالاھىيە قىلىپ ئىشلىتىدۇ. ئىشلىتىلىشى: بەدەننى قۇۋۋەتلىنىدۇرۇش، قان ئازلىق، مەدى تۇتالىماسلىق، جىگەر، مەدە ئاجىزلىقى قاتارلىق.

تازىلىقلار ئۈچۈن يىلغۇز ئوزى ياكى قۇۋۋەت دورىلىرىغا
(لۇبۇپ، ماددە تىلھاياتلارغا) قوشۇپ بېرىلىدۇ.
مىقدارى: كۈنىگە بىر قېتىم، بىر ئارپا چوڭلىقىدا
ئېلىپ، قايماق بىلەن بېرىلىدۇ.

مىنى كۈشتە قىلىش

1) ئۇسۇل: ياپىلاق مىنى ئوتتا قىزىتىپ كالا
سۇيىدۇڭىدە 9 قېتىم سۇغىرىلىدۇ. بۇ مىنى ئىككە كەلپ
2.5 مىسقال تالغان ئېلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا سىماپتىن
 $\frac{1}{2}$ 6 مىسقال، تازىلانغان گۇڭگۇرتتىن 5 مىسقال ئۆلچەپ،

ئاۋال سىماپ بىلەن مىس سالاھىيە قىلىنىدۇ. ئىككىسى
ئوبدان بىرىكىپ بولغاندىن كېيىن، بوتىنىڭ ئاستىغا
يەنىچىلگەن تازا گۇڭگۇرتنىڭ يېرىمى سېلىنىپ، ئۈستىگە
مىس بىلەن سىماپ بىرىكمىسىنى، ئۇنىڭ ئۈستىگە قالغان
تازا گۇڭگۇرت تالقىنىنى قۇيۇپ، يەنە بىر بوتىنى دۇم
كومتۇرۇپ يېپىلىدۇ. ئەتراپى گىلى ھىكمەت بىلەن چاپ-
لىنىپ، تىزەك ئوتىدا 4 سائەت قىزىتىلىدۇ. ئاندىن
كېيىن 3 مىسقال سىماپنى 3 مىسقال زەرىخ ۋە لىمون
سۇيى بىلەن سالاھىيە قىلىپ بوتىدىن ئېلىنغان چالا كۈش-
تىگە قوشۇپ قايتا گىلى ھىكمەت بىلەن ئوراپ، تىزەك
ئوتىدا 8 سائەت قىزىتىلسا كۈشتە تەييار بولىدۇ.

ئىشلەتمەش: لەقۋا، پالەج، تىتىرەش (رەئىشە)،
مىگە ئاجىزلىق، جىنى ئاجىزلىق، ئەرقۇنىسا، مۇپاسىل،

كوزنىڭ ئۇرلۇك كىيىملىكلىرىگە تىخۋەندىكى ئۇسۇللار تەركىۋىگە قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ ياكى يېرىم ماشىنىدا دارىدىكى مىس كۈشتىسىنى قايقاق بىلەن يىيىشكە بېرىلىدۇ.

(1) ئاقىرقىرغا، زەپەر، قەلەمپۇر ھەربىرى 3 مىس-قالدىن، مىس كۈشتىسى بىر مىسقال، دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ ئوقۇتتەك كومۇلاچ تەييارلاپ، بىر دانىدىن كۈنىگە 2 قېتىم بېرىلىدۇ.

(2) نۇسخە: زەپەر، ئاقىرقىرغا، دارچىن، خولىنجان، قارامەۋسۇل ھەربىرى بىر مىسقالدىن، مىس كۈشتىسى يېرىم مىسقال. يۇقۇرقىدەك ئۇسۇل بىلەن تەييارلاپ 2 دانىدىن 2 قېتىم بېرىلىدۇ.

سىمپىنى كۈشتە قىلىش

تازىلانغان سىمپ، تازىلانغان گۇڭگۇرت باراۋەر مىقداردا، داۋلوشدۇر سىمپنىڭ ئۇلدىن بىر قىسمى بىلەن تەڭ مىقداردا، زەمچە سىمپنىڭ يىگىرىمىدىن بىر قىسمى بىلەن تەڭ مىقداردا، يۇقۇرقىلارنىڭ ھەممىسىنى قوشۇپ 2 كۈن سالاھىيە قىلىنىدۇ. 3-كۈنى سىمپ بىلەن تەڭ مىقداردا مورا قۇرۇمى قوشۇپ، يەنە بىر كۈن سالاھىيە قىلىنىدۇ. بۇلارنى ئۈستى ماتا ۋە گىلى ھىكمەت بىلەن ئورالغان شىشكە سېلىپ، ئاندىن ئۇنى قازانغا قويۇلىدۇ، قازاننىڭ شىشە تۈۋى تۈرىدىغان يېرى توشۇك بولۇشى لازىم. قازان شىشنىڭ دەل ئاغزىغا كەلگىدەك ھەرىجىدە قۇم

بىلەن توشقۇزۇلىدۇ. شىشىنىڭ ئاغزى ئوچۇق بولۇپ قۇمىدىن يۇقۇرى چىقىپ تۇرۇشى كېرەك. ئاندىن كېيىن قازان ئاستىغا ئوت قالىنىدۇ. بىرىنچى كۈنى ئاستا قالاپ، 2-3- كۈنلىرى ئوت تەدرىجى كۈچەيتىلىدۇ. جەمئى 3 كۈن ئوت قالانسا شىشىدىكى سىماپ كۈشتە بولىدۇ. شىشىنى سۇندۇرۇپ، كۈشتىنى ئېلىپ، پاكىزە شىشىدە قۇرۇق ۋە قاراغۇ جايدا ساقلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: تۈرلۈك باقايماق تېرە. جاراھەتلىرىگە يەل يارا (ئابىلە فەرەڭگى)، ناسۇر قاتارلىق جاراھەتلىرىگە مەلەملەر تەركىبىدە سىرتتىن ياغلاشقا بېرىلىدۇ ياكى ئوزۇنى يالغۇز $\frac{1}{3}$ لى $(\frac{1}{3}$ فۇڭ) مىقداردا ئېلىپ،

قايماق بىلەن كۈنىگە بىر قېتىم يېمىشكە بېرىلىدۇ (تېرە تاناسىل ئىزا جاراھەتلىرىگە بېرىلىدۇ).

دەققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشلار: سىماپ كۈشتە سىنى يېمىشكە بېرىپ، يەل يارا (سېفىلىس) نى داۋالە. ھاندا ئادەتتە 2-3 كۈن بىر داۋالاش ۋاقتى بولۇپ ھېساپلىنىدۇ. بۇ چاغدا ئاچچىق - چۈچۈك نەرسىلەر يېيىش، جىنى ئالاق قىلىش مەنى قىلىنىدۇ. دورىنى يېگەندە چىشقا تەككۈزۈپ قويماسلىق لازىم. زەھەرلىنىش ئالامەت - لىرى كوزۇلسە دەرھال دورىنى توختىتىپ چارە كۆرۈش كېرەك ("سىماپ بىلەن زەھەرلىنىش" گە قاراڭ).

سىماپنى كۈشتە قىلىش ئۇسۇللىرى كۆپ بولۇپ،

قەللىنىلغان ئۇسۇلغا قاراپ سىماپ ھەرخىل رەڭدە كۈشتە بولىدۇ. مەسىلەن، قارا رەڭدە چىقىدۇ. بۇ 1 - دەرىجى - دىكى كۈشتە ھىساپلىنىدۇ. 2 - دەرىجىدىكى قىزىل، 3 - دەرىجىدىكى ئاق ۋە سېرىق بولىدۇ. بىر چىڭ ئېغىرلىقتىكى قىزىلچىنىڭ ئىچىنى ئويۇپ، ئىچىگە 3 مىسقال سىماپنى سېلىپ، ئويۇپ تاشلىغان پارچىسى بىلەن ئوبدان بېكىتىپ، ئۈستىدىن گىلى ھىكمەت قىلىپ قۇرۇتۇپ 30 چىڭ تىزەك ئوتتۇرىسىدا قويۇپ ئوت يېقىپ كۆيدۈرۈلسە، سىماپ ئاق رەڭدە كۈشتە بولىدۇ.

ياقۇتنى كۈشتە قىلىش

سۈزۈك، قىزىل رەڭلىك ۋە داغسىز ياقۇتنى ئون باراۋەر پەيقارا لۇئابى بىلەن بىللە بىر ساپال قاچىغا سېلىپ، ئاغزىنى گىلى ھىكمەت بىلەن چاپلاپ 30 چىڭ تىزەك ئوتىدا قىزىتىلىدۇ. ئادەتتە بىرىنچى ئوت بىلەنلا كۈشتە بولىدۇ. ئەگەر بىر ئاز چالا قالغان بولسا يۇقۇر - قىغا ئوخشاش يەنە بىر قېتىم ئوت قالاش كېرەك.

ئىشلىتىلىشى: يۈرەك ۋە مىڭىنى قۇۋۋەتلەندۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ. يۈرەككە تەسىر قىلغۇچى مۇھىم مۇرەككەپ دورىلارنىڭ ئاساسىي تەركىبى قىسمى بولىدۇ. ئوزۇننى يالغۇز ئىشلىتىشكە قارىغاندا، باشقا دورىلار بىلەن قوشۇپ (مۇپەررىمى ياقۇتى) تەييارلاپ (9 - 84 - 85 - نۇسخىلەر) بېرىلگىنى ياخشى.

مەرۋايىت، مارجان، سەدەپلەرنى كۈشتە قىلىش

يۇقۇرقىلاردىن باشقا، مەرۋايىت، مارجان، سەدەپ-
لەرنى كۈشتە قىلىش ئۇسۇلى ياقۇتنى كۈشتە قىلىش
بىلەن ئوخشاش. ئىشلىتىش دائىرىسىمۇ شۇنداق. بۇلار
ناھايىتى ئاز ئەھۋاللاردا يالغۇز ئىشلىتىلىدۇ. كۆپىنچە
مىڭە، يۈرەك، جىگەر ۋە بورەكلەرنى قۇۋۋەتلەندۈرىدىغان
مەجۇنلەر (داۋائىلىشىكى، نوشىدارى ۋە مۇپەررىھلەر)
تەركىبىدە بېرىلىدۇ. يۇقۇرقى ئۇسۇل بىلەن كۈشتە قى-
لىنغانى، يالغۇز ھالدا سوزنەك كېنىلى، مەنى تۇتالماس-
لىق، مەئدە، يۈرەك، مىڭە ئاجىزلىقلىرى ئۈچۈن بىر فۇڭ
كۈشتىنى قايماق ياكى بىيە مۇراپىياسى بىلەن كۈنگە
بىر قېتىمدىن بېرىلىدۇ.

ئادەتتە باشقا دورىلار بىلەن مەجۇنلەر تەركىبىدە
بېرىلگەندە بۇلارنى (شاخ ماجان، بىخ ماجان،
مەرۋايىت ۋە سەدەپلەرنى) تومۇر قاچىغا ئېلىپ، كۈمۈر
ئوتىغا قويۇپ، رەڭگى ئۈزگەرگىچە قىزىتىلىپلا كۈپايە
قىلىدۇ. كېيىن گۈلاپ بىلەن سالايە قىلىنىپ مەجۇنلەرگە
قوشۇلىدۇ. بۇ تۈردىكى مەجۇنلەرنى تەييارلاپ، چىنە
قاچىلارغا ئېلىپ، موتىدىل ئىسسىقلىقتىكى جايدا 3-6
ئاي قويۇپ ئاندىن كېيىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

مەرۋايىت كۈشتىسى تۈرلۈك كۈز كېسەللىرىدە
(كۈزگە ئاق چۈشكەندە، سۇ چۈشكەندە) سۈرمىلەر تەر-
كىبىدە بېرىلىشى مۇمكىن.

دورا نۇسخىلىرى

(دورلار ھەرقايسى كېسەللەرنى داۋالاشتا كورسىتىل-
گەنلىكى ئۈچۈن ئارىلاش يېزىلدى)

1 - نۇسخە: ئىترىپىل كەبىرى

تەركىبى: كابۇل ھىلىلىسى، بەلىلە پوستى ھەرى
بىرى 6 مىسقالدىن. قارا ھىلىلە، ئامىلە پوستى ھەرىبىرى
6 مىسقالدىن. قارىمۇچ، پىلىپىل 6 مىسقالدىن. شاقاقۇل،
زەنجىۋىل، سېرىق تۇدىرى، قىزىل تۇدىرى، ئىرمىدۇن
ئۇرۇغى (لسانى ئەسپۇر)، ئاق بەھمەن، قىزىل بەھمەن،
ناۋات، ھەببى قۇل-قۇل، كۈنجۇت، ئاق كۆكنار ھەرىبىرى
2 مىسقالدىن. ھەسەل پۈتۈن دورا ئىپتىخارلىغىنىڭ ئۈچ
باراۋەرىدە. بادام يېغى 16 مىسقال (كۈنجۇت يېغى بول-
سىمۇ بولىدۇ).

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، بادام يېغى بىلەن ياغلاپ، ھەسەلنى بىر ئاز
ئېرىتىپ ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ. 3 ئايىدىن
كېيىن ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

يېيىش مىقدارى: 1 - 2 مىسقالدىن كۆلىگە 1 -

2 قېتىم.

تەسكەرتىش: ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەر ياز
كۈنلىرى ئىستىمال قىلماستىن كېرەك ياكى ئىسكەنجە-
ۋىل بىلەن بېرىش لازىم.

2 - نۇسخە: شەرۋىتى بىنەپشە I

تەركىۋى: ئىلۇفەر، قىزىل گۈل، كاسىن ئۇرۇغى،
شاتەرە، شوخلا، ھەمشىۋا ھەربىرى ئىككى يېرىم مىسقال-
دىن. گازىۋان ئەرەقى 7 مىسقال، چىلان 7 دانە، سەر-
پىستان 9 دانە، بىيە ئۇرۇغى بىر مىسقال. قارا سونا
ئۇرۇغى بىر مىسقال، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى بىر
مىسقال، تەرەنجىۋىل 12 مىسقال، گۈلچەن 12 مىسقال.
تەييارلاش: گۈلچەن بىلەن تەرەنجىۋىلنى ئايرىم قاچى-
غا، باشقا دورىلارنى ئايرىم قاچىغا سېلىپ، بىر چىنە سۇغا
2 سائەت چىلاپ قويۇلىدۇ، كېيىن ئۇستىگە 2 چوڭ چىنە سۇ
قۇيۇپ، تەمى چىققىچە قاينىتىپ، ئۇستىگە 10 مىسقال گۈل
بىنەپشىنى سېلىپ، بىردەمدىن كېيىن سۇزۇلسە تەييار بولىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: 10 مىسقالدىن كۈنىگە 3
قېتىم.

3 - نۇسخە: جەۋارىش جالىنۇس

تەركىۋى: سۇمبۇل، قەلەمپۇر، قېلىن دارچىن،
دارچىن، قاقىلە، خولىنجان، زەنجىۋىل، زەپەر، ئاققۇچ،

پىلىپ، دەريا قۇستى، سەئىدى ھىندى، ئۇدى بىلىن،
ھەبىۋىلئاس، ئاسارۇن، قەسبۇزەرىرە ھەربىرى 2 مىسقال -
دىن، مەستىكى 10 مىسقال، شېكەر 44 مىسقال،
ھەسەل (كۆپىگىنى ئالغان) 44 مىسقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: زەپەردىن باشقا دورىلارنى
يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. شېكەرنى قىيام
قىلىپ ھەسەلگە قوشۇپ، سوقۇلغان زەپەرنى ئۇنىڭغا
قوشۇلىدۇ. ئالدىن كېيىن سوقۇپ تەييارلانغان دورىنى
ئۈستىگە سېلىپ، ياخشى ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. 10 كۈندىن
كېيىن ئىستىمال قىلىشقا بولىدۇ.
يېمىش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنگە بىر قېتىم.

4 - نۇسخە: ھەببى سەبە

تەركىبى: سەبە 6 مىسقال، سېرىق ھېلىلە پوستى
3 مىسقال، قىزىل گۈل، رۇمبىدىيان $1\frac{1}{2}$ مىسقال،
كەسرا 2 مىسقال.

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئازراق قايناقسۇ بىلەن يۇغۇرۇپ
ھەب (كومۇلاج) قىلىپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.
يېمىش مىقدارى: 3 - 5 دانە ياكى 7 دانىدىن
(تېۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە) ھەر كۈنى ئاخشامدا
ئىچىلىدۇ.

5 - نۇسخە: ئىترىپىل سەغىر

تەركىبى: سېرىق ھېلىلە، كاپىل ھېلىلىسى،
بەلىلە پوستىلىرى، ئۇرۇغدىن ئايرىلغان ئامىلە 10
مىسقالدىن

تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى سىرقۇپ، ئەل-
گەكتىن ئوتكۇزۇپ، يېتەرلىك مىقداردا ھەسەل بىلەن
يۇغۇرۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن 2 مىسقالغىچە
ياكى تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىستىمال قىلىنىدۇ.

6 - نۇسخە: ئىترىپىل كەشىمىز

تەركىبى: سېرىق ھېلىلە، كاپىل ھېلىلىسىنىڭ
پوستى، ئامىلە، يۇمىلاقسۇت ئۇرۇغى ھەربىرى بىر سەردىن.
تەييارلاش ئۇسۇلى: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ،
ئەلگەكتىن ئوتكۇزۇپ 5 مىسقال بادام يېغى بىلەن
ياغلاپ، دورا ئېغىرلىغىنىڭ 3 باراۋىرىدە ھەسەل بىلەن
يۇغۇرۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن $2\frac{1}{2}$
مىسقالغىچە.

7 - نۇسخە: ھەبىي ئايارەج

تەركىبى: ئايارەج پەيقارا ① تۇرىۇتە غارىقۇن
ھەر بىرى بىر سەردىن، كابىل ھېلىلىسى، سېرىق ھېلىلى،
رۇمبېدىيان $3\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، ھىندى تۇزى (ئەمەكى
ھىندى)، سوقمۇلىيا ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، بادام
يېغى $1\frac{1}{2}$ مىسقال، بېدىيان ئەرەقى 6 مىسقال.

تاييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، بېدىيان ئەرەقى بىلەن ئايارەجنى ئېرىتىپ،
ئۈستىگە بادام يېغى ۋە تالقان دورىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ
خېمىر قىلىپ ئوقۇت چوڭلۇغىدا كومۇلاچ تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: تىۋىپنىڭ كورسەتمىسىگە ئاساسەن،
3 - 7 - 11 دانىدىن ھەركۈن كەچقۇرۇن بىخەرقە -
تىم قايناقسۇ بىلەن يېمىشكە بېرىلىدۇ.

8 - نۇسخە: نۇشدارى لۇئۇۋى (مەرۋايىتلىق نۇشدارى)

تەركىبى: لاچىن دانە، زەرنەپ، دارچىن، ئايلىشى
(زورەنbad) سۇمبۇل، جۇيۇز، بەسباسە، قەلەمپۇر، دۆرۈنەج
③ ئايارەج پەيقارا 16 - نۇسخىغا قارالغۇ.

ئەقرەبى، يۇيۇلغان گىلى ئەرمنى، گىلى مەختۇم، مەستىكى،
زەپەر، كۈمۈش ۋە رەق، ئۇرۇغسىز زىرخ، ئىپار، تاباشىر
ھەربىرى بىر مىسقالدىن، قىزىل گۈل، سەدى كۇفى، گۈلاپقا
سۈرۈلگەن ئاق سەندەل، ئاقلانغان سېمىز ئوت ئۇرۇغى
(تۇخىمى خىرقە) ھەر بىرى بىر سەردىن، تېشىلىمىگەن

مەرۋايىت $\frac{1}{2}$ مىسقال، ساپ ئامىلە 9 سەر، قىزىل
گۈل گۈلابى، بىيە سۈيى، يازلىق ئالما سۈيى، تاتلىق
ئامۇت سۈيى، بىدىمىشكى گۈلابى، چۇكا ئاق ئاۋات،
ھەسەل، ئاق قەن ھەربىرى 12 سەردىن.

تەييارلاش: ئاۋال ئامىلە بىر كېچە سۈتكە چىلە -
ئىدۇ. ئەتىسى سۈزۈك سۇ بىلەن يۇيۇپ تازىلاپ 2
جىڭ سۇ قۇيۇپ تاكى سۈيى تۈگەپ ئامىلە قالغىچە
قاينىتىلىدۇ. ئاندىن كېيىن سىم ئەلگەكتىن ئوت -
كۈزۈپ، ئۈستىگە مۇبلەر سۈيى، ئاۋات، قەن، ھە -
سەللەرنى سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ. قالغان دورىلارنى
يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، قىيام سوۋىغاندىن
كېيىن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ، 40 كۈنگىچە
قاچىدا ساقلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: ھەركۈن ئەتىگەن كەچتە تاماق -

تىن كېيىن 2 - 3 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

9 - نۇسخە: مەجۇنى مۇپەررىپى ياقۇتى I

تەركىبى: تېشىلىمىگەن مەرۋايت، گازىۋان، بىخ مارجان، قۇرۇق يۇمىقاسۇت ئۇرۇغى، ئاق بەھمەن، قىزىل گۈل، كەھربا، تۇرۇلجى پوستى، ئاق پىلە (يىپەك غوزىسى)، سېمىز ئوت ئۇرۇغى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، كاپۇر بىر مىسقال، قىزىل ياقۇت 2 مىسقال.

تەييارلاش: ياقۇت كۈشتە قىلىنىدۇ. بىخ مارجان بىلەن مەرۋايتلارنى تۇمۇر قاچىغا سېلىپ چوغ ئۈستىگە قويۇپ كويىدۇرىلىدۇ ۋە سالاھىيە قىلىنىدۇ. قاتقان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، يۇقۇرقىلار بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، 2 ياكى 3 ھەسسە سېرىق ھېلىلە مۇرايىياسىنىڭ شىرىسى بىلەن مەجۇن قىلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە ئىككى قېتىم ھەر قېتىمدا 2 مىسقالدىن.

10 - نۇسخە: زۇفا شەرۋىتى I

تەركىبى: چىلان 30 دانە، سەرپىستان 50 دانە، پىشقان ئەنجۈر 20 دانە، گۈل بىنەپشە 4 مىسقال، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، ھەمىشۋا ئۇرۇغى ھەربىرى 5 مىسقال.

① ياقۇت، مەرۋايت، ماچان ئالدى بىلەن كۈشتە قىلىنىدۇ ياكى كويىدۇرۇلىدۇ (كۈشۈتلەرگە قارالغۇ).

قالدىن. پىرسىياۋشان 7 مىسقال. ئاقلانغان چۈچۈكبۇيا
يىلتىزى زۇفا ھەربىرى 8 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلانى چالاسۇقۇپ، 8 سائەت 3
چوڭ چىشە سۇغا چىلاپ قويغاندىن كېيىن سۇنىڭ يېرىد-
مى قالغىدەك قاينىتىپ سۇزۇپ، تېرىپىنى سىقىپ سۇ-
يىگە 18 سەر قەن سېلىپ قايتا قىيام بولغىدەك قاي-
نىتىپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: 2-3 چاي قوشۇغىدىن بارا-
ۋەر مىقداردا قايناقتۇ بىلەن (ئەگەر قىيام بەك قويۇق
بولسا) 3 قېتىم ئىچىشكە بېرىلىدۇ. قىيام قويۇق بول-
مىسا قايناقتۇ قوشماسلىق كېرەك.

11 - نۇسخە: ھەببى ئىستەمىخىقۇن

تەركىبى: ئايارەج پەيقارا، ھەشقىپچەك ئۇرۇغى
(ھەببۇلىل) بىر سەردىن، سەبىرە بىر سەر، سېرىق ھە-
لىلە پوستى، ئەپتىمەن، بىستىپايەج، سۇقموئىيا يىرىم
سەردىن، شەھى ھەنزىل ئۈچ مىسقال، سانا، مۇقىل بىر
سەردىن.

تەييارلاش: ئايارەجدىن باشقا دورىلارنى سوقۇپ،
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئايارەجنى بىر ئاز سۇ بىلەن
ئېرىتىپ، دورىلارغا قوشۇپ خېمىردەك يۇغۇرۇپ كومۇلاچ
قىلىنىدۇ.

يېيىش مىقدارى: 2 - 3 مىسقالدىن كۈنگە بىر قېتىم يېيىشكە بېرىلىدۇ.

12 - نۇسخە: ھوقنە (كلىزما) دورىسى

تەركىبى: بىخ كەبىر، چىڭسەي يىلتىزى (بىخ كەرەپشى)، بېدىيان يىلتىزى، پودىنە، قەنتە رېون، ئىز-خىر يىلتىزى ھەربىرى $3\frac{1}{2}$ مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى بىرچىڭچە سۇدا بىر ئاز قاينىتىپ، سۇزۇپ، بۇنىڭ ئۈستىگە زاراڭزا مېغىزى، مۇرى مەككى، قارا شىكەرلەردىن 2 مىسقالدىن ئېلىپ ئۇلارنى ياخشى ئېرىتىپ، ئارىلاشتۇرۇپ ھوقنە قىلىنىدۇ.

13 - نۇسخە: ماتىل ئۇسۇل

تەركىبى: چىڭسەي يىلتىزى، بېدىيان يىلتىزى 1 سەردىن، ئىزخىر 5 مىسقال، بىخ كەبىر 7 مىسقال، ئارپا بېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى، رۇمبېدىيان، قەنتە رېون، ئاقىرقەرھە، زەنجىۋىل ھەربىرى 3 مىسقالدىن، قۇست، ئۇزۇن زىراۋەند 4 مىسقالدىن، سىيادان 2 مىسقالدىن، قەردەمنا، سۇزاپ ئۇرۇغى، شەترەنجى ھىندى 5 مىسقالدىن، قۇندۇز قەرى 2 مىسقال.

تەييارلاش: ئۇرۇق دورىلار يۇمشاق، يىلتىز دورى-
لار چالا سوقۇلىدۇ. 7 جىڭ سۇدا قاينىتىپ يېرىمى
قالغاندا سوزۇپ تەييارلىنىدۇ. بۇنىڭ ئۈستىگە ئىنەك
پىتى (بىدەنجىر) يېغى، ئايارەج پەيقارا 3 سەر قوشۇلىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: ھەركۈنى 12 مىسقال.

14 - نۇسخە: ھەبىي ئەپتىمۇن

تەركىۋى: ئەپتىمۇن، بىستىپايەج 1 مىسقالدىن،
قارا خەربەق، ھىندى ئۆزى 2 مىسقال، ئۇستۇخۇددۇس
 $2\frac{1}{2}$ فۇڭ، ئايارەج پەيقارا، غارىقۇن 5 مىسقالدىن.

تەييارلاش: ئايارەج ۋە غارىقۇندىن باشقا دورى-
لارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. غارىقۇن
سىم ئەلگەككە سۈركەپ ئۆتكۈزۈلۈپ، دورىلارغا قوشۇپ
بېدىيان سۈيى بىلەن خەمىردەك يۇغۇرۇپ كۇمۇلاچ قىلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: 3 مىسقالدىن ھەر كۈنى ئاخ-
شامدا بىر قېتىم بېرىلىدۇ.

15 - نۇسخە: شەرۋىتى پەۋاكە (مىۋىلەر

شەرۋىتى)

تەركىۋى: ئالما سۈيى، ئاچچىق ئانار سۈيى، بىيە
سۈيى، بۇلار ھەر بىرى 4 سەردىن، گىلاس سۈيى، تە-

مىرى ھىندى، زىرىخ، لىمون سۇيى، ھەربىرى 8 مىسقالدىن
دىن. گۈل بىنەپشە، نىلۇپەر، يۇمىلاقسۇت 4 مىسقالدىن
ئاقسەندەل، گازىۋان، ئالما چىچىكى، بىدىمىشكى
 $2\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، تەررە (ئەگرى

خاڭكا) ئۇرۇغى ھەربىرى $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، چىلان 55
دانە، تەرەنجىۋىل 2 سەر. سېرىق ھېلىلە پوستى
 $1\frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: مۈە سۇلىرى، تەمىرى ھىندى، تە-
رەنجىۋىل ۋە سېرىق ھېلىلىدىن باشقىلىرى ئەرەق چە-
قىرىش ئۇسۇلى بىلەن ئەرەق تارتىلىدۇ. تارتىلغان
ئەرەق ئۈستىگە مۈە سۇلىرى ۋە ئېرىتىلگەن تەمىرى ھى-
ندى قوشۇلىدۇ. سېرىق ھېلىلە يۇمشاق سوقۇپ ئارىلاش-
تۇرۇلىدۇ. تەرەنجىۋىل توپا-چاڭلاردىن تازىلىنىپ
ئۈستىگە قويۇپ قىيام قىلىنىدۇ.
ئىچىش ھەمىيارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا
5 مىسقالدىن بىرسەرگە قەدەر ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

16 - نۇسخە: ئايارەج پەيقارا

تەركىبى: سۈمبۇل، دارچىن، سەلىخە، ھەبىي بىلە-
سان، ئۇدى بىلىسان، مەستىكى رۇمى، ئاسارۇن، زەپەر.

ھەر بىرى 3 مىسقالدىن. سەپرە 6 مىسقال، ھەسەل 3 ھەسسە.

تەييارلاش: زەپەردىن باشقا دورىلارنى سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. زەپەرنى ئايرىم سوقۇپ بىرئاز قىزىتىلغان ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ ئۈستىگە قالغان دو- رىنى قۇيۇپ خېمىردەك يۇغۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. 40 كۈندىن كېيىن ئىشلىتىلىدۇ.

يېمەش مىقدارى: 3 مىسقالدىن ھەركۈنى ئاخ- شامدا بىر قېتىم بېرىلىدۇ.

17 - نۇسخە: ھەببى قوقىيا

تەركىبى: سەپرە، ئەپسەننىن، مەستىكى، غارىقۇن ھەر بىرى تەڭ مىقداردىن، شەھى ھەنزەل، سوقمۇنىيا يېرىم ھەسسىدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، چىڭسەي ئۇرۇغىنىڭ سۈيى بىلەن خېمىر قە- لىپ كۈمۈلاچ تەييارلىنىدۇ. غارىقۇلنى سوقماي، سىم ئەلگەككە سۈرۈپ ئۆتكۈزۈش كېرەك.

يېمەش مىقدارى: بىرمىسقالدىن كۈنىگە بىر قې- تىم (ئاخشامدا) بېرىلىدۇ.

18 - نۇسخە: مەجۇنى قەلەمىيە (مەجۇنى مادە تولھايات)

تەركىبى: پىلىپ، قارىمۇچ، دارچىن، ئۇرۇغىدىن
ئايىرىلغان ئامىلە، بەلىلە پوستى، شەترەنچى ھىندى، زى-
راۋەندى مۇدەھرىج، خۇسىيەتۇسۇئەلەب، قارىغاي مۇسى
(چەلغۇزە) مېغىزى، بابۇنە يىلتىزى، ئارچىل ھەربىرى
بىرسەردىن. بابۇنە ئۇرۇغى بەش مىقال، ئۇرۇغىز قۇرۇق
ئۇزۇم ئۈچ سەر، شاقاقۇل بىرسەر. ھەسەل پۇتۇن دو-
رىلارنىڭ 2 باراۋىرىدە.

تەييارلاش: مېغىز ۋە ئۇزۇم ئايرىم سۇقىلىدۇ.
قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئوتكۇزۇپ
ئاۋال مېغىزلار ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇلۇپ، ئاندىن كېيىن
قالغان دورىلارنى سېلىپ خېمىردەك يۇغۇرۇپ مەجۇن قىلىدۇ.
ئىندۇ چىنە قاچىدا 40 كۈن قويۇپ ئىستىمال قىلىنىدۇ.
يىمىش مىقدارى: 2 - 3 مىقالغا قەدەر چاي
بىلەن كۈنىگە بىر قېتىم تاماقتىن كېيىن ئىستىمال
قىلىنىدۇ.

19 - نۇسخە: مەجۇنى نۇجاھ

تەركىبى: كاجىل ھېلىلىسى، بەلىلە، ئامىلە پوستى
ھەربىرى بىر سەردىن، قارا ھېلىلە بىر سەر. تۇرىبۇت.

بىستىپايەج، ئەپتىمۇن، ئۇستۇخۇددۇس يېرىم سەردىن، ھە-
سەل 2 ھەسسە.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلنى ئېرىتىپ، دورىلارنى ئارىلاشتۇ-
رۇپ خېمىردەك ھەجۈن تەييارلىنىدۇ. چىنە قاچىلا، دا-
ساقلىنىپ 40 كۈندىن كېيىن ئىستىمال قىلىشقا بولىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 1-2 مىسقالدىن 1-2 قې-
تىم تاماقتىن كېيىن ئىستىمال قىلىنىدۇ. تەييارلانغان
دورنى كۈندە بىر قېتىم قۇچۇپ تۇرۇش كېرەك.

دىققەت: ھەسەلنى ئوت ئۈستىگە قويۇپ ئېرىتىش-
كە بولمايدۇ. ھەسەلنى قاچىغا ئېلىپ، سۇ قۇيۇلغان
قاچىدا قويۇپ قىزىتىلسا، سۇ قاينىغاندا ھەسەل ئېرىپ،
كوۋۇكلىرى يۇقۇرى ئورلىيدۇ.

20 - نۇسخە: مەتبۇخى ئەپتىمۇن (ئەپتىمۇن

قايناتمىسى) I

تەركىبى: ئەپتىمۇن، كابىل ھېلىلىسى، ئۇستۇخۇد-
دۇس، ھەر بىرى بىرسەردىن. شاتەرە، بىستىپايەج،
سانا ھەرىرى 5 مىسقالدىن، غارىقۇن بىرمىسقال، سەپ-
رە ئىككى مىسقال.

تەييارلاش: ئەپتىمۇن (سېرىق يۈگەي)دىن باشقا دو-
رىلارنى سوقۇپ، 6 جىڭ سۇ قۇيۇپ يېرىمى قالغىچە قاينىتىدۇ.

لىنىدۇ. ئەپتىمۇنى بىر خالتىغا سېلىپ، ئاغزىنى بېكىتىپ قازانغا تاشلاپ قويۇش لازىم. دورىلار داكا بىلەن سۇزۇپ، سىقىپ تەييارلىنىدۇ. سۇزۇلگەن دورا ئۈستىگە سەپرە ۋە غارىقۇنى (سىم ئەلگەكتىن ئوتكۇزۇلگەن) سېلىپ ئىستىمال قىلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: بىر ئاز شىكەر سېلىپ ھەمە - سىنى بىراقلا ئىچىدۇ.

21 - نۇسخە: نۇشدارى ساددە (ئاددى نۇشدارى)

تەركىبى: سەندى كوفى 5 مىسقال، قىزىل گۈل 6 مىسقال، قەلەمپۇر، مەستىكى، ئاسارۇن، سۇمبۇل 3 مىسقالدىن، زەرنەپ، كىچىك قاقىلە، چوڭ قاقىلە، بەسباسە، جويۇز، گۈل دارچىن، زەپەر 2 مىسقالدىن. ئامىلە 9 سەر، قەن 2 سەر، ھەسەل 9 سەر. تەييارلاش ئۇسۇلى: 8 - نۇسخە بىلەن ئوخشاش، يىمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم 3 مىسقال - دىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

22 - نۇسخە: داۋائىل مىشكى شېرىن (ھار - ئىسقى)

ئايلىشى: دۇرۇنەچ ئەقرەبى، تېشىلىمگەن مەرۋا - پىت، كەھرېۋا، مارجان (كويىدۇرۇلگەن) ھەربىرى بىرسەر -

دىن، قىزىلغان پىلە، ئاق بەھىمىن، قىزىل بەھىمىن، سۇمبۇل، قاقىلە، سازەج ھىندى، قەلەمپۇر ھەر بىرى بەش مىسقالدىن، ئۇشە، زەنجىۋىل، پىلىپىل ھەر بىرى تۆت مىسقالدىن، ئىپار بىر مىسقال. ھەسەل پۈتۈن دورا مىقدارىدىن 2 ھەسسە ئارتۇق.

تەييارلاش ئۇسۇلى: (1) پىلە غوزىنى قىزىپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ، (2) مەرۋايىتىنى گۈلاپ بىلەن ئۆپىدەك سوقىلىدۇ. (3) ئىپارنى ئازراق قىن بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ سوقىلىدۇ. (4) قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقاندەك قىلىنىدۇ. (5) ھەسەلنى ئېرىتىپ، ئۈستىگە مەرۋايىت، ئىپارنى سېلىپ ياخشى ئارىلاشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن قالغان دورىلارنى سېلىپ، مەجۇن تەييارلاپ چىنە قاچىدا 40 كۈن قويۇپ تىندۈرۈلغاندىن كېيىن ئىشلىتىلىدۇ.

يېيىش مىقدارى: كۈنىگە 1 — $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن

ئىستىمال قىلىش كېرەك.

23 - نۇسخە: خەمىرى ئىفۇرىش

تەركىبى: ئۇدى ھىندى، ئاق سەندەل كېپىكى ھەر بىرى بىر يېرىم مىسقالدىن، سۇمبۇل، پىستىنىك

① بۇ مىڭ ۋە يۈرەكنىڭ ھەر خىل ئاجىزلىقلىرى ئۈچۈن مۇھىم دورا نۇسخىلىرىدىن بىرى.

ئاشقى پوستى، پىشقان جۈيزە شوپىكى، مەستىكى، قەلەمپۇر،
لاچىندانە، سازەج ھىندى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، تېشى-
مىگەن مەرۋايىت، كەھرىۋا 3 مىسقالدىن، قىزىل ياقۇت

$\frac{1}{2}$ 1 مىسقال، شاخ مارجان، بىخ مارجان ھەر بىرى 3 مىس-

قالدىن، زەپەر 3 مىسقال، ئىپار، ئەنپەر $\frac{1}{2}$ 1 مىسقالدىن، پىلە

غوزىسى (قاينىتىلمىغىنى) 12 مىسقال، گازىۋان ئەرەقى،
بېدىمىشك ئەرەقى، قىزىل گۈل ئەرەقى (گۈلاپ)، ئالما
سۈيى، ئانار سۈيى ھەر بىرى 42 مىسقالدىن، پار سۈيى
24 سەر، قەن 12 سەر، ھەسەل 6 سەر، ئالتۇن ۋەرەق،
كۈمۈش ۋەرەق 40 دانىدىن.

تەييارلاش: ئاۋال پىلىنى ئەرەق ۋە سۇدا 3 كۈن
چىلاپ قويغاندىن كېيىن يېرىمى قالغىدەك قاينىتىپ،
ماتادىن ئۆتكۈزۈپ، تازا سىقىپ، سۈيىگە قەن ۋە ئالما-
ئادار سۇلىرىنى سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ. مەرۋايىت، ياقۇت،
مارجانلارنى كويدۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، كەھرىۋا بىلەن
قوشۇپ سالايە قىلىنىدۇ. قالغان دورىلارنى يۇمشاق سو-
قۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ. زەپەر، ئىپار، ئەنپەرلەرنى
سالايە قىلىپ، گۈلاپ بىلەن ئېرىتىپ، ئىلمان قىيامغا
قوشۇپ، تازا ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، سوقۇلغان تالقان-
لارنى ھاۋانچىغا ئاز-ئازدىن سېلىپ، بىر ياندىن ئىزىپ،
بىر ياندىن ئارىلاشتۇرۇلىدۇ ۋە ئەلگەكتىن يەنە بىر قېتىم
ئۆتكۈزۈپ قىيامغا سېلىپ ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. ئالتۇن، كۈمۈش

ۋەرەقلەرنى سېلىپ ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن چىنە - قا -
چىلارغا ئېلىپ ساقلاندىۇ، يېيىش مىقدارى كۈنىگە 1-2
قېتىم، ھەر قېتىمدا 1 - 2 مىسقالدىن.

24 - نۇسخە: ماتىل ئۇسۇل

تەركىبى: بىخ كەبىر، بېدىيان يىلتىزى ھەربىرى
10 مىسقالدىن، چىگىسەي يىلتىزى، چىگىسەي ئۇرۇغى،
كىچىك سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان ھەربىرى
بىر مىسقالدىن. ئىزخىر 4 مىسقال، ھەببى بىلسان،
ئاسارۇن، جېنتىيانا ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، ئۇدى
بىلسان، بوزىدان، سەلىخە، ھەزارئەسپەند 3 مىسقالدىن.
تەييارلاش: 3 چوڭ چىنە سۇغا بىر كېچە چىلاپ
ئەتىسى يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ سۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا
3 قوشۇقتىن ئىچىدۇ.

25 - نۇسخە: مەجۇنى مەشدىرتۇس

تەركىبى: ئىزخىر، ئۇستۇخۇددۇس، سىسالىيۇس،
كىمافىتۇس، مەستىكى، پىلىپىل، ئوسارە لەھىيە تۇتتىس،
قۇندۇز قەرى، جاۋۇشىر، ئۇدى بىلسان، قۇست شىرىن،
تاغ پىننىسى، ئۇشەق، ئىگىر، سەكېنەج ھەربىرى 8

مىسقالدىن، سەلىخە، ئاقىمۇچ، قارىمۇچ، سوزۇلجان مېسىرى،
جوئە، ئوشقۇدرىيۇن، دۇقۇ، ئەكىلىل مىلىك ھەربىرى 7
مىسقالدىن، پەتەر سالىيۇن، قەرەدەنە، ئەپيۇن ھەربىرى
5 مىسقالدىن، ئارپايدىيان 5 مىسقال، رۇمبىدىيان،
ئاسارۇن ھەربىرى 3 مىسقالدىن، ئاقاقىيا 4 مىسقال،
سەقەنقۇر بىر مىسقال، ھوفارىقۇن $\frac{1}{2}$ 4 مىسقال، جېنتىيانا،
رەۋغەنى بىلسان، قۇرس پەرىپىيۇن، مۇقىل ھەربىرى 7
مىسقالدىن، سۇزاپ 2 مىسقال، ئارجىل، سەمغى ئەرەبى
5 مىسقالدىن، ھەسەل ئومۇمى دورىلار ئېغىرلىقى بىلەن
3 باراۋەر.

تەييارلاش: يىلىم دورىلارنى رەيھان شەرىۋىتىگە
چىلاپ ئېرتىلىدۇ. باشقا دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلنى قاتىدە بويىچە ئېرتىپ
قوشۇپ، ئۈستىگە يىلىم دورىلارنى قۇيۇپ ياخشى ئېلىش
تۇرۇپ چىنە - قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.

يىيىش مىقدارى: ئىسسىق مىزاج كىشىلەرگە، 12
ياشتىن توۋەن بالىلارغا بېرىلمەيدۇ. پالەچ ۋە لەقۋا
كېسەللىكلىرىگە مائۇل ھەسەل (ھەسەل سۈيى) بىلەن
بېرىلىدۇ. ئادەتتە كۈنىگە بىر قېتىم (سەھەردە) يىر
مىسقالدىن ئىستىمال قىلىنىدۇ. زەھەرلىنىشلەردە ئەھۋالغا
قاراپ كۈنىگە 3 - 6 قېتىم بېرىلىدۇ.

26 - نۇسخە: ھەبىي جەدۋار (پارپا كومۇلىسى)

تەركىۋى: جەدۋار (پارپا)، ئايلىشى، ئاق سەندەل، قەلەمپۇر، سەمى ئەرەبى، دۇرۇلەج ئەرەبى، قارىمۇچ، دارچىن ھەربىرى 2 مىسقالدىن، زەپەر، ئاقسېرىق، ھەربىرى ئىپار ھەربىرى يېرىم مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ قىزىق سۇيى بىلەن خېمىر قىلىپ، قارىمۇچ چوڭلۇقىدا كومۇلاچلاپ سايدا قۇرۇتۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 12 ياشتىن تۆۋەنلەرگە بېرىشكە بولىدۇ. چوڭلارغا كۈنىگە بىر قېتىم 7 - 5 دانە يېمىشكە بېرىلىدۇ.

27 - نۇسخە: ھەبىي مەنتىن

تەركىۋى: سەككىنەج، ئۇشەق، جاۋۇشەر، مۇقىل، شەھى ھەنزەل، ئادراسمان، سەبەز سۇقوتىرى، تۇرپۇت، سېرىق ھېلىلە پوستى، ئەلىزۇرۇت ھەممىسى ئوخشاش مىقداردا.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، كۈدە (جۈسەي) سۇيى بىلەن كۈمۈلاچ قىلىنىدۇ. يېمىش مىقدارى: بىر مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم، تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىشلىتىلىدۇ.

28 - نۇسخە: ھەبىي پەرپىيۇن

تەركىۋى: پەرپىيۇن، مۇقىل، غارىقۇن، سەككىنەج،
شەھى ھەزەل ھەربىرى بىر ھەسسىدىن. سەبە سۇقۇم
تىرى ئىككى ھەسسە.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ (غارىقۇننى سىم ئەلگەكتىن سۈزۈپ ئۆتكۈزۈپ)
كۈدە (جۈسەي) سۈيى بىلەن ھەب قىلىنىدۇ.
يېيىش مىقدارى: 1 - 2 مىسقالدىن كۈنگە
بىر قېتىم.

29 - نۇسخە: مەجۇنى بالادۇر II

تەركىۋى: سۇمبۇل، سازەج ھىندى، سەلىخە، مۇرى
مەككى، زەپەر، شەھرۇمى، ئەپتىمۇن، ئىزخىر، رەۋەن چىنى،
ھەببىلبان، قەلەمپۇر، ئىرسا، سەبە ھەربىرى $\frac{1}{2}$ 7 مىس-
قالدىن، غارىقۇن 8 مىسقال، بالادۇر 5 مىسقال، بىخ
بېدىيان 27 سەر، سىركە 45 سەر، ھەسەل 35 سەر.
تەييارلاش: بېدىيان يىلتىزىنى چالا سوقۇپ، بىر
كېچە ئازراق سۇغا چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى سىركە بىلەن
قاينىتىپ، تەمىنى چىقىرىپ سۈزۈپ، سۈيىگە ھەسەل سېلىپ

قيام قىلىنىدۇ. باشقا دورىلارنى سوقۇپ، ئىلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، قيام بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن قىلىنىدۇ. يېمىش مىقدارى: تەييارلاپ چىنە قاچىدا ئالتى ئاي تۇرغاندىن كېيىن كۈنىگە $1 - \frac{1}{2}$ مىسقال بېرىلىدۇ. كىچىك بالا ۋە ئۆسمۈرلەرگە بېرىشكە بولمايدۇ.

30 - نۇسخە: رەۋغەنى قۇست (قۇستە يېغى)

تەركىبى: قۇستە تەلخى 1 سەر، قارىمۇچ، پەر-
پىيۇن 2 مىسقالدىن، ئاقىرقەرھە 4 مىسقال، قۇندۇز
قەرى $\frac{1}{2}$ 4 مىسقال، زەيتۇن يېغى 5 سەر.

تەييارلاش: قۇستە، ئاقىرقەرھە ۋە قارىمۇچلارنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە مۇسەللەسكە چىلىنىدۇ. ئەتىسى قاينىتىپ يېرىمى قالغاندا زەيتۇن يېغى قوشۇلىدۇ. قايناپ خاس يېغى قالغاندا، پەرپىيۇن، قۇندۇز قەرىنى يۇمشاق سوقۇپ ئىلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، قازاننى چۈشۈرۈش بىلەن تەڭ ياققا سېلىپ، ياخشى ئارىلاشتۇرۇپ شىشلەردە ئاغزىنى مەھكەم بېكىتىپ ساقلىنىدۇ.

ياغلاش ئۇسۇلى: كۈنىگە بىر قانچە قېتىم پەي ۋە باشقا ئەزالارنى ئاپتاپتا ياغلايدۇ.

31 - نۇسخە: رەۋغەنى قۇرۇتى

تەركىۋى: ئاق موم 1 سەر، توخۇ يېغى 5 مىسقال، كالا ئىلىكى 4 سەر، كۈنجۈت 1 مى 2 سەر، بادام يېغى 1 سەر.
تەييارلاش: كۈنجۈت يېغىنى قىزىتىپ، ئۈستىگە ئاق مومنى سېلىپ، ئېرىپ بولغاندىن كېيىن، باشقىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. شىئەردە ساقلىنىدۇ. ئىشلىتىلىشى: سىرتتىن ياغلاشقا بېرىلىدۇ.

32 - نۇسخە: خەمىرى گازىۋان

تەركىۋى: گازىۋان، ئاقلىغان يۇمىغاقسۇت ئۇرۇغى، قىزىلغان پىلە غوزىسى، ئاق بەھەمەن، بالەنگۈ ئۇرۇغى، ئىككىگە ئىگەن ئاق سەندەل، پەرەنجى مىشىكى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، ئەلپەر $\frac{1}{2}$ مىسقال، كۆيدۈرۈلگەن مەرۋايەت، ئىپار $\frac{1}{4}$ مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ 24 سەر سۇغا بىر كېچە چىلاپ ئەتىسى $\frac{1}{3}$ قىسمى قالغىچە قايدىتىپ سۈزۈپ، 12 سەر ئاۋات بىلەن قىيام قىلىنىدۇ. قىيام ئىلمان ھالغا كەلگەندە ئىپار، ئەلپەر ۋە مەرۋايەتلەرنى سالايە قىلىپ، سېلىپ ياخشى ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

ئىشلەتمىشى: $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن كۈنگە 2 قېتىم تاماقتىن

كېيىن بېرىلىدۇ.

33 - نۆسخە: مەجۇنى سەنچىرىنا

تەركىمى: قۇندۇز قەرى، دارچىن، ئىپيۇن، ئاسا-
رۇن، فۇھ (ئوردان)، موھ، دوقۇ ھەر بىرى بىر مىسقالدىن،
قارىمۇچ، پىلىپىل، بارى زەد، قۇشتە شىرىن ھەر بىرى ئالتە
مىسقالدىن، زەپەر يېرىم مىسقال، ھەسەل پۈتۈن دورىلار
ئېغىرلىغىنىڭ 3 باراۋىرىدە.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەل بىلەن مەجۇن تەييارلىنىدۇ. 3 - 6
ئايدىن كېيىن ئىشلىتىلىدۇ.

يىمىش مىقدارى: يېرىم ياكى بىر مىسقالدىن
كۈنگە بىر قېتىم ئىستىمال قىلىنىدۇ.

34 - نۆسخە: مەجۇنى سورۇنجان

تەركىمى: سورۇنجان 6 مىسقال، بوزىدان، ماھى
زەھرەج، بىخ كەبىر، زىرە، شەترەنجى ھىندى، سېرىق
ھېلىكە پوستى ھەر بىرى 7 مىسقالدىن، چىڭگىسەي ئۇرۇغى،
ئارپا بېدىيان، ئاقبۇج، ياپچان، ئەمەكى ھىندى، پىننە

يوپۇرمىغى، كۆپۈكى دەريا، ھەر بىرى $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن.
قىزىل گۈل، كۈنجۈت، زەنجىۋىل، سوقمولىيا ھەر بىرى
3 مىسقالدىن. تۇربۇت 1 سەر، بادام يېغى 12 مىسقال،
ھەسەل پۇتۇن دورا ئېغىرلىغىغا 2 باراۋەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلاپ،
ئۈستىگە بادام يېغىنى قۇيۇپ ئوبدان ئېلىشتۇرۇپ
ساقلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 2 - 3 مىسقالدىن كۈنىگە
1 - 2 قېتىم قايناقسۇ بىلەن يېمىشكە بېرىلىدۇ.

35 - نۇسخە: سۇپۇپى سورۇنجان (بىرىنچى سورۇنجان تالقىنى)

تەركىۋى: سورۇنجان مىسىرى 11 مىسقال، سانا
33 مىسقال، شەترەنجى ھىندى 9 مىسقال، زەپەر 1
مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: ھەر كۈنى 3 مىسقالدىن قايناقسۇ
بىلەن كاپ ئېتىدۇ.

36 - نۇسخە: سۇيۇپى سورۇنجان II (ئىككىنچى سورۇنجان تالقنى)

تەركىۋى: سورۇنجان مىسى، مەستكى 1 مىس-
قالدىن، قىزىل گۈل 6 مىسقال، ھىندى تىۋى، رەۋەن،
زەنجىۋىل، رۇم يېدىيان $1 \frac{1}{2}$ مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنگە 1 قېتىم 2 مىسقالدىن
قايناقۇ بىلەن سەھەردە ئىچىدۇ.

37 - نۇسخە: ھەببى سورۇنجان (سورۇنجان كومۇلىسى)

تەركىۋى: ئايارەج پەيقارا 1 سەر، تۇرپۇت 1
سەر، شەھى ھەنزەل، قەنتەرىون، سورۇنجان مىسى،
ماھى زەھەرەج، بوزىدان ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، پەر-
پىيۇن، زەنجىۋىل، قىچا، قۇندۇز قەرى 2 مىسقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ئايارەج پەيقارانى بىرئاز سۇدا ئېرىتىپ،
تالقان دورىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ خېمىر قىلىپ كومۇلاچ
ياسىلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: ھەر كۈنى ئاخشامدا 12 گرام
ئىدىن يېيدۇ.

38 - نۇسخە: مەتبۇخى ھېلىلە (ھېلىلە قاينىتىلمىسى)

تەركىبى: سېرىق ھېلىلە پوستى 1 سەر، تەمرى
ھىندى 2 سەر، ئۇيۇلا 30 دانە، سەرپىستان، بىنەشە، كە -
چىك سېرىق يۈگەي ئۇرۇغى، كاسىن ئۇرۇغى ھەر $\frac{1}{2}$
سەردىن، فۇلۇس 25 مىسقال، تەرەنجىۋىل 20 مىسقال.
تەييارلاش: فۇلۇس ۋە تەرەنجىۋىلدىن باشقىلارنى
چالا سوقۇپ (ئۇيۇلنى پارچىلاپ قويۇلما بولىدۇ)،
دورلار چوڭكىدەك سۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى
يېرىمى قالغىچە قاينىتىلىدۇ. قازاننى ئېلىپ ئۈستىگە
تەرەنجىۋىل ۱. لەن فۇلۇس سېلىپ تازا ئارلاشتۇرۇپ
تەييارلىنىدۇ. ئاتادىن ئۆتكۈزۈپ سۇزۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: تىۋىپنىڭ مەسلىھەتى بويىچە
كۈندە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 2 - 4 سەرگىچە ئىچىشكە
بېرىلىدۇ.

39 - نۇسخە: مەتبۇخى شاتەرە (شاتەرە قاينىتىلمىسى)

تەركىبى: سېرىق ھېلىلە، كابىل ھېلىلىسى، بەلىلە،
ئامىلىنىڭ پوستى $\frac{1}{2}$ سەردىن، شاتەرە، شۇمشە

(شياخدوزا) 7 مىسقالدىن، قارا ھېلىلە 5 مىسقال، سانا 4 مىسقال. ئىلۇقىر، مامىرانچىنى 1 مىسقالدىن. ئەپ-تىمۇن، قىزىل گۈل 3 مىسقالدىن، بېدىيان، كاسىن ئۇرۇغى، چىڭىي ئۇرۇغى، بىستپايەج، ئۇستۇخۇددۇس، يالپۇز ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، چىلان، ئەينۇلا ھەر بىرى 20 دانىدىن (بۇلارنى چالا سوقۇپ، چىلانغىدەك سۇ قۇيۇپ بىر كېچە قويۇلىدۇ). فۇنۇس، تەمرى ھىندى 15 مىسقال، تەرەنجىۋىل 3 سەر.

تەييارلاش: چىلانغان دورىلارنى يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ بولغاندىن كېيىن، ئۈستىگە فۇنۇس، تەمرى ھىندى، تەرەنجىۋىلنى سېلىپ، تازا ئارىلاشتۇرۇپ ماتا ئارقىلىق سۈزۈلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسىگە بىنا-ئەن ئىچىلىدۇ.

40 - نۇسخە: شىياق ئەھمەدلىيىمىن

تەكۋى: شادىنەج، يۇيۇلغان ئەدەس 1 سەر، كوپدۇرۇلگەن مىس 8 مىسقال. كەتىرا، سەمىي ئەرەبى، ساپ مۇرمەككى 2 مىسقالدىن، بىخ مارجان، كەھرىۋا، تېشىلىمگەن مەرۋايىت، سازەج ھىندى 4 مىسقالدىن، خۇنسىياۋشيان، زەپەر 1 مىسقالدىن.

تەييارلاش: يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ،

تۇخۇم ئېقى ياكى بىرەر لۇئاب بىلەن خېمىر قىلىپ
جىگدە ئۇرۇغى چوڭلۇغىدا شامچە تەييارلىنىدۇ.
ئىشلىتىش: كۈنگە 2 - 3 قېتىم كوز ئىچىگە
سۈركەيدۇ.

41 - نۇسخە: سۈرمە رۇشنايى (كوزنى روشەن - لەشتۇرگۇچى سۈرمە)

تەركىبى: كويدۇرۇلگەن مىس، شادىنەج ھەربىرى
5 مىسقالدىن، زەڭگەر، سەبزە، بورە ئەرمنى ھەربىرى
1 مىسقالدىن، قارىمۇچ، پىلىپىل، شەھىمى ھەنزەل ھەر
بىرى يېرىم مىسقالدىن، ئىقلىمىيا 2 مىسقال بۇلارنى
توزاڭدەك يۇمشاق سوقۇپ ئىشلىتىلدە ساقلىنىدۇ.
ئىشلىتىلىشى: كۈندە 2 قېتىم كوزگە سۈرمە قىلىپ
تارتىلىدۇ.

42 - نۇسخە: ھەببى مۇسەپىل (سۈرگە كۇمۇلىسى)

تەركىبى: سېرىق ھېلىلە، كابىل ھېلىلىسى،
بەلىلىلەرنىڭ پوستى ھەربىرى بىر مىسقالدىن، سانا ئىككى
مىسقال. غارىقۇن، تۇربۇت، لاجىۋەرد ئىككى يېرىم مىس -
قالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن

ئوتكۈزۈپ، سۇ بىلەن قارىمۇچ چوڭلۇقىدا كومۇلاچ ياسىلىدۇ.

يېمەش مىقدارى: تىۋىپنىڭ كورسەتمىسى بويىچە ئىستىمال قىلىنىدۇ.

43 - نۇسخە: مائىل ئۇسۇل III

تەرگىۋى: چىڭسىي يىلتىزى، بىخ بېدىيان يىل - شىزى، بىخى كەبىر ھەربىرى 1 سەردىن، رۇمبېدىيان، چىڭسىي ئۇرۇغى 2 مىسقالدىن، ئاغەس، ئەپسەنتىن، بۇ - دۇشقاق ھەربىرى 5 مىسقالدىن، قەنتەرىون 3 مىسقال. تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە سۇغا چىلاپ قويۇلىدۇ. ئەتىسى 4 جىڭ سۇ بىلەن قاينىتىپ، 2 جىڭ قالغاندا سۇزۇۋېلىپ، بۇنىڭغا 4 سەر گۈلەن قوشۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 5 ئاش قوشغىدىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

44 - نۇسخە: ھەببى زەھەب

تەرگىۋى: سەبىرە سۇقۇتىرى ① 1 سەر، تۇربۇت

① سەبىرە سۇقۇتىرى - سەبىرەنىڭ بىر خىل ياخشى تۈرى بولۇپ، سېرىق رەڭدە پاقىراپ تۇرىدۇ.

7. مىسقال. سېرىق ھېلىكە پوستى 5 مىسقال. سوقمۇلىغا

$\frac{1}{2}$ 3 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ سۇ بىلەن قارىمۇچ چوڭلۇغىدا كومۇلاچ
تەييارلاپ، سايدا قۇرۇتۇلىدۇ.
يېمىش ھەقدارى: ھەر كۈنى ئاخشامدا 2 مىس-
قالدىن بېرىلىدۇ.

45 - نۇسخە: مائىل ئۇسۇل IV

تەركىبى: بېدىيان يىلتىزى، چىڭسەي يىلتىزى
چىڭسەي ئۇرۇغى، پىرسياۋشان، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى (بىخى
سۇس) ھەربىرى 2 مىسقالدىن، ئارپا بېدىيان، رۇمبېدىيان،
ئىزخىر ھەربىرى 3 مىسقالدىن، گۈلچەن 12 مىسقال.
تەييارلاش: يىلتىز دورىلار چالراق، ئۇرۇق دو-
رىلار يۇمشاق سوقىلىدۇ. يېتەرلىك مىقداردىكى سۇغا
بىر كېچە چىلاپ، ئەتىسى 4 جىڭ سۇ بىلەن قاينىتىپ،
2. جىڭ قالغاندا سۇزۇپ، قاچىغا ئېلىپ، گۈلچەن قو-
شۇپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: بىر كۈندە بىر قانچە قېتىم -
غا بولۇپ ھەممىسىنى ئىچىپ بولىدۇ

46 - نۇسخە: قۇرسى فېلدىپپۇن

تەركىبى: شۇ تەكىمگەن شاھاڭ ۋە خىيال، قە-
ۋىل زەرىنخ، سېرىق زەرىنخ، قەلىي، ئاقاقىيا ھەربىرى
1 $\frac{1}{2}$ مىقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئۈزۈم
سىركىسى بىلەن يۇغۇرۇپ قۇرسى (توقۇچاق) قىلىپ،
سايدا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.
ئىشلىتىلىشى: كېرەك بولغاندا ئېزىپ چارامەتكە
سېپىلىدۇ.

47 - نۇسخە: ئانار شەۋىتى

تەركىبى: تاتلىق ئانار دانىسى بىر ھەسسە،
ئاچچىق ئانار دانىسى يېرىم ھەسسە، شېكەر ئۈچ ھەسسە،
تەييارلاش: ئانار دانىلىرىنى پاكىز نەرسە بىلەن
سىقىپ، سۇزۇپ، شېكەرنى سېلىپ، ئوتنى ئاستا قالاپ
ھۇشيارلىق بىلەن قاينىتىپ قىيام قىلىنىدۇ. ئوتنى
كۈچلۈك قالاپ شەرۋەت كويۇپ رەڭگى قارىداپ كېتىش-
تىن ساقلىنىش شەرت.
ئىشلىتىلىشى: تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە، كۈ-
نىگە 3 قېتىم ئېچىلىدۇ.

48 - نۇسخە: ئالما قەدۋىتى

تەركىبى: ئالمنى سويۇپ ئىچىدىكى ئۇرۇقلىرىنى ئېلىپ تاشلاپ ئۇششاق تۈزىلىدۇ ياكى قىرغۇش بىلەن قىرىلىدۇ. ئۇنىڭدىن چىقىرىلغان سۇدىن بىر ھەسسە، شەكەردىن 4 ھەسسە ئېلىپ قىيام قاينىتىلىدۇ. تەييارلاش: ئالما سۈيىگە شېكەرنى سېلىپ، قىيام بولغىچە ناھايىتى سۇس ئوتتا ئاستا قاينىتىپ قىيام قىلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە كۈ - نىگە 3 قېتىم، 5 - 10 مىسقالدىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

49 - نۇسخە: مەجۇنى جەۋارش كۇمۇنى

تەركىبى: زىرە (بىر كېچە سىركىگە چىلاپ قۇ - زۇتۇلغان) 18 سەر، قارىمۇچ 3 سەر، زەنجبۇل، يالىپۇز 4 سەردىن، بورە ئىرىمنى (توغرىغۇ) 1 سەر، سەلەخە، دارچىن، ھەببى بىلسان، قىرغە، سۈمبۇل، مەستىكى رۇمى 4 مىسقال.

تەييارلاش: زىرنى مۇدەببەر قىلىش ئۇسۇلى - زىرنى توپا، ئەخلەتلىرىدىن ئايرىپ، قاچىغا سېلىپ، زىرە ئۈستىگە زىرىدىن 4 ئىلىك يۇقۇرى چىقىرىپ سىركە قۇيۇلىدۇ. سىركە قۇيۇلغان زىرە بىر كېچە - كۈن -

دۆز تۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن سۇزۇۋېلىپ، سايە يەردە ئۈستىنى يېپىپ قۇرۇتۇلىدۇ. قۇرىغاندىن كېيىن بىر ئاز قىزىتىپ قورۇلىدۇ. زىرە چالاراق سوقۇلىدۇ. قالغان دورىلىرىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تالقان قىلىنىدۇ. ھەسەلنى ئېرىتىپ، توغرىغۇنى سېلىپ، ئارىلاشتۇرۇلىدۇ. ئاندىن كېيىن زىرە ۋە تالقان دورىلارنى ھەسەلگە سېلىپ تازا ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

يېيىش مىقدارى: 1 مىسقالدىن 2 مىسقالغىچە بېرىلىدۇ.

50 - نۇسخە: مەلھىمى ئىسپىداچ I

تەركىۋى: سۈزۈك ئاق موم 3 مىسقال، گۈل يېغى 12 مىسقال، قەلەي ئۇپىسى $\frac{1}{2}$ 4 مىسقال، تۇخۇم ئېقى بىر دانە.

تەييارلاش: ئالدى بىلەن قەلەي ئۇپىسى (تال-قىنى)، تۇخۇم ئېقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىزىلىدۇ. ئاندىن ئۈستىگە موم ۋە گۈل يېغىنى قۇيۇپ ئارىلاشتۇرۇپ شىشە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ھەر خىل بوۋاسىر كېسەللىكلىرىگە سىرتقى تەرەپتىن ئىشلىتىلىدۇ.

51 - نۇسخە: رەۋغەن

تەركىمى: شۈمشە، سۈمبۇل، زىنقىر، كالىئەك بەسەي،
سۈيى بىر ھەسسە، مەئەسائىلە، بابۇنە، مۇقىل، ئەپسەنتىن،
زاراڭزا مېغىزى $\frac{1}{2}$ ھەسسە، ئاق موم، زەيتۇن يېغى،
توخۇ يېغى، كالا ئىلىكى $\frac{1}{4}$ ھەسسە، زەپەر 1 مىقال
مىقدارى.

تەييارلاش: دورىلارنى يېتەرلىك مىقداردىكى سۇ
بىلەن قاينىتىپ، تەمىنى چىقىرىپ، ياغلارنى سېلىپ
قايتا قاينىتىلىدۇ. سۈيى تۈگەپ يېغى قالغاندا ئېلىپ
ساقلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ئىچكى ئەزالارنىڭ ئىششەقلىرىدا
سرتتىن ياغلاشقا بېرىلىدۇ.

52 - نۇسخە: تەرياق ئەسنان

تەركىمى: قۇندۇز قەرى، ھەك، مۇرمەككى،
پىلىپىل، زىراۋەندى مۇدەھەرەج، زەئەبۇل، مەئەسائىلە،
ئەپيۇن، بەڭگى دىۋانە ئۇرۇغى تەڭ مىقدارلاردا ئېلىنىدۇ.
تەييارلاش: دورىلار يۇمشاق سوقۇلۇپ، تىنالىق

ھالىتىدە ئىشلىتىلىدۇ ياكى ھەسەل بىلەن ھېب تەييار -
لىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ھەر خىل چىش ئاغرىقى ئۈچۈن
چىشقا سېلىنىدۇ ياكى كومۇلىسى ئېغىزدا تۇتۇلىدۇ.

53 - نۇسخە: ھوقنە

تەركىمى: بۇغداي كېپىكى بىر سەر، سېرىق چە -
چەك ئۇرۇغى 5 مىسقال، ئەكىللىك 4 مىسقال،
ئەنجىر قېقى 7 مىسقال، تۇز 8 مىسقال، قارا شېكەر 1.2
مىسقال، ئەپكەمە بىرمىسقال.

تەييارلاش: قارا شېكەر، ئەپكەمە، تۇزدىن باش -
قىلىرىنى قاينىتىپ، سۇزۇپ كېيىن بۇلارنى قوشۇپ،
كلىزما ئۇسۇلى بىلەن ئارقا يولدىن بىرقېتىملا كىرگۈ -
زۇلىدۇ.

54 - نۇسخە: مەتبۇخى خىيارى شەنپەر

تەركىمى: چىلان 20 دانە، سەرپىستان 30 دانە،
ئۇرۇغى ئېلىنغان ئۇزۇم بىر سەر، پىشە 4 مىسقال،
ئەنجىر قېقى 10 دانە، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، پىرسىياۋ -
شىان ھەربىرى 5 مىسقالدىن، خىيارى شەنپەر ئىچىدىكى
گۆش قىسمى 7 مىسقال، تەرەنجىۋىل 1 سەر.

تەييارلاش: خىيارى شەنبەر، تەرەنجىۋىلدىن باش-
قىلىرىنى چالا سوقۇپ، بىر يېرىم جىڭ سۇ بىلەن قاي-
نىتىپ، يېرىم جىڭچە قالغاندا قازاننى چۇشۇرۇپ، ئۇس-
تىگە تەرەنجىۋىل بىلەن خىيارى شەنبەرنى سېلىپ تازا
ئارىلاشتۇرۇپ، سۇزۇپ تەييارلىنىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: تىۋىنىڭ كۆرسەتمىسى بويى-
چە 1-3 سەردىن ئىچىشكە بىرىلىدۇ.

55- نۇسخە: نوقوئى تەمرى ھىندى

تەركىبى: تەمرى ھىندى، تەرەنجىۋىل باراۋەر
مىقداردا.
تەييارلاش: چىلاشقىدەك قايناقۇغا 4 سائەتچە
چىلاپ قويۇپ، ئوبدان تەمى چىققاندا سىقىپ، سۇزۇپ
تەييارلىنىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: بىر پىمالدىن كۆلىگە 3 قې-
تىم ئىچىشكە بىرىلىدۇ.

56- نۇسخە شەرۋىتى دىنارى

تەركىبى: كاسىن ئۇرۇغى، قىزىل گۈل 2 سەر-
دىن، كاسىن يىلتىزىنىڭ پۇستى 4 سەر، نىلۇفەر، گا-
زىۋان ھەربىرى 1 سەردىن، خالتىغا ئېلىنغان كوشۇش
ئۇرۇغى 3 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ يېتەرلىك مىقداردىكى سۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ ئەتىسى يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ سۇزۇۋېلىپ تەييارلىنىدۇ (كوشۇش ئۇرۇغى سوقۇلماي خالتا بىلەن قاينىتىلىدۇ). ئۈستىگە بىرچىڭ قەن سېلىپ قىيام قىلىپ بولغاندىن كېيىن، بىرسەر رەۋەننى يۇمشاق سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: ھەر قېتىمدا بىرسەرلى تەڭ مىقداردا بېدىيان سۈيى بىلەن تەڭشەپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

57- نۇسخە: لۇئۇقى زەنجىۋىل (زەنجىۋىل يالانچۇغى)

تەركىمى: زەنجىۋىل 10 سەر، پىلىپىل 5 سەر، زەپەر 5 مىسقال، نىشاستە 15 سەر، تەرەنجىۋىل 30 سەر، شېكەر 45 سەر.

تەييارلاش: زەنجىۋىلنى بىرقانچە كۈن كالا سۇ-تىگە چىلاپ، كۈندە بىر قېتىم يەڭگۈشلەپ تۇرۇپ ئۇنى تاكى زەنجىۋىل خۇددى مۇراببا ھالىغا كەلگىچە تەك-رارلىنىدۇ (ئەگەر ھول ھالدىكى زەنجىۋىلنىڭ ئوزى بولسا ناھايىتى ياخشى. ئۇنى سۈتكە چىلاش ھاجەتسىز). كېيىن ئۇنى پاكىزلاپ ئۈستىگە يۇمشاق سوقۇلغان پىلدە پىل سېلىنىدۇ. تەرەنجىۋىلنى بىرئاز سۇ بىلەن ئېرىتىپ

ماتتا ئارقىلىق سۇزۇپ 45 سەر شېكەر بىلەن قوشۇپ قىيام قىلىنىدۇ. قىيام بولغاندا ئۇنىڭگە زەنجىۋىل بىلەن نىشاستىنى سېلىپ، تازا ئارىلاشتۇرۇپ پاكىزە قاقچىلارغا ئېلىپ ساقلىنىدۇ.

يېيىش مىقدارى: ھەركۈنى ئەتىگەندە بىر سەردىن.

58- نۇسخە: لوئۇقى ئىنجۇر.

تەركىمى: پىشقان ئىنجۇر 10 دانە، زۇفا، گۈل سۈسەن ھەر بىرى 8 مىسقالدىن، شېكەر 12 سەر.

تەييارلاش: ئىنجۇرنى 2 چوڭ چىنە سۇدا يېردىن قانچە قايىشتىپ، ئۇستىگە شېكەرنى سېلىپ قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

يېيىش مىقدارى: ھاجەت بولغاندا 4 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

59- نۇسخە: لوئۇقى ھولبە (شۇمشە)

تەركىمى: شۇمشە (شاڭدۇزا)، بادام مېغىزى 4 مىسقالدىن، كەتىرا، چۈچۈكبۇيا يىلتىزنىڭ قويۇقلاشتۇرۇلغان قايىشتىلىشى (رۇبى سۇس)، ياڭاق مېغىزى، نىشاستە، سەغىز ئەرەبى 2 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلەكتىن

ئوتكۈزۈپ شېكەر قىيامى ياكى ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ
تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: ھاجەت بولغاندا ئىككى مىس-
قالدىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

60 - نۇسخە: لۇتۇقى سەرپىستان

تەركىبى: چىلان 50 دانە، سەرپىستان 30
دانە، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، بادام مېغىزى، تەرخەمەك
ئۇرۇغى 5 مىسقال، گۈل بىنەپشە 4 مىسقال، كەتە-
را 2 مىسقال.

تەييارلاش: چىلان، سەرپىستان، ئاق لەيلىلەرنى
2 چوڭ چىنە سۇ بىلەن قاينىتىپ يېرىمى قالغاندا 4
سەر قەن بىلەن قىيام قىلىپ قالغان دورىلارنى يۇمشاق
سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم بىر مىسقال-
دىن 2 مىسقالغىچە.

61 - نۇسخە: لۇتۇقى خەشخاش

تەركىبى: ئاق كۆكنار (خەشخاش سەپىت)، قازا
كۆكنار ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، ئاقلاغان چۈچۈكبۇيا
يىلتىزى 8 مىسقال، ناۋات 4 سەر، كەتىرا، سەمىغى

ئەرەبى 3 مىسقالدىن.

تەييارلاش: كوكئار ۋە چۈچۈكبۇيا يىلتىزىنى
سۇدا قاينىتىپ. ئاۋات بىلەن قىيام قىلىپ قالغان دو-
رىلانى سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.
يىمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم بىر مىسقالدىن
2 مىسقالغىچە ئىستىمال قىلىنىدۇ. كىچىك بالىلارغا
بېرىشتە دىققەت قىلىش كېرەك.
ئەسكەرتىش: كوكئار (خەشخاش) نىڭ تىلىپ ئەپ-
يۇنى ئېلىنىمىغىنى ياخشى ھىساپلىنىدۇ.

62 - نۇسخە: ھەبىي غارىقۇن

تەركىبى: غارىقۇن (سىم ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈلىدۇ،
سوقۇلمايدۇ) 3 مىسقال، تۇرىۋۇت 5 مىسقال، شەھى ھەل-
زەل، ئەنزۇرۇت 2 مىسقال، چۈچۈكبۇيا يىلتىزىنىڭ قويۇق
لاشتۇرۇلغان قاينىتىلمىسى بىر مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ئايارەجنى بىر ئاز سۇ بىلەن ئېرىتىپ، قار-
مۇچ چوڭلۇغىدا ھەب قىلىپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.
يىمىش مىقدارى: 12 - 20 دانىدىن ھەركۈنى
ئاخشامدا ئىچىدۇ.

63 - نۇسخە شەرۋىتى زۇفا II

تەركىمى: ئارپا بېدىيان، چىگىسى ئۇرۇغى 9 مىس-
قالدىن، زۇفا، پىرسىياۋشيان 7 مىسقالدىن، ئەنجۈر، چىلان،
سەرىپىستان ھەرىرى 20 دانىدىن، ئۇرۇقسىز چۈڭ ئۈزۈم
3 سەر، شۈمشە ئۇرۇغى، ھەمشىۋا ئۇرۇغى، گۈل سوسەن،
پاراسىئون 3 مىسقالدىن، قەن 20 سەر، گۈل قەن 10 سەر
(ئەگەر مۆتىدىللىرىگە قىلىش لازىم بولسا ئىلوفەردىن 3
مىسقال، كۆكتار ئۇرۇغىدىن 3 مىسقال ئېلىنىدۇ. گۈل قەن
ئورنىغا تەرەنجىۋىل سالىا بولىدۇ).

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ 3 چىنە سۇغا بىر
كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى يېرىمى قالغىچە قايىنىتىپ
سۇزۇپ، سىقىپ ئۈستىگە قەن سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ.
كېيىن گۈل قەن سېلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم ھەر قېتىمدا
6 ئاش قۇشىغىدىن بېرىلىدۇ.

64 - نۇسخە: ھەببى پىلپىل (قارىمۇچ

كۈمۈلىسى)

تەركىمى: قارىمۇچ، قۇيۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈكبۇيا
قايناتىمىسى، شېكەر ھەر بىرىنى باراۋەردىن ئېلىپ، يۇم-

شاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سۇ بىلەن قارىغۇچ چوڭلۇغىدا ھەب قىلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: بىردىن بىر ھاجەت بولغاندا ئېغىزدا تۇتۇپ شۇمىدۇ.

65 - نۇسخە: مەجۇنى بىنەپشە II

تەركمۇ: گۈل بىنەپشە، بادام مېغىزى ھەربىرى بىر سەردىن، مەستىكى، قويۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈكبۇيا قاينا تېشى بەش مىسقال، تۇرپۇت بىرسەر، تەرەنجۈل، پۇنۇس، خىيارى شەلىر ھەربىرى بەش سەردىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ئالغان قىلىنىدۇ. تەرەنجۈل بىلەن پۇنۇسنى ئومۇمى دورىنىڭ 2 باراۋەر ۋەزىنىدىكى سۇ بىلەن ئېرىتىپ تەمى چىقىرىلىدۇ. كېيىن سۇزۇۋېلىپ، سۈيگە قەن سېلىپ، قىيام تەييارلاپ، بۇنىڭ ئۈستىگە تالقالارنى سېلىپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: 3 - 5 مىسقالدىن كۆلىگە بىر قېتىمدىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

66 - نۇسخە: شۇمشە دەملەمىسى

تەركمۇ: شۇمشە ئۇرۇغى 10 مىسقال، بىنەپشە 4 مىسقال، بېدىيان 2 مىسقال، قۇرۇق ئۇزۇم 30 دانە.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، يېتەرلىك سۇ بىلەن قاينىتىپ، قەن قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.
مىقدارى: كۈنگە 3 فېتىم ھەر قېتىم 6 ئاش قوشۇقتىن ئىچىدۇ.

67 - نۇسخە: شەرۋىتى ئەنسىل (ياۋا پىياز شەرۋىتى)

تەركىمى: ياۋا پىياز (ئەنسىل) 6 سەر، رۇمبىددە -
يان 6 مىسقال، ئۇرۇقسىز ئۈزۈم 40 سەر، ئەنجۈر
14 دانە، شېكەر 12 سەر.

تەييارلاش: ياۋا پىيازلى ياغاچ پىچاق بىلەن ئاقلاپ، دورىلارنى سوقۇپ، 3 چوڭ چىنە سۇغا (قايناقسۇغا) بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى سىقىپ، سۇزۇپ، شېكەر بىلەن قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: ئەتىگەن تاماقتىن ئىلگىرى چاي قوشۇمدا 1 - 2 قوشۇقتىن ئىچىلىدۇ.

68 - نۇسخە: مەجۈنى زىراۋەندى

تەركىمى: زىراۋەند مۇدەھرىج، قەرەدما، پىلىپ، ئىسپەندىن ئۇرۇغى، ئاچچىق بادام مېغىزى، ئەنجۈر بۇلار ھەربىرى 5 مىسقالدىن قويۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈك - بۇيا قايناتمىسى، زۇفا، پىرسىياۋشان ھەربىرى 2 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دوزىلارنى يۇمشاق سوقۇپ 2 ھەسەل ھەسەل بىلەن مەجۇن قىلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: تىۋىپنىڭ كورسەتمىسى بويىچە
1-2 مىسقالدىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

69 - نۇسخە: شەرۋىتى خەشخاش (كوكنار شەرۋىتى)

تەركىبى: كوكنازغوزسى (ئۇرۇغى بار بولغىنى ۋە
ئەپيۇن تەركىبى ئېلىنىمىغىنى ياخشى)، يۈز دانە، گۈلەپ
45 سەر، قەن 27 سەر.

تەييارلاش: كوكنازنىڭ پوستىنى چالا. ئۇرۇغىنى
يۇمشاق سوقۇپ، گۈلەپقا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ.
ئەتىسى سۇزۇپ، تېرىپىنى سىقىپ سۈيىگە قەن سېلىپ
قىيام قىلىنىدۇ.

تىچىش مىقدارى: بىر چاي قوشۇقتىن كۈنىگە 3
قېتىم ئىچىشكە بېرىلىدۇ. كىچىك بالىلارغا بېرىشكە بولمايدۇ.

70 - نۇسخە: ھەبىي سۇئال (يوتەل كۇمۇلىسى)

تەركىبى: نىشاستە، بىنەپشە، تاتلىق بادام مېغىزى،
كوكناز شاكىلى، گىلى ئەرمىنى، كەتىرا، كوكناز ئۇرۇغى،
پۇرچاق، سەملى ئەرمەبى 3 مىسقالدىن، ئىسپۇغۇل 5 مىس-
قال (لۇتايى چىقىرىپ قوشۇلىدۇ).

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئوت-
كۈزۈپ ئىسپۇغۇل لۇئابى بىلەن ھەب تەييارلاپ سايىدا
قۇرۇتۇلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: ھاجەت ۋاقتىدا بىر دانىدىن ئېغىزغا
سېلىپ شۇمۇشكە بېرىلىدۇ.

71 - نۇسخە: قۇرسى كەھربا

تەركىبى: كەھربا، گىل ئەرمىنى، سەمى ئەرەبى،
خۇلىسىياۋشان، تاباشىر، ئىشاستە، كەتتە، ئاقاقىيا، ئانار
گۈلى تەڭ مىقداردا.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئوتكۈزۈپ، پاقا يوپۇرمىقى سۈيى ۋە گازىۋان سۈيى
بىلەن خېمىر قىلىپ يۇغۇرۇپ قۇرس (توقىچاق)
تەييارلىنىدۇ.

يېمەش مىقدارى: تىۋىپنىڭ كورسەتمىسى بويىچە
1 - 2 مىقالدىن كۈنگە 2 قېتىم بېرىلىدۇ.

72 - نۇسخە: شەرۋىتى ئەنجىبار (ئۈرگۈنەك شەرۋىتى)

تەركىبى: ئەنجىبار 7 مىقال، ئاق سەندەل،
قىزىل سەندەل (ئىكەكلەنگىنى) 5 مىقالدىن ئاقاقىيا
2 مىقال، قەن 12 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، 3 چوڭ چىنە قايناقسۇغا بىر كېچە چىلاپ، ئەتىسى سۇزۇپ تىرىپىنى ئوبدان سىقىپ، سۇيىگە قەن سېلىپ قىيام تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: ئوزۇنى يالغۇز ياكى باشقا قان توختاتقۇچى دورىلار بىلەن بىللە 3 قوشۇقتىن ئىچىلىدۇ.

73 - نۇسخە: مەتبۇخى مۇلەيىن (تەرەتنى يۇمشاتقۇچى قايناتما)

تەركىبى: سەرپىستان، چىلان 25 دانىدىن، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، بىنەپشە 3 مىسقالدىن، بابۇنە 2 مىسقال، خىيارى شەنبەر، تەرەنجىۋىل 15 مىسقالدىن (سوقۇلمايدۇ).

تەييارلاش: سوقمايدىغان دورىلارنى يېرىم چوڭ چىنە قايناقسۇغا چىلاپ، 4 سائەتچە دۈملەپ قويغاندىن كېيىن سىقىپ سۇزۇۋېلىپ، قالغان دورىلارنى بىر چىنە سۇ بىلەن قاينىتىپ، سۇزۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم ھەر قېتىمدا بىر پىيالىدىن ئىچىدۇ.

74 - نۇسخە: شەرۋىتى بىنەپشە

تەركىمى: ھول بىنەپشە (گۈلى بولغىنى ياخشىراق)

$\frac{1}{2}$ 4 سەر پار. سۈيى (ياكى گۈلاپ) 18 سەر، قەن 5 سەر.

تەييارلاش: گۈلاپقا بىنەپشنى بىر كېچە - كۈندۈز

چىلاپ قويۇپ، $\frac{1}{3}$ قىسمى قالغىچە قاينىتىپ سۈزۈپ ئۈس -

تىگە قەن سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: 2 - 3 قوشۇقتىن كۈندە 3 قېتىم ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

ئەسكەرتىش: ئەگەر بىنەپشنىڭ ھول تۈرى بولمىسا قۇرۇق بىنەپشنى 7 باراۋەر گۈلاپقا چىلاپ، سۇنى پۈتۈنلەي شىمىرىپ بولغانغا قەدەر قويۇلسا ھول بىنەپشە بىلەن ئوخشاش بولىدۇ.

75 - نۇسخە: شەرۋىتى نىلۇفەر

تەركىمى: نىلۇفەر 5 سەر، قەن بىر چىڭ، گۈلاپ 18 سەر.

تەييارلاش ۋە ئىچىش مىقدارى: 74 - نۇسخە بىلەن ئوخشاش.

76 - نۇسخە: قۇرسى كافۇر

تەركىمى: قىزىل گۈل 2 مىسقال، تاباشىر 4 مىسقال، ئاق سەندەل 2 مىسقال، سېمىز ئوت ئۇرۇغى 3 مىسقال. خاڭگا، تەرخەمەك، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى

5 مىسقالدىن، زەپەر 1 مىسقال، كاپۇر $\frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئىسپۇغۇل لۇئابى بىلەن بىر فۇڭلۇق تەڭگە چوڭلۇقىدا قۇرس تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: ئانار شەرۋىتى بىلەن كۈنگە 2 قېتىم 1 - 2 دىن بېرىلىدۇ.

گەسكەرتىش: تال كېسەللىكىدە ئىشلەتكەندە رەۋەن،

ئۇسۇقۇردىنلارنى $\frac{1}{2}$ 1 مىسقالدىن قوشۇلىدۇ.

77 - نۇسخە: خېمىرى سەندەل

تەركىمى: ئاق سەندەلنى گۈلاپقا سۇرۇپ قۇرۇتۇلغان تالقىنى كازىۋان گۈلى، قىرىقىلغان پىلە،

قىزىل گۈل ئەرەقى، بىدىنىشك ئەرەقى ھەر بىرى $\frac{1}{2}$ 3

مىسقالدىن، زەپەر يېرىم مىسقال، قەن $\frac{1}{2}$ 5 سەر.

تەييارلاش: ئەرەقلەر بىلەن قەنى قىيام قىلىپ، قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ قىيامغا سېلىپ، خېمىردەك قىلىپ تەييارلىنىدۇ.
ئىشلەتمەش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنگە بىر قېتىم بېرىلىدۇ.

78 - نۇسخە: شەرۋىتى بادىرەنجىبۇيا

تەركىبى: بادىرەنجىبۇيا ئۇرۇغى، كاسىن ئۇرۇغى، فەرەنجى مىشكى 20 مىسقالدىن، گازىۋان 30 مىسقال، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 10 مىسقال، بېدىيان، بىسپايەج 7 مىسقال، گۈلاپ 6 مىسقال، تاتلىق ئالما سۈيى 22 سەر، قەن 24 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، گۈلاپ ۋە ئالما سۈيى بىلەن $\frac{1}{3}$ قالغىچە قاينىتىپ، سۈزۈپ، سىقىپ، سۈيىگە قەن سېلىپ، قىيام قىلىپ شىشە قاچىدا لاردا ساقلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 4 قوشۇقتىن ئىچىدۇ.

79 - نۇسخە: گازىۋان شەرۋىتى

تەركىبى: ھول گازىۋان، قەن بۇلار ھەربىرى 20 سەردىن، گۈلاپ 2 سەر.

تەييارلاش: بۇلارنى بىرلەشتۈرۈپ قاينىتىپ قىيام قىلىپ تەييارلاپ پاكىزە شىشلەردە ساقلىنىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: كۈنگە 3 قېتىم 4 قوشۇقتىن ئىچىدۇ.

ئەگەر ھول گازبۇدان بولمىسا قۇرۇق گازبۇداننى قايناق سۇ ياكى گۈلاپقا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ ئەتىسى قاينىتىپ، سۈزۈۋېلىپ 3 ھەسسە قەن ياكى شېكەر بىلەن قىيام قىلىنىدۇ.

80 - نۇسخە: سەندەل ئەرەقى

تەركىبى: قىزىل گۈل، كاسىن ئۇرۇغى، بىدىمىشكى، ئىلۇپەر ھەربىرى 1 سەردىن، ئاق سەندەل كىپىكى، يۇمىقاسۇت ئۇرۇغى، زىرىخ، ئالما چىچىكى، بىيە چىچىكى ھەر بىرى $1\frac{1}{2}$ سەردىن.

تەييارلاش: بۇلارنى يۇمشاق سوقۇپ، بىر كېچە قايناقسۇغا چىلاپ، ئەتىسى 6 ھەسسە سۇ قوشۇپ ئەرەق تارتىش ئۇسۇلى بويىچە تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: ئوزۇننى يالغۇز ياكى باشقا مۇناسىۋەتلىك دورىلار بىلەن بىر ئاش قوشۇقتىن 3 قېتىم بېرىلىدۇ.

81 - نۇسخە: مەجۇنى داۋائىلىمىشكى تەلخى
(قېرىق داۋائىلىمىشكى مەجۇنى)

تەركىبى: ئەپسەنتىن، سەبىرە سۇقوتېرى، زىراۋەلدە،
مۇدەھرەج، دۇرۇنەج ئەقرەبى ھەربىرى $6\frac{1}{2}$ مىسقالدىن.
جۇۋىنە، زەپەر، چىگەي ئۇرۇغى 4 مىسقالدىن، سۇمبۇل،
سازەج ھىندى 2 مىسقال، قۇندۇز قەرى، ئىپپاز بىر
مىسقالدىن، سۇزۇلگەن ھەسەل 110 مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يېيىش مىقدارى: 2 - 1 مىسقالدىن كۈنىگە
2 قېتىم.

82 - نۇسخە: مەجۇنى فلۇنىيا

تەركىبى: ئاقىر قېرەھا، پەرپىيۇن، سۇمبۇل، بەڭگى
دېۋانە ئۇرۇغى ھەربىرى 1 مىسقالدىن، زەپەر 5 مىسقال،
ئەپيۇن 2 مىسقال، ئاقىمۇچ 20 مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ 2 ھەسسە ھەسەل بىلەن مەجۇن قىلىنىدۇ.
يېيىش مىقدارى: كېسەل بەدەنىنىڭ قۇۋۋەت

ئەھۋالغا قاراپ ئوقۇت چوڭلۇغىدا ياكى ئۇنىڭدىن
چوڭراق بېرىلىدۇ.

83 - نۇسخە: مەجۇنى فەلافى I

تەركىبى: ئاقمۇچ، قارىمۇچ 15 مىسقالدىن، ئۇدى
بىلەن $7\frac{1}{2}$ مىسقال، سۇمبۇل، ھۇماما 4 مىسقالدىن،
زەنجىۋىل، چىڭسەي ئۇرۇغى، سىلىمىۋىس، سەلەمە،
ئاسارۇن، راسەن بىر مىسقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ 2 ھەسسە ھەسەل بىلەن مەجۇن قىلىنىدۇ.
يېمىش مەقدارى: قايناقسۇ بىلەن كۈنىگە بىر
مىسقالدىن ئىچىلىدۇ.

84 - نۇسخە: مەجۇنى مۇپەررىھى ياقۇتى II

تەركىبى: تاباشىر، گازىۋان، كاسىن ئۇرۇغى ھەر-
بىرى 3 مىسقالدىن، ئامىلە 15 مىسقال، ئاق سەندەل،
قىزىل سەندەل، قىزىل گۈل، تىشىلىمىگەن مەرۋايىت،
مارجان 4 مىسقالدىن (كويدۇرۇلگەندىن كېيىنكى ۋەزنى)،
كەھرىۋا 4 مىسقال، زەپەر يېرىم مىسقال، ئالتۇن ۋە-
رەق، كۈمۈش ۋە رەق ھەر بىرى $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن.
تەييارلاش: مارجان، مەرۋايىتلارنى كويىدۇرۇپ

سالايە قىلىنىدۇ. قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ،
ئەلگەكتىن ئوتكۇزۇپ 2 ھەسسە ئالما شەرۋىتى (48 -
نۇسخە) بىلەن مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يىمىش مىقدارى: كۈنگە بىر مىسقالدىن 2 قېتىم
قەھۋە (كافى) بىلەن بېرىلىدۇ.

85 - نۇسخە: مەجۇنى مۇپەررىھى ياقۇتى III

تەركىبى: ئاق بەھمەن، قىزىل بەھمەن، ئايلىشى
2 سەر دىن. دۇرۇنەج ئەقرەبى، بادرنەجبۇيا، ئاق ئۇدى
قىمارى ھەر بىرى 1 مىسقالدىن. قەلەمپۇر، سۇمبۇل، زەپەر،
ھەر بىرى 5 مىسقالدىن. ئالتۇن ۋەرەق $\frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئوتكۇزۇپ، ياخشى ئالما شەرۋىتى (2 ھەسسە) بىلەن
مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يىمىش مىقدارى: كۈنگە بىر مىسقالنى ئىۋە-
رىشىم شەرۋىتى (86 - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ.

86 - نۇسخە: شەرۋىتى تەۋرىشىم (پىلە غۇزىسى شەرۋىتى)

تەركىبى: ئاق پىلە (يىپەك غۇزىسى) 6 سەر،
ئاۋات 36 سەر، قىزىل گۈل گۈلابى، گازىۋان گۈلابى،

بىدىمىشكى گۈلابى ھەر بىرى بىر جىڭ (16) سەردىن،
سۈمبۇل، پەرەنجى مىشكى، ئاق سەندەل كىيىمى، ئۈشە
ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، مەستىكى 2 مىسقال، خۇلىنجان، ئىگىر
5 مىسقال، زەپەر $\frac{2}{1}$ مىسقال، ئىپار 1 فۇڭ.

تەييارلاش: پىلە غوزىنى قاچا بىلەن ئۇشاق
قىرىقىپ، قۇرۇتىنى تازىلاپ، قەلەيلەنگەن مىس قازانغا
ياكى چىمە قاچىغا سېلىپ گۈلاپقا بىر كېچە - كۈندۈز
چىلاپ قويۇش لازىم. ئەتىسى ئىگىر، سەندەل ۋە خۇلىن -
جاننى سېلىپ يېرىمى قالغىچە قاينىتىش كېرەك. ئۇندىن
كېيىن ماتا ئارقىلىق سۈزۈپ، سىقىپ، سۈيىگە ئاۋاتنى
سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ.

قىيام سۈۋىغاندىن كېيىن، زەپەر بىلەن ئىپارنى
سالايە قىلىپ قوشىلىدۇ. ئاندىن قالغان دورىلار سوقۇپ
ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: ئوزۇنى يالغۇز ياكى باشقا
دورىلار بىلەن قوشۇپ، كۈندە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا
2 - 3 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

دەققەت: قىيام قىلغاندا ئوتنى ئاستا قالاش كېرەك.
بولمىسا ئاسانلا تېشىپ كېتىدۇ.

ئەگەر گۈلاپلار بولمىسا، شۇ دورىلارنىڭ ئوزۇنى
سۇ بىلەن قاينىتىپ تەمىنى ئىشلەتسىمۇ بولىدۇ. ئەمما
گۈلاپنىڭ بولغىنى ئەۋزەل.

87 - نۇسخە: مەجۇنى ئايارەج لوغانزىيا

تەركىبى: شەھى ھەنزەل 5 مىسقال، پىشۇرۇلغان
ياۋا پىتياز (ئەتىل)، غارىقۇن، سوقمولىيا، قارا خەربەي
ئۇشەق، ئوسقۇدرىيۇن ھەر بىرى 4 مىسقالدىن، ئەپتىن
كىمازىيۇس، مۇقىل، سەبرى، ھەر بىرى 3 مىسقالدىن
ھاشا، ھۇفارىقۇن، سازەج ھىندى، فراسون، سەلىخ
پىلىپ، ئاقمۇچ، قارىمۇچ، جاۋۇشەر، زەپەر، داچىن، پىشتاپايەج،
قۇندۇز قەرى، مۇرى مەككى، پەتەرسالىيۇن، زىۋاۋەند-
تەۋىل، ئوسارە ئەپسەنتىن، پەرىپىيۇن، ھۇماما، زەنجىۋىل،
ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، جىنتىيانا، ئۇستۇخۇددۇس
ھەر بىرى $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، ھەسەل ئومۇمى دورىلار
ۋەزىندىن 3 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى قائىدە بويىچە يۇمشاق
سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەل بىلەن مەجۇن
تەييارلىنىدۇ.

يىمىش مىقدارى: 4 - 2 مىسقالدىن كۈنگە 1 - 2
قېتىم قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ.

88 - نۇسخە: ئىسكەنجىمىن سەپەر جىلى (بىيە ئىسكەنجىۋىلى)

تەركىبى: بىيە، سىركە ھەر بىرى 9 سەردىن، سۇم-

بۇل، قەلەمپۇر، دارچىن ھەر بىرى 2 مىقالدىن، شېكەر 12 سەر.

تەييارلاش: بىيەنى توغراپ، سىركە ۋە 3 چوڭ چىنە بۇ بىلەن يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، ماتىدادىنى ئەتكۈزۈپ، تازا سىقىپ، ئۈستىگە شېكەرنى سېلىپ، قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ. قىيام ئىلمان بولغاندا قالغان دورىلارنى سوقۇپ قوشۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: بىر ئاش ئوشۇغىدىن كۈنىگە 3 قېتىم.

ئەسكەرتىش: يەنە بىر نۇسخىدا، زىكۇر دورىنى بىر خالتىغا ئېلىپ، قىيام بىلەن بىللە قاينىتىپ تەييارلاشنى كۈتەتكەن.

89 - نۇسخە: شەرۋىتى زىرشىك (زىرىخ شەرۋىتى)

تەركىمى: زىرىخ سۈيى بىر ھەسسە، شېكەر 5 ھەسسە.

تەييارلاش: زىرىخ سۈيىگە شېكەرنى سېلىپ، سۇس

ئوت بىلەن $\frac{1}{3}$ قالغىچە قاينىتىپ قىيام قىلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: 2 ئاش قوشۇقتىن كۈنىگە

3 قېتىم بېرىلىدۇ.

دېققەت: ئوت بەك تېز كېتىپ قېلىپ، دورا

رەڭگىنىڭ قارىيىپ كەتمەسلىگىگە دېققەت قىلىش زورۇر.

90 - نۇسخە: جەۋارىش تەمرى ھىندى

تەركىمى: تەمرى ھىندى 12 سەر، ئانار سۈيى بىرسەر، لاچىندانە بىر مىسقال، گازىۋان، مەسكى 2 مىسقالدىن، كاسىن ئۇرۇغى 3 مىسقال، قىس 4 سەر، يۇمىلاقسۇت ئۇرۇغى 2 مىسقال.

تەييارلاش: تەمرى ھىندىنى بىر ئاز قايناقسۇدا ئېرىتىپ سۇزۇپ، ئانار سۈيى بىلەن قوشۇپ قەنى سىلىپ قىيام قىلىندۇ. قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ قىيام ئىلما بولغاندا قوشۇلىدۇ. يېمىش مىقدارى: كۈنگە بىر قېتىم، 5 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

91 - نۇسخە: شەرۋىتى ئەپسەتتىن

تەركىمى: ئەپسەتتىن رۇمى 5 مىسقال، قىزىل گۈل 7 مىسقال، شاتەرە، ئۇرۇقسىز ئۇزۇم 2 مىسقال، قارا ئۇرۇك 20 دانە، تەمرى ھىندى 20 مىسقال.

تەييارلاش: 2 جىڭ قايناقسۇغا چىلاپ، تازا تەمى چىققاندا ماتادىن سىقىپ، سۇزۇپ، قاينىتىپ پاكىزە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: ھەر كۈنى ئەتىگەندە 40

مىسقالنى 10 مىسقال شېكەر، بىر مىسقال سەبىز، بىلەن ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

92 - نۇسخە: جەۋارىش ئۇد (I)

تەركىبى: ئۇدى ھىندى، سۇمبۇل، مەستىكى، قەلەمپۇر، لاچىندانە، جەۋزىبەۋا ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، كابۇل ھېلىلىسىنىڭ پوستى، چىڭگەي ئۇرۇغى، رۇمبېدىيان، تورۇنچى پوستى، بوزۇغا، بادىرەنجىبۇيا $1 \frac{1}{2}$ مىسقال دىن، زەپەر، بەسباسە، زەنجىۋىل ھەر بىرى يېرىم مىسقالدىن، تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، 6 سەر قەنىي قىيام قىلىپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. يېمىش مىقدارى: كۈنگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

93 - نۇسخە: جەۋارىش ئۇد (II)

تەركىبى: ئۇد ھىندى، ئارپا بېدىيان، چىڭگەي ئۇرۇغى، ئىكىر، سۇمبۇل، ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، كافۇر 2 فۇڭ، ئىپار 2 فۇڭ، بەسباسە، نارمىشكى، فەرەنجى مىشكى، سەئىدى كۇفى، بوزۇغا، زەرەپ 1 مىسقالدىن، دارچىن، مەستىكى، زەنجىۋىل، قارىمۇچ، پىلىپىل، قەلەمپۇر بىر سەردىن، گازىۋان 5 مىسقال، ھەسەل 18 سەر.

تەييارلاش: كوزىلارنى سوقۇپ، ھەسەلنى سەل ئېرىتىپ ئارىلاشتۇرۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنىگە بىر ياكى ئىككى قېتىم يېرىلىدۇ.

بۇ نۇسخە ئەبۇ ئەلى ئىبنىسىنانىڭ تەجرىبىسىدىن ئۆتكەن نۇسخە بۇلۇپ، مەئدە، يۈرەك كېسەللىكلىرى ۋە نەپەس قىيىنلىشىشلارغا بېرىلىدۇ.

94 - نۇسخە: ھەببى سەكبىنەج

تەركىمى: سەبىرە سوقۇتتىرى، سەكبىنەج، مۇقىل، غارىقۇن باراۋەر مىقداردا.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-تىن ئۆتكۈزۈپ قايناقسۇ بىلەن خېمىر قىلىپ ھەب تەييارلىنىدۇ، سايدا قۇرۇتۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: $1 - \frac{1}{2}$ مىسقالغىچە كۈنىگە

بىر قېتىم كەچقۇرۇن يېرىلىدۇ.

95 - نۇسخە: قۇرسى ئەنسۇن (رۇمبىدىيان

توقچىغى)

تەركىمى: ئەنسۇن (رۇمبىدىيان)، چىگىسەي ئۇرۇغى 5 مىسقالدىن، ئاسارۇن، ئاقلاڭغان بادام مېغىزى 5 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قىلىپ

ئاقسۇ بىلەن ئېمىر قىلىپ $1\frac{1}{2}$ مىسقاللىقتىن قۇرس

قىلىنىدۇ. سايىدا قويۇپ قۇرۇتىلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنگە 2 قېتىم بىر دانىدىن

ئىسكەنجىۋىل بىلەن بېرىلىدۇ.

96 - نۇسخە: قۇرسى كەۋكەب (پاقىراق تاش

توقچىغى)

تەركىبى: سۇمبۇل، قۇلدۇز قەرى 4 مىسقالدىن،

مورى مەككى، سەلىخە، يەبىرۇجى سەلەم 4 مىسقالدىن،

ئەپيۇن، رەزەپەر، قۇستە كەۋكەب بولتەرز (تەلىق) 5 مىس-

قالدىن، كوكئار، رۇمبىدىيان، سىسالىيۇس، مەنە سائىلە،

بەگگى دىۋانە، چىڭسەي ئۇرۇغى غەربىرى 6 مىسقالدىن.

تەييارلاش: يىلىم دورىلارنى بىر ئاز سۇ بىلەن

ئېرىتىپ، قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ سېلىپ،

يېرىم مىسقالدىن قۇرس تەييارلىنىدۇ (ھەسەل بىلەن

تەييارلاشقىمۇ بولىدۇ). سايىدا قۇرۇتۇپ ھاجەت ۋاقتىدا

ئىستىمال قىلىنىدۇ.

ئىشلىتىش مىقدارى: بىر دانىدىن 2 قېتىم

تەۋبىنىڭ كۆرسەتمىسى بىلەن بېرىلىدۇ.

97 - نۇسخە: مەجۇنى جەۋارىش شەھرى ياران

تەركمۇي: قەلەمپۇ، گۈل دارچىن، سەلىخە،
سۇمبۇل، جەۋزىبەۋار، لاچىندانە، قاقىلە، ھەببى
بىلسان، زەپەر $4\frac{1}{2}$ مىسقالدىن. سوقمۇنىيا 3 مىسقال،

توربۇت، ھەشىقى پىچەك ئۇرۇغى 8 مىسقال، قەن $6\frac{1}{2}$
سەر، ھەسەل 13 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ (ئەلگەكتىن ئوت-
كوزمەي) قەننى بىر ئاز سۇ بىلەن قىيام قىلىپ ھەسەل
بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، ئۈستىگە دورىلارنى سېلىپ تازا
قوچۇپ تەييارلىنىدۇ.

يىمىش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنىگە بىر
قېتىم ئىچىدۇ.

98 - نۇسخە: جەۋارىش سەپەر جىلى (بىيە جەۋارىشى)

تەركمۇي: ئىسسىق مىزاجلىق كىشىلەرگە — سوق-
مۇنىيا 2 مىسقال، توربۇت بىر سەر، قاپاق، خاڭگا،
قوغۇن ئۇرۇقلىرىنىڭ مېغىزى 5 مىسقالدىن، قىزىل گۈل
 $2\frac{1}{2}$ مىسقال، تەرەنجىبۇل 25 سەر، بىيە سۈيى 20 سەر،

سەغاق مىزاجلىق كىشىلەرگە — مېغىزلارنىڭ ئورنىدا
زەنجىۋىل، دارچىن، مەستىكى ھەر بىرى 2 مىسقالدىن
قوشۇلىدۇ.

تەييارلاش: تەرەنجىۋىلنى سۇدا، ئېرىتىپ، سۇزۇپ،
سۈيىگە بىيە سۈيىنى قوشۇپ قىيام قىلىپ، دورىلارنى
سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: 1 - 2 مىسقالدىن كۈنگە
2 قېتىم بېرىلىدۇ.

99 - نۇسخە: جەۋارش نارمىشكى

تەركىمى: نارمىشكى، زەنجىۋىل، قارىمۇچ، پىلپىل
ھەر بىرى 6 مىسقالدىن، لاچىندانە، گۈلدارچىن 8 مىس-
قال، سوقمولىيا 12 مىسقال، قەن 4 سەر، ھەسەل 17
سەر.

تەييارلاش: قەننى ھاجەت مىقدارى سۇ بىلەن
تازا ئوبدان قىيام قىلىۋېلىپ سەل ئىلماق بولغاندا
ھەسەلنى ۋە ئاندىن كېيىن دورىلارنى سوقۇپ ئارىلاش-
تۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن كۈنگە 2 قېتىم

بېرىلىدۇ.

100 - نۇسخە: ئىسكەنجىۋىل بوزۇرى

تەركىۋى: كىشۇش ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان، چىگىسەي
ئۇرۇغى. رۇمبېدىيان 5 مىسقال، كاسىن ئۇرۇغى بىر
سەر، ئۆتكۈر سىركە $13\frac{1}{2}$ سەر، قەن 45 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالاراق سوقۇپ، سىركە ۋە
باراۋەر مىقداردىكى سۇ بىلەن بىر كېچە - كۈندۈز چىلاپ،
ئەتىسى قوشۇلغان سۇ قالغىچە قاينىتىپ، سۈزۈپ سىقىپ،
سۈيىگە قەن سېلىپ قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ (قايناش
ئالدىدا كۆپۈك ئۆرلەيدۇ، بۇنى سۈزۈۋېتىش كېرەك).
ئىچىش مىقدارى: 1 - 2 سەردىن كۈنىگە بىر قېتىم
بېرىلىدۇ.

101 - نۇسخە: مەجۇنى خۇبۇسۇلەددىد (تومۇر پوقى مەجۇنى)

تەركىۋى: كابىل ھېلىلىسى پوستى، سېرىق ھە -
لىلە پوستى، قارا ھېلىلە، بەلىلە، ئامىلە، بەسپاسە، قا -
قىلە، ئۇدى ھىندى، ئىپار، كۈنجۈت 2 مىسقالدىن.
خۇبۇسۇلەددىد (تومۇر پوقى) 5 سەر، ھەسەل 20 سەر.
تەييارلاش: تومۇر پوقىنى ئالدى بىلەن 3 كېچە -
كۈندۈز سىركىگە چىلاپ قويغاندىن كېيىن، ئېلىپ سې -

رىق ماي بىلەن قورۇپ، يۇمشاق يەنجىلىدۇ. ياشقا دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تومۇر پوقى بىلەن قوشۇپ، ھەسەل ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن قىلىنىدۇ (6 ئايدىن كېيىن ئىستىمال قىلىشقا بولىدۇ).
يېمەش مىقدارى: كۈنىگە بىر قېتىم 2 مىسقال - دىن بېرىلىدۇ.

102 - نۇسخە: جەۋارىش بۇزۇرى

تەركىبى: چىڭسەي ئۇرۇغى، جۈۋىنە (ئالەخا) 2 مىسقالدىن، خولىنجان، گۈلدارچىن، قەلەمپۇر 3 مىسقالدىن، قورۇلغان زاغۇن ئۇرۇغى (ھەببۇر شاد) 2 مىسقال، ئارچا مېۋىسى (ئوبەل) 5 مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ 3 باراۋەر ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. چىنە ياكى شىشە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ. كۈنىگە بىر قېتىم ياغاچ قوشۇق بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تۇرۇش لازىم.
يېمەش مىقدارى: 3 مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم.

103 - نۇسخە: جەۋارىش مۇناسىبى

تەركىبى: ئاقلىغان كۈنجۈت بىر سەر، بوزۇغا، چىڭسەي ئۇرۇغى، زىرە، جۈۋىنە 2 مىسقالدىن، كۈندۈر،

زەنجىۋىل، پىلىپىل، قارسۇچ، دارچىن، قاقىلە 2 مىس-
قال، قەين 9 سەر.
تەييارلاش: بىر پىيالە سۇ بىلەن قىيام قىلىپ
دورلارنى سوقۇپ قىيام بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.
يىمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر قېتىم 3 مىسقال-
دىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

104 - نۇسخە: جەۋارىش مۇتەۋى مەئدە (ئاشقازاننى كۈچەيتىدىغان مەجۇن)

تەركىبى: رۇمبىدىيان، سېرىق ھېلىلە پوستى،
چوڭ قاقىلە، بەلىلە، كىچىك قاقىلە، ئامىلە، زەنجىۋىل،
مەستىكى، سۇزاپ، زىرە، قارىمۇچ، جۇۋىنە ھەر بىرى 5
مىسقالدىن، ناۋات 18 سەر.

تەييارلاش: دورلارنى سوقۇپ ناۋاتنى 2 پىيالە
سۇ بىلەن قىيام قىلىپ، ئۇستىگە دورىلارنى سېلىپ
تازا ئارىلاشتۇرۇپ چىنە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.
يىمىش مىقدارى: 3 مىسقالدىن كۈنىگە بىر قې-
تىم بېرىلىدۇ.

105 - نۇسخە: مائىل ئۇسۇل V

تەركىبى: كاسنى يىلتىزى، ئارپا بېدىيان، ئاق-
لانغان چۈچۈكبۇيا يىلتىزى، ئارپا بېدىيان ھەر بىرى
ئوخشاش مىقداردا، گۈلقەن لازىم مىقداردا.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، دورىدىن 4 ئىلىكچە ئۈستۈن قاينا قۇغدا بىر كېچە چىلاپ، ئەتە-سى قاينىتىپ، يېرىمى قالغاندا ماتا بىلەن سۈزۈپ سىقىپ تەييارلىنىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: كۈلۈك قوشۇپ بىر پىيالەدىن كۈنىگە 1 - 2 قېتىم ئىچىدۇ.

106 - نۇسخە: قۇرسى سۇمبۇل

تەركىبى: سۇمبۇل، ئىزخىر، سەلىخە 3 مىسقالدىن، زىراۋەلدىچىنى، قەسبۇسزەرىرە 3 مىسقالدىن، زەپەر، رۇمبى-دىيان 2 مىسقال، مۇرى مەككى، قۇستە تەلىخى، قارىمۇچ بىر مىسقالدىن، ئۇشەق يېرىم مىسقال، مۇقىل 1 مىسقال. تەييارلاش: مۇقىل بىلەن ئۇشەقنى مۇسەللەسكە چىلاپ ئېرىتىلىدۇ. قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئېرىتكەن دورىلار بىلەن قوشۇپ 2 فۇڭلۇق تەيىن چوڭلۇغىدا توقچاق تەييارلاپ سايدا قۇرۇتۇلىدۇ.
يىيىش مىقدارى: بىر مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم ئىستىمال قىلىنىدۇ.

107 - نۇسخە: قۇرسى ئالۋۇسى (ئۇچەي تويىلىش توقچىغى)

تەركىبى: چىڭسەي ئۇرۇغى، رۇمبىدىيان 15 مىسقال، ئەپسەنتىن 10 مىسقال، سەلىخە 20 مىسقال،

مۇرى مەككى، قارىمۇچ، قۇندۇز قەرى، ئەپيۇن
 $2 \frac{1}{2}$ مىقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ،
قايناقسۇ بىلەن كۈنگە بىر دانىدىن بېرىلىدۇ.

108 - نۇسخە: قۇرسى كوھلى

تەركىبى: سۈرمە، شادىج مەغۇل، خۇنسىياۋشان
ھەر بىرى 3 مىقالدىن. سېمىز ئوت، ئانار گۈلى، موز
2 مىقالدىن. كويدۇرۇلگەن بۇغا مۇڭگۈزى، ئاقاقىيا
1 مىقالدىن، لادەن، زەپەر يېرىم مىقالدىن، پىر-
سىياۋشان $1 \frac{1}{2}$ مىقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، گازىۋان سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ، بىر
پۇڭلۇق تېمىن چوڭلىغىدا توقچاق تەييارلاپ سايىدا
قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 2 - 3 دانىنى كۈنگە 1
قېتىم بېرىلىدۇ.

109 - نۇسخە: جەۋارشى كۇندۇر.

تەركىبى: كۇندۇر، ئانار گۈلى 1 سەردىن، قا-
رىمۇچ، جۈۋىنە، سۇمبۇل، ھىڭ، دۈمبەدىيان، سىمادان
ھەر بىرى 3 مىقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، 3 باراۋەر ھە-
سەلگە ئارىلاشتۇرۇپ، چىنە قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.
يېيىش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم
تاماقتىن ئىلگىرى بېرىلىدۇ.

110 - نۇسخە: جەۋارىش خەرنۇپ

تەركىبى: خەرنۇپ نەبىتى (تازىلانغان) 5 مىس-
قال، سىركىگە چىلانغان زىرە 5 مىسقال، ھەببۇل ئاس،
پىستە، بەللۇت، قورۇلغان يۇمىقاسۇت ئۇرۇغى، مەستىكى
ھەر بىرى 5 مىسقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ (ئەلگەكتىن ئۆتكۈز-
مەي) 3 باراۋەر ھەسەلنى بىر ئاز ئېرىتىپ ئۇستىگە
دورىلارنى سېلىپ، تازا ئارىلاشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ. چىنە
قاچىلاردا ساقلىنىدۇ.
يېيىش مىقدارى: كۈنىگە 1 - 2 قېتىم، 2 - 3
مىسقالدىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

111 - نۇسخە: سوپۇپى رۇممان (ئانار) ئۇرۇغى تالقىنى

تەركىبى: ئاچچىق ئانار ئۇرۇغى 8 مىسقال،
قەرەدمانا، يۇمىقاسۇت ئۇرۇغى ھەر بىرى 4 مىسقالدىن،
گەزمازەج، خەرنۇپ نەبىتى 2 مىسقالدىن، ئانار گۈلى،
سىماق 3 مىسقالدىن.

تەييارلاش: قەردمانا بىلەن يۇمغاقسۇت ئۇرۇغە -
 نى سىركىگە بىر كېچە - كۈندۈز چىلاپ، ئەتىسى ئېلىپ
 سايدا قۇرۇتۇپ قورۇلىدۇ. ئانار ئۇرۇغىمۇ قورۇلىدۇ.
 كېيىن ھەممە دورىلارنى قوشۇپ، يۇمشاق سوقۇپ ئەل -
 گەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.
 يىمىش مىقدارى: كۈنگە 3 مىسقالدىن قايناقسۇ
 بىلەن بېرىلىدۇ.

112 - نۇسخە: قۇرسى تاباشىر

تەركىبى: تاباشىر، بارتەك بىر مىسقالدىن، سەمغى
 ئەرەبى، كەتسە، نىشاستە، 2 مىسقالدىن، قىزىل گۈل
 بىر مىسقال، ئانار گۈلى بىر مىسقال.
 تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
 ئۆتكۈزۈپ، ئىسپۇغۇل لۇئابى بىلەن خېمىر قىلىپ، بىر
 فۇڭلۇق تىيىن چۆڭلۈغىدا توقچاق تەييارلاپ سايدا
 قۇرۇتۇلىدۇ.
 يىمىش مىقدارى: كۈندە 2 مىسقالنى بىر ياكى
 ئىككى قېتىمدا ئىچىلىدۇ.

113 - نۇسخە: قۇرسى ئۇد

تەركىبى: پىلىپىل، كاۋاۋىچىن 1 مىسقالدىن،
 سۇمبۇل، مەستىكى يېرىم مىسقالدىن، ئۇدى خام 4 مىس -
 قال، شېكەر 7 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، شېكەرنى بىر ئاز قايناقسۇدا ئېرىتىپ، دورىلارنى خېمىردەك قىلىپ، بىر فۇڭلۇق پۇل چوڭلۇغىدا قۇرس تەييارلىنىپ، سايمىدا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: بىر دانىدىن كۈنگە 3 قېتىم بېرىلىدۇ.

114 - نۇسخە: قۇرسى راسەن

تەركىبى: قەلەمپۇر 1 سەر، ئىپار 1 مىسقال،
گۈلدارچىن 2 مىسقال. قۇرۇق راسەن $\frac{1}{2}$ مىسقال مە.

تىكى ئەپيۇن، يەبرۇجى سەنەم (رېنىسك) $\frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئەپيۇننى بىر ئاز سۇ بىلەن ئېرىتىپ، دورىلارنى قوشۇپ جەمى 10 دانە قۇرس تەييارلاپ سايمىدا قۇرۇتۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنگە بىر دانىدىن بېرىلىدۇ.

115 - نۇسخە: مەتبۇخى تەمرى ھىندى

تەركىبى: سېرىق ھېلىسە، خىيارى شەلبەر بىر سەردىن، ئىت ئۇزۇمى 4 مىسقال، كاسەنى ئۇرۇغى 6 مىسقال،

خاڭگا ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى، ئەينۇلا 5 مىسقالىدىن،
تەمرى ھىندى $1\frac{1}{2}$ سەر، تەزەنجىۋىل 1 سەر، ئىلۇفەر،
بىنەپشە 4 مىسقالدىن.

تەييارلاش: خىيارى شەنبەر، تەمرى ھىندى، تەرەف
جىۋىلدىن باشقىلىرىنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە - كۈندۈز
4 چوڭ چىنە سۇغا چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى يېرىمى قالغى-
چە قاينىتىپ ئېلىپ، ماتادىن ئۆتكۈزۈپ، تازا سىقىپ
سۈيىگە سوقمايدىغان دورىلارنى سېلىپ تەمىنى ئوبدان
چىقىرىپ قايتا سۇزۇپ تەييارلىنىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 2-3 قېتىم بىر پىيالە
دىن ئىچىلىدۇ.

116 - نۇسخە: مەجۇنى ئاساناسىيا

تەركىبى: سۇمبۇل، قۇستە تەلىخى، زەپەر، مۇرى
مەككى، ئۆدبىلسان، ئەپيۇن، سەلىخە، قۇرۇتۇلغان بورە
جىگىرى ① ھەر بىرى بىر مىسقالدىن، غاپەس 2 مىسقال،
بىخ سۇس 3 مىسقال، ھەسەل 4 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ، مەجۇن تەييارلىنىپ،
چىنە قاچىلاردا ساقلىنىپ، 6 ئايدىن كېيىن ئىستېمال
قىلىنىدۇ.

① بورە جىگىرى قۇرۇت يەپ قالغان ياكى بەك كونا
بولماسلىقى لازىم.

يېيىش مىقدارى: تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە
كۈنىگە يېزىم مىسقالدىن بىر مىسقالغىچە ئىستىمال قىلىن-
دۇ، بالىلارغا بېرىشكە بولمايدۇ.

117 - نۇسخە: داۋائىل كوركەم

تەركىبى: ئاسارۇن، دوقۇ، ئەنسۇن، پەتەر سالىۇن،
رەۋەن، 4 مىسقالدىن، سۇمبۇل لەتىپ 6 مىسقال، قۇستە،
سەلىخە، ئىزخىر، ھەببى بىلسان 1 مىسقال، ئوردان
2 مىسقال، قويۇقلاشتۇرغان چۇچۇكبۇيا يىلتىز قاينات-
مىسى، جوئدە، مەپتىكى رۇمى، غاپەس 3 مىسقالدىن،
بىلسان يېغى 5 مىسقال، شاخ مارجان (كويۇرۇپ سالاىە
قىلىنغىنى) 4 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، كوپىكى ئېلىنغان ھەسەل بىلەن مەجۇن قىلىنىدۇ،
چىنە قاچىدا ساقلىنىدۇ.

يېيىش مىقدارى: كۈنىگە 1 - 2 مىسقالدىن
ھەسەل سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ.

118 - نۇسخە: ئىسكەنجىۋىل بۇزۇرى موتىدىل

تەركىبى: چىڭسەي ئۇرۇغى، كاسىنى ئۇرۇغى، ئارپا
بېدىيان 3 مىسقالدىن، بېدىيان يىلتىزى، چىڭسەي يىل-

تىزى 1 سەردىن، سىركە 5 سەر، شېكەر 12 سەر
(قەن بولسىمۇ بولىدۇ).

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ 3 2 سەر قايم
ناقسۇغا 4 سائەتچە چىلاپ قويۇپ، كېيىن يېرىمى قالغى-
چە قاينىتىپ، سۇزۇپ، سىقىپ قەن بىلەن سىركىنى
قويۇپ قىيام قىلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا
3 - 5 ئاش قوشۇقتىن ئىچىدۇ.

119 - نۇسخە: ئىسكەنجىۋىل بۇزورى ھار (ئىسسىق)

تەركىمى: ئوسارە غاپەس، رەۋەن 2 مىسقالدىن،
چىڭسەي، كاسىنى ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان، رۇمبېدىيان،
كۈشۈش ئۇرۇغى 5 مىسقالدىن، بىخ كەيىر پويىتى، بېدى-
يان يىلتىزى، چىڭسەي يىلتىزى 8 مىسقالدىن، سىركە
5 سەر، قەن 16 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ 2 چىڭ
(3 2 سەر) سۇ ۋە سىركىگە بىر كېچە چىلاپ، ئەتىسى
قاينىتىپ، يېرىمى قالغاندا سۇزۇپ، تازا سىقىپ، سۈيىگە
قەن سېلىپ قىيام قىلىپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا
3 - 5 ئاش قوشۇقتىن ئىچىلىدۇ.

120 - نۇسخە: شەرۋىتى دىنارى II

تەركىبى: بېدىيان يىلتىزى 2 سەر، چىگىسەي يىلتىزى 2 سەر، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 3 سەر (ئاقلاڭغان)، كاسىنى يىلتىزى 2 سەر، قىزىل گۈل خەمكى 1 سەر، زىرىخ 1 سەر، رەۋەن چىنى، كوشۇش ئۇرۇغى، ئەپتىم - جۈن 1 سەردىن، ئىزخىر 4 مىسقال.

تەييارلاش: كوشۇش ئۇرۇغى ۋە ئەپتىمۇنى چالا سوقۇپ، ئايرىم ھالدا بىر كەچىك خالتىغا سېلىپ ئاغزى تىكىلىدۇ. قالغان دورىلارنى چالا سوقۇپ 4 چوڭ چىنە سۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى يېرىمى قالغىدەك قاينىتىپ، سىقىپ، سۇزۇپ، تەييارلىغان خالتىنى ئۇنىڭغا تاشلاپ ئىككىلا قاينىتىپ، خالتا ئوبدان سىقىپ ئېلىندۇ ۋە 12 سەر قەن بىلەن قىيام قىلىنىدۇ. كېيىن رەۋەننى يۇمشاق سوقۇپ ئۈستىگە سېلىپ تەييارلىنىدۇ.

قېچىش مىقدارى: 3 - 5 ئاش قوشۇقتىن كۈنىگە 3 قېتىم ئىچىدۇ.

121 - نۇسخە: مائىل ئۇسۇل VI

تەركىبى: چىگىسەي يىلتىزىنىڭ پوستى 7 مىسقال، ئىزخىر 5 مىسقال، غاپەس 3 مىسقال، خوخاتىكەن، ئەپ سەنتىن، قىزىل گۈل 3 مىسقالدىن، ئوشەق، ئۇرۇقسىز

ئۇزۇم 20 مىسقال. سۇمبۇل، مەستىكى، ئۇردان، لەكى
 مەغسۇل، ئۇدى بىلسان ھەر بىرى 3 مىسقالدىن، بۇدۇشقا،
 بىخ كەبىر 3 مىسقالدىن، ئەنجۇر 10 دانە، قەن 9 سەر.
 تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، 32 سەر
 قايناقسۇغا بىر كېچە چىلاپ ئەتمىسى يېرىمى قالغىچە
 قاينىتىپ، سۇزۇپ، سىقىپ، سۈيىگە قەن سېلىپ تەييارلىنىدۇ.
 ئىچىش مىقدارى: 40 مىسقالغا بىر مىسقال ئاچ
 چىق بادام، بىر مىسقال تاتلىق بادام يېغىنى قوشۇپ
 كۈنىگە بىر قېتىم ئىچىدۇ.

122 - نۇسخە: زىياد (سۇيۇق مەلەم)

تەركىمى: ئوقۇت، رەۋەن، مومىيا (ئەسلى مومىيا)،
 بىنەپشە يېغى، گۈلى سوسەن يېغى، قىزىل گۈل يېغى، بابۇ-
 لە يېغى ھەر بىرى 3 مىسقالدىن.
 تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ياغلارنى
 بىرلەشتۈرۈپ، بىر ئاز قىزىتىلسا ھەممىسى ئارىلىشىپ
 دورا تەييارلىنىدۇ.
 ئىشلىتىلىشى: سىرتتىن ياغلايدۇ.

123 - نۇسخە: زىياد (سۇيۇق مەلەم)

تەركىمى: ئۇدى خام 2 مىسقال، بۇغداي كىپىكى،
 زىغىر، ھەبۇلغار، مۇقىل، مەستىكى 1 مىسقالدىن، گۈلى

سۈسەن يېغى، گۈل يېغى، يىنەپشە يېغى، موم يېغى ھەر
بىرى 2 مىسقالدىن
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ياغلارنى
بىرلەشتۈرۈپ بىر ئاز قىزىتقاندىن كېيىن دورىلارنى
قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.
ئىشلىتىلىشى: سىرتتىن ياغلاشقا بېرىلىدۇ.

124 - نۇسخە: قۇرسى ئەپسەنتىن

تەركىبى: ئەپسەنتىن 6 مىسقال، چىگىسەي ئۇرۇغى،
ئاسارۇن ھەر بىرى 3 مىسقال، بادام مېغىزى 5 مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك -
تىن ئۆتكۈزۈپ، بادام مېغىزى ئۈستىدىكى ئېپىز پوستى -
نى ئاقلاپ سوقۇپ دورىلار بىلەن ئېلىشتۇرۇپ، سۇ بىلەن
خېمىردەك قىلىپ قۇرسى تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.
يېمەش مىقدارى: كۈنىگە بىر مىسقالدىن بىر قېتىم.

125 - نۇسخە: مەتبۇخى ئەپتىمۇن (ئەپتىمۇن

قاينىتىلمىسى) II

تەركىبى: سانا 1 سەر، ئەپتىمۇن 6 مىسقال،
بالىنگۇ 4 مىسقال، پىرسىياۋشيان 2 مىسقال، بادام مېغىزى
2 سەر، گازىۋان 4 مىسقال، چۈچۈكبۇيا يىلتىزى 4 مىس -
قال، كاسىنى ئۇرۇغى 4 مىسقال، ئۈستۈخۇددۇس 2 مىسقال.

شېكەر 5 سەر، شاتەرە 1 سەر، قىزىل گۈل 2 مىسقال،
ئىت ئۆزۈمى 3 مىسقال، ئەينۇلا 10 دانە،

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ 3 چوڭ چىنە
قايناقسۇغا بىر كېچە چىلاپ ئەتمىسى يېرىمى قالغىچە
قاينىتىپ سۇزۇپ، تازا سىقىپ، سۈيگە شېكەر سېلىپ
تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: بىر پىيالىدىن كۈنگە 2 - 3
قېتىم بېرىلىدۇ.

126 - نۇسخە: مەجۇنى پودىنە

تەركىمى: قۇرۇتۇلغان پۇدىنە 5 مىسقال، سۇزۇپ
يوپۇرمىقى، قارىمۇچ، جوۋىنە، قەزەدىمانا، ھىڭ، زەنجىر
ۋىل، دارچىن، پىلىپ 5 مىسقالدىن، ھەسەل 15 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ ھەسەل بىلەن ئېلىشتۇرۇپ مەجۇنى تەييارلىنىدۇ.
يىمىش مىقدارى: تاماقتىن 1 - 2 سائەت كېيىن
1 - 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

127 - نۇسخە: شەرۋىتى ئەپسەنتىن

تەركىمى: ئەپسەنتىن، غارىقۇن (سىم) ئەلگەكتىن
سۇرۇلگىنى، ھاشا، سەبەرە 4 مىسقالدىن، چىڭشەي ئۇرۇغى،
بېدىيان يىلتىزى 2 مىسقال، مەشنىكى، ئىزخىر، پىننە،

زەپەر، رۇمبېدىيان، سۇمبۇل، ئاسارۇن، سازەج ھىندى

ھەر بىرى $1\frac{1}{2}$ مىسقالدىن، يالپۇز 3 مىسقال، چۈچۈك-

بۇيا يىلتىزى 3 مىسقال، ھەسەل 15 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، 5 جىڭ

(80 سەر) سۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى يېرىمى

قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ، تىرىپىنى سىقىپ سۇزۇلىدۇ،

كېيىن ھەسەل قوشۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 2 - 3 قېتىم 2 ئاش

قۇشۇقتىن ئىلمان ھالدا ئىچىدۇ.

128 - نۇسخە: ھەببى رەۋەن (رەۋەن كۇمۇلىسى)

تەركىبى: رەۋەن، غارىقۇن (سىم ئەلگەكتىن

سۇرۇپ ئۆتكۈزۈلگىنى) 2 مىسقالدىن، تۇربۇت 4 مىسقال،

زىراۋەند گىردە، مۇقىل 1 مىسقالدىن، رۇمبېدىيان

$\frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ، ئەلگەكتىن

ئۆتكۈزۈپ قايناقسۇ بىلەن خېمىردەك قىلىپ ھەب

تەييارلىنىدۇ.

يىمىش مىقدارى: كەچتە 2 مىسقالدىن يېرىلىدۇ.

129 - نۇسخە: شەرۋىتى بۇزۇرى I

تەركمۇ: بېدىيان يىلتىزنىڭ پۈستى، چىڭسەي يىلتىزى ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، بېدىيان، رۇمبېدىيان، چىڭسەي ئۇرۇغى 5 مىسقالدىن، قەن 7 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە 32 سەر قايناقسۇغا چىلاپ، ئەتىسى يېرىمى قالغىچە قاينە-تىپ، سۇزۇپ، تىرىپىنى مىچىپ سۇزۇپ، سۈيىگە قەن سېلىپ قىيام قىلىندۇ.
ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 3 ئاش قوشۇغىدىن ئىچىدۇ.

130 - نۇسخە: شەرۋىتى بۇزۇرى II

تەركمۇ: كاسنى ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى، تەرخەمەك ئۇرۇغى ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، كاسنى يىلتىزى 1 سەر، قەن 12 سەر.
تەييارلاش: چالا سوقۇلغان دورىلارنى 40 سەر قايناقسۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ ئېلىپ تىرىپىنى تازا سىقىپ، سۇزۇپ سۈيىگە قەن سېلىپ قىيام قىلىندۇ.
ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 4 قېتىم، ھەر قېتىمدا 3 ئاش قوشۇغىدىن ئىچىدۇ.

131 - نۇسخە: كەلكىلانەج I

تەركىبى: مازەرىيۇن (مۇدەببەر قىلىنغان)، سېرىق ھېلىلە پوستى 5 مىسقالدىن، ئەپسەنتىن ئوسارسى 3 مىسقال، چىغىرىتماق يىلتىزى، كاسىن ئۇرۇغى، قىزىل گۈل، خاڭگا، ئۇرۇغى، قويۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قاينا تەمىسى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، پۇنۇس، خىيارى شەنبەر، تەرەنجىۋىل ھەربىرى 15 مىسقالدىن.

تەييارلاش: پۇنۇس، خىيارى شەنبەر ۋە تەرەنجىۋىلنى ئايرىم قاينا قىسقا چىلاپ، تەمىنى چىقىرىپ، سۈزۈپ، ئۈستىگە قالغان دوزىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئېلىشتۇرۇپ تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 - 3 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

132 - نۇسخە: كەلكىلانەج II

تەركىبى: سېرىق ھېلىلە پوستى، قارا ھېلىلە، لىسانى ئەسلىپۇر، پىلىپلىمۇيە، زىرە، رەۋەن ھەربىرى 3 مىسقالدىن، تۇربۇت 9 مىسقال، ھىندى تۇزى، چىڭ-سەي ئۇرۇغى، شەترەنجى ھىندى، لاھۇر تۇزى، پىلىپلى، جۇۋىنە ھەربىرى 3 مىسقالدىن، ئامىلى 27 سەر،

تەييارلاش: ئامىلىنى 24 جىڭ سۇدا 8 جىڭ قالغىچە قاينىتىپ، سىم ئەلگەكتىن سۇزۇپ ئۆتكۈزۈل-
گەن سۇيىگە 4 جىڭ شېكەر سېلىپ قىيام قىلىنىدۇ.
قىيامغا بىر ئاز ھەسەل بىلەن 12 سەر كۇنجۇت يېغى
ئارملاشتۇرۇلىدۇ، قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ،
ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ قوشۇپ تازا قوچۇپ تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر قېتىم 2 - 3 مىس-
قالدىن بېرىلىدۇ.

133 - نۇسخە: قۇرسى مازەرىيۇن I

تەركىمى: مازەرىيۇن (مۇدەببەر) (49 - نۇسخە -
دىكىدەك)، مازەرىيەن يوپۇرمىغى، غارىقۇن، غاپەس ئو-
سارسى ھەربىرى 1 مىسقالدىن، قىزىل گۈل، خاڭكا
ئۇرۇغى 2 مىسقالدىن، كاسىن ئۇرۇغى 1 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەل-
گەكتىن ئۆتكۈزۈپ، قايناقسۇ بىلەن خېمىردەك قىلىپ
10 دانە توقچاق تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر دانىدىن بېرىلىدۇ.

134 - نۇسخە: قۇرسى مازەرىيۇن II

تەركىمى: مازەرىيۇن مۇدەببەر 3 مىسقال، سېرىق
ھېلىلە پوستى 3 مىسقال، ئارپا ئۇنى 3 مىسقال.

تەييارلاش: يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ قايناقسۇ بىلەن خېمىردەك يۇغۇرۇپ قۇرس تەييارلاپ سايدا قۇرۇتۇلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 1 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

135-نۇسخە: قۇرسى ئەنەبەر بارسى

تەركىمى: چۈچۈك بۇيا يىلتىزى، قوغۇن ئۇرۇ-غىنىڭ مېغىزى، خاڭكا ئۇرۇغى ھەربىرى 3 مىسقالدىن، قىزىل گۈل، تەرەنجىۋىل 6 مىسقالدىن، كوشۇش ئۇرۇغى، قويۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈك بۇيا يىلتىزى، تاباشىر، كاسىن ئۇرۇغى، سۈمبۇل، غاپەس ئوسارسى، ئوردان، رەۋەن، لەكىمەغۇل، ئىزخىر، ئەپسەننىن ھەربىرى 2 مىسقالدىن، زەپەر يېرىم مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەرەنجىۋىلنى بىرئاز سۇ بىلەن ئېرىتىپ سۇزۇپ، خېمىردەك يۇغۇرۇپ، قۇرس تەييارلاپ سايدا قۇرۇتۇپ ئىستىمال قىلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر مىسقالدىن، ئانار ياكى ئالما شەرىتى (47-48-نۇسخە) لەر بىلەن بېرىلىدۇ.

136 - نۇسخە: شەرۋىتى كۇشۇش

تەركىبى: قىزىل گۈل ئۇرۇغى، رۇمبىدىيان 2 مىسقالدىن، كۇشۇش (سېرىق ئوت) ئۇرۇغى، ئارپا بېدىيان، كاسىنى ئۇرۇغى، سېرىق ئوت گۈلى، خاڭگا ئۇرۇغى، قوغۇن ئۇرۇغى، كاسىن يىلتىزى ھەر بىرى 3 مىسقال - دىن، شېكەر 9 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە قايناقسۇغا چىلاپ، ئەتىسى يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، ماتادىن ئۆتكۈزۈپ، سىقىپ، سۈزۈپ، سۈيگە قەن سېلىپ قىيام تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش ھەقدارى: ھەر قېتىمدا بىر سەردىن كۈنىگە 2 - 3 قېتىم ئىچىدۇ.

دىققەت: سېرىق ئوت گۈلى ۋە ئۇرۇغىنى ئاي - رىم - ئايرىم سوقۇپ بىر خالىغا ئېلىپ تىكىپ، شەرۋەت قايناپ بولۇش ئالدىدا خالتا بىلەنلا قازانغا تاشلاش كېرەك.

137 - نۇسخە: قۇرسى غاپەس I

تەركىبى: غاپەس ئوسارسى 20 مىسقال، سۈم - بۇل 10 مىسقال، تاباشىر 4 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىككى-
كەكتىن ئوتكۇزۇپ، بىر ئاز سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ،
5 فۇڭلۇق تىيىن چوڭلۇغىدا توقچاق تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە بىر قېتىم بىر دانە -
دىن بېرىلىدۇ.

138 - نۇسخە: قۇرسى بۇزۇرى

تەركىمى: بىخ كەبىر، زىراۋەند، ئۇسقودرىسۇن،
ئۇشەق، ئىگىر، سۇمبۇل، فەرەنجى مىشكى، قارىمۇچ،
قۇست، سۇزاپ، ئۇشەن، گۈلىسۇسەن ھەر بىرى 5
مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ بىخ كەبىر
سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ، توقچاق تەييارلاپ، سايە -
دا قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

139 - نۇسخە: ئوردان قۇرسى

تەركىمى: ئوردان 12 مىسقال، ئىرسا، يالىۇز
يىلتىزنىڭ پوستى، ئۇزۇن زىراۋەندى ھەر بىرى 2 مىس-
قالدىن.

تەييارلاش: يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈ -

زۇپ، ئىسكەنجىۋىل بىلەن خېمىر قىلىپ، توقىچاق ياساپ
 سايدا قۇرۇتۇپ تەييارلىنىدۇ.
 يېيىش مىقدارى: كۈنىگە بىر مىسقالدىن
 بېرىلىدۇ.

140 - نۇسخە: قۇرسى كەبىر

تەركىۋى: ئۇزۇن زىراۋەند 2 مىسقال، بىخ كە -
 بىر پۇستى، ئۇشەق ھەر بىرى 4 مىسقالدىن، پەنجى
 ئەگگۈشت ئۇرۇغى 6 مىسقالدىن.
 تەييارلاش: ئۇشەقنى كونا سىركىدە ئېرىتىپ،
 قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ
 يۇغۇۇپ توقىچاق تەييارلىنىدۇ.
 يېيىش مىقدارى: ئىسكەنجىۋىل بىلەن بىر
 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

141 - نۇسخە: قۇرسى گۈلنار

تەركىۋى: گۈلنار (ئانار گۈلى) ① 10 مىسقال،
 گىلى ئەرمىنى، سەلىخە، سەمىقى، ئەرەبى ھەر بىرى 4
 مىسقالدىن، قىزىل گۈل، ئاقاقچا ھەر بىرى 3 مىسقالدىن،
 كەتىرا بىر مىسقال.

① ئانار گۈلىنىڭ سايدا قۇرۇتۇلغىنى.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگە كىسى
ئۆتكۈزۈپ، ئاناركۇلى قايناتقان سۇ بىلەن يۇغۇرۇپ
تەقچاق تەييارلىنىدۇ. سايدا قۇرۇتۇش كېرەك (قۇرس
چوڭلۇقى 2 فۇڭلۇق تىيىندەك بولسا بولىدۇ).
يىيىش مىقدارى: 3 دانىدىن كۈنىگە 3 قېتىم
بېرىلىدۇ.

142- نۇسخە: سۇپۇپى تىن

تەركىبى: ئىشاستە (قورۇلغان) 4 مىسقال، گۈل
يېغى بىلەن قورۇلغان سەمغى ئەرەبى 3 مىسقال، كەتىرا،
گىلى ئەرەبى، خۇنسىياۋشان، ئىسپۇغۇل (سوقۇلمايدۇ)،
سېمىز ئوت ئۇرۇغى، بارتەك (قورۇلغان) 3 مىسقالدىن،
بالەڭكۇ (سوقۇلمايدۇ).
تەييارلاش: سوقۇشقا تېگىشلىكلىرىنى يۇمشاق
سوقۇپ، ئارىلاشتۇرۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.
يىيىش مىقدارى: 1-2 مىسقالدىن كۈنىگە
3 قېتىمدىن بىر سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ.

143- نۇسخە: قۇرسى زەرىنخ

تەركىبى: سېرىق زەرىنخ، قىزىل زەرىنخ (كۈش-
تە فېلىنغان)، كويدۇرۇلگەن مىس، ئوچۇرۇلگەن ھاك،

مۇزا ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، ئىپپۇن، زەپەر ھەر بىرى بىر مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، پاقا يوپۇرمىغىنىڭ سۈيى بىلەن 2 فۇڭلۇق تەيىندەك قۇرس تەييارلىنىدۇ.

ئىشلەتمىشى: تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە يېرىم مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ.

144 - نۇسخە: مەجۇنى فىلافى II

تەركىبى: ئاقمۇچ، پىلىپىل ھەربىرى 15 مىسقالدىن، ئۇدى بىلەن 7 يېرىم مىسقال، سۇمبۇل، ھۇماما ھەربىرى تۆت مىسقالدىن، زەنجىۋىل، چىڭسەي ئۇرۇغى، سىالىيۇس، سەلىخە، ئاسارۇن، راسەن ھەر بىرى بىر مىسقالدىن، ھەسەل پۈتۈن دورىلار ئېغىرلىقى بىلەن 3 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەك-تىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئېلىشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ. يىمىش مىقدارى: ھەر تاماقتىن كېيىن بىر مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

145 - نۇسخە: مەجۇنى جەۋارش خەۋزى

تەركىبى: كوندۇر، جۇۋىنە، مەستىكى، سەئدە كۆپى، سۇمبۇل ھەر بىرى 5 مىسقالدىن، خەرنۇپ نەبتى،

ئانارگۇلى، يۇلغۇن مۇئەسسى (داۋا) 2 مىسقالدىن، قۇرغاق
ئۇزۇم ئۇرۇغى 3 سەر، ھەببۇل ئاس 6 سەر، قىزىق
بىلەن ھەسەل پۇتۇن دورىنىڭ 3 باراۋىرىدە.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈلىدۇ. قەنى بىر ئاز سۇ بىلەن قىلىنىپ قىيام
قىلغاندىن كېيىن ئۇستىگە ھەسەلنى قۇيىمىز. تازا ئاردا-
لاشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، دورىلارنى سېلىپ مەجۇن
تەييارلىنىدۇ.

يېمەش مىقدارى: كۈنىگە 3 - 4 مىسقالدىن
قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ.

146 - نۇسخە: مەجۇنى تۇرۇت

تەركىمى: مەھمۇدە (سوقمۇنىيا)، تۇرپۇت ھەر بىرى
10 مىسقالدىن. قاقىلە، لاچىندانە، زەنجىۋىل، دارچىن،
گۈلدارچىن، قەلەمپۇر، قارىمۇچ، نارمىشكى 5 مىسقالدىن.
زىرە، جۇۋىنە، قارا شېكەر 10 سەر. ھەسەل 50 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلنى قاچىغا ئېلىپ، قايناقسۇ ئۇستىگە
قويۇپ، بىر ئاز ئېرىتىپ ئۇستىگە قارا شېكەرنى سېلىپ،
تازا ئارىلاشقاندىن كېيىن، دورىلارنى قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ
مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يېمەش مىقدارى: كۈنىگە 5 مىسقال (كەچتە)
بېرىلىدۇ.

147 - نۇسخە: شىيافى كوھلى

تەركمۇۋى: ئالار گۈلى، موزا، سۈرمە، زەمچى،
ئاقاقىيا، سەمغى ئەرەبى ھەربىرى 3 مىسقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ، سۇ بىلەن سۈڭ شامچىلىرى ياساپ
قۇرۇتۇپ، ھاجەت بولغاندا ئىشلىتىلىدۇ.
ئىشلىتىلىشى: بوۋاسىر قاناشنى توختىتىش ئۈچۈن
مەقئەتكە قويۇلىدۇ.

148 - نۇسخە ھەبىي مۇقىل I

تەركمۇۋى: سېرىق ھېلىلە پوستى 30 مىسقال
(كالا يېغىدا قورۇپ) كەھرىبا 1 سەر، مۇقىل 4 سەر.
تەييارلاش: مۇقىلنى جۈسەي سۇيىدە ئېرىتىپ،
دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، قوشۇپ ھەب تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ
(قەۋزىيەتلىك بوۋاسىرغا بېرىلىدۇ).

149 - نۇسخە: ھەبىي مۇقىل II

تەركمۇۋى: سېرىق ھېلىلە، كابدل ھېلىلىسى پوستى،
قارا ھېلىلە، ئامىلە، مۇقىل، كەھرىبا، كويىدۇرۇلگەن

مارجان، كويدۇرۇلگەن سەدەپ ھەربىرى 2 مىسقالدىن تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-تىن ئۆتكۈزۈپ، مۇقىلنى جۈسەي سۈيى بىلەن ئېرىتىپ، دورىلارنى يۇغۇرۇپ ھەب تەييارلىنىدۇ. يىمىش مىقدارى: كۈنگە 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

150 - نۇسخە: ئىترىپىل مۇقىل

تەركىمى: كابۇل ھېلىلىسى پوستى 6 مىسقال، بەلىلە پوستى 6 مىسقال، ئامىلە پوستى 6 مىسقال، مۇقىل 9 سەر. تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ بولغاندىن كېيىن مۇقىلنى جۈسەي سۈيى بىلەن ئېرىتىپ، ئۈستىگە دورىلارنى قوشۇپ، ھەسەلدىن ھاجەت مىقداردا قوشۇپ، خېمىر قىلىپ، قوناقتەك ھەب تەييارلىنىدۇ.

151 - نۇسخە: مەجۇنى لوپۇنى سەغىر

تەركىمى: بوزىدان، قىزىل ۋە ئاق بەھمەن، لىسانى ئەسپىر، خولسۇنجان، دارچىن، ھەربىرى 2 مىسقالدىن، تەرخەمەك ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى، خاڭگا ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى 3 مىسقالدىن، پىندۇق مېغىزى، بادام مېغىزى، پىستە مېغىزى، ئاقلاڭغان كۈنجۈت، چەلغوزە مېغىزى، قوغۇن ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى، كوكنار ئۇرۇغى ھەربىرى 6 مىسقالدىن. ھەسەل دورىلار ئومۇمى ۋەزىندىن 3 ھەسسە. تەييارلاش: مېغىز دورىلارنى ئايرىم-باشقا دورىلارنى

ئايرىم ھالدا يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئوتكۇزۇلىدۇ.
 ھەسەلنى پار ئۈستىدە قويۇپ ئېرىتىپ ئالدى بىلەن
 مېغىز دورىلارنى، ئۇنىڭدىن كېيىن باشقا دورىلارنى سېلىپ
 تازا ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
 يېيىش مىقدارى: كۈنگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا
 2 مىسقالدىن.

152 - نۇسخە: قۇرسى كاكىنەج

تەركىمى: تۈز ۋە ئەگرى خاڭكا ئۇرۇقلىرى بىر
 سەر، كاكىنەج 3 مىسقال، چىڭسەي ئۇرۇغى، شوھدانە
 گىلى ئىرىمىنى، سەمغى ئەرەبى، خۇنسىياۋشيان، بەزۇرۇل -
 مەنجى 2 مىسقال، ئەپيۇن بىر مىسقال.
 تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
 ئوتكۇزۇپ، بىيە ئۇرۇغىنىڭ لۇئابىدا بىر مىسقالدىن
 توقىچاق تەييارلىنىدۇ.
 يېيىش مىقدارى: 1 دانىدىن شەرۋىتى بىنەپشە
 (74 - نۇسخە) بىلەن بېرىلىدۇ.

153 - نۇسخە: بىنادىق بۇزۇرى

تەركىمى: قوغۇن، خاڭكا، قاپاق ئۇرۇقلىرىنىڭ
 مېغىزى، ئاق لەيلى ئۇرۇغى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، بە -
 زۇلبەنجى، بادام مېغىزى، نىشاستە، كۆكنار ئۇرۇغى، قويۇق -
 لاشتۇرۇلغان چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قايناتمىسى 2 مىسقالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ (مېغىرلاپ) ئايرىم سوقۇلىدۇ) ئۇسۇغۇل لۇئابىدا بىر مىسقالدىن توقچاق تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا بىر دانىدىن.

154 - نۇسخە: قۇرسى زىياىتۇس

تەركىمى: تاباشىر، قويۇقلاشتۇرۇلغان چۈچۈكبۇيا قايناتمىسى 5 مىسقالدىن، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، قارا سونا ئۇرۇغى 15 مىسقالدىن، يۇمىلاقسۇت ئۇرۇغى، پاقا يو - پۇرمىغىنىڭ ئۇرۇغى، گىلى ئەرمىنى 3 مىسقالدىن، ئاق سەندەل، ئانار گۈلى، سىماق، سەمىغى ئەرەبى ھەربىرى 2 مىسقالدىن، كافۇر يېرىم مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، سېمىز ئوت ئۇرۇغى قايناتقان سۇ ۋە ئانار سۈيى بىلەن خېمىر قىلىپ، توقچاق تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنگە بىر مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

155 - نۇسخە: مەجۇنى بەللۇت

تەركىمى: شاھى بەللۇت، سۇندى ھىندى، موزا، خولىنجان، گۈلدارچىن، كۈندۈز 5 مىسقالدىن، ھەسەل

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ھەسەل بىلەن مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنگە 2 مىقالدىن بېرىلىدۇ.

156 - نۇسخە: مەجۇنى ئەقرەب (چايان مەجۇنى)

تەركىبى: ئەقرەب (چايان) ① $3\frac{1}{2}$ مىقال.

جېنتيانا $\frac{1}{2}$ 1 مىقال، زەنجىۋىل 1 مىقال، قارىتۇچ، پىلىپىل ھەربىرى 2 مىقالدىن، كاكنەج 5 مىقال، قۇندۇز قەرى 4 مىقال، ھەسەل ئومۇمى دورىلار ۋەزىنىدىن 2 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنگە بىر قېتىم $\frac{1}{5}$

مىقال (2 فۇڭ مىقداردا) نى چىڭسەي ئۇرۇغىنىڭ سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ.

① چاياننى ساپال ياكى چىنە قاچىغا سېلىپ، ئاغزىنى قىزىل گىل بىلەن مەھكەم بېكىتىپ ئوتى توختاپ بىر ئاز سو-ۋۇغان تونۇردا بىر كېچە قويۇپ كويدۇرۇپ تەييارلانغىنى ئىشلەتلىنىدۇ.

157 - نۇسخە: مەجۇنى ھەجەرلىيە ھود

تەركىمى: قاپاق ئۇرۇغنىڭ مېغىزى، خاڭكا
ئۇرۇغنىڭ مېغىزى 5 مىسقالدىن، ھەجەرلىيە ھود
5 سەر. ھەسەل دورىلار ۋەزىنىدىن 2 باراۋەر.
تەييارلاش: دورىلارنى سۇقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ
زۇپ ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم 2 مىسقالدىن
بېرىلىدۇ.

158 - نۇسخە: چايان يېغى (رەۋغەنى ئەقرەب)

تەركىمى: زىراۋەند مۇدەھەرەج، جېنتىيانا، سەئىدى
كوفى، بىخ كەبىر ھەربىرى 7 مىسقالدىن، چىلان 50
دانە، ئاچچىق بادام يېغى 9 سەر (گۈل يېغى بولسىمۇ
بولىدۇ). چوڭ چايان (سېرىق ئىشەك) 10 دانە.
تەييارلاش: ئالدى بىلەن دورىلارنى سۇقۇپ بىر
شىشكە سېلىپ، ئۇستىدىن 9 سەر ئاچچىق بادام يېغى
قۇيۇپ، ئاغزىنى بېكىتىپ، ئاپتاپتا 2 ھەپتە قويۇلىدۇ
(تۆمۈز كۈنلىرىدە بىر ھەپتە تۇرسىمۇ بولىدۇ). دورىلار-
نىڭ تەمى ياخشى چىقىپ بولغاندىن كېيىن 10
دانە تىرىك چاياننى ياغ ئۈستىگە تاشلاپ شىشنى

ئوبدان سىكتىپ، يەنە ھەپتە ئاپتاپتا قويۇپ، سۈزۈپ تەييارلاپ ساقلىنىدۇ.

ئىشلىتىش: دوۋىساقىتىكى تاشنى پارچىلاش ئۈچۈن، سۇيىدۇك يولىدىن تەۋىپنىڭ كورسەتمىسى بويىچە تامغۇزۇلىدۇ.

159 - نۇسخە: مائىل ئۇسۇل VII

تەركىمى: بېدىيان، چىڭسەي، كاسنى يىلتىزى
1 سەردىن، ئىزخىر 1 سەر، رۇمبېدىيان، زىرە، سۇزۇپ
5 مىسقالدىن، جۇۋىنە، سورۇنجان 3 مىسقال، قۇستى
شىرىن، قەسبۇسزەرىرە، مەستىكى ھەربىزى بىر مىسقالدىن،
گۈلقەن 3 سەر، ئىنەك پىتى يېغى 1 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سۇقۇپ 32 سەر سۇدا
بىر كېچە چىلاپ، ئەتىسى يېرىمى قالغىچە قاپىتىپ،
سۈزۈپ گۈلقەن بىلەن ئىنەك پىتى يېغىنى قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: ئادەتتىكى چاي پىيالىسىدە بىر
پىيالىدىن كۈنگە 1-2 قېتىم ئىچىدۇ.

160 - نۇسخە: مەتبۇخى سورۇنجان

تەركىمى: سېرىق ھېلىلە پوستى 1 سەر، بىسە-
پايەج 4 مىسقال، شاتەرە 6 مىسقال، سورۇنجان مىسرى

5 مىسقال، كاسىن ئۇرۇغى، بېدىيان، قىزىلگۈل 4 مىس-
قالدىن، سانا 15 مىسقال، بىنەپشە، ئىلۇفەر 6 مىس-
قالدىن، خىيارى شەنبەر 8 مىسقال، تەرەنجىۋىل 3 سەر،
بادام يېغى 3 مىسقال.

تەييارلاش: خىيارى شەنبەر بىلەن تەرەنجىۋىلنى
ئايرىم قاچىغا سېلىپ، ئېرىگىدەك قايناقسۇ قويۇپ
قويۇلىدۇ. باشقا دورىلارنى چالا سوقۇپ 2 چوڭ چىنە
قايناقسۇغا بىر كېچە چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى يېرىمى
قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ تازا سىقىپ بولغاندىن
كېيىن بۇنىڭ ئۈستىگە سۇزۇلگەن خىيارى شەنبەر بىلەن
تەرەنجىۋىل ۋە بادام يېغىنى قوشۇپ تەييارلىنىدۇ.
ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم (ئەتىگەن ۋە
كەچتە) بىر چاي پىيالىدىن ئىچىلىدۇ.

161 - نۇسخە: قۇرسى بەۋلىددەم (قان سىمىش تابلېتى)

تەركىبى: تەرخەمەك ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى 12 مىس-
قال، نىشاستە، كەتىرا، ئانار گۈلى، سوك، خۇنسىياۋشان،
سەمغى ئەرەبى ھەربىرى 3 مىسقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ، سېمىز ئوت سۈيى بىلەن ياكى سېمىز
ئوت ئۇرۇغىنى قايناتقان سۇ بىلەن توقچاق تەييارلىنىدۇ.
يىمىش مىقدارى: كۈنىگە 1 - 2 قېتىم بىر مىس-
قالدىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

162 - نۇسخە: قۇرسى گۈل (قىزىل گۈل تابلېتى) I

تەركىبى: سۈمبۇل، ئۇدى ھىندى، ئاسارۇن،
ئەپسەنتىن، ئاچچىق بادام مېغىزى 3 مىسقالدىن، چىڭ-
سەي ئۇرۇغى 1 مىسقال، قىزىل گۈل 6 مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ چىڭسەي ئۇرۇغىنىڭ سۈيى بىلەن قۇرس
تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتىلىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 مىسقالدىن بىر
مىسقالغىچە بېرىلىدۇ.

163 - نۇسخە: قۇرسى گۈل (قىزىل گۈل تابلېتى) II

تەركىبى: قىزىل گۈل 6 مىسقال، پاقا يوپۇرمىغىنىڭ
ئۇرۇغى، سەمى ئەرەبى 4 مىسقالدىن، نىشاستە، زىرىخ،
تاباشىر ھەربىرى 2 مىسقالدىن، سېمىز ئوت ئۇرۇغى
2 مىسقال، كەتىرا، سۈمبۇل، زەپەر، رەۋەن ھەربىرى بىر
مىسقالدىن، كافۇر بىر ئارپا مىقدارى.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ سېمىز ئوت ئۇرۇغىنىڭ قايناتقان سۈيى بىلەن
قۇرس تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتىلىدۇ.
يېمىش مىقدارى: بىر مىسقالدىن كۈنىگە 2 قېتىم.

164 - نۇسخە: داۋائىل تۇرۇد

تەركىبى: ئىچى كاۋاك ئاق تۇرۇد بىر سەر،
زەنجىۋىل، مەستىكى 5 مىسقالدىن، قەن 20 سەر،
تەييارلاش: دورىلارنى قەن بىلەن قوشۇپ يۇم-
شاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.
يىمىش مىقدارى: 1-2 مىسقالدىن كۈنگە
1 قېتىم ئىستىمال قىلىنىدۇ.

165 - نۇسخە: قۇرسى غاپەس II

تەركىبى: غاپەس 3 سەر، قىزىل گۈل 6 سەر،
تاباشىر 4 سەر،
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ قايناقسۇ بىلەن خېمىر قىلىپ تىخىچاق
تەييارلىنىدۇ.
يىمىش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنگە بىر
قېتىم بېرىلىدۇ.

167 - نۇسخە: قۇرسى مەرۋايىت

(مەرۋايىت تابلېتى)

تەركىبى: تەشمىگەن مەرۋايىت، لەھىيەتۇتتىس
ئۇسازسى، بار تەڭ ئۇرۇغى 2 مىسقالدىن، تاباشىر،

قىزىلگۈل 6 مىسقالدىن، گىلى ئىرىمىنى 4 مىسقال،
قاپاق ئۇرۇغىنىڭ مېغىزى، تۇز ۋە ئىگىرى خاڭگا ئۇرۇق-
لىرى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، كەھرىبا 3 مىسقالدىن، كافۇر
ئاق سەندەل بىر مىسقالدىن.

تەييارلاش: مەرۋايىت سالايە قىلىنىدۇ، باشقا
دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزگەندىن
كېيىن، مەرۋايىتنى قوشۇپ ھەببۇل ئاس سۈيى
بىلەن خېمىر قىلىپ قۇرس تەييارلاپ سايىدا قۇرۇ-
تىلىدۇ.

يېمىش مىقدارى: بىر يېرىم مىسقالدىن كۈنىگە
بىر قېتىم.

168 - نۇسخە: قۇرسى خەشخاش (كوكنار تابلېتى)

تەركىمى: كوكنار ئۇرۇغى، قاپاق ئۇرۇغىنىڭ
مېغىزى، سېمىز ئوت ئۇرۇغى، ئىگىرى، تۇز خاڭگا ئۇرۇ-
غى، بىيە ئۇرۇغى ھەر بىرى 6 مىسقالدىن، سەمغى ئە-
رەبى، تاباشىر، قىبرىس گىلى، ھۇمماز ئۇرۇغى ئۈچ
مىسقالدىن، نىشاستە 2 مىسقال، قىزىل گۈل 5 مىسقال،
كافۇر $\frac{1}{2}$ مىسقال.

تەييارلاش: مېغىز دورىلارنى بىر قورۇپ، باشقا
دورىلار بىلەن قوشۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن

ئۆتكۈزۈپ ئىسپۇغۇل لۇتابى بىلەن چوقچاق تەييارلى-
نىدۇ.

يېمىش مىقدارى: 2 مىسقالدىن كۈنىگە 1 قېتىم
سەھەردە ئالما ياكى بىيە سۈيى بىلەن بېرىلىدۇ.

169 - نۇسخە: مەجۇنى زەرئۇنى

تەركىبى: پىلىپىل، قارىمۇچ، زەنجىۋىل، گۈل
دارچىن، خولىنجان بىر سەردىن، سېرىق تۇدرى، ئاق
تۇدرى، ئاق بەھمەن، قىزىل بەھمەن، بوزىدان، لىسانى
ئەسپىر، سەئدە، سۇمبۇل 3 سەردىن، ھەسەل 90 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلنى قاينىدە بويىچە ئېرىتىپ، مە-
جۇن تەييارلىنىدۇ. 40 كۈندىن كېيىن يېمىشكە بولىدۇ.
يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم 2 مىسقالدىن
بېرىلىدۇ.

170 - نۇسخە: مەجۇنى بۇزۇرى

تەركىبى: سەۋزە ئۇرۇغى، چامغۇر ئۇرۇغى، پە-
ياز ئۇرۇغى، لوبۇ ئۇرۇغى، پىچان ئۇرۇغى (بىدە ئۇرۇ-
غى)، زاغۇن، ئاقلىغان كۈنجۈت، قارىمۇچ، سېرىق تۇد-
رى، قىزىل تۇدرى، ھەببى زەلەم، لىسانى ئەسپىر ھەر
بىرى بىر مىسقالدىن، شاقاقۇل، بەھمەن، بوزىدان،

قۇستە زەنجىۋىل، پىلىپىل ھەر بىرى بىر مىقالدىن،
ھەك بىر مىقال، ھەسەل ئالتە سەر.
تەييارلاش: ئادەتتىكى ئۇسۇل بىلەن مەجۇن
تەييارلىنىدۇ.

يىمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم 2 - 3
مىقالدىن بېرىلىدۇ.

171 - نۇسخە: مەجۇنى لوۋبۇي كەبىر

تەركىۋى: تاتلىق بادام مېغىزى، ياڭاق مېغىزى،
زاراڭزا مېغىزى، ھەببى زەلەم مېغىزى، پىندۇق مېغىزى،
چەلغۇزە مېغىزى، ئارجىل مېغىزى، كىكنار ئۇرۇغى بىر
سەردىن، ئاق تۇرى، قىزىل تۇردى، سېرىق تۇردى،
كۈنجۇت مېغىزى، زەدەك (سەۋزە) ئۇرۇغى، زاغۇن، پىياز،
چامغۇر ئۇرۇغى، ئاق ۋە قىزىل بەھمەن ھەر بىرى بىر
سەردىن، زەنجىۋىل، پىلىپىل، كاۋاۋىچىن، گۈلدارچىن،
سۇڭلىپ، شاقاقۇل، شياڭدوزا ئۇرۇغى ھەر بىرى بىر
سەردىن، ھەسەل 28 سەر، پىياز سۈيى 8 سەر، خۇ-
لىنجان بىر سەر.

تەييارلاش: پىياز سۈيى بىلەن ھەسەلنى بىللە
قاينىتىپ، ھەسەل قالغاندا ئېلىپ، قالغان دورىلارنى
يۇمشاق سوقۇپ، قائىدە بويىچە مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يىمىش مىقدارى: تەييار بولغاندىن كېيىن قە-

رىق كۈنگىچە ھەر كۈنى بىر قېتىم ياغاچ قوشۇنى سىلىنى
قوچۇپ قويىلىدۇ. شىشە ياكى چىنىلەردە ساقلىنىپ كۈن-
نىگە 2 قېتىم 3 - 2 مىسقالدىن بېرىلىدۇ.

172 - نۇسخە: مەتبۇخى شاتەرە

تەركىبى: سېرىق ھېلىلە، كابۇل ھېلىلىسى، بىر
لىلە، ئامىلە پوستى 5 مىسقالدىن، شاتەرە، شۇمشە 7
مىسقالدىن، سانا 4 مىسقال، نىلۇفەر، مامىرانچىن 1
مىسقالدىن، ئەپتىمۇن، قىزىلگۈل 3 مىسقالدىن، بېدىيان،
كاسىن ئۇرۇغى، چىگىسەي ئۇرۇغى، بىستىپايەج، ئۈستۈ-
خۇددۇس، يالپۇز ھەر بىرى 2 مىسقالدىن، چىلان،
ئەينۇلا ھەر بىرى 20 دانە، كاسىن كۆكى بىر سىقىم.
تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، بىر كېچە
3 جىگىچە سۇغا چىلاپ قويۇپ، ئەتىسى
 $\frac{1}{3}$ قىسمى قالغىچە قاينىتىپ، سۇرۇپ سىقىپ سۈيگە

تەمرى ھىندى، پۇلۇس، تەرەنجىۋىلىدىن $\frac{1}{2}$ سەرنىڭ
ئايىرىم تەمى چىقىرىلغان سۈيى قوشۇلىدۇ.

ئىچىش مىقدارى: بىر - ئىككى پىيالە مىقداردا
كۈنگە 2 - 1 قېتىم ئىچىدۇ.

173 - نۇسخە: داۋائىللۇك

تەركىمى: لىكى مەقسۇل، قۇستە تەلخى، ئىزخىر
چىچىكى، تېرمىس، ھەبۇلغار، شۇمشە، قارىمۇچ 10
مىسقالدىن، رەۋەن چىنى 15 مىسقال، ھەسەل 2
ھەسسە.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەك-
تىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئېلىشتۇرۇپ مەجۇن تەييار-
لىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كۈنىگە 2 قېتىم 2 مىسقالدىن
بېرىلىدۇ.

174 - نۇسخە: سۇپۇپى مۇقەۋۋى مەئدە

تەركىمى: پىننە، بېدىيان ھىزىرى 4 مىسقال-
دىن، لاچىندانە 3 مىسقال، شەترەنجى ھىندى
 $1 \frac{1}{2}$ مىسقال، يۇمىقاسۇت ئۇرۇغى، ئانار ئۇرۇغى
 $3 \frac{1}{2}$ مىسقالدىن، قىزىلگۈل، قەرەدمانا 3 مىسقالدىن،
قارىمۇچ، پىلىپىل، نەمەكى لاھورى ھىزىرى 4 مىس-
قالدىن.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن تىن ئۆتكۈزۈپ تالقان تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: تاماقتىن بۇرۇن 2 - 1 مى -
قالدىن كۈلگە 3 - 2 قېتىم قايناقدۇ بىلەن ئىچىدۇ.

175 - نۇسخە: مەجۇنى لوغانزىيا

تەركىبى: شەھى مەنزەل 5 مىسقال، ياۋا پىياز (ئەسلى)، غارىقۇن، سومونىيا، قارا خەربىق، ئاق خەربىق، ئوسقۇر، ئوسقۇر -
 $4 \frac{1}{2}$ مىسقالدىن، پىلىپىل، جۈندە، ئاقچۇچ، قارىسۇچ،
جاۋۇش، زەپەر، دارچىن، بىستىپايەج، قۇندۇز قەرى،
مۇرى مەككى، پەتەرسالىيۇن، ئوستخوددۇس 2 مىسقال -
دىن. ئەپتىمون $3 \frac{1}{2}$ مىسقال، كامادۇس $3 \frac{1}{2}$ مىس -
قال، سەبرە 3 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئومۇمى دورىلار ۋەزنى بىلەن 3 باراۋەر كېلىدىغان ھەسل قوشۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ. 40 كۈندىن كېيىن ئىستىمال قىلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: ھەر كۈنى ئاخشامدا 3 - 2 مىسقالدىن بىر قېتىم بېرىلىدۇ.

176 - نۇسخە: قۇرسى مور

تەركىبى: مۇرى مەككى 3 مىسقال، قىزىل 10-
بىيا 5 مىسقال، سۇزاپ، پىننە، قەرەدمانا، مىشكى تارا-
مىشى، ئۇردان، ھىڭ، جاۋۇشىر، سەككىنەج 2 مىسقالدىن.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، 2 مىس-
قال تۇبەل (ئارچا مېۋىسى) قايناتقان سۇ بىلەن خېمىر
قىلىپ توقىچاق تەييارلاپ سايىدا قۇرۇتىلىدۇ.
يىمىش مىقدارى: كۈنگە 2 مىسقالدىن 5 كۈن
ئۇدا بېرىلىدۇ.
دققەت: ھامىلدارلارغا بەرسە بالىسى چۈشۈپ
كېتىدۇ.

177 - نۇسخە: مەلھىمى داخىلىون

تەركىبى: رۇفتى رۇمى، راتىيانەج، ئاق موم 8
مىسقالدىن، قۇننە 4 مىسقال، زەيتۇن يېغى 30 مىسقال.
تەييارلاش: مومنى زەيتۇن يېغى بىلەن ئېرىتىپ،
قالغان دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئارىلاشتۇرۇپ ماي دورا
تەييارلىنىدۇ.
ئىشلىتىش: تاشقى تەرەپتىن جاراھەت ۋەزەملەرگە
بېرىلىدۇ.

178 - نۇسخە: مەتبۇخى ھېلىلە II

تەركىۋى: سېرىق ھېلىلە، كابىل ھېلىلىسى، بەلىلە،
ئامىلىنىڭ پوستى 15 مىسقالدىن، قارا ھېلىلە 15
مىسقال، يىنەپشە، ئىلۋېر، كاسىن ئۇرۇغى، شاتەرە، سانا
5 مىسقالدىن، چىلان 50 دانە، سەرپىستان 40 دانە،
ئەينۇلا 20 دانە، تەمرى ھىندى، تەرەنجىۋىل ھەر بىرى
2 سەردىن، پۇنۇس 15 مىسقال، خىيارى شەنبەر بىر
سەر، بادام مېغىزى بىر سەر.

تەييارلاش: { 38 - نۇسخە بىلەن ئوخشاش.
ئىچىش مىقدارى: }

179 - نۇسخە: مەلۇمى ئىچىمداچ II

تەركىۋى: ئۇپا 5 مىسقال، ئاق موم 1 سەر،
گۈل يېغى 5 مىسقال.

تەييارلاش: ئالدى بىلەن تومۇر قاچىغا مومنى
سېلىپ، ئوتتا قويۇپ ئېرىتىپ، ئۈستىگە گۈل يېغى قوشۇلۇپ-
دۇ. ئوت ئۈستىدىن ئېلىپ ئۇپنى قويۇپ تازا ئارىلاش-
تۇرۇپ تەييارلىنىدۇ (ئەگەر سوغاق خۇسۇسىيەتلىك قىلماقچى

بولغاندا $\frac{1}{2}$ مىسقال كاپۇر قوشۇلىدۇ).

ئىشلىتىش مىقدارى: تاشقى تەرەپتىن جاراھەتلەر-
گە بېرىلىدۇ.

180 - نۇسخە: ئىترىپىل غۇدۇدى (بەزى ئىترىپىلى)

تەركمۇى: قارا ھېلىكە 15 مىقال، بەلىكە، ئامىلىكە،
توربۇت 7 مىقالدىن، ئەپتىمۇن 1 سەر، ئۇستۇخۇددۇس،
قوپىنىك قۇرۇتۇلغان بويۇن بىزى 5 مىقالدىن،
سانا 4 مىقال، غارىقۇن، شەترەنجى ھەندى، ئوشىدىر
3 مىقال، زورەنبات 3 مىقال، رۇمبىدىيان، گۈل دارچىن،
سۇمبۇل، قەلەمپۇر، جويۇز، لاچىندانە، مەستىكى 2 مى-
قالدىن، بىستاپايەج 5 مىقال، ھەسەل 30 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئېلىشتۇرۇپ ماسچۇن تەييارلىنىدۇ
(5 مىقال بادام يېشى قوشۇۋەتسە تېخىمۇ ياخشى).
يېيىش مىقدارى: 5 مىقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم
بېرىلىدۇ.

181 - نۇسخە مائۇلجىبىن

تەركمۇى: ئەپتىمۇن، ئۇستۇخۇددۇس ھەر بىرى
بىر سەردىن، ھېلىكە پوستى 2 سەر، شاتەرە، گازۇئان، بىستە-
پايەج، سانا، بادەرەنجىبۇيا 5 مىقالدىن، غارىقۇن، توربۇت
2 مىقالدىن، سىركە 8 سەر، ئۆشكە سۇتى 12 سەر،
شېكەر 1 سەر، تەرەنجىبۇل 2 سەر، بادام مېغىزى 1 سەر
تەييارلاش: ئەپتىمۇن، ئۇستۇخۇددۇستىن باشقىلىرىدە

نى سىركە بىلەن 3 چوڭ چىنە سۇغا چىلاپ قويغاندىن كېيىن (ئەپشەمۇننى خالتىغا ئېلىپ تاشلاپ قويىلىدۇ)، ئۇستوخۇددۇسىنى قوشۇپ يېرىمى قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ تىرىپىنى سىقىپ سۈيىگە شېكەر، تەرەنجىۋىل، سۈتنى قۇيۇپ بىر قاينىتىپ ئېلىپ، تادام مېغىزنى پەنچىپ قوشۇۋېتىلىدۇ (تەرەنجىۋىلنى ئالدى بىلەن ئېرىتىپ سۇزۇش كېرەك).
ئىچىش مىقدارى: 1 - 2 چاي پىمالدىن كۈندىگە 1 - 2 قېتىم ئىچىلىدۇ.

182 - نۇسخە: مەلھىمى زەڭگار

تەركىبى: زەڭگار بىر ھەسسە، ئەنزۇرۇت، تۇشەق يېرىم ھەسسەدىن، ھەسەل ئومۇمى دورىلار ۋەزنى بىلەن تەڭ، تەييارلاش: دورىلارنى سىركىدە ئىزىپ ئۇستىگە ھەسەلنى قۇيۇپ، تازا ئارىلاشتۇرۇپ مەلھەم دورا تەييارلىنىدۇ.
ئىشلىتىش مىقدارى: تاشقى تەرەپتىن ئىشلىتىشكە بېرىلىدۇ. قىزىتمىسى بارلارغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

183 - نۇسخە: مەتبۇخى سانا (سانا قايناتمىسى)

تەركىبى: سانا 4 مىسقال، شاتەرە 3 مىسقال، تەمرى ھىندى 2 مىسقال، ھېلىبە پوستى 3 مىسقال،

بىخ كەبىر پوستى $1\frac{1}{2}$ مىسقال، چىلان، سەرپىستان

15 دانىدىن، ئىت ئۇزۇمى، كاسىن ئۇرۇغى، قىزىل گۈل،
ئاق لەيلى 3 مىسقالدىن، تەرەنجىۋىل 15 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سوقۇپ، بىر گىچە
2 چوڭ چىنە سۇغا چىلاپ قويۇپ يېرىمى قالغىچە قاي-
تىشىپ، ماتادىن ئۆتكۈزۈپ، سىقىپ سۈرۈپ تەييارلىنىدۇ.
تىنچىش مىقدارى: پۈتۈن دورىنى 3 كە بۆلۈپ
ياكى بىراقلا ئىچىدۇ.

184 - نۇسخە: مەتبۇخى تەبىئىيەت II

تەركىبى: سېرىق ھېلىلە، بەلىلە، كابىل ھېلىلىسى-
نىڭ پوستلىرى 14 مىسقالدىن، قارا ھېلىلە 7 مىسقال،
ئامىلە 5 مىسقال، ئۇستۇخۇددۇس 5 مىسقال، بىيە قېقى
1 سەر، زىرىخ 4 سەر، قىزىل گۈل 5 مىسقال، ئاق
سەندەل 3 مىسقال، كاسىن ئۇرۇغى بىر سەر، ئىلۇفەر 4
مىسقال، گازىۋان 1 سەر، بادىرەنجىۋىيا 15 مىسقال،
ئەبىتىمۇن 2 سەر، بادام مېغىزى 4 سەر، سېرىق ئوت
ئۇرۇغى 1 سەر، سۈمبۇل 5 مىسقال، قەلەمپۇر 2 مىسقال،
شاتەرە 1 مىسقال، بىستىپايەج 4 مىسقال، ئوشنە 3 مىسقال،
خىيارى شەنبەر 1 سەر، تەرەنجىۋىل 4 سەر، سىركە 2 سەر،
شېكەر 16 سەر، لاچىندانە 3 مىسقال، بىدىمىشكى ئەرەقى،

كازىۋان ئەرەقى، بادىرەنجىبويى ئەرەقى، دارچىن 2 مىس-
قال، ئەينۇلا 4 سەر.

تەييارلاش: دورىلارنى چالا سۇقۇپ، سىركە ۋە
ئەرەقلىرىگە چىلاپ ئەتسى 6 جىڭ سۇ بىلەن يېرىمى
قالغىچە قاينىتىپ، سۇزۇپ شېكەرنى سېلىپ يەنە بىر
قاينىتىپ تەييارلىتىدۇ. قالغان ئۇسۇلى (20-نۇسخىدىكىدەك).
ئىچىش مىقدارى: كۈنىگە 4 سەر، يېرىم ئىسسىق
ھالدا ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

185 - نۇسخە: مەجۇنى بالادۇر II

تەركىمى: سۇمبۇل، ئۇرۇقسىز ئۇزۇم، زەپەر، سە-
لىخە، سازەنجى ھىندى، ئەپتىمۇن، ئىزخىر، ھەببى بىل-
سان، زىراۋەند، قىلەمپۇر، زەنجىۋىل، سەبىرە، مۇقىل
ھەر بىرى 8 مىسقالدىن، بالادۇر ھەسلى ①، مەستىكى،
غارىقۇن 5 مىسقالدىن، بېدىيان يىلتىزى 27 سەر، سىركە
ئومۇمى دورا ۋەزىنىدىن 3 باراۋەر.

تەييارلاش: 29 - نۇسخە بىلەن ئوخشاش.
يېمىش مىقدارى: بىر مىسقالدىن كۈنىگە بىر
قېتىم ئىچىلىدۇ.

① بالادۇر ھەسلى: بالادۇرنى قىزىتىلغان ئامپۇر بىلەن
قىسىپ تۇرۇپ ئېقىتىپ چىقارغان شىلمىلىق سۈيى بولۇپ، زە-
ھەرلىك تەسىرى كۈچلۈك، بەدەنگە تىگىپ كەتسە كويۇرىدۇ.
تۇتۇنى بۇرۇنغا كىرىپ كەتسە زەھەرلەيدۇ. ئىشلەشتە بۇ نۇق-
تىلارغا دىققەت قىلىش لازىم.

186 - نۇسخە: تەرياقى فارۇق

تەركىۋى: مۇرى مەككى، راتيانەج، جاۋۇشېر
4 مىسقال (بۇلار يىلىم دورىلار بولغاچقا ئال-
دى بىلەن يېتەرلىك مىقداردىكى گۈلاپ سۇيىدە ئېرىتىدۇ).
دارچىن ئەرەقى 4 مىسقال، مومىيا، ئەنبەر، مەس-
تىكى، كۈندۈز، سەمغى ئەرەبى 2 مىسقال، بىلسان يېغى
10 مىسقال، تېشىلىمىگەن مەرۋايىت، قىزىل ياقۇت، زۇم-
رەت، ھىقىق، كەھرىبا، سۈنئى دىگىزىيا (ياداتاش) 4
مىسقالدىن، لاجىۋەرد، ھەجەرى ئەرەبىنى (يۇيۇلغان)، پىلە
(قىرىلغان)، ھەبۇلغار، جېنتىيانا، زىراۋەند تەۋىل، قۇستە
تەلىخى، ئارپا بېدىيان يىلتىزى، ئەپتىمۇن، ئۇدى قىمارى،
پارپى (جەدۋار)، ئىزخىر، رەۋەن، سۈنبۇل، ياپچان، سە-
رىق ھېلىلە پوستى، ئۇستۇخۇددۇس، زەپەر، دۇرۇنەج
ئەشرەبى، ئۇدى سەلب، ئىناقىرقەرھ، رىسالىيۇس،
پوستى بىخ كەبىر، سازەنجى ھىندى، زورەنباد، غارىقۇن
بەرەنجا سەپ، بابونە مەر بىرى 4 مىسقالدىن، قىزىل
گۈل 60 مىسقال، ئىپار 2 مىسقال، ھەسەل پۈتۈن
دورىلار ۋەزىنىدىن 3 باراۋەر.

تەييارلاش: يىلىم دورىلار ئەرەق بىلەن ئېرىتىدۇ.

لىنىدۇ. مەدەن جىنىسلىق دورىلار سالاھىيە قىلىنىدۇ. زەپەر،
ئىپار، قۇندۇز قەرى ئايرىم سوقۇلىدۇ. قالغان دورىلارنى
يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، باشقا دورىلارنى
ئارىلاشتۇرۇپ ھەسەلگە قوشۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ. چىنە
ياكى مىرلانغان ساپال قاچىلارغا يېرىم كەلگىدەك قاچە -
لىنىپ ئارىغا 3 - 5 ھەپتە كومۇلسە تەييار بولىدۇ.
ئىشلىتىلىشى: 1 - 2 مىسقالغا قەدەر كۈنىگە بىر -
ئىككى قېتىم ئىستىمال قىلىنىدۇ.

187 - نۇسخە: تەرياقى گىلى مەختۇم

تەرگەۋى: گىلى مەختۇم، ھەبۇلغار بىر سەردىن،
ھەسەل 6 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى سېرىق ياغ بىلەن مايلاپ،
يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ھەسەل بىلەن
مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يېيىش مىقدارى: بىر مىسقال قايناقسۇ بىلەن
يېرىلىدۇ (قېتىم سانى تىۋىپنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە
بەلگىلىنىدۇ).

188 - نۇسخە: تەرتاقى ئەرەبە

تەرگەۋى: زىراۋەند تەۋىل، ھەبۇلغار، مۇرمەككى
باراۋەردىن، ھەسەل جەمئى ۋەزىندىن 2 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئارىلاشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ. يېمىش مىقدارى: بىر مىسقال قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ. (بۇ دورىنى تەييارلاپ 2 يىلغىچە ئىشلەتكىلى بولىدۇ).

189 - نۇسخە: تەرياق I

تەركىبى: ھەبىي بىلسان، زۇفا، ياۋا چامغۇر ئۇرۇغى، ئاقمۇچ، قارىمۇچ، پىلىپىل، ئىگىر، رۇمبىدىيان، يەتەر سالىيۇن، ئاسارۇن، زىرە، بەگىگى دىۋانە (بەزۇ - رۇلبەنجى) 4 مىسقالدىن، سۇمبۇل، ئىزخىر 6 مىسقالدىن. تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، 3 باراۋەر ھەسەل بىلەن يۇغۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: بىر مىسقالدىن ئەھۋالغا قاراپ بىر قانچە قېتىم بېرىلىدۇ.

190 - نۇسخە: تەرياق II

تەركىبى: سىيادان، ھازار ئىسپەند، زىرە 2 مىسقالدىن، جېنتىيانا، زىراۋەند بىر مىسقالدىن، ئاقمۇچ، مۇرى ھەككى بىر يېرىم مىسقالدىن، ھەسەل 33 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلگە ئېلىشتۇرۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يىيىش مىقدارى: پۇرچاق چوڭلىقىدا ئېلىپ رەيھان شەرۋىتى بىلەن بېرىلىدۇ. قېتىم سانى زەھەرلەشش ئالامەتلىرىگە قاراپ بەلگىلىنىدۇ.

191 - نۇسخە: مەجۇنى سوم (سامساق مەجۇنى)

تەركىبى: ئاقلانغان سامساق 9 سەر، زەنجىۋىل، كېلىپ، قارىمۇچ، قەلەمپۇر، دارچىن، كاۋاۋىچىن، جويۇز، ئاقىر قەرھا ۋە خولىنجان 2 مىسقالدىن، زەپەر 1 مىسقال، گۈل يېغى 1 سەر.

تەييارلاش: سامساقنى سۇقۇپ $13\frac{1}{2}$ سەر كالا سۇ- تىدە تاكى سۇت سىڭىپ بولغىچە قاينىتىلىدۇ. ئۇلدىن كېيىن $13\frac{1}{2}$ سەر ھەسەل بىلەن قايتا قىيام قىلىنىدۇ. قىيام بولغاندىن كېيىن قازاننى ئېلىپ گۈل يېغى ئېلىش- تۇرۇلىدۇ. دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ ئەلگەكتىن ئۆتكۈ- زۇپ ئۈستىگە سېلىپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يىيىش مىقدارى: زەھەرلىك ھاشارەتلىر چاققاندا 2 - 3 مىسقالدىن كېسەلنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ بىر قانچە قېتىم بېرىلىدۇ. مەئىدىنى، جىگىرنى ۋە باھنى كۈچلەندۈ- رۈشكە بېرىلگەندە 3 مىسقالدىن كۈنىگە بىر قېتىم بېرىلىدۇ.

192 - نۇسخە: تەرياقى سەرتان

تەركىبى: كويدۇرۇلگەن سەرتان ① بىر سەر، كۇندۇر،
جىنتەيانا 5 مىسقالدىن، ھەسەل 4 سەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ ھەسەل بىلەن مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
يېمەش مىقدارى: بىرىنچى قېتىم بىر مىسقال،
2 - قېتىم 2 مىسقالدىن، كېيىنچە ئاشۇرۇپ كۈنگە
4 مىسقالغا يەتكۈزۈلىدۇ.

193 - نۇسخە: ھەبىي مۇقەۋۋى باھ

تەركىبى: بەسباسە، قەلەمپۇر، زەپەر، موچىرەس،
ئاق شېكەر 2 مىسقالدىن، كۇمۇش كۈشتىسى $2\frac{1}{2}$ مىسقال.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ ئوقۇت چىرگۇغىدا
ھەب تەييارلىنىدۇ.
يېمەش مىقدارى: 3 - 5 دانىدىن كۈنگە بىر
قېتىم بېرىلىدۇ.
① سەرتاننى كويدۇرۇش ئۇسۇلى ئوپكە سىل كېسىلىدە
كورستىلگەن.

194 - نۇسخە: ھەبىي ئىمساك

تەركىبى: جويۇز، كەتىرا، شاقاقۇل، تانكار
(دانىكا) 4 مىسال، سىر 2 مىسال.
تەييارلاش: دورىلارنى سوقۇپ سۇ بىلەن ماش
چوغلۇغدا ھەب تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: تاماقتىن ئىلگىرى كۈنگە بىر
قېتىم بېرىلىدۇ.
(تەشئالىق پەيدا بولۇپ، بىرەر ئۆزگىرىش بولسا
سۇت ئېچكۈزۈش كېرەك، مەنى بالدۇر كېلىشىنى داۋا -
لاشتا ئۇنۇملۇك دورا).

195 - نۇسخە: مەجۇنى ئازاراقى

تەركىبى: سۇغا، سۈتكە چىلاپ تىلى ئېلىنغان
كۈچۈلا 6 مىسال، زورەنباد، ئۇستۇخۇددۇس، كەتىرا،
نارجىل (نارىيل)، چەلغوزە مېغىزى، شاقاقۇل 3 مىسالدىن،
لاچىندانە 2 مىسال، ئاق سەندەل، قەلەمپۇر بىر مىسال،
شاكالسىز ئامىلە، قارا ھېلىلە 5 مىسالدىن، ھەسەل
دورىلار ۋەزىندىن 3 باراۋەر.
تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەلنى ئېرىتىپ قوشۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.
ئىشلىتىلىشى: پەي، گوشلەرنى چىگىتىش، پالەچ،

مەقۇل، ئىرقۇنىسا، بەل ئاغرىغى، جىنسى ئاجىزلىق،
ۋىدۇك تامچىلاپ كېلىشلەرنى ۋە ئەپيۇن خۇمارىنى
اۋالاش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

مىقدارى: 12 ياشتىن تۆۋەنلەرگە بېرىلمەيدۇ.

ئوغلارغا كۈنىگە $\frac{1}{2}$ مىسقال بىر قېتىم بېرىلىدۇ. مىقدارى

ارتۇق بولۇپ كەتسە زەھەرلەيدۇ. ئىشلىتىشتە تىۋىپنىڭ
ۋەرسەتمىسى بىلەن ئىستىمال قىلىنىشى لازىم.

ئۇچۇلىنى مۇدەببەر (زەھەرسىز) قىلىش ئۇسۇلى:

ئالدى بىلەن كۈچۈلىنى 3 كۈن قىزىق سۇغا
سېلىپ تۇرۇپ پىچاق بىلەن ئۈستىدىكى بىر قات تۈكلەش
مەۋتى قىرىپ تاشلىنىدۇ. ئۇندىن كېيىن كۈچۈلا چۆك-
مىدەك سۈتكە 7 كۈن چىلاپ قويغاندىن كېيىن ئېلىپ،
ئىسسىق سۇ بىلەن بىر قانچە قېتىم يۇيۇپ تازىلىنىدۇ
سۈتكە چىلغاندا سۇت ئۇيۇپ قالىدۇ. ئەگەر كۈچۈلا
يەنىمۇ قالسا ئۈستىگە يەنە سۇت قۇيۇپ قويۇش كېرەك.
ئۇندىن كېيىن پىچاق بىلەن كۈچۈلىنىڭ قىرىدىن بويلاپ
لېپاقلاپ كېسىلگەندە ئوتتۇرىسىدىن ئاق "تىلى" يەنى
مەھرى چىقىدۇ. ئۇ ئېلىپ تاشلىنىدۇ ۋە ئوتقا سېلىپ
ويىدۇرۇۋېتىلىدۇ (چۈنكى بۇنى ھەر قانداق جانلىقلار
بىلەن سالسا دەرھال ئۆلىدۇ)، تەييار بولغان كۈچۈلا ئاپ-

ايتا قۇرۇتۇلىدۇ. سوقۇشقا ئوڭاي بولسۇن ئۈچۈن
مەكەكلەپ قويۇلىدۇ.

كۈچۈلنى زەھەرسىزلەندۈرۈشنىڭ يەنە بىز ئۇسۇلى:
ۈچۈلنى 2 - 3 كۈن سۇغا چىلاپ ئۈستىدىكى پوستىنى
مىرىپ تازىلاپ بولغاندىن كېيىن ئىكەك بىلەن يۇمشاق
مەكەپ قېلىنراق رەختىن ياسالغان خالتىغا ئېلىپ كالا
ئۈتىگە سېلىپ قاينىتىلىدۇ. خالتا قازان تىگىگە تەگ-
مىلىك ھالىتى بىلەن ئېسىپ قويۇلىدۇ. 2 - 3 سائەت
اينىتىپ ئېلىپ سايىدا قۇرۇتۇپ كېرەكلىك مىقداردا
ېلىپ سوقۇپ دورىغا قوشۇلىدۇ (كۈچۈلا مۇدەببەر قىلىش-
نىڭ باشقا چارىلىرىمۇ بار ئەمما ئانچە ئۇنۇملۇك ئەمەس).

196 - نۇسخە: ھەبىي تازاراقى I

تەركىبى: قارىمۇچ، پىلىپىل، زەنجىۋىل، قەلەمپۇر،
ھويۇز، نەسپاسە بىر ھەسسەدىن، كۈچۈلا (مۇدەببەر قىلىش-
نى) 2 ھەسسە.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەل ياكى بېدىيان ئەرەقى بىلەن خېمىر
ئىلىپ 2 دانە قارىمۇچ چوڭلۇغىدا كۈمۈلاچلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى ۋە مىقدارى: ئىشلىتىلىشى 195 -
نۇسخىغا ئوخشاش. كۈلىگە بىر قېتىم 5 - 7 دانىدىن
بىرىلىدۇ.

197 - نۇسخە: ھەببى ئازاراقى II

تەركىبى: قارىمۇچ، مۇدەببەر قىلىنغان كېۋىچىلا
ھەر بىرى بىر سەردىن، پارپى. بىر مىسقال، سەمىقى
ئەرەبى 2 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ بېدىيان ئەرەقى بىلەن قارىمۇچ چىرىلغۇدا
ھەب تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىلىشى ۋە مىقدارى: مەلى تۇتالماستىق،
تامچىلاپ سىچىش، پالەچ، لەقۋا ۋە ھول سوغاقتىن
بولغان ئاجىزلىقلارغا كۈنگە بىر قېتىم، 5 - 7 دانىدىن
بېرىلىدۇ. 12 ياشتىن تۆۋەنلەرگە بېرىلمەيدۇ.

198 - نۇسخە: مەجۇنى قەمبىل

تەركىبى: قەمبىل، سېرىق ھېلىلە پوستى، شاكال -
سىز ئامىلە، نوربۇت، زەنجىۋىل، دەرەمەنە تۈركى باراۋەر
مىقداردا، ھەسەل دورىلار ۋەزىندىن 3 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سوقۇپ، ئىلگەكتىن
ئۆتكۈزۈپ، ھەسەل بىلەن مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

ئىشلىتىش مىقدارى: ھەر خىلدىكى ئۇچەي مەددە
قۇرۇتلىرىنى چۈشۈرۈشكە:

12 ياشتىن يۇقۇرلار بىر مىسقالدىن 2 مىسقالغىچە.

12 ياشتىن 5 ياشقىچە $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن $\frac{1}{2}$ 7

فۇڭغىچە.

5 ياشتىن تۆۋەنلەرگە $\frac{1}{2}$ مىسقالدىن $\frac{1}{2}$ 2 فۇڭغىچە.

(2 ياشتىن تۆۋەنلەرگە بېرىلمەيدۇ).

دېققەت: دورا ئىچكەندە كېسەلنىڭ بۇرۇننى تۈسەپ قويۇش (دورنىڭ پۇرۇغى بۇرۇنغا كىرمەسلىكى) كېرەك. شۇنىڭدەك دورا ئىچىۋاتقاندا ياغلىق دورىلار مەنى قىلىنىدۇ.

199 - نۇسخە: سۇپۇپى سۇزاك (سوزنەك تالقنى 1)

تەركىمى: كاۋاۋىچىن 5 مىسقال، قەلەي كۈش -

تسى 20 مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى 25 مىسقال شېكەر قوشۇپ،

بۇ شاق سۇقۇپ ئىلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ ئالغان تەييارلىنىدۇ.

يېمىش مىقدارى: كونا سىزلام (سوزنەك) كېسەللىككە

كۈندە سەھەردە 3 مىسقالنى بىر سەر قېتىق بىلەن

بېرىلىدۇ.

200 - نۇسخە: سۇپۇپى سۇزالە II (سۆز ئەڭ تالقىنى 2 -)

تەركىمى: شورا، قاقىلە ئۇرۇغى باراۋەر مىقداردا.
تەييارلاش: يۇمشاق سوقۇپ تالقان تەييارلىنىدۇ.
يېمىش مىقدارى: يېڭى سىزلام كېسىلىدە 2 مىس-
قالى كۈلگە بىر قېتىم (ئەتىگەندە) قايناقۇ ياكى
قىزىل گۈرۈچ سۈيى بىلەن (ئۇدا 3 كۈن) بېرىلىدۇ.
يېرىك ئېقىۋاتقان سىزلاملارغا 3 مىسقالدىن
بېرىلىدۇ.

201 - نۇسخە: لۇبۇپى كەبىر II

تەركىمى: پىستە مېغىزى، پىندۇق مېغىزى، بادام
مېغىزى، ياڭاق مېغىزى، ھەببە تۇلخۇزرا، چىلغوزە مېغىزى،
ھەببى زەلەم، ماھى رۇبىيان، خولىنجان، شاقاقۇل، قىزىل
بەھمەن، ئاق بەھمەن، سېرىق تۇدرى، قىزىل تۇدرى،
زەنجىۋىل، ئاقلاڭغان كۈنجۈت، دارچىن 5 مىسقالدىن،
سۈمبۇل، سەندى كۈپى، قەلەمپۇر، كىۋاۋىچىن، ھەببى
قۇلقۇل، سەۋزە ئۇرۇغى، چامغۇر، پىياز، لوپۇ، بىدە ئۇ-
رۇغى، ھەلىمۇن ئۇرۇغى، ئەرمۇدۇن ئۇرۇغى، دۇرۇنەج
ئەقەرىمى، زورەنباڭ 3 مىسقالدىن، ويۇز، بەسباسە، داۋالە،
پىلىپ 2 مىسقالدىن، سوتلەپ مىسىرى، ئارچىل، قۇش-

قاچ مىڭسى، كوكنار ئۇرۇغى 2 مىسقال، ئىكەكلىكتىن بۇقا چۆپىسى، سۈرۈنجان، بوزىدان، يالپۇز 4 مىسقالدىن، تۈگە بوتىلىغىنىڭ ئوغۇز سۈتى، زەپەر، مەستىكى

3 مىسال، ئۇدى خام $2\frac{1}{2}$ مىسقال، ئەنەبىر بىر مىسقال.

ئىپار يېرىم مىسقال، ئالتۇن ۋەرەق 30 دانە، كۈمۈش ۋەرەق 50 دانە، ھەسەل پۇتۇن دورىلار ۋەزنى بىلەن 3 باراۋەر.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئالدى بىلەن زەپەر، ئىپار، ئەنەبىرلەرنى سالايە قىلىپ، ھەسەلنى قائىدە بويىچە ئىپرىتىپ، ئىپلىشتۈرۈپ بولغاندىن كېيىن تەييارلانغان تالقان دورىلارنى قوشۇپ مەجۇن تەييارلىنىدۇ.

يىمىش مىقدارى: ساقلاش ۋە ئىستىمال قىلىش 171 - نۇسخە بىلەن ئوخشاش.

202 - نۇسخە: ھەببى شەبىيار

تەركىبى: سەبرى سۇقۇشىرى، 3 مىسقال، قىزىل گۈل، سېرىق ھېلىلە پوستى، مەستىكى، تۇربۇت بىر مىسقالدىن، سوقمۇنىيا يېرىم مىسقال.

تەييارلاش: دورىلارنى يۇمشاق سۇقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، سۇ بىلەن خېمىر قىلىپ قارىمۇچ چوڭلۇغىدا كومۇلاچ قىلىنىدۇ.

يېيىش مىقدارى: ھەر كۈنى ئاخشى 7 - 9 دا -
ئىدىن قايناقسۇ بىلەن بېرىلىدۇ.

203 - نۇسخە: ھەبىي تەنكار

تەركىبى: سەبرى سوقۇتتىرى 16 مىسقال، قا -
رىمۇچ 12 مىسقال، تانكار 2 مىسقال، ئاق مىگىدۋانە
ئۇرۇغى 1 مىسقال 5 فۇڭ.
ياسىلىشى: سوقۇپ، ئوقۇت چوڭلۇغىدا ھەب
ياسىلىدۇ.

ئىشلىتىلىشى: مەئدە ئاغرىغىغا، قوساق كۆپكەنگە،
ئېغىر ئاغرىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ دورا يەل ھەيدەش
ئۈچۈن 3 دانىدىن بېرىلىدۇ. ئارتۇغراق بېرىلسە ئىچىنى
يۇمشىتىدۇ. ھەمىشە يېپ بەرسە يەلنى قويمايدۇ.

维吾尔民医手册

吐尔地·买买提编写

(维吾尔文)

新疆人民出版社出版

新疆新华书店发行

新疆新华印刷厂印刷

开本：787×1092毫米1/32 印张：31 插页：4

1977年12月第1版 1977年12月第1次印刷

统一书号：M14098·23 定价：1.73元