

كىرىش سۆز

تېببىي دورىگەرلىك ئىشلىرىنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشى، دورا بازارلىرىنىڭ ئېچىۋېتىلىشى، جۇڭگونىڭ WTOغا كىرىشىگە ئەگىشىپ، چەت ئەللەرده ئىشلەنگەن يېڭى، ئۇنۇمى يۇقىرى دورىلار جۇڭگو دورا بازارلىرىغا كۆپلەپ كىرىپ كلىنىكلىق داۋالاش جەريانىدا كەڭ قوللىنىلماقتا.

ئىمپورت دورىلار ھەققىدىكى بىلىملىرىگە ئېھتىياجلىق ھەر دەرىجىلىك دوختۇرخانىلاردىكى تېببىي خادىملىار، دورىگەرلەر، كەڭ بىمارلارنىڭ زۆرۈر ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش ھەممە رايونىمىزدا ئۇيغۇر تىلىدا نەشر قىلىنغان ئىمپورت دورىلار توغرىسىدىكى كىتاب ۋە ماتېرىياللارنىڭ كەمچىل بولۇشىدەك ئەھۋالنى كۆزدە تۇتۇپ، شىنجاڭ تېببىي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دورىگەرلىك ئىنسىتىتۇتىدىكى ئەخمىد تجان تۇرسۇن، چېن جىين قاتارلىق كەسپىي خادىملىار جىندۇن نەشرىياتى 2001 - يىلى 3 - ئايدا نەشر قىلغان «كۆپ ئىشلىلىدىغان ئىمپورت دورىلار قوللانمىسى» دېگەن خەنزۇچە كىتابتنىن پايدىلىنىپ، رايونىمىزنىڭ ئەمەلىي ئەھۋالغا بىرلەشتۈرۈپ، مەزكۇر كىتابنى قىسىقارتىپ تۈزۈپ چىقتى. بۇ كىتاب 20 باقا بولۇنگەن بولۇپ، يېقىنلىق ئۈچ يىلدىن بۇيان كۆپ ئىشلىلىۋاتقان ئىمپورت دورىلاردىن جەمئىي 322 خىل دورا كىرگۈزۈلگەن، شۇنداقلا ھەربىر دورىنىڭ ئۇيغۇرچە، خەنزۇچە، ئىنگلىزچە نامىلىرى ۋە ئاساسلىق تەركىبىي، فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى، مۇۋاپىق كېلىلىدىغان كېسەللىكلىر، ئىشلىتىش ئۇسۇلى، ئىشلىش مىقدارى، ناچار تەسىرلىرى، دىققەت قىلغىشقا تېگىشلىك ئىشلار، تاۋار نامى ۋە ئۇنىڭ ئىشلەنگەن ئورنى قاتارلىق مەزمۇنلارغا

ئايرىلىپ تەپسىلىي، ئېنىق چۈشەندۈرۈلگەن بولۇپ، ئەمەلىي قوللىنىش قىممىتى ئالاھىدە يۈقىرى كۆتۈرۈلگەن.
بۇ كىتاب ئاساسىي قاتلام دوختۇرخانىلىرىدا ئىشلەۋاتقان دوختۇرلارنىڭ، تېببىي مەكتەپ ئوقۇتقۇچى - ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ، دورىگەرلەرنىڭ، شۇنداقلا كەڭ بىمارلارنىڭ پايدىلىنىشىغا مۇۋاپىق كېلىدۇ.

مۇندەرىجە

بىرىنچى باب مىكرو ئورگانىزمالارغا قارشى دورىلار

1 . پېنیتىسىللەن تۈرىدىكى دورىلار

- (1) فېنوكسېمىتىلىپېنیتىسىللەن پوتاسسيوم
- (2) ئاموکستىسىللەن
- (3) مېزلىتىسىللەن
- (5) سۇلباكتام/ ئامېتىسىللەن
- (7) كالىي كلاۋۇلانات/ ئاموکستىسىللەن
- (9) كالىي كلاۋۇلانات/ تىكارتىسىللەن
- (10) پېپراتسىللەن/ تازوباكتام
- (11) 2 . سېقالوسپورىن تۈرىدىكى دورىلار

- (11) سېفرادىن
- (13) سېفتازىدم
- (15) سېغۇرۇكسىم
- (17) سېفاكلور
- (19) سېفيكىسىم
- (20) سېفېپىيم
- (21) سېفمتازول
- (23) لوراكاربىف
- (24) سېفتەئاكسون
- (25) سېفوکىستىن
- (26) سېفوتابكسىم

(28)	لاتامو كىسبەف
(29)	سېفو تىئام
(31)	سېفو دىزىم
§ 3 . 32) لاكتام تۈرىدىكى باشقا دورىلار	ئېمىپېنېم / سلاستاتىن
(32)	مېرىپېنېم
(33)	پانىپېنېم / بېتامىپرون
(34)	ئاز تربىئونام
§ 4 . 35) ئامىنۇگىلگۈزىد تۈرىدىكى دورىلار	سېپكىتىنومىتسىن
(37)	نېتىلمىتسىن
§ 5 . 38) ماكرولىدىپس تۈرىدىكى دورىلار	ئاز ترۇرمىتسىن
(40)	كلاრتىرۇرمىتسىن
(41)	روكسيترۇرمىتسىن
§ 6 . 42) كۆئىنولون تۈرىدىكى دورىلار	سېپروفلوكساتىسىن
(43)	رۇفلوكساتىسىن
(45)	ئۇفلوكساتىسىن
(47)	لېۋەفلوكساتىسىن
(48)	سپارفلوكساتىسىن
(48)	لومېفلوكساتىسىن
(49)	فلېپرولوكساتىسىن
§ 7 . 50) باشقا ئانتىبىئوتىك دورىلار	ۋانکومىتسىن
(51)	كلىندامىتسىن
§ 8 . 53) تۇپېركۈلۈزغا قارشى دورىلار	پازىنىئازىد
(53)	

(54)	رەفاتپىر
(55)	رەفنا
(56)	9 . زەمبۇرۇغقا قارشى دورىلار
(56)	فلۇكۇنازول
(58)	ئىتراكۇنازول
(59)	ئامفوپېرىتسىن B
(61)	10 . ۋېرۇسقا قارشى دورىلار
(61)	ئاتسىكلوۋىر
(62)	گانتسىكلوۋىر

ئىككىنچى باب قان ئايلىنىش سىستېمىسىغا قەسىر قىلغۇچى دورىلار

1 . يۈرەكى كۈچەيتكۈچى دورىلار	1
(64)	مىلىرىنون
(64)	دوبۇتامىن
(65)	مېتىلىدىگۈكسىن
(67)	ئۇبىدېكارپىنون
(68) يۈرەك رىتمىسىزلىقىنى داۋالايدىغان دورىلار
(69)	2
(69)	پروپاپېنون
(71)	سوتالول ھىdroхlorid
(72)	پوتاسىسىئوم ماگنىزىئوم ئاسپاراتات
(74)	3 . يۈرەك سانجىقىغا قارشى دورىلار
(74)	ئىزو سوربىد دىنترات
(76)	ئىزو سوربىد - 5 - نىترات
(77)	ئاتېنلول
(79)	دللىتىئازىم

(80)	نەتروگلىتسېرىن
(82)	ترىمېتازىدىن
4 § . ئەtrap قان تومۇرلارنى كېخەيتىكۈچى دورىلار
(83)	پېنتوكسفللىن
(83)	شاتىنول شىكتىنات
(85)	مىدودىن
(86)	فېنتولامىن
5 § . قان بېسىمنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلار
(89)	ۋېرآپامىل
(89)	ئۇرآپىدىل
(91)	بېتاكسولول
(92)	ئىندىپامىد
(93)	بۇنازوسىن ھىdroخلورىد
(94)	لاتسىدىپىن
(95)	ئاملوودىپىن
(96)	نېپىدىپىن
(97)	نىكاردىپىن
(99)	كاپتوپريل
(100)	لىزىنۇپريل
(102)	بېنازېپريل
(103)	ئېنلاپريل
(104)	دېلاپريل
(106)	لوزارتان پوتاسىسىئۇم
(107)	ۋالسارتان
6 § . قاندىكى ماينى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلار
(109)	پراۋاستاتىن
(109)	سىمۋاستاتىن
(110)	

(112)	فلۇۋاستاتىن
(113)	لوۋاستاتىن
(114)	بېزافېرات
(116)	فېنوفېرات
(117)	گېمېفېرۇزىل
(118)	ئاتسېپىموكس

ئۈچىنچى باب ئۆسمىگە قارشى دورىلار

(120)	مېلىپران
(121)	ناۋېلىپىن
(122)	سېكلىفوسفامىد
(123)	فلۇئوروئۇراتسىل
(125)	ئالترېتامىن
(126)	ئاسېپاراگىنازا
(127)	دائۇنۇرۇبىتسىن
(129)	ستاراپىن
(131)	لېئۇپروپېلىن
(133)	تىئۇگۇئانىن
(134)	ئېتىپوزىد
(135)	تېنىسىپوزىد
(136)	ۋېنکرېستىن
(137)	ۋېنلاستىن
(138)	ترېپتورېتىن
(140)	تاموکسىفېن
(141)	ئېفوسفامىد
(142)	دوكىسىغلىۇرىدىن
(143)	ئادرېئامىتسىن

(145)	مېتىوتىرىپكىسات
(147)	مېسىنا
(148)	فېنيلائالانىن مۇستارد
(149)	كالتسئۈم لېئۈكۆۋورىن
(151)	بلېئۈمىتسىن
(152)	فارمورۇبىتسىن
(153)	سىسپلاتىن
(155)	كارموفۇر
(156)	مېركاپتوپۇرۇن

تۆتىنچى باب نېرۋا سىستېمىسىغا تەسىر قىلغۇچى دورىلار

1 . ئاغرىق پەسەيتتكۈچى دورىلار	(158)
ترامادول ھىندروخلورىد	(158)
فلۇنارىزىن ھىندروخلورىد	(159)
2 . قىزىتما قايىتۇرۇپ، ئاغرىق توختاتقۇچى دورىلار	
ئاتسىپاتامىنوفېن	(161)
فورتولىن	(162)
سۇماترپىتان	(163)
3 . قىترەشچان پالەچكە قارشى دورىلار	
بروموكرىپتن	(164)
لېۋەدوپا/بېنسېرازىد	(166)
كاربىدوپا/لېۋەدوپا	(168)
توبىرامات	(169)
ئېپېرىزۇن ھىندروخلورىد	(170)
باكلوفېن	(172)

(218)	لانسوپرازول
(219)	پاتنوسپرازول
(220)	ریبامپید
(222)	کولولوئدال بسموت سوبسیترات
(223)	سمپتیدین
(225)	رانستیدین
(226)	فاموتیدین
(227)	نزاتیدین
(228)	مزوپروستول
(230)	تیپرپنون
(231)	پرینزپین
(232)	هیدروتاالتست
2 . ئاشقازاننى كۈچەيتىپ، ھەزمىنى ياخشىلغۇچى	
(233)	دورىلار
(233)	لاكتازا
(234)	ئوتيلونئۇم بروميد
(234)	داگپىس
(235)	پانكرېئاتين
3 . قۇسۇشنى توختابقۇچى دورىلار	
(237)	گرانسيپترون
(238)	ترئۇپىسىپترون
(239)	ئۇندانسىپترون
(240)	ئازاسېپترون
4 . ئىچ سۈرۈشنى توختابقۇچى دورىلار	
(241)	دىئوكتاكېدرال سمبكتىت
5 . سۈرگۈ دورىلىرى	
(242)	لاكتۇلوزا
6 . سپازمىنى بوشاتقۇچى دورىلار	

ئالۋېرىن سىترات	(244)
مېبېۋېرىن	(245)
دروتاۋېرىن	(246)
7 . ھەزم يولىدىكى قاناشنى توختابقۇچى دورىلار	
.....	(247)
ئوكىرپېوتىد	(247)
تېرىلىپېرسىن	(249)
8 . جىگەر ۋە ئۆتكە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار	
.....	(250)
ئۇرسۇدېئوكسخولىك كىسلاتا	(250)
پروتوبورفيرين/ دىسودىئۇم	(251)
گلۇتاتىئۇن	(252)
ھېپا - مېرز	(253)
9 . باشقىلار	
سۇلغاسالازىن	(255)

يەقىنچى باب سۈيدۈك ئاجرىتىش سىستېمىسىغا تەسىر قىلغۇچى دورىلار

ئالپروستاديل	(257)
ئالفوزوسىن	(259)
پروسات	(260)
سېفاسابال	(261)
ۋاسوپېرسىن	(262)
تامسۇلوسىن ھيدروخلوريد	(263)
تادېنان	(264)
دېسموپېرسىن ئاتسېتات	(265)

سەككىزىنچى باب روھىي كېسىھ للىكىلەرگە قارشى دورىلار

- (267) فلۇۋەكسامن
- (268) فلۇفېنازىن دېكانوئات
- (269) ئولانزايىن
- (270) پارو كېپتىن
- (272) مىئانسېرىن
- (273) فلۇۋەكېپتىن
- (274) تىئاپىرىد

توقۇزىنچى باب ھورمۇن تۈرىدىكى دورىلار

- (277) سوماتروپىن
- (278) ئېسترادىئول ۋالېرات/سېپروتېرون ئاتېتات
- (280) تېستوستىپرون ئوندېكانوئات
- (281) ترىئامىتسىنولون ئاتېپتونىد
- (285) لېۋەتروكىسىن سودىئۇم
- (287) مېتىلپرېدىنىزولون سودىئۇم سۇكىسىنات
- (290) پروپېلتىئۇراتسىل

ئونىنچى باب مېتابولىزىمغا تەسىر كۆرسىتىدىغان دورىلار

- 1 . ئىچىلىدىغان قان شېكىرىنى تۆۋەنلەتكۈچى
(292) دورىلار

(292)	گلىتسلازىد
(294)	گلىپىزىد
(296)	مېتفورمن ھيدروخلوريد
(297)	گلىكۈيدون
(298)	ئاكاربوس
(299)	ۋوڭلوبوس
2 § . (301)	ئىنسۇلىن
(301)	ئادەم ئىنسۇلىنى
(303)	نوۋولىن R
3 § . ماددا ئالمىشىشقا تەسىر كۆرسىتىدىغان باشقان دورىلار (304)	باشقان
(304)	كالتسىئوم كاربونات
(305)	كالتسىئوم دوبېسلات
(306)	ئالفاكالتسىدول
(307)	كالتسىترىئول
(310)	ئالپىندرۇنات سودىئۇم
(311)	سودىئۇم پامىدرۇنات

ئۇن بىرىنچى باب قان ۋە قان ئىشلەش سىستېمىسى دورىلىرى

(313)	تۆۋەن مۇلېكۈلىق ھېپارىن سودىئۇم
(315)	ئېنوكساپارىن سودىئۇم
(317)	تىكلىپىدىن ھيدروخلوريد
(318)	سوما توستاتىن
(320)	سارپۇگرېلات ھيدروخلوريد
(322)	مېكوبالامىن
(323)	ھيدروكسىئېتىل ئېتىل ستارچ

(324)	ستريپتوكينازا
(327)	ڙارفارين
(329)	ئاپروتنين
(331)	سُولودبکسید
(332)	تومور پروتئين سوكستنيلات

ئۇن ئىككىنجى باب نەسىلىنىش سىستېمىسى دورىلىرى

(334)	پرومېستريئين
(335)	تېستوتېرون
(336)	سېپروتېرون ئاتسېبات
(338)	سېپروتېرون
(339)	مېدروكسېپروگېستېرون ئاتسېبات
(341)	دیدروگېستېرون
(342)	نونوكسینول
(343)	مېنېبىگول
(344)	دېزوگېسترېل / ئېتىنيلېسترادئول
(346)	ئېسترادئول
(347)	ئېسترادئول ڦالېرات
(349)	ئاللىلىېستېنول
(350)	خورئونىك گونادوتروفين
(352)	ئوروفوللىتروپىن
(353)	مېنوتروفين
(355)	لېۋونورگېسترېل
(356)	پرمېگېستون
(357)	كلوميفېن
(359)	رتودرين هيدروخلوريد
(360)	دىنۇپروست

ئۇن ئۇچىنچى باب ھالەت ئۆزگىرىش رېئاكسىيىسىگە قارشى دورىلار

- | | |
|-------------|-------------|
| (362) | ئاكرىۋاستىن |
| (363) | مېكۇئىتازىن |
| (364) | لوراتادىن |
| (365) | تىپرولىدىن |

ئۇن تۆتىنچى باب ئىممۇنىت دورىلىرى

- | | |
|-------------|--------------|
| (366) | سىكلوسىپورىن |
| (368) | سېللسىپىت |
| (369) | ئازاتشۇپىرىن |

ئۇن بەشىنچى باب ياللۇغلىنىش، رېماتىزم ۋە پوداگراغا قارشى دورىلار

- | | |
|-------------|----------------|
| (371) | ئاتسىپمېتاتسىن |
| (373) | ئىمپسۇلد |
| (374) | مېلوكسىكام |
| (377) | ئالمىنوبروتبىن |
| (378) | ئىدرىوسلامىد |
| (379) | بېنزبرومارون |

ئون ئالتنىچى باب كۆز كېسەللىكى
بۆلۈمىدە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار

- (381) لېۋەپۇنولول ھيدروخلوريد
- (382) سېپتىرىمىد
- (383) پېرپۇنكىسىن
- (384) لودوکسامىد
- (385) پولىئۇنىل ئالكوهول كۆز دورا سۇيۇقلۇقى
- (385) دېپىۋېفرىن
- (387) كالتىسىئۇم دوبېزىلات
- (388) ناتامىتسىن
- (389) كېتىروللاڭ
- (390) ئېنېپېكتوفلام
- (392) ئوكسىبۇپروكائىن
- (393) پىروپاراكائىن ھيدروخلوريد
- (394) فلۇئورومېتولون
- (396) مۇرىن كۆزگە تېمىتىش سۇيۇقلۇقى
- (397) سۇنئىي كۆز يېشى
- (398) بېتاكسولول ھيدروخلوريد
- (399) ھېپوتېئارس
- (400) كارباخول

ئون يەتنىچى باب قۇلاق، بۇرۇن، يۇنقۇنچاق،
كېكىردهڭ كېسەللىكى بۆلۈمىدە
ئىشلىتىلىدىغان دورىلار

- (402) لېۋەكاباستىن
- (403) دېكۈئالىنىئۇم خلوريد

ئۇن سەككىزىنچى باب تېرە كېسەللىكى بۆلۈمىدە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار

(405)	مومەتازون فۇروئات
(407)	كالتسىپوترىئول
(408)	كلوستریدئوم پېپتىدازا A مەلهىمى
(410)	ئاداپالىن
(411)	كلوبېتازول
(414)	ئىزۋەترېتىنۇئىن
(416)	پودوفىللۇم
(417)	ئېتربىتنات
(419)	ئاكتۇۋېگىن
(421)	مۇپىروتسىن
(422)	بونالفا مەلهىمى
(423)	پودوفىللۇتكىسىن
(425)	كولپوزېپتىن
(426)	تىئوكۇنازول
(427)	مۇكۇپولساخارىد پولىسۇلغات

ئۇن توققۇزىنچى باب ناركوز دورىلىرى

(429)	روپۇڭاڭىن
(430)	فلۇمازېپنلىل
(432)	سېۋوفلۇران
(433)	ئېتىومىدات

- (435) سۈپران
(436) روکۇروننىئۇم برومىد

**يىگىرمىنچى باب سايىلاندىرۇپ سۈرەتكە
ئېلىش دورىلىرى**

- (439) دىمىگلۇمىن گادوپېنتىتات
(441) ئىئوتىرولان
(442) ئىئوپامسىدل
(443) لېۋۆۋىست

يىگىرمە بىرىنچى باب باشقا دورىلار

- (445) بىئۇستىم
(445) دىئۇسمىن

ئەم بىلەتلىك ئەندىمىرىنىڭ
ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ

ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ
ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ

ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ
ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ

ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ
ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ

ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ
ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ

ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ
ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ

ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ
ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ

ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ
ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ

ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ
ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ

ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ
ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ

ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ
ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ

ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ
ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ ئەندىمىرىنىڭ

بىرىنچى باب مىكرو ئورگانىزملارغا قارشى دورىلار

1 . پېنىتىسىللەن تۈرىدىكى دورىلار

فېنوكسيمېتىلىپېنىتىسىللەن پوتاسىسىيۇم
(青霉素 V 钾, phenoxymethylpenicillin potassium)

【باشقا نامى】 مېگاتىسىللەن (Megacillin) ، 美格西
【ئاساسىي تەركىبى】 فېنوكسيمېتىلىپېنىتىسىللەن پوتاسىسىيۇم .
【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ، كۆپپىش
مىزگىلىدىكى باكتېرىيىلەرنى ئۆلتۈرگۈچى دورا بولۇپ، گرام مەنپىي
تاياقچە باكتېرىيىلەرگە قارشى تەسىرى بولمىغان تار تەسىرلىك
ئاتىبىئۇتكى دورا ھېسابلىنىدۇ. دورىنى ئىچكەندىن كېيىن 12 بارماق
ئۈچمەيدە سۈمۈرۈلدۈ، T_{max} (پۇتون يىمرىلىش دەۋرى) بىر سائەت
بولىدۇ، ئاقسىل بىلەن بىرىكىش نسبىتى تەخىمنەن % 80، مېڭە قان
توسىقىدىن ئۆتىمەيدۇ، ئەمما كۆكىرەك بوشلۇقى سۈيۈقلۈقى ۋە قورساق
سۈيىگە سىڭىپ كىرىدۇ، $t_{1/2}$ (پېرىم يىمرىلىش دەۋرى) 60min
بولىدۇ، بۇرەكتىن چىقىرىلىدۇ.
【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىكەر】 ئاساسەن گرام مۇسېت
باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يېنىك دەرىجىدىكى يۈقۈملەنىشقا
ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە 1~1.5g
3~4 قېتىمغا بولۇپ ئىچىدۇ. بالىلار كۈنىگە ھەر kg بىدەن ئېغىرىلىقىغا
10~40mg نى 3~4 قېتىمغا بولۇپ ئىچىدۇ.
【ناچار تەسىرى】 زىيادە سېزىمچانلىق رېئاكسىيىسى، ئاشقازان
ئۈچەي يولى رېئاكسىيىسى كۆرۈلىدۇ، قىسىمن چاغلاردا قان رايىدا
ئۆزگىرىش پەيدا قىلىدۇ ۋە ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك بۇرەك ياللۇغىنى

كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

【دىقىدت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: پروپېنپىسىد (丙磺舒)，ئىندومېتاتسین (消炎痛)，بوتازولىدىن سەرتقا چىقىرىلىش ۋاقتىنى ئۆزارتىشى مۇمكىن. ② مەنى ئىلىنىدىغان ئەھۋالار: پېننسىللەنغا نسبىتەن زىيادە سەزگۈرلۈك رېئاكسىسى پەيدا بولىدىغان بىمارلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 مېگاتىسىللەن گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. تابلېتى: تابلېت/600000u، تابلېت/1000000u، قاپ/10 تابلېت. فېنوكسيپېنلىپېننسىللەن پوتاسىسيۇم قۇرۇتۇلغان شېكەرلىك قىيامى، گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. قۇرۇتۇلغان شېكەرلىك قىيامى: بوتولكا/21g، بوتولكا/60ml، بوتولكا/35g، بوتولكا/100ml.

ئاموکىستىسىللەن

(阿莫西林，Amoxicillin)

【باشقانامى】 P - ھىdroكىسى - ئامپېتىسىللەن
(弗莱莫星，Flemoxin) ، فلېموكىسىن (P-hydroxy-ampicillin)
ئامولىن (阿莫仙，Amolin) ، ئاموکىستىسىللەن (阿莫灵，Amoxicillin)
ئاموكىسل (奥纳欣，Amoxil) .

【ئاساسىي تەركىبى】 p - ھىdroكىسى - ئامپېتىسىللەن.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 يېرىم سىنتېز لەنگەن كەڭ تەسىرىلىك پېننسىللەن، باكتېرىيىگە قارشى دائىرسى ئامپېتىسىللەنغا ئوخشىپ كېتىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن سەل كۈچلۈك بولىدۇ. كىسلاتاغا چىداملىق، ئەمما ئېنىزىمغا چىدامسىز، β - لاكتامازانى ئوڭايى ھاسىل قىلىدىغان باكتېرىيىلەرگە قارشى ئۇنۇم بىرمىدیدۇ. ئىچكەندە ئوڭايى سۈمۈرۈلدۈ، قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نسبىتى تۆۋەن. $t_{1/2}$ بىر سائەت بولۇپ، بۇرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىسق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 سەزگۈر باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان نەپەس يولى، سۈيدۈك يولى، يۈمىشاق توقۇلما قاتارلىقلارنىڭ يۈقۈمىنىشىغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۈنگە 3g ~ 1 نى 4 ~ 3 قېتىمغا بۆلۈپ ئىچىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان، ئۇچىي يوللىرى رېئاكسىيىسى كۆرۈلىدۇ، ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەتكەندە تەكىرار يۇقۇملۇنىش پەيدا قىلىدۇ. قىسمەن چاغلاردا ئاللىپىرىگىلىك ئەسوھ، دورا قىزىتىمىسى قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. بىزى كىشىلەرde كىسلاتا خۇمار دانىچە ھۈجەيرىلەر كۆپپىش، ئاق قان دانىچىسى كېبىميش قاتارلىقلارنى پەيدا قىلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: پېننېتسىللەن G بىلەن ئوخشاش. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: پېننېتسىللەن تۈرىدىكى ۋە سېفالوسيورىن تۈرىدىكى دورىلارغا زىيادە سەزگۈر بىمارلارغا، يۇقۇملۇق ئاق قان يادولۇق كۆپپىش كېلىگە گىرىپتار بولغۇچىلارغا، لىمفا ھۈجەيرىلىك ئاق قان كېلىلى بىمارلىرىغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: ھامىلىدارلار، جىنگەر، بۆرەك ئىقتىدارى توسقۇنلۇققا ئۇچرغۇچىلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 فلىمووكسىن گوللانىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىتى: تابلىت/125mg، تابلىت/250mg، تابلىت/500mg.

ئامولىن شىائىڭاڭىدا ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دان/250mg. ئاموكسىل گىرمانانىيىدە ئىشلەنگەن، كاپسۇلى: دان/250mg، دان/500mg.

مېزلىوتىسىللەن (美洛西林，Mezlocillin)

【باشقا نامى】 بېپېن (拜朋, Baypen)

【ئاساسىي تەركىبى】 مېزلىوتىسىللەن.

【فارماكولوگىلىك ئالاھىدىلىكى】 ئوكساتىسىللەن (苯咪唑青霉素， β - لاكتامازاغا نىسبەتن تۇراقىسىز، باكتېرىيىگە قارشى دائىرىسى يېشىل يېرىڭ تاياقچە باكتېرىيىسى، چوڭ ئۇچىي تاياقچە باكتېرىيىسى، سالمونىلا باكتېرىيىسى ۋە پېننېتسىللەنغا سەزگۈر گرام

مۇسېت شارچە باكتېرىيە قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. مىقدارى كۆپ بولغاندا باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش تەسىرىگە ئىگە بولىدۇ. ئىچىكىنە سۈمۈرۈلمىدۇ، ۋېناغا ئوکۇل قىلىنسا قان پلازما ئاقىلى بىلدەن بىرىكىش نسبىتى 27% بولۇپ، يۇرهەك كلاپىنى ۋە شورغۇزۇمىان مۇسکۇلى ھەمدە مەزى بىزى تو قولمىسى قاتارلىقلارغا تارقىلىدۇ، قورساق سۈبى ۋە ئۆت سۈيۈقلۈقىدىكى قويۇقلۇقى ئەڭ يۈقرى بولۇپ، كانايچە ئاجرالىلىرىغا ئوڭايلىقە كىرەلمىدۇ. ئاساسلىقى يۇرەكتىن ئىسلى پېتى چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاساسەن يېشىل يېرىڭى تاياقچە باكتېرىيىسى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ھەر خىل يۇقۇملۇنىش ۋە سەزگۈر باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سېپىتىتىپىمە، نەپەس يولى، سۈيدۈك يولى، كۆپىيىش سىستېمىسى قاتارلىقلارنىڭ يۇقۇملۇنىشى ۋە مېڭە پەردە ياللۇغى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ ياكى تېمىتىلىدۇ، چوڭلارغا ھەر قېتىمدا 3~3g، كۈنىگە 4 قېتىم، باللارغا ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 75mg 75 دىن كۈنىگە ئىككى قېتىم مۇسکۇلغۇ ئوکۇل قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 پېنتسىللەن تۈرىدىكى دورىلارغا ئوخشاش، بىزى كىشىلەرنىڭ ئاشقازان - ئۇچىي يولى رېئاكسىيىسى پەيدا قىلىدۇ ياكى قان زەردابى ئامىنوتانسىپەرازانى ئۆرلىتىپ، ئاق قان ھۈجەيرىسىنى كېمەيتىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: گېنىتامىتسىن، كانامىتسىن قاتارلىق ئامىنۇگلىكۈزىلەر بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىلە ماسلىشىش تەسىرى كۆرۈنۈرلىك بولىدۇ. كىسلاتالىق دورىلار بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىلە چۆكمە ھاسىل قىلىدۇ. ئىشقارلىق دورىلار بىلەن قوشۇپ ئىشلەتكىنە باكتېرىيىگە قارشى ئۇنۇمى ناھايىتى تېز تۆۋەنلىكىدۇ؛ ② مەنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: پېنتسىللەن تۈرىدىكى ياكى سېفالووسپورىن تۈرىدىكى دورىلارغا نىسبەتنەن سەزگۈرلۈك رېئاكسىيىسى پەيدا بولىدىغان بىمارلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشىلار: ۋېناغا ئوکۇل قىلىش ۋاقتىنى قاتىقى تىزگىنلەش لازىم؛ ۋاقتى توشماي توغۇلغان باللار ۋە يېڭى توغۇلغان باللارغا ئوکۇل قىلغاندا ئوکۇل قىلىش ۋاقتىنى ئۇزارتىش؛ بۇرەك ئىقتىدارى تولۇق بولمىخانلارغا

نسبىتەن دورا بېرىش ئارىلىقى 12 سائەتتىن يۇقىرى بولۇش لازىم.
【ياسالمىسى ۋە ئۆلچىمى】 بىپېن گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن.
 ئوكۇلى: بوتۇلكا/1g ، بوتۇلكا/2g .

سۇلباكتام/ ئامپىتسىللەن

(氨苄青霉素，Ampicillin/Sulbactam，舒巴坦)

【باشقۇ نامى】 ئۇناسىن (Unasyn) ، 强力安必仙 (优立新)
【ئاساسىي تەركىبى】 ئوكۇلى، ناتىرىي سۇلباكتام ۋە ناتىرىي
 ئامپىتسىللەن؛ تابىت، سۇلتاامتىسىللەن توزىلات (舒他西林甲苯磺酸盐) .
【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 باكتېرىيىگە قارشى
 دائىرىسى ئامپىتسىللەنغا ئۇخشاش. ئامپىتسىللەنىڭ باكتېرىيىھ پەيدا
 قىلغان β -لاكتامازا تەرىپىدىن ھىدرولىزلىنىشنىڭ ئالدىنى ئالدى،
 ئىچكەن چاغدىكى مۇتلەق بىئولوگىيلىك پايدىلىنىش دەرجىسى 80%，
 ئوكۇل قىلىنغاندىن كېيىن ئادەم ۋۇرگانىزى توقولمىسى ۋە بەدەن
 سۈيۈقلۈقدا تېزلىكتە تارقىلىدۇ، مېڭ پەردىسى يۇقۇملانغان ئەھەزلىنى
 ھېسابقا ئالىمغاڭاندا، بۇ دورىنىڭ مېڭ-يۇلۇن سۈيۈقلۈقغا سىڭىپ كىرىش
 مىقدارى نسبىتەن تۆۋەن بولىدۇ. ۋېناغا ئوكۇل قىلغاندىن كېيىنلىكى ياكى
 مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلغاندىن كېيىنلىكى 0.75h ئايىرم - ئايىرم ھالدا
 ۋە 1h بولىدۇ، كۆپىنچە ئىسلى پېتى سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىپ كېتىدۇ.
【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 سەزگۈر باكتېرىيىلەر
 كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يۇقۇملۇنىش، بولۇپپۇ نەپس يولى، سۈيدۈك
 يولى، كۆپىيىش ئەزاسى قاتارلىقلارنىڭ يۇقۇملۇنىشغا ئىشلىتىلىدۇ.
 قورساق قىسىمى ئۇپپەراتسىيىسى ۋە ئاياللار بۆلۈمۈ ئۇپپەراتسىيىسىدە
 سەزگۈر باكتېرىيىدىن يۇقۇملۇنىشنىڭ ئالدىنى ئالدى.

【ئىشلىتىش مۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئىشلىتىش مىقدارى
 ئامپىتسىللەن ئارقىلىق ھېسابلىنىدۇ، چوڭلارغا ھەر قېتىمدا 1g دىن
 كۈننە 2 قېتىم مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، ھەر قېتىمدا 1 ~ 2g
 كۈننە 4 ~ 2 قېتىم ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ. ئېغىر دەرىجىدە يۇقۇملانغان
 بولسا ۋېناغا ئوكۇل قىلىش مىقدارى كۈننە 12g غا يەتكۈزۈلەن. تاشقى
 كېسەللىكىلەر بۆلۈمىدە ئالدىنى ئېلىشتا، ھەر قېتىمدا 1g ۋېناغا ئوكۇل

قىلىنىدۇ، ئۆپپراتسييىدىن ئىلگىرى 2 ~ 1 قېتىم، 24 سائەت ئىچىدە ھەر 8h ~ 6 تە تەكىرار ئۆكۈل قىلىنىدۇ. بۆرەك ئىقتىدارى تولۇق بولىغانلارغا، كىرىشلىش نىسبىتىگە ئاساسەن دورا مىقدارىنى تەڭشەپ تۈرۈش لازىم. تابلىپتىنى چوڭلار ھەرقېتىمدا 30kg ~ 375 دن كۈنىگە 2 قېتىم ئىچىدۇ. بەدەن ئېغىرلىقى 50mg دن كىچىك بولغان باللار كۈنىگە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقى 30kg دن يۈقىرى ئىككى قېتىمغا بولۇپ ئىچىدۇ؛ بەدەن ئېغىرلىقى 30kg دن يۈقىرى باللارنىڭ دورا مىقدارى چوڭلارنىڭكىگە ئوخشاش. سۆزىنى داۋالاشتا كۈنىگە بىر قېتىم 2.25g ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاللىرىگىلىك رېئاكسىيە پەيدا قىلىدۇ، فەسىلەن: يەلتاشما، قىزىتش، نەپەس قىسىش قاتارلىقلار. زىيادە سەزگۈرلىكتىن بولغان شوك، قان ئازلىق، ئاق قان ھۈجەيرسى كېمىيىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، ياندۇرۇش، ئىچى سۈرۈش، كەم ئۈچرايىدىغان ساختا پەردىلىك ئۈچەي ياللۇغى، داغلىق دۆڭچە ئەسۋە، سرغىتمىلىق كۆپ شەكىللەك قىزىل داغ، Lyell يىخىندى ئالامىتى، كۆپ شەكىللەك تېرە ئىسۋىسى، سويۇلۇشچان تېرە ياللۇغى ۋە جىڭىر، بۆرەك ئىقتىدارى تولۇق بولماسلىق قاتارلىقلار ئىنتايىن كەم ئۈچرايىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئاللىپۇرۇنول (別嘌呤醇) ۋە سۈيدۈك كىسلاتسىنىڭ سىنتېزلىنىشنى تورمۇزلىغۇچى باشقا دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، تېرىگە رېئاكسىيە بېرىش خەتىرىنى ئاشۇرىدۇ. ② مەنى قىلىنىدىغان ئەمۇلار: پېنىتىسىللىن، سېفالوپسۇرن تۈرىدىكى دورىلارغا زىيادە سەزگۈرلەر، قوقاق ۋېرۇسىدىن يۇقۇملانغانلار، لىمغا ھۈجەيرلىك ئاق قان كېسىلىك گىرىپتار بولغۇچىلار ۋە لىدو كائىنغا زىيادە سەزگۈرلەر، شۇنداقلا ئىككى يېرىسم ياشتنى تۆۋەن باللارغا ئىشلىتىش چەكللىنىدۇ. ③ باشقىلار: ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 强力安必仙 0.75g/粒， قاپ/10 بوتۇلكا.
ئۇناسىن گېرمانىيە ئىشلەنگەن. ئۆكۈلى: بوتۇلكا/0.75g；
 تابلىپتى، تابلىپتى/375mg، قاپ/10 تابلىپت.

کالی کلاوُلانات/ئاموکسیسللین

(阿莫西林/克拉维酸钾)

(Amoxicillin/Clavulanate Potassium)

【باشقا نامى】 ئاموکسیکلاو، ئوگمنتنىن (安美汀，Augmentin，

【ئاساسىي تەركىبى】 ئاموکسیسللین، کالىي کلاوُلانات.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 باكتيرىيگە قارشى دائىرىسى ئاموکسىلغا ئوخشاش، کلاوُلانات ئاتىسىد β - لاكتامازانى تورمۇزلايدۇ. Tmax بىر سائەت بولۇپ، قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نسبىتى تۆۋەن، تەخمىندەن 70% ئىقىمىنى زەردابىدا ئىسىلى پېتى مەۋجۇت بولۇپ تۈرىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 سەزگۈر باكتيرىييلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان نەپەس يولى، كۆپىش سىستېمىسى ۋە سۈيدۈك يوللىرى يوقۇملۇنىشغا ھەمە چوڭ ئۆپپەراتىسىدىن كېيىنكى يوقۇملۇنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ ياكى ۋېناغا تېمىتىلىدۇ، چوڭلار ۋە 12 ياشتنىن تۆۋەن باللارغا دائىمىلىق ئىشلىتىش مىقدارى 1.2g بولۇپ، هەر 8 سائەتتە بىر قېتىم، ئېغىر دەرىجىدە يوقۇملانغانلارغا ھەر 6 سائەتتە بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ؛ 12 ياشتنىن تۆۋەنلەرگە دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىشلىتىلىدۇ، بۆرەك ئىقتىدارى تولۇق بولىغانلارغا كېپئاتىنىنىڭ چىقىرىلىش نسبىتىگە ئاساسەن دورا مىقدارى ۋە دورا بېرىش قېتىم سانى تەڭشىلدۇ. ئىچىشكە بېرىلگەنندە، چوڭلار ۋە 12 ياشتنىن يۇقىرى باللار ھەر قېتىمدا 375mg ~ 750mg دىن كۈننەگە ئۇچ قېتىم ئىچىدۇ. بۇۋاقلار ۋە ئۆسمۈر باللارغا شېكىرىلىك قىيامى ھەر قېتىمدا 10ml ~ 2.5 دىن كۈننەگە ئۇچ قېتىم ئىچۈرۈللىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاساسلىقى ئىچ سۈرۈش، ھەزم قىلىش ناچارلىشىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ساختا پەردەلىك ئۇچەي ياللۇغى ۋە تەسۋىسىمان زەمبۇرۇغ كېسىلى قاتارلىقلار يېنىك دەرىجىدە ۋە ۋاقىتلىق كۆرۈللىدۇ. قىسىمن چاغلاردا AST ياكى ALT لار ئەسلىگە يېنىشچان يۇقىرى كۆتۈرۈلۈش، جىڭەر ياللۇغى ۋە تۆسۈلۈش خاراكتېرىلىك

سېرىقلىق چۈشۈش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يەرلىك ئورۇغا ئوکۇل قىلىنسا، ۋېبا ياللۇغىنى پەيدا قىلىدۇ، يەلتاشما، قىزىل داغ قاتارلىقلار تاسادىپى كۆرۈلدى، سۈلۈق ئىشىق ۋە كۆپ شەكىللەك قىزىل داغ، Stevens — Johnson يىغىندى ئالامەتلەرى (سېرىغۇتىمىلىق كۆپ شەكىللەك قىزىل داغ)، زەھەرلىنىش خاراكتېرىلىك تېرى بېكىرۇزلىنىش ۋە سوپۇلۇشچان تېرى ياللۇغى ئىنتايىن ئاز كۆرۈلدى.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: كەڭ تەسىرىلىك باشقا ئانتېبىئوتىك دورىلار بىلەن بىرلىكتە ئىشلەتكەننە، بۇ دورىلارنىڭ داۋا لاش ئۇنۇمىنى تۆۋەنلىقىتىدۇ، گلۈكوزا، ناتىرىي ھەدروكاريوناتى ئۆز ئىچىگە ئالغان ياسالىملار ھەمەدە قان پلازمىسى ۋە قان ياسالىملىرىغا قوشۇپ ئىشلىتىش مۇۋاپق ئەمەس. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۇلالار: β - لاكتان تۈرىدىكى دورىلارغا زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بار بىمارلار؛ بۇ دورىنى ياكى يېنىتىسىلىن ئىشلەتكەننە سېرىقلىق چۈشكەن ياكى جىڭىر فۇنكسييىسى تولۇق بولمىغانلار؛ يوقۇملىق ئاق يادرولۇق ئاق قان ھۈجەيرلىرى كۆپبىيش كېسىلى، لىمغا ھۈجەيرلىك ئاق قان كېسىلى بىمارلىرىغا ئىشلىتىش مەنئى قىلىنىدۇ. ③ باشتىلار: ھامىلدارلارغا ئېھىتىيات قىلىپ ئىشلىتىش لازىم؛ كۆپ مىقداردا ئىشلەتكەننە سۈيىدۇك كىرسىتاللىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

【ياسالىمسى ۋە ئۆلچىمى】 ئوگىمەتنىن سنگاپوردا ئىشلەنگەن. پاراشوكلۇق ئوکۇلۇ: بوتۇلكا/600mg، بوتۇلكا/1200mg؛ تابلىپتى: تابلىپتى/375mg، قاپ/10 تابلىپتى؛ قۇرۇتۇلغان شېكەرلىك قىيامى، خالتا/156mg.

ئوگىمەتن ئاؤسترالىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى/375mg، قاپ/15 تابلىپتى؛ قۇرۇتۇلغان شېكەرلىك قىيامى: بوتۇلكا/5ml، 156mg/5ml. ئوگىمەتنىن ئىنگلەنلە ئىشلەنگەن. پاراشوكلۇق ئوکۇلۇ: بوتۇلكا/600mg، قاپ/1 بوتۇلكا، قاپ/10 بوتۇلكا، بوتۇلكا/1200mg، قاپ/1 بوتۇلكا، قاپ/5 بوتۇلكا.

ئاموکسىكلاۋ سلوۋېنىيىدە ئىشلەنگەن. ئىچىلىدىغان دۇغ لەيلىمە سوپۇلۇقى: بوتۇلكا/30ml، بوتۇلكا/60ml؛ تابلىپتى: تابلىپتى/625mg.

کالی کلاوؤلانات/تیکارتسیللين

(替卡西林/克拉维酸钾)

(Ticarcillin/Clavulanate potassium)

【باشقا نامى】 تیمەتتىن (特美汀，Timentin) ئاساسىي قەركىبى】 ناترىي تىكارتسىلىن، کالىي کلاوۇلانات.
【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ بىر خىل ئېنىزم قوشۇلغان تورمۇزلىغۇچى مۇرۇككەپ ياسالما بولۇپ، باكتېرىيىگە قارشى دائىرسىي تىكارتسىلىن بىلەن ئوخشاش. كەڭ تىسىرىلىك باكتېرىيە ئۆلتۈرۈش رولىغا ئىگە، باكتېرىيىگە قارشى دائىرسىي ئالىنۇن رەڭلىك ئۆزۈمىسىمان شارچە باكتېرىيىسى ۋە ئېمپىدىرىمىدىكى ئۆزۈمىسىمان شارچە باكتېرىيە، موکىسىمان سپورىلىق باكتېرىيە ئۇرۇقدىشى، چوڭ ئۇچىي تىاقچە باكتېرىيىسى، قان خۇمار تارقىلىشچان زۇكام تاياقچە باكتېرىيىسى، يېشىل يېرىڭ تاياقچە باكتېرىيىسى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ۋېناغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ ياكى ۋېناغا تېمىتىلىدۇ، $t_{1/2}$ 70min بولىدۇ، بۇرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 سىزگۈر باكتېرىيە پەيدا قىلىدىغان يۇقۇملىنىشقا ئىشلىتىلىدۇ. مەسىلن: يېرىڭ زەھەرلىك قان كېسىلى، باكتېرىيىلىك قان كېسىلى، سېپىتىتىپىمە، ئەپەس يولى يۇقۇملىنىش، سۈيدۈك يولى يۇقۇملىنىش، ئۇپېراتسىيىدىن كېيىن يۇقۇملىنىش، ئىمۇنۇت سىستېمىسى زەخىملەنگەن بىمارلار، قورساق پىرددە ياللۇغى، سۆڭەك ۋە بوغۇم يۇقۇملىنىش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ ياكى ۋېناغا تېمىتىلىدۇ. چوڭلارنىڭ دائىملق مىقدارى هەرقىتىمدا 3.2g، هەر 8 سائەتتە بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ. ئەڭ كۆپ ئىشلىتىش مىقدارى هەر تۈت سائەتتە 3.2g. بۇرەك فۇنكىسييىسى زەخىملەنگەنلەرگە كىرىڭىزىنىڭ چىقىرىلىش نىسبىتىگە قاراپ دورا مىقدارى تەڭلىلىدۇ. بالىلارنىڭ دائىملق مىقدارى هەر 8 ~ 6 سائەتتە هەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 80mg بېرىلىلىدۇ. كېيىن تەدرجىي ھالدا سەككىز سائەتتە بىر قېتىم دورا بېرىشكە

ئۆزگەرتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 پېنتسىللېنى ئوکۇل قىلغاندا كۆرۈلىدىغان تېپىك ناچار تەسىرلەر كۆرۈلىدۇ. ئەسۋە چىقىش، يەلتاشما، ئىچ سۈرۈش، كۆكۈل ئېلىشىش قاتارلىقلار كۆپ كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنى قىلىنىدىغان ئەھەلлار: پېنتسىللېنغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: ھاسىلىدارلار، جىڭىر فۇنكىسييسى ئېغىر زەخملەنگەنلەرگە ئېھەتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ مۇسکۈلغا ئوکۇل قىلىشقا بولمايدۇ؛ قان ۋە قان پلازا ماسالىلىرى بىلەن بىر لەشتۈرۈپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 تىمدەتنىن ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن، پاراشوكلۇق ئوکۇلى: بوتۇلكا/3.2g، قاپ/1 بوتۇلكا، قاپ/4 بوتۇلكا، قاپ/6 بوتۇلكا.

پىپەراتسىللەن/تازوباكتما

(他唑巴坦, Tazobactam/piperacillin, 呻拉西林)

【باشقىا نامى】 تازوتسىن (Tazocin) (特治星,)

【ئاساسىي تەركىبى】 ناتىرىي پىپەراتسىللەن، ناتىرىي تازوباكتما.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ناتىرىي

پىپەراتسىللەن ۋە ناتىرىي تازوباكتمادىن تۈزۈلگەن مۇرەككىپ ياسالما. پىپەراتسىللېنغا سەزگۈر باكتېرىيە ۋە β - لاكتامازانىڭ ھاسىل بولۇشى تۈپەيلى شەكىللەنگەن پىپەراتسىللېنغا چىداملىق باكتېرىيىگە قارشى تەسىرگە ئىگە. ئاشقازان - ئۇچىي يولىدا سۈمۈرۈلمىدۇ، شۇڭا ۋېناعا ياكى مۇسکۈلغا ئوکۇل قىلىنىدۇ. $t_{1/2}$ 1.2 ~ 0.7 سائەت، بۆرەكتىن چىقىرىلىدۇ، شۇنداقلا ئۆتكىمۇ كىرىدى.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەلىلىكىلەر】 β - لاكتامازانىڭ ھاسىل

بولۇشى تۈپەيلى شەكىللەنگەن پىپەراتسىللېنغا چىداملىق باكتېرىيىدىن يۇقۇملىنىشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ ياكى

تېمىتىلىدۇ، مۇسکۈلغا ئوکۇل قىلىشىمۇ بولىدۇ. چوڭلارنىڭ دائىملق مىقدارى ھەر سەككىز سائەتتە 4.6g بولىدۇ، يۇقۇملىنىشنىڭ ئېغىر - يېنىكلىك دەرىجىسى ۋە يۇقۇملاڭان ئورۇنغا قاراپ دورا مىقدارىنى

کۆپىتىشكە ياكى ئازايتىشقا بولىدۇ. بۇرەك فۇنكسىيىسى تولۇق بولمىغان بىمارلارغا كېۋاتىنىنىڭ چىقىرىلىش نىسبىتىگە ئاساسەن دورا مقدارىنى تەڭشىپ تۈرۈش لازىم.

【ناچار تەسىرى】 تېرىھ قىچىشىش، ئەسۋە چىقىش، ئىچ سۈرۈش كۆكۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئۆكۈل قىلىنغان ئورۇنغا رېئاكسىيە بېرىش قاتارلىقلار كۆرۈلدۈ، يۇقىرىقلاردىن سىرت يەنە قان پلاستىنكلەرنى ئازىيىش، قىزىش، كىسلاتا خۇمار دانلىق ھۈجەيرە كۆپىيىش، ترانسئامىنزا يۇقىرىلاش قاتارلىقلار كۆرۈلدۈ.

【دىقىقتە قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: شېرىستا ياكى دورا بوتۇلكىسىدا باشقا دورىلار بىلەن ئارلاشتۇرۇشقا بولمايدۇ؛ ئامىنۇگلۇكوزىد (氨基糖昔) تۈرىدىكىلەرگە قوشۇپ ئىشلىتىلسە، ئامىنۇگلۇكوزىد تۈرىدىكى دورىلارنىڭ ئاكتىپچانلىقى يوقلىدۇ؛ پروپېنېتسىد (丙磺舒) بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، بۇ دورىنىڭ ئۆزىزرايدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: پېتىسىلىن تۈرىدىكىلەر، سېفالوسيپورىن تۈرىدىكى دورىلار ياكى β - لاكتا مازانى تورمۇز لغۇچى دورىلارغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋانقان ئاياللار ۋە 12 ياشتنى تۆۋەنلەرگە ئېھتىيات قىلىپ ئىشلىتىلدى؛ ئۆزۈن مۇددەت ئىشلىتىش توغرى كەلگەندە قان ئىشلىش فۇنكسىيىسى ۋە قان زەردابىدىكى ئېلىكترولىت سەۋىيىسىنى قىرەللەك تەكشۈرۈپ تۈرۈش لازىم؛ ناۋادا ئىچ سۈرۈش كۆرۈلە ساختا پىردىلىك ئۈچىي ياللۇغىنىڭ بار - يوقلۇقىنى ئويلىشىپ كۆرۈش لازىم. 【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 تازوتىسىن ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. پاراشوكلۇق ئۆكۈلى: بوتۇلكا/g 2.25g، بوتۇلكا/g 4.5g.

2 . سېفالوسيپورىن تۈرىدىكى دورىلار

سېفراادىن (头孢拉定 Cefradine)

【باشقا نامى】 (泛捷复，Velosef)، ۋېلۇزېف (Velosef)
【ئاساسىي تەركىبى】 ۋېلۇزېف.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىك】 كەڭ تىسىرىنىڭ دورا بولۇپ، ئۇچىي شارچە باكتېرىيىسىدىن سىرت گرام مۇسېت باكتېرىيىسى، گرام مەنپىي باكتېرىيىسى ۋە كۆپ ساندىكى فېرىمىت ئىشلىگۈچى ئۇزۇمىسمان باكتېرىيىلەرنىڭ ھەمىسىگە ئۇنىم بېرىدۇ. β - لاكتامازاغا بولغان تەسىرى تۇراقىزىز، ئىچكەندە ياخشى سۈمۈرۈلدۈ، T_{max} 1/2 بىر سائىت، $t_{1/2}$ بىر سائىت بولۇپ، ئاساسلىقى ئەسلى پىشى بۇرەكتىن چىقىرىلدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەلىكلىك】 سەزگۈر باكتېرىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان نەپەس يولى، كۆپىيىش سىستېمىسى، سۈيدۈك يولى، ئۇچىي يولى، يۇمىشاق توقۇلما ۋە تېرە، سۆڭكەن ۋە بوغۇم يۇقۇملىنىش ھەمدە يۈرەك قان تومۇر سىستېمىسى يۇقۇملىنىشقا ئىشلىتىلدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋىناغا ياكى مۇسکۇلغა ئوكۇل قىلىنىدۇ، چوڭلارنىڭ دائىملۇق مىقدارى كۈننە 4g ~ 2 بولۇپ، توت قېتىمغا بولۇپ ئوكۇل قىلىنىدۇ. بۇۋاق ۋە ئۇسۇمۇر بالىلارنىڭ دائىملۇق مىقدارى كۈننە ھەر kg بىدەن ئېخىرلىقىغا 100mg ~ 50 بولۇپ، توت قېتىمغا بولۇپ ئوكۇل قىلىنىدۇ ھەمدە يېشى، بىدەن ئېخىرلىقى ۋە يۇقۇملىنىش دەرىجىسىگە ئاساسەن دورا مىقدارى تەڭشىلدۇ. ئىچىشى، چوڭلار ھەر قېتىمدا 500mg ~ 250، ھەر 6 سائىتتە بىر قېتىم، ئېخىر يۇقۇمانغانلار ھەر قېتىمدا كۆپ بولغاندا 1g غىنچە ئىچىسە بولىدۇ، ئەمما كۈنلۈك ئۇمۇمىي مىقدارى 4g دىن ئېشىپ كەتمەسىلىكى كېرەك. بالىلار كۈننە ھەر kg بىدەن ئېخىرلىقىغا 50mg ~ 25 نى 4 ~ 2 قېتىمغا بولۇپ ئىچىدۇ، ئېخىر يۇقۇمانغانلارغا كۈننە ھەر kg بىدەن ئېخىرلىقىغا 100mg ~ 75 ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان - ئۇچىي فۇنكسىيىسى قالايمقانلىشىش ھەمدە تاسادىپىي كۆرۈلىدىغان ئالىپرگىيەلىك رېئاكسىيىسى بىلەنلا چەكلەندىدۇ. مەسىلەن: تىل ياللۇغى، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش، قۇرۇق ئىنجىق، قورساق قىسىمى يېقىمىزلىنىش، يەلتاشما ياكى ئەسۋە، قىزىل داغ، كىسلاتا خۇماردانلىق ھۈچەيردا، كۆپىيىش، ئاق قان ھۈچەيرلىرى ئازىيىش، نېيتىرال دانلىق ھۈچەيرلىر كېمېيىش قاتارلىقلار.

【دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 سېفالوسپورن تۈرىدىكى ئانتىبىئوتىك دورىلارغا زىياده سىزگۇر كىشىلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ.
【ياسالمىسى ۋە ئۆلچىمى】 君必青 شياڭاڭىدا ئىشلەنگەن.

كاپسۇلى: دانه/250mg

ۋېلوزېف ئىتالىيىمە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/250mg
قۇرۇتۇلغان دۇغ لىيلىمە ياسالمىسى، بوتۇلكا/1.5g، بوتۇلكا/3.0g؛
پاراشوكلىق ئوکۇلى: بوتۇلكا/0.5g، بوتۇلكا/1.0g.

سېفتازىدىم

(头孢他啶, Ceftazidime)

【باشقان نامى】 فورتۇم (复达欣, Fortum)，كېفادىم (泰得欣, Tazime)，تازىم (凯复定, Kefadim)
· (泰得欣, Tazime) · (凯复定, Kefadim) · (أساسىي تەركىبى) سېفتازىدىم (Ceftazidime) ·

【فارماكولوگىيلىك ئاھىدىلىكى】 گرام مۇسېبت باكتېرىيىگە بولغان تىسىرى 1 - ئۇقاد سېفالوسپورن تۈرىدىكى دورىلارغا ئوخشاب كېتىدۇ ياكى بىرقەدەر ئاجىز بولىدۇ. ئۇزۇم شارچە باكتېرىيىسى، زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيىنىڭ A ۋە B توپى، ئۆپكە ياللۇغى شارچە باكتېرىيىسى مەزكۇر دورىغا سىزگۇر كېلىدۇ. بۇ دورىنىڭ گرام مەنبىي باكتېرىيىگە بولغان تىسىرى گەۋدىلىك بولىدۇ. ئىچسە سۈمۈرۈلمىدۇ، مۇسکۇلغا ياكى ۋېناغا ئوکۇل قىلىنسا بەندىنگە كەڭ تارقىلىپ، كۆكىرەك سۈيىي، قورساق سۈيىي، بىلغەم، لىمغا سۈيۈقلۈقى، مېڭە، يۈلۈن سۈيۈقلۈقى (مېڭە پەردىسى ياللۇغىلانغان چاغدا)غا كىرىدىز، بەندەن بىرچىلانمايدۇ، بۆرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، 1.3~2h $t_{1/2}$ بولىدۇ.
【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 گرام مەنبىي سىزگۇر باكتېرىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان تۆۋەنلىكى نەپەس يولى، تېرىه ۋە يۈمىشاق توقۇلما، سۆڭۈك ۋە بوغۇم، كۆكىرەك بوشلۇقى، سۈيدۈك ئاچىرىتىش - كۆپىيىش سىستېمىسى ھەممە مەركاز قاتارلىق ئۇرۇنلارنىڭ يۇقۇملىنىشىغا ئىشلىتىلىدۇ، سېپتىتسېمىيگىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلارغا ئىشلىتىشتە كېسەللىك ئەھىزىلغا قارلىدۇ، يېنىڭى دەرىجىدىكىلىرى، ھەرقېتىمدا 1g

دەن كۈنگە ئىككى قېتىم مۇسکۇلغا ئوکۇل قىلىنىدۇ. ئوتتۇرا دەرىجىدىكىلەرگە ھەرقېتىمدا 1g دىن كۈنگە 3 ~ 2 قېتىم مۇسکۇلغا ياكى ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ. ئېغىر دەرىجىدىكىلەرگە ھەر قېتىمدا 2g دىن كۈنگە 3 ~ 2 قېتىم ۋېناغا تېمىتىلىدۇ ياكى ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ. ئىككى ئايىدىن ئاشقان بۇۋاقلارنى ۋە بالىلارغا، كۈنگە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 100mg ~ 30نى، ئىككى ئايىدىن كچىك بۇۋاقلارغا كۈنگە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 60mg ~ 25 نى 3 ~ 2 قېتىمغا بۆلۈپ، مۇسکۇلغا ياكى ۋېناغا ئوکۇل قىلسا بولىدۇ. بۆرەك فۇنكسييىسى تو سقۇنلۇققا ئۇچرىغانلارغا دورا مىقدارى ئەھۋالغا قاراپ كېمەيتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئىسوه پەيدا بولۇشى مۇمكىن. ئاشقازان، ئۇچىي يوللىرى رېئاكسىيىسى، سۈيدۈك يولى تەسۋىسمان زەمبۇرۇغ كېسىلى، جىنسىي بول ياللۇغى ۋە باش ئاغىرىش، باش قېيش، كىسلاتا خۇمار دانلىق ھۇجىھىرە ۋاقتىلىق كۆپىش، ترانسەئامىزازا، ALP قاتارلىقلارنىڭ ئەسلىگە يېنىشچان يۇقىرىلىشى تاسادىپى كۆرۈلۈپ قالىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئامىنۇگلوكوزىدە تۈرىدىكى ئانتىبىئۆتك دورىلار ۋە ئۇنىمى كۈچلۈك سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورىلارغا قوشۇپ ئىشلىتىلسە، دورىنىڭ بۆرەككە بولغان زەھرچانلىقى كۆچىيدۇ؛ ناتىرىي ھىدرۆكاربۇنانقا ئۇچرىسا ئۇراقىسىزلىشىدۇ. ② باشقىلار: پېنتىسىلىنغا زىيادە سەزگۈر كىشىلەرگە ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 فورتۇم ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. پاراشوكلىق ئوکۇلى: بوتۇلكا/0.5g， بوتۇلكا/1g， بوتۇلكا/2g.

كېفادىم تىيەندە ئىشلەنگەن. پاراشوكلىق ئوکۇلى: بوتۇلكا/1g، بوتۇلكا/0.5g.

تازىم كورىيىدە ئىشلەنگەن. پاراشوكلىق ئوکۇلى: ئامپۇل/0.5g، ئامپۇل/1.0g.

سېفۇرۇكىسىم (头孢呋辛，Cefuroxime)

【باشقا نامى】 ئاكسىپتىن (安可欣，Axetine) ، سۇپېرو (舒贝乐，Supero) ، موناسېف (明可欣，Monacef) ، سېفۇرۇكىسىم

· (西力欣，Zinacef) ، زىناسېف (头孢呋肟，Cefuroxime)

【ئاساسىي تەركىبى】 تابلىت تەركىبى سېفۇرۇكىسىم ئاكسىپتىل، ئوكۇل تەركىبى ناتىرىي سېفۇرۇكىسىم.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 2 - ئۇلااد سېفالوسپورن.

باكتېرىيە ئاجرلىپ چىقارغان β - لاكتامازاغا نىسبەتن تۇراقلق بولۇپ، پېنىتىللەنغا چىداملق ئالتۇن رەڭلىك ئۆزۈمىسىمان شارچە باكتېرىيىگە ئۇنۇم بېرىدۇ. يېشىل يىرنىڭ تاياقچە باكتېرىيىسى، ئەگىرى تاياقچە باكتېرىيىسى، ھەرىكەتسىز تاياقچە باكتېرىيىسى، سالمۇنلا تاياقچە باكتېرىيىنىڭ كۆپ ساندىكى باكتېرىيە تۈپى، ئادەتىكى شەكل ئۆزگەرتۈچى تاياقچە باكتېرىيە، موکىسىمان سپورىلىق تاياقچە باكتېرىيە قاتارلىقلار بۇ دورىغا سەزگۈر ئەمەس. تابلىتىنى ئىچىپ سۈمۈرۈلگەندىن Tmax كېيىن، $t_{1/2}$ ~ 2h ~ 3h، $t_{1/2}$ ~ 1.5h، $t_{1/2}$ ~ 1 كىچى، ئاكسىي جەھەتسىن بىرلىكش قىلىنغاندىن كېيىن 50% بولىدۇ، ئاساسىي جەھەتسىن پارچىلانمايدۇ، نىسبىتى تەخمىنەن 45min تەخمىنەن كېيىن 50% بولىدۇ، ئاساسىي جەھەتسىن بىرلىكش ئاساسەن ئىسلى يېتى سۈيدۈك ئارقىلىق بىدەن سىرتىغا چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىللەكىلەر】 سەزگۈر باكتېرىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان تۆۋەنكى نەپەس يولى، سۈيدۈك يولى، تېرە - يۇمشاق توقۇلما، سۆڭىك ۋە بوغۇم قاتارلىقلارنىڭ يۇقۇملۇنىشىغا ئىشلىتىلدى. سېپتىتىمىيە، مېڭە پەرە ياللۇغىغىمۇ ئۇنۇم بېرىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مۇسكۇلغَا ياكى ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، چوڭلارغا ھەر قىتىمدا 1500mg ~ 750 دن كۈنگە ئۇج قىتىم، ئېغىر يۇقۇملانغانلارغا ھەر قىتىمدا 1500mg دن كۈنگە تۆت قىتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ. مېڭە پەرە ياللۇغىنى داۋالاشتا كۈنلۈك مىقدارى 9g دن تۆۋەن بولىدۇ. بالىلارغا ئوتتۇرا ھېساب بىلەن كۈنگە ھەر بىدەن ئېغىرلىقىغا 60mg نى، ئېغىر يۇقۇملانغانلارغا ھەر kg

kg بىدهن ئېغىرلىقىغا 100mg نى 4 ~ 3 قېتىمغا بۆلۈپ ئوکۇل قىلسا بولىدۇ. بۇرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولمىغان بىمارلارغا كېۋاتىنىنىڭ چىقىرىلىش نسبىتىگە قاراپ دورا بېرىش لايىھىسى بېكىتىلدى. تابلىقى چۈئۈرگۈچىلارغا ھەرقېتىمدا 125mg 125mg دىن كۈنگە ئىككى قېتىم بېرىلىدۇ. تۆۋەنلىك ئېپەس يولى يۈقۈملانغانلارغا ھەرقېتىمدا 500mg 500mg دىن كۈنگە ئىككى قېتىم بېرىلىدۇ؛ نوقۇل سۈيدۈك يولى يۈقۈملەنىشقا ھەرقېتىمدا 125mg 125mg دىن كۈنگە ئىككى قېتىم بېرىلىدۇ؛ ئادىبى سۆزىنەككە كۈنگە 1g 1g ئىشلىتىلدى. بالىلارغا ئادەتتە ھەرقېتىمدا 250mg 250mg دىن كۈنگە ئىككى قېتىم ئىچۈرۈلەندۇ؛ ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغىنقا گىرىپتار بولغان ئىككى ياشلىق ياكى ئىككى ياشتنىن كىچىك بالىلارغا 250mg 250mg دىن كۈنگە ئىككى قېتىم ئىشلىتىلدى. بىر داۋالاش مۇددىتى ئادەتتە 7 كۈن بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 تېرىر قىچىشىش، ئاشقازان، ئۈچىي يولى رېئاكسىيىسى، قان رەڭ ماددىسى تۆۋەنلىش، قان بىلىر وۇنى يۈقىرىلاش، بۇرەك فۇنكسييىسى ئۆزگىرش قاتارلىقلار كۆرۈلەندۈدۇ. مۇسکۇلغا ئوکۇل قىلغاندا يېرىلىك ئورۇن ئاغرىيدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلدەن بولغان تەسىرى: ئامىنۇگلىكوزىد تۈرىدىكى دورىلار بىلدەن بىرگە ئوکۇل قىلىشا بولمايدۇ؛ يۈقىرى ئۇنىملىك سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورىلار بىلدەن بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىلسا بۇرەكىنى زەخىملەندۈرەندۇ. ② باشقىلار: پېنېتىلىنىغا زىياده سەزگۈر كىشىلەرنىڭ ئېھتىيات بىلدەن ئىشلىتىلدى.

【ياسالىمنىسى ۋە ئۇلچىمى】 سۈپىرو ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: بوتۇلكا/ 500mg، بوتۇلكا/ 750mg، بوتۇلكا/ 1000mg. موناسىپ ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: بوتۇلكا/ 750mg. سېفۇرۇكىسم تىۋەندە ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: بوتۇلكا/ 750mg. زىناسىف ئەنگىلىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: 0.75gm/. ئامپۇل، ئامپۇل/ 1.5g؛ تابلىقى: تابلىقى: 125mg/، تابلىقى: 500mg تابلىقى: 250mg/؛ قۇرۇتۇلغان شېكەرلىك قىيامى: خالتا/ 250mg/.

سېفۇرۇكىسم ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: بوتۇلكا/ 750mg. ئاكسېتىن سېپرۇستا ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: بوتۇلكا/ 750mg.

سِفَاكْلُور (头孢克洛, Cefaclor)

【باشقا نامى】 كېفلور (可福乐, Keflor), سېڭاكلىر (希刻劳, Ceclor), كلېم سېف (希刻乐素, Cegaclor) · (史达功 S250, Cefacolor S250) سېفاكولور (克林社福, Clemcef) · (头孢克洛).

【فارماكولوگييلىك ئالاھىدىلىك】 كەڭ تەسىرىلىك ئانتىبىئوتىك دورا بولۇپ، ئۆزۈمىسمان باكتېرىيە، يېرىتىلىق زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيە، ئۆپكە ياللىوغى شارچە باكتېرىيىسى، تارقىلىشچان زۇكام تاياقچە باكتېرىيىسى، Klebsiella سۆزىنەك (奈瑟菌, Neisser) باكتېرىيىسى، سالਮۇنىلا باكتېرىيىسى، شىگا تاياقچە باكتېرىيىسى (志贺菌) باكتېرىيىسى، باكتېرىوئىدلار سەزگۈر كېلىدۇ، ئاچ قورساق ئىچكىندە ياخشى سۈمۈرۈلىدۇ، 0.6~0.9h تەخمىنلىك، ئاساسلىقى ئىسىلى سۈيىتلىك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 سەزگۈر باكتېرىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئوتتۇرا قۇلاق ياللىوغى، نەپەس يولى يۈقۈملەنىش، يۇتقۇنچاق ياللىوغى ۋە بادام بىز ياللىوغى، سۈيىدۇك يولى يۈقۈملەنىش، تېرە ۋە تېرە يۈمىشاق تو قوللىرى يۈقۈملەنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلارنىڭ دائىملىق مىقدارى هەر 8h تە 250mg بولۇپ، ئىچىشكە بېرىلىدۇ. بالىلارنىڭ دائىملىق مىقدارى كۈنىگە هەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 20mg بولۇپ، 3 قېتىمغا بولۇپ ئىچلىدۇ. بىر قەدر ئېغىر يۈقۈملەنىش ياكى سەزگۈرچانلىقى نىسبەتن ئاجىز باكتېرىيەلەر كەلتۈرۈپ چىقارغان يۈقۈملەنىشلارغا مىقدارى بىر ھىسىھ قوشۇلىدۇ. -قان ئېرىتكۈچى زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيىسىدىن يۈقۈملەنىشنى داۋا لاشتا دورا ئىچىش ۋاقتى ئاز بولغاندا 10 كۈن بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان - ئۈچەي يولى ئالامەتلەرى كۆرۈلىدۇ، مەسىلەن: ئىچ سۈرۈش، ساختا پەردىلىك بوجىغان ئۈچەي ياللىوغى، كۆڭۈل ئېلىشىش ۋە قۇرمۇش قاتارلىقلار. بۇ دورا ئۆزۈن مەزگىل ئىشلىتىلە

تەكرار يۇقۇملىنىش كېلىپ چىقىشى مۇمكىن، ئاللىرىگىيلىك رېئاكسىيىدىن قىزىلغا ئوخشاش ئەسۋە، قاپارتقاو، قىچىشىش، يەلتاشما قاتارلىقلار كۆرۈلدۈ. بىر قىسم داۋالاش بىلەن مۇناسىۋەتلەك باشقا رېئاكسىيىدىن كىسلاتا خۇمار دانچە ھۈجىرىلىر كۆپىشى، ئاياللار جىنسىي يول ياللۇغى قاتارلىقلار بار. GPT ياكى ALP نى ۋاقتىلىق ئۇرۇلىتىۋېتىدۇ. قان ئۇرپىتا ئازوتى ياكى قاندىكى كربئاتىنىن يۇقىرىلاش ياكى سۈيدۈك ئانالىزىدا كرسىتال نورمالسىزلىقى ناسادىپى كۆرۈلۈپ قالىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: سېفالوپىورن تۈرىدىكى ئانتىبىئوتاك دورىلاغا زىيادە سەزگۈرۈك تارىخى بارلارغا ئىشلىتىش چەكللىنىدۇ. ② باشقilar: بۆرەك ئىقتىدارى كۆرۈنەرلىك تولۇق بولمىغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ ھامىلدارلار، بالا ئېمىتىش مەزگىلىدىكى ئاياللارغىمۇ ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ ئېيىغا توشماي تۇغۇلغان بوزاقلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 كېفلور ھىندىستاندا ئىشلەنگەن: كاپسۇلى، دانه/250mg، قۇرۇتۇلغان شېكەرلىك قىيامى: بوتۇلكا/1.5g/60ml.

سېكلىور ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/250mg، دانه/500mg؛ دوغ لەيلىمە ياسالىمىسى: بوتۇلکىسى/5ml 125mg، بوتۇلکىسى/5ml 250mg؛ قۇرۇتۇلغان شېكەرلىك قىيامى: بوتۇلکىسى/125mg/5ml، بوتۇلکىسى/1.5g/60ml، 125mg/5ml، خالتا/125mg.

سېڭاكلىور تىيەندە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/250mg. كلىپئانسېف كورىيىدە ئىشلەنگەن. قۇرۇتۇلغان شېكەرلىك قىيامى: بوتۇلكا/100mg.

سېغاكلور S250 گېرمانييىدە ئىشلەنگەن. ئىچىلىدىغان دوغ لەيلىمە ياسالىمىسى: 250mg/5ml.

سېفیکسیم

(头孢克肟，Cefixime)

【باشقا نامى】 CFIX (世福素)

【ئاساسىي تەركىبى】 سېفیکسیم

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىنىكى】 3 - ئەۋلاد كەڭ تەسىرىلىك سېفالوسپورىن تۈرىدىكى دورا بولۇپ، كۆپ ساندىكى گرام مەنپىي ئوكسигېن خۇمار باكتېرىيىلەر مەزكۇر دورىغا سەزگۇر كېلىدۇ، ئېنزىم ھاسىل قىلىدىغان ۋە ئېنزىم ھاسىل قىلمايدىغان ئالتۇن رەڭ باكتېرىيىلەر، ئېپىدىپرمىدىكى ئۆزۈمىسىمان شارچە باكتېرىيىلەر بۇ دورىغا سەزگۇر ئەمەس، ئۇچىي يولى شارچە باكتېرىيىسى ۋە تاياقچىسىمان باكتېرىيىلەرگە بولغان تەسىرى ناھايىتى ئاجىز، ساختا يەككە سپورلىق زەمبۇرۇغ ئۇرۇقدىشى مەسىلىن: بېشىل يېرىڭ تاياقچە باكتېرىيىشىگە ئاساسىي جەھەتنىن ئۇنۇم بىرمەيدۇ. چوڭلار ئىچكەندىن كېيىن T_{max} ئوتتۇرا ھېساب بىلەن $4h \sim 3$ ، $t_{1/2} = 2.5h$ بولسا $2.3 \sim 2.7h$ $t_{1/2} = 3-4h$ T_{max} تەخمىمنىن بىدەندە ئاساسىي جەھەتنىن پارچىلانماي، ئۇچىي يولى ياكى بۆرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كىسىللەكلەر】 كانايچە ياللۇغى، ئۇپكە ياللۇغى، بۆرەك جامى بۆرەك ياللۇغى، دوۋساق ياللۇغى، سۈيدۈك يولى ياللۇغى، ئۆت خالتا ياللۇغى، سكارلاتىنا، ئوتتۇرا قولاق ياللۇغى، بۇرۇن كاۋىكى ياللۇغى قاتارلىقلارنى داۋاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۈنگە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا $100mg \sim 50$ دىن ئىچىدۇ، كېسىلى ئېغىرلارغى ھەر قېتىمدا $200mg$ غىچە كۆپەيتىشكە بولىدۇ. بالىلار كۈنگە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا $3mg \sim 1.5$ ئىچىدۇ، كېسىلى ئېغىرلارغى ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا $6mg$ ئىچىسە بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئىسۋە، قىزىل داغ، قىچىشىلار كۆرۈلىدۇ. شوڭ ئالامەتلەرى ناھايىتى ئاز كۆرۈلىدۇ. دانچە ھۇجەيرىلەر كېمېيش ۋە كىسلاتا خۇمار دانچە ھۇجەيرىلەر كۆپىيىش ھەمde SGPT، SGOT، ئىشقارلىق فوسفاتازا، BUN ئۇرلەش، ئىچ سۈرۈش، ئاشقازان ئاغرىش،

ئىشتىها تۇتۇلۇش، كۆڭۈل ئېلىشىش قاتارلىقلار تاسادىپىي كۆرۈلۈپ قالىدۇ. ئېغىز ياللۇغى، تەسوچىسىمان زەمبۇرۇغ كېسىلى، باش ئاغىرش، قان پلاستىنكلەرى ئازىيىش، ساختا پەردىلىك بوغماق ئۆچىي ياللۇغى قاتارلىقلار ئىنتايىن ئاز كۆرۈلدى.

【دىقىقتە قىلىدىغان ئىشلار】 سېفالوسبۇرۇن تۇرىدىكى ئاتتىبىئوتىك دورىلارغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتش چەكلىنىدۇ. **【ياسالمىسى ۋە ئۆلچىمى】** يابۇنىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانە/50mg؛ دانە/100mg، دانىچە ياسالمىسى ھەر بولىقى/g 50mg.

سېفېپىم

(头孢毗肟, Cefepime)

【باشقۇ نامى】 ماكسىپىم (马斯平, maxipime) .
【ئاساسىي تەركىبى】 سېفېپىم.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 4 - ئۇلۇاد كەڭ تەسىرىلىك سېفالوسبۇرۇن تۇرىدىكى دورا بولۇپ، كۆپ ساندىكى گرام مۇسېدىت ۋە گرام مەنپىي باكتېرىيىللەرنى ئۆلتۈرەلەيدۇ. كۆپ ساندىكى β-لاكتامازاننىڭ ھىدرولىزلىشىغا بولغان چىدامچانلىقى يۇقىرى، ئۆكۈل قىلغاندىن كېپىن 2h CL 120ml/min، سۈيدۈك، ئۆت سۈيۈقلۈقى، قورساق پەرە ياللۇغى، قاپارتما سۈپىي، كاناي شىللەق پەردىسى، بەلخەم، معزى بېزى سۈيۈقلۈقى، سازاڭسىمان ئۆسۈك، ئۆت خالتنىسى قاتارلىقلاردا داۋالاش قويۇقلۇق دەرجىسىگە يېتىلەيدۇ. ئاساسلىقى ئىسلى پېتى بۆرەك ئاراكتىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىر】 سەزگۈر باكتېرىيىللەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان تۇۋەتكى نەپەس يولى، سۈيدۈك يولى، تېرىه، يۇمشاڭ توقۇلما، قورساق بوشلۇقى يۇقۇملۇنىش، ئاياللار - تۇغۇت بۇلۇمىدىكى يۇقۇملۇنىش، سېپېتىتىپىمەيە ھەمدە نېيتەرال دانىچە ھۈچىيەرلىر كېمىيىش خاراكتېرىلىك قىزىش قاتارلىقلارنى ئېنقاڭلاش خاراكتېرىلىك داۋالاشقا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا تېمىتىلىدۇ ياكى مۇسکۇلغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ. چوڭلار ۋە 12 ياشتنىن يۇقىرى بالىلارنىڭ

دائىملق مقدارى كۈنىگە ئىككى قىتم، ھەر قىتىمدا 1g بولۇپ، 10 ~ 7 كۈن بىر داۋالاش كۇرسى قىلىنىدۇ، يۇقۇملۇنىش ئېغىر بولغانلارغا داۋالاش مۇددىتىنى ئۆزارتىشقا بولىدۇ. بۇرەك ئىقتىدارى تولۇق بولىغانلارغا كىرىاتىنىڭ چىقىرىلىش نىسبىتىگە قاراپ دورا مقدارى تەڭشىلدۇ.

【ناچار تەسىرى】 سېفالوسپورن تۈرىدىكى باشقا دوربىلارنىڭكىگە ئوخشىشىپ كېتىدۇ. ئاشقازان - ئۆچەي يولى ئالامەتلەرى ۋە ئاللىرىگىلىك رېئاكسىسيسى كۆپ كۆرۈلدى.

【دىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 L- ئارگىنин (精氨酸-L) ، سېفالوسپورن تۈرىدىكىلەر، پېنتىسللين ۋە ياكى باشقا β - لاكتام تۈرىدىكى ئانتىبىئوتىك دوربىلارغا نىسبەتەن زىيادە سىزگۈرچانلىق رېئاكسىسيسى كۆرۈلدىغانلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ.
【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 ماكسىپم ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. پاراشوكلۇق ئوکۇلى: بوتونلۇكا/0.5g ، بوتونلۇكا/1g .

سېفەيتازول

(头孢美唑, Cefmetazole)

【باشقا نامى】 سېفەيتازون (先锋美他醇).

【ئاساسىي تدرىكىبى】 ناترىي سېفەيتازون.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 باكتېرىيىگە قارشى دائىرىسى گرام مۇسېت، گرام مەنپى باكتېرىيە ۋە ئوکسىگېنдин قاچقۇچى باكتېرىيەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، ئېنزمىغا چىدامچانلىقى كۈچلۈك بولۇپ، گرام مەنپى باكتېرىيە ۋە ئوکسىگېنдин قاچقۇچى باكتېرىيىگە بولغان باكتېرىيىگە قارشى دائىرىسى 1 - ئەۋلاد سېفالوسپورن تۈرىدىكى دوربىلارغا قارىغاندا كەڭ بولىدۇ. ۋېناغا ئوکۇل قىلىنسا بەدەنگە كەڭ تارقىلىنىدۇ، $t_{1/2}$ 1h بولۇپ، ئاساسەن ئىسلى پېتى بۇرەكتىن چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 سىزگۈر باكتېرىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئۆپكە ياللۇغى، كاناچە ياللۇغى، ئۆت يولى يۇقۇملۇنىش، قورساق پەردىسى ياللۇغى، سۇيدۇك ئاجرەتىش سىستېمىسى

يۇقۇملىنىش، بالىيانقۇ ۋە قوشۇمچىلىرى يۇقۇملىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ ياكى ۋېناغا ئىشلىتىلدى. چوڭلارغا كۈنىگە $2g \sim 1$ گىكى قېتىمغا بىۋلۇپ ئىشلىتىلدى. بالىلارغا كۈنىگە هەر $1kg$ بىدەن ئېغىرلىقىغا $100mg \sim 135$ ، $4 \sim 2$ قېتىمغا بىۋلۇپ ئىشلىتىلدى. ئېغىر ئەجەلسەن ئەجەلسەن خاراكتېرىلىك كېسەلىكلىرىنىڭ دورا مىقدارىنى كۆپەيتىشكە بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 زىيادە سەزگۇرلۇك، مەسىلەن: يەلتاشما، ئەسۋە، دورا قىزىتىمىسى قاتارلىقلار قىسىمن چاغلاردا كۆرۈلەندۇ، يەنە شوڭ پېيدا قىلىدۇ. BUN ناڭ يۇقىرىلىشى تاسادىپىي كۆرۈلۈپ قالىدۇ. كىسلاتا خۇمار دانىچە ھۇجەيرىلەر كۆپىيىش، ئاق قان ھۇجەيرىلىرى ۋە قىزىل قان ھۇجەيرىلىرى ئاز يىشلارمۇ كۆرۈلەندۇ. بىزى بىمارلاردا GPT ۋە ALP لار يۇقىرى كۆتۈرۈلەندۇ. كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش ۋە ئىچ سۈرۈش قاتارلىقلار كۆرۈلەندۇ. ئىنتايىن ئاز ساندىكى بىمارلاردا ساختا پەردەلىك ئۇچىي ياللۇخى پېيدا بولىدۇ، تەسۋىسمان زەمبۇرۇغدىن تەكرار يۇقۇملىنىشىمۇ كەلتۈرۈپ چىقىرىدى.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: تەسىرى كۈچلۈك، سۈيىدۇك ھەيدىگۈچى دورىلار بىلەن بېرىلىكتە ئىشلىتىلسە بۆرەكىنىڭ زەخىملىنىشىنى ئېغىرلاشتۇرىدى؛ ئېتاناولنىڭ نورمال مېتابوليزملىنىشىغا كاشلا قىلىدۇ. ② دېققەت قىلىدىغان ئىشلار: سېفالوسپورىن تۈرىدىكى دورىلارغا زىيادە سەزگۇر كىشىلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: زىيادە سەزگۇرلەر ۋە بۆرەك ئىقتىدارى زەخىملەنگەنلەرنىڭ ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 سېفەمتازون ياپۇنىيىدە ئىشلەنگەن. پاراشوكلۇق ئوکۇلۇ: بوتۇلكا/0.25g، بوتۇلكا/0.5g، بوتۇلكا/1g، بوتۇلكا/2g، قاپ/بوتۇلكا 10.

لوراكاربيف (氯碳头孢, Loracarbef)

【باشقا نامي】 لورابيد (Lorabid)

【ئاساسىي تەركىبى】 لوراكاربيف

【فارماکولوگىلىك ئالاھىدىلىكى】 تەسىر قىلىش مېخانىزمى باشقا β - لاكتام تۇرىدىكى ئاتتىبىئوتىك دورىلارغا ئوخشاش. ھەر خىل باكتېرىيلىر پەيدا قىلىدىغان β - لاكتامازاغا نىسبەتەن تۇرالقلىق، ئىچكەندە ياخشى سۈمۈرۈلىدۇ. $T_{max} \sim 1.0 \sim 1.3h$, $t_{1/2} \sim 1.0 \sim 1.5h$, ئاساسلىقى بۆرەكتىن چىقىرىلىدۇ، بۆرەك ئىقتىدارى تولۇق بولىغانلارنىڭ $t_{1/2}$ ئۇزىرىайдۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 سەزگۈر باكتېرىيە كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان چوڭلار ۋە بالىلارنىڭ نەپەس يولى، سۈيدۈك سىستېمىسىدىكى يۈقۇملىنىش، ئاياللار بۆلۈمى، بېش ئىزا بۆلۈمى ۋە تېرى، يۇمشاق توقۇلمىلاردىكى يۈقۇملىنىشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 يۇتقۇنجاق ياللۇغى، بادام بىز ياللۇغى، كانايىچە ياللۇغىغا گىرپىتار بولغانلار، تېرى ۋە يۇمشاق توقۇلمىلار يۈقۇملانغان بىمارلار: چوڭلارغا كۈننەگە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 200mg دىن ئىچىشكە بېرىلىدۇ، بالىلارغا ھەر kg بىدەن ئىغىرىلىقىغا 15mg ~ 7.5 mg كۈننەگە ئىككى قېتىم ئىچىشكە بېرىلىدۇ. ئۆپكا ياللۇغى، بۆرەك ياللۇغى، بۆرەك جامى بۆرەك ياللۇغى بىمارلىرىغا كۈننەگە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 400mg 400mg 400mg 400mg ئىچىشكە بېرىلىدۇ، دوۋۇساق ياللۇغى ۋە سۈيدۈك يولى ياللۇغى بىمارلىرىغا كۈننەگە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 200mg 200mg 200mg 200mg ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاساسلىقى ئاشقازان - ئۈچەي يولى رېئاكسىيىسى كۆرۈلىدۇ، زىيادە سەزگۈرلۈك ئالامەتلەرى ناھايىتى ئاز كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 باشقا سېفالوسپورن تۇرىدىكى دورىلارنىڭىگە ئوخشاش.

【باسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 لورابيد ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانە/200mg، دانە/400mg، بوتۇلكا/دانە 30؛ قۇرۇتۇلغان شېكەرلىك قىيامى: 100mg/5ml، بوتۇلكا/50mg.

سېفتەرىئاكسون (头孢曲松, Ceftriaxone)

【باشقى نامى】 روتسېفين (罗氏芬, Rocephin) ، سېفين
(泛生舒复, Cefin)

【ئاساسىي تەركىبى】 ناترىي سېفتەرىئاكسون.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بېرىم سىنتېزلىكىن 3 - ئەۋلاد سېفالوسپورىن تۈرىدىكى ئاتىبىئۇتىك دورا. گرام مۇسبىت باكتېرىيىگە نسبەتن ئوتتۇرا دەرىجىلىك قارشى تەسىرى بار، گرام مەنپى باكتېرىيىگە بولغان تەسىرى كۈچلۈك، ئەمما گەندە زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيىسى ۋە يېڭى پېننسىللەنغا چىدالىق ئۈزۈمىسىمان شارچە باكتېرىيىسى بۇ دورخا چىدالىق، ئىچسە سۈمۈرۈلمىدۇ، بەدەندە كەڭ تارقىلىدۇ، مېڭى قان توسوقدىن ئۆتۈپ، باش سۈيى ۋە سۆڭەك تو قوللىرىغا كىرەلەيدۇ. $t_{1/2} = 6 \sim 8\text{h}$ ۋە مېڭى ئەسلى پېتى بۆرەكتىن چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەلىكىلەر】 سەزگۈر باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئۆپكە ياللۇغى، كانايىچە ياللۇغى، قورساق پەرده ياللۇغى، كۆكىرەك پەرده ياللۇغى ھەمدە تېرى ۋە يۇمشاق توقۇلماڭلار، سۈيدۈك يولى، ئۆت نىچىسى، سۆڭەك ۋە بوغۇم، بېش ئىزا، جاراهەت يۈزى قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ يۈقۈملەنىشىغا ئىشلىلىدۇ، سېپتىتسېمىيە ۋە مېڭە پەرده ياللۇغىنى داۋلاشىقىمۇ ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇفلى ۋە مىقدارى】 مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ ياكى ۋىنغا تېمىتىلىدۇ، چوڭلاردىكى ئادەتسىكى يۈقۈملەنىشلارغا 2.0g ~ 0.5 كۈنگە بىر قېتىم؛ ئېخىر يۈقۈملەنىشلارغا كۈنگە 2g ئىككى قېتىمغا بولۇپ ئوكۇل قىلىنىدۇ. سۆزىنە كە كۈنگە بىر قېتىم 250mg ئىشلىلىدۇ. باللارغا ئادەتتە چوڭلار دورا مىقدارىنىڭ 1/2 ئىشلىلىدۇ. بۇزانق ۋە گۇددەكلىرىگە كۈنگە هەر kg بەدەن ئېخىر لىقىغا 20 ~ 80mg دورا بېرىش ئارىلىقى 24h بولىدۇ، ۋىنغا تېمىتىقاندا بىر قېتىملق مىقدارى 1g ياكى كۈنلۈك مىقدارى 2g بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان، ئۈچەي يولى سىستېمىسى رېئاكسىسي، ئالاھىرىگىيلىك رېئاكسىسيه

ۋە باش ئاغرىش، باش قېيىش، ئامىنوترانسىپېرازا يۇقىرى كۆتۈرۈلۈش، قان زەردابىدىكى كىرىڭىزلىرىنىن ئۆرلەش، كۆپىيىش سىستېمىسى زەمبۇرۇغ كېسىلى قاتارلىقلار كۆرۈلۈدۇ. قىسمەن بىمارلاردا ۋېناغا ئوكۇل قىلغاندىن كېيىن ۋېنا ياللۇغى پەيدا بولۇشى مۇمكىن.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئامىنۇگلىكۈزىد تۈرىدىكى ئانتىبىئۆتكى دورىلار بىلەن بىر لەشتۈرۈپ ئىشلەتكەندە بىر - بىرىنى ئايىپ ئىشلىتىش ياكى ماسلىشىش تەسىرى كۆرۈلۈدۇ، ئەمما بۇ ئىككى دورىنى ئايىپ ئىشلىتىش كېرەك. ② مەنى ئىلىنىدىغان ئەھۋاللار: سېفالو سپورىن تۈرىدىكى دورىلارغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: زىيادە سەزگۈرلەرگە ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ ياش - ئۆسۈرلەر ۋە باللارغا ئىشلەتكەندە قىسمەن چاغلاردا ئۆتتە تاش پەيدا قىلىدۇ؛ جىڭىر، بۆرەك ئىقتىدارى ئېغىر دەرىجىدە زەئىپلەشكەنلەرگە ئىشلەتكەندە قان رايىنى قەرەللەك تەكسۈرۈپ تۇرۇش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ٹۈلچىمى】 روتسېفن، شۇبىتىسارىيىدە ئىشلەنگەن. بوتۇلكا/0.25g، بوتۇلكا/0.5g، بوتۇلكا/1g، بوتۇلكا/1.2g. سېفن تىۋەندە ئىشلەنگەن. ئوكۇلى: بوتۇلكا/0.25g، بوتۇلكا/1g.

سېفوکسىتىن (头孢西丁, Cefoxitin)

【باشقا نامى】 مېفوكسىن (美福仙, Mefoxin).

【ئاساسىي تەركىبى】 سېفوکسىتن

【فارماگولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 گرام مۇسېدەت باكتېرىيىگە قارشى تەسىرى ئاچىز، گرام مەنپىي باكتېرىيىگە قارشى تەسىرى كۈچلىك، يېشىل يىرىڭ تاياقچە باكتېرىيىسى، ئۇچەي شارچە باكتېرىيىسى ۋە يېپىق ئېرىق تاياقچە باكتېرىيىسىنىڭ كۆپ ساندىكى باكتېرىيە تۈپىگە نسبەتەن سەزگۈر ئەمەس، مۇسكۇلغا ئوكۇل قىلغاندا T_{max} ~ 30min بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 سەزگۈر باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان تۆۋەنكى نەپەس يولى، سۈيدۈك، كۆپىيىش

سىستېمىسى، قورساق يوشلۇقى، سۆڭۈك ۋە بوغۇم، تېرى ۋە يۇمشاق توقۇلما قاتارلىق ئورۇنلارنىڭ يۇقۇملۇنىشغا ئىشلىلىدۇ، سېپتىتىسىمېگىمۇ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، چوڭلارغا كۈنگە 4 ~ 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 2g ~ 1 ئىشلىلىدۇ، بۇرەك فۇنكسىيىسى تولۇق بولمىغانلارغا كەپئاتىنىنىڭ چىقىرىلىش نسبىتىگە ئاساسەن دورا بېرىش لايىھىسى بېكىتلىدىدۇ..

【ناچار تەسىرى】 مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلغان ئورۇن ئاغرىنىدۇ، رېئاكسىيە بېرىش ئالامەتلەرى پېيدا بولىدۇ، نېيتراال دانچە ھۇجمەيرىلەر كېمىيىش، جىڭىر، بۇرەك فۇنكسىيىسى نورمالسىزلىنىش قاتارلىقلار تاسادىپى كۆرۈلۈپ قالىدۇ.

【دىقىھەت قىلىدىغان ئىشلار】 كۆپ ساندىكى سېفالوسپورىن تۈرىدىكى دورىلار بىلەن قارىمۇ قارشى تەسىر پېيدا قىلىدۇ، بىرلىكتە ئىشلىلىسە باكتېرىيىگە قارشى داۋالاش ئۇنۇمى ئاجىزلايدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 مېغۇكىسىن ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. ئوكۇلى: بوتۇلکا/ 1g.

سېفوتابىسىم

(头孢噻肟, Cefotaxime)

【باشقا نامى】 كلافوران (Claforan) ، (凯福隆， Claforan) سېفومىك (菌必灭, Cefomyc) ، سېفاجېت (Cefajet) . (凯福捷， Cefomic)

【ئاساسىي تەركىبى】 سېفوتابىسىم
【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بېرىم سىنتېزلىنگەن كەڭ تەسىرلىك باكتېرىيىگە قارشى 3 - ئەۋلاد سېفالوسپورىن تۈرىدىكى دورا بولۇپ، زەنجرىسمان شار باكتېرىيىسى (ئۇچىي شار باكتېرىيىسى بۇنىڭ سىرتىدا) گە قارشى تۇرۇش تەسىرى بىرقەدەر كۈچلۈك. گرام مەنپىي باكتېرىيىگە بولغان تەسىرى بىرقەدەر كۈچلۈك، يېشىل يېرىڭ تاياقچە باكتېرىيىسى، يېپىق ئېرىق تاياقچە باكتېرىيىسى، ئاجىز تاياقچىسىمان باكتېرىيە قاتارلىقلار بۇ دورىغا ئانچە سەزگۈر ئەمەس، ئىچكەندە سۈمۈرۈلمىدىدۇ، مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلغاندا، $t_{1/2}$ 0.5h Tmax

1.13h بولىدۇ، قان پلازمىسى ئاقسىلى بىلدەن بىرىكىش نىسبىتى 45% ~ 30 بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 سىزگۈر باكتېرىييلر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان نېبەس يولى، سۈيدۈك يولى، سۆڭۈك، بوغۇم، تېرىه، يۇمىشاق توقۇلمىلار، قورساق يوشلۇقى، ئۆت نېچىسى، ھەزىم يولى، بىش ئەزا، نېسىللەنىش ئەزىزلىرى قاتارلىقلارنىڭ يۇقۇملەنىشغا ئىشلىتىلدى، كۆيۈك، زەخىملەنىش كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يۇقۇملەنىش ھەمدە سېپتىتسېمىيە، مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنىڭ يۇقۇملەنىشىغىمۇ ئۇنۇم بېرىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مقدارى】 مۇسکۇلغا ياكى ۋىناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ، چوڭلارغا كۈنگە 4~2 قېتىم، ھەر قېتىم 0.5~1g، ئادەتتىكى يۇقۇملەنىشقا كۈنگە 2g، ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ ئوکۇل قىلىنىدۇ؛ ئۇتتۇرا دەرىجىدە ياكى بىر قەددەر ئېخىر يۇقۇملانغانلارغا كۈنگە 3~6g، ئۇچ قېتىمغا بۆلۈپ ئوکۇل قىلىنىدۇ؛ سېپتىتسېمىيەگە گىرىپتار بولغانلارغا كۈنگە 8g ~ 6، 4 ~ 3 قېتىمغا بۆلۈپ ئوکۇل قىلىنىدۇ؛ ناھايىتى ئېخىر يۇقۇملانغانلارغا ئىشلىتىش مقدارى كۈنگە 12g دىن ئاشۇرۇۋېتىلىمیدۇ ھەمدە ئالىتە قېتىمغا بۆلۈپ ۋىناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ؛ سۆزىنەك كېسەللىرىگە 1g مۇسکۇلغا ئوکۇل قىلىنىدۇ. باللارغا كۈنگە ھەر kg بەدەن ئېخىر لەقىغا 100mg ~ 50، 3 ~ 2 قېتىمغا بۆلۈپ ئوکۇل قىلىنىدۇ. بۇۋاق ۋە ئۆسمۈر باللارغا مۇسکۇلدىن ئوکۇل قىلىشقا بولمايدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئۆزۈن مۇددەت ئىشلەتكىندە تەكىرار يۇقۇملەنىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، مەسىلەن: تەسۋىسىمان زەمبۇرۇغ كېسىلى، ساختا پەردىلىك ئۆچىي ياللۇغى قاتارلىقلار.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 بېنىتىلىن تۈرىدىكى دورىلارغا زىيادە سىزگۈرلەر ۋە زىيادە سىزگۈرلۈك تارىخى بارلارغا، بۆرەك فۇنكىسىيى ئېخىر زەخىملەنگەنلەرنىڭ ئېھىتىيات بىلدەن ئىشلىتىش لازىم. 【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 كلافوران كېرمانىيىدە ئىشلەنگەن.

ئوکۇلى: بوتۇلكا/0.5g، بوتۇلكا/1g، بوتۇلكا/2g. سېغومىك تايلانددا ئىشلەنگەن. پاراشوكلۇق ئوکۇلى: ئامپۇل/1g. سېفاجىت ھىندىستاندا ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: بوتۇلكا/0.25g،

بوتولكا/0.5g ، بوتولكا/1g

لاتاموكسيف

(拉氧头孢，Latamoxef)

【باشقا نامي】 شيومارин (噬吗灵，Shiomarin).

【ئاساسىي تەركىبى】 لاتاموكسيف

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 يېرىم سىنتېزلىنگەن β -لاكتام تۈرىدىكى ئانتىبىئوتىك دورا، گرام مۇسېدەت ۋە گرام مەنپىي باكتېرىيىلەرنىڭ باكتېرىيىگە قارشى دائىرىسى كەڭ بولۇپ، β -لاكتامازاغا چىداملىق $t_{1/2}$ ~ 2.4h، $t_{1/2}$ ~ 1.8h.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 چوڭ ئۆچەي تاياقچە باكتېرىيىسى Klebsiella باكتېرىيىسى، سېرراتسىيە باكتېرىيىسى (沙雷菌) قاتارلىقلار كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سېپتىتىسىمىيە، مېڭە پىرەدە ياللۇغى، نەپەس يولى يۈقۈملەنىش، جىڭەر، ئۆت يولى يۈقۈملەنىش، قورساق پىرەدە ياللۇغى، سۈيدۈك يولى ۋە كۆپپىش سىستېمىسى قاتارلىقلارنىڭ ئېغىر يۈقۈملەنىشىغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 چوڭلارغا كۈنىگە 2g ~ 1 ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ ياكى ۋېناغا تېمىتىلىدۇ ۋە ياكى مۇسکۇلغۇ ئوکۇل قىلىنىدۇ. بالىلارغا كۈنىگە هەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا ~ 80mg، 40، 4 ~ 2 قېتىمغا بۆلۈپ ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ ياكى ۋېناغا تېمىتىلىدۇ، كېسەللىك ئەھۋالى ئېغىرلارغا ھەسىلىپ ئىشلىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 شوڭ ئالامەتلەرى ئىنتايىن ئاز كۆرۈلىدۇ. ئىسۋە، يەلتاشما، BUN ئۇرلەش، سۈيدۈكتىن ئاقسىل كېلىش، قىزىل قان ھۈجىرىسى ۋە دانىچە ھۈجىرىلەر ئازىيىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ؛ قىزىش، يۆتىلىش، نەپەس قىيىنلىشىش، كىسلاطا خۇمار دانىچە، ھۈجەيرىلەر كۆپپىش، زەھەرلىنىش خاراكتېرلەك يۈزە تېرىه نېكروزلىنىش، ۋىتامىن K بېتىشەسلىك كېسىلى، ۋىتامىن E بېتىشەسلىك كېسىلى، باكتېرىيىلەر توبى ئالماشىش ئالامەتلەرى، باش ئاغىش، چارچاش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ.

【دېقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: فۇرۇزپىمىد (呋噬咪) قاتارلىق يۇقىرى ئۇنۇملىوڭ سۈيدۈك ھىدىيگۈچى دورىلار بىلەن بىرلىكتە ئىشلەتكەندە، بىزى چاڭلاردا بۆرەكى زەھەرلەش خۇسۇسىيەتى كۈچىيپ كېتىدۇ؛ ئىچىدىغان قان ئۇيۇشقا دسۇلفرام (双硫仑) دەك تەسىر پىيدا قىلىدۇ؛ ئىچىدىغان خەترى كېلىپ قارشى دورىلار بىلەن بىرلىكتە ئىشلىتىلسە، قاناش خەترى كېلىپ چىقىدۇ. ② مەئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا ئاللىپرىگىيلىك رېئاكسىيە تارىخى بارلار ۋە لىدوكاڭىن ياكى فېنۇل ئامىن تۈرىدىكى يېرىلىك ئورۇنى ناركوز قىلغۇچى دورىلارغا نىسبەتن ئاللىپرىگىيلىك رېئاكسىيە تارىخى بارلارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ؛ ③ باشقىلار: مەزكۇر بىمار ياكى ئاتا - ئانا، بىر تۇغقان قېرىنداشلىرى ىچىدە كانايچە زىقىسى، ئەسۋە، يەلتاشما قاتارلىق زىيادە سەزگۈرلۈك كۆرۈلگەن بىمارلار، بۆرەك فۇنكسىيىسى ئېغىر دەرىبىدە تولۇق بولىغانلار، ئېغىزدىن ئوزۇقلۇق قوبۇل قىلىش ياخشى بولماي ئېغىزدىن سىرتقى يوللار ئارقىلىق ئوزۇقلۇق قوبۇل قىلغۇچىلار، ياشانغانلار، بەدەن ھالتى ناچار لاشقاڭلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى؛ بۇۋاق ۋە ئۆسمۈر بالىلارغا مۇسکۇلغا ئوکۇل قىلىش مۇۋاپىق ئەممەس.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 شىومارىن ياپونىيىدە ئىشلەنگەن. پاراشوكلۇق ئوکۇل: بوتولكى/0.25g، بوتولكى/0.5g، بوتولكى/1g.

· سېفوتوئام

(头孢替安, Cefotiam)

【باشقا نامى】 پانسپورن pansporin . 泛司博林

【ئاساسىي تەركىبى】 سېفوتوئام.

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 2 - ئۇلۇاد يېرىم سىنتىپز لەنگەن سېغالووسپورن تۈرىدىكى دورا بولۇپ، گرام مۇسېدەت باكتېرىيىگە بولغان تەسىرى ئانسېپ (头孢唑啉) غا ئوخشاب كېتىدۇ، گرام مەنپىي باكتېرىيىگە بولغان تەسىرى بىر قەدەر كۈچلۈك بولىدۇ. ئىچكەندە سۈمۈرۈلمەيدۇ، مۇسکۇلغا ئوکۇل قىلغاندا 0.5h Tmax بولىدۇ، مېڭە - يۈلۈن سۇيۇقلۇقىغا ئوڭايىلىقە كىرەلمەيدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كىسىللەكلىدەر】 سەزگۈر باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يۇقۇملۇنىشلار، مەسىلەن: ئۆپكە ياللۇغى، كانايچە ياللۇغى، ئۆت يولى يۇقۇملۇنىش، قورساق پەزىسى ياللۇغى، سۈيدۈك يولى يۇقۇملۇنىش، ئۇپېراتىسىدىن كېيىن ياكى زەخىمىلىنىش كەلتۈرۈپ چىقارغان يۇقۇملۇنىش ۋە سېتتىسىمىيە قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مۇسکۈلغا ياكى ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ. چوڭلارغا كۈنگە 2g ~ 1, 4 ~ 2 قېتىمغا بۇلۇپ ئوکۇل قىلىنىدۇ، ئېغىر يۇقۇملۇنىشلارغا كۈنگە 4g غىچە ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئۆچەي يولى باكتېرىيە توپىنىڭ ئۆزگەرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدى، ئىككىلمەمچى يۇقۇملۇنىش تاسادىپى كۆرۈلەندۇ. ئادەتتە كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، قورساق ئاغرىش، ئىچ سۈرۈش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدى، زىيادە سەزگۈرلۈك ئاندا - ساندا كۆرۈلەندۇ، GPT ۋاقتىلىق ئۆرالىپ، دورا توختىتلەغاندىن كېيىن ئەسىلگە كېلىدۇ، قان رايىنىڭ ئۆزگەرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدى.

【دىققەت قىلىنىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئامىنۇگىلکۈزىد تۈرىدىكى ئاتىبىئۇتكى دورىلار بىلەن بىر لەشتۈرۈپ ئىشلىتىلسە، بۇركە زەخىمىلىنىش ئېغىرلىشىش مۇمكىن؛ تەسىرى كۈچلۈك سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە بۇركە زەخىمىلىنىدۇ. ② مەنىنى قىلىنىدىغان ئەھۇاللار: پېننسىللەن ۋە سېفالوسپورىن تۈرىدىكى دورىلارغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: بۇركە فۇنكسىيىسى تولۇق بولىغانلارغا دورا مىقدارنى ئازايىتىش ياكى ئېوتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم؛ بۇ دورا كۆپ مىقداردا ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىسا قان تومۇر خاراكتېرىلىك ئاغرىش ۋە قان نۆكچىسى خاراكتېرىلىك ۋېنابى ياللۇغى كېلىپ چىقىدى.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 پانسپورىن يابۇنىيىدە ئىشلەنگەن. پاراشوكلۇق ئوکۇلى: بوتۇلغا 1g.

سېفودىزىم (头孢地嗪，Cefodizime)

【باشقا نامى】 مودىۋىد (莫迪，Modivid)
【ئاساسىي تەركىسى】 سېفودىزىم.
【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ئىممۇنىتلىق ئىقتىدارنى
ئاشۇرالايدىخان سېفالوپسپورىن تۈرىدىكى دورا بولۇپ، β - لاكتامازاغا
تۈراقلىق، ئوكسىگېندىن قاچقۇچى باكتېرىيە ۋە ئوكسىگېن خۇمار
باكتېرىيىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كۆپ ساندىكى گرام مەنپىي باكتېرىيە
ۋە مۇسېبەت باكتېرىيىلەرگە تەسىر كۆرسىتىدۇ، دورا بېرلىگەندىن كېيىن
تارقىلىشى تېز ۋە كەڭ دائىرىلىك بولۇپ، ئاساسلىقى بۆرەك ئارقىلىق
چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەككەر】 سەزگۈر باكتېرىيىلەر
كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ھەرخىل يۇقۇملۇنىشلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
【ئىشلىتىش مۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ ياكى
ۋېناغا تېمىتىلىدۇ ۋە ياكى مۇسۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ. چوڭلارغا كۈنگە
بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا $2.0\text{g} \sim 1.0$ ئىشلىتىلىدۇ.
【ناچار تەسىرى】 ئاللىپرگىيلىك رېئاكسىيە، ئاشقاران - ئۈچەي
رېئاكسىيىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، GPT ۋە بىلرۇنىنى
ئۆرلىتتۈپتىشى مۇمكىن. ئۆزۈن مەزگىل ئىشلەتكەننە ئاق قان
ھۇجەيرىلىرى كېمىيىش ياكى كەم ئۇچرايدىغان دانلىق ھۇجەيرىلىر
كەملىك كېلىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى:
پروبېنپەتسىد (丙磺舒) بىلەن بىرلىكتە ئىشلەتكەننە بۇ دورىنىڭ
چىقىرىلىشىنى ئۇزارتقىلى بولىسىدۇ. ئامينوگلىكوزىد،
ئامفوتوپرتىسنس (环孢霉素)， سىكلوپسپورىن (环孢霉素)， سىسپلاتن
(顺铂)， ۋاكوسىن (万古霉素)， پوليمىكسن E (多粘菌素 E) قاتارلىق
بۆرەكىنى يوشۇرۇن زەھەرلەش خۇسۇسىتىگە ئىنگە دورىلار بىلەن بىرگە
ئىشلەتكەننە، بۆرەكىنى زەھەرلەش خۇسۇسىتى ئارتىدۇ؛ ئۇنۇمى كۈچلۈك
سۈيدۈك ھېيدىگۈچى دورىلارغا قوشۇپ ئىشلىتىلسە، بۆرەكىنى

زەخىملەندۈرىدۇ. ② مەنى قىلىنىدىغان ئەھۋالار: سېفالوسپورين ۋە پېنтиسللين تۈرىدىكى دورىلارغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ھەمەدە ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: جىڭىر، بۇرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولمىغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش كېرەك؛ مۇسکۇلغَا ئوکۇل قىلغاندا ئاغرىتسا، 1% لىدو كائىن ئىشلىتىپ ئاغرىق پەسىيىتشىكە بولىدۇ، ئىمما ۋېنغا ئوکۇل قىلىشقا بولمايدۇ. «ياسالمىسى ۋە ئۆلچىمى» مودۇۋىد گېرمانىيەدە ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: بوتۇلكا/0.5g، بوتۇلكا/1.0g، بوتۇلكا/2.0g.

§ . β - لاكتام تۈرىدىكى باشقىا دورىلار

ئىمپېپنېم/سلاستاتين

(西司他汀, Cilastatin/Imipenem, 亚胺培南)

【باشقىا نامى】 泰能， تىئىنام (Tienam).
 【ئاساسىي تەركىبى】 ئىمپېپنېم ۋە ناترىي سلاستاتين.
 【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 كۆپ ساندىكى گرام مۇسېت، مەنھىي باكتېرىيە ۋە ئوکسىگىندىن قاچقۇچى باكتېرىيىلەرنىڭ ھەممىسىگ ئۇنۇم بېرىدۇ، بولۇپمۇ كۆپ خىل باكتېرىيىدىن بېرىكتە يۇقۇملىنىشقا مۇۋاپىق كېلىدۇ. β - لاكتام تۈرىدىكى باشقىا دورىلارغا سېلىشتۈرگاندا، باكتېرىيىگە قارشى دائىرسى كەڭ، ئاكىنچىچانلىقى كۈچلۈك بولۇپ، دورىغا گىرەلشمە چىدامچانلىق ئوڭاي پېيدا بولمايدۇ. مەزكۇر دورا بەدەنگە كەڭ تارقىلىدۇ، $t_{1/2}$ 1h بولىدۇ، ئاساسلىقى بۇرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 سەزگۈر باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ھەرخىل يۇقۇملىنىشلارغا، بولۇپمۇ ھەرخىل باكتېرىيىلەردىن ئارىلاشما يۇقۇملىنىشقا مۇۋاپىق كېلىدۇ.
 【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېنغا تېمىتىلىدۇ، چوڭلارغا كۈنگە 2g ~ 1.5 ~ 1، 2 ~ 1 قېتىمغا بولۇپ ئوکۇل قىلىنىدۇ. ئېغىر يۇقۇملىنىش ۋە يېشىل يېرىڭ تاياقچە باكتېرىيىسىدىن يۇقۇملىنىشقا كۈنگە 3 ~ 2 قېتىمغا بولۇپ ئىشلىتىلىدۇ، سۈيدۈك يولى

بۇقۇملۇنىشغا كۈنگە 2g ~ 1 ئىشلىتىلди. ئەمما ئومۇمىي مىقدارى
ھەر kg بىدەن ئېغىرىلىقىغا 50mg 50 دىن ئېشپ كەتمەسىلىكى كېرەك.
بالىلارغا كۈنگە ھەر kg بىدەن ئېغىرىلىقىغا 80mg ~ 30، كېسىلى
ئېغىرلارغا ھەر kg بىدەن ئېغىرىلىقىغا 100mg ~ 8h، ھەر 6 تە بىر قىتىم
مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئوكۇل قىلىغان ئورۇن ئاغرىش، قىزىل داغ،
قاتىق توڭۇن ۋە ۋىبا ياللۇغى دائىم كۆرۈلدى. ئاشقازان - ئۇچەي يولى
رېئاكسىيىسى ۋە زىيادە سەزگۈرلۈك ئالامەتلەرنىمۇ پەيدا قىلىدۇ.
【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى:
بىڭىياڭنىياۋەگەن (丙氧鸟甘) بىلەن بىرگە ئىشلىتىسىه تۇتقاقيقى
قوزغىلىدۇ؛ ② باشقىلار: ھامىلىدارلار ۋە پېننسىللەنغا زىيادە
سەزگۈرلەرگە ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى؛ بالىلارغا مۇسکۇلدىن ئوكۇل
قىلىنىدۇ.
【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 تىئىنام ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن.
پاراشوكلۇق ئوكۇلى: بوتولكا/0.25g، بوتولكا/0.5g.

مېرۆپېنېم (美罗培南, Meropenem)

【باشقا نامى】 مېپېم (Mepem)
【ئاساسىي تەركىبى】 مېرۆپېنېم.
【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 كاربېنېم
(碳青霉烯) تۈرىدىكى ئاتتىبىئوتىك دورا بولۇپ، ئورگانىزىمىدىكى بۆرەك
دېھىدرۆپېپتىدازا (脱氢肽梅)غا نسبىتەن تۈرقلقى، باكتېرىيىگە قارشى
داىرىسى كەڭ بولۇپ، گرام مۇسېت، گرام مەنپىي ۋە ئوكىسىگىنдин
قاچقۇچى باكتېرىيىلەرنىڭ ھەممىسىگە ناھايىتى سەزگۈر، بولۇپمۇ گرام
مەنپىي باكتېرىيىگە بولغان تەسىرى كۈچلۈك، ۋېناغا ئوكۇل قىلغاندىن
كېيىن بىدەنگە كەڭ تارقىلىدۇ، بىلەم، ئۆپكە توقۇلمىسى، ئۆت
سۇيۇقلۇقى، ئۆت خالتىسى، قورساق بوشلۇقى سىرغىما سۇيۇقلۇقىغا
ياخشى تارقىلىدۇ، $t_{1/2}$ 1h بولۇپ، ئاساسلىقى بۆرەك ئارقىلىق
چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 سەزگۈر باكتېرىيلىر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئوتتۇرا ۋە ئېغىر دەرىجىلىك يۇقۇمىلىنىشلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ ياكى ۋېناغا تېمىتىلىدۇ، چوڭلارغا كۈنگە $1\text{g} \sim 0.5\text{ g}$ ~ 3 ~ 2 قېتىمغا بۆلۈپ ئىشلىتىلىدۇ، كېسىلى ئېغىر لارغا كۈنگە 2g غىچە كۆپەيتىلىدۇ. 【ناچار تەسىرى】 ئاللىرىگىلىك رېئاكسىيە، ھەزمىم سىستېمىسى، قان سىستېمىسى ئالاھىتلىرى بەزىدە كۆرۈلىدۇ. تەكرار يۇقۇلىنىش ۋە جىڭىر، بۆرەك فۇنكىسىيىسى زەخىلىنىش تاسادىپى كۆرۈلۈپ قالىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنى قىلىنىدىغان ئەمۇللار: مەزكۇر دورا تەركىبىگە نىسبەتنەن زىيادە سەزگۈرلۈكتىن بولغان شوك پەيدا بولۇش تارىخى بارلار ۋە سودئۇم ۋابروئات (丙戊酸钠) ئىشلىتىلۋاقان تۇتقاڭ كېسىلى بىمارلىرىغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ② باشقىلار: سېفالوسپورىن تۈرىدىكى دورىلارغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ۋە زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ بالا ئېمىتىۋاقان ئاياللار، ياشاغان بىمارلار ۋە جىڭىر، بۆرەك فۇنكىسىيىسى ئېغىر دەرىجىدە توسقۇنلۇققا ئۇچرىغۇچىلارغا ئىشلەتكەندە ئېھتىيات قىلىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 مېپىيم ياپونىيىدە ئىشلەنگەن. پاراشوكلۇق ئوکۇلى: بوتولكا/ 0.25g ، بوتولكا/ 0.5g .

پانىپېنېم/بېتامىپرون

(培他米隆, Betamipron/Panipenem, 帕尼培南)

【باشقا نامى】 كاربېنن (克倍宁, Carbenin)

【ئاساسىي تەركىبى】 پانىپېنېم ۋە بېتامىپرون.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ئالتۇن رەڭلىك ئۈزۈمىسىن شارچە باكتېرىيىسى، ئۇچىدى شارچە باكتېرىيىسىنى ئاساس قىلغان گرام مۇسېدە باكتېرىيە، چوڭ ئۇچىدى تاياقچە باكتېرىيىسى، يېشىل يىرىڭ تاياقچە باكتېرىيىسىنى ئاساس قىلغان گرام مەنپىي باكتېرىيە، تاياقچىسىمان باكتېرىيە قاتارلىقلارغا قارشى تەسىرى بار.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 سىزگۈر باكتېرىيلەر

كەلتۈرۈپ چىرىدىغان ھەرخىل يۇقۇملۇنىشلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋىناغا تېمىتىلىدۇ، چوڭلارغا

كۈنگە 1g ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ ئىشلىتىلىدۇ. ئېغىر كېسەللەر ياكى

جاھىل خاراكتېرىلىك يۇقۇملانغان بىمارلارغا 2g غىچە كۆپەيتىلىپ، ئىككى

قېتىمغا بۆلۈپ ئىشلىتىلىدۇ. باللارغا ئادەتتە كۈنگە ھەر kg بەدهن

ئېغىرلىقىغا 30~60mg، ئۇچ قېتىمغا بۆلۈپ ئىشلىتىلىدۇ. ئېغىر ياكى

جاھىل خاراكتېرىلىك يۇقۇملۇنىشلارغا كۈنگە ھەر kg بەدهن ئېغىرلىقىغا

جاھىل خاراكتېرىلىك يۇقۇملۇنىشلارغا كۈنگە ھەر kg بەدهن ئېغىرلىقىغا

100mg غىچە كۆپەيتىلىپ، 4 ~ 3 قېتىمغا بۆلۈپ ئىشلىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاساللىقى ئەسوھ، سېسىق كېكىرسە،

قۇسۇش، GPT، GOT يۇقىرلاش، كىسلاتا خۇمار دانچە ھۈجىرلەر

كۆپىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنتى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار:

مەزگۈر دورا تەركىبىگە زىيادە سىزگۈرلۈك تارىخى بارلارغا ئىشلىتىش

چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: كاربپىنم (碳青霉烯) تۈرىدىكى دورلار،

پېنтиسللين ياكى سېفالوسپورىن تۈرىدىكى ئانتىبىئوتىك دورلارغا زىيادە

سىزگۈرلۈك تارىخى بارلار ياكى شۇ كىشى ۋە ياكى ئۇنىڭ ئاتا - ئانا، بىر

تۇغقان قېرىندىاشلىرى ئىچىدە زىيادە سىزگۈرلۈك ئالامەتلەرى پەيدا بولغان

ۋە زىيادە سىزگۈرلەر، بۇرەك فۇنكسييىسى ئېغىر دەرىجىدە تو سقۇنلۇققا

ئۇچرىغۇچىلار، ھامىلىدارلار، ئاي كۇنى تو شماي تۇغۇلغان باللار، يېڭى

تۇغۇلغان باللار قاتارلىقلارغا ئېھتىيات بىلدەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچەمى】 كاربپىنن ياپۇنىيىدە ئىشلەنگەن.

پاراشوكلۇق ئوكۇلى: بوتونلۇك/ 0.25g، بوتونلۇك/ 0.5g.

ئازترېئونام

(氨曲南，Aztreonam)

【باشقىا نامى】 ئازاكتام (君刻单，Azactam)

【ئاساسىي تەركىبى】 ئازترېئونام.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 يەككە هالقىلىق β - لاكتام

تۈرىدىكى ئانتىبىئوتىك دورا، كۆپ ساندىكى گرام مەنپىي ئوكسىگېن خۇمار

باكتېرىيىلەرگە نسبەتن باكتېرىيىگە قارشى يۇقىرى ۋاتىپچانلىققا ئىگە، يېشىل يېرىڭ تاياقچە باكتېرىيىسىدىن سرت، بىر قىسىم ساختا يەككە سپورتلىق زەمبۇرۇغ ئۇرۇقدىشى ۋە ھەرىكەتسىز باكتېرىيىلەر ئۇرۇقدىشغا نسبەتن باكتېرىيىگە قارشى تەسىرى بىر قەدەر ئاچىز، ئۇزۇمىسىمان شارچە باكتېرىيە ئۇرۇقدىشى، زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيە ئۇرۇقدىشى قاتارلىق ئوكسىگېن خۇمار گرام مۇسېدىت باكتېرىيە ھەمە ئوكسىگېنىدىن قاچقۇچى باكتېرىيىلەرگە قارىتا باكتېرىيىگە قارشى ۋاتىپچانلىقى بولمايدۇ، بۇ دورىنى مۇسکۇلغَا ئوکۇل قىلغاندا سۈمۈرلۈشى تېز ھەم تولۇق بولىدۇ، مۇسکۇلغَا ئوکۇل قىلىنسا T_{max} 1h ئىتراپىدا، ئاقسىل بىللەن بىرىكىش نسبىتى $65\% \sim 40$ بولىدۇ ھەمە بەدەنگە كەڭ تارقىلىدۇ، تەخمىمنەن 70% ئىسلى پىتى سۈيدۈكتىن چىقىرىلىدۇ.

$1.5 \sim 2h t_{1/2}$

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 بۇ دورىغا سەزگۈر گرام منپى ئوكسىگېن خۇمار باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سۈيدۈك يولى يۇقۇملۇنىش، تۆۋەنكى نەپەس يولى يۇقۇملۇنىش، سېپتىتىسىمىيە، ئۆت نېچىسى ۋە قورساق بوشلۇقى يۇقۇملۇنىش، ئاياللار بۆلۈمىدىكى يۇقۇملۇنىش، ئوپپراتىسىدىن كېيىنكى يارا ئېغىزى ۋە كۆيۈك، يارا قاتارلىقلارنىڭ يۇقۇملۇنىشغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا ياكى مۇسکۇلغَا ئوکۇل قىلىنىدۇ. چوڭلارنىڭ ئادەتتىكى يۇقۇملۇنىشغا كۈنگە $1g \sim 0.5$ ، ئۇقتىرۇرا، ئېغىز دەرىجىدىكى يۇقۇملۇنىشلارغا $2g$ غىچە كۆپەيتىلىپ، $12h \sim 8$ تە بىر قېتىم ئىشلىلىدۇ، بۇرەك فۇنكسىيىسى تولۇق بولىغانلارغا كەپئاتىنىنىڭ چىقىرىلىش نسبىتىگە ئاساسەن دورا بېرىش لايىھىسى بېكىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش ھەمە تېرە ئاللىپ كېلىلەك رېئاكسىيىسى كۆرۈلىدۇ، ئاق قان ھۈچەيرىسى كېمىيىش، قان پلاستىنكلىرى كېمىيىش، پەرق ئېتىش قىيىن بولغان سوکىسىمان باكتېرىيە خاراكتېرىلىك ئىچ سۈرۈش، ئاشقازان - ئۇچىي قاناش، سويۇلۇشچان تېرە ياللۇغى، جىڭەر - ئۆت سىستېمىيى زەخىملىنىش، مەركىزىي نېرۇۋا سىستېمىيى رېئاكسىيىسى ۋە مۇسکۇل ئاغرىش قاتارلىقلار ناھايىتى ئاز كۆرۈلىدۇ. مۇسکۇلغَا ئوکۇل قىلغاندا

يەرلىك ئورۇن يېقىمىزلىنىش سېزىمى پەيدا بولىدۇ، ۋېنادىن دورا بېرىللىك قىسىمن چاغلاردا ۋېنا ياللۇغى كېلىپ چىقىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان

تەسىرى: سېفرادىن (头孢拉定)، مېھىروننىدازول (甲硝唑) بىلەن بىرگە ئىشلىتش چەكلىنىدۇ. ② مەئى ئىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا نىسبەتن ئاللىپرىگىلىك رېئاكسىيە پەيدا بولغۇچىلارغا ئىشلىتش چەكلىنىدۇ؛ ③ باشقىلار: زىيادە سەزگۈرلەر ۋە β -لاكتام تۈرىدىكى باشقا ئانتىبىئوتىك دورىلار ئاللىپرىگىلىك رېئاكسىيە پەيدا قىلغۇچىلارغا، شۇنداقلا ھامىلىدارلار، بۇۋاق ۋە گۆدەك بالىلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ئازاكتام ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن.

پاراشوكلۇق ئوکۇلۇ: بوتلەكى / 500mg.

4 . ئامىنۇ گلىكوزىد تۈرىدىكى دورىلار

سېپىكتىنومىتسىن

(妝观霉素, Spectinomycin)

【باشقا نامى】 تروپىتىسىن (淋必治, Trobicin)， توگوبلۇس

· 大观霉素，(克利宁, Kirin) (高巴斯, Togoplus)

【ئاساسىي تدركىبى】 سېپىكتىنومىتسىن.

【فارماكولوگىلىك ئالاھىدىلىكى】 ئامىنۇ گلىكوزىد تۈرىدىكى ئانتىبىئوتىك دورا بولۇپ، گرام مۇسېبەت ۋە مەنپىي باكتېرىيىلەرگە قارشى تەسىرى، ئەمما ئادەتتە تەسىرى بىرقەدەر ئاجىز بولىدۇ. ئاساسلىقى سۆزىنەك شارچە باكتېرىيىسىگە ئالاھىدە ئۇنۇم بېرىدۇ. ئىچكەندە سۈمۈرۈلمىدۇ، مۇسکۇلغا ئوکۇل قىلىنسا ياخشى سۈمۈرۈلىدۇ،

1h T_{max} ، 5h $t_{1/2}$ بولۇپ، ئاساسن بۆرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللەككىلەر】 مەزكۇر دورىغا سەزگۈر

سۆزىنەك شارچە باكتېرىيىسىدىن يۇقۇملۇنىشتىن كېلىپ

چىقىدىغان ئەرلەرىدىكى ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك سۆزىنىك باكتېرىيىسى سۈيدۈك يولى ياللۇغى ۋە تۈز ئۈچەي ياللۇغى، ئاياللاردىكى ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك بالىيانقۇ بوبىنى ياللۇغى ۋە تۈز ئۈچەي ياللۇغىنى داۋالاشقا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مۇسکۇلغۇ ئۆكۈل قىلىنىدۇ، چوڭلارغا هەرقېتىمدا 2g (5ml) ئىشلىتىلدى، ئەگەر (10ml) 4g ئۆكۈل قىلىشقا توغرا كەلسە، 10ml دورىنى ئايىرمى - ئايىرمىم ھالدا ساغرا قىسىمىنىڭ ئۆڭ - سول ئىككى تەرىپىگە ئۆكۈل قىلىش لازىم.

【ناچار تەسىرى】 ئۆكۈل قىلىنغان ئورۇن ئاغرشى، يەلتاشما، باش قېيىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، تىترەش، قىزىش، سۈيدۈك مىقدارى ئازىيىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغانان تەسىرى: لىتىمىي ياسالىمىلىرى بىلەن بىلە ئىشلەتكەندە، لىتىمىي ياسالىمىسىدىن زەھەرلىنىش كېلىپ چىقىدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋالار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بارلارغا ئىشلىتىش چەكلەنىدۇ. ③ باشقىلار: سەفلەسىنى داۋالاشقا مۇۋاپىق كەلمەيدۇ؛ مۇسکۇلغۇ ئۆكۈل قىلىنىدۇ، ۋېناغا ئۆكۈل قىلىشقا بولمايدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 تروپىتىسن بېلگىيىدە ئىشلەنگەن. پاراشوكلۇق ئۆكۈلى: بوتۇلغا 2g/ .

توگوپلۇس ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. ئۆكۈلى: بوتۇلغا 2g/. كىرىن سېرۋىتا ئىشلەنگەن. پاراشوكلۇق ئۆكۈلى: بوتۇلغا 2g/ .

نېتىلمىتسىن (奈替米星，Netilmicin)

- 力克菌星，(力确兴，Netromycin)
- 【ئاساسىي تەركىبى】 نېتىلمىتسىن سۇلغات (星) (硫酸奈替米星).
- 【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 ئامىنۇ گلىكوزىد تۈرىدىكى ئانتىبىئوتىك دورا بولۇپ، تۆۋەن قويۇقلۇقتىلا گرام مەنپىي باكتېرىيە ۋە ئۇزۇمىسىمان شارچە باكتېرىيە، سۆزىنىك Neisseria شارچە باكتېرىيىسى قاتارلىق كېسىل پەيدا قىلغۇچى كۆپ خىل باكتېرىيىلىرىنى ئۆلتۈرەلەيدۇ. مۇسکۇلغۇ ئۆكۈل قىلغاندا قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نسبىتى

تۆۋەن بولىدۇ. $t_{1/2}$ 2.5h، ئەمما دورا مىقدارى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. بىدەندە مېتابولىز ملانىايدۇ، ئاساسىي ئەزالار ۋە بىدەن سۈيۈقلۈقىغا كەڭ تارقىلىدۇ، ئەمما مېڭە - يۈلۈن سۈيۈقلۈقى ۋە ئۆت سۈيۈقلۈقىدىكى قوپىقلۇقى بىرقدەر تۆۋەن بولىدۇ. دورىنىڭ كۆپ قىسىمى ئەسلى پېتى سۈيۈدۈك ئارقىلىق چىقرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 سەزگۈر باكتېرىيەر كەلتۈرۈپ چىقرىدىغان نەپەس سىستېمىسى، سۈيۈدۈك يولى، كۆپىيىش سىستېمىسى قاتار لىقلارنىڭ يۇقۇملۇنىشى ھەممە تېرى، يۇشماق تو قولما، سۆڭەك، بوغۇم، زەخىملەنگەن ئورۇن قاتار لىقلارنىڭ يۇقۇملۇنىشىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، ۋېناغا تېمىتىلىدۇ. چۈچلارغا كۈنىگە ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا ~ 6mg، ھەر 8h تە بىر قېتىم ياكى ھەر 12h تە بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ، ئېغىر يۇقۇملانغانلارغا كۈنىگە ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 7.5mg غىچە كۆپەيتىشكە بولىدۇ. بالىلارغا كۈنىگە ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 7.5mg ~ 6، ھەر 8h تە بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ. يېڭى تۇغۇلغان بالىلارغا كۈنىگە ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 6mg ھەر 12h تە بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ. بۇرەك فۇنكىسييسى تولۇق بولمىغان بىمارلارغا دورا بېرىش ئارلىقىنى ئۇزارىش ياكى دورا مىقدارىنى كېمەيتىش كېرەك.

【ناچار تەسىرى】 بۇرەك ۋە نېرۋىنى زەھەرلىيدۇ، بۇرەك فۇنكىسييسى ۋە سەككىزىنچى جۈپ مېڭە نېرۋىسىنى زەخىملەندۈردى.

【دىققەت قىلىدىغان قىشلار】 ① مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۇلار:

بۇ دورىغا ياكى ئامىنۇگلەككۈزىد تۈرىدىكى باشقا دورىلارغا نىسبەتن ئاللىپىركىيەلەك رېئاكسىيە ۋە ئېغىر زەھەرلەش رېئاكسىيى پەيدا بولغۇچىلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: بۇ دورىنى ئىشلەتكەندە بۇرەك فۇنكىسييسى ۋە سەككىزىنچى جۈپ مېڭە نېرۋىسى ئىقتىدارنىڭ ئۆزگۈرىشىنى بېقىندىن كۆزىتىپ تۇرۇش، يوشۇرۇن ھالدا نېرۋىنى زەھەرلىيدىغان ياكى بۇرەكىنى زەھەرلىيدىغان باشقا دورىلار بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىشىن ساقلىنىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 نېترومېتسىن بېلگىيىدە ئىشلەنگەن.

ئوکۇلى: ھەر ئامپۇلى 2ml/50mg، ھەر ئامپۇلى 2ml/200mg.

5 . ماكرولىدېس تۈرىدىكى دورىلار

ئازىترومىتسىن (阿齐霉素, Azithromycin)

【باشقا نامى】 سۇمامېد (舒美特, Sumamed)

【ئاساسىي تەركىبى】 ئازىترومىتسىن (阿齐红霉素)

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ئازوت ھالقىلىق لاكتون (氮环内脂) تۈرىدىكى بىر سىنجى ئاتىبىستۇتكى دورا بولۇپ، بەدەن سىرتىدىكى باكتېرىيىگە قارشى ئاكتىپچانلىقى ئېرىترومىتسىن بىلەن ئۆخشاشىپ كېتىدۇ ياكى سەل كۈچلۈك، ئەمما باكتېرىيىگە قارشى دائىرىسى ئېرىترومىتسىندىن سەل كەڭ، بەزى گرام ھەنپىي تاياقچە باكتېرىيىلەرگە قارشى ئاكتىپچانلىقى بىرقەدەر ياخشى، مەسىلەن: ئارقىلىشچان زۇكام تاياقچە باكتېرىيىسى، ھەربىي قىسىم باكتېرىيىسى قاتارلىقلار. $t_{1/2} = 60h$ 40 گە يېتىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 نەپەس سىستېمىسىنىڭ سەزگۇر باكتېرىيىلدەن يۇقۇملىنىشى، بۇرۇن كاۋىكى ياللۇغى، ئۇتتۇر اقۇلاق ياللۇغى، جىنسىي يۇقۇملۇق كېسەللەكلەر دىن غەيرىي خاس (خلامىدىيە) ۋە سۆزىنىڭ شارچە باكتېرىيىسى مەنبەلىك سۈيدۈك يولى ياللۇغى، بالىيانقۇ بويىنى ياللۇغى قاتارلىقلارنى داۋالاشقا ئىشلىتىلەدۇ.

【ئىشلىتش ڭۈسۈلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۇنىڭ 250mg 25 دىن ئۇدا بەش كۈن ئىچىدۇ، دەسلەپكى قىتىمدا دورا مىقدارى ھەسسلىنىدۇ ياكى كۇنىڭ 500mg، ئۇدا ئۇچ كۈن ئىچىلدى، بالىلارغا كۇنىڭ ھەر kg بەدەن ئېغىر لىقىغا 10mg، ئۇدا ئۇچ كۈن ئىشلىتىلدى، بەدەن ئېغىرلىقى 25 ~ 40mg غىچە بولغان بالىلارغا كۇنىڭ 0.125g، ئۇدا بەش كۈن ئىشلىتىلدى، دەسلەپكى قىتىمدا دورا مىقدارى ھەسسلىنىدۇ، جىنسىي يۇقۇملۇق كېسەللەكلەرگە بىر قىتىمدا 1g ئىشلىتىلەدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان - ئۇچەي رېئاکسىيىسى تاسادىپپى كۆرۈلىدۇ، مەسىلەن: كۆئۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىچ سۇرۇش قاتارلىقلار، قىسمەن كىشىلەرde ئاللېرىگىيلىك رېئاکسىيە، مەسىلەن: دورا قىزىتمىسى، ئەسۋە قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، GPT قايتما خاراكتېرىلىك

يۇقىرى كۆتۈرۈلۈش تاسادىپسى كۆرۈلۈپ قالىدۇ.
 【دىقىقتەن قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنىئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار:
 مەزكۇر دورا ياكى ماكرولىدېس تۈرىدىكى باشقا ئانتىبىئوتىك دورىلارغا
 زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: جىڭىر
 فۇنكسييىسى تولۇق بولمىغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.
 【ياسالىملىسى ۋە ئۆلچىمى】 سۇمامېد كورىيىدە ئىشلەنگەن.
 كاپسۇلى: دانە/250mg ، تاختا/6 دانە؛ تابلىپتى: تابلىپت/125mg ،
 تابلىپت/500mg ، قۇرۇتۇلغان شېكەرلىك قىيامى: 100mg/5ml ،
 20ml ، بوتۇلكا/200mg/5ml

كلارتروومىتسىن (克拉霉素，Clarithromycin)

【باشقا نامى】 مېتيل ئېرىتروومىتسىن (甲基红霉素)，
 كلاسىد (克拉仙，Klacid)
 【ئاساسىي تەركىبى】 كلارتروومىتسىن.
 【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ئېرىتروومىتسىنىڭ
 تۈغۈندىسى بولۇپ، گرام مۇسبىت باكتېرىيىگە فارشى ئاكتېچانلىقى بىر
 قەدر ياخشى، بەدهن سىرىتىدىكى باكتېرىيىگە فارشى ئاكتېچانلىقى
 ئېرىتروومىتسىنغا ئۇخشىپ كېتىدۇ. ياخشى سۇمۇرۇلىدۇ، بىئولوگىيلىك
 پايدىلىنىش دەرىجىسى % 60 كە پېتىدۇ.
 【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەلىكىلەر】 سەزگۈر باكتېرىيىلەر
 كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان نەپەس سىستېمىسى يۇقۇملىنىش، بۇرۇن كاۋىكى
 ياللۇغى، ئوتتۇرا قۇلاق ياللۇغى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
 【ئىشلىتىش ئۇسوپلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۇنىگە
 ~ 500 نى ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ ئاج قورساق ئىچىدۇ؛ بالىلار
 كۇنىگە هەر kg بەدهن ئېغىرىلىقىغا 150mg نى ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ
 ئىچىدۇ؛ هەر قېتىمدا 500mg، كۇنىگە ئىككى قېتىم ۋېنادىن تېمتىلىدۇ.
 【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان - ئۇچىي يولى يېقىمىزلىنىش،
 كۆڭۈل ئېلىشىش، ھەزمىم قىلىش ناچارلىشىش، قورساق ئاغرىش، قۇسۇش
 ۋە ئىچ سۇرۇش ئەڭ كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئۇنگىدىن باشقا، باش ئاغرىش،

تەم سەزگۈسى نورمال سىزلىنىش ۋە جىڭىرىدىكى ترانسیئامىنازا (肝转氨酶) ۋاقتىلىق يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشلەرمۇ كۆرۈلىدۇ. بۇ دورىنى ئىچكەندە دورا ئەسۋىسى، يەلتاشما، يەغىندى ئالامەتلەرى قاتارلىق پېيدا بولۇشى مۇمكىن.

【دېقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنىق قىلىدىغان ئەھۋاللار: ماکرولىدېس تۈرىدىكى دورىلارغا زىياده سەزگۈرلەرگە ئىشلىش چەكلىنىدۇ؛ ② باشقىلار: جىڭىر ئىقتىدارى زەخىملەنگەنلەر، ئوتتۇرا، ئېغىر دەربىجىدىكى بۆرەك فۇنكسييتسى زەخىملەنگەنلەرگە ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 كلاسىد ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى 250mg، قاپ/8 تابلىپت، 500mg، قاپ/10 تابلىپت. ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. قۇرۇتۇلغان شېكىرىلىك قىيامى، بوتۇلكا/1.5g/60ml؛ تابلىپتى: تابلىپت 250mg، قاپ/6 تابلىپت، قاپ/8 تابلىپت.

روكستروميسين (罗红霉素，Roxithromycin)

【باشقانامى】 رۇلىد (Rulide)، رېنیتىسىن (迈克罗德，Makrodex) ماکرودېكس (罗利宁，Renicin) (فارما ماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى) ئېرىتروومتىسىنىڭ تۇغۇندىسى بولۇپ، باكتېرىيىگە قارشى دائىرىسى ۋە، تەسىرى ئېرىتروومتىسىن بىلەن ئوخشاش، ئىچكەندە ياخشى سۈمۈرۈلۈپ، بەدەنگە كەڭ تارقىلىدۇ، $t_{1/2}$ 16h گە يېتىدۇ.

【مۇۋاپىق كىلىدىغان كېسەلىكىلەر】 سەزگۈر باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان نەپس سىستېمىسى يۇقۇملىنىش، بۇرۇن كاۋىنلىكى ياللىۇغى، ئوتتۇرا قۇلاق ياللىۇغى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدۇ، سۈيدۈك كۆپبىش سىستېمىسى ۋە تېرىه - يۇماشاق توقۇلمىلارنىڭ يۇقۇملىنىشىغىمۇ ئىشلىتىلدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۈنگە

600mg ~ 300 نى ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ ئىچىدۇ. بەدهن ئېغىرلىقى 23kg ~ 12 غىچە بولغان بالسالار ھەرقېتىمدا 50mg دىن كۈنىگە ئىككى قېتىم ئىچىدۇ؛ 40kg ~ 20 غىچە بولغان بالسالار ھەرقېتىمدا 100mg دىن كۈنىگە ئىككى قېتىم ئىچىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاساسلىقى يېنىك ھەرجىدىكى ئاشقازان - ئۇچىدىي يولى يېقىمىزلىنىش كۆرۈلدۈ، ئەسوھ قاتارلىق ناچار تەسىرلەر ئاز كۆرۈلدۈ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 جىڭىر، بۆرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولىغانلارغا ۋەتىيات بىلەن ئىشلەتلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە، ئۆلچەمى】 رۆلىد فرانسييىدە ئىشلەنگەن.

تابلىپتى، 50mg، تابلىپت/100mg، تابلىپت/150mg، تابلىپت/300mg، قاپ/10 تابلىپت، لەيلىمە ياسالىمىسى: خالتا/50mg، قاپ/6 خالتا.

رېنتسىن سلۇۋېنىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپت/150mg، قاپ/6 تابلىپت، قاپ/10 تابلىپت.

ماکرودبىكس ھىندونبىز يېنىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپت/150mg، قاپ/6 تابلىپت.

§ 6. كۇئىنولون تۈرىدىكى دورىلار

سېپروفلوکساتسىن (环丙沙星, Ciprofloxacin)

【باشقان نامى】 سىفران (悉复欢, Cifran)، تېمارىل

· (西普乐, Ciprobay) سېپروفليبي (特美力, Temaril)

【ئاساسىي تەركىبى】 سېپروفلوکساتسىن لاكتات.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 DNA ئايلانما ئېنزمىنداڭ DNA نىڭ ئاكتىپچانلىقىغا كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى تورمۇزلاش ئارقىلىق باكتېرىيىلەرنى ئۆلتۈرۈش رولىغا ئىكە بولىدۇ. گرام مەنبىي تاياقچە باكتېرىيىىنگە بولغان سەزگۈرلۈكى يۇقىرى، گرام مۇسېدەت شارچە باكتېرىيىسىنىڭ بۇ دورىغا بولغان سەزگۈرچانلىقى گرام مەنبىي تاياقچە باكتېرىيىسىگە يەتىمىيدۇ. ئۇچىي شارچە باكتېرىيىسى، دورىغا چىداملىق

ئۇزۇمىسىمان شارچە باكتېرىيىسى، تاق يادرولىق ئاق قان ھوجىرىلىرىنى كۆپەيتکۈچى لىستى (利斯特) باكتېرىيىسى، نocardio (诺卡氏) باكتېرىيىسى قۇرۇقىدىشى، بۇمانى (布马尼) هەرىكەتسىز تاياقچە باكتېرىيىسى قاتارلىقلار بۇ دورىغا چىداملىق، بۇ دورىنى ىچىسە ياخشى سۈمۈرلۈدۇ، ۱/۲-تە خىمنىن 4h ئەتراپىدا بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەر】 كېسەللەك پەيدا قىلغۇچى سەزگۇر باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقرىدىغان ھەرخىل سىستېملىرىنىڭ يۇقۇملىنىشى ۋە يەرلىك ئورۇنىنىڭ يۇقۇملىنىشىغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش مۇسۇلى ۋە مىقدارى】 200mg 200 دىن كۈنگە 3 ~ 2 قېتىم ۋېنغا تېمىتىلدى. بۇرەك فۇنكسييىسى نورمالسىزلارغا CLRغا ئاساسىن دورا مىقدارى تەڭشىلدۇ؛ جىڭىر فۇنكسييىسى نورمالسىزلىققا قورساق سۇبى قوشۇلۇپ كەلگەن بىمارلارغا ئىشلىتىلىدىغان دورا مىقدارى 400mg غا يەتكۈزۈلدى، كۈنگە كۆپ بولغاندا ئىككى قېتىم ئىشلىتىلدى. 500mg دىن كۈنگە ئىككى قېتىم ئىچىلىدۇ. ئەڭ يۇقىرى مىقدارى 750mg دىن كۈنگە ئىككى قېتىم ئىچىلىدۇ؛ سۆزىنىڭ شارچە باكتېرىيىسى خاراكتېرلىك سۈيدۈك يولى ياللۇغى بولسا 250mg بىر قېتىم ئىچىلىدۇ؛ تۆۋەنلىك سۈيدۈك يولى يۇقۇملىنىش (ئەگە شەمە كېسەللەك بولىغان) بولسا 250mg دىن كۈنگە ئىككى قېتىم ئىشلىتىلدى. بۇرەك فۇنكسييىسى ئېغىر دەرىجىدە تولۇق بولمىغانلار (كېرىتەتنىنىڭ چىقىرىلىش نسبىتى 20ml/min دىن تۆۋەنلىر)، جىڭىر فۇنكسييىسى ئېغىر دەرىجىدە تولۇق بولمىغان ھەم قورساق سۇبى قوشۇلۇپ كەلگەنلەرگە دائىملىق دورا مىقدارنىنىڭ 1/2 ئىشلىتىلدى ھەممە ھەر قېتىملىق دورا ئىشلىتىش ئارىلىقى 24h بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 يەلتاشما، داغلىق دۆكچە ئەسوھە، قورساق ئاغرش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش، قورساق كۆپۈش، مۇسکۈل ۋە ياكى بوغۇملار ئاغرش، نېرۋا سىستېمىسى ئالامەتلەرىدىن، تارتىشىش، خىيالىي سېزىم، باش قېيىش، ئۇيقوسىزلىق، ئۆزىنى مەستەك سېزىش، سېزىم نورمالسىزلىنىش، مېڭە ئىچكى بېسىمى ئۆرلەش قاتارلىقلار كۆرۈلدى. نېرۋا خاراكتېرلىك سۈلۈق ئىشىق، زىيادە سەزگۈرلۈكتىن بولغان شوڭ، نۇرغا سەزگۈر تېرە ياللۇغى، قان تومۇر سۆسۈن دېغى، كۆپ شەكىللەك قىزىل داغ، Stevens — Johnson

يىغىندى ئالامەتلىرى، ئۆكچە بېي ياللۇغى ۋە ئۆكچە پېسى ئۈزۈلۈش، GPT ، ALP ۋە بىلىرۇپن ئۆرلەش، جىڭىر ياللۇغى قاتارلىقلار ناھايىتى ئاز كۆرۈلىدۇ؛ ياشانغان بىمارلاردا ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك قايتما بۆرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولماسلقنى پېيدا قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا مەلۇماتلار بار.

【دېقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ماشىنا مەشغۇلاتى بىلەن شۇغۇزلانغۇچىلار ۋە شوپۇرلاردا نېرۋا فۇنكسييىسى قالايمقاڭانلىشىش خەترى پېيدا بولىدۇ؛ مۇسکۇلى كۈچسىز لەنگۇچىلەرگە ياكى تارتىشىش تارىخى بارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 سفران ھىندىستاندا ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپت 250mg/20، قاپ/20 تابلىپت، ئۆكۈلى، ھەر ئامپۇلى 200mg/100ml.

تېمارىل گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى، 250mg ياكى تابلىپت/500mg، قاپ/10 تابلىپت، قاپ/20 تابلىپت؛ ئۆكۈلى: ھەر ئامپۇلى 200mg/100ml.

سېپروبىي ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپت/100mg، تابلىپت/200mg، قاپ/6 تابلىپت، قاپ/12 تابلىپت؛ ئۆكۈلى، ئامپۇل/20ml، ئامپۇل/40ml، بوتۇلكا/100ml، بوتۇلكا/200ml.

رۇفلاوكساتسىن (芦氟沙星，Rufloxaçin)

【باشقا نامى】 چارى (Qari) (卡力)

【ئاساسىي تەركىبى】 رۇفلاوكساتسىن هىدرۆخلورىد.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 ئۇزۇن ئۇنىتىمۇك يېڭى كۈئىنلۈون تۈرىدىكى دورا بولۇپ، ئۇكسىگېنغا ئېھتىياجلىق گرام مۇسېدت باكتېرىيە، گرام مەنپىي باكتېرىيە، بولۇپمۇ سۈيدۈك يولى ۋە نەپەس يولى يۇقۇملۇنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان كېسىللىك باكتېرىيىسىگە بولغان تىسىرى ناھايىتى كۈچلۈك بولىدۇ. 35h تاخىمنىن $1/2$.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىللىكلىكەر】 سىزگۈر باكتېرىيىلىر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان تۆۋەنكى نەپەس يولى ۋە سۈيدۈك يولى

يۇقۇملىنىشى دۇالاشقا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش مۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنىگە بىر قېتىملا ئىشلىتىلدى. تۇنجى كۈنى 400mg نى بىر قېتىمدا ئىچىپ، ئىككىنچى كۈنىدىن باشلاپ كۈنىگە 200mg دىن ئىچىلدى. داۋالاش مۇددىتى يۇقۇملىنىنىڭ ئېغىر لىق دەرىجىسى، كېسەلىك ئەھۋالى ۋە باكتېرىيىنىڭ بەدەندىكى ئەھۋالىغا قاراپ تەڭشىلدى، ياش قۇرامىغا يەتكەن بىمار لارغىلا ئىشلىتىلدى.

【ناچار تەسىرى】 قورساق ئاغرىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، ھەزم قىلىش ناچارلىشىش، ئىچ سۈرۈش، قۇسۇش، باش ئاغرىش، نېرۋا زىيادە سېزىمچانلىشىش، تەشۇشلىنىش، باش قېيىش، ئۇيقو تو سقۇنلۇققا ئۇچراش، تىترەش، ئەسوھ، يەلتاشما، قىزىل داغ، تىل ۋە ئاۋاز فاپقى سۇلۇق ئىشىش، نەپەس قىينلىشىش، تۆۋەن قان بېسىمى، شوڭ قاتارلىقلار پىيدا بولۇشى مۇمكىن. ئېغىز قۇرۇش، قورساق كۆپۈش، سېزىم نورمالسىزلىنىش، نېرۋىسى چېچىلىش، خىيالىي سېزىم پىيدا بولۇش، قۇلاق غۇڭۇلداش، تىرلەش، مۇسکۇللار ئاغرىش ۋە نۇرغا سەزگۈرچانلىق ئېشىش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلدى.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 مەزكۇر دورا ياكى كۈنىلۈن تۈرىدىكى دورىلارغا زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بارلارغا، تۇنقاڭ كېسىل ياكى تارتىشىش تارىخى بارلارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ھامىلدارلار، بالا ئېستىۋاتقان ئاياللار، باللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى. بۇ تۈرىدىكى دورىلارنى ئىشلىتىپ مۇسکۇل زەخەملىنىش كېلىپ چىققانلارغا ئىشلەتىمىسىلىك لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 چارى ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپ/200mg، قاپ/6 تابلىپ، قاپ/2 تابلىپ.

ئۇفلاکساتسىن (氧氟沙星, ofloxacin)

【باشقا نامى】 تارىۋىد (Tarivid)

【ئاساسىي تەركىبى】 ئۇفلاکساتسىن

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 گرام مۇسبىت باكتېرىيە، مەنپىي باكتېرىيە توپىغا قارشى كەڭ تىسرىلىك رولى بار. بولۇپمۇ ئامېتىسىلىنىغا چىداملىق سۆزىنەك شارچە باكتېرىيىسى، گېنتمامىتسىنىغا چىداملىق يېشىل يېرىڭ تىاچقە باكتېرىيىسى، ھېزم زەنجىرسىمان شارچە باكتېرىيە ئۇرۇقدىشى قاتارلىقلارغا ياخشى ئۇنۇم بېرىدۇ. ئىچكەندە سۈمۈرۈلۈشى تېز ھەم تولۇق بولۇپ، بەدەنگە كەڭ تارقىلىدۇ، ئاز قىسىمى مېتابوليزملەنلىپ، ئاساسەن ئىسلى پېتى سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ،

$t_{1/2} \sim 6 \text{ h}$

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 سەزگۈر باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سىستېملار ۋە يەرلىك ئورۇنىڭ يۇقۇملىنىشغا ئىشتىلىدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئىچلىدۇ ياكى ۋېناغا تېمىتىلىدۇ، كۈنگە $600\text{mg} \sim 300 \sim 3 \sim 2$ قېتىمغا بۆلۈپ ئىشتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش، قورساق ئاغرىش، باش ئاغرىش، باش قېيىش، ئۇيقوسىزلىق، ئىسۋە، چىقىش، قىچىشىش، ترانسىئامنزازا قىسقا مۇددەتلىك ئۇرالىش، ئەتراب قان رايى ئۆزگىرىش ۋە تېرىنىڭ ئۇرغۇلۇك رېئاكسىيىسى قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، دورا توختىتىغاندىن كېيىن ھەممىسى يوقاپ كېتىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 تارىۋىد ياپونىيىدە ئىشلەنگەن: نېپىز پۇستىلىق تابلېتى، تابلېت/100mg، تاختا/10 تابلېت، قاپ/2 تاختا، قاپ/10 تاختا، تابلېت/200mg، تاختا/12 تابلېت، تاختا/6 تابلېت، قاپ/1 تاختا، ئوكۇلى، هەر بۇتلۇكىسى 200mg/100ml.

لېۋە فلوکساتسىن (左氧氟沙星, Levofloxacin)

【باشقى نامى】 كراۋىت (可乐必妥, Cravit).

【ئاساسىي تەركىبى】 لېۋە فلوکساتسىن

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ئۇفولوكساتسىن (氧氟沙星)
نىڭ ئۇنىمۇلۇك تەركىبى لېۋە ئۆزۈمىرى. تىسىرى قىلىش مېخانىزمى ۋە باكتېرىيىگە قارشى تىسىرى ئۇفولوكساتسىن بىلەن ئوخشاش، ئەمما باكتېرىيىگە قارشى تىسىرى ئۇفولوكساتسىننىن كۈچلۈك، ئىچكىندە تېز ھەم تولۇق سۈمۈرۈلىدۇ. $2h$ T_{max} 200mg، بەدەنگە تارقىلىشى كەڭ، توقۇلمىلار ۋە بەدەن سۈيۈقلۈقىدىكى قويۇقلىقى يۈقرى بولىدۇ. بەدەن مېتابولىزملانمايدۇ، 85% دورا ئىسىلى پېتى سۈيىدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىدلىكلىرى】 سەزگۈر باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىسىرىدىغان سىستېملىار ۋە يەرلىك ئورۇنىڭ يۇقۇملىنىشىغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 100mg 100 دىن كۈننە 3 ~ 2 قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ناچار تىسىرى】 ئۇفولوكساتسىننىڭكىمە ئوخشاش.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 بۇرەك فۇنكسىيىسى ئېغىر دەرىجىدە تولۇق بولىغانلار، تۇتقاقلقىكىلىك گىرىپتار بولغان ياكى تۇتقاقلقىكىلىك تارىخى بارلار، ياشانغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 كراۋىت يايپونىيىدە ئىشلەنگەن.

تابلىتى: تابلىت/100mg، تاختا/10 تابلىت، قاپ/10 تاختا.

سپارفلوكساتسىن (司帕沙星, Sparfloxacin)

【باشقى نامى】 سپارا (司巴乐, Spara)، سپارا (司氟沙星，司巴沙星，司巴乐，Spara)

【ئاساسىي تەركىبى】 سپارفلوكساتسىن

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 3 - ئەۋلاد كۈئىنلۈن

تۈرىدىكى يېڭى ئاتىبىئوتىك دورا بولۇپ، باكتېرىيىگە قارشى دائىرسى كەڭ، گرام مەنپىي تاياقچە باكتېرىيە، گرام مۇسېت باكتېرىيە، ھەربىي قىسىم باكتېرىيىسى، خلامىدىيە، مىكۆپلازミلارغا قارشى تەسىرى ئوخشاش كۈچلۈك، ئۆكسىگىندىن قاپقۇچى باكتېرىيىگە قارشى تەسىرى ئوخشاش تۈردىكى باشقا دورىلاردىن كۈچلۈك، كۆپ خىل دورىغا چىداللىق باكتېرىيىلەرگە قارىتا كۈچلۈك ئاكتىپچانلىققا ئىگە. ئوتتۇرا ئۇنۇمۇلۇك باكتېرىيىگە قارشى دورا، $t_{1/2}$ 19.2h، ئاساسەن ئۆت نېچىسى ۋە سۈيدۈك يولى ئارقىلىق سرتقا چىقىرىلىدۇ.

『مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر』 ھەرخىل دائم ئۈچرايدىغان كېسىل قوزغانقۇچى باكتېرىيە، ئۆكسىگىندىن قاچقۇچى باكتېرىيە، خلامىدىيە ۋە مىكۆپلازミلار كەلتۈرۈپ چىقارغان ھەرخىل يۈقۇملۇنىشلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

『ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى』 چوڭلار كۈنىگە 300mg ~ 200 نى 2 ~ 1 قىتىمغا بولۇپ ئىچىدۇ، داۋالاش مۇددىتى 14 ~ 7 كۈن بولىدۇ.

『ناچار تەسىرى』 فلوئورو كۈئنولون (氟硅诺酮) تۈرىدىكى باكتېرىيىگە قارشى باشقا دورىلارنىڭكىگە ئوخشاش.

『ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى』 سپارا ياپۇنىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىتى: تابلىت/100mg، قاپ/6 تابلىت.

لومېفلوکساتسىن (洛美沙星, Lomefloxacin)

『باشقانامى』 ماخاکۈئىن (洛美景, Mahaquin)

ماكساكۈئىن (美西肯, Maxaquin) 洛威 ·

『ئاساسىي تەركىبى』 لومېفلوکساتسىن هىدرۆخلورىد.

『فارماماكولوگىلىك ئالاھىدىلىكى』 گرام مۇسېت باكتېرىيە ۋە گرام مەنپىي باكتېرىيىلەرگە قارشى كۈچلۈك ئاكتىپچانلىققا ئىگە، بۇ دورىنىڭ باكتېرىيىگە قارشى كۈچلۈكلىك دەرىجىسى ئوفلۇكსاتسىنغا ئوخشاشپ كېتىدۇ. تېز ۋە تولۇق سۈمۈرۈلىدۇ، $t_{1/2}$ 8h، بىدەنگە كەڭ تارقىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 سەزگۈر باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سىستېمىلار يۇقۇملۇنىشقا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۇنىگە 0.6g نى ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ ئىچىدۇ، سۈيدۈك يولى يۇقۇملانغانلار كۇنىگە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 400mg ئىچىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاساسلىقى كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، باش سەل - پەل ئاغرىشلار كۆرۈلەدۇ، ئەسۋە، تېرى، قىچىشش قاتارلىقلازمۇ پېيدا بولىدۇ، GPT ۋە قاندىكى كىرىاتىنىن يۇقىرى كۆتۈرۈلۈش ئاز كۆرۈلەدۇ. ئادەتتە كۆرۈلىدىغان ئالامەتلەر يېنىك بولۇپ، دورا توختىلغاندىن كېيىن نورماللىشىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 كۆئىنلۈن تۈرىدىكى دورىلارغا زىيادە سەزگۈرلەرگە، بالىلار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلەندى.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ماخاكۇئىن ھىندىستاندا ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى/400mg، قاپ/40 تابلىپت. ماكساكۇئىن فرانسييىدە ئىشلەنگەن. تابلىپت/400mg، قاپ/3 تابلىپت، قاپ/5 تابلىپت.

فلېروكساتسىن (氟罗沙星，Fleroxacin)

【باشقى نامى】 多氟哌酸，天方罗欣，多氟沙星 مېگالوتسىن (麦佳乐杏，Megalocin)

【ئاساسىي تەركىبى】 فلېروكساتسىن.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 گرام مۇسېدەت، مەنپىي باكتېرىيىلەرگە قارشى كۈچلۈك تەسىرگە ئىگە. ئىچىكىنده ياخشى سۈمۈرۈلەدۇ، $t_{1/2}$ 10h، بىئولوگىيلىك پايدىلىنىش دەرىجىسى 90% بولۇپ، تەخمىنەن 60% دورا ئىسلى پېتى بۆرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 سەزگۈر باكتېرىيىلەر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سىستېمىلارنىڭ ۋە تېرى، يۇمشاق توقۇلمىلارنىڭ يۇقۇملۇنىشقا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار ھەر قېتىمدا

~ 300mg كۈندە بىر قېتىم ئىچىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆئۈل ئېلىشىش، قۇسۇشلار دائمى كۆرۈلىدۇ. ئەسۋە چىقىش، قىچىشىش، باش قېيىش، ئۇيقوسىزلىق ۋە AST，BUN، ALT يۇقىريلاش قاتارلىقلار پەيدا بولىدۇ. ئەمما ناچار تەسىرى يېنىك بولۇپ، دورا توختانقاندىن كېيىن يوقلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 كۆئىنلۈن تۈرىدىكى دورىلارغا زىيادە سەزگۈرلەر، باللار، ھامىلىدار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىشلىتش چەكلىنىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 مېگالوتىسىن ياپونىيىدە ئىشلەنگەن.

تابلىتى: تابلىت 100mg، قاپ/10 تابلىت.

7 . باشقا ئانتىبىئوتىك دورىلار

ۋانکومىتسىن

(万古霉素，Vancomycin)

【باشقا نامى】 ۋانکومىتسىن (稳可信，Vancocin)

【ئاساسىي تۈركىبى】 ۋانکومىتسىن ھىدروخلورىد.

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 پولپىپتىدىلىق ئانتىبىئوتىك دورا بولۇپ، باكتېرىيە ھۈجىزىسى دىۋارىدىكى ئاقسىلىنىڭ سىنتېزلىنىشىنى تورمۇزلاش ئارقىلىق، باكتېرىيىنى تېز سۈرئەتتە ئۆلتۈرۈش رولىنى ئۆتتىدۇ، ھەر خىل گرام مۇسبىت باكتېرىيىلەرگە قارشى ئاكتىپچانلىقى كۆچۈلۈك، MRSA ۋە MRSE ھەمدە ئۇچەي شارچە باكتېرىيىسىگە بولغان سەزگۈرچانلىقى يۇقىرى، گرام مەنپى باكتېرىيىگە قارشى ئاكتىپچانلىقى يوق. بىدەنگە كەڭ تارقىلىدۇ، گرام مۇسبىت 6h ئۆزۈك، بىدەندە نامايتى ئاز مېتابولىزملەنىدۇ. ئاساسەن ئىسلى پېتى سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نىسبىتى 55%.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەلىكىلەر】 گرام مۇسبىت باكتېرىيىدىن يۇقۇملىنىشقاڭلا ئىشلىتىلىدۇ، بولۇپمۇ MRSE، MRSA ۋە

ئۈچەي شارچە باكتېرىيىسىدىن بولغان يۇقۇملۇنىشلارغا مۇۋاپىق كېلىدۇ.
 【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېباغا تېمىتىلىدۇ. چوڭلارغا
 ھەرقېتىمدا 0.5g دىن كۈنىگە 4 ~ 2 قېتىم ئىشلىتىلىدۇ. باللارغا ھەر
 kg بىدەن ئېخىرلىقىغا 30mg ~ 15 دىن 3 ~ 2 قېتىمغا بۆلۈپ
 ئىشلىتىلىدۇ.

【ناچار نەسىرى】 ئەسۋە چىقىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، ۋېبا ياللۇغى
 قاتارلىقلار ئاز كۆرۈلىدۇ، ۋېباغا تېمىتىش بىك تېز بولۇپ كەتسە، پۇتۇن
 بىدەن قىزىرىپ چىقىدۇ. قۇلاق غۇڭۇلداش، ئائىلاش ئىقتىدارى چېكىنىش،
 بۇرەك فۇنكسىيىسى زەخىمىنىش، ئاق قان دانچىلىرى ۋاقتىلىق
 تۆۋەندىش، GPT يۇقۇرلاش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ.

【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 بۇرەك ئىقتىدارى تولۇق بولىمغاڭانلار
 ۋە ياشانغان بىمارلارغا ئەھتىيات بىلەن ئىشلىتىش، دورا ئىشلىتىۋاقان
 مەزگىلدە بۇرەك فۇنكسىيىسى ۋە ئائىلاش ئىقتىدارىنى قەرەللەك تەكشۈرۈپ
 تۈرۈش ھەمدە دورا مىقدارىنى تەڭشىپ تۈرۈشقا دەققەت قىلىش لازىم.
 ۋېباغا ئۆكۈل قىلىش بىلەن بىرگە ناركوز قىلغۇچى دورىلارنى ئىشلەتكەندە
 تۆۋەن قان بېسىمى، يۈز قىسى قىزىرىش، يەلتاشما ۋە قىچىشىش
 قاتارلىقلار پەيدا بولۇشى مۇمكىن.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ۋانكوتىسىن ئامېرىكىدا
 ئىشلەنگەن. پاراشوكلۇق ئۆكۈل: ئامېۇل/500mg.

كليندامتىسىن (克林霉素, Clindamycin)

【باشقا نامى】 دالاسىن C, Dalacinc, دالاسىن C, 氯洁霉素, 氯林可霉素

【ئاساسىي تەركىبى】 كليندامتىسىن

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا
 لىنکومىتىسىن (林可霉素) دىڭ تۆغۇندىسى بولۇپ، باكتېرىيىگە
 قارشى دائىرسى لىنکومىتىسىن بىلەن ئوخشاش، ئەمما باكتېرىيىگە قارشى
 تەسىرى لىنکومىتىسىن 8 ~ 4 ھەسسى كۈچلۈك، ئۆكسىگىندىن قاچقۇچى
 باكتېرىيىگە قارشى تەسىرى تېخىمۇ كۈچلۈك بولىدۇ، ئىچكەندە ياخشى
 سۈمۈرۈلىدۇ، جىڭەردە مېتالىزملەنىدۇ، سۆڭۈك تو قولمىلىرىغا

تارقىلىشى يۇقىرى.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كىسەللىكلىر】 ئالتۇن رەڭ ئۈزۈمىسىن شارچە باكتېرىيە، ئوكسิกېنىدىن قاچقۇچى باكتېرىيە ۋە سىزگۇر باكتېرىيىلىر كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئېغىر يوقۇمىلىشلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار ھەر قېتىمدا 1.50mg 6h تە بىر قېتىم ئىجىدۇ؛ مۇسکۇلغَا ۋە ئېناغا ئوکۇل قىلغاندا، چوڭلارغا كۇنگە 1200mg ~ 600 مۇسکۇلغَا ئوکۇل قىلىنىدۇ، ئېناغا ئوکۇل قىلغاندا 1200mg 1200mg دىن ئاشۇرۇ ۋۆتىلمىيدۇ، 4 ~ 3 قېتىمغا بولۇپ ئىشلىتىلىدۇ، بالىلارغا كۇنىگە ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 16mg ~ 8، 4 ~ 3 قېتىمغا بولۇپ ئىشلىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان - ئۇچىي رېئاكسىيىسى دائىم كۆرۈلىدۇ، ئاللىرىگىيىلىك رېئاكسىيە ۋە قان زەردابىدىكى ترانسىئامىنازا ئۆزىلەش قاتارلىقلار تاسادىپى كۆرۈلۈپ قالىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 دالاتىن بىلگىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى : دانه/150mg . قاپ/12 دانه، قاپ/100 دانه؛ ئوکۇلى: 2ml/150mg/ml

8 . تۈپىر كۈلۈزغا قارشى دورىلار

پازىنیازىد

(帕司烟肼，pasiniazid)

【باشقى نامى】 دىپازىك (力排肺疾，Dipasic) ، ئىزۈننىازىد

ئامىنۇ سالتسىلات (对氨基水杨酸异烟肼).

【ئاساسىي تەركىبى】 ئىزۈننىازىد ئامىنۇ سالتسىلات .

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】

ئىزۈننىازىد (异烟肼) بىلەن پارائامىنۇ سالتسىلات (对氨基水杨酸) نى خىمېيىلىك رېئاكسىيەلەشتۈرۈش ئارقىلىق سىنتېزلىنگەن تۈپىر كۈلۈزغا قارشى دورا. پارائامىنۇ سالتسىلات ئىزۈننىازىدىنىڭ ئاتىپتىللەشىنى تۈرمۇزلاپ، دورىنىڭ ئۇنۇمىنى كۈچەيتىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كىسەللىكلىر】 ھەرخىل تۈپىر كۈلۈزنى

داۋالاشقا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار بىر قىتىمدا 200mg دىن كۈنىگە ئۈچ قېتىم ئىچىدۇ ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويچە ئىشلىتىدۇ، بالىلارغا كۈنىگە ھەر kg بىدەن ئېخىرلىقىغا ~ 20 ئىشلىتىلدى. ئۇدا ئۈچ ئاي ئىچىسە بىر داۋالاش كۆرسى ھېسابلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش قېيش، باش ئاغرىش، كۆپ ئورۇندا پەيدا بولىدىغان نېرۋا ياللۇغى، تېرە رېئاكسىيىسى، سېرىقلىق چۈشۈش، قىزىل داغلىق بۆرە چاقسىخغا ئوخشайдىغان يىغىندى ئالامەتلەر، قەۋزىيەت قاتارلىقلارنى پەيدا قىلىدۇ.

【دېقەت قىلىدىغان ئىشلار】 دورا ئىشلىتىۋانقان مەزگىلدە جىڭىر فۇنكىسىيىسىنى تەكشۈرötپ تۈرۈش، جىڭىر، بۆرەك فۇنكىسىيىسى تولۇق بولىمۇچىلار، روھى كېسەللەر ۋە تۇتقاڭ كېسىلى بارلارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 دېپازىك شۇبىتىسارىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىقى: تابلىت 100mg.

رېفاتېر (卫非特，Rifater)

【ئاساسىي تەركىبى】 'ھەربىر تال تابلىتىدا 120mg رېئامېتسىن (利福平)، 80mg ئىزۇنىئا زىد (异烟肼)، 250mg ئالدىنامىد (毗嗪酸胺) بار.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ئۈچ تۈرلۈك تەركىبىنىڭ ھەممىسى باكتېرىيە ئۆلتۈرگۈچى تۈبىر كۈلۈزغا قارشى دورا.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 تۈبىر كۈلۈز كېسىلىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلدى، تۈبىر كۈلۈزنى قىسقا مۇددەتلىك خىمىيلىك داۋالىغان چاغدىكى كۈچەيتىش مەزگىلىگە ئىشلىتىش مۇۋاپىق كېلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 بىدەن ئېخىرلىقى 39kg ~ 30 غىچە بولغانلار ئۈچ تال، 49kg ~ 40 غىچە بولغانلار 4 تال ئىچىدۇ؛ 50kg دىن يۇقىرىلار كۈنىگە بىر قېتىم، تاماقتىن

1 ئىلگىرى بەش تال ئىچىدۇ، ئادەتتە ئىككى ئاي بىر داۋالاش كۈرسى 2h قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ناچار تەسىرى ئىنتايىن ئاز كۆرۈلدۈ، ئاساسلىقى جىگىرنى زەھەرلىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، قورساق ئاغرشن، ئەتراپ نېرۋا ياللۇغى، سېزىم نورمالىسىزلىنىش، مۇسکۇل كۈچى چېكىنىش، ئۇيۇشۇش ۋە ئاغرشن قاتارلىقلار كۆرۈلدۈ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 رفامېپتىسىن، ئىزونئازىد، ئالدىنمىدلارنىڭىگە ئوخشاش.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 رفاتپىر ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. تابلېتى: تابلېت/450mg، قاپ/60 تابلېت.

رېفينا

(卫非宁, Rifenah)

【ئاساسىي تەركىبى】 رېفينا TM150 نىڭ ھەربىر تال تابلېتىدا 150mg رفامېپتىسىن، 100mg ئىزونئازىد بولىدۇ؛ رېفينا TM300 نىڭ ھەربىر تال تابلېتىدا 300mg رفامېپتىسىن، 150mg ئىزونئازىد بار.

【فارماكولوگىلىك ئالاھىدىلىكى】 رفاتبرغا قاراڭ. «مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر» ھەرخىل ئېپەر كۈلۈز كېسىلىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش قۇسۇلى ۋە مىقدارى】 تاماقتنىن 30min بۇرۇن ياكى تاماقتنىن 2h كېيىن كۈندە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ. بىدەن ئېغىر لىقى 50kg دىن تۆۋەنلەر كىچىك دوزلىق تابلېتتىن ئوج تال ئىچىدۇ؛ 50kg دىن يۇقىرىلار چوڭ دوزلىق تابلېتتىن ئوج تال ئىچىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 يېنىك، ئاساسلىقى جىگەرگە بولغان زەھەرچانلىقى يۇقىرى، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، قورساق ئاغرشن، ئەتراپ نېرۋا ياللۇغى، سېزىم نورمالىسىزلىنىش، مۇسکۇل كۈچى چېكىنىش، ئۇيۇشۇش ۋە ئاغرشن قاتارلىقلار.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ئۆزۈلىنىڭ دۆچار بولغان كىشىلەر ۋە ياش - ئۆسمۈر كېسەللەك ئۆزگىرىشىگە دۆچار بولغان كىشىلەر ۋە ياش - بىمارلارغا ۋىتامىن B₆ قوشۇپ ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ.

【ياسالمىسى ۋە ئۆلچىمى】 رىفينا ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن.
 تابلىپتى: تابلىپتى/250mg ، قاپ/60 تابلىپتى؛ تابلىپتى/450mg ،
 قاپ/60 تابلىپتى.

9 . زەمبۇرۇغقا قارشى دورىلار

فلۇكونازول (氟康唑，Fluconazole)

【باشقانامى】 دىفلۇكان (大扶康，Diflucan)
 مېدوفلۇكون (麦道氟康，Medoflucon) ، سىسكان (Syscan)
 . 【ئاساسىي تەركىبى】 فلۇكونازول.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ترىئازول (三唑) تۈرىدىكى زەمبۇرۇغقا قارشى دورا بولۇپ، زەمبۇرۇغ ھۈچەيرە پەردىسى ئېھتىياجلىق بولغان سېبرول (甾) نى تورمۇزلاش ئارقىلىق، پەردىنىڭ فۇنكسييىسىگە تەسىر كۆرسىتىپ زەمبۇرۇغنى ئۆلتۈرۈدۇ. بۇ دورىنىڭ ھەرخىل زەمبۇرۇغقا قارشى كۈچى بىرقەدەر كۈچلۈك، مەزكۈر دورىنى ئىچىشكە ياكى ۋېندىن بېرىشكە بولىدۇ. ئىچىكەندە بىئولوگىيلىك پايدىلىنىش دەرىجىسى 90% دىن يۇقىرى بولىدۇ، $t_{1/2}$ 1h T_{max} 30h. بەدەن سۇيۇقلۇقىغا كەڭ تارقىلىپ، بەدەنە مېتابولىز ملانمايدۇ، ئاساسەن ئىسلى بېتى بۇرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 پۇتون بەدەنلىك تەسۋىسمان زەمبۇرۇغ كېسىلى، دائىرىلىك يوشۇرۇن شارچە باكتېرىيە كېسىلى، شىللېق پەر دە تەسۋىسمان زەمبۇرۇغ كېسىلى، ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ياكى قايتا قوزغىلىشچان جىنسىي يول تەسۋىسمان زەمبۇرۇغ كېسىلى، تېرە زەمبۇرۇغ كېسىلى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ، خىمىيلىك داۋالاش ياكى رادىئۇ ئاكتېلىق داۋالاش ئېلىپ بېرىلىۋاتقان زەمبۇرۇغدىن ئۇشاي يۇقۇملۇنىدىغان ئاق قان كېسىلى بىمارلىرى ۋە باشقا يامان سۇپەتلىك ئۆسىمگە گىرىپتار بولغان بىمارلارغا بۇ دورىنى ئالدىنى ئېلىش خاراكتېرىدە ئىشلەتسە بولىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۇنگە 200~400mg بىر

قېيتىم ئىشلىتلىدۇ. داۋالاش مۇددىتى دورا ئىشلىتلىگەندىن كېيىنكى كلىنىكىلىق ۋە مىكولوگىيلىك رېئاكسىيىگە ئاساسەن بېكىتلىدۇ، ئەمما يوشۇرۇن شارچە باكتېرىيە خاراكتېرىلىك مېڭە پەرەدە ياللۇغىغا نسبەتەن داۋالاش مۇددىتى ئادەتتە ئاز بولغاندا 8 ~ 6 ھەپتە بولىدۇ. شىللەق پەردىنىڭ زەمبۇرۇغدىن يۇقۇمىلىنىشغا كۈنگە بىر قىدەر تۆۋەن دوزىدا دورا بېرىلىدۇ (50mg). ۋېنادىن دورا بېرىش مىقدارى ئىچىش مىقدارى بىلەن ئوخشاش، ياشانغان ھەم بۆرەك فۇنكسىيىسى نورمال سىزلانغان بىمارلارغا بۆرەك فۇنكسىيىسىنىڭ زەخەمىلىنىش دەرىجىسىگە قاراپ دورا بېرىش لايىھىسى تەڭشىلىدۇ. بۇ دورا ئادەتتە بالىلارغا ئىشلىتلىمەيدۇ، ئىگەر زۆرۈر تېپىلغاندا كۈنگە ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 2mg بويىچە بېرىلىدۇ، چوڭقۇر قىسىمنىڭ زەمبۇرۇغدىن يۇقۇمىلىنىشغا كۈنگە ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 3~6mg دىن دورا بېرىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، قورساق ئاغرش، ئىچ سۈرۈش، ئەسۋە چىقىش قاتارلىقلار دائىم كۆرۈلىدۇ؛ جىڭەر، بۆرەك ۋە قان ياساش ئىقتىدارى زەخەمىلىنىش قاتارلىقلار تاسادىپىي كۆرۈلىدۇ.
【دىقىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 مەنىي قىلىنىدىغان ئەھۋالار: فلۇكونا زۇلۇل ۋە باشقىا ئازول (唑) تۈرىدىكى دورىلارغا زىيادە سىزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 سىسكان ھىندىستاندا ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/100mg، قاپ/8 دانه، دانه/150mg، قاپ/1 دانه، قاپ/4 دانه؛ ئوكۇلى: ھەر بوتۇلكىسى 100mg/50ml، ھەر بوتۇلكىسى 200mg/100ml.

دىغلىكان فرانسييىدە ئىشلەنگەن. ئوكۇلى: ھەر ئامپۇلى 2mg/ml، ھەر بوتۇلكىسى 100mg/50ml، ھەر بوتۇلكىسى 200mg/100ml. مېدوفلۇكۈن سىپرۇستا ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/50mg، دانه/150mg، قاپ/7 دانه.

ئىتراكونازول

(伊曲康唑，Itraconazole)

【باشقا نامى】 سپورانوكس (斯皮仁诺，Sporanox)

【ئاساسىي تەركىبى】 ئىتراكونازول

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 چۈڭقۇر قىسىم ۋە يۈزەكى قىسىمىدىكى زەمبۇرۇغلىرىنىڭ ھەممىسىگە قارشى تەسىرگە ئىگە بولۇپ، باكتېرىيىگە قارشى تەسىرى كېتكۈنۈزۈلۈ (غَا ئوخشىپ كېتىدۇ، ياخشى سۈمۈرۈلىدۇ، بەدەنگە كەڭ تارقىلىدۇ. $t_{1/2} = 24\text{h}$

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاياللار سىرتقى جىنسىي ئەزاسى ۋە جىنسىي يول تەسوچىسىمان زەمبۇرۇغ كېسىلى، ئالىچىپار تەمرەتكە، تېرىز زەمبۇرۇغ كېسىلى، زەمبۇرۇغلىق مۇڭگۈز پەرە ياللوغۇنى ۋە ئېغىز بوشلۇقى تەسوچىسىمان زەمبۇرۇغ كېسىلى، تىرناق زەمبۇرۇغ كېسىلى، سىستېمىلىق (پۇتنۇن بەدەنلىك) زەمبۇرۇغدىن يۇقۇملۇنىش ۋە باشقا كەم ئۇچرايدىغان ھەرخىل سىستېمىلىق ياكى ئىسسىق بىلۋاغ زەمبۇرۇغ كېسىلىك ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 200mg ~ 100 دىن كۈندە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ، ئۇچ ئاي بىر داۋالاش كۇرسى قىلىنىدۇ. كۈندە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 200mg دىن ئۇدا يەتتە كۈن ئىشلىتىپ، 21 كۈن توختاتقاندىن كېيىن، 2 - داۋالاش باسقۇچىنى ئېلىپ بېرىشىمۇ بولىدۇ، يۇقۇملانغان ئورۇنغا قاراپ 3 ~ 2 داۋالاش كۇرسىغىچە دورا ئىچىشكە بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئىشتىهاسىزلىق، كۆڭۈل ئېلىشىش، قورساق ئاغرىش ۋە قۇزىيەت دائم كۆرۈلىدۇ، باش ئاغرىش، ترانسიئامىنازا قايتما خاراكتېرىلىك يۇقىرىلاش، ھەيز قالايمىقاتلىشىش، باش قېيىش ۋە ئاللىپگىيلىك رېئاكسىيە بىر قەدەر ئاز كۆرۈلىدۇ، ئەتراپ نېرۋىلارنىڭ كېسىللىك ئۆزگەرىشى ۋە Stevens — Johnson يىغىندى ئالامەتلەرى ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر ۋە ھامىلىدار ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلەنىدۇ.

② باشقىلار: باللار، ھامىلىدارلار ۋە بالا ئىميتىش مەزگىلىدىكى ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىلىدۇ؛ ئاشقازان كىسلاقاتاسىنىڭ تۆۋەنلىشى بۇ دورىنىڭ سۈمۈرۈلۈشكە تىسىر كۆرسىتىدۇ؛ كىسلاقاتاغا قارشى دورا ئىشلىلىۋاتقان بىمارلار بۇ دورىنى ئىشلىتىپ ئاز بولغاندىمۇ 2h گۈتكەندىن كېيىن ئاندىن كىسلاقاتاغا قارشى دورىلارنى ئىچىش لازىم. ئۇدا بىر ئايىدىن ئارتۇق دورا ئىشلەتكەنلەر ۋە داۋالاش جەريانىدا ئىشتىها سىزلىق، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، چارچاش، قورساق ئاغرىش ياكى قان سىيىش كۆرۈلگەنلەرگە جىڭىر فۇنكسييىسىنى تەكشۈرۈش تەشەببۈس قىلىنىدۇ؛ ئەگەر جىڭىر فۇنكسييىسى نورمال بولمىسا، دورا ئىشلىتىشنى توختىتىش لازىم.

【ياسالمىسى ۋە ئۆلچىمى】 سپورانووكس بېلگىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/100mg، قاپ/4دانه، قاپ/15 دانه.

ئامفوتېرتىسىن B

(两性霉素 B, Amphotericin B)

【باشقا نامى】 فۇنگىزون (庐山霉素, Fungizone)

【ئاساسىي تەركىبى】 ئامفوتېرتىسىن B

【فارماکولوگىسىلىك ئالاھىدىلىكى】 چوڭقۇر ئورۇندىكى زەمبۇرۇغقا قارشى ئانتىبىئوتىك دورا بولۇپ، دائم ئۇچرايدىخان كۆپ ساندىكى كېسەللەندۈرگۈچى زەمبۇرۇغقا قارشى بىر قەدەر كۈپلۈك تىسىرگە ئىنگە، ئېچىتىقۇ زەمبۇرۇغى بۇ دورىغا مەلۇم دەرىجىدە چىداملىق، تېرىھ ۋە چاچ تەمرەتكە زەمبۇرۇغىنىڭ كۆپىنچىسى بۇ دورىغا چىداملىق، ئىچىكەندە ياخشى سۈمۈرۈلمىدىدۇ، دورىنىڭ قان زەردايدىكى قويۇقلۇقى تۆۋەن بولىدىدۇ، بەدەندىكى كۆپ قىسىم توقۇلما ۋە بەدەن سۈيۈقلۈقىغا تارقىلىدىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 ئاساسلىقى چوڭقۇر ئورۇندىكى زەمبۇرۇغ بىلەن يۇقۇملۇنىشى ۋە باشقا زەمبۇرۇغ خلار پەيدا قىلغان پۇتون بەدەنگە تارقىلىش تىپلىق زەمبۇرۇغ كېسىلىنى داۋالاشقا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا تېمتىلىدۇ.

دەسلىپىدە كۈنده بىر قېتىم 5mg ~ 1 ، 6 ~ 5 سائىته ۋېناغا تېمىتىلىدۇ، سۈيۈقلۈق بىرگەندىن كېينىكى رېتاكسىسيسىگە قاراپ، 2 - كۈنى 5mg كۆپەيتىلىدۇ ياكى ئالدىنىقى كۈندىكى دورا مىقدارى ساقلىنىدۇ، يەنى ھەركۈنى ياكى كۈن ئاتلاپ 5mg دن كۆپەيتىپ، تاكى كۈنىگە ~ 30 غىچە داۋاملاشتۇرغاندىن كېين مۇشۇ مىقدارنى ساقلاپ دورا ئىشلىتىلىدۇ، چوڭۇر قىسىمىدىكى يوشۇرۇن شارچە باكتېرىيدىن بۇقۇملۇنىشقا يۇقرى دوزىدا دورا ئىشلىتىلىدۇ، ئۆمۈمىي مىقدارى 1 بىر داۋالاش كۈرسى قىلىنىدۇ، ئادەتسىكى زەمبۇرۇغلاർدىن بۇقۇملۇنىشى داۋالاش مۇددىتى قىسقراق بولسىمۇ بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 يۇقرى قىزىتما، تىترەش، ياش ئاغرش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، بۆرەكتى زەھەرلەش، قاندا كالىي تۆۋەنلەش ئالامىتى، قىزىل قان ھۈچىرىسى مەنبىلك قان ئازلىق قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، يىلىك يېنىك دەرجىدە تورمۇزلىنىش، قان پلاستىنكلىرى كېمىيىش، زىيادە سەزگۈرلۈكتىن بولغان شوڭ قاتارلىقلار تاسادىپى كۆرۈلۈپ قالىدۇ، دورىنىڭ ئېقىش سورئىتى بەك تېز بولغاندا يۈرەك قېرىنچىسى تىترەش ۋە يۈرەك سوقۇشى توپۇقسىز توختاپ قېلىش كۆرۈلىدۇ؛ غلاب ئىچىگە ئۆكۈل قىلىنسا نېرۋا سىستېمىسى ئېغىر دەرجىدە زەھەرلىنىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 دورا ئىشلىتىش جەرياندا ئۆز ۋاقتىدا كالىي تولۇقلاب تۈرۈشقا دىققەت قىلىش لازىم؛ بۇ دورا كىسلاتالىقى بىر قەدەر كۈچلۈك بولغان ئېرىتىمە ئۇڭاي پارچىلىنىدۇ، شۇڭا ئىشلىتىلىدىغان گلۈكۈزا ئۆكۈلىنىڭ pH قىممىتى 4.2 دن تۆۋەن بولماسىلىقى كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 فۇنگىزون B ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. پاراشوكلۇق ئۆكۈلى: دانه/ 50mg .

§ . ۋېرۇسقا قارشى دورىلار

ئاتسىكلوۋىر (阿昔洛韦，Aciclovir)

【باشقانامى】 زۆزراكس (舒维疗，Zovirax)，ۋېرلىس (丽珠克毒星，甘泰，无环鸟甘，Virless) · 丽珠克毒星，甘泰，无环鸟甘，Virless)

【ئاساسىي تەركىبى】 ئاتسىكلوۋىر
【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ئاددىي قوقاق ۋېرۇسىدىكى DNA پۇلمپرازا (聚合酶)غا كاشلا قىلىپ، ۋېرۇستىكى DNA نىڭ تەقلىد قىلىپ ياسىلىشنى تورمۇزلايدۇ، ئاددىي قوقاق ۋېرۇسى، بىلۋاغىسىمان مایمۇن B ۋېرۇسى ۋە EB ۋېرۇسلرىنى مەلۇم دەرىجىدە تورمۇزلاش رولىغا ئىگە. ئىچكەندە سۈمۈرۈلۈشى ناچار بولىدۇ. بەدەنگە كەش تارقىلىدۇ، كۆپ قىسمى ئىسىلى پېتى سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، ئاز بىر قىسمى جىڭىرە مېتابولىزملىنىدۇ. $t_{1/2}$ 2.5h، يېڭى تۈغۈلخان بۇۋاق ۋە بۆرەك فۇنكىسىيى نورمال بولىغانلاردا $t_{1/2}$ زور دەرىجىدە ئۈزۈرىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 ئاددىي قوقاق ۋېرۇسىدىن يۈقۈملەنىش ياكى سۇ. چېچەك - بىلۋاغىسىمان قوقاق ۋېرۇسىدىن يۈقۈملەنىش، كۆپپىش سىستېمىسى تۈنجى قېتىم قوقاق ۋېرۇسىدىن ئېغىر دەرىجىدە يۈقۈملەنىش، بىلۋاغىسىمان قوقاق ۋېرۇسىدىن ئېغىر دەرىجىدە يۈقۈملەنىش، قوقاق ۋېرۇسى مەنبىلىك مېڭە پەرەدە ياللۇغى قاتارلەقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش تۈسۈلى ۋە مىقدارى】 داۋالاش مۇددىتى 10 ~ 8 كۈن، چوڭلاردىكى ئاددىي قوقاق ۋېرۇسىدىن يۈقۈملەنىشقا هەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا هەر 8h تە بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ؛ سۇ چېچىكى - بىلۋاغىسىمان قوقاق ۋېرۇسىدىن يۈقۈملەنىش ۋە قوقاق ۋېرۇسى مەنبىلىك مېڭە پەرەدە ياللۇغىغا هەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 10mg 8h تە بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ. بالىلار ۋە ئۈچ ئايلىقتىن يۈقرى بۇۋاقلارغا، هەر 8h تە بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ؛ ئىممۇنت كەمچىل

بالىلار يۇقۇملاڭاندا m^2 / 500mg ھەر 8h تە بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ؛ بىئىچى تۇغۇلغان بالىلار ھەر kg بىدهن ئېغىرلىقىغا 10mg ھەر 8h تە بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ. بۆرەك فۇنكسىيىسى تولۇق بولىمغاڭانلارغا ئوخشاش بولغان نورمال ئۆلچەملىك مىقدار ئىشلىتىلىپ، ئىككى قېتىمىلىق ئۈكۈل قىلىش ئارقىلىق ئۇزارتىلىدۇ.

【ناچار تەسلىرى】 ماغدۇرسىزلىنىش، باش ئاغرش، نېرۋىسى چېچىلىشىش، خىالىي سېزىم پەيدا بولۇش، هوشسىزلىنىش، بۆرەك فۇنكسىيىسى تولۇق بولماسىقى كۆرۈلىدۇ؛ ياللۇغلىنىش، ئاغرشلار ئىنتايىن ئاز كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقتە قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنىئى قىلىنىدىغان ئەھەللار: بۇ دورىخا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ② باشقىلار: ياشانغاڭانلارغا ۋە ياكى بۆرەك فۇنكسىيىسى تولۇق بولىمغاڭانلارغا دورا مىقدارى كېمەيتىلىدۇ ھەممە بېتەرلىك مىقداردا سۇ قوبۇل قىلىشقا كاپالەتلىك قىلىنىدۇ؛ بۆرەك فۇنكسىيىسىنى ۋە قان ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى كۆزىتىپ تۈرۈشقا دىقىقتە قىلىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 زوۋبراكس ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپت/200mg، قاپ/25 تابلىپت، تابلىپت/400mg، قاپ/70 تابلىپت، تابلىپت/800mg، قاپ/35 تابلىپت. ۋېرلىپس تىيەمنە ئىشلەنگەن. تابلىپت/200mg، قاپ/10 تابلىپت، قاپ/20 تابلىپت، قاپ/100 تابلىپت.

گانتسىكلوۋىر (更昔洛韦，Ganciclovir)

【باشقا نامى】 سىمبىۋېن (Cymevene) . (赛美维)

【ئاساسىي تەركىبى】 ناترىي كاتتسىكلوۋىر تۇزى.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 گۈۋانس (鸟嘌呤) نىڭ سىنتېزىلەنگەن ھومولوگى بولۇپ، قوقاق ۋېرۈسىنىڭ تەقلىد قىلىپ ياسلىشىنى تورمۇزلايدۇ. زور ھۈچىرە ۋېرۈسى (CMV)， ئاددىي قوقاق ۋېرۈسى-1(HSV-1)، ۋە ئاددىي قوقاق ۋېرۈسى - 2 (HSV-2)， EB ۋېرۈسى ۋە سۇ چېچىكى قوقاق ۋېرۈسىلىرى بۇ دۇريغا سەزگۈر. ئەسلى پېتى مۇيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

«مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر» ئىممۇنتى زەخىملەنگەن بىمارلاردىكى زور ھۈجىرى ۋېرۇسى (CMV) كېسەللىكلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئىندوكسيلىك داۋالاش: هەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 5mg بىر سائەتتىن ئارتۇق ۋاقتىن ئىچىدە ۋېناغا كىرگۈزۈلىدۇ، ھەر 12h تە بىر قېتىم، 21 ~ 14 كۈن ئۇدا ئىشلىتىلىدۇ. مادار لاندۇرۇپ داۋالاش: ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 5mg بىر سائەتتىن ئارتۇق ۋاقتىتا ۋېناغا كىرگۈزۈلىدۇ، ھەر ھەپتىدە 7 قېتىم، ھەر 24h تە بىر قېتىم ياكى ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 6mg دىن كۆنگە بىر قېتىم ھەر ھەپتىدە 5 قېتىم ئىشلىتىلىدۇ. ئالاهىدە دورا ئىشلىتىش: بۇرۇك فۇنكىسىسى تولۇق بولىغانلارغا قان زەربابىدىكى كىرىئاتىنىڭ چىقىرىلىش نىسبىتىگە ئاساسەن دورا مىقدارى تەڭشىلىدۇ؛ ئاق قان ھۈجىرىسى كېمىيىش كېسىلى ۋە قان پلاستىنكلىرى كېمىيىش دەرجىدە كېمىيىش كېسىلى ۋە قان ھۈجىرىلىر ئېغىر كېسىلىرىن كېمىيىش كېسىلىرىن كېمىيىش كېسىلى ۋە قان رايىنى كۆزىتىپ تۇرۇشنى ئويلىشىش كېرەك؛ ياشانغان بىمارلارغا بۇ دورىنى ئىشلەتكەننە، بۇرۇك فۇنكىسىسىگە ئاساسەن دورا مىقدارىنى تەڭشەپ تۇرۇش لازىم.

【ناچار تەسىرى】 نېيتراال دانىچە ھۈجىرىلىر كېمىيىش، قان پلاستىنكلىرى ئازىيىش ئەڭ كۆپ كۆرۈلىدۇ. ئاشقازان، ئۇچىدى يولي، نېرۋا سىستېمىسى ئالامەتلەرى، جىڭىر فۇنكىسىسى نورمالسىزلىنىش، قىزىش، ئەسۋە چىقىش، ۋېبا ياللۇغى، BUN يۇقىرى ئۆرلەش، كىرىئاتىنىن ئۆرلەش، قاندا كالىي تۆۋەنلەش ۋە قان شېكىرى تۆۋەنلەش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنى ئىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا ياكى ئاتىسكلۇۋېرىغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدى. ② باشقىلار: نېيتراال دانىچە ھۈجىرىلىر سانى زىيادە ئازىيىپ كەتسە، بۇ دورىنى ۋاقتىنچە ئىشلەتمەسىلىك كېرەك؛ ئەر بىمارلار دورا ئىشلىتىۋاتقان مەزگىلەدە ھەممە دورا ئىشلىتىپ 90 كۈن ئىچىدە ئەۋلاد قالدۇرۇشتىن ساقلىنىش، بالىلارغا بۇ دورىنى ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم.

【ياسالىمسى ۋە ئۇلچىمى】 سىمبۇپن ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. ئۆكۈل: ئامپۇل/500mg، قاپ/1 ئامپۇل، قاپ/5 ئامپۇل، قاپ/25 ئامپۇل.

ئىككىنچى باب قان ئايلىنىش سىستېمىسىغا تەسir قىلغۇچى دورىلار

§ 1 . يۈرەكىنى كۈچەيتكۈچى دورىلار

مىلىرىنون (米力农, Milrinone)

【باشقا نامى】 پrimacor, 甲腈砒酮, 米力酮 (Corotrope)

【ئاساسىي تەركىبى】 مىلىرىنون.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىك】 ئامرىنون (安力农) نىڭ
ھومولوگى بولۇپ، يۈرەك مۇسکۇلىنىڭ قىسىقىرىش كۈچىنى ئاشۇرۇش ۋە
قان تومۇرلارنى كېڭەيتىش تەسىرىگىمۇ ئىگە، ئۇنىڭ تەسir كۈچى
ئامرىنوننىڭ $30 \sim 10$ ھەسىسىگە بازاۇر كېلىدۇ ھەممە قان
پلاستىنكلېرىنى ئازايىتىشتىك ناچار تەسىرى يوق، چىدامچانلىقى بىر قەدەر
ياخشى. $2h t_{1/2}$.

【مۇۋاپىسق كېلىدىغان كېسەللىكلىدر】 سوزۇلما قان تولۇش
منبىلىك يۈرەك زەئىپلىشكە ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا تېمتقاندا ھەر منۇتتا
ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا $0.375 \sim 0.75 \mu g$ تېمىتلىدۇ؛ ۋېناغا ئوكۇل
قىلغاندا، ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا $50mg \sim 37.5$ ، 10 منۇتta ئاستا
- ئاستا ئوكۇل قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرىش، قېرىنچە منبىلىك ۋە قېرىنچە
ئۇستى منبىلىك يۈرەك سوقۇش تېزلىشىش، تۆۋەن قان بېسىمى ۋە يۈرەك
مۇسکۇلىغا قان يېتىشىمىلىك ئېغىرلىشىش، تۆۋەن كالىلىق قان كېسىلى
كۆرۈلىدۇ، دالانچە تىترەش، قان پلاستىنكلېرى كېمىيىش قاتارلىقلار
ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ.

【دېقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەئى قىلىنىدىغان ئەھۋالار: ئامرىنون ۋە بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ؛ ② باشقىلار: بۇ دورىنى ئۆزۈن مەزگىل ئىشلىتىش تەشەببۈس قىلىنىمايدۇ، ئايىرم ئىشلىتىش كېرىڭكە؛ مەزكۇر دورا ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك يۈرەك مۇسکۇل تىقىلامسىنىڭ دەسلەپكى باسقۇچىدىكى بىمارلارغا ۋە ھامىلىدارلارغا ئېتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ يۈرەك رىتىمى، قان بېسىم، ئېلىكtronولىتلار، بۆرەك فۇنكسييىسى قاتارلىقلارنىڭ ئۆزگەرنىنى ئەستايىدىل كۆزىتىش ھەمدە دورا مىقدارىنى ئۆز ۋاقتىدا تەڭشىپ تۇرۇش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 پېرىماكور ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. ئۆكۈل سۇبۇقلۇقى: ھەر بوتۇلكىسى 10mg/10ml، ھەر بوتۇلكىسى 20mg/20ml، قاپ/1 بوتۇلغا، قاپ/10 بوتۇلغا.

دوبۇتامىن (多巴酚丁胺，Dobutamine)

【باشقانامى】 杜丁胺，Inotrex，دوبۇتربىكىس . Dobuject，(独步催，Dobutrex)

【ئاساسىي تەركىبى】 دوبۇتامىن ھىdroxylchloride
【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ئاساسلىقى β_1
ئاكسېپتۆرنى غىنتىلاپ، يۈرەك مۇسکۇلنىڭ قىسىقىرىش كۈچىنى ئاشۇرىدۇ، يۈرەك ئەندىمىنىڭ چىقىرىش مىقدارى، تاجىسمان ئارتېرىيىدىكى قان مىقدارى ۋە يۈرەك مۇسکۇلنىڭ ئوكسىگېن سەرپىياتىنى ئاشۇرىدۇ، يۈرەك سوقۇش قېتىمغا بولغان تەسىرى بىر قەدەر كېچىك بولىدۇ. بۇ دورىنىڭ نورئادرپىنالىنىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى ۋاستىلىك ئىلگىرى سۈرۈش رولى يوق، ۋېناغا ئۆكۈل قىلىنىپ 2 ~ 1 مىنۇتتىن كېيىن ئۇنۇمى كۆرۈلدۈ ھەمدە بەدەندە تېزلا ئاكتىپسىزلىنىدۇ، مېتابولىزم ھاسلاتى ئاساسەن بۆرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، $t_{1/2}$ 2min بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 يۈرەك مۇسکۇل تىقىلمىسىدىن كېيىنكى ياكى يۈرەك ئۆپپراتسىيىسىدىكى قان سىغىمچانلىقى تۆۋەنلەشتىن كېلىپ چىقىدىغان شوڭ ياكى ئورگان خاراكتېرىلىك يۈرەك

كېسلىدىكى يۇرهەك مۇسکۇلنىڭ قىسىقىرىش كۈچى تۆۋەنلەشتىن كېلىپ چىمىدىغان يۇرهەك زەئىپلىشىشكە ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا تېمىتىلىدۇ، 250mg نى 5% لىك گلۈكۈزا ئوکۇل سۈيۈقلۈقىغا ياكى ناتىري خلورىد ئوکۇل سۈيۈقلۈقىدىن 500ml ~ 250 غا قوشۇپ، ھەر مىنۇتتا ھەر kg بىدەن ئېخىرلىقىغا 10 μ g ~ 2.5 تېزلىكتە ئوکۇل قىلىنىدۇ. سۈرئىتى ۋە داۋاملىشىش ۋاقتى يۇرهەك سوقۇش قېتىمى، قان بېسىمى، سۈيدۈك مىقدارىغا ئاساسەن تېڭىلىدۇ. دورىنى توواتىتنىن توختاتماستىن، مىقدارىنى تەدرىجىي كېمەيتىپ توختىتىش كېرەك.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، باش ئاغرىش، يۇرهەك سېلىش، يۇرهەك سانجىپ ئاغرىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، يۇقىرى قان بېسىمى، يۇرهەك ھەرىكىتى زىيادە تېزلىشىش، غېرىي ئورۇنلۇق يۇرهەك رىنتىمى قاتارلىقلارمۇ كۆرۈلدۇ.

【دىقىقتەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئىشقارلىق دورىلار بىلەن ئارىلاشتۇرۇش مەنىئى قىلىنىدۇ، تەركىبىدە پىرسوسودىئۇم سۇلغىت (焦亚硫酸钠) بولغان ياسالىملاردا سۈيۈلدۈرۈشلىمۇ بولمايدۇ. ② مەنىئى قىلىنىدىغان ئەھۋالار: يۇقىرى قان بېسىمى، دالانچە تىترەش، قېلىنلاشقان يۇرهەك مۇسکۇل كېسىلى بىمارلىرىغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشىclar: ئالاھىدە پەيدا بولغان قېلىنلاشقان ئائۇرتا كlapىسىنى ئاستى تارىغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى؛ يۇرهەك دالانچىسى تىترەيدىغان بىمارلارغا بۇ دورىنى ئىشلىتىشىن ئىلىگىرى يۇرهەك كىنى كۈچەيتىكۈچى دورا بېرىلىدۇ؛ قان سغىمچانلىقى يېتىرلىك بولمىغان بىمارلارغا بۇ دورىنى ئىشلىتىشىن ئىلىگىرى پۇتۇن قان ياكى قان پلازمىسى بېرىش ئارقىلىق قان سغىمچانلىقىنى تولۇقلاش لازىم. **【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】** دوبۇترپكى ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. پاراشوكولق ئوکۇلى: بوتۇلغا/ 250mg، قاپ/1 بوتۇلغا؛ ئوکۇل سۈيۈقلۈقى، 250mg/20ml، قاپ/1 بوتۇلغا. دوبۇجىكى گوللەندىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: ئامپۇل/250mg، قاپ/1 ئامپۇل.

مېتىلدىگوكسىن (甲基地高辛, Metildigoxin)

【باشقا نامى】 لانитوب (甲基狄戈辛, Lanitop)

. Medigoxin, β -Methyldigoxin

【ئاساسىي تەركىبى】 مېتىلدىگوكسىن.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 يۈرەكنى كۈچەيتىش تەسىرى دىگوكسىن (地高辛) دىن كۈچلۈك، يۈرەك مۇسکۇلىنىڭ قىسىقىرىش كۈچىنى كۈچەيتىدۇ، يۈرەكنىڭ سوقۇش قېتىمىنى ئازايىتىپ، يۈرەكنىڭ چىقىرىش سىقدارىنى ئاشۇرۇپ، ئۆپكە قان ئايلىنىش ۋە بەدەن قان ئايلىنىشنى ياخشىلايدۇ ھەمەدە مەلۇم دەرىجىدە سۈيدۈك ھەيدەش تەسىرىنگە ئىگە. ئىچكىندە ياخشى سۈمۈرۈلدۈ، دورا ئىشلىتىپ 20 ~ 10 منۇتتا ئۇنىزمى كۆرۈلدۈ، 40 ~ 30 منۇتتا ئەڭ يۈقىرى ئۇنىزمىگە پېتىپ بارىدۇ، $t_{1/2}$ 54~60h، ئاساسلىقى سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىللەكلەر】 ئۆتكۈر، سوزۇلما خاراكتېرىلىك يۈرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولماسىلىققا ئىشلىتىلدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە سىقدارى】 دورا سىقدارى يەككە تەن بوبىچە بولىدۇ. بۇ دورىنى ئىچكىندە چوڭلار ھەر قېتىمدا 0.2mg دىن كۈنىڭى ئىككى قېتىم ئىچىدۇ، ئۆچ كۈندىن كېيىن كېسىللەك ئالامەتلىرىدە ياخشىلىنىش كۆرۈلۈپ، يۈرەك سوقۇش قېتىمى تۈراقلق بولسا، قامداش سىقدارى بوبىچە دورا بېرىلىدۇ، يەنى ھەر قېتىمدا 0.1mg دىن كۈنىڭى 3 ~ 2 قېتىم، ۋىناغا ئوکۇل قىلغاندا ھەر قېتىمدا 0.2 دىن كۈنىڭى 2 قېتىم، قامداش سىقدارى كۈنىڭى 0.2 ~ 0.3mg ئوکۇل قىلىنىدۇ. يۈرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولماغانلارغا دورا سىقدارى كېمىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 دالانچە - قېرىنچە ئۆتكۈزۈشى توسلۇش، يۈرەك رىتىمىزلىنىش، كۆكۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ساگدۇر سىزلىنىش فاتارلىclar كۆپ كۆرۈلدۈ؛ كۆرۈش قۇۋۇتى توسوغۇنلۇققا ئۇچراش ۋە نېرۈسى چېچىلىش ئاز كۆرۈلدۈ؛ ئەرلەرنىڭ ئەمچىكى يوغىناش ۋە ئالاپىرىگىيلىك رېئاكسىيە بېرىش ناھايىتى كەم ئۇچرايدۇ.

【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: يۈرەك ھەرىكتى قېرىنچە مەنبەلىك زىيادە تېزلىشىش، قېرىنچە تىترەش،

ۋولف - پاركينسون - ۋىت سىندرومى (دالانچە تئۋەش، دالانچە تىترەش) بىمارلىرىغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ؛ دىگتالس (洋地黄) دىن زەھەرلىنىش، قاندىكى كالتسىي زىيادە يۇقىرىلاش كۆرۈلگەندە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: ھامىلدارلار، بالا ئىميتىۋاتقان ئاياللارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ قالقانبىز فۇنكسييسى تۆۋەنلىگەن، كالتسىي يۇقىرىلىغان، كالىي تۆۋەنلىگەن، دالانچە - قېرىنچە ئۆتكۈزۈشى توسلۇلغانلارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ، دورىنى ئىشلىتىش جەريانىدا ئېلىپكتەر و كاردئوگرامما، ئېلىپكتەرولىت، قاندىكى دورا قويۇقلۇقى ۋە جىڭىر، بۇرەك فۇنكسييسى قاتارلىقلارنى قەرەللەك تەكشۈرۈپ تۇرۇش؛ ياشانغانلار، تېنى ئاجىز لارغا دورا مىقدارىنى كېمەيتىش لازىم. **【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】** لانتوپ كېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپ / 0.1mg ، ئوكۇلى، ھەر ئامپۇلى 2ml / 0.2mg . تېمىتىمىسى: ھەردانىسى 0.6mg / 1ml

ئۇبىدىكارپىنون (泛癸利酮，Ubidecarenone)

【باشقا نامى】 كۆئىنزم (辅酶 Q₁₀，Coenzyme Q₁₀)، نېئوکۇئىنون
· 奚烯醌，(能气朗，Neuquinon)

【ئاساسىي تەركىبى】 كۆئىنزم Q₁₀

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىك】 قان يېتىشىمىگەن بۇرەك مۇسکۇلىنىڭ ئوكسىگېندىن پايدىلىنىش نىسبىتىنى ياخشىلاب، بۇرەك مۇسکۇلى يېپسىمان تەنچىسىدىكى ATP نىڭ سىنتېزلىنىشىنى ئاشۇرىدۇ، بۇرەك فۇنكسييىسىنى ياخشىلایدۇ، بۇرەك مۇسکۇلىنى قوغدانپا، جىڭىر كىنىڭ چىقىرىش مىقدارىنى ئاشۇرىدۇ، جىڭىر ھۇجىير سىنىڭ ئىسلەك كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، گلىكوجېن (肝糖原) نىڭ سىنتېزلىنىشىنى كۆپەيتىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىر】 يېنىك، ئوتتۇرا دەرىجىدىكى قان تولۇش خاراكتېرلىك بۇرەك زەئىپلىشىش، تاجسىمان ئارتېرىيلىك بۇرەك كېسىلى، يۇقىرى قان بېسىمى، ۋېرۇسلۇق جىڭىر ياللۇغى، سۇس ئۆتكۈر خاراكتېرلىك جىڭىر نېكروزلىنىشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 بۇ دورىنى ئىچكەندە ھەر

قېتىمدا 10mg دن كۈنگە 3 قېتىم تاماقتنى كېيىن ئىچىلىدۇ. ياش قۇرامىغا، كېسەللىك ئەھۋالغا قاراپ دورا مىقدارىنى كۆپەيتىشكە ياكى ئازايىشقا بولىدۇ. مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلغاندا هەر قېتىمدا 5 ~ 10mg دن كۈنده بىر قېتىم ئوكۇل قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان يېقىمىزلىنىش، ئىشتىهاسى تۈتۈلۈش، كۆئۈل ئېلىشىش، ئىچ سۈرۈش، ئىسۋە قاتارلىق ئالامەتلەر ئاندا - ساندا كۆرۈلدۈ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ئوكۇل سۈيۈقلۈقىدا سېرىق رەڭلىك چۆكمە پەيدا بولۇپ قالسا، ئامپۇلنى قاييانق سۈغا 3min ~ 2 قويۇپ، چۆكمە سۈزۈلگەندىن كېيىن ئىشلەتسە بولىدۇ.
【ياسالىمىسى ۋە تۈلچىمى】 نېئۇكۈينون يابۇنىيىدە ئىشلەنگەن.
 تابلېتى: تابلېت، 10mg، قاپ/30 تابلېت، قاپ/100 تابلېت؛
 ئوكۇلى: ئامپۇل / 15mg ، ئامپۇل/10mg ، ئامپۇل/15mg
 كاپسۇلى: كاپسۇل/ 5mg .

2 . يۈرهەك رىتىمىزلىقىنى داۋالايدىغان دورىلار

پروپاپېنون (普罗帕酮，Propafenone)

【باشقا نامى】 رىتمونورم (心律平，Rytmonorm)

【ئاساسىي تەركىبى】 پروپاپېنون هيدroxihloride.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 ناترىي ۋە كالتسىينىڭ تېز سۈرئەتتە ھۈجىيرە ئىچىگە كىرىشىنى تورمۇزلايدۇ، ئىمپۇلسنىڭ تارقىلىشىنى تۆۋەنلىتىدۇ ھەمدە ئۇنۇملىك قوزغالماس دەۋرىنى ئۇزارتىدۇ. غىيرىي ئورۇنلۇق ئۆز - ئۆزىنى تورمۇزلاش خۇسۇسىيىتىنى تىزگىنلىدۇ، β - ئاكسىپېپتۈرنى ئاجىز دەرىجىدە توسوش رولىغا ئىگە. ئىچىپ 30min تىن كېيىن ئۇنۇمى كۆرۈلىدۇ، 2 ~ 3h Tmax، 8h تەسىرى داۋاملىشىدۇ، قان پلازمىسىدىكى 4h $t_{1/2}$ ~ 3.5 بولىدۇ. ئوكۇل سۈيۈقلۈقىنىڭ ئۇنۇم بېرىشى تېز بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 قېرىنچە ئۆستى مەنبەلىك

تىز سۈرئەتلىك يۈرەك رىتىمىزلىقى، جانغا زامىن بولىدىغان قېرىنچە مەنبەلىك تىز سۈرئەتلىك يۈرەك رىتىمىزلىقلېرىنغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار داۋالاشنىڭ دەسلېپىدە ۋە قامداپ داۋالاش معزىگىلىدە كۈنىگە 600mg ~ 450mg ئۆچ قېتىمغا بۆلۈپ ئىچىدۇ، دورا مىقدارى ئېھىتىياتچانلىق بىلەن ئاستا - ئاستا ئاشۇرۇلىدۇ، ئەڭ يۈقرى مىقدارى كۈنىگە 900mg بولىدۇ. بالىلارغا ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا ~ 5 كۈندە ئۆچ قېتىم ئىچىشكە بېرىلىدۇ، ئۇنۇمى كۆرۈلگەندىن كېيىن دورىنىڭ يېرىمى كېمەيتىلىپ، داۋالاش ئۇنۇمى قامدېلىدۇ. ۋېناغا ئوکۇل قىلغاندا چوڭلارنىڭ ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 1.5mg ~ 1 ئوکۇل قىلىنىدۇ، زۆرۈر تېپىلسا دورىنى كۆپەيتىشكە بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 يۈرەك رىتىمىزلىقى ئېغىرلىشىش، يۈرەك سوقۇشى تۇيۇقسىز توختاپ قېلىش، يۈرەك زەئىپلىشىلدەر كۆرۈلىدۇ؛ بەدەن تۇرقى خاراكتېرلىك تۆۋەن قان بېسىمى، ئاشقازان - ئۇچىي يېقىمىزلىنىش، سېزىم نورمالىسىزلىنىش ۋە چارچاش، باش ئاغىرش، ئاق قان ھۈجەيرىسى، دانچە ھۈجەيرە ۋە قان پلاستىنكلىرى كېمېيش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ ھەمە پىرامىدا سىرتقى سىستېمىسى ئالامەتلىرى پىدا بولۇشىمۇ مۇمكىن؛ ئالىپرگىيلىك تېرە رېئاكسىيىسى، مەسىلەن: قىزىل داغ، قىچىشقاق، ئەسۋە قاتارلىقلار ئاز كۆرۈلىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋالار: ئوڭشالىمغان قان تولۇشلۇق يۈرەك زەئىپلىكى، يۈرەك مەنبەلىك شوڭ، يۈرەك ھەربىكتى زىيادە ئاستىلاش، يۈرەك مۇسکۇل تىقلىمىسى، ئېغىر دەرىجىلىك سىنۇس دالانچىسى، دالانچە - قېرىنچە ياكى يۈرەك قېرىنچىسىنىڭ ئۆتكۈزۈشى تو سقۇنلۇقا ئۆچراش ياكى سىنۇشلۇق يېغىندى ئالامىتى ھەمە قان بېسىمى روشنەن ھالدا تۆۋەن بولۇش، ئېلىپتەرولىتلار كۆرۈنەرلىك تەڭپۈئىسىزلىنىش، ئېغىر دەرىجىدىكى تو سۇلۇش خاراكتېرلىك ئۆپكە كېسىللىكلىرى، ئېغىر ئۆتىدىغان مۇسکۇل جانسىزلىنىشلارغا ئىشلىتىش چەكللىنىدۇ. ② باشقا دېققەت قىلىدىغان ئىشلار: ھامىلىدارلار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ يەرلىك ئورۇنى ناركۈز قىلغۇچى دورىلار ياكى يۈرەك سوقۇش قېتىمى ۋە يۈرەك مۇسکۇلنىڭ قىسىقىرىشىنى تورمۇزلىخۇچى باشقا

دوربىلارنى ئىشلىتىۋاقىنالارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ بىمارنىڭ ئىنكاڭ سۈرئىتى ۋە ماشىنلاردا مەشخۇلات قىلىش ۋە ماشىنا ھەيدەش ئىقتىدارىغا تەسىر يەتكۈزۈدۇ؛ شۇڭا، مىقدارىنى ئېھىتىياتچانلىق بىلەن تەڭشىش كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 رىتمونورم گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. قاپلىق تابلىپتى: تابلىپ/150mg، قاپ/10 تابلىپ، ئۆكۈلى: ھەر ئامپۇلى 70mg/20mg، قاپ/5 ئامپۇل.

سوتالول ھىدرۆخلورىد

(盐酸索他洛尔，Sotalol Hydrochloride)

【باشقى نامى】 施太可，Sotacor (舒心可)

【ئاساسىي تەركىبى】 سوتالول ھىدرۆخلورىد.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا تاللاشچانلىققا ئىگە

بولىغان β - ئادىربىنالىن ئىقتىدارلىق ئاكسىپپىتۆرنى تورمۇزلىغۇچى دورا بولۇپ، يۈرەك سوقوش قېتىمىنى ئاستىلىتش ۋە قىسقىرىش كۈچىنى ئاجىزلىتىش، يۈرەك مۇسکۇلىنىڭ ئوكسىگېن سەرپىياتىنى ئازايىتىش تەسىرىنگە ئىگە. يۈرەكىنىڭ ھەرىكەت پۇتىنسىئال ۋاقتىنى ئۇزارتىدۇ، يۈرەك دالانچىسى، يۈرەك قېرىنچىسى، يان يولىنىڭ ئۇنۇمۇك قوزغالماش دەۋرىنى ئۇزارتىدۇ. يۇقىرى قان بېسىمى بىمارلىرىنىڭ قىسىقىرىش بېسىمى ۋە كېڭىش بېسىمىنى كۆرۈنەرىلىك تۆۋەنلىتىدۇ. ئاساسلىقى بۆرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، $t_{1/2}$ 12h بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەلىكىلەر】 يۈرەك رىتىمىسىزلىقىغا

ئىشلىتىلىدۇ. بۇنىڭدىن سرت، يۈرەك سانجىقى، يۈرەك مۇسکۇل تىقىلىمىسى، يۇقىرى قان بېسىمى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 دەسلەپكى مىقدارى كۈنىڭ

160mg بولۇپ، ئىككى قېتىمغا بولۇپ ئىچىلىدۇ، دورا بېرىش ئارلىقى 12 سائەت بولۇپ، تاماڭتن 2 ~ 1 سائەت ئىلگىرى ئىچىلىدۇ. 2 ~ 3 گۈن دورا مىقدارى كۈنىڭ كۆپەيتىلىدۇ.

【ناچار تەسىر】 نەپەس قىيىنلىشىش، چارچاش، باش قېيش،

باش ئاغرىش، قىزىش، يۈرەك ھەرىكتى زىيادە ئاستلاش، تۆۋەن قان بېسىمى، ئېغىر بولغاندا يۈرەك ئۇچى تولغىشنى تېلىق قېرىنچە مەنبىلىك يۈرەك سوقۇشى تېزلىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان يۈرەك رىتىمىزلىقى كېلىپ چىقدۇ. دېمى سىقلىش، سۇلۇق ئىشىشىقلارمۇ پېيدا بولىدۇ، ئىسۇھ ئاندا - ساندا كۆرۈلدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: كانايىچە زىقىسى ياكى توسلۇش خاراكتېرىلىك سوزۇلما ھاوا يولى كېسىلىكلىرى، بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بارلار، يۈرەك مەنبىلىك شوك، سىمپېتوملۇق سىنۇس مەنبىلىك يۈرەك سوقۇش زىيادە ئاستلاش، سىنۇسلۇق يېغىندى ئالامەتلەر، ② ~ ③ دەرىجىلىك دالانچە - قېرىنچە ئۆتكۈزۈشى توسلۇش، تىزگىنلەنمىگەن قان تولۇش خاراكتېرىلىك يۈرەك فۇنكىسييسى تولىق بولماسلق، بۇرەك فۇنكىسييسى تولىق بولماسلق، توغما ياكى ئېرىشمە QT ئارىلىق ۋاقتى ئۇزىراش يېغىندى ئالامەتلەر، ھاسىلىدارلار، بالا ئېميتىۋاتقان ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقلار: ئۇپپراتسىيە ياكى يۈرەك مۇسکۇلىنى تورمۇزلىخۇچى دورا ئىشلەتكەنلەرگە ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدىدۇ؛ دىئابېت كېسىلى، قان شېكىرى تۆۋەلەش تارىخى بارلار، قالقانبىز خىزمىتى تەرەققىي قىلىشچان كۈچىيپ كەتكەنلەر، بۇرەك فۇنكىسييسى تولىق بولمىغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدىدۇ؛ يۇقرى قان بېسىمىغا قارشى باشقا دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەننە دورا مىقدارىنى تەڭشەشكە دققەت قىلىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 سوتاکور ئىنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلېتى: تابلېت/80mg، قاپ/14 تابلېت، قاپ/28 تابلېت.

پوتاسىسىئۇم ماگنىزىئۇم ئاسپاراتات (门冬氨酸钾镁, Potassium Magnesium Aspartate)

【باشقان نامى】 پانانگىن (潘南金, Panangin) ، پېرىكۇرسال (Perikursal).

【ئاساسىي تەركىبى】 ماگنىزىئۇم ئاسپاراتات، پوتاسىسىئۇم ئاسپاراتات.

【فارماکولوگیلیک ئالاھىدىلىك】 كالى ئىئۇنى يۈرەك مۇسکۇلىنىڭ بېتابولىزمنى ياخشلاپ، يۈرەك مۇسکۇلىنىڭ قىسىرىش ئىقتىدارنى ياخشلايدۇ ھەمەدە ئوكسىگېن سەرپىياتنى تۆۋەنلىتىپ، دىگەتلىسىنىڭ زەھرلەش تەسىرىنى تۆۋەنلىتىدۇ. ماڭنىي ئىئۇنى ھۈچەيرە ئىچىدىكى كالىي مىقدارىنى ساقلاپ قىلىشتا مۇھىم رول ئۇينىدۇ. ئاساپارتىك كىسلاتانىڭ ھۈچەيرىلەر بىلەن يېقىنىلىشش كۈچى كۈچلۈك بولغاچقا، بەدەندە كالىي، ماڭنىي ئىئۇنلىرىنى توشۇپ، ھۈچەيرىكە ئېلىپ كىرىدىغان توشۇغۇچى قىلىنىدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 تۆۋەن كالىي، ماڭنىيلق قان كېسىلى، يۈرەك رىتىمى نورمالسىزلىنىش، يۈرەك ھەرىكتى زىيادە تېزلىشش، يۈرەك مۇسکۇل تىقلىمىسى، يۈرەك سانجقى، ئۆتكۈر، سوزۇلما خاراكتېرىلىك جىڭىر ياللۇغى، جىڭىر قېتىش، ئۆت سۇيۇقلۇقىنىڭ ئاجرىلىشى توسقۇنلۇققا ئۈچۈراش، قاندا ئاممۇنىي يۈقرىلاش كېسىلى، ھابىلىدارلىقىنىكى يۈقرى قان بېسىمى يىغىندى ئالامەتلەرى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار ھەر قېتىمدا ئىككى تابلىتىن كۈنگە ئۈچ قېتىم ئىچىدۇ. ئالدىنى ئېلىشقا ئىشلەتكەندە: ھەر قېتىمدا بىر تابلىتىن كۈنگە ئۈچ قېتىم ئىچىدۇ. بالىلارغا ئىشلەتكەندە: بەش ياشتىن تۆۋەنلىرىگە ھەر قېتىمدا بىر تابلىتىن، 10 ياشتىكىلەرىگە ھەر قېتىمدا ئىككى تابلىتىن كۈنگە ئۈچ قېتىم ئىشلىتىلىدۇ. ۋېناغا تېمىتقاندا كۈنگە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 20ml ~ 10 ئاستا - ئاستا تېمىتىلىدۇ. ئالاھىدە بىمارلارغا ھەر قېتىمدا 60ml ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىشلىتىلىدۇ. بالىلارغا دورا مىقدارى كېمەيتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشش، قۇسۇش، قان تومۇرلار ئاغرىش، قىزىرىش، قان بېسىم تۆۋەنلىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. يۈرەك سوقۇش قېتىمى ئاستىلاش، ئاشقازان يارىسى ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەئى قىلىنىدىغان ئەھۋالار: قاندا كالىي يۈقرىلىغان، قاندا ماڭنىي يۈقرىلىغان، بۆرەك فۇنكىسيسى ئېغىر دەرىجىدە توسقۇنلۇققا ئۈچۈرخانلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: مۇسکۇلغا ياكى ۋېناغا ئوكۇل قىلىشقا بولمايدۇ؛ ۋېناغا تېمىتقاندا

تېمىتىش سورئىتى ئاستا بولۇشى لازىم؛ دىگىتالىستىن زەھەرلەنگەنلەردىن سىرت، دالانچە - قېرىنچە ئۆتكۈزۈش توسۇلغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

『ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى』 پاناكىن ۋېنگرېيىدە ئىشلەنگەن.

تابلىقى: قاپ/50 تابلېت؛ ئوكۇلى: تەركىبىدە 400mg ماقنىزىئۇم ئاسپارتاتات ۋە 452mg پوتاسىئۇم ئاسپارتات بار، ئامپۇل/10ml، قاپ/5 ئامپۇل.

3 . يۈرەك سانجىقىغا قارشى دورىلار

ئىزو سوربىد دىنترات

(硝酸异山梨酯, Isosorbide Dinitrate)

『باشقانامى』 ئىزو كېت (异舒吉, Isoket) ، ئېلاتانت (易舒吉, Iso-Mack) ، ئىزو - ماك (易顺脉, Iso-Mack) ، ئانگىئولونگ (安其伦, Angiolong).

『ئاساسىي تەركىبى』 ئىزو سوربىد دىنترات.

『فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىسى』 بۇ دورىنىڭ تەسىرى نىتروگلیتسىپrin بىلەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ. ئىچىپ يېرىم سائەتتىن كېپىن ئۇنۇمى كۆرۈلىدۇ، تىل ئاستىغا قويۇپ شۇمگەنде 3min ~ 2 ئۇنۇم بېرىدۇ.

『مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر』 يۈرەك سانجىقى ۋە قان تولۇش خاراكتېرىلىك يۈرەك زەئىپلىشىشكە ئىشلىتىلىدۇ.

『ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى』 يۈرەك سانجىقىنى پەسىيەتىتىش تىل ئاستىغا دورا سېلىنىدۇ، ھەر قېتىمدا 500mg ئىشلىتىلىدۇ. يۈرەك سانجىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ھەر قېتىمدا 5~10mg دىن كۆنگ 10~30mg بولىدۇ، تۇمانلاشتۇرۇپ شۇمۇرتىكىنە ھەر قېتىمدا 2mg/h تېمىتىقاندا ئاشلىتىلىدۇ.

『ناچار تەسىرى』 دورا ئىشلەتكەن دەسلەپكى مەزگىلدە قان تومۇرلارنىڭ كېڭىيىشى تۈپەيلى باش ئاغرىش، كۆڭۈل ئېلىشىش پەيدا

بولىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: قان تومۇرنى كېڭىتىكۈچى باشقا دورىلار، كالتسىي بىلەن قارشىلاشقاچى دورىلار، قان بېسىمنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلار، ترسكلىك تۈرىدىكى خامۇشلوققا قارشى دورىلار ۋە ئىسپىرت بىلەن بىلە ئىشلەتكەندە بۇ دورىنىڭ قان بېسىمنى تۆۋەنلىتش تەسىرى كۈچىيدۇ. ② مەنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئايلىنىش زەئىپلىشش، ئېغىر دەرىجىدىكى تۆۋەن قان بېسىمى، ھامىلىدارلىقنىڭ دەسلەپكى ئۇچ ئېبىي، تۆۋەن قان تولۇشلوق ئۆتكۈر يۈرەك مۇسکۇل تىقلىمىسىغا ئىشلىتش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: دورا ئىشلىتش داۋامىدا بىمارنىڭ يۈرەك رىتمى ۋە قان بېسىمنى ئىزچىل كۆزىتىپ تۇرۇش كېرەك؛ قالقانبىز ئىقتىدارى چېكىنگەن، ئوزۇقلىنىشى ناچارلاشقا، ئېغىر جىڭەر، بۆرەك كېسەللەرى، بەدەن ئېغىرلىقى زىيادە تۆۋەنلەر، ھامىلىدارلار ۋە بالا ئېمىتۋاتقان ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك يۈرەك مۇسکۇل تىقلىمىسىغا ئىشلىتىلمىيدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ئىزو كېت گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. ئاستا تەسىرلىك تابلىپتى: تابلىپتى/20mg، قاپ/50 تابلىپتى؛ ئوكۇلى: 1mg/ml، ئامپۇل/10ml، ئامپۇل/50ml، تۇمانلاشتۇرغۇچى ياسالىمىسى: دان/300×1.25mg قېتىم پۇركۈلىدۇ.

ئېلاتىنات گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى/20mg، قاپ/50 تابلىپتى.

ئىزو - ماڭ گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. كاپۇلى: دان/20mg، قاپ/20 دانه، قاپ/10 دانه، دان/40mg، دان/20 دانه، قاپ/100 دانه، ئېغىزغا پۇركۈلىدىغان ياسالىمىسى؛ بوتۇلكا/125mg.

ئانگىئولونگ ياپۇنىيىدە ئىشلەنگەن. ئاستا تەسىرلىك كاپۇلى: دان/20mg، قاپ/20 دانه، دان/40mg، قاپ/10 دانه.

ئىزوسوربىد - 5 - نىترات

(单硝酸异山梨酯, Isosorbide - 5 - Nitrate)

【باشقا نامى】 مونوتروات (莫诺确特, Monotrate) ، ئىس- 5 - مونو رېتاراد راتىئوفارم (德明, Is-5-Mono, Retard Ratiopharm) ، ئۇزۇن ئۇنۇملاوك ئېلاتان لونگ (长效异乐定, Elantan Long) ، پېنتاكارد 20 (康维欣, Corangin) ، كورانگىن (盘得高, Pentacard20) . (莫诺美地, Mono Mack 50D) 50D

【ئاساسىي تەركىبى】 ئىزوسوربىد - 5 - نىترات.

【فارماکولوگىسىلىك ئالاھىدىلىكى】 ئىزوسوربىد - 5 - نىترات بولسا بۇ دورىنىڭ ئاساسلىق ئاكتىپلاشقان مېتالىزىم ھاسىلاتى بولۇپ، يۈرەك مۇسکۇلغا قان يېتىشىمىسىلىككە قارشى تۇرۇش تەسىرى بار. ئىچكەندە تېزلىكتە سۈمۈرۈلدۈ، جىگەر دەسلەپكى دورا تەسىرى مەۋجۇت بولمايدۇ، بىئولوگىسىلىك پايدىلىنىش دەرجىسى 100% گە يېتىدۇ، $t_{1/2}$ ~ 5h، يۈرەك ئارقىلىق چىقرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىككەر】 تاجىستان ئارتىپىسىلىك يۈرەك كېسىلى، قان تومۇر سېپازىمىلىنىش تېپلىق ۋە ئارملاش تېپلىق يۈرەك سانجىقى، يۈرەك مۇسکۇل تىقلىمىسى ۋە سوزۇلما خاراكتېرىلىك يۈرەك زەئىپلىشىشكە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش تۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەنر قىتىمدا 20mg 20 دىن كۈنگە ئىككى قىتىم ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئىسۋە، بىدەن تۇرقى خاراكتېرىلىك تۆۋەن قان بېسىمى، باش قېيىش، باش ئاغىرىش، يۈز قىسىمى قىزىرىش، قىزىغاندەك سېرىش، كۆڭۈل ئېلىشىش قاتارلىقلار كۆرۈلدۈ.

【دىقىقتە كېلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: قان تومۇرنى كېڭىتىكۈچى باشقا دورىلار، كالتسىي بىلەن قارشلاشقاچىي دورىلار، قان بېسىمنى تۆۋەنلىتكۈچى دورىلار، ترسىكلىك تۈرىدىكى خامۇشلۇققا قارشى دورىلار ۋە ئىسپىرت بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، بۇ دورىنىڭ قان بېسىمنى تۆۋەنلىتىش تەسىرى كۈچىيدۇ؛ دەھىدرۇئېرگوتامن (双氢麦角胺) نىڭ قان بېسىم تۆۋەنلىتىش تەسىرى بۇ

دورا تەرىپىدىن كۈچەيتىلىدۇ؛ سېتىرۇئىدىلىق بولمىغان ياللۇغا قارشى دورىلار (非甾体抗炎药) بۇ دورىنىڭ تەسىرىنى تۆۋەنلىتىدۇ. ② مەنى ئىلىنىدىغان ئەھۋاللار: گلازوكوما، شوک، قىلىنلاشقان توسلۇش خاراكتېرىلىك يۈرەك كېسىلى، ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك يۈرەك مۇسۇكۇل تېقىلىمىسى بىمارلىرىغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ③ باشقىلار: بىدەن تۇرقى خاراكتېرىلىك قان ئايلىنىشنىڭ تەڭشىلىشى توسقۇنلۇققا ئۇچرىغۇچىلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ يۈرەك سانجىقنىڭ ئۆتكۈر قوزغىلىشىغا ئىشلىتىلىمەيدۇ؛ ھامىلدارلار ۋە بالا ئېمىستۇرانقان ئاياللار، ئۆپك ئايلىنىشدا بىرلەمچى يۇقىرى قان بېسىم بارلار، ئائۇرتا كلاپنى ياكى ئىككى قاناتلىق قاپقىقى تارايغانلار، باش ئىچى بېسىمى يۇقىرىلىغانلار، بۇرەك ئىقتىدارى ئېغىر دەرىجىدە توسقۇنلۇققا ئۇچرىغۇچىلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 مونوترات ھىندىستاندا ئىشلەنگەن.
 ئاستا تەسىرلىك تابلىپتى: تابلىپت/50mg، قاپ/10 تابلىپت.
 ئىس - 5 - مونورپتارد راتئۇفارم گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. ئاستا تەسىرلىك كاپسۇلى: دانه/40mg، قاپ/30 دانه.
 ئۇزۇن ئۇنۇمۇلۇك ئېلاتتان لونگ گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى:
 دانه/25mg، دانه/50mg، قاپ/20 دانه.
 پېنتاكارد گوللاندىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپت: تابلىپت/20mg،
 بولاق/100 تابلىپت.
 كورانگىن شۇبىتىسارىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپت، تابلىپت/40mg،
 قاپ/10 تابلىپت، قاپ/20 تابلىپت، تابلىپت/60mg، قاپ/10 تابلىپت،
 قاپ/20 تابلىپت.
 مونوماك گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپت/50mg،
 قاپ/20 تابلىپت.

ئاتېنولول

(阿替洛尔，Atenolol)

【باشقا نامى】 تېنورمەن (天诺敏，Tenormin)
 【ئاساسىي تەركىبى】 ئاتېنولول.

『فارماکولوگىسىلىك ئالاھىدىلىك』 - ئادرېنالىن ئىقتىدارلىق ئاكسېپتۇرنى تو سقۇچى دورا بولۇپ، يۈرەك سانجىقى ئالاھىدىلىرىنى ئۇنۇمۇلۇك يوقتاالايدۇ ياكى ياخشلايدۇ. يۈرەككە بولغان تاللاشچانلىقى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇپ، قان تومۇر ۋە كانايچىلارغا بولغان تەسىرى نىسبەتن ئاجىز. ئىچكەندىن كېيىن تەخمىنەن 50% ~ 40 سۈمۈرۈلدى، Tmax، 2 ~ 4h بۆرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، كۈنده بىر قېتىم ئىچىلسە، دورا ئۇنۇمى ئاز بولغاندا 24h 5 سائەت داۋام قىلىدۇ.

『مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەلىكىلەر』 يۇقىرى قان بېسىمى، يۈرەك سانجىقى، يۈرەك رىتمىسىزلىقى، يۈرەك مۇسکۇل تىقلىمىسى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

『ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى』 يۇقىرى قان بېسىمىغا: 1~100mg، كۈنگە بىر قېتىم، يۈرەك سانجىقى ۋە يۈرەك رىتمىسىزلىقىغا: 100mg، كۈنگە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ، بۆرەك فۇنكىسىيىسى ئېغىر دەرىجىدە تو سقۇنلۇققا ئۇچىرخان بىمارلارغا دورا مىقدارى تەڭشەپ بېرىلىدۇ.

『ناچار تەسىرى』 يۈرەك ھەرىكتى زىيادە ئاستىلاش، يۈرەك زەئىپلىشىش، كانايچىلار سپاز مىلىنىش، ئاشقازان - ئۇچىي يولي يېقىمىسىزلىنىش، چارچاش، دالانچە - قېرىنچە ئۆتكۈزۈشى تو سولۇش، تۆۋەن قان بېسىمى، ئۇيقوسى ناچارلىشىش قاتارلىقلار كۆرۈلدى.

『دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار』 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: يۇقىرى قان بېسىمىغا قارشى باشقا دورىلار ۋە سۈيدۈك ھەيدىكۈچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىسى، بۇ دورىنىڭ قان بېسىم تۆۋەنلىتىش ئۇنۇمى كۈچىيىدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۇللار: ②، ③ دەرىجىلىك دالانچە - قېرىنچە ئۆتكۈزۈشى تو سولۇش، سىنۇسلىق يۈرەك ھەرىكتى زىيادە ئاستىلاش، قان تولۇش خاراكتېرلىك يۈرەك زەئىپلىشىش، يۈرەك مەنبەلىك شوك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: بۆرەك فۇنكىسىيىسى تولۇق بولىغانلار، دىئاپىت كېسىلى بارلار، قالقانبەز خىزمىتى كۈچىيىپ كەتكەنلەر، ھامىلىدارلار ۋە بالا ئېمىتىۋانقان ئاياللار، يۈرەكنىڭ كومپېنساسىتىلىك ئىقتىدارى ناچارلاشقا نلار، يۈرېكى زەئىپلەشكەنلەر، سوزۇلما خاراكتېرلىك ئەپەس يولي تو سولۇش، زىققە، زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ، باللارغا

ئىشلىش مۇۋاپق كەلمىدۇ.
【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 تېنورمن ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىقى: تابلىت/25mg، قاپ/28 تابلىت، تابلىت/50mg، قاپ/28 تابلىت.

دىلتىئازېم

(地尔硫䓬 Diltiazem)

【باشقانامى】 ئودىزېم (奥的镇, Odizem) (奥的镇, Odizem), خېرىبىسېر (合心爽, Herbesser).

【ئاساسىي تەركىبى】 دىلتىئازېم ھيدروخلورىد.
【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 كالتسينياڭ يولىنى توسىقۇچى دورا بولۇپ، ئاساسلىقى قان تومۇر سىلىق مۇسکۇلغا تاللاش خاراكتېرىلىك تەسر كۆرسىتىدۇ، تاجسىمان ئارتبىرىيىنى كېڭىتىپ، يان شاخچە قان ئايلىنىشنى ياخشلايدۇ، تاجسىمان ئارتبىرىيىنىڭ قان مىقدارىنى ئاشۇرۇپ، قان يېتىشىمىلىك مىزگىلىدىكى قان يېتىشىمىگەن رايىونتىڭ قان ئېقىمىنى ياخشلايدۇ ھەمدە يۈرەك مۇسکۇل تىقلىمىسى دائىرىسىنىڭ كېڭىشىنى چەكلىدۇ؛ ئەتراب قان تومۇرلارنى كېڭىتىپ، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىدۇ، يۈرەكىنىڭ يۈكىنى يېنلىكتىدۇ، 3 ~ 5h Tmax ~ 6h t_{1/2} ~ 4، ئاقسىل بىلەن بىرىكىش نسبىتى 80% بولىدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كىسەللەككەر】 ھەرخىل تېپىكى يۈرەك سانجىقى، بىرلەمچى يۇقىرى قان بېسىمى (يېنىك، ئوتتۇرا دەرىجىدىكى) گە ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەرقېتىمدا 60mg ~ 30، كۈنىڭ ئۆچ قېتىم ئىچلىدۇ، ۋېناغا ئوکۇل قىلغاندا قېرىنچە ئۇستى مەنبەلىك يۈرەك ھەرىكىتى زىيادە تېزلىشىكە ھەرقېتىمدا 10mg ئاستا - ئاستا ئوکۇل قىلىنىدۇ؛ ئوپپراتسىيىدىكى غىيرىي نورمال يۇقىرى قان بېسىمىنى جىددىي بىر تەرەپ قىلىشتا، ھەر قېتىمدا 10mg ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ ياكى ھەر منۇتتا ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 10μg ~ 5 ۋېناغا تېمىتىلدى؛ جىددىي يۇقىرى قان بېسىم كېسىلىگە ھەر منۇتتا ھەر kg

بىدەن ئېغىرىقىغا $15\mu\text{g}$ ~ 5 ۋېباغا تېمىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرىش، ئاشقازان - ئۈچىي يولى يېقىمىسىزلىنىش، ئەسۋە، تومۇر سوقۇش ئاستىلاش، دالانچە - قېرىنچە ئۆتكۈزۈشى توسوْلۇش ۋە ئۆتكۈنچى خاراكتېرىلىك GPT يۇقىرلاش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىنىدەغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: يۇقىرى قان بېسىمغا قارشى دورىلار، β - ئاكسىپيتورنى توسىقۇچى دورىلار ياكى دىگىتالىس، پۇرتسىپ ناركوز قىلىش دورىلىرى بىلەن ئۆز ئارا تەسىرىلىشىدۇ. ② مەنىي قىلىنىدەغان ئەھۋاللار: ئېغىر دەرىجىدىكى تۆۋەن قان بېسىمى ياكى يۈرەك مەنبەلىك شوڭ، يۈرەك ھەرىكىتى زىيادە ئاستىلاش، سىنۇس - دالانچە ئۆتكۈزۈشى توسوْلۇش، قان تولۇش خاراكتېرىلىك يۈرەك زەئىپلىكى ياكى يۈرەك مۇسکۇل كېسىلى بىمارلىرىغا، ھامىلىدار لارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: جىڭىر، بۆرەك فۇنكىسىسى تولۇق بولىغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ. **【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】** خېرىبېسىپر يابۇنىيىدە ئىشلەنگەن. تابلېتى: تابلېت/30mg، قاپ/20 تابلېت، قاپ/50 تابلېت: ئۆكۈلى: ئامپۇل/10mg، قاپ/10 ئامپۇل، ئامپۇل/50mg، قاپ/10 ئامپۇل.

નિટ્રોગ્લિટ્સ્પરન (硝酸甘油, Nitroglycerin)

【باشقا نامى】 نિટ્રો - ટાઇમ (耐安康, Nitro - Time) ، નિટો - માક - રિટાર્ડ (夕护晓, (疗通脉, Nito - Mack - Retard) ، નિટ્રોરોસ્ટાટ (耐较咛, Nitrostat) ، નિટ્રોનિટ્રારિટ નિલ્રાડિન (三硝酸甘油酯缓释贴剂, Glyceryl Trinitrate Nilradise) ، નિટ્રોગ્લિટ્સ્પરન ડેપોનિટ (贴保宁, Nitroglycerin Deponit) ، નિટ્રોલિંગ્યુથાલ (永保心灵, Nitrolingual) .

【ઓસાસી તેરકીબી】 ગ્લિટ્સ્પરિલ ટ્રિનિટ્રાટ

【ફાર્માકોલોગ્યિસ્લિક નિલ્રાડિસ્લિકી】 કાન تومۇر سિલિક મુસ્કૂલિની બેઝાસ્ટે બોષટિદુ، બોલ્યુપ્મો ચિલ કાન تومۇر سિલિક મુસ્કૂલિની બોશાસ્ટોર્વ્પ، ئەત્રાપ કાન تومۇر لارنى كېڭىھિટ્સ، ئەત્રાપ

قارشىلىق كۈچىنى تۆۋەنلىتىدۇ، يۈرەككە قايتىدىغان قان مىقدارىنى ئازايتىدۇ، يۈرەكىنىڭ چىقىرىدىغان قان مىقدارىنى تۆۋەنلىتىپ، يۈكىنى يېنىكلىتىدۇ، يۈرەك مۇسکۇلىنىڭ ئوكسىجىن سەرپىياتىنى تۆۋەنلىتىدۇ، نەتجىدە يۈرەك سانجىقى ياخشىلىنىدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 يۈرەك سانجىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 يۈرەك سانجىقىنى پەسەيتىشە ھەر قېتىمدا 0.5mg تىل ئاستىغا سېلىنىدۇ. نىتروگلىتىسپرنلىق پەرەد ياكى نىتروگلىتىسپرنلىق پلاستېر كۈنگە بىر دانه كۆكىرەك ئالدىغا چاپلىنىدۇ، مىقدارى ئەھۋالغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرىش، يۈز قىزىرىش، ئۇيقوسراش، بەدهن تۈرقى خاراكتېرىلىك تۆۋەن قان بېسىمى، رېفلىكسلىق يۈرەك ھەرىكىتى زىيادە تېزلىشىش كۆرۈلىدۇ. كوللاپىس ئاندا - ساندا كۆرۈلدۈ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دوربىلار بىلەن بولغان تەسىرى: قان تومۇزلارنى كېڭىتىكۈچى دوربىلار، يۈقىرى قان بېسىمىغا قارشى دوربىلار، β - ئاكسبېپتورىنى توسقۇچى دوربىلار، كالتسىي ئىئۇنىنى توسقۇچى دوربىلار، نېرژىنى تۈرمۇزلىغۇچى دوربىلار ياكى ترسىكلىك تۈرىدىكى خاموشلۇققا قارشى دوربىلار ۋە ئىسپىرت بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە، بۇ دورىنىڭ قان بېسىمىنى توۋەنلىتىش تەسىرى كۈچىيدۇ؛ دەمەرۋەپرگوتوكسىن (二氢麦角碱) نىڭ تەسىرىنى كۈچىيتىدۇ، ھېپارىن (肝素) نىڭ ئۇنۇمىنى توۋەنلىتىدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋالار: ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك قان ئايلىنىش زەئىپلىشىش، ئېغىر دەرىجىدە تۆۋەن قان بېسىمى، گلاؤكوما بىمارلىرىغا ئىشلىتىلمىدۇ. ③ باشقىلار: ھامىلىدارلار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىھەتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ يۇتۇۋېتىشكە بولمايدۇ؛ دەسلەپتە ئىشلەتكەندە ناچار تەسىرىدىن ساقلىنىش ۋە يېنىكلىتىش ئۈچۈن يېرىم تال دورىنى تىل ئاستىغا قويۇپ شۇمسە بولىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 نىترو - ماك - رېتارد گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن: كاپسۇلى: دانه 25mg ، قاپ/20 دانه، قاپ/60 دانه. نىترو - تىم ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن: ئاستا تەسىرىلىك كاپسۇلى:

دانه/2.5mg ، دانه/mg .6.5mg .
 ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. پلاستېرى: پلاستېر/ 10cm^2 ، پلاستېر/ 20cm^2 ، پلاستېر/ 30cm^2 .
 نىتروستات ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. تاپلىتى: 0.6mg ، قاپ/ 25×4 .
 نىترودېرم پلاستېر پەردىسى شۇپىتسارىيىدە ئىشلەنگەن.
 پلاستېر/2.5mg ، پلاستېر/5mg .
 گلنتېرىل ترنىترات نىلرادىز پلاستېرى ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن.
 پلاستېرى: پلاستېر/10mg .
 نىتروگلنتېرىن دېپونت گېրمانىيىدە ئىشلەنگەن.
 پلاستېرى: پلاستېر/5mg ، پلاستېر/10mg ، قاپ/10 پلاستېر .
 نىتروولىنگۈۋال شياڭاڭدا ئىشلەنگەن. پۇركۈلىدىغان ياسالىمىسى:
 $230\times 400\mu\text{g}$ قېتمىم پۇركۈلىدۇ.

ترىمېتاژىدەن (曲美他嗪，Trimetazidine)

- 『باشقانىمى』 ۋازورېل (万爽力，Vasorel) .(万爽力，Vasorel) . Idaptan, Vastazin, Vastarel, 三甲氯苄嗪，心康宁，冠脉舒
- 『ئاساسىي تەركىبى』 دەھىدرۇخlor ترىمېتاژىدەن .
- 『فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى』 بۇ دورا ھۇجىرىدە سەۋىيىسىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ، يۈرەك مۇسکۇلغۇ قان يېتىشىمەسلىككە قارشى تۈرۈش رولىخا ئىكە. ئىچكەندە تېز سۈمۈرۈلىدۇ، $t_{1/2} = 6\text{h}$ $T_{max} = 2\text{h}$ بۆلۈپ، كۆپ قىسى ئىسلى پېتى سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ .
- 『مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى』 يۈرەك سانجىقىنى ئۆزۈن مۇددەت داۋالاشقا ئىشلىلىدۇ .
- 『مۇشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى』 كۈنىگە 60mg ئۇچ قېتىمغا بۆلۈپ تاماق يېگەندە ئازراق ئىلمان سۇدا ئىچىلىدۇ .
- 『ناچار قەسىرى』 باش قېيىش، ئىشتىهاسى تۈتۈلۈش، ئەسۋە قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ .
- 『دىققەت قىلىدىغان ئىشلار』 يېڭىدىن پەيدا بولغان يۈرەك

مۇسکول تىقلىمىسىغا ئىشلىتىلمىدۇ. ھامىلدارلار ۋە بالا ئېمىتىۋانقان ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.
【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ۋازورېل فرانسييىدە ئىشلەنگەن.
 تابلېتى: تابلېت/20mg، قاپ/30 تابلېت.

4 . ئەتراب قان تومۇرلارنى كېڭىيتكۈچى دورىلار

پېنتوكسفيلىن (己酮可可碱，Pentoxifylline)

【باشقانامى】 ترېنتمال (巡能泰，Trental)، پېنتومېز (潘通，Pentamer)
【ئاساسىي تەركىبى】 تورېنتمال.
【فارماكولوگىيلىك ۋالاھىدىلىكى】 ئەتراب قان تومۇرلارنى كېڭىيتكۈچى دورا بولۇپ، ھۇجمىرىلەرنىڭ شىكىل ئۆزگەرتىش ئىقتىدارنى ياخشلايدۇ، قان پلاستىنكلىرنىڭ توپلىشىنى تورمۇزلاپ، قاننىڭ يېپىشقاقلقى دەرىجىسىنى تۆۋەنلىقىش ئارقىلىق، قان ئېقىمىنىڭ خاراكتېرىنى ئۆزگەرتىدۇ، مېڭى ۋە توت مۇچىدىكى قاننىڭ ئايلىنىشنى ياخشلايدۇ.
【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەلىكلىدر】 ئەتراب ئارتىرىپىلەرنىڭ توسلۇشى مەنبېلىك كېسەلىكلىر، ئارتىرىپىيە بونقىسман قېتىش ياكى دئابىت كېسىلى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئارتىرىپىيە، ۋەننا كېسەلىكلىرى ۋە ئوزۇقلۇنىش توسقۇنلۇققا ئۈچۈراش، مېڭى قان ئايلىنىشى توسقۇنلۇققا ئۈچۈراش، كۆز ۋە ئىچكى قولاق قان ئايلىنىشى توسقۇنلۇققا ئۈچۈراش، كۆرۈش كۈچى ۋە ئائىلاش ئىقتىدارى ناچارلىشىش.
【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 بىماردىكى قان ئايلىنىشنىڭ توسقۇنلۇققا ئۈچۈراش دەرىجىسى ۋە تۈرىگە ھەممە بىمارنىڭ بۇ دورىغا بولغان چىدامچانلىقىغا ئاساسەن دورا مىقدارى ۋە دورا بېرىش شەكلىنى بېكىتىپ، يەككە تەنھە بويىچە دورا بېرىلىدۇ. ئادەتتىكى مىقدارى ھەر قېتىمدا

600mg ~ 200، كۈنگە 3 ~ 2 قىتىم ئىچىلدۇ. كۈنگە ئىككى قىتىم ۋېناغا تېمىقاندا، ھەر قىتىمدا 400mg ~ 200، 180min ~ 90 تا تېمىتىش تمامالىنىدۇ. 24h ئىچىدىكى مىقدارى 1200mg 12 دىن ئاشۇرۇلمايدۇ.

【ناچار تەسىرى】 يۈز قىسى قىزىرىش، ئاشقازان - ئۇچىي يولى يېقىمىزلىنىش كۆپ كۆرۈلىدۇ؛ يۈرەك رىتىمىزلىقى ئاز كۆرۈلىدۇ، بەدەن قىچىشىش، قىزىرىش، يەلتاشما ۋە ئېغىر ئاللىپرگىلىك تاسادىپىي كۆرۈلۈپ قالىدۇ؛ يۈرەك سانجىقى، قان بېسىم تۆۋەنلەش، تېرىه، شىلىق پەرەد ۋە ئاشقازان - ئۇچىي يولى قاناش ناھايىتى ئاز كۆرۈلىدۇ؛ ئاز بىر قىسىم بىمارلاردا قان پلاستىنکىلىرى كېمىيىش كېسىلى كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقتە قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەئىي قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: پېنتوكسافىللەن (己酮可可碱) ، باشقا مېتىل كىسانتن (甲基黄嘌呤) ياكى ھەر قانداق بىر قويۇقلاتۇچى تەركىبىگە زىيادە سەزگۈرلەرگە، قان كۆپ چىقىپ كەتكەنلەرگە، كۆرۈش تور پەردىسى كەڭ دائىرىدە قانىخانلارغا ئىشلىتىش چەكلەنىدۇ. ② باشقىلار: جىڭەر فۇنكىسييسى ئېغىر دەرىجىدە زەخىملەنگەنلەرگە يەككە تەنلەرنىڭ چىداماچانلىقى بويىچە دورا مىقدارىنى ئازايىتىش لازىم؛ تۆۋەن قان بېسىمنى بۇ دورا بىلەن داۋالىغاندا چوقۇم كىچىك دوزىدىن باشلاپ، دورا مىقدارىنى تەدرىجىي ئاشۇرۇش لازىم؛ ئاللىپرگىلىك رېتاكسىيە پەيدا بولغاندا دورىنى چوقۇم توختىتىش ھەمدە دوختۇرغا خەۋەر قىلىش لازىم؛ ئېغىر دەرىجىدىكى يۈرەك رىتىمىزلىقى بارلار، يۈرەك مۇسکۇل تىقىلىمىسى بارلار، قان بېسىمى زىيادە تۆۋەن بولغانلار، بۆرەك فۇنكىسييسى زەخىملەنگەنلەر، كېۋەتلىنىڭ چىقىرىلىش نسبىتى 30ml/min دىن تۆۋەنلەر، جىڭەر فۇنكىسييسى ئېغىر دەرىجىدە زەخىملەنگەنلەر، قاناش خاھىشى ئېغىر بولغانلارغا بولغان كۆزىتىشنى ئالاھىدە كۈچىتىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 تېرىپتال گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. ئاستا تەسىرلىك شېكەر ياللىغان تابلىتى: تابلىت/400mg، بوتولكى/100 تابلىت؛ ئوكۇلى: ھەر ئامپۇلى 300mg/15ml، قاپ/10 ئامپۇل.

پېنتومېر گېرمانىيە ئىشلەنگەن. ئاستا تەسرىلىك تابلىت، تابلىت/400mg، قاپ/20 تابلىت، ئوكۇلى: ھەر ئامپۇلى 100mg/5ml، قاپ/5 ئامپۇل.

شانتىنول نيكوتينات (尼可占替诺，Xanthinol Nicotinate)

【باشقى نامى】 ۋېدرىن (脉栓通，Vedrin)
【ئاساسىي تەركىبى】 پروكسىفللن نيكوتينات (羟丙茶碱烟酸酯).
【فارماكولوگىيلىك ۋالاھىدىلىكى】 بۇ، كىچىك ئارتىرىيە سىلىق مۇسکۇللىرىغا تەسىر قىلىدىغان ئەتراپ قان تومۇرلارنى كېڭىتىكۈچى دورا. قان تومۇرلارنىڭ سېاز مىلىنىشىنى يوقىتىدۇ؛ نېرۋا ئاخىرقى ئۇچلىرىنىڭ قارشىلىق كۈچىنى ئازىيتىدۇ؛ ئوكسىگېنىنىڭ توقولمىلارغا ئىشلىتىلىشىنى ئاشۇرىدۇ؛ تالا ئاقسىلىنى ئېرىتىدۇ، قان نۆكچىسى قايىتا شەكىللەنىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ؛ خولېستېرىن ۋە ترىگلىتسېرىد (三酰甘油) نىڭ مقدارىنى كۆرۈنەرلىك تۆۋەنلىكتىدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 يۈرەك تاجىمان ئارتىرىيىسىدىكى قان ئايلىنىشنىڭ توسۇنلۇققا ئۇچرىشىغا ئىشلىتلىدۇ، مەسىلەن: تاجىمان ئارتىرىيە قېتىش، يۈرەك سابىقى قاتارلىقلار، ئەتراپ ئارتىرىيىلىرنىڭ قان ئايلىنىشى توسۇنلۇققا ئۇچراش، مەسىلەن: رايىناۋۇد كېسىلى، ئارىلاپ ئاقساش كېسىلى، دىئاپت كېسىلەن بولغان گانگىرپىنا، قان نۆكچىسى كېپلەشكەن ۋېپىنالىڭىنى ياللۇغى، ئەتراپ قان تومۇرلاردا نۆكچە شەكىللەنىش قاتارلىقلار؛ مېتابولىزم قالايمىقانلىشىش، مەسىلەن: قان يېخى كۆپىيپ كېتىش، قاندا خولېستېرول كۆپىيپ كېتىش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىش تۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 2 ~ 1 تال ئىچلىدۇ. مۇسکۇلغَا ئوكۇل قىلغاندا، كۈنگە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 2 ~ 1 ئامپۇل ئوكۇل قىلىنىدۇ، ۋېناغا ئوكۇل قىلغاندا كۈنگە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 2 ~ 1 ئامپۇل ئوكۇل قىلىنىدۇ. ۋېناغا تېمىتقاندا، ھەر قېتىمدا ئىككى ئامپۇل 2h تېمىتىلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى:

بۇ دورا نېرۋا ئۆتكۈزۈشىنى تورمۇزلىخۇچى دورىلار بىلەن بىرلا ۋاقتىتا ئىشلىتىلمىدۇ. ② مەئى قىلىنىدىغان ئەھۇاللار: ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك قاناش، يۈرەك مۇسکۇل تقلىمىسى، كومپېنسაسيلىك ئىقتىدارنى يوقانقان يۈرەك فونكىسىسى تولۇق بولمىغان ئەھۇالدا ئوکۇلىنى ئىشلىتىش مۇۋاپق ئىمدى. ③ باشقلار: بەزىدە بۇ دورىنى ئىشلىتىشكە باشلىغاندا، تېرىلىر قىزىرىپ چىقىش ئەھۇاللىرى كۆرۈلدۈ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ۋېدىرىن ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن.
تابلىپتى: تابلىپتى/150mg، قاپ/30 تابلىپتى؛ ئۆكۈلى: ئامپۇل/300mg،
قاپ/10 ئامپۇل.

مىدو درىن (米多君, Midodrine)

【باشقى نامى】 گۈترون (普通, Gutron).

【ئاساسىي تەركىبى】 مىدو درىن ھيدروخلورид.

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ئەتراب قان تومۇرلاردىكى $t_{1/2}$ - ئاكسېپتۇرغا تاللاش خاراكتېرىلىك تەسىر كۆرسىتىش مېخانىزىمغا ئىگە بولۇپ، β - ئاكسېپتۇرنى قوزغاتىمایدۇ. ئىچكەندىن كېيىنكى بىئولوگىيىلىك پايidalىنىش دەرجىسى %93 گە يېتىدۇ، $t_{1/2}$ 3h گە يېتىدۇ، ئىنچىكىه ئۈچەي دۇزارىدا مېتابولىزملەنندۇ، ئاساسلىقى سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ:

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكلىكەر】 يۈرەك قان تومۇرلارنىڭ تەڭشەش ئىقتىدارى قالايسقانلىشىنى داۋا لاشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆرە تۈرۈشتىن بولغان تۆۋەن قان بىسىم، بەدهن تۈرقى خاراكتېرىلىك تۆۋەن قان بىسىم، سىمپيتوملۇق ۋە كىلىماتقا سەزگۈرلىكتىن بولغان تۆۋەن قان بىسىمغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش مۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار ۋە بالا گەيدىكەن بىمارلار ھەر كۈنى ئەتىگەن، كەچتە بىر قېتىمدىن، ھەر قېتىمدا بىر تالدىن ئىچىدۇ. ئالاھىدە ئەھۇالدا ئەھۇالغا قاراپ ئىشلىتىلىدۇ. بالىلارغا دورا مىقدارى بەدهن ئېغىرلىقىغا قاراپ ھېسابلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 يۈرەك رىتىمىسىزلىقى، يۈرەك ئالدى رايونى

ئاغريش ۋە تېرى رېئاكسىيىسى ئاز كۆرۈلدۈ. مىقدارى كۆپ بولغاندا موبىلار تىكلىنىش رېئاكسىيىسى يەنى توخۇئەت ئۆرلەش، ئۆزىنى توڭلۇخانىدەك سېزىش ۋە سۈيدۈك يىخىلىپ قېلىش كېلىپ چىقىشى ھەمدە تومۇر سوقۇشى منۇتىغا 60 قېتىمىدىن تۆۋەنلەپ كېتىشى مۇمكىن.

【دېقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار:

يۇقىرى قان بېسىمى، خروم خۇمار ھۇجىرە ئۆسمىسى، ئۆتكۈز خاراكتېرىلىك بۇرەك ياللۇغى، بۇرەك فۇنكىسييىسى ئېخىر دەرىجىدە توسقۇنلۇققا ئۇچراش، گلاۋكوما، مەزى بېزى يوغىناشقا ئەگىشىپ كەلگەن سۈيدۈك يىخىلىپ قېلىش، مېخانىك سۈيدۈك توسلۇش، قالقابىز خىزمىتى كۈچىيىپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: ئۇزۇن مەزگىل دورا ئىشلەتكۈچلىرنىڭ بۇرەك فۇنكىسييىسىنى تەكشۈرۈپ تۇرۇش، يۇقىرى قان بېسىم تارىخى بارلارغا دورا مىقدارىنى قاتىق كوتىرول قىلىش لازىم؛ ئورگان خاراكتېرىلىك ئېخىر دەرىجىدىكى يۇرەك ئۆزگىرىشى، يۇرەك قان تومۇر كېسىللەكلىرى ياكى يۇرەك رىتىمىسىزلىقى ۋە بۇرەك فۇنكىسييىسى تولۇق بولماسىلىقلارغا دورا ئىشلەتكەندە دورا مىقدارىنى تەڭشەشكە دېقىقت قىلىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 گۇترون ئاۋسترىيىدە ئىشلەنگەن.

تابلىپتى: تابلىپ/2.5mg، قاپ/20 تابلىپت.

فېنتولامىن

(酚妥拉明，Phentolamine)

【باشقا نامى】 رېگىتن (利其丁，Regitin)

【ئاساسىي تەركىبى】 فېنتولامىن.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 قىقا ئۇنۇملىك α_1 -ئاكسېپتۈرنى توسقۇچى دورا بولۇپ، α_2 -ئاكسېپتۈرلىرىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ، قاندىكى كاتىخولامىنغا قارشى تەسىرى بولۇپ، قان تومۇرلارنى كېڭىيەتىپ، ئەتراپ قارشىلىق كۈچىنى تۆۋەنلىتىدۇ، قان بېسىمى، ئۆپكە ئارتېرىيە بېسىمىنى تۆۋەنلىتىدۇ؛ يۇرەكىنى غىدىقلاش تەسىرىگە ئىگە بولۇپ، يۇرەك مۇسکۇلىنىڭ قىسىقىرىش كۈچىنى كۈچەيتىپ، يۇرەك سوقۇش قېتىمىنى تېزلىتىدۇ، دالانچە - قېرىنچە

ئۆتكۈزۈشىنى تېزلىتىدۇ، يۈرەكىنىڭ چىقىرىش مىقدارىنى ئاشۇرىدۇ.
【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئەتراب قان تومۇرلار سپازمىلىنىشتىن بولغان كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلدى. ئۆتكۈر، سوزۇلما قان تولۇش خاراكتېرىلىك يۈرەك زەئىپلىشىنى داۋالاپ، يۈرەكىنى يۈكىنى يېنىكلىتىدۇ؛ يۇقۇمىنىش خاراكتېرىلىك، يۈرەك مەنبىلىك ۋە نېرۋا خاراكتېرىلىك شوکنى داۋالاشتا ھەممە خروم خۇمار ھۇجىيرە ئۆسمىسىگە دىئاگنوز قويۇشتا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 قان تومۇرلار سپازمىلىنىشتىن بولغان كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا: ھەر قېتىمدا 5mg، كۇنىگە 2 ~ 1 قېتىم مۇسکۇلغا ياكى ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، شوڭقا قارشى تۈرۈشتى 0.3mg/min ۋېناغا تېمىتىلدى، خروم خۇمار ھۇجىيرە ئۆسمىسىگە دىئاگنوز قويۇشتا ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، چوڭلارغا ھەر قېتىمدا 5mg، باللارغا ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 0.1mg ئوكۇل قىلغاندىن كېيىن، قان بېسىمى ھەر 0.5min تا بىر قېتىمدىن جەمئىي 10min ئۆلچىنىدۇ. يۈرەك زەئىپلىشىشكە ئىشلەتكەندە 30mg ~ 15 ۋېناغا تېمىتىلدى.

【ناچار تەسىرى】 ئۆرە تۈرۈش خاراكتېرىلىك تۆۋەن قان بېسىمى، يۈرەك ھەرىكىتى زىيادە تېزلىشىش، يۈرەك رىتمىسىزلىقى، يۈرەك سانجىقى، ئىچ سۈرۈش، كۆڭۈل ئېلىشىش، بۇرۇن پۇتۇپ قېلىش، تېرە قىزىرىپ قېلىش قاتارلىقلار دائمى كۆرۈلەندى.

【دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: يۈرەكىنى كۈچىتىكۈچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە، زەھەرچانلىقى كۈچىبىدۇ، تۆمۈر ياسالىمىسىغا قوشۇپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: تۆۋەن قان بېسىمى، ئارتىپىيە ئېغىر دەرىجىدە قېتىش، يۈرەك سانجىقى، يۈرەك مۇسکۇل تىقلىمىسى، ئاشقازان ۋە 12 بارماق ئۈچەي يارسىغا ئىشلىتىش چەكلەندى. ③ باشقىلار: شوڭقا قارشى داۋالاشتىن ئىلگىرى چوقۇم قان سىخىمچانلىقىنى تولۇقلاش كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 رېگىتىن شۇپىتىسارىيىدە ئىشلەنگەن: ئۆكۈلى: ھەر ئامپۇلى ئامپۇل/10mg/ml، قاپ/5 ئامپۇل.

ھ 5 . قان بېسمنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلار

ۋېرآپامىل (维拉帕米， Verapamil)

· 戊脉安 · 诺富生 (异搏定 Isoptin) ·

. Veraloc · Anpec · Novopressan

【ئاساسىي تەركىبى】 ۋېرآپامىل ھيدروخلورىد.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىك】 كالتسي ئىئونى بىلەن قارشلاشقۇچى دورا بولۇپ، كالتسي ئىئوننىڭ سىنۇس دالانچە توگۇنى قاتارلىق ئاستا ئىنكا سلىق ھۈجىرە ئىچىگە كىرىشنى ئاللاش خاراكتېرىلىك تىزگىنلەيدۇ، سىنۇس دالانچە توگۇنى، دالانچە، قېرىنچە توگۇنىنىڭ ئۆزى ئىزگىنلەش خۇسوسىيەتىنى ئاجىزلىتىدۇ. يۈرەك مۇسکۇلىنىڭ قىسىقىش كۈچىنى ئاجىزلىتىپ، ئوكسىگېن سەرىپىياتىنى تۆۋەنلىتىدۇ، شۇنىڭدەك تاجسىمان ئارتىرىيە ۋە ئەتراپ قان تومۇرلارنى كېڭىيتسىش، قان بېسمنى سۇس تۆۋەنلىتش رولىغا ئىنگ. ئىچكەندە ياخشى سۈمۈرۈلدۈ.

$T_{max} \sim 3 \text{ غىچە بولىدۇ.}$

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كىسىللەكلىر】 دالانچە خاراكتېرىلىك مۇددەتتىن بالدۇر سوقۇش ۋە قېرىنچە ئۇستى مەنبېلىك يۈرەك ھەرىكتى زىيادە تېزلىشىشكە ئىشلىتىلدى، يۈرەك سانجىقى، قېلىنلاشقان يۈرەك مۇسکۇل كېسىلى، يېنىك، ئوتتۇرا دەرىجىدىكى يۇقىرى قان بېسمنى قاتارلىقلارغىمۇ ئىشلىتىلدى، ۋىناغا ئوكۇل قىلىش ئارقىلىق قېرىنچە ئۇستى مەنبېلىك تۇتقاقلىق يۈرەك ھەرىكتى زىيادە تېزلىشىنى توختىشقا بولىدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 40mg كۈنگە 3 قېتىم ئىچىلىدۇ. ئاستا تەسىرلىك تابلىقى كۈنگە بىر قېتىم، 240mg ~ 120 ئىچىلىدۇ. بالىلارنىڭ مىقدارى: ئىككى ياشتنى تۆۋەنلەرگە ھەر قېتىمدا 20mg، كۈنگە 3 ~ 2 قېتىم ئىچىشكە بېرىلىدۇ.

『ناچار تەسىرى』 كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، قۇزىيەت، يۈرەك سېلىش، باش قېيش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىسا تۆۋەن قان بېسىمى پەيدا قىلىدۇ، يۈرەك ھەرىكتى زىيادە ئاستلاش، سىنۇس دالانچە توسوْلۇش، ॥ دەرىجىلىك ياكى ॥ دەرىجىلىك دالانچە - قېرىنچە ئۆتكۈزۈشى توسوْلۇش قاتارلىقلار تاسادىپىي كۆرۈلۈپ قالىدۇ.

『دىققەت قىلىنىدىغان ئىشلار』 ① دوربىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ٣ - ئاكىپېتۈرنى توسوْقۇچى دوربىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە تۆۋەن قان بېسىمى، يۈرەك ھەرىكتى زىيادە ئاستلاش، ئۆتكۈزۈشى توسوْلۇش، ھەتتا يۈرەك سوقۇشى تۈيۈقىسىز توختاپ قېلىش كېلىپ چىقىدۇ؛ دىگىتالىس بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە دىگىتالىسىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ، باشقا يۈرەك رىتمىسىزلىقىغا قارشى دوربىلار، پۇرتىپ ناركوز قىلىش دوربىلىرى، مۇسکۇللارنى بوشاقۇچى دوربىلار، كاربامازبېسىن (卡马西平)，لىتىمىي تۆزلىرى، ريفامپين (利福平) لار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە ئېھتىيات قىلىش لازىم. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: يۈرەك ئېغىر دەرىجىمە زەئىپلىشىش، يۈرەك مەنبىلىك شوک، ॥ ياكى ॥ دەرىجىلىك دالانچە - قېرىنچە ئۆتكۈزۈشى توسوْلۇش، سىنۇسلۇق يېخىندى ئالامەتلەر، ئېغىر دەرىجىدىكى قان بېسىم تۆۋەنلىك، ۋۇل - پاركىنسون - ۋىت سىندرومىغا ئەگىشىپ كەلگەن يان يول ئالدىدىن ئايلىنىش تىپلىق قايتىش خاراكتېرىلىك يۈرەك ھەرىكتى زىيادە تېزلىشىش، بولۇپىمۇ دالانچە تىترەش قوشۇلۇپ كېلىش، دالانچە تەۋەرەشلەرگە ئىشلىتىش چەكلەنندۇ. ③ باشقىلار: يۈرەك ھەرىكتى زىيادە ئاستلاش، جىڭىر، بۆرەك فۇنكسييىسى زەخىملىنىش، يېنىك، ئۆتتۈرە دەرىجىدىكى تۆۋەن قان بېسىمى، كاناچە زىققىسى بىمارلىرى ۋە ھامىلىدارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ، ۋېناغا ئوكۇل قىلىش دەۋرئىتى بىك تېز بولۇپ كەتمەسىلىكى كېرەك، ئۇنداق بولمايدىكەن، يۈرەك سوقۇشى تۈيۈقىسىز توختاپ قالىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە يۈرەك رىتىمى ۋە قان بېسىمىدىكى ئۆزگىرىشلەرنى كۆزتىشكە دىققەت قىلىش كېرەك.

『ياسالىمىسى ۋە مۇلچىمى』 ئزوپتن گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. ئاستا تەسىرىلىك تابلىپتى: تابلىپ/10، قاپ/10، تابلىپتى؛ لسوپتن ئادەتتىكى تابلىپتى: تابلىپ/40mg، قاپ/50 تابلىپتى،

قاب/100 تابلېت، تابلېت/80mg، قاب/20 تابلېت، قاب/50 تابلېت.
 ۋېرآپاميل ھيدروخلوريد ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. ئاستا تەسىرىلىك
 تابلېتى: تابلېت/240mg، قاب/7 تابلېت، قاب/10 تابلېت، قاب/20
 تابلېت.

ئۇرآپىدىل (乌拉地尔，Urapidil)

【باشقا نامى】 ۋېبرانتىل (压宁定，Ebrantil)
 【ئاساسىي تەركىبى】 ئۇرآپىدىل ھيدروخلوريد.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ئەتراپ ۋە
 مەركىزگە تەسىر قىلىش ئارقىلىق قوش بىسلىق قان بىسىم تۆۋەنلىتش
 رولىنى ئوينايىدۇ. ئەتراپقا بولغان تەسىرى A_1 - ئاكسىپتۇرنى تۈرمۈزلاش،
 قان تومۇرلارنى كېڭىيەتىش، ئەتراپ قارشىلىق كۈچىنى تۆۋەنلىتشتىن
 ئىبارەت، مەركىزگە بولغان تەسىرى بولسا ئاساسلىقى مېڭە غولىدىكى
 5 — ھيدروكىسد تېپتامىن (羟色胺) — 5) ئاكسىپتۇرنى غىنەقلاش،
 ئۆزۈنچاڭ مېڭىدىكى يۈرەك قان تومۇر مەركىزىنىڭ قايتما ئىنكاڭ
 تەڭشىنى تۆۋەنلىتشتىن ئىبارەت. بۇ دورىنىڭ سۈمۈرلۈشى
 ياخشى، T_{max} ~ 4، ~ 6h جىڭىرە پارچىلىنىپ بۈرەك ئارقىلىق
 چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 ھەر خىل تېپتىكى يۇقىرى
 قان بىسىمغا ئىشلىلىدۇ. مەزى بېزى يوغىناشىقىمۇ مەلۇم دەرىجىدە
 تەسىر كۆرسىتىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنىگە 180mg ~ 30g
 ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ ئىچىلىدۇ. ئادەتتە دەسلەپكى مىقدارى ھەر قېتىمدا
 30mg بولۇپ، كۈنىگە 2 قېتىم ئىچىلىدۇ، كېيىن كېسەللىك ئەھۋالغا
 قاراپ مۇۋاپىق تەڭشىلىدۇ. 25mg ~ 12.5 نى ۋېناغا ئوكۇل قىلىپ، قان
 بىسىم ئۆزگىرىشنى كۆزىتىپ تۇرۇپ 10min ~ 5 تىن كېيىن زۆرۈر
 تېپىلسا يەن 25mg ~ 12.5 ئوكۇل قىلىشا بولىدۇ. ۋېنادىن تېمىتقاندا،
 داۋالاş ئۇنۇمىنى ساقلاش ياكى قان بىسىمنى ئاستا - ئاستا چۈشورۇش
 ئۈچۈن، بۇ دورا ناتريي خلوريد ئوكۇل سۈيۈقلىقى ياكى گلۈكۈزا

ئوكۇل سۇيۇقلۇقىغا قوشۇپ بېرىلىدۇ، تېمىتىش سۇرئىتى ئادەتتە $400\mu\text{g}/\text{min}$ ~ 100 بولىدۇ. قان تولۇش خاراكتېرىلىك يۈرەك زەئىپلىكى: قان بېسىمى روشن يۇقىرىلىغانلارغا ئالدى بىلەن بۇ دورىدىن 25mg 12.5 نى 10ml ناتىرى خلورىد ئوكۇل سۇيۇقلۇقى ياكى گلۈكۆزا ئوكۇل سۇيۇقلۇقىغا قوشۇپ ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ. ئادەتتىكى ئەھۋالدا ۋېناغا تېمىتىلىدۇ، تېمىتىش سۇرئىتى $100\mu\text{g}/\text{min}$ ~ بولىدۇ، كېسەللىك ئەھۋالغا قاراپ مىقدارى ۋە تېمىتىش سۇرئىتى تەڭشىلىدۇ، كۈنىگە بىر قېتىم ياكى 24h ئۇدا ئىشلىتىلىدۇ، داۋالاش مۇددىتى ئادەتتە 6 ~ 3 كۈن بولىدۇ، كېسەللىك ئەھۋالغا قاراپ ئالىتە كۈندىن كۆپ بولسىمۇ بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغىرىش، باش قېبىش، ماغدۇرسىزلىنىش، يۈرەك سېلىش ۋە ئاشقازان، ئۈچەي رېئاكسىسيسى، ئاللىپرگىيلىك رېئاكسىسي، ئۆرە تۈرۈش خاراكتېرىلىك تۆۋەن قان بېسىمى ۋە قان بېسىم زىيادە تۆۋەنلىش كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 هامىلىدار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار، ئائورتا بوغۇزى تارىيىش ياكى ئارتىرىيە، ۋېنا بۆلۈنۈپ ئېقىش قوشۇلۇپ كىلگەن بىمارلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 ئېبراتىلى گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. ئاستا تەسىرلىك كاپسۇل: دانە/ 300mg ، قاپ/ 20 دانە؛ ئوكۇلى: ئامپۇل/ 25mg ، قاپ/ 5 ئامپۇل.

بېتاکسولول (倍他洛尔，Betaxolol)

【باشقى نامى】 كېرلۇن (卡尔仑，Kerlone) 倍他索洛尔，倍他心安，

【ئاساسىي تەركىبى】 بېتاکسولول هىدرۆخلورىد.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 β_1 - ئاكسېپپتۇرنى تاللاش خاراكتېرىلىك تورمۇزلىغۇچى دورا بولۇپ، β_2 - ئاكسېپپتۇرغا تەسىرى يوق دېيدىرىلىك، ئىچكىندىن كېيىن $T_{1/2}$, $4 \sim 6\text{h}$ T_{max} ~ 22h ، دانە 16، تەسىرى 24h ئارتۇق ساقلىنىدۇ.

【مسۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىر】 يۇقىرى قان بېسىمغا

ئىشلىتىلدى، بولۇمۇ ئوتتۇرا ۋە ئېغىر دەرىجىدىكى ئەگەشمە كېسىدلىك بولمىغان ياش يۇقىرى قان بېسم بىمارلىرىغا ناھايىتى ياخشى ئۇنۇم بېرىلىدى.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قىتىمدا 20mg ~ 10 كۈنگە بېرىلىنىش ئىچىلىدۇ، ياشانغانلار ۋە بۆرەك فۇنكسييىسى ئېغىر دەرىجىدە تولۇق بولمىغانلارغا كۈنگە 10mg ئىشلىتىلدى.

【ناچار تەسىرى】 چارچاش، ماغدۇر سىزلىنىش، توت مۇچە سېزىمى بىنورمال بولۇش، ئارىلاپ ئاقساش ئېغىرلىشىلار دائىم كۆرۈلىدۇ، يۇرەك ھەرىكتى زىيادە ئاستىلاش ۋە تۆۋەن قان بېسىمىمۇ كۆرۈلىدۇ، ئېغىر بولغاندا دالانچە - قېرىنچە ئۆتكۈزۈشى توسۇلۇش، كانايچىلار سېازمىلىنىش كېلىپ چىقىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: يۇرەك مەنبىلىك شوڭ ۋە كونترول قىلىنىمىغان يۇرەك زەئىپلىك بارلار، دالانچە - قېرىنچە ئۆتكۈزۈشى توسۇلخانلار، يۇرەك ھەرىكتى زىيادە ئاستىلار ۋە ھامىلىدارلارغا ئىشلىتش چەكلىنىدۇ. ② دىققەت قىلىنىدىغان ئىشلار: مىقدارى كۆپ بولۇشتىن يۇرەك ھەرىكتى زىيادە ئاستىلاپ كەتسە ئاتروپىن ئارقىلىق تۈزىتىشكە بولىدۇ، يۇرەك زەئىپلەشىسى دىگتالىس ۋە سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورىلار بىلەن بېرىتەپ قىلىنىدۇ، تۆۋەن قان بېسىمى ئادرېنالىن بىلەن بېرىتەپ قىلىنىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 كېرلۇن فران西يىدە ئىشلەنگەن. تابلىقى: تابلىپ/10mg، تابلىپ/20mg، تابلىپ/14mg.

ئىنداپامىد

(吲达帕胺，Indapamide)

【باشقا نامى】 寿比山，(纳催离，Natriliix) ، ناتريليكس (Natrilix) ، مىللەبار (Millibar) ، Ipamix، Arifon (美利巴，Millibar) .

【ئاساسىي تەركىبى】 ئىنداپامىد.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 كالمتسي بىلەن قارشىلىشىغان قان بېسىم تۆۋەنلەتكۈچى، سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورىلار تۆۋەن دوزىدا ئىشلىتىلسە ئاساسلىقى قان بېسىمنى تۆۋەنلىتىدۇ. يۇقىرى

دوزىدا ئىشلىتىلسە سۈيدۈك ھەيدەش تىسىرىگە ئىگە بولىدۇ، ئىچكەندە تېز، تولۇق سۈمۈرۈلىدۇ، $t_{1/2} \sim 1h$ $T_{max} \sim 0.5h$ $\sim 18h$ بولىدۇ.
【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەلىكلىرى】 يېنىك، ئوتتۇرا درېجىلىك بىر لەمچى يۇقىرى قان بېسىمى، قان تولۇش خاراكتېرىلىك بۇرەك زەخىملىنىش كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بىدەن سۈيۈقلۈقى يىغىلىپ قېلىشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنىگ بىر قېتىم ھەر قېتىمدا 2.5mg ئىتىگەنلىك تاماقتنىن كېيىن ئىچلىدۇ، قامداش مىقدارى ئىككى كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 2.5mg بولىدۇ، دورا ئىشلىتىپ ئىككى ھەپتىنده ئۇنۇمى كۆرۈنەرىلىك بولىسا، كۈنىگ 5mg نى ئىككى قېتىمغا بولۇپ ئۇدا 6 ~ 4 ھەپتە ئىچسە بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغىرش، باش قېيش، ئۇيقوسىزلىق، چارچاش، كۆڭۈل ئېلىشىش، ئىچ سۈرۈش، ئەسوھ چىقىش، قىچىشىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنىق قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: مېڭە قان تومۇر كېسىلى بارلار، بۇرەك فۇنكىسىسى ئېغىر دەرىجىدە زەئىپلەشكەنلەر، ھامىلدارلار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلەنىدۇ. ② باشقىلار: سۇلغانلىمىدلار (გა زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بارلاردا ئاللىرىگىلىك رېئاكسىيە پەيدا قىلىشى مۇمكىن؛ كالىي تۆۋەنلەرنىڭ قېنىدىكى كالىينى تەكشۈرۈپ تۇرۇش لازىم؛ β - ئاكسېپتۈرنى توسقۇچى دورىلار، بۇرەكىنى كۆچەيتىكۈچى دورىلار، قان ئۇيۇشقا قارشى دورىلار، قاندىكى شېكەر مىقدارىنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلار، دىئازپىام (安定) قاتارلىق دورىلار بىلەن بىر لەشتۈرۈپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ناتريلكس فرانسييىدە ئىشلەنگەن. تابلىتى: تابلىت 2.5mg.

بۇنازوسن ھىدروخلورىد (盐酸布纳唑嗪，Bunazosin Hydrochloride)

【باشقا نامى】 دېتانتو (迪坦妥, Detanto).

【ئاساسى تەركىبى】 بۇنازوسىن ھىدروخلورىد.
【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ، α_1 - ئاكسيپتورنى تاللاپ تورمۇزلىخۇچى دورا بولۇپ، α_2 - ئاكسيپتورغا تىسىرى يوق دېيدىلىك، شۇڭا سىمپاتىك نېرۋا ئۇچىنىڭ كاتېخولامىن قويۇپ بېرىشتن ئىبارەت تەتۈر قايتما تەسىرىنى تورمۇزلىمايدۇ، يۈرەك سوقۇش قېتىم سانى ۋە يۈرەكنىڭ چىقىرىش مىقدارىنى ئاشۇرۇۋەتىمەيدۇ. T_{max} ، $2ht_{1/2}$ ، جىڭىرە پارچىلىنىپ، گەندە ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.
【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 بىرلەمچى يۇقىرى قان بىسىم، بۇرەك مەنبەلىك يۇقىرى قان بىسىم ۋە خروم خۇمار ھۇجدىرە ئۆسمىسى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يۇقىرى قان بىسىمغا ئىشلىتىلىدۇ.
【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 دەسلەپكى مىقدارى كۈنگە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 0.5mg بولۇپ، تاماقتنى كېسىن ئىچىلىدۇ، كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ تەدرىجىي ھالدا ھەر قېتىمدا 2mg كۆپەيتىلىدۇ، كۈنگە $3 \sim 2$ قېتىم بولۇپ، كۈنلىك ئىڭ يۇقىرى مىقدارى 12mg دىن ئاشۇرۇۋەتلىمەيدۇ.
【ناچار تەسىرى】 باش قېيىش، باش ئاغرىش، يۈرەك سېلىش، ئۇيقوسراش، ئاشقاران، ئۇچىي يېقىمىزلىنىش، بۇرۇن پۇتۇپ قېلىش، يۈزى قىزىرىش، تۆۋەن قان بىسىمى قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.
【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر، ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار ۋە بالىلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: جىڭىر، بۇرەك فۇنكىسىسى چېكىنگەنلەرگە ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.
【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 دېتانتو ياپۇنىيەدە ئىشلەنگەن.
 تابلىپتى: تابلىپتى/ 0.5mg ، تابلىپتى/ 1mg ، تابلىپتى/ 3mg .

لاتسىدىپىن (拉西地平, Lacidipine)

【باشقا نامى】 لاتسىپىل (乐息平, Lacipil)
【ئاساسى تەركىبى】 لاتسىدىپىن.
【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ بىر يېڭى تېپتىكى

پېرىدىن (毗啶) تۈرىدىكى كالتسىي بىلەن قارشلاشقۇچى دورا بولۇپ، قان تومۇر سىلىق مۇسکۇلىنى بوشتىشا يۇقىرى تاللاشچانلىققا ئىگە. قىسىرىش بېسىمى، كېڭىيىش بېسىمى، ئارتىرىيىنىڭ ئوتتۇرپە بېسىمىنى تۆۋەنلىتىدۇ، يۇرەك سوقۇش قېتىمىنى سەل ئاشۇرىدۇ. ئىچكەندە ياخشى سۈمۈرۈلىدۇ، ئەمما دەسلەپكى ئۇنۇمى كۆرۈنرلەك بولۇپ، دورا بېرىلگەندىن كېيىن T_{max} 3h بولىدۇ.

«مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللەكلەر» بىرلەمچى ۋە بۇرەك مەنبىلەك يۇقىرى قان بېسملارنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ؛ يۇرەك سانجىقىنىڭ قوزغىلىش قېتىمىنى ۋە نىتروگلىتىپېرنىنىڭ ئىشلىتىلىش مىقدارىنى ئازىيتىدۇ؛ يۇرەكنى كۈچىتىكۇچى ۋە سۈيدۈكە هەيدىگۈچى دوربىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە يۇرەك زەئىپلىشىش ئالامەتلەرى ۋە يۇرەك فۇنكسييىسى ياخشىلىنىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا $8\text{mg} \sim 4\text{ ئىچىلىدۇ، ياشانغانلارنىڭ دەسلەپكى مىقدارى } 2\text{mg بولۇپ، كۈنگە بىر قېتىم ئەتىگەندە ئىچىلىدۇ.}$

【ناچار تەسىرى】 يۈز قىسىمى قىزىرىش، باش ئاغىرىش، باش قېشىش، يۇرەك سېلىش، ئوشۇق قىسىمى سۇلۇق ئىشىش، ئاشقازان، ئۈچىي يېقىمىزلىنىش كۆرۈلىدۇ.

【دېقىقتە قىلىدىغان ئىشلار】 ① دوربىلار بىلەن بولغان تەسىرى: سىمىپتىدىن (甲氯咪胍) بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە بۇ دورىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقى ئارتىدۇ. ② مەنىنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: تۆغما يۇرەك كېسىلىگە قوشۇنۇپ كەلگەن يۇرەك ۋە جىڭىر فۇنكسييىسى تولۇق بولىغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 لاتسپىل ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى 2mg ، تابلىپتى 4mg ، قاپ/7 تابلىپتى.

ئاملوودىپىن (氨氯地平，Amlodipine)

【بىلقا نامى】 نورۋازاك (Istin, 安洛地平, 阿莫洛地平, (洛活喜, Norvasc)
【ئاساسىي تەركىبى】 ئاملوودىپىن بېنزوسلوفونات.

【فارماکولوگیسلیک ٹالاہیدیلیک】 پېڭى تېپتىكى دېھىدروپېرىدىن (二氢毗啶) تۇرىدىكى ئۇزۇن ئۇنىۋەملۇك كالتسىي بىلەن قارشلاشقاچى دورا بولۇپ، ئاكسىپېتىر بىلەن بىرىكىش ۋە پارچىلىنىش سۈرئىتى بىر قىددەر ئاستا، تەسىرى كېچىكىپ كۆرۈلدۈ ھەم ئۇزۇنخېچە داۋام قىلىدۇ، قان تومۇر لارغا بولغان تاللاشچانلىقى نىفېدىپىن (硝苯地平) دىن يۇقىرى. باشقا قارشلاشقاچى دورىلارغا ئوخشىمايدىغان يېرى، يۈرەك مۇسکۇلىنىڭ ئۆتكۈزۈشى ۋە قىسىقىرىشغا تەسىرى يوق، رېبلىكىلىق يۈرەك ھەرىكىتى زىيادە تېزلىشىش پەيدا قىلمايدۇ. ئىچكىننە سۈمۈرلۈشى ئاستا بولىدۇ، $t_{1/2} = 8 \sim 12\text{h}$ $T_{max} = 50\text{h}$ مېتا بولىزىلىنىپ، مېتالزم ھاسلاتىنىڭ كۆپ قىسىمى سۈدىلەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىر】 دەسلەپىكى مىقدارى ھەر قېتىمدا 5mg بولۇپ، كۈنگە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ، كېپىن كېسەللىك ئەھۋاتىغا قاراپ دورا مىقدارى ئاشۇرۇلدۇ ياكى كېمەيتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئوشۇق ۋە يۈز قىسىمدا يېنىك دەرىجىدە سۈلۈق ئىششقىق، يۈز قىزىرىش، باش ئاغرىش، باش قېيىش ۋە ئاشقازان، ئۇچەي رېڭىسىسى دائىم كۆرۈلدۇ.

【دىقىقتى قىلىدىغان ئىشلار】 جىڭەر فۇنكسىيىسى زەخىملەنگە ئەرگە ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 نورۋازاك ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن.

تابلىكتى: تابلىپتى 5mg، قاپ/7 تابلىپتى.

نېفېدىپىن (硝基地平, Nifedipine)

【باشقا نامى】 ئېكودىپىن (艾克地平, Ecodipine)، ئۇندىپىن (乐欣平, Adalat Gitis)، ئادالات گىتىس (拜新同, Unidipine) 心痛定，(乐欣平，Adalat Gitis)

【ئاساسىي تەركىمى】 نېفېدىپىن.

【فارماکولوگىيلىك ٹالاہیدىلىك】 دېھىدرو پېرىدىن تۇرىدىكى كالتسىي بىلەن قارشلاشقاچى دورا بولۇپ، قان تومۇر سلىق مۇسکۇلى ھۈچىرىسىدىكى كالتسىي ئىئۇننىڭ ھۈچىرە ئىچىگە كىرسىنى

تۇرمۇزلاش ئارقىلىق، ئەتراب قان تومۇرىسى ۋە تاجسىمان قان تومۇرىسىنى كېڭىتىپ، قان بېسىمنى تۆۋەتلىتىدۇ، تاجسىمان ئارىپرىيىدىكى قان ئېقىمىنى ئاشۇرىدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 يۈرەك سانجىقى، ھەر خىل تۇردىكى يۈقرى قان بېسىمى ۋە يۈرەك زەئىپلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەرقىتمىدا 10mg 10 دىن كۈننە 4 ~ 3 قېتىم ئېچىلىدۇ، قان بېسىمنى جىددى چۈشۈرۈشكە توغرا كەلگەندە بۇ دورىدىن بىر تابلىپتىنى تىلل ئاستىغا سېلىپ شۇمۇشكە بولىدۇ. يۈرۈلگۈچى ياسالىمىسى، ھەر قىتمىدا 4 ~ 3 قېتىم پۇر كۈلىدۇ (2mg ~ 1.5).

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرش، باش قېيىش، چارچاش، يۈرەك ھەرىكىتى زىيادە ئاستىلاش، ئاشقازان يېقىمىزلىنىش، ئىشتىهاسى نۇرتۇلۇش، قەۋىزىيەت، ئىچ سۈرۈش، ئۆرە تۇرۇش خاراكتېرىلىك تۆۋەن قان بېسىمى قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، ئاندا - ساندا جىڭەرنى زەخىملەندۈرۈدۇ.

【دېقىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنىي قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: ۱) دەرجىلىكتىن يۇقىرى دالانچە - قېرىنچە مۇتكۈزۈشى توسۇلۇش، سىنۇس - دالانچە توسۇلۇشلارغا ۋە ھامىلىدارلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: ئائورتا كlapانى تارايىغان، قان بېسىمى تۆۋەن، جىڭىر، يۈرەك فۇنكسىيىسى تولۇق بولىغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى. دىئاپت كېسىلىگە گىربىتار بولغۇچىلارغا ئىشلىتىلدىغان قاندىكى شېڭەر مىقدارىنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىنىڭ مىقدارى تەڭشىلىدۇ، دورىنى ئۇزۇن مۇددەت ئىشلىتىپ تو ساتتىن توختىتىپ قويۇشقا بولمايدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 ئىكىدەپىن گېرمانانىيە ئىشلەنگەن. ئاستا تەسىرىلىك تابلىپتى: تابلىپتى/20mg، قاپ/10 تابلىپت.

ئۇنىدىپىن ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. تەسىرى كوتىرول قىلىنىدىغان تابلىپتى: تابلىپتى/30mg، قاپ/10 تابلىپت.

ئادالات گىتسىس گېرمانانىيە ئىشلەنگەن. تەسىرى كوتىرول قىلىنىدىغان تابلىپتى: تابلىپتى/30mg، قاپ/10 تابلىپتى، تابلىپتى/60mg، قاپ/10 تابلىپتى.

نیکاردیپین (尼卡地平, Nicardipine)

【باشقا نامى】佩尔，پيردېپين (佩尔地平, Perdipine) .

【ئاساسىي تەركىبى】نیکاردیپین ھيدروخلوريد.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】2 - ئەۋلاد دىھيدروپيردېن

تۇردىكى كالتسىي بىلەن قارشلاشقۇچى دورا بولۇپ، ئارتىرىيە سلىق مۇسکۇلى ھۈچەيرسىدىكى فوسفوڈىپستېرزا (磷酸二酯酶) نىڭ ئاكتېچانلىقىنى تورمۇزلاپ، سىكلىك ئادىبىزىن فوسفات (环磷腺苷) نىڭ قويۇقلۇقىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ، قان تومۇرلارنى كېڭىتىپ، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىدۇ ھەمدە تاجىسمان ئارتىرىيە، مېڭە ۋە يۈرەك قان تومۇرلىرىنى كېڭىتىپ، قان ئېقىمىنى كۆپىتىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە قان تومۇر ئۈچلىرىنىڭ قارشلىق كۈچىنى تۆۋەنلىتىپ، يۈرەك مۇسکۇلىنىڭ ئوكسigen سەرپىياتىنى تۆۋەنلىتىدۇ. بۇ دورا ئاساسلىقى كىچىك ئۈچىيده سۈرۈلدى، 20mg ئىچىلگەندىن كېيىن ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، بۇ دورىنىڭ ئالاھىدىلىكى بولسا قان تومۇر سلىق مۇسکۇلىغا بولغان تىسىرى ئەڭ كۈچلۈك، يۈرەكتى تورمۇزلاش تىسىرى ئەڭ ئاجىز.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىر】 بىرلەمچى يۇقىرى قان بېسىمى، قان يېتىشىمىلىك خاراكتېرىلىك مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرى، يۈرەك مۇسکۇلىغا قان يېتىشىمىلىك ۋە سوزۇلما خاراكتېرىلىك يۈرەك زەئىپلىكىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 دائىملق مىقدارى ھەر قېتىمدا 20mg ~ 10 بولۇپ، كۈنىڭە ئۇچ قېتىم ئىچلىدۇ. مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرىگە ھەر قېتىمدا 20mg؛ يۇقىرى قان بېسىم، يۈرەك سانجىقىغا ھەر قېتىمدا 30mg ~ 10؛ يۈرەك زەئىپلىكىگە ھەر قېتىمدا 20 ~ 40mg كۈنىڭە ئۇچ قېتىم ئىشلىتىلىدۇ. جىددىي يۇقىرى قان بېسىم كېلىگە دائىملق مىقدارى مىنۇتىغا ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 2μg ~ 1 تېمىتىلىدۇ، تېمىتقاندا بىر تەرەپتن قان بېسىمىنى ئۆلچەپ، يەنە بىر تەرەپتن تېمىش سۈرئىتى تەڭشىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئۇدا ئىشلەتكەننە قان زەردابىدىكى بىلىر وېنى، BUN, GOT, GPT لار تاسادىپىي يۇقىرى ئۆرلەپ قالىدۇ. دانىچە ھۇجەيرىلدر كېمىيش، ئاللىپەرگىيەلىك رېئاكسىسيه ئاز كۆرۈلىدۇ؛ ئىشتىماسىزلىق، قورساق ئاغرىش، ئېغىز قۇرۇش، باش ئاغرىش، باش قېمىش، تۆۋەنكى مۇچە سۈلۈق ئىشىش، يۇرهەك ھەربىكتى زىيادە تېزلىشىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: كالتىسى بىلەن قارشلاشقاچى باشقا دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ، قان تومۇرلارنى كېڭىتىكۈچى باشقا دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەننە، تۆۋەن قان بېسىمغا دېققەت قىلىش لازىم. ② مەنى ئىلىنىدىغان ئەھۋالار: باش ئىچى بېسىم يۇقىرىلىغان. ياكى قان توختىمىغانلار، ھامىلىدار ۋە بالا ئېمىتىۋانقان ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: تۆۋەن قان بېسىم، گلاؤكوما، جىڭىر، بۇرەك فۇنکسىيىسى ئېغىز دەرىجىدە تولۇق بولمىغانلارغا ئېھىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 پېردىپن ياپۇنىيىدە ئىشلەنگەن. ئاستا تەسىرلىك كاپسۇلى: دانە/40mg، قاپ/30 دانە؛ ئوكۇلى ئامپۇل/2mg، قاپ/10 ئامپۇل.

كاپتوپرەل (卡托普利，Captopril)

【باشقا نامى】 كاپوتېن (开博通，Capoten)
【ئاساسىي تەركىبى】 كاپتوپرەل.

【فارماکولوگىيەلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ يۇقىرى قان بېسىمغا قارشى تەسىرگە ئىنگ دورا بولۇپ، ئانگىئوتېپنس ئىنۋېرتازا (血管紧张素转换酶) نى تورمۇزلىغۇچى بىر تۈرلۈك ئالاھىدە خۇسۇسىيەتلەك دورا (ACEI)، بۇ يەنە ئالدوستېرون (醛固酮) نىڭ ئاجىرىلىشىنى تورمۇزلاپ، ناتىرىي ۋە سۇ يىخلىپ قېلىشنى ئازايتىدۇ. ئادەتتە بىر قېتىملىق مىقدارى ئىچىلىپ 90min ~ 60 تىن كېيىن ئەڭ كۈچلۈك قان بېسىم تۆۋەنلىتش تەسىرى پەيدا بولىدۇ. ئىچكەننە تېز

سومۇرۇلىدۇ، 24h، 1h Tmax، 3h $t_{1/2}$ دىن ئارتۇق دورا سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىپ كېتىدۇ، دىن ئاز بولىدۇ.

【ئىشلىتىش ٹۇسۇلى ۋە مىقدارى】 يۇقىرى قان بىسىمى كېسىلگە ئىشلىتىلىدۇ. سۈيدۈك ھېيدىگۈچى دورا، دىكتالىس تۇرىدىكى دورىلار ئۇنۇم بىرمىگەن يۇرەك زەئىپلىشىشكىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ٹۇسۇلى ۋە مىقدارى】 دائىملق مىقدارى 25 ~ 50mg بولۇپ، كۈنگە 3 ~ 2 قىتم تاماقتنىن بىر سائەت ئىلگىرى ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 يۆتلل ۋە ھەزىم يولى غىدىقلىنىش ئالامەتلرى كۆرۈلىدۇ، ئاقسىلىق سۈيدۈك، بۇرەك كېسىلى يىغىندى ئالامەتلرى، نېيتىرال دانچە ھۇچىرىلەر كېمىيىش، داغلىق دۆڭچە ئىسۋە قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلۈپ قالىدۇ، ئەمما ھەممىسى دېگۈدەك يېنىك بولىدۇ؛ يۈز قىسىمى قىزىرىش، تەم سېزىمى چېكىنىش، ئاواز چىقىرىش قىيىنلىشىش، سېزىم نورمالسىزلىنىش، يۇرەك ھەرىكتى زىيادە تېزلىشىش، كۆكەك ئاغرىش، يۇرەك سېلىش، يۇرەك مۇسکۇل تىقىلىمىسى، رايىناۋۇد كېسىلى، قان تولۇش خاراكتېرلەك يۇرەك زەئىپلىشىش، GPT يۇقىرى ئۆرلەش، توسلۇش خاراكتېرلەك سېرىقلىق چۈشۈش ۋە ئىككىلەمچى ئۆت سۈيۈقۇقى يىخلىپ قىلىش قاتارلىقلار ئاز كۆرۈلىدۇ؛ قان بىسىمى ۋاقتلىق تۆۋەنلەش ھەمدە يېنىك ھەم قىسقا مۇددەتلەك باش قېبىش قوشۇلۇپ كېلىشى مۇمكىن.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: بۇ دورا قاندىكى كالىينى يۇقىرىلىتىشى مۇمكىن، شۇڭا ئاتىستېرون (安体舒通)، ترىئامستېرىن (氨苯喋啶)، ئامىلورىد (阿米洛利) قاتارلىق كالىينى ساقلاپ، سۈيدۈك ھېيدىگۈچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىشىن ئېھتىيات قىلىش لازىم. ② مەنى ئىلىنىدىغان ئەۋالار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ③ باشقىلار: ئىممۇنلىق ئىقتىدارىغا تەسر كۆرسىتىدىغان دورىلار ئىشلىتىلگەنلەر، بۇرەك ئىقتىدارى ئېغىر دەرىجىدە چېكىنگەن ۋە ئۆز بەدەن ئىممۇنلىق كەمچىل بولغانلار، باللار، ھامىلىدارلار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ قان تومۇر مەنبىلىك سۈلۈق ئىشىش ئالامەتلرى بايقالسا، جىددىي بىر تەرەپ قىلىش ھەم دورىنى توختىتىش لازىم؛ ئەگەر

باش ئاغرش، قىزىش قاتارلىق يۈقۈملىنىش ئالامەتلرى كۆرۈلە، ئۆز ۋاقتىدا تەدېر قوللىنىش، ئاق قان ھۈجەيرىسى تۆۋەنلەپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. يۈركى زەئىپلەشكەن بىمارلارنى داۋالىغاندا، ئۇلارنىڭ زىيادە جىسمانى پائالىيەت قىلىشنى توسوش، بىدەن سۈيۈقلۈقى كېمىيپ، قان بىسەم تۆۋەنلەپ كېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن تەرلەش، ئىچ سۈرۈش، قۇسۇش قاتارلىقلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم.
【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 كاپوتىن ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن.
 تابلىپتى: تابلىپتى/12.5mg ، قاپ/20 تابلىپتى، قاپ/100 تابلىپتى،
 تابلىپتى/25mg ، قاپ/10 تابلىپتى، قاپ/50 تابلىپتى.

لىزىنۇپريل (赖诺普利，Lisinopril)

【باشقىا نامى】 داپريل (Dapril) ، 诺普顿 (麦道心宁，Dapril) ، زېستريل (利压定，Zestril) ، 麦通心宁 (捷赐瑞，Zestril)
【ئاساسىي تەركىبى】 لىزىنۇپريل دەھىدرات.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ ACEI تۈرىدىكى دورا بولۇپ، ئىچكەندە ئوڭاي سۈمۈرۈلدۈ، دورىنى ئىچىپ 2h ئىچىدە ئۇنىمى كۆرۈلۈدۈ، 12h $t_{1/2}$ ~ 4 ، 6h Tmax، بىدەنگە كەڭ تارقىلىدۇ، قان پلازا ئاقسىلى بىلەن بىرىكىمەيدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەز】 بىرلەمجى يۈقىرى قان بېسىمى ۋە بۇرەك مەنبەلىك يۈقىرى قان بېسىمغا ئىشلىتىلىدۇ، قان تولۇش خاراكتېرىلىك يۈرەك زەئىپلەشىشىمۇ داۋالايدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 هەر قېتىمدا 10mg ، كۈنگە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىشلىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش قېيىش، باش ئاغرش، ئىچ سۈرۈش، يۈرەك سېلىش، كۆكىرەك ئاغرش ۋە زىققە قاتارلىقلار ئاز كۆرۈلۈدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىخا زىيادە سەزگۈزۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدى. ② باشقىلار: ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋانقان ئاياللار، بالىلار ۋە بۇرەك ئىقتىدارى ئېغىر

دەرىجىدە زەخىملەنگەنلەرگە ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ ئىگەر قان بېسىم تۆۋەنلەش كۆرۈلسە، بىمار تۇز ياتقۇزۇلىدۇ، زۆرۈر تېپلىغاندا ۋېنادىن فىزئولوگىيلىك تۇز سۇبى بېرىلىدىۇ ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويچە دورا مقدارى تەشىلىدۇ؛ بۇرەك فۇنكسييىسى ۋە قاندىكى كالىي مقدارى قەرەللەك تەكسۈرۈپ تۇرۇلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 داپريل سېپرۇستا ئىشلەنگەن.

تابلىت/5mg، تابلىت/10mg، قاپ/20 تابلىت، قاپ/30 تابلىت.

زېستىريل ئەنگلىيده ئىشلەنگەن. تابلىتى: تابلىت/5mg، تابلىت/10mg، تابلىت/20mg، قاپ/28 تابلىت.

بېنازېپريل (苯那普利，Benazepril)

【باشقا نامى】 لوٌتنىسنىن (洛汀新，Lotensin)

【ئاساسىي تەركىبى】 بېنازېپريل ھىدرۆخلورىد.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 جىڭىرە ئاكتىپچانلىققا ئىگە ماددا بېنناپولسلا (苯那普利拉) خا ئايلىنىپ، ئانگىوتېنسىن ئىنۋېرتازا (血管紧张素转换酶) نى تورمۇزلايدۇ، قان تومۇرلارنى كېڭىيەتكۈچى بىرادىكىنن (血管舒张剂缓激肽) سۇسلىشىشنى تورمۇزلاش ئارقىلىقىمۇ قان بېسىمنى تۆۋەنلىتش تەسىرىنى جارى قىلدۇرىدۇ. ئىچكەندە تېز سۇمۇرۇلىدۇ، مۇتلق بىئولوگىيلىك پايدىلىنىش دەرىجىسى 27%， قان زەردابىدىكى ئاقسىل بىلەن بىرىكىش نسبىتى تەخمىنەن 95%، $t_{1/2} \sim 11\text{h}$. ئاساسلىقى بۇرەك ۋە ئۆت سۇيۇقلۇق ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 ھەرقايىسى دەۋرىدىكى يۈقرى قان بېسىمى، قان تولۇش خاراكتېرىلىك يۈرەك زەئىپلىشىشكە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 يۈقرى قان بېسىمى: دەسلەپكى مىقدارى 10mg بولۇپ، كۈنگە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ، كېپىن مۇۋاپىق كۆپەيتىشكە بولىدۇ، بۇرەك فۇنكسييىسى زەئىپلىشىش: دەسلەپكى مىقدارى 15mg بولۇپ، كۈنگە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ، بۇ دورىنى يەككە

ئىشلىتىپ قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش ئۇنىمى قانائىتلەنەرلىك بولمىسا، تىئازىدىلىق (噻嗪类) سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورىلار، كالتسىي بىلەن قارشىلاشقاچى دورىلار، β - ئاكسىپپىتورنى تورمۇزلىغۇچى دورىلارنى قوشۇپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ، دەسلەپكى مىقدارى تۆۋەن بولۇشى كېرەك؛ قان تولۇش مەنبىلىك يۈرەك كېپىلىشىش: دەسلەپكى مىقدارى 2.5mg بولۇپ، كۈنگە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرىش، ئۇيغۇسراش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىج سۈرۈش، ئەسۋە چىقىش، قىچىشقاق، يۈز قىزىرىش، تۆۋەن قان بېسىمى، يۈرەك سېلىش، يۆتلىش، نېپەس قىينلىشىش، سىيىش قېتىم سانى كۆپىيىش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ. جىڭىر ياللغى، ئۇت قېيىپ قېلىش خاراكتېرلىك سېرىقلق چۈشۈش، قان تومۇرلار نېرۋا مەنبىلىك سۈلۈق ئىشىش قاتارلىقلار ئىنتايىن ئاز كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقتە قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنىي قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىخا زىيادە سەزگۈرلەر، قان تومۇرلار نېرۋا مەنبىلىك سۈلۈق ئىشىش تارىخى بارلار ۋە ھامىلىدارلارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ② باشقىلار: بۆرەك ئارتىپرىيىسى تارايغان بىمارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ، بۆرىكى زەئىپلەشكەنلەرگە تۆۋەن دوزىدا بېرىلىدۇ؛ ئاز بىر قىسىم بىمارلاردا قاندىكى BUN ۋە قان زەردابىدىكى كېپئاتىننى يۇقىرى ئۆرلىسە، دورىنى توختاقاندىن كېپىن ئۆزلىكىدىن ئەسلىگە كېلىدۇ؛ يۈز قىسىدا سۈلۈق ئىشىشىق پەيدا بولسا دورىنى دەرھال توختىتىپ، قاندىكى كالىيىنى ئۆلچەشكە دىقىقتە قىلىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 لوتنىسىن شۇبىيتىسارىيىدە ئىشلەنگەن. تابلېتى: تابلېت/5mg، قاپ/14 تابلېت.

ئېنالاپريل (依那普利，Enalapril)

【باشقا نامى】 莱定，Renitec，Ripentibek
ئىنۇرورىل (因弗尔，Invoril).
【ئاساسىي تەركىمى】 ئېنالاپريل مالبئات (依那普利马来酸盐).
【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 كارбоوكسیل رادىكالى

(羧基) نى ئۆز ئېچىگە ئالغان ACEI بولۇپ، ئېچىكەندىن كېيىن جىڭىردى ئېنالاپريل كىسلاتسىغا ئايلىنىپ، ئانگىئوتېنسىن ئىنۋېرتازانى كۈچلۈك تورمۇزلايدۇ. ئېچىكەندىن كېيىن تەخمىنەن 60% سۇمۇرۇلمايدۇ، ئاقسىل بىلدەن بىرىكش نىسبىتى 50 ~ 4h Tmax ـ 3، ـ 50% بىسىمى، بۆرەك مەنبىلىك يۇقىرى قان بىسىمى، قان تولۇش مەنبىلىك يۇرەك زەئىپلىشىشكە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 باشلىنىش مىقدارى كۈنگە 5 بولۇپ، 2 ~ 1 قېتىمغا بۆلۈپ ئېچىلىدۇ، بۆرەك فۇنكىسىسى ئېغىر دەرىجىدە زەخىملەنگەنلەرگە كىرىاتىنىنىڭ چىقىرىلىش نىسبىتىگە قاراپ دورا مىقدارى تەڭشىلىدۇ. دائىملىق مىقدارى كۈنگە 20mg ~ 10 بولۇپ، بىر كۈنلۈك ئەڭ يۇقىرى مىقدارى 40mg دىن ئاشۇرۇ ۋېتىلىمەيدۇ. **【ناچار تەسىرى】** باش قېبىش، باش ئاغرىش، ئۇقۇسراش، ئېغىز قۇرۇش، كۆڭۈل ئېلىشىش، يۇرەك سېلىش، دېمى سىقىلىش، يۇتلىش، ئەسمەۋە چىقىش، GOT، GPT يۇقىرىلاش، قان تومۇرلار نېرۋا مەنبىلىك سۇلۇق ئىشلىش قاتارلىقلار كۆرۈلسە، مىقدارى كېمەيتىلىدۇ، ئەگەر ئاق قان ھۇجەيرسى كېمېيىپ كەتسە دورا توختىتىلىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلدەن بولغان تەسىرى: سىمپاتىك نېرۋىنى توسۇقچى دورىلار بىلدەن بىرگە ئىشلەتكەنде ئېھتىيات قىلىش كېرەك؛ β - ئاكىسىپتۇرنى توسۇقچى بىر قىسىم دورىلار بىلدەن بىرگە ئىشلەتكەنده بۇ دورىنىڭ يۇقىرى قان بىسىمىغا قارشى تەسىرى كۈچىسىدۇ؛ كالىينى ساقلىغۇچى سۈيىدۇك ھەيدەش دورىللىرى، كالىي تۇزى ۋە كالىينى ئۆز ئېچىگە ئالغان دورىلار بىلدەن بىرگە ئىشلەتكەنده، قاندا كالىي يۇقىرىلاش كېسىلى پەيدا بولىدۇ، بۇ دورىنى ئىشلەتكەنده ئاق قان ھۇجەيرسى ۋە بۆرەك ئىقتىدارنى قىرەللەك تەكشۈرۈپ تۇرۇش لازىم. ② مەنىئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر ياكى ئىككىلا بۆرەك ئاراپىسى تارايغۇچىلارغا ئىشلىتىلىمەيدۇ. ③ باشقىلار: بۆرەك ئىقتىدارى ئېغىر دەرىجىدە زەخىملەنگەنلەر، بالىلار، ھامىلىدارلار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئېھتىيات بىلدەن ئىشلىتىلىدۇ، قان بىسىمى نورمال يۇرەك زەئىپلىكى بار بىمارلارغا دورا ئىشلىتىلگەندىن كېيىن تۆۋەن قان بىسىمى پەيدا بولسا، دورا مىقدارىنى كېمەيتىش ياكى توختىتىش كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 رېنېتك ئاۋسەترالىيىدە ئىشلەنگەن.
 تابلىتى: تابلىت/2.5mg، تابلىت/5mg، تابلىت/10mg، تابلىت/20mg،
 قاپ/10 تابلىت.

ئاپو - ئېنالاپريل كانادادا ئىشلەنگەن. تابلىتى: تابلىت/2.5mg،
 تابلىت/5mg، تابلىت/10mg، تابلىت/20mg.

ئېنام ھىندىستاندا ئىشلەنگەن. تابلىتى: تابلىت/2.5mg،
 تابلىت/5mg، تابلىت/10mg، قاپ/20 تابلىت.

ئىنۋوريل ھىندىستاندا ئىشلەنگەن. تابلىتى: تابلىت/5mg،
 تابلىت/10mg، قاپ/30 تابلىت.

دېلاپريل (地拉普利, Delapril)

【باشقۇ نامى】 ئادېكۇت (压得克, Adecut)
 【ئاساسىي تەركىبى】 دېلاپريل.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 تەركىبىدە كاربوكسىل
 رادикаلى بولغان ئانگىئوتېنسىن ئىنۋېرتازانى تورمۇزلىغۇچى دورا بولۇپ،
 تەسىرى كاپتوپريل (卡托普利) (卡托普利) (卡托普利) نىڭ 10 ھەسىسىگە باراۋىر كېلىدۇ،
 تەسىرىنىڭ داۋام قىلىش ۋاقتى ئۈزۈن.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللەككەر】 يۇقىرى قان بېسىمى.

【مۇشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 باشلىنىش مىقدارى ھەر
 قېتىمدا 7.5mg بولۇپ، كۈنگە ئىككى قېتىم ئىچىلىدۇ؛ دائىملق
 مىقدارى ھەر قېتىمدا 30mg ~ 15 بولۇپ، كۈنگە ئىككى قېتىم
 ئىچىلىدۇ؛ ئىڭ يۇقىرى مىقدارى كۈنگە 120mg، داۋالاش ئۇنۇمى
 تۇراقلاشقاندىن كېيىن ئەتىگەندە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ، كۈندىلىك مىقدارى
 ياكى بېرىمى ئىشلىتىلىپ قامدەلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش قېيىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش،
 ماغدۇرسىزلىنىش، چارچاش، يۆتلىش، قان بېسىم تۆۋەنلەش، يۈرەك
 سېلىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، زىيادە سەزگۈرلۈك، قان تەكشۈرۈشتە
 نورمالسىز چىقىش، جىڭىر فۇنكىسىسى غەيرىي نورمال بولۇشلار تاسادىپسى
 كۆرۈلۈپ قالىدۇ.

【دېقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دوربىلار بىلەن بولغان تەسىرى: كالىينى ساقلاپ سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دوربىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەننە، قاندىكى كالىينىڭ قويۇقلۇقنى ئۆلچەپ تۇرۇشقا دېقىقت قىلىش لازىم. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈزۈرلەرگە ئىشلىش چەكلەنىدۇ. ③ باشقىلار: بۇرەك فۇنكىسىسى ئېغىر دەرىجىدە زەخىملەنگەنلەر، ئىككىلا تەرمەپ بۇرەك ئارتىرىيىسى تارايغانلار، ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئېتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ بوشلۇقتا مشخۇلات قىلغۇچى خادىمлار، شوپۇرلار ئىشلەتكەننە دېقىقت قىلىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ئادىكۇت ياپونىيىدە ئىشلەنگەن.
تابلىپتى: تابلىپتى 15mg، قاپ/30 تابلىپت.

لوزارتان پوتاسىسيوم (氯沙坦钾，Losartan Potassium)

【باشقا نامى】 كوزاڭار (科素亚，Cozaar) . 洛沙坦，(科素亚，Cozaar)

【ئاساسىي تەركىبى】 لوزارتان پوتاسىسيوم.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 پېپتىدىسىز ئانگىكىوتىنسىن II ئاكسېپتورى AT₁ تېپلىق قارشلاشقۇچى؛ (非肽类) ئاكتېپچانلىققا ئىگە مېتابولىزم ھاسىلاتى بار. بۇ دورا قىسىرىش بېسىمى ۋە كېڭىشىش بېسىمىنى تۆۋەنلىتىپ، سول دالانچە ئەقتىدارىنى ياخشىلایدۇ، ئىچكەنде ئوڭىاي سۈمۈرۈلىدۇ، دەسلەپكى دورا تەسىرى تۈپەيلى، بىئولوگىيلىك پايدايىنىش دەرىجىسى 33% بولىدۇ، Tmax تەخمىنەن 1h، t_{1/2} 2h، جىڭىرە مېتابولىزملىنىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەتكەر】 ئاساسلىقى بىرلەمچى يۇقىرى قان بېسىمغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىش تۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 50mg دىن كۈنىگە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرش، باش قېيىش، نەپەس يولى يۇقۇمىنىش، چارچاش، يۆتلىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، ئۆرە تۇرۇش خاراكتېرىلىك تۆۋەن قان بېسىمى، GPT يۇقىرىلاش ھەمەدە قاندا كالىي

يۇقىرىلاش قاتارلىقلار ئاز كۆرۈلەدۇ؛ قان تومۇر خاراكتېرىلىك سۇلۇق ئىشىق ئىنتايىن ئاز كۆرۈلەدۇ.

【دىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار:

بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر، ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ② باشقىلار: قان سەخىمچانلىقى يېتىشىمگەنلەرde سىمپتوملۇق تۆۋەن قان بېسىمى پېيدا بولىدۇ. جىڭىر فۇنكسييىسى زەخىملەنگەن تارىخى بارلارغا دورا مقدارى كېمەيتىپ بېرىلەدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 كوزائار ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن.

تابلىقى: تابلېت/50mg، قاب/7 تابلېت.

ۋالسارتان (缬沙坦, Valsartan)

【باشقى نامى】 دىئۋۋان (代文, Dioan)

【ئاساسىي تەركىسى】 ۋالسارتان.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 ئانگىئوتېنسىن

ئاكسېپتۇرى بىلەن قارشىلاشقاچى دورا بولۇپ، ئانگىئوتېنسىن ئاكسېپتۇرى بىلەن ئالاھىدە ۋە تاللاش خاراكتېرىلىك بىرىكىش ئارقىلىق قان بېسىم تۆۋەنلىتىش رولىنى ئوينىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىدەر】 يۇقىرى قان بېسىمىغا ئىشلىتىلەدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 80mg كۇنىڭە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ. ئەگەر قان بېسىمى كۆڭۈلدىكىدەك تۆۋەنلىمىسى، 160mg غىچە كۆپەتىلىدۇ ياكى باشقى قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتكۈچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىلىدۇ، مەسىلەن: سۈيدۈك ھەيدىگۈچى دورىلار.

【ناچار تەسىرى】 ئاساسلىقى باش قېبىش، باش ئاغرش، چارچاش قاتارلىقلار كۆرۈلەدۇ. يۆتەل پېيدا بولۇش نىسبىتى ACEI نىڭىكىدىن روشن تۆۋەن بولىدۇ.

【دىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار:

بۇ دورا تەركىبىگە زىيادە سەزگۈرلەرگە، ھامىلىدارلار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ② باشقىلار: بۇرەك ئارتېرىيىسى

تارايغان، بورهك فونكسييسي ئېغىر دەرىجىدە تولۇق بولمىغان، ئۆت سۈيۈقلۈقى مەنبىلىك جىگەر قانقان ياكى ئۆت يولى توسۇلغانلاردا تۆۋەن قان بىسىمى خەترى پەيدا بولۇشى مۇمكىن؛ كالىينى ساقلىغۇچى سۈيدۈك ھېيدەش دورىلىرىنى ياكى كالىي تولۇقلۇغۇچى دورىلارنى ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە تۇلچىمى】 دىئۋان شۇپىتسارىيىدە ئىشلەنگەن.

كაپسۇلى: دانە 80mg، دانە 160mg، دانە، قاپ/7 دانە، قاپ/28 دانە.

§ 6 . قاندىكى ماينى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلار

پراۋاستاتىن (普伐他丁，Pravastatin)

【باشقا نامى】 مېۋالوتىن (Mevalotin) (美百乐镇)

【ئاساسىي تەركىبى】 ناتريي پراۋاستاتىن.

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ئومۇمىي خولېستېرىن ۋە LDL - خولېستېرىنى تۆۋەنلىتىش، HDL - خولېستېرىنى يۇقىرىلىتىش رولىغا ئىگە. ئۇنىڭ تەسىر مېخانىزمى 3 - كاربووكسیل 3 - مېتىل گلۇتاريل كۆئىنزم (HMG - CoA) A (還原酶) رېدوكتازا (羧基-3-甲基戊二酰辅酶 A) تۆرمۇزلاشتىن ئالاھىدە توسمۇپ، خولېستېرىنىڭ سىنتېزلىنىشىنى تۆرمۇزلاشتىن ئىبارەت.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 قاندىكى ياغ كۆپىيپ كېتىش كېسىلى، جەمەتلىك قاندا خولېستېرىن كۆپىيپ كېتىش كېسىلىگە ئىشلىتىلدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار 10mg 10 دن كۈنىگە بىر قېتىم ياكى ھەر قېتىمدا 5mg دن كۈنىگە ئىككى قېتىم ئىچىدۇ، يېشى ۋە كېسەللىك ئالامىتىك قاراپ دورا مىقدارىنى مۇۋاپىق كۆپىيتش ياكى كېمەيتىشكە بولىدۇ، ئېغىر كېسەللىرگە كۈندە 20mg غېچە كۆپىيتشىشكە بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئەسۋە چىقىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش،

قەۋزىيەت، ئىچ سۈرۈش، قورساق ئاغرىش، ئاشقازان يېقىمىزلىنىش قاتارلىقلار كۆرۈلدۈ؛ BUN، GPT، GOT مۇسکۈل ئاغرىش، مۇسکۈل ماغدۇرسىزلىنىش، بۇلاردىن كېلىپ چىقىدىغان بۇركە فۇنكىسييسى زەخىملىنىش قاتارلىقلار ناگاندا كۆرۈلۈپ قالدى.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: فېنوكسى ئاروماتىك كىسلاتا (苯氧芳酸类) تۈرىدىكى ياسالىملىار، ئىممۇنت تورمۇزلىخۇچى دورىلار ۋە نىكوتىن كىسلاتاسى بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، توغرا يوللۇق مۇسکۈل ئېرىش كېسىلى ئوڭاي پەيدا بولىدۇ. ② مەنىنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بارلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: باللار، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار، ھامىلىدارلار ۋە جىڭىر فۇنكىسييسى ئېغىر دەرىجىدە زەخىملەنگەنلەرنىڭ ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ دورا ئىشلىتىشتىن ئىلگىرى، قاندا ياغ كۆپپىش كېسىلى، جەمدەتكى قاندا خولبىستېرىن كۆپپىش كېسىلى ئىكەنلىكىگە ئېنلىق دىئاگنوز قويۇلغاندىن كېيىن دورا ئىشلىتىشنى ئويلىشىش كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 مېۋالوتىن يابۇنىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپت/5mg، قاپ/100 تابلىپت، تابلىپت/10mg، قاپ/100 تابلىپت.

سىمۋاستاتىن (辛伐他丁, Simvastatin)

【باشقا نامى】 زوکور (舒降之, Zocor).

【ئاساسىي تەركىبى】 سىمۋاستاتىن.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ئەسلىدە ئاكتىپچانلىقى يوق لاكتون (内酯) بولۇپ، ئىچكىندىن كېيىن سۈمۈرۈلۈپ ماس ھالدىكى ۋ - كارбоکسیل كىسلاتالىق تۈزۈلۈشىگە ھىدرولىزلىنىدۇ، بۇ، خولبىستېرىن بىلەن بىرىكىشنى ئىلگىرى سۈرۈدىغان HMG-CoA رېدوكتازانى تورمۇزلىخۇچى ياسالىدىن ئىيارەت. ئاساسلىق رولى جىڭىرددە جارى قىلدۇرۇلدۇ، كېيىن ئۆت سۈيۈقلۈقى ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 تاجسىمان ئارتىرىيلىك يۈرەك كېسلىگە قوشۇلۇپ كەلگەن قاندا خولپىستېرىن يۇقىرىلاش كېسىلى، بىرلەمچى قاندا خولپىستېرىن يۇقىرىلاش كېسىلى، هېتپىروزىگوتا كېسىلى (杂合子) جەمەتلەك قاندا خولپىستېرىن يۇقىرىلاش كېسىلى، ئارلاش تىپلىق قاندا ياغ يۇقىرىلاش كېسىلى بىمارلىرى ۋە ھوموزىگوتا (纯合子) جەمەتلەك قاندا خولپىستېرىن يۇقىرىلاش كېسىلى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 قاندا ياغ كۆپىيىش كېسلىگە ئىشلىتىلىدىغان دەسلەپكى مىقدارى كۈننەگە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 10mg بولۇپ، كەچتە ئىچىلىدۇ، مىقدارىنى تەڭشەشكە توغرا كەلسە تۆت ھەپتىدىن كېيىن تەڭشەش كېرەك، ئەڭ يۇقىرى مىقدارى كۈننەگە 80mg بولۇپ، كەچتە بىر قېتىمىدىلا ئىچىلىدۇ. ھوموزىگوتالىق قاندا خولپىستېرىن يۇقىرىلاش كېسلىگە 40mg نى كەچتە بىر قېتىمىدىن ئىچىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ ياكى كۈننەگە 80mg، كۈندۈزى 20mg 20 دىن ئىككى قېتىم، كەچتە 40mg ئىچىلىدۇ. تاجسىمان ئارتىرىيلىك يۈرەك كېسلى بىمارلىرى ھەر كۈنى كەچتە 20mg نى دەسلەپكى مىقدارى قىلىپ ئىچىدى. بۇرەك فۇنكىسييسى ئېغىر دەرجىدە تولۇق بولماخانلارغا ئىشلىتىلىدىغان دورا كۈننەگە 10mg 10 دىن ئېشپ كەتسە ئېھتىيات قىلىش كېرەك.

【ناچار تەسىسى】 قورساق ئاغرش، قەۋىزىيەت، ئاشقازان - ئۇچەي كۆپۈش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، ماغدۇرسىزلىنىش، باش ئاغرش كەم كۆرۈلىدۇ، مۇسکۇل كېسىلى ئىنتايىن ئاز كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: داۋالاش دوزىسىدا ستوكخروما $P_{450}3A_4$ (细胞色素 $P_{450}3A_4$) نى كۆرۈنۈزلىك تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە باشقا دورىلاردىن سىكلوسبورىن (环孢霉素) قاتارلىقلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىسى، توغرا يولۇق مۇسکۇلنىڭ ئېرىش خەتىرىنى ئاشۇرىدۇ؛ تېترارافتفول تۈرى (四氢茶类) دىكى كالتسىينىڭ يولىنى توسقۇچى دورا منوكسىدىل (米贝地尔) بىلەن بىرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② منهنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىدىكى ھەرقانداق بىر تەركىبگە زىيادە سەزگۈرلەر، ھەركەتچان جىڭىر ياللۇغى ياكى چۈشەندۈرگىلى بولمايدىغان GPT نىڭ ئۇدا يۇقىرى كۆتۈرۈلۈشى، ھامىلىدار ياكى بالا ئېمىتىۋانلىقان ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ.

③ باشقىلار: ئاز بىر قىسىم كىشىلەرde GPT يۇقىرىلاش كۆرۈلە، دورا

ۋاقتىلىق ياكى پۇتۇنلىي توختىتلغاندىن كېيىن، GPT ئادەتىه ئاستائىستا داۋالاشتىن ئىلگىرىكى سەۋىيىگە كېلىدۇ؛ باشقا HMG-CoA رېدوكتازانى تورمۇزلىغۇچى دورىلار ئاندا - ساندا مۇسکۇل كېسىلىنى كەلتۈرۈپ چىرىدۇ.
【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 Zocor ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. تابلىقى:
تابلىپتىن 5mg، قاپ/10 تابلىپتى، تابلىپتى/20mg، قاپ/7 تابلىپتى.

فلۇۋاستاتىن (氟伐他丁, Fluvastatin)

【باشقا نامى】 لېسکول (来适可, Lescol)
【ئاساسىي تەركىبى】 فلوۋاستاتىن.
【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ، بىر خىل پۇتۇنلىي سىنتېزلەنگەن سۇغا مايىل خولپىستېرىنى تۆۋەنلەتكۈچى دورا بولۇپ، HMG-CoA رېدوكتازانى رېقاپتىلىك تورمۇزلاپ، ئاساسلىق مېۋالونىك كىسلاتا (3-3,5-二羟戊酸 甲基-3-3) غا ئايلاندۇردى، ئەھۋالدا تىسرى كۆرسىتىدىغان ئورۇن جىڭىر. يېمەك - ئىچىمەك چەكلەنگەن ئەھۋالدا ئىچۈرүسە تېز ھەم تولۇق سۈمۈرۈلدۇ. قان پلازا ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نىسبىتى 98% دىن يۈقرى بولۇپ، ئاساسلىق ئۆت يولى ئارقىلىق چىرىلدى.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 يېمەك - ئىچىمەنى بولمايدىغان قاندا ياغ يۇقىرىلاش كېسىلى بارلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 تەۋسىيە قىلىش مىقدارى ھەركۈنى كەچتە 40mg ~ 20 بولۇپ، بىرلا قېتىمدا ئىچىلىدۇ.
【ناچار تەسىرى】 ھەزمىم قىلىش ناچارلىشىش، كۆڭۈل ئېلىشىش ۋە ئۇيىقۇسىزلىق كۆرۈلدى. جىڭىر فۇنكسييىسى نورمالسىزلىنىش، قورساق ئاغرىش، سۈيدۈك يولى يۇقۇملىنىش ئالامەتلىرى ئاز كۆرۈلدى.
【دېقىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئىئۇن ئالماشتۇرغۇچى رېئاكتىۋ بىلەن بىرىكىس ئۇنۇمىگە تىسرى يېتىدۇ.
رەفامېپىتسىن (利福平) ئىچكەندىن كېيىن، بۇ دورىنىڭ بىئولوگىيلىك

پايدىلىنىش دەرجىسى تۆۋەنلىدۇ. ② مەنىق قىلىنىدىغان ئەھۇالار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر، ھەرىكەتچان جىڭىر ياللۇغى بارلار ياكى چۈشىندۈرگىلى بولمايدىغان GPT ئۇدا يۈقىرىلىغان بىمارلار ۋە ھامىلىدارلارغا ئىشلىتىلمىدۇ. ③ باشقىلار: جىڭىر فۇنكسييىسى تولۇق بولمىغانلار، ھاراقنى كۆپ ئىجىدىغانلار، 18 ياشتنىن تۆۋەن بىمارلارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمسى ۋە ئۆلچىمى】 لېسکول شۇپىتسارىيىدە ئىشلەنگەن.
كاپسۇلى: دانه/20mg، قاپ/7 دانه، دانه/40mg، قاپ/7 دانه.

لوۋاستاتىن (洛伐他丁，Lovastatin)

【باشقىا نامى】 مېۋناکور (美降之，Mevnacor)
【ئاساسىي تەركىبى】 لوۋاستاتىن.

«فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى» بۇ، دورا بەدەندە ھىدرولىزلىنىپ، β -كاربوكسىل كىسلاتسانىڭ مېتابولىزملق ھاسلاتىغا ئايلىنىش ئارقىلىق رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ، β -كاربوكسىل كىسلاتسانىڭ HMG-CoA رېدوكتازانى تورمۇزلايدۇ. ئىچكى مېتالىزم ھاسلاتى TG سىنتېزلىنىشنى كېمەيتىدۇ. سەۋىيىسىنىمۇ تۆۋەنلىتىلەيدۇ. ئىچكەندىن كېيىن Tmax 4~5h 2 بولىدۇ. قان پلازا ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش ئىسبىتى تەخمىنەن 95%، $t_{1/2}$ تەخمىنەن 1~2h.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 بىرلەمچى قاندا خولېستېرىن يۈقىرىلاش كېسىلىك قوشۇلۇپ كەلگەن تېرىكلىتسېرىد (三酰甘油) يۈقىرىلاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئادەتتە دەسلەپكى مىقدارى 20mg بولۇپ، كۈنگە بىر قېتىم كەچلىك تاماقتا ئىچىلدۇ، ھەرقېتىمدا 10mg بولۇپ، كۈنگە بىر قېتىم كەچلىك تاماقتا ئىچىلدۇ، يېنىك، ئوتتۇرا دەرجىدىكى قاندا خولېستېرىن يۈقىرىلاش كېسىلىك 80mg دىن باشلاپ دورا بېرىپ، مىقدارىنى كۈنگە ئەڭ كۆپ بولغاندا 1.95mmol/L 3.64mmol/L دىن تۆۋەنلىگەندە ياكى ئومۇمىي خولېستېرىن 1.95mmol/L دىن تۆۋەنلىگەندە،

مقدارىنى كېمىيەتىش كېرىشكى.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان - ئۈچىي كۆپۈش، ئىچ سۈرۈش، قەۋزىيەت، كۆڭۈل ئېلىشىش، ئىشتىها تۆنۈلۈش، باش قېيىش، چارچاش، كۆرۈش خىرەلىشىش، باش ئاغرىش، مۇسکۇللار ئاغرىش، ئۇيقوسىزلىق، تەم سېزىمى توسوقۇنلۇققا ئۇچراش، قىچىشىش قاتارلىقلار كۆرۈلدى، مۇسکۇل كېسىلى ۋە توغرا يوللۇق مۇسکۇل ئېرش قاتارلىقلار ئىنتايىن ئاز كۆرۈلدى.

【دىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دوربىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئىممۇنت تورمۇزلىخۇچى دوربىلاردىن گېمبىروزىل (吉非罗齐)， نىكوتىن كىسلاتا (烟酸) ياكى ئېرىتروستىسەن (红霉素) لار بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، مۇسکۇل كېسىلى قوزغلۇش خەترىنى ئاشۇرىدۇ؛ ئۆكۈمارىن (香豆素) قان ئۇيۇشقا قارشى دوربىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، بەزى بىمارلارنىڭ ترومبوگېن (凝血酶原) ۋاقتى ئۆزىرىدۇ. ② مەنى ئىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىدىكى هەرقانداق بىر تەركىبگە زىيادە سەزگۈرلەر، جىڭىر بىدە هەرىكەتچان كېسىللىك ئۆزگىرىشى بارلار ياكى GPT ئۇدا يۇقىرىلىغان، ئەمما سۆزىمى ئېنقلانىمىغانلار، ھامىلىدارلار ياكى بالا ئېمىتىۋانقان ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكللىنىدۇ. ③ باشقىلار: جىڭىر فۇنكسييىسىنى قەرەللىك تەكشۈرۈپ تۇرۇش لازىم؛ جىڭىر كېسىلى تارىخى بارلار، ھاراقنى كۆپ ئىچىدىغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدۇ؛ كربئاتىنىنى قوزغاتقۇچى فېرىمېنت (肌酸激酶) كۆرۈنەرلىك يۇقىرىلاپ، مۇسکۇل كېسىلى دەپ دىئاگنووز بېكتىلگەن ياكى گۇمان قىلىنغانلارغا دورىنى دەرھال توختىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 مېۋناكور ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى 10mg، قاب/10 تابلىپتى.

بېزاfibرات (苯扎贝特，Bezafibrate)

【باشقا نامى】 بېزاfibرات - 400 سىتادا رېتارد
(脂康平，Bezafibrate—400 Stada Retard)

【ئاساسىي تەركىبى】 بىز افېرات.

【فارماکولوگىيلىك ىلاھىدىلىكى】 كلوافيرات (氯贝丁脂) نىڭ تۇغۇندىسى بولۇپ، ئۇنىڭ تەسىرى كلوافيراتقا ئاساسىي جەھەتنىن ئوخشىپ كېتىدۇ، ئەمما بىر قىدەر كۈچلۈك بولۇپ، ھەرخىل تېلىق يۇقىرى ياغلىق قان كېسلىدىكى قان ئومۇمىي خولپىتىرىنىڭ ۋە ترىگلىتىسپرىدىنىڭ قويۇقلۇقىنى تۆۋەنلىتەلەيدۇ، ئىچكەنە تولۇق سۈمۈرۈلىدۇ، $t_{1/2}$ 2.1h، T_{max} 2h، دەرىجىدىكى چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 ئېغىر دەرىجىدىكى بىر لەمچى قاندا ياغ زىيادە كۆپىشىكە ئىشلىتىلىدۇ، دىئابىت كېسىلى، يەللەك بوغۇم ئاغرىقى قاتارلىق كېسەللەكلەرگە ئەگىشىپ كەلگەن ئېغىر دەرىجىدىكى ئىككىلەمچى قاندا ترىگلىتىسپرىد زىيادە كۆپىشىكىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئاستا تەسىرىلىك تابلىپتى، هەرقىتىمدا 400mg دىن كۈنگە بىر قېتىم تاماڭتىن كېيىن ئىچىلىدۇ. بۇرەك فۇنكسييىسى ناچار لاشقان بىمارلارغا قان زەردابىدىكى كەرەتائىنىن سەۋىيىسىگە قاراپ دورا مىقدارى تەڭشىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئىشتىها تۇنۇلۇش، كۆڭۈل ئېلىشىش، ئاشقازان قىسىمى يېقىمىزلىنىش قاتار لىقلار كۆرۈلىدۇ، قېچىشىش، يەلتاشما تاسادىپىي كۆرۈلۈپ قالىدۇ؛ چاچ چۈشۈش، پۇتون بەدهن مۇسکۈل ياللۇغىغا ئوخشاش ئاغرىش ياكى مۇسکۈللار زەئىپلىشىش ئاز كۆرۈلىدۇ.

【دېقىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: بۇ دورا ئوكۇماراتين (香豆素) تۈرىدىكى دورىلارنىڭ قان ئۇيۇشقا قارشى تەسىرىنى كۆچىتەلەيدۇ؛ سۇلغۇنلىل ئۇرپىئا (磺酰脲) ۋە ئىنسۇلىتىنىڭ نىڭ تەسىرىنى كۆچەيتىدۇ. ② مەنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: جىڭگەر، ئۇت كېسىلى بارلار، ئېغىر دەرىجىدە بۇرەك فۇنكسييىسى توسقۇنلۇققا ئۇچرىخۇچىلارغا ئىشلىتىلمىدۇ. ③ باشقىلار: ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار ۋە بالىلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ ئېستروگېن (雌激素) ياكى ئېستروگېننى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلرىنى ئىشلەتكەن قاندىكى ياغ زىيادە يۇقىرى بىمارلارنىڭ قېنىدا ياغ مىقدارى زىيادە يۇقىرىلاش خاسلىقىنى

ئۆلچەش كېرىك.

【ياسالمىسى ۋە ئۆلچەمى】 بېزافبرات 400 سىتادا رېتارد گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. ئاستا تەسرىلىك تابلىپتى: تابلىپتى 400mg، قاپ/10 تابلىپت.

فېنوفىبرات (非諾貝特, Fenofibrate)

【باشقا نامى】 لىپانتىل (力平脂, Lipanthyl)
【ئاساسىي تەركىبى】 فېنوفىبرات.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا لىپوپروتېئن لىپازا (脂蛋白酶) نىڭ ئاكتىپچانلىقىنى ئاشۇرۇپ، ترىگلىتىرسىرىدىنى روشنەن تۆۋەنلىكتىدۇ، زىچلىقى يۇقىرى ياخ ئاقسىلىنىڭ مىقدارىنىمۇ يۇقىرى كۆتۈرىلدى. ئىچكىندە تېز ھەم تولۇق سۈمۈرۈلدۈ، $t_{1/2}$ 25h گە يېتىدۇ. ئاساسلىقى گلۈكۈرونىك كىسلاتا بىرىكىمىسى شەكىلde بۆرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىدلىكىلەر】 چوڭلارنىڭ يېمەك - ئىچمىكىنى تىزگىنلەش ئۇسۇلى كۆئۈلىدىكىدەك بولمىغان يۇقىرى خولپىستېرىلىق قان كېسىلى ۋە ياكى يۇقىرى تىرىگلىتىسپىرىلىق قان كېسىلىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مىكرو زەررچىلەشتۈزۈلگەن كاپسۇلى، 200mg كۈنگە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ. ئۆلچەملىدەشتۈزۈلگەن كاپسۇلى، ھەر قېتىمدا 100mg، كۈنگە ئۆچ قېتىم ياكى كۈنگە بىر قېتىم 300mg ئىچىلىدۇ. قامداش مىقدارى ھەر قېتىمدا 100mg، كۈنگە ئىككى قېتىم ياكى 200mg كۈنگە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان، ئۈچەي يېقىمىزلىنىش، تېرىھ ئاللىپرىگىيلىك رېئاكسىيىسى، تراناسىئامىنازا ئۆتكۈنچى يۇقىرلاش ۋە مۇسکۇل ئاغىرش كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: باشقا خولپىستېرىنىنى تۆۋەنلىكتۈچى دورىلار (مدسلەن: 他丁类, 贝特类) بىلەن بىرگە ئىشلىتىشتن ئېھتىيات قىلىش، قان ئۇيۇشقا قارشى

دوريلارنى ئىشلەتكەنде بۇ دورىنى ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: جىڭىر ياكى بۇرەك فۇنكسييسى زەخىملەنگەنلەر، باللار ۋە ھامىلىدارلارغا ئىشلىتىلمىيدۇ. ③ باشقىلار: بۇ دورىنى يېمىدۇ - ئىچمەكىنى تىزگىنلەشنىڭ ئورنىغا دەسىتىپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ؛ قانىنى قائدىلىك تەكشۈرۈش ۋە جىڭىر فۇنكسييسىنى تەكشۈرۈشنى قەرەللەك ئېلىپ بېرىش لازىم؛ ئىگەز مۇسۇكۇللار ئاغرسا، دوخۇرۇغا دەرھال خەۋەر قىلىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 لېپاتىل فرانسىيەدە ئىشلەنگەن. ئۆلچەمە شتۇرۇلگەن كاپسۇلى: دانه/100mg، قاپ/25 دانه، دانه/300mg، قاپ/10 دانه؛ مىكرو زەررجىلە شتۇرۇلگەن كاپسۇلى: دانه/200mg، قاپ/10 دانه.

گېمبىروزىل (吉非贝齐，Gemfibrozil)

【باشقۇ نامى】 لوپىد (Lopid) (洁之，Gemnpid) ، گېمنپىد (諾衡，Polipid) (优瑞脂，Uragem) ، ئۇراگىم (博利脂，Polipid) (ئاساسىي تەركىبى) گېمبىروزىل .

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 غىيرىي گالوگىنلاشقان كلوفېرىات (非卤化的氯贝丁酯) تۇرىدىكى دورا بولۇپ، ئىچكەنде ياخشى سۇمۇرۇلىنىدۇ، $t_{1/2}$ 1 ~ 2h Tmax 1.5h دەسىلى پىتى بۇرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 I، II، III، IV ۋە V تېلىق يۈقرى ياغ ئاقسىلىق قان كېسىلىك ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 600mg ىىككى قېتىمغا بۆلۈپ ئەتىگەن، كەچتە تاماق يېيىشتن 30min بۇرۇن ئىچىلىدۇ، مىقدارىنى كېسەللىك ئەھۋالغا قاراپ كۆپەيتىشكە ياكى كېمەيتىشكە بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان - ئۇچەي يولى رېشاكسىيىسى، ماغدۇرسىزلىنىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، ترانسئامينازا ئۆتكۈنچى يۇقىرىلاش ئاز كۆرۈلىدۇ، دورا توختىتسا ئىسلىگە كېلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دوريلار بىلەن بولغان تەسىرى:

قان ئۇيۇشقا قارشى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە، قان ئۇيۇشقا قارشى دورىلارنىڭ مىقدارى ئەھۋالغا قاراپ كېمەيتىلىپ، ترومبوگىن ۋاقتى مۇۋاپىق سەۋىيىدە ساقلىنىدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋالار: جىگەر، بۇرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولمىغانلار، بىرلەمچى ئۆت خالتىسى قېتىشقاڭلار، ئۆت تېشى كېلى تارىخى بارلار، دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر، ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار ۋە باللارغا ئىشلىتىلمىدۇ. ③ باشقىلار: ترومبوگىن ۋاقتىنى كۆزىتىشكە دىققەت قىلىش لازىم. 【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 لوپىد ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. تابلىقى: دانە/900mg، قاپ/10 دانە.

گىمنىپىد تەيۋەندە ئىشلەنگەن. تابلىقى: تابلىپت/600mg، قاپ/10 دانە.

پولپىد سېپرۇستا ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانە/300mg، قاپ/50 دانە.

ئۇراغىم تەيۋەندە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانە/300mg قاپ/100 دانە.

ئاقسىپىموكس (阿西莫司，Acipimox)

【باشقا نامى】 ئولبېتام (乐脂平，Olbetam)

【ئاساسىي تدرکىبى】 مېتوكسى پرازىن (氯甲毗嗪) .

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ترىگلەتسېرىدىنىڭ جىگەرde سىنتېزلىنىشنى تۆۋەنلىتىپ، قان پلازمىسىدىكى ترىگلەتسېرىد ۋە ئومۇمىي خولپىتىرىنى تۆۋەنلىتىدۇ. بۇ دورىنى ئىچىنەن كېيىن تىز ھەم تولۇق سۈمۈرۈلدۈ، $t_{1/2}$, 2h Tmax 2h تەخمىنەن 2h بولىدۇ. ئەسلى پىتى سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 V ~ II تېپلىق يۇقىرى ياغ ئاقسىللىق قان كېسىلىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 250mg، كۈنگە 3 ~ 2 قېتىم تاماقتىن كېيىن ئىچىلىدۇ، IV تېپلىق يۇقىرى ياغ ئاقسىللىق قان كېسىلىگە كۈنگە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا

250mg ئىشلىلىدۇ؛ Ⅱ، Ⅲ، Ⅳ تىپلىق يۇقىرى ياغ ئاقسىللىق قان كېسىلىگە ھەر قېتىمدا 250mg، كۈنگە ئۈچ قېتىم ئىشلىلىدۇ، كۈندىلىك ئومۇمىي مىقدارى 1200mg 12 دىن ئاشۇرۇۋېتىلمەيدۇ؛ بۆرىكى زەخىملەنگەن بىمارلارغا كېپتەتنىنىڭ قىممىتىگە ئاساسەن، ئەھۋالغا قاراپ دورا مىقدارى كېمەيتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 تېرە قان تومۇرلىرى كېڭىيىش، قىچىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. ئاشقازان، ئۈچەي رېئاكسىيىسى تاسادىپى كۆرۈلىدۇ، بۇنىڭدىن سرت، باش ئاغرىش، زىققە قاتارلىقلارمۇ كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقتە قىلىنىدىغان ئىشلار】 ① مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا زىيادە سىزگۈرلەر، ھەزم خاراكتېرىلىك يارا بارلارغا ئىشلىتىش چەكللىنىدۇ. ② باشقىلار: ئۆزۈن مۇددەت داۋالىنىدىغان بىمارلار قان يېخى، ياغ ئاقسىلى، جىڭىر ۋە بۆرەك فۇنكسىيىسىنى قەرەللەك تەكشۈر تۈپ تۈرۈشى لازىم، باللارغا بۇ دورىنى يېقىن يولاتماسىلىق، ھامىلىدار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم. 【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ئولبىتام بىلگىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانە/250mg، قاپ/30 دانە.

ئۈچىنچى باب ئۆسمىگە قارشى دورىلار

مېلېران

(马利兰, Myleran)

【باشقا نامى】 بۇسۇلغان (白消安, Busulfan).

【ئاساسىي تەركىبى】 بۇسۇلغان.

【فارماکولوگىسىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ئالكلل سۇلغونىك كىسلاتا ئىستېرىتىرى تۇرىدىكى ئالكانلاشتۇرغۇچى دورا (烷基磺酸酯类烷化剂)غا تەۋە بولۇپ، يىلىكىنى تاللاپ تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەككەر】 سوزۇلما خاراكتېرىلىك دانىچە هۇجىدىرىلىك ئاق قان كېسىلى، ھەققىنى قىزىل قان ھۇجىدىرىلىرى كۆپپىش كېسىلى، يىلىك تالالىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۈنگە ھەر kg بەدەن ئېخىرىلىقىغا 0.1mg، بالىلار ھەر kg بەدەن ئېخىرىلىقىغا 0.05mg ئىچىدۇ. ئۇزۇن مەزگىل ئارىلاپ داۋالاش ئۇسۇلى: يۇقىرىقى مىقداردا دورا ئىچىلىپ ئاق قان ھۇجىرىسى $L^{-1} \times 10^9$ گە تۆۋەنلىگەندە، دورا ۋاقتىنچە توختىلىدۇ، ئاق قان ھۇجىرىسى ئۆرلەپ $L^{-1} \times 10^9$ 50 گە يەتكەندە دورا يەنە داۋاملىق ئېچىلىدۇ؛ ئۇزۇن مۇددەت ئۇزۇلۇكسىز داۋالاش ئۇسۇلى: يۇقىرىقى مىقداردا دورىنى ئاق قان ھۇجىرىسى $L^{-1} \times 10^9$ ($10 \sim 20$) گە تۆۋەنلىگەندەن كېيىن مىقدارى كېمەيتىلىدۇ، چوڭلارغا كۈنده تەخمىنەن 2mg ئىشلىتىلىدۇ، بۇ سەۋىيە ئۇزۇن ۋاقتى داۋاملاشتۇرۇلدۇ.

【ناچار تەسىرى】 يىلىك تورمۇزلىنىش، ئاشقازان - ئۇچىي يولى رېئاكسىيىسى، پىغمېنت ئولتۇرۇشۇش، ئىلگىرىلەشچان نەپەس قىينلىشىش ۋە داۋاملىشىچان قۇرۇق يۆتەلگە قوشۇلۇپ كەلگەن ئۆپكە كەڭ دائىرىلىك تالالىشىش، يەلتاشما، كۆپ شەكىللەك قىزىل داغ، تۈگۈنلۈك قىزىل داغ، چاج چۈشۈش، ئىرلەرنىڭ ئەمچىكى ئاياللىشىش

قاتارلقلار كۆرۈسىدۇ.

【دېقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 بېقىنلىق مەزگىلدە رادئۇڭاتىپلىق داۋالاشنى قوبۇل قىلغان ۋە باشقا ھۇچىرىلىرنى زەھىرىدىغان دورىلار بىلەن داۋالاغانلارغا بۇ دورىنى ئىشلىتىش مۇۋاپىق ئىمەس؛ ھامىلىدار ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 مىلىپران ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپت / 2mg، بوتولكى / 100 تابلىپت.

ناۋېلىپىن

(诺维本，Navelbine)

【باشقا نامى】 长春瑞宾，Vinorelbine，异长春花碱
【ئاساسىي تەركىبى】 قوش تارتاتلىق نورۇنىبلاستىن
· (双酒石酸盐去甲长春花碱)

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا تۇبۇلسىن — مىكرو تۇبۇلسىنىڭ دىنامىك تەڭپۈڭلۈقىغا بىۋاستە تەسىر كۆرسىتىدۇ. تۇبۇلسىنىڭ توپلىشىشنى تورمۇزلايدۇ ھەممە ئاساسلىقى بۇلۇنۇش دەۋرىدىكى مىكروتۇبۇلسىنغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. G ۋە M دەۋرىدىكى ھۇچىرىلىرنىڭ يېپلىق بۇلۇنۇشنى تورمۇزلاش ئارقىلىق ئارام ئېلىش دەۋرىىگە ياكى كېينىكى بۇلۇنۇش دەۋرىىگە قەددەم قويغان ھۇچىرىلىرنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىسىرىدۇ. ئاخىرقى فازىنىڭ ئوتتۇرۇچە $t_{1/2}$ بۇلسا 40h، قان پلازما CL سائىتىگە 0.8L/kg بولۇپ، ئاساسلىقى گىندە ئارقىلىق چىسىرىلىدۇ، ئاقسىل بىلەن بىرىكىش نسبىتى $80\% \sim 50\%$ بىتىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 كىچىك ھۇچىرىسىز ئۆپكە راکى، كۆچۈشۈش خاراكتېرىلىك ئەمچەك راکىغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېنادىنلا دورا بېرىلىدۇ، بۇ دورىنى يالغۇز ئىشلىتىپ داۋالاشتا دائىملىق مىقدارى ھەپتىدە بىر قېتىم $30 \text{mg/m}^2 \sim 25$ بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 قەۋزىيەت، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، دانچە ھۇچىرىلىر كېمىيىش، ئوتتۇرا دەرىجىلىك قان ئازلىق، نەپەس

قىيىنلىشىش، كاناچە سپازملىنىش، چاج چۈشۈش، تۆۋەنكى جاغ ئاغرىش، تېرە نېكروزلىنىش قاتارلىقلار كۆرۈلدۈ. بېزىدە سېزىم نورمالسىزلىنىش تۆۋەنكى مۇچىلەر كۈچسۈزلىنىش ۋە ئۇيۇشۇش، پالەچىلىنىشلىك ئۈچەي توسوڭلۇش ئىنتايىن ئاز كۆرۈلدۈ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: چۈكمە ھاسىل بولۇشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئىشقا لىق ئېرىتمە بىلەن سۈيۈلدۈرۈشقا بولمايدۇ. ② مەنئى قىلىنىدەغان ئەھۋالار: ھامىلىدار ۋە باڭ ئېمىتىۋاچان ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: جىڭىر، بۆرەك فۇنكسىسى تولۇق بولمىخانلارغا دورا مقدارى كېمەيتىلىدۇ؛ دورا ئىشلىتىۋاچان مەزگىلە قان رايى ئۆزگەرىشىنى تەپسىلىي كۆزىتىش، بۇ دورىنىڭ كۆزىنى بۇلغاب قويۇشىدىن ھەزەر ئېيلەش كېرەك، بۇ دورىنى جىڭىرنى رادىئوئاكىتىپلىق داۋالاش بىلەن بىرگە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. 【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ناۋىلېن فرانسييە ئىشلەنگەن. ئوكۇل سۈيۈقلۈقى: ھەر ئامپۇلى 10mg/1ml، ھەر ئامپۇلى 50mg/5ml، قاپ/10 ئامپۇل.

سكلوفوسفاميد

(环磷酰胺, Cyclophosphamide)

【ئاساسىي تەركىبى】 سكلوفوسفاميد.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ھيدرولىزانغاندىن كېيىن ئاكتىپلاشقان تېقا ئايلىنىپ، مۇستارگىن رادىكالى (氮芥基) قويۇپ بېرىش ئارقىلىق ئۆسمىنىڭ ئۆسۈشىنى تورمۇزلاش رولىنى جارى قىلدۇردى.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 يامان سۈپەتلىك لىمعا ئۆسمىسى، ئۆتكۈر، سوزۇلما خاراكتېرىلىك لىمعا ھۇجمىرىسى مەنبىلىك ئاق قان كېسىلى، تۆخۈمدان راكى، ئەمچەك راكى، ئۇرۇق ئانا ھۇجمىرىه ئۆسمىسى، كۆپ ئورۇندا پەيدا بولىدىغان يىلىك ئۆسمىسى، باش، بويۇن قىسىم ئۆسمىسى قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مقدارى】 $600\text{mg}/\text{m}^2 \sim 400$ ھەپتىدە بىر قېتىم ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، تەخىمنەن 8g بىر داۋالاش مۇددىتىگە

ئىشلىتىلىدۇ. ئىچىلىدىغاننى كۈنگە ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 50mg دىن ئىچىلىدۇ، ئارتبىيىگە ئوکۇل قىلىنىدىغاننى ھەر قېتىمدا 500mg ~ 100 ياكى غىلاپ ئىچىگە ھەر قېتىمدا 500mg ~ 100 ئوکۇل قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان - ئۇچىي يولى رېئاكسىيىسى، يىلىك تورمۇزلىنىش، دۆۋاساق ياللۇغى، جىڭىر فۇنكىسىيىسى زەخىمىلىنىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، باش قېيىش، بىئارام بولۇش قاتارلىقلار ئاز كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 مەئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: ئېغىر دەرجىدىكى كاخېكسييە بىمارلىرى، يىلىك ئېغىر دەرجىدە تورمۇز لانغانلار، ھامىلدار لارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ئىسلەدە جىڭىر كېسىلى بار بىمارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ، ئاشقازان - ئۇچىي رېئاكسىيىسى مۇستار گېن (氮芥) نىڭىدىن يېنىك بولىدۇ؛ چېچى چۈشۈپ كەتكەنلەرنىڭ چېچى دورا توختىتىغاندىن كېيىن قايىتا چىقدۇ؛ يىلىكىنىڭ تورمۇزلىنىشى ئادەتتە ئۇڭاي ئەسلىگە كېلىدۇ.

【ياسالىمسى ۋە ئۇلچىمى】 سىكلوفوسفامىد گېرمانييىدە ئىشلەنگەن. تابلىقى: تابلىپتى/ 50mg؛ ئوکۇلى: ئامپۇل/ 200mg، 500mg/، 200mg/، ئامپۇل، ئامپۇل/ 1000mg، قاپ/ 10 ئامپۇل.

فلۇئوروئۇراتسىل · (氟尿嘧啶, Fluorouracil)

【باشقىا نامى】 5 - فلوئوروئۇراتسىل (5-FU)

【ئاساسىي تەركىبى】 فلوئوروئۇراتسىل.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ پىرىمىدىن تۈرىدىكى مېتابولىزمغا قارشى دورا، بىدەندە 5 - فلوئوروئۇراتسىل دېئوكسى رىبۇنو كلىپۇزىد (胸腺嘧啶脱氧核苷) (5-氟尿嘧啶脱氧核苷) قا ئايلىنىپ، تىمىدىن سىنتېتىزا تىمىدىن (胸腺嘧啶脱氧核苷合成酶) (胸腺嘧啶脱氧核苷合成酶) ئورىدىن (尿嘧啶脱氧核苷) ئۆرۈمىدەن (DNA) ئىلىنىشىنى توسىپ، بىئوسىنتېزلىنىشىگە تىسىر كۆرسىتىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىدلىكىلەر】 ھەزم قىلىش يولىدىكى

تەرقىي قىلىشچان بىز راکى، تۈز ئۈچەي راكنى كېسىپ ئېلىۋەتكەندىن كېيىنكى داۋاملىق داۋالاش، ئەمچەك راك ئۆسمىسىنى كېسىپ ئېلىۋەتكەندىن كېيىن ياكى كېسىپ ئېلىۋەتكەندىن كېيىنكى قايتا قوزغىلش، تۆخۈمدان بىزى راکى، يۇقىرى هەزمىم يولى ۋە قىزلىئۇڭىچ ئېپتېلىيە راکى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مقدارى】 كۈنگە بىر قېتىم ۋېنادىن بېرىشكە بولىدۇ، ئەمما مۇسکۇلغا ئوڭۇل قىلىشا بولمايدۇ. ۋېنادىن تېمىتىش مقدارى $1000\text{mg}/\text{m}^2$ ~ 700 دىن ئاشۇرۇۋېتلىمەيدۇ، ھەر ئايدا 6 ~ 3 كۈن ئۇدا ئىشلىتىلىدۇ، ۋېناغا تېمىتىش ۋاقتى 1h ئەتراپىدا بولىدۇ. باشقا دورىلار بىلەن بىرلەشمە داۋالاش ئۇسۇلىدا: كۈنگە $600\text{mg}/\text{m}^2$ ~ 300 ئىشلىتلىپ، 5 ~ 2 كۈن بىر داۋالاش كۇرسى قىلىنىدۇ، 4 ~ 3 ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن يەنە ئىشلىتىلىدۇ. باشقا دورا بېرىش شەكلى: جىڭىر ئارتىرىيىسىدىن ئاستا - ئاستا بېرىشكە بولىدۇ.

【ناچار قەسىرى】 ئاق قان ھۈجەيرىسى كېمىيىش، قان پلاستىنكلىرى كېمىيىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇمۇش، ئىچ سۈرۈش، ئىشتىها تۇتۇلۇش، تېرىگە پىغمېنت ئولتۇرۇشۇش، چاج چۈشۈش، تېرىه ۋە شىللەق پەرەد ياللۇغلىنىش، ئەسۋە چىقىش، يەلتاشما، نۇر رېڭاسىيە بېرىش، يۈرەك ئالدى رايونى ئاغرىش، ئېلىكتروكاردىئوگرامما ۋاقتىلىق ئۆزگىرىش، كىچىك مېڭىنىڭ ھەرىكەت تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇش، ياش بېزىنىڭ ئاجرىتىشى زىيادە كۆپپىش قاتارلىقلار كۆرۈلەندۇ. بەزىدە قان ئازلىق، ھەزم يولى قاناش ۋە يۈرەك مۇسکۇل تىقلىمىسى پەيدا بولىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ئىگەر توواتىن ئىچ سۈرۈش، ئېغىز ياللۇغى، يارا ياكى قاناش پەيدا بولسا، دەرھال دورىنى توختىتىپ، تاكى يۇقىرىقى ئالامەتلەر تامامەن يوقالغانغا قەدەر دورا ئىشلىتلىمەيدۇ؛ ھەر قېتىملق داۋالاشتن ئىلگىرى، قان ئەستايىدىلىق بىلەن قائىدىلىك تەكشۈرۈلەندۇ. ئەگەر نورمالسىز ئەھۋال بايقالسا، دورا توختىتىلىدۇ؛ يۈرەك كېسىلى تارىخى بارلار، ئىسپىرتىن زەھەرلەنگەن ۋە تاماڭا چەككەن تارىخى بارلارنىڭ يۈركىنى دەسلەپكى ئۈچ داۋالاش كۇرسىدا داۋاملىق كۆزىتىش لازىم؛ ئاق قان ھۈجەيرىسى $L \times 10^9 > 2$ ، قان پلاستىنكلىرىدىن كىچىك بولسا $L / 10^9 \times 80 <$ ياكى يۈرەك فۇنكىسيسى قالا يىمقانلاشسا دورىنى دەرھال توختىتىش لازىم.

【یاسالمیسى ۋە ئۆلچىمى】 فلوئوروئوراتسىل ئاۋستربىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: 500mg/10ml, 2.5g/100ml.

ئالترباتامىن (六甲蜜胺, Altretamine)

· Altretaminum, 六甲三聚氰胺 Hexalen, Hexamethylmelamine (HMM)

【ئاساسىي تەركىبى】 ئالترباتامىن (六甲三聚氰胺).

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ پرەمىدىن تۈرىدىكى مېتابولىزمغا قارشى دورا بولۇپ، دەھىدروفولات رېبۇكتازا (二氢叶酸还原酶) نى تورمۇزلاش رولغا ئىنگ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىدەر】 ئۆپكە راكى، يامان سۇپەتلىك لىمفا ئۆسمىسى، تۇخۇمدان راكى، ئەمچەك راكى، ھەزمىم يولى راكى، ئاستا خاراكتېرىلىك دانچە ھۇجەيرلىك ئاق قان كېلىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئادەتتە كۈنىڭكە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 12mg ~ 10، توت قېتىمغا بولۇپ ئىچىلىدۇ، 21 كۈن بىر داۋالاش مۇددىتى قىلىنىدۇ ياكى كۈنىڭكە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 8mg ئىشلىتىلىپ 90 كۈن بىر داۋالاش مۇددىتى قىلىنىدۇ. سوزۇلما خاراكتېرىلىك ئاق قان كېلىگە كۈنىڭكە 200mg 200 دىن باشلاپ ئىشلىتىپ، ئۇچ كۈنىدىن كېيىن ئاستا - ئاستا كۈنىڭكە 800mg غېچە كۆپەيتىلىدۇ، بۇ مىقدار تاكى كېسەللىك ياخشىلانغىچە ياكى ئۇنۇم بەرگىچە داۋاملاشتۇرۇلىدۇ، ياخشىلانغاندىن كېيىن مىقدارنى ئازىتىپ، قامداش مىقدارى بېرىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئاق قان ھۇجەيرىسى تۆزەنلەش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. بەزىدە قان پلاستىنكلىرى ئازىيىش كېلىپ چىقىدۇ، ئۇزۇن مەزگىل ئىشلەتكەندە مەركىزىي ۋە ئەتراپ نېرۇا سىستېمىسىغا مەلۇم دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ.

【یاسالمیسى ۋە ئۆلچىمى】 ھېكسالابن ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانە 50mg، قاپ/100 دانە.

ئاسپاراگىنازا

(门冬酰胺酶, Asparaginase)

【باشقا نامى】 Elspar, 优适宝

【ئاساسىي تەركىبى】 ئاسپاراگىنازا.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا قاندىكى لېۋۋە ئاسپاراگىن (左旋门冬酰胺) نى پارچىلاب، ئاسپاراگىنغا ئېھىتىيا جىلق ئۆسمە ھۇچىرىسىنى ئوزۇقلۇق كەمچىل ھالىتىگە كەلتۈرۈش ئارقىلىق ئۆسمىگە قارشى رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئاق قان كېسلىنىڭ (سوزۇلما خاراكتېرىلىك ئاق قان كېسلىنىڭ ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئۆزگىرىشىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)، يامان سۈپەتلىك لىمفا ئۆسمىسى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مۇسکۇلغا، ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ ياكى ۋېناغا تىمىتىلىدۇ. ئادهتە كۈندىلىك مىقدارى ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 1000U ~ 20، ھەر ھەپتىدە 2 ~ 1 قېتىم ئىشلىتىلىدۇ، 4 ~ 3 ھەپتە بىر داۋالاش كۈرسى قىلىنىدۇ. ياش قۇرامى ۋە پۇتون بىدەن ھالىتىگە قاراپ مىقدارى كۆپېتىلىدۇ ياكى كېمەتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئېسىنى يوقىتىش، تارتىشىش، قان بېسىم تۆۋەنلەش، تىترەش، قىزىش، قۇسۇش، ئەسۋە چىقىش، قان پلاستىكلىرى كېمىش، قاناش، قان ئازلىق، جىڭىر فۇنكسييسى زەخىلىنىش، يۇقىرى ئاممونىيلىق قان كېسلى، ئاقسىلىق سۈيدۈك، ئازاتلىق قان كېسلى، سۈلۈق ئىشىق، ئىشتىها تۇتۇلۇش، ئىج سۈرۈش، ماغدۇر سىزلىنىش، باش ئاغرىش قاتارلىقلار كۆرۈلدى؛ بەزىدە ئۇيقوسراش، ئەنسىزلىنىش، يۇنىلىشنى پەرق ئېتىش تو سقۇنلۇقتا ئۇپراش، بەھوش ئۇخلاش قاتارلىقلار پەيدا بولىدۇ؛ ئۇنىڭدىن باشقا، قان تومۇرلار ئاغرىش، قەنتىكە چىدامچانلىقى نورمالسىزلىنىش قاتارلىقلار مۇ بار. بەزىدە ئېغىر دەرىجىدىكى ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللىۇنى، ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ ئىچىكى ئاجراتما فۇنكسييسى تو سقۇنلۇقتا ئۇچراشتىن كېلىپ چىقىدىغان دىئابىت كېسلى، مېڭىنىڭ كەڭ دائىرلىك ئورگان خاراكتېرىلىك تو سقۇنلۇقتا ئۇچرىشىدىن ئۆلۈپ

کېتىش قاتارلىقلار پېيدا بولىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا ئېغىر دەرىجىدە زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بارلار ۋە ھامىلىدارلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: جىڭىر فۇنكسىيىسى زەخىملەنگەنلەر، بۆرەك فۇنكسىيىسى زەخىملەنگەنلەر، يىلىك قوشۇلۇپ كەلگەنلەر، سۇ چېچىكى تورمۇزلانغانلار، يۇقۇملىنىش قوشۇلۇپ كەلگەنلەر، تورمۇزلىنىش پېيدا چىققانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ ئەگەر يىلىك تورمۇزلىنىش پېيدا بولسا، كلىنىكىدا قايتا - قايتا تەكشۈرۈپ، بىمارنىڭ ھالىتىگە يېقىندىن دىققەت قىلىش، غىيرى ئۆزگىرىش كۆرۈلسە، دورا مىقدارىنى كېمەيتىش ياكى دورا توخنلىتىش ئارقىلىق مۇۋاپىق بىر تەرەپ قىلىش لازىم؛ ئۆزۈن مەزگىل دورا ئىشلەتكەن نە ئېھتىيات قىلىش كېرەك؛ يۇقۇملاغان بىمارلاردا قاناش خامىشىنىڭ پېيدا بولۇشى ۋە ئېغىرلىشىشغا يۈكىسەك دەرىجىدە دىققەت قىلىش لازىم؛ بالىلارغا دورا ئىشلىتىشتە ئېھتىيات قىلىش لازىم؛ تۈغۇت يېشىدىكى بىمارلارغا نسبەتن دورىنىڭ جىنسى بىزگە بولغان تەسىرىگە دىققەت قىلىش لازىم. 【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 ۋامېرىكىدا ئىشلەنگەن. ئۆكۈلى: ئامپۇل/1000U.

دائۇنورۇبىتسىن (柔红霉素，Daunorubicin)

【باشقا نامى】 (正定霉素，Dauoblastine) .

【ئاساسىي تەركىبى】 دائۇنورۇبىتسىن ھىدرۆخلورىد.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ئانتراتىپن ھالقىسى تۈرى (蒽环类) دىكى ئۆسمىگە قارشى ئاتتىپۇتكى دورا، تەسىر قىلىش مېخانىزمى مەزكۈر دورىنىڭ DNA بىلەن بىرىكىش ۋە نۇكلىيٹ كىسلاتا (核酸) نىڭ سىنتېزلىنىشى تورمۇزلىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. بۇ دورا ئۆت يولى ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، مېڭە قان توسوقدىن ئۆتىلمىيدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىمەر】 ئۆتكۈز خاراكتېرلىك ئاق قان كېسىلىگە ئىشلىتىلىدۇ، ئىپتىدائىي دانلىق ھۈجمىرە ئاق قان

كېلىلى، نېرۋا ئانا ھۈجىرىسى ئۆسمىسى ۋە توغرا يوللۇق مۇسکۇل ئۆسمىسىگىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 يەككە مىقدارى ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا ~ 0.5 دىن باشلىنىپ ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ، بىر كۈن ياكى بىر كۈندىن كۆپ ۋاقت ئۆتكەندىن كېيىن، ئاندىن قايta ئوکۇل قىلىشقا بولىدۇ؛ ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا بولسا تۆت كۈن ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ ۋاقتىن كېيىن قايta ئىشلىتىلىدۇ. يەككە تەندر بويچە دورا بېرىلىدۇ. ئومۇمىي مىقدارى ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 20mg 20 دىن ئاشۇرۇۋېتىلمىيدۇ. بۇ دورىنى ئىچىسى ئۇنۇمى بولمايدۇ ھەمde مۇسکۇلغا ياكى غلاب ئىچىگە ئوکۇل قىلىشقا بولمايدۇ، پەقەت ۋېناغىلا ئوکۇل قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 يىلىك تورمۇزلىنىش، يۈرەك زەھەرلىنىش، چاچ چۈشۈش، ئېغىز بوشلۇقى ياللۇغى، ھەزمىم يولى ئالامەتلەرى (كۆڭۈل ئىلىشىش، قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش)، ۋېنە قېتىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. ئەگەر بۇ دورىنى ئوکۇل قىلغاندا سىرتقا چىقىپ كەتسە، ئېغىر دەرىجىدە نېكروزلىنىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

【دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەئى قىلىنىدەغان ئەھۇاللار: يۈرەك كېلىلى تارىخى بارلار، ئېغىر دەرىجىدە يۈقۇملانغانلارغا ئىشلىتش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئاق قان كېلىلىنىڭ ياخشىلىنىش دەۋرىدە بۇ دورا ئىشلىتىلىدىغان بىمارلار بالنىسىدا يېتىشى ھەمde تەپسىلى كۆزىتىلىشى كېرەك. داۋالاش جەريانىدا دائىم دېگۈدەك قاندىكى ئۇرپىتا ۋە سۈيدۈك كىسلاتسىنى ئۆلچەپ تۈرۈش، يىلىككە بولغان زەھەرچانلىقىغا نسبەتن قۇۋۇۋەتلەندۈرۈپ داۋالاش تېيارلىقىنى ياخشى ئىشلەش، داۋالاشنىڭ بىرىنچى ھەپتىسىدە چوقۇم ھەر كۇنى قاننى قائىدىلىك تەكشۈرۈش، داۋالاشنى باشلىغان ۋە داۋالاش مەزگىلىدە، جىڭىر فۇنكسىيىسىنى تەكشۈرۈپ تۈرۈش، يۈرەككە بولغان زەھەرچانلىقىغا ئالاھىدە دىقىقت قىلىش لازىم؛ بۇ دورا ئەگەر تېرى ياكى شىلىق پەردىلەرگە ئېھتىياتىزلىقىنى تېكىپ كەتسە، دەرھال تەلتۆكۈس يۈيۈۋېتىش كېرەك، بۇ دورىنى ئانتىبىئوتىك دورا ئورنىدا ئىشلىتىشكە مۇتلق بولمايدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 دائئۇ ئوبلاستىن ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن.

پاراشوكلۇق ئوکۇلى: بوتۇلكا/20mg، قاپ/1 بوتۇلكا.

دائئرئوبلاستين، يابونينide ئىشلىنگەن. ئوكۇل سۇيۇقلۇقى: ئامپۇل/20mg، قاپ/1 ئامپۇل.

ستارابين
(阿糖胞苷，Cytarabine)

【باشقا نامى】 سىتوزار (赛德萨，Cytosar)，ئالبىكسان (爱力生，Alexan).

【ئاساسىي تەركىبى】 ستارابين.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ئاساسىن بۆلۈنگەن ھۆجەيرىدىكى DNA نىڭ سىنتېزلىنىشىگە تەسىر كۆرسىتىپ، كۆپپىش ۋاقتى ۋە DNA نىڭ سىنتېزلىنىش دەۋر ئۆزۈنلۈقىغا تەڭ تەسىر كۆرسىتىدۇ. ۋېناغا ئوكۇل قىلغاندىن كېيىن، جىڭىرددە (بىر قىسىمى بۇرەكتە) تېز سۈرئەتتە مېتابولىزەملەندىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىر】 چوڭلاردىكى ئۆتكۈر دانچە ھۆجەيرىلىك ئاق قان كېسىلىنى ھەممە چوڭلار ۋە باللاردىكى باشقا ئاق قان كېسەللەكلىرىنى ياخشىلاشقا ئىشلىتىلدى، چوڭلار ۋە باللاردىكى باشقا ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئاق قان كېسىلىگە بولغان تەسىرى دانچە ھۆجەيرە خاراكتېرىلىك ئاق قان كېسىلىگە بولغان تەسىرى بىلەن ئاساسىي جەھەتنىن ئوخشىشىپ كېتىدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 تېز سۈرئەتتە ۋېناغا ئوكۇل قىلىش - ئۆزۈلۈكسىز داۋالاش: دەسلېپىدە كۈنگە ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 2mg دىن كۈنە بىر قېتىم، ئۇدا 10 كۈن ئىشلىتىلدى. زۆرۈر تېپىلغا ئاكى كۆنگە ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 4mg غىچە كۆپەيتىلدى، ئۆزۈلۈكسىز داۋالاپ تاكى كۆرۈنەرلىك زەھەرچانلىقى ياكى ياخشىلىنىش كۆرۈلگەنگە قەدەر مۇشۇ مىقدار ئىشلىتىلدى، زەھەرچانلىق رېئاكسىيىسى ھەممە بىماردا دېگۈدەك پېيدا بولىدۇ. ۋېناغا تېمىتىش - ئۆزۈلۈكسىز داۋالاش: دەسلەپتە كۈنگە ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 0.5 ~ 1.0mg ئىشلىتىلدى. تېمىتىش ۋاقتى 1h بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ. ئىڭىر زۆرۈر تېپىلسا، كۈنگە ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 2mg غىچە كۆپەيتىشكە بولىدۇ، ئۆزۈلۈكسىز داۋالاپ تاكى ياخشىلانغىچە ياكى

زەھەرچانلىق رېئاكسىسى پەيدا بولغىچە داۋاملاشتۇرۇلدۇ. مىقدارىنى ئۆزگەرتىش: ئېغىر دەرىجىدە قان ئىشلەش فۇنكسىسى تورمۇز لانسا، دورىنىڭ مىقدارىنى ئۆزگەرتىش ياكى دورىنى ۋاقتىنچە توختىتىش كېرىك. قامداپ داۋالاش ئۇسۇلى: كېسەللىك ئەھۋالى ياخشىلانخاندىن كېيىن، ھەر ھەپتىدە بىر قېتىم ياكى بىرىم ھەپتىدە بىر قېتىم، ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقغا 1mg تېرە ئاستىغا ئوکۇل قىلىپ قامىدىلەدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسوش، يىلىكى زەھەرلەش (يىلىك ئۇچلىرىدىكى ئاق قان ھۈچەيرىسى كېمىش)، قان ئازلىق ۋە زور گۆدەك قىزىل قان ھۈچەيرىلىك قان كېسىلى.

【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنى قىلىنىدىغان ئەھۋالار: يىلىكى تورمۇز لانغان بىمارلارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ② باشقىلار: چوقۇم تېببىي نۇقتىدىن زىچ كۆزىتىش، بېتەكلىپ داۋالاش مەزگىلىدە ھەركۈنى چوقۇم ئاق قان ھۈچەيرىسى ۋە قان پلاستىنكلېرىنىڭ سانىنى ئۆلچەپ تۇرۇش لازىم. يىلىك تورمۇزلىنىشا ئەگىشىپ پەيدا بولغان كېسەللىكلىرىنى بىر تەرەپ قىلىدىغان ئۇسۇنلىر بولۇشى كېرىك؛ تېز سۈرئەتتە كۆپلەپ ۋېناغا ئوکۇل قىلىنخاندىن كېيىن بىر نەچچە سائەت ئىچىدە كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسوش كۆرۈلسە، ۋېناغا تېمىتىشقا ئۆزگەرتىپ، بۇ خىل ئالامەتلەر يېنىكلىتىلىدۇ؛ جىڭىر فۇنكسىسىنى ناچارلارغا بۇ دورىنى ئىشلىتىشىدە ئېھتىيات قىلىش ھەممە مىقدارىنى تۆۋەنلىتىش كېرىك؛ بۇ دورا سۆگەلىسىمان ھۈچەيرىلىرنى تېز سۈرئەتتە بۇزۇش ئارقىلىق يۈقرى سۈيدۈك كىسلاقاڭلىق قان كېسىلى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن، شۇڭا دوختۇرلار بىمارنىڭ قېنىدىكى سۈيدۈك كىسلاتا سىنىڭ قويۇقلۇقىدىن خەۋەردار بولۇپ تۇرۇشى، زۆرۈر تېپىلغاندا بىر تەرەپ قىلىشى لازىم.

【ياسالىمسى ۋە ئۇلچىمى】 سىتۆزار بىلگىيىدە ئىشلەنگەن. پارашوكلىق ئوکۇلۇ: ئامپۇل/100mg، ئامپۇل/500mg، قاپ/1 ئامپۇل. ئالېكىان گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇلۇ: ھەر ئامپۇل 100mg/5ml، ھەر ئامپۇل 500mg/10ml، ھەر ئامپۇل 1000mg/20ml. سىتارابىن ئاؤسترالىيىدە ئىشلەنگەن. ھەر ئامپۇل 100ml/1ml، قاپ/5 ئامپۇل؛ ھەر ئامپۇل 500mg/5ml، قاپ/1 ئامپۇل، ھەر ئامپۇل 100mg/5ml، ھەر ئامپۇل 1g/10ml، قاپ/1 ئامپۇل؛ ھەر ئامپۇل 2g/20ml، قاپ/1 ئامپۇل.

لېئۇپورېلىن (亮丙瑞林, Leuprorelin)

【باشقا نامى】 ئېناتتون (抑那通, Enantone)

【ئاساسىي تەركىبى】 لېئۇپورېلىن ئاستېتات.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا يۇقىرى ئاكتىپچانلىققا ئىگ LH-RH نىڭ توغۇندىسى، ئاقسىلىنى پارچىلىغۇچى ئېنزايمغا بولغان قارشىلىق كۈچى ۋە RH - LH ئاكسېپتوري بىلەن بىرىكىش كۈچى RH - LH دىن كۈچلۈك بولغاچقا، هىپوفիز - جىنسىي بەز سىستېمىسىنىڭ ئىقتىدارىنى ئۇنۇملۇك تورمۇزلىيالايدۇ. بەدەنە يىخلىپ قېلىش تەسىرى يوق.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىر】 بالىياتقۇ ئىچكى پەردىسى غەيرىي ئورۇنلىشىش كېسىلى، مەزى بېزى زاكى، ھەيز زىيادە كۆپ كېلىش، قورساقنىڭ توۋەن قىسىمى ئاغرىش، بىل ئاغرىش ۋە قان ئازلىق قاتارلىقلارغا ئەگىشىپ كەلگەن بالىياتقۇ مۇسکۇل ئۆسمىسىگە ئىشتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 تېرە ئاستىغا ئوكتۇرۇنلىكلىنىدۇ. ئادەتتە چوڭلارغا ھەر قېتىمدا 3.75mg، ھەر توت ھەپتىدە بىر قېتىم، ئاياللارغا دەسلەپكى قېتىم ھەيز دەۋاراننىڭ 5 ~ 1 - كۈنى ئىشلىتىلىدۇ؛ بالىياتقۇ مۇسکۇل ئۆسمىسىگە ھەر قېتىمدا 1.88mg ئىشلىتىلىدۇ، ئەمما بەدەن ئېغىرلىقى زىيادە ئېشىش ياكى بالىياتقۇسى زىيادە يوغىنغاڭلارغا ھەر قېتىمدا 3.75mg ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 بەزىدە ترانسإامىنازا ۋە بىلىرۇپىن ئۆرلەش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىشتىها تۆتۈلۈش، قورساق ئاغرىش، قورساق كۆپۈش، ئىچ سۈرۈش، ئېغىز بوشلۇقى ياللۇغى، يۈرەك سېلىش، قىزىل قان ھۈچىرىسى كۆپپىش، ئاق قان ھۈچىرىسى كېمىيىش، قان پلاستىنكلىرى ئازىيىش، پات - پات سىيىش، سىيىش قىيىنلىشىش، دانىخورەك چىقىش، تېرە قۇرغاقلىشىش، چاچ چۈشۈش، موی كۆپ چىقىش ياكى پۇت تىرىنىقى نورمالسىزلىنىش، چارچاش، بەدەن كۆپۈشۈش، ئۇڭاي

ئاچقىلىنىش، قۇلاق غۇڭۇلداش، كۆكەك قىسىمى يېقىمىزلىنىش، سۈلۈق ئىشىق، بىدەن ئېغىرىلىقى ئېشىش، قىزىش، ئەستە تۇتۇش قابىلىيەتى چېكىنىش، سۆڭەك ئاغرىش قاتارلىقلار پېيدا بولىدۇ، مەزى يېزى راكى بىمارلىرىدا سۈيدۈك نېچىسى توسوۇلۇش ياكى يۈلۈن بېسلىش، ئوکۇل قىلىنغان ئورۇن ئاغرىش قاتارلىقلار كېلىپ چىقىدۇ؛ بوغۇم قېتىۋېلىش، بەل ئاغرىش قاتارلىقلار تاسادىپى كۆرۈلۈپ قالىدۇ؛ قاتىق توگۇن پېيدا بولۇش ياكى قىزىرىش يېرىڭىلىق ئىشىق، خامۇشلۇق ئىنتايىن ئاز كۆرۈلدى.

【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەئى قىلىنىدىغان ئەھۇلار: بۇ دورغا زىيادە سەزگۈرلەر، جىنسىي يۈلۈدىن نورمالسىز قان كەلگەنلەر ھامىلىدار ياكى بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: دورا ئىشلىتىۋاتقان مەزگىلە ئىزچىل كۆزىتىش كېرەك؛ بالياتقۇ ئىچكى پەردىسى غەيرىي ئورۇنلىشىش كېسلىگە گىرىپتار بولخان بىمارلارنى داۋااشتىن ئىلگىرى بىمارنىڭ ھامىلىدار ياكى ئەمەسلىكىنى ئېنىقلاش ياكى ھورمۇنسىز داۋااش ئۇسۇلى ئارقىلىق ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش لازىم؛ باشقا ئوخشىشىپ كېتىدىغان كېسلىكلىرىدىن پەرقلەندۈرۈشكە دەققەت قىلىش، كلىنىكىلىق ئالامەتلىرىدە ياخشىلىنىش كۆرۈلمىسى، دورىنى توختىتىش لازىم؛ ئۇزۇن مەزگىل دورا ئىشلەتكەندە ئىمكân بار سۆڭەكىنىڭ زىچەلىقىنى ئۆلچەپ چىقىش، دورىنى ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم؛ دورا پەقفت تېرە ئاستىدىنلا بېرىلىدۇ، يۇقىرىقى يۇقىرىقى ئەھۇلارغا تەرەققىي قىلىش ئېھىتماللىقى بار بىمارلارغا ئېھىتىيات بىلەك، قورساق قىسىمى ياكى ساغرا قىسىمىنى تاللاپ ئوکۇل قىلىنىدۇ، ھەر قېتىسم ئوکۇل قىلغاندا ئوخشاش بىر ئورۇنغا تەكرار ئوکۇل قىلىماسىلىق، ئوکۇل قىلىنغان ئورۇتنى ئۆزۈلماسىلىق لازىم. **【ياسالىممىسى ۋە ئۆلچەمى】** ئېنانتون ياپونىيىدە ئىشلەنگەن.

ئوکۇلۇ: بوتۆلکا/3.75mg.

تىئوگۇئانىن (硫鸟嘌呤，Thioguanine)

【باشقا نامى】 لانۋىس (Lanvis, 兰快舒)

【ئاساسىي تەركىسى】 تىئوگۇئانىن.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا گۇئانىن (鸟嘌呤)

نىڭ ھىدرو سۈلۈريل (硫氢基) لىق تۇرداش ماددىسى بولۇپ، پۇرىن (嘌呤) مېتابولىزملەنىشى بىلدەن قارشىلىشىش تەسىرىنى پەيدا قىلايىدۇ، ئۇنىڭ مېتابولىزم ھاسلاتى يېڭى پۇرىنىنىڭ سىنتېزلىنىشى ۋە پۇرىن نۇكلىبئوزىد كىسلاتا (嘌呤核苷酸) نىڭ ئۆز ئارا ئۆزگەرىشنى تورمۇزلايدۇ. نۇكلىبئىك كىسلاتا (核酸) ۋە دېئوكسى رىبۇنوتكلىبئىك كىسلاتا (脱氧核糖核酸 DNA) ئىچكى قىسىمىخچە سىڭپ كىرىپ، ھۈچەيرىلىرىنى زەھەرلەش تەسىرىنى پەيدا قىلايىدۇ. ئىچكەندە ھۆجەيرىلىرىنى زەھەرلەش تەسىرىنى پەيدا قىلايىدۇ. ھۆجەيرىلىرىنى زەھەرلەش تەسىرىنى پەيدا قىلايىدۇ.

T_{max} ~ 8 بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىر】 ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئاق قان كېسىلىك ئىشلىتىلىدۇ. سۇزۇلما خاراكتېرىلىك دانچە ھۈچەيرىلىك ئاق قان كېسىلىنى داۋااشقىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 يېتەكلىپ داۋالاش: چوڭلارغا كۈنىگە 200mg/m² ~ 100، 2 ~ 1 قېتىمغا بولۇپ ئىچىشكە بېرىلىدۇ، داۋالاش مۇددىتى 20 ~ 5 كۈن بولىدۇ، بالىلار مىقدارىنى ھېسابلاش ئۇسۇلى چوڭلارنىڭكە ئوخشاشىپ كېتىدۇ ياكى 75mg/m² ~ 60 بولىدۇ. قامداپ داۋالاش: ھەر كۈنى ياكى كۈن ئاتلاپ 60 ~ 200mg/m² بېرىلىدۇ. جىڭەر ياكى بۇرەك فۇنكسييىسى زەخىملەنگەنلەرگە ئىشلىدىغان دورا مىقدارى ئەھەنغا قاراپ كېمىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 يىلىكى تورمۇلاش، ئاق قان ھۈچەيرىسى ۋە قان پلاستىنکىلىرى كېمىيىش، ئاشقازان - ئۆچەي يولى بىرداشلىق بېرەلمەسىلىك ھادىسى كۆرۈلۈش، ئېغىز ياللۇغى، ئۆچەي تېشلىش ياكى نېكروزلىنىش، جىڭەر فۇنكسييىسى نورماللىزلىنىش، سېرىقلىق چۈشۈش ۋە جىڭەر ۋېناسى توسوڭلۇش كېسەللىكلىرى كۆرۈلىدۇ، دورا

توختىتلغانىن كېيىن ئىسلەگ كېلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلدەن بولغان تەسىرى: بۇسۇلغان (白消安) بىلەن بىرگە ئىشلەتكەنە تۈگۈنچىلەر قايتا ئىشلىنىشلىك ئۆسۈش، قاپقا ۋىپا بېسىمى يۈقرىلاش ۋە قىزىلئۆڭكەچ ۋېناسى ئەگر بىلىشپ كېڭىيىش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ② باشقىلار: ياخشىلىنىشنى يېتەكەلەش باسقۇچىدا ھەر كۈنى قان رايىنى تەكشۈرۈپ تۈرۈش كېرەك، داۋالاش جەريانىدا قان رايىنى تەپسىلى كۆزىتىش، قۇۋۇۋەتلەندۈرۈپ داۋالاشنى كۈچەيتىش، يۈقۈملەنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا دىققەت قىلىش، ھۈجەيرىلەر كۆپلەپ ئېرىش پەيدا بولغاندا، تېخىمۇ دىققەت قىلىش، قان ۋە سۈيدۈكى سۈيدۈك كىسلاقاتىنىڭ ئۆرلىشى ۋە سۈيدۈك كىسلاقاتى مەنبىلىك بۆرەك كېسىلىنىڭ خەترىدىن ساقلىنىش، ھامىلدار، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئېھتىيات بىلدەن ئىشلىنىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 لانۋىس ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن.
تابلىپتى: تابلىپتى/40mg، قاب/25 تابلىپتى.

ئېتوبوزىد (依托泊昔, Etoposide)

【باشقا نامى】 لاستېت (拉司太特, Vepesid) ۋېپېزىد (凡华士，Lastet)
· (足叶乙昔'，鬼臼乙叉昔

【ئاساسىي تەركىبى】 ئېتوبوزىد.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 تەسىر قىلىش مېخانىزمى بولسا رىبوزىد (核甘) نىڭ يۇتكىلىشىنى تورمۇزلاپ، RNA، DNA، ۋە ئاقسىلىنىڭ سىنتېزلىنىشىنى تورمۇزلاشتىن ئىبارەت. ۋېناغا ئوكۇل قىلىغاندا $t_{1/2\alpha}$ تەخمىنەن 2.03h ~ 0.13، $t_{1/2\beta}$ تەخمىنەن $t_{1/2\alpha}$ ~ 3.33 بولىدۇ؛ ئىچكەندە $t_{1/2\alpha}$ تەخمىنەن 3.40h ~ 6.52، $t_{1/2\beta}$ تەخمىنەن ~ 37.15h بولىدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسىلىكلىكەر】 كىچىك ھۈجەيرىلەك ئۆپكە راكى، يامان سۈپەتلىك لىمفا ئۆسمىسى، تۆخۈمدان راكىغا ئىشلىلىدۇ. ئۆتكۈر خاراكتېرلىك دانىچە ھۈجەيرىلەك ئاق قان كېسىلى، ئۆتكۈر

خاراكتېرلىك تاق يادرو هۇجەيرلىك ۋە ئۆتكۈر خاراكتېرلىك دانىچە تاق
يادرو هۇجەيرلىك ئاق قان كېسلىگە ئۇنۇم بېرىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ ياكى ئىككى
ۋېناغا تېمىتىلىدۇ، يەككە مىقدارى $100\text{mg}/\text{m}^2$ ، كۈنندە ياكى ئىككى
كۈنندە بىر قېتىم، ئۇدا 5 ~ 3 قېتىم ئىشلىتىپ، 4 ~ 3 ھەپتە
توختاتقاندىن كېيىن يەنه قايىتا ئىشلىتىلىدۇ، ئومۇمىسى ئىشلىتىش
مۇقدارى 2000mg ~ $1000\text{mg}/\text{m}^2$ بولىدۇ. ئۇدا بىش كۈن
ئىچىلىپ، ئۆچ ھەپتە توختاتقاندىن كېيىن قايىتا ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 يەلىك تورمۇزلىنىش رېئاكسىيىسى ۋە كۆكۈل
ئېلىشش، قۇسۇش، باش قېيىش، يۈرهەك سېلىش، ئەسۋە چىقىش
قاتارلىقلار كۆرۈلەندۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 كۆكەرەك بوشلۇقى، قورساق
بوشلۇقى ياكى غلاپ پەردىسى بوشلۇقىدىن دورا بېرىشكە بولمايدۇ؛ ۋېناغا
ئۆكۈل قىلغاندا يەلىك ئورۇنىڭ نېڭرۇزلىنىشدىن ساقلىنىش ئۈچۈن
دورا سۈيۈقلۈقىنى قان تومۇر سىرتىغا چىقىرىۋە تەسلىك كېرەك؛ بۇ دورا
قان بېسىمىنى ئوڭاي تۆۋەنلىقىتىدۇ. شۇڭا، ۋېناغا تېمىتىقاندا ئاستا -
ئاستا تېمىتىش كېرەك.

【ياسالىممىسى ۋە ئۆلچەمى】 لاستېت ياپونىيىدە ئىشلەنگەن.
ئۆكۈل: ئامېپۇل/ 100mg ، قاپ/10 ئامېپۇل؛ كاپسۇلى: دانه/ 25mg ،
قاپ/40 دانه؛ دانه/ 50mg ، قاپ/20 دانه، دانه/ 100mg ، قاپ/10 دانه.
ۋېپېزىد ئىتاكىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/ 50mg ،
بوتۇلكا/20 دان ياكى قاپ/20 دانه.

تېنىسپوزىد

(替尼泊昔，Tenisposide)

【باشقى نامى】 (卫萌，Vumon) (威猛，鬼白甲叉甙 VM-26)
【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 يېلىق بۇلۇنۇشنى
تورمۇزلىخۇچى دورا بولۇپ، ئۆسمە ھۇجەيرىسىنىڭ يېلىق بۇلۇنىشنى
ئۆزۈپ تاشلايدۇ. زەھەرچانلىقى تۆۋەن، ياغدا ئېر شچانلىقى يۇقىرى، مېڭە
قان توسوقدىن ئوڭاي ئۆتەلەيدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 يامان سۈپەتلەك كوللۇئىد ھۇجەيرە ئۆسمىسى، كىچىك ھۇجەيرەلىك ئۆپكە راكى، تۇخۇمدان راكى قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 يامان سۈپەتلەك كوللۇئىد ھۇجەيرە ئۆسمىسى: چوڭلارغا $100\sim130\text{mg}/\text{m}^2$ كۈنگە بىر قېتىم ۋېناغا تېمىتىلدۇ. كىچىك ھۇجەيرەلىك ئۆپكە راكى: چوڭلارغا $100\sim130\text{mg}/\text{m}^2$ ، كۈنگە بىر قېتىم، ئۇدا ئۇچ كۈن ۋېناغا تېمىتىلدۇ. ھەر ھەپتىدە ئۇچ كۈن تەكار ئىشلىتىلدۇ.

【ناچار تەسىرى】 يىلىك تورمۇزلىنىش، قان پىسىم شىددەت بىلەن تۆۋەنلەش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، زىيادە سەزگۈرلۈك، چاج چۈشۈش، شىللىق پەرەدە ياللۇغى، ۋېبا ياللۇغى قاتارلىقلار كۆرۈلدۈ.

【دىقىقتى قىلىدىغان ئىشلار】 ۋېنادىن دورا بەرگەندە يەرلىك ئورۇنىڭ نېڭرۇزلىنىشىدىن ساقلىنىش ئۇچۇن دورىنى قان تۆمۈرنىڭ سىرتىغا چىقىرۇۋېتىشكە بولمايدۇ؛ ئادەتتە ۋېناغا تېمىتىش ۋاقتى $2h \sim 1.5$ بولىدۇ؛ قان رايىنى قەرەللىك تەكشۈرۈپ تۇرۇش كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ۋۇمون ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. ئۆكۈلى: ھەر ئامپۇلى $50\text{mg}/5\text{ml}$ ، قاپ/10 ئامپۇل.

ۋىنكرىستىن

(长春新碱, Vincristine)

【باشقا نامى】 ئونكۈۋىن (安可平, Oncovin) ، ۋېلىبى (Velbe) (癌备，Oncovin) . ۋەنكرىستىن (VCR) . 醛酣基长春碱 .

【ئاساسىي تەركىبى】 ۋېنكرىستىن سۇلغات.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ھۇجەيرە مىكرو نىيچە ئاقسىلى بىلەن بىرىكەلەيدۇ، ئاقسىلىنىڭ مېتابولىزملەنىشىغىمۇ توسقۇنلۇق قلىيدۇ ۋە DNA پولىمېرازانىڭ ئاكتىپچانلىقىنى تورمۇزلاپ، ھۇجەيرە پەردىسىدىكى ياغىمان ماددىنىڭ سىنتېزلىنىشى ۋە ئامىنۇ كىسلاقاتانىڭ ھۇجەيرە پەردىسىدىكى يۆتكىلىشىنى تورمۇزلايدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكلىر】 ئۆتكۈر، سوزۇلما

خاراكتېرىلىك ئاق قان كېسىلى، كىچىك ھۇچەيرلىك ئۆپكە راكى، ئەمچەك راكى، يامان سۈپەتلىك لىمغا ئۆسمىسى، تۈخۈمدان راكى، يامان سۈپەتلىك قارا پىگەنلىق ئۆسمىسى، ھەزمىم يولى راكى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 25 μ g ياكى 1.4mg/m² ~ 1 كۈنىڭ بىر قېتىم ۋېباغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، بىر قېتىملىق مىقدارى 2mg دىن ئاشورۇ ۋۆتىلمىدۇ، بىر داۋالاش مۇددىتىنىڭ ئومۇمىي مىقدارى 20mg بولىدۇ، فزئۇلولوگىلىك تۇز سۇيي ياكى 5% لىك گلۈكۈزا ئوكۇل سۈيۈقلۈقىدا ئېرىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 نېرۋا سىستېمىسىنى زەھەرلىشى بىر قەدەر كۆرۈنەرلىك بولىدۇ، يىلىكى تورمۇزلىشى ۋە ئاشقازان - ئۆچەي رېئاكسىيىسى بىر قەدەر يېنىك بولىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەئى قىلىنىدىغان ئەھۇللار: ھامىلدار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىشلىتىلمىدۇ. ② باشقىلار: ئىككى ياشتىن تۆۋەن باللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ، بۇ دورا راك، خىربى ھامىلە پەيدا قىلىشى مۇمكىن؛ بۇ دورىنى مۇسکۇلغا، تېرە ئاستىغا، غىلاپقا ئوكۇل قىلىشقا بولمايدۇ. كۆز گە ئېگىپ كەتسە بولمايدۇ. ئوكۇل قىلىنىۋاتقان سۈيۈقلۈق قان تومۇر سىرتىغا چىقىپ كەتسە، ئوكۇل قىلىشنى دەرھال توختىتىش كېرەك.

【ياسالمىسى ۋە ئۆلچەمى】 ئونكۈشىن گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. ئوكۇلى: ئامپۇل/1mg. ئۆپلىي ئامپۇل/10mg.

ۋېنblastine (长春碱, Vinblastine)

【باشقا نامى】 ۋېنblastin سۇلغات (VLB, 硫酸长春碱)

【ئاساسىي تەركىبى】 ۋېنblastin سۇلغات.

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ئاساسلىقى ھۇچىرىم مىكرو نىيچە ئاقسىلىنىڭ توپلىشىنى تورمۇزلاش ئارقىلىق، سېنىدل مىكرو نىيچەنىڭ (纺锤体微管) ھاسىل بولۇشىغا كاشلا قىلىپ، يادرونىڭ پارچىلىنىشىنى ئوتتۇرا دەۋرىدىلا توختىتىپ، يادرونىڭ

بۇوهە كېلىك ئۆزگىرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىدەر】 يامان سۈپەتلىك لىمفا ئۆسمىسى، ئۇرۇقدان ئۆسمىسى، تئۇتلىق پەرەد ئۇستۇنکى تېرە راكى، غەيرىي تۇرەلمە ئۆسمىسى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلارنىڭ ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا $150\mu\text{g}$ ، باللارنىڭ ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا $250\mu\text{g}$ ياكى بىر قېتمىدا 5mg ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ ياكى ۋېناغا تېمىتىلىدۇ. ۋېناغا تېمىتىش ئۇنۇمى ۋېناغا ئوكۇل قىلغاندىن ياخشى بولىدۇ. ھەپىتىدە بىر قېتمىم، چوڭلارنىڭ ئومۇمىي مىقدارى $80\text{mg} \sim 60$ بولۇپ، بىر داۋالاش مۇددىتى قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 نېرۇا زەھەرلىنىش، يىلىك تورمۇزلىنىش، تۇخۇمدان ياكى ئۇرۇقدان فۇنكىسىسى تورمۇزلىنىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، قايىتا - قايىتا ئوكۇل قىلىنسا قان نۆكچىسى خاراكتېرلىك ۋېنابى ياللۇغى ئوڭاي پېيدا بولىدۇ. ئاشقازان، ئۇچىي رېئاكسىسىسى بىر قەدەر يېنىك بولۇپ، ئاساسلىقى كۆكۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، قورساق ئاغرىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، چاج چۈشۈش ۋە ئۇيقوسلىق قاتارلىقلارمۇ پېيدا بولىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: بلېئومىتسىن (博来霉素，Sisplatin) بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، ھاياتقا ئېغىر دەرىجىدە خەۋىپ يەتكۈزىدىغان يۈرەك قان تومۇر زەھەرلىنىش رېئاكسىسىنى ئوڭاي كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ؛ مىتومىتسىن (C丝裂霉素) بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، ئۆپكىنى زەھەرلەيدۇ، شۇنداقلا ھاياتقا تەھدىت سالىدىغان كانايىچە سپازمىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ② مەئى ئىلىنىدىغان ئەھۋالار: ھامىلدار ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 ۋېنېلاستىن سۇلغات ئاۋسەترالىيىدە ئىشلەنگەن. ئوكۇلى: ھەر ئامپۇلى $10\text{mg}/10\text{ml}$.

ترىپتۇرېتىن (曲普瑞林，Triptorelin)

【باشقا نامى】 دىفېرېلىن (Dipherelin)

دېكاپېپتيل (Decapeptyl) (达必佳).

【فاساسيي تەركىبى】 تريپتوريتىن.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورىنى ئىشلەتكەن دەسلەپكى مەزگىلىدە قىسقا ۋاقت ئىچىدە ھېپوفىز جىنسىي بەزنى قوزغانقۇچى ھورمون (腦垂体促性腺激素) نىڭ ئاچرىلىشنى ئاشۇرۇدۇ، كېيىنچە ھېپوفىز جىنسىي بەزنى قوزغانقۇچى ھورموننى تورمۇزلاش ئارقىلىق ئۇرۇقدان ۋە تۇخۇمداننى تىزگىنلەش رولىنى ئوبىنайдۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىكەر】 مەزى بېزى راكى، بالىيانقۇ ئىچكى پەردىسى غەيرىي ئورۇنلىشىش، بالىلارنىڭ جىنسىي ئىقتىدارى ھەققىي بالىدور يېتىلىش.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مەزى بېزى راكى: 3.75mg ھەرقېتىملق ھەيزنىڭ 28 - كۈنى ئاستا ئۇنۇملۇك ياسالىمىدىن ياسالىمىدىن كېلىش ئالدىدىكى بەش كۈن ئىچىدە، ئاستا تىسرىلىك ئورۇنلىشىش: ھەيز كېلىش ئالدىدىكى بەش كۈن ئىچىدە، ئاستا تىسرىلىك ياسالىمىدىن 3.75mg نى مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلىشنى باشلاپ، كېيىن ھەر 28 - كۈنى بىر قېتىم مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، ئاز بولغاندا تۆت ئاي ئىشلىتىلىدۇ، كۆپ بولغاندا ئالىت ئايىغىچە ئىشلىتىلىدۇ؛ ئاياللارنىڭ تۇغما سلىق كېسلىگە: ھەيزنىڭ 2 - كۈنى ئاستا تىسرىلىك ياسالىمىدىن 3.75mg مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، ھېپوفىزنىڭ سىزگۈزۈكى يوقالغاندىن كېيىن جىنسىي بەزنى قوزغانقۇچى ھورمون (促性腺激素) نى بىرلىكتە ئىشلىتىشكە بولىدۇ، ئادەتتە مەزكۈر دورىنى ئوكۇل قىلىپ 15 كۈندىن كېيىن ئىشلىتىلىدۇ؛ بالىلاردىكى جىنسىي ئىقتىدارى بالىدور يېتىلىش: ھەر kg بىدەن ئېغىرىلىقىغا ھەر تۆت ھەپتىدە بىر قېتىم مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئەرلەر دە داۋالاشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە بىزىدە كلىنىكلىق ئالامەتلەر ئېغىر بولىدۇ؛ ئاياللاردا ھۆل ئىسىق، جىنسىي يول قۇرغاقلىشىش، باش ئاغرىش ۋە دەرمانسىزلىق كۆرۈلىدۇ؛ قىز بالىلاردا بىزىدە يېنىك دەرىجىدە جىنسىي يول قاناش پىيدا بولىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 بىئولوگىيلىك، كلىنىكلىق ۋە رادئۋاكتىپلىق نۇردا قانۇنىيەتلىك تەكشۈرۈش لازىم. 【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 دەپەرپلىن فرانسييىدە ئىشلەنگەن. ئوكۇل: ئامپۇل/3.75mg، قاب/100 ئامپۇل.

دېكاپېتيل گېرمانييىدە ئىشلەنگەن. تەسىرى تىزگىنلىنىدىغان ئوکۇلى: ئامېپۇل/3.75mg، قاپ/1 ئامېپۇل، قاپ/3 ئامېپۇل، قاپ/7 ئامېپۇل.

تاموكسېفېن (他莫昔芬， Tamoxifen)

【باشقا نامى】 三苯氧胺， نولۋادېكس (Nolvadex) (诺瓦得土， Tamofen).

【ئاساسىي تەركىبى】 تاموكسېفېن.

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورىنىڭ ئانلىق هورمونغا قارشى تەسىرى بولۇپ، ئۆسمە ئۇرۇنىدىكى ئانلىق ھورمون ئاكسېپتۈرى بىلەن بىرىكىپ، ئۆسمە ھۈچەيرسىنىڭ ئۆسۈشىنى تۈرمۈزلايدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 ھەيز كېسىلىشنىڭ ئالدى كىينىدىكى ئەمچەك راکى، كۆچمە ئەمچەك راکىغا ئۇنۇم بېرىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەرقىتىمدا 20mg ~ 10، كۇنىڭ 2 ~ 1 قېتمى ئىچىلدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان - ئۇچىي يولى رېئاكسىيىسى، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، يۈز قىسىمى قىزىرىش، ئاياللار سىرتىنى جىنسىي ئىزاسى قىچىشىش، جىنسىي يول سېزىمى گاللىشىش، جىنسىي يولدىن سۈيۈقلۈق ئېقىش، ئەتراب نېرۇا ياللۇغى، چاچ چۈشۈش، ئاق قان ھۈچەيرىسى كېمىيىش، قان پلاستىنكلىرى تۆۋەتلەش، باش ئاغىرىش، بىدەندە سۈيۈقلۈق يىغىلىپ قاتارلىقلار كېلىپ چىقىدۇ. دورىنى ئۆز ئۇنچە كۆپلەپ ئىشلەتكەندە كۆرۈش تور پەردىسىگە تەسىر يېتىپ، كۆرۈش قۇۋۇنى ئاجىزلىشدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنى ئىلىنىدىغان ئەھۋاللار: ھامىلىدارلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: قان راىي، جىنگەر ۋە بۇرەك فۇنكسىيىسى نورمالسىز لارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى؛ سۆڭكە مەنبەلىك يۆتكىلىشكە گىرپىتار بولغانلاردا بۇ دورىنى ئىشلىتىپ داۋالاشرىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە قاندا كالتسىي يۇقىرىلاش كېسىلى پەيدا

بوليديغانلىقى بايقالدى.

【ياسالميسى ۋە ئۆلچىمى】 三苯氧胺 Finlanndiyidه ئىشلەنگەن.

تابلىتى: تابلىت/10mg، بوتولكا/100 تابلىت.

نولۇادپىكى ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىتى: تابلىت/10mg،

تابلىت/20mg، قاپ/30 تابلىت.

تاموفېن فنلاندىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىتى، تابلىت/10mg،

بوتلوكا/100 تابلىت.

ئىفوسفامىد

(异环磷酰胺, Ifosfamide)

【باشقانامى】 ھولوكسان (和乐生, Holoxan)

(乐沙定, Eloxatin)

【ئاساسىي تەركىبى】 ئىفوسفامىد.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ سىكلوفوسفامىد

(环磷酰胺) نىڭ ئىزۈمۈرى بولۇپ، تەسىرى سىكلوفوسفامىدا ٹوخشىپ

كېتىدۇ. ئاساسلىقى بۇرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ. $t_{1/2} \sim 7\text{ h}$

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 ئۆپكە راكى، تۇخۇمدان

راكى، ئۇرۇقدان ئۆسمىسى، يۇمشاق توقۇلما ساركومسى، ئەمچەك راكى،

ئاشقازان ئاستى بېزى راكى، بالىياتقۇ ئىچكى پەرde راكى ۋە يامان

سوپەتلىك لىمفا ئۆسمىسىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش مۇسۇلى ۋە متىدارى】 ۋېنىغا ئوكۇل

قلىنىدۇ. هەربىر داۋالاش مۇددىتىدە هەر kg بەدەن ئېغىرىلىقىغا

$\sim 250 \text{ mg}$ ئىشلىتىلىدۇ. ئادەتتە كۈنگە هەر kg بەدەن ئېغىرىلىقىغا

$\sim 60\text{ mg}$ ، ئۇدا بەش كۈن ئىشلىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، چاچ چۈشۈش،

يسلىك زەخىلىنىشكە قوشۇلۇپ كەلگەن ئاق قان ھۈجەيرىسى ۋە قان

پلاستىنکىلىرى كېمىيش، ئىممۇنت تورمۇزلىنىش، دوۋساق ياللۇغى،

ھېپوفىز ئىقتىدارى تو سۇقۇنلۇققا ئۇچراش قاتارلىقلار كۆرۈلدى، بۇرەك

ئىقتىدارى زەخىلىنىش تاسادىپىي پەيدا بولىدۇ.

【دىقىدت قىلىدىغان ئىشلار】 دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى:

سىسپلاتن (顺氯胺铂) بىلەن داۋالىنىڭ ئاقنالاردا بۇ دورىنىڭ نېرۇنى زەھەرلىشى، قاننى ۋە بۇرەكىنى زەھەرلىشى ئېغىرراق بولۇشى مۇمكىن. قان ئۇيۇشقا قارشى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەنде، قاناش خەترى يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن، قاندىكى شېكىر مىقدارىنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلار بىلەن بىلە ئىشلەتكەنде، قاندىكى شېكىر مىقدارىنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلارنىڭ قاندىكى شېكىر مىقدارىنى تۆۋەنلىقىش تەسىرى كۈچىيەدۇ. «ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى» ئېلوساتىن فرائىسييە ئىشلەنگەن. ئوکۇلۇ: بوتۇلوك/ 50mg.

دوكسىفلورىدىن (去氧氟尿苷，Doxifluridine)

【ئاساسىي تەركىبى】 دوكسىفلورىدىن.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ بىر تۈرلۈك فلۇئوروئۇراتىسل (氟尿嘧啶) تۈرىنىڭ تۇغۇندىسى بولۇپ، تەسىرى فلۇئوروئۇراتىسل بىلەن ئوخشاش، ئىچكەندىن كېيىن تېز سۈمۈرۈلىدۇ، ئەسلى دورا $2h \sim 1$ دىن كېيىن Cmax $1\mu\text{g}/1\text{ml}$ گە بىتىدۇ. «مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر» ئەمچىك راکى، ئاشقازان راکى، بوغماق ئۇچىمى ۋە تۆز ئۇچىمى راكىغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىقىش تۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئادەتتە بىر كۈنلۈك ئومۇمىي مىقدارى $800 \sim 1200\text{mg}$ بولۇپ، $4 \sim 3$ قېتىمغا بولۇپ ئىچىلىدۇ ھەمde ياش پەرقى، ئالامەتلەرنىڭ قاراپ مۇۋاپىق كۆپەيتىشكە ياكى كېمەيتىشكە بولىدۇ ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىشلىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 بەزىدە قان سىيىش، ئاقسىللەق سۈيدۈك، BIL، ALP، GPT، GOT، BUN كۆكىرەك قىسىمى بېسىلىش سېزىمى، ئېلىكتروكارديوگرامما نورمالسىزلىق، قورساق ئاغرىش، ئىچ سۈرۈش، كۆڭۈل ئېلىشىش، ئىشتىها تۇتۇلۇش، ئېبىخىز بوشلۇقى ياللىقى، كۆكىرەك قىسىمى يېقىمىسىزلىنىش، قورساق كۆپۈش، ئۇسساش، جاۋىغاي ياللىقى، يۇرەك ئالدى رايونى ئاغرىش، قەۋزىيەت، قورساق كۆپۈش، قىزىش، يۇتقۇنچاق، كېكىرەك يېقىمىسىزلىنىش، كۆز چارچاش قاتارلىقلار پېيدا بولىدۇ؛ قان

پلاستنکلری کېمیيىش، قان ئازلىق، چارچاش، قىدىمى دۇرۇس بولماسلق، يۆنلىشنى پەرق ئېتىش تو سقۇنلۇققا ئۇچراش، سۆزدەش ئىقتىدارى تو سقۇنلۇققا ئۇچراش، تەم سېزىمى چېكىنىش، پىغمېنت ئولتۇرۇشۇش، بەدەن كۈيۈشۈش، چاج چۈشۈش، ئەسۋە چىقىش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلدۈ، نۇرغا زىيادە سەزگۈرلۈك رېئاكسىيىسى كەم كۆرۈلدۈ، بۇ دورىغا ئوخشىپ كېتىدىغان بىرىكىملەرنىڭ مېڭە ئاق ماددىسى كېسىلى پەيدا قىلىدىغانلىقىغا ئائىت مەلۇماتلار بار.

【دىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: سورىۋۇدىن (Sorivudine) گە فلوئوروئوراتسىل تۈرىدىكى دورىلار بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىلسە، فلوئوروئوراتسىل تۈرىدىكىلىرنىڭ مېتابوليزملەنىشى تورمۇزلىنىپ، قاندىكى FU - 5 نىڭ قويۇقلۇقى ئۆرلەيدۇ ھەمدە ئېغىر دەرىجىدە قان فۇتكىسييىسى تو سقۇنلۇققا ئۇچراشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. باشقا ئۆسمىگە قارشى دورىلارغا بىرلەشتۈرۈپ ئىشلىتىلسە، يىلىك تورمۇزلىنىش قاتارلىقلار كېلىپ چىقىشى مۇمكىن. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھەللار: بۇ دورىغا ئېغىر دەرىجىدە زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بارلار ھەمدە سورىۋۇدىن (Sorivudine) ئىشلىتىۋاقنانارغا ئىشلىتىلمىيدۇ. ③ باشقىلار: بالا ئېمتىۋاتقان ئاياللارغا ئەڭ ياخشى ئىشلەتمەسىلىك كېرەك.

【ياسالىمىسى وە ئۆلچەمى】 فۇرتوتون يابونىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانە/100mg، قاپ/100 دانە، دانە/200mg، قاپ/100 دانە.

ئادرىئامىتسىن (阿霉素，Adriamycin)

【باشقا نامى】 دوكسورۇبىتسىن (Doxorubicin) (多柔比星).
【ئاساسىي تەركىبى】 ئادرىئامىتسىن ھيدروخلورىد.
【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ھۈچىريلەرنى كۈچلۈك زەھرلەش تەسىرىگە ئىنگە، ئاساسلىقى ئادرىئامىتسىن مولكۇلىسى DNAغا كىرىشىپ نۇكلىئىك كىسلاتا (核酸) نىڭ سىنتېزلىنىشىنى تورمۇزلايدۇ، ۋېناغا ئوکۇل قىلىنغاندىن كېيىن، جىگەر، تال، بۆرەك، ئۆپكە ۋە يۈرەككە كەڭ تارقىلىدۇ، ئاساسلىقى جىگەر دە مېتابوليزملەنىدۇ،

بېڭە قان تو سۇقىدىن ئۆتكەلمىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 كۆپ خىل ئۆسمىگە ئىشلىتىلدى، ئۇلار ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئاق قان كېسىلى، لىمفا ئۆسمىسى، يۇماشقا توقۇلما ۋە سۆڭىك هاسىل قىلغۇزچى ساركوما، بالىلار يامان سۇپەتلىك ئۆسمىسى ھەمدە چوڭلار ئۇنىل ماددا ئۆسمىسى، بولۇپمىۇ ئەمچەك راكى ۋە ئۆپكە راكى قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 بۇ دورا ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ ياكى ۋېناغا تېمىتىلدى. بىر داۋا اش مۇددىتىنىڭ دائىمىلىق مىقدارى $60\text{mg}/\text{m}^2$ ~ 40 بولۇپ، ئارىلاپ دورا بېرىلىدى، ئۇچ ھەپتە بىر داۋا اش مۇددىتى قىلىنىدۇ، ئۇمۇمىي دورا مىقدارى $450\text{mg}/\text{m}^2$ دىن ئاشۇرۇ وۇپتىلىمەيدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش، ئېغىز بوشلۇقى ياللۇغى، قان پلاستىنكلىرى ۋە ئاق قان ھۈجىرسى كېمىيىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. يۈرەكىنى كېچىكىش خاراكتېرىلىك زەھرلەيدۇ، ئېغىز بولغاندا يۈرەك زەئىپلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئاز ساندىكى بىمارلاردا قىزىش، قاناش، تېرىگە پىكىرىتتى ئولتۇرۇشۇش ۋە جىڭىر فۇنكىسىسى زەخىلىنىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.

【دەقىقتە قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: «بىمارىن (肝) بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: پاراھيدروكسبېنزوۋات (对羟基苯甲酸酯)قا زىياەد سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: قان رائى، جىڭىر فۇنكىسىسى ۋە ئېلىكتىرۇكاردىئوگرامىنىڭ ئۆزگىرىشىنى تەپسىلىي كۆزىتىپ، نورمالىسىز ئەھۋال كۆرۈلسە دورىنى توختىتىش لازىم، مەزكۈر دورىنى تېرىه ئاستى ياكى مۇسکۇلغَا ئوکۇل قىلىشقا بولمايدۇ، ۋېناغا ئوکۇل قىلغاندا دورا سۈپۈقلۈقىنىڭ قان تومۇر سىرتىغا چىقىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، بۇ ئارقىلىق توقۇلمىلارنىڭ زەخىلىنىشى ۋە ئېكروزلىنىشدىن ساقلىنىش، باشقىا دورىلار بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشىن ساقلىنىش، ئېرىتكەندىن كېيىن ئىمكانتىدەر تېزدىن ئىشلىتىش كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ئادرىئامىتىسىن ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇل سۈپۈقلۈقى: ئامپۇل/10mg.

مېتوترېكسات (甲氨蝶呤，Methotrexate)

【باشقا نامى】 تربكسان (Trexan) . (川桑)

【ئاساسىي تەركىبى】 مېتوترېكسات.

【فارماکولوگىسىك ئالاھىدىلىكى】 ئانتىمبتابولىتلىق راكتا قارشى دورا بولۇپ، دىھيدروفولات رېدوكتازا (二氢叶酸还原酶) نى رىقابىت خاراكتېرىلىك تورمۇزلاش ئارقىلىق ھۈجمىرىگە بولغان زەھەرچانلىق رولىنى جارى قىلدۇرىدۇ، بۇ خىل فېرمېنت فولىك كىسلاتا (叶酸) نى ئوكسىدسىزلاپ، تېتراھيدروفولىك كىسلاتا (四氢叶酸)غا ئايلاندۇرۇپ، DNA نىڭ سىنېپىزلىنىشى ۋە ھۇجەيرىنىڭ كۆپپىشىنى توسىقۇنلۇققا ئۈچۈرىتىدۇ. ۋېنادىن دورا بىرگەندە ياكى مۇسکۇلغَا ئوکۇل قىلغاندا تەختىتىن 50% دورا قان پلازما ئاقسىلى بىلەن ئەسلەنگە يېنىشچان بىرىشكىدۇ، ئادەتتىكى دوزىدا، بۇ دورا بەدەندە روشن مېتابولىزم ملانمايدۇ، ئاساسلىقى بۇرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئايىرم ئىشلەتكەندە ئەمچەك راكى، هامىلدارلىقتىكى تېۋەتلىق پەرەدە راكى، ئۆزۈمىسمان تۆرەلمە ياكى يامان سۈپەتلىك ٹۈزۈمىسىمان تۆرەلمىنى داۋالايدۇ. بىرلەشتۈرۈپ ئىشلەتكەندە ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئاق قان كېسىلى، Burkitts لىمغا ئۆسمىسى، ئاخىرقى دەۋرلىك لىمغا ساركومسى ۋە ئاخىرقى دەۋرلىك موگۇسىمان زەمبۈرۈغ كېسىلىنى داۋالايدۇ، بۇ دورىنى كۆپ مىقداردا ئايىرم ياكى باشقا دورىلار بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئىشلەتكەندە، سۆڭەك ھاسىل قىلغۇچى ساركوما، ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئاق قان كېسىلى ياكى باش ۋە بويۇن قىسىمى ئېپتېلىيە راكىنى داۋالايدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مۇسکۇلغَا ئوکۇل قىلىنىدۇ، ۋېنا ياكى غىلاب ئىچىدىن دورا بېرىشكە بولىدۇ. ھېپپرتونىك ئېرىتىمىسى (高滲溶液) نى غىلاب ئىچىنگە ئوکۇل قىلىشقا بولمايدۇ. تېۋەتلىق پەرەدە راكى ۋە ئېپتېلىيىسىمان كېسەللىكلىر: كۈنىگە 30mg ~ 15 مۇسکۇلغَا ئوکۇل قىلىنىدۇ، داۋالاش مۇددىتى بېش كۈن بولىدۇ. ئادەتتە 5 ~ 3 داۋالاش كۈرسى بولسا بولىدۇ. ئەمچەك راكى: 40mg/m²، بىرىنچى كۈنى

ۋە سەككىزىنجى كۈنى ۋېنادىن دورا بېرىلىدۇ. ئاق قان كېسىلى: ھەر كۈنى $3.3\text{mg}/\text{m}^2$ ئىچىلدى، كۈنگە پرېدىنزوون (强的松) دىن $60\text{mg}/\text{m}^2$ دىن $30\text{mg}/\text{m}^2$ ئۆزگەرتىلىدۇ، يەنى ھەپتىدە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا ئىچىلدى ياكى مۇسکۇلغا ئوکۇل قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاق قان ھوجىرىسى كېمىيىش، قان پلاستىنكلىرى ئازىيىش، قان ئازلىق، گامما شار ئاقسىلى كېمىيىش، كۆپ ئورۇندىن قان چىقىش، سېپتىتسېمىيە، قىزىل داغ، قىچىشقاق، يەلتاشما، قان قېيىش دېغى، قىل قان تومورلار كېڭىيىش، دانخورەك ۋە چىقىان چىقىش قاتارلىقلار كۆرۈلدۇ. يەنە چىش مىلىكى ياللۇغى، يۇتقۇنچاق ياللۇغى، ئاشقازان ياللۇغى، كۆڭۈل ئېلىشىش، ئىشتىماسىزلىق، قۇسۇش، ئىچ سۇرۇش، قان قۇسۇش، قارا تەرەت قىلىش، ھەزمىم يولى يارسى، ئۇچىدى ياللۇغى كۆرۈلدۇ، ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك جىڭەر يېڭىلەش ۋە نېكروزلىنىش، جىڭەر ياغلىشىش، قاپقا ۋېنا تالالىشىش ياكى جىڭەر قېتىش قاتارلىق جىڭەر زەھەرلىنىش ئىپادىلىرى كۆرۈلدۇ. يۇقىرىقلاردىن سىرت، بۆرەك زەئىپلىشىش، ئازوتلۇق قان كېسىلى، دوۋساق ياللۇغى، سۇيدۇكتىن قان كېلىش، تۇخۇم ياكى ئۇرۇق ئازىيىش، قىستا مۇددەتلىك ئىسپېرما كېمىيىش، ھەيز قالايمىقانلىشىش، توغماسلق، بوبىدىن ئاجراش، تېغىز بۆرەك كېسىلى قاتارلىقلارمۇ كۆرۈلدۇ. يەنە باش ئاڭىرىش، باش قېيىش، كۆرۈش خىرەلىشىش، گەپ قىلالماسلق كېسىلى، يېنىك دەرىجىدىكى يارتا بالەچلىك ۋە تارتىشىش قاتارلىقلارمۇ كۆرۈلدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: سالتسىلىك كىسلاتا تۇزى، سىتپروئىدىسىز ياللۇغا فارشى دورىلار (非甾体抗炎药)， سۇلغانلىمید (磷胺)， فېنتۇئىن (苯妥英)， تېتراتسىكلين (四环素)， خلورومىستېپتن (氯霉素)، پارائامىنوبىنزوئىك كىسلاتا (对氨基苯甲酸) قاتارلىق دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكىدە دورىلارنىڭ يوشۇرۇن زەھەرچانلىقى كېلىپ چىقىدۇ. ② مەنىنى قىلىنىدىغان ئەھەللار: بۆرەك فۇنكسييىسى زەخىملەنگەنلەر، ھامىلىدارلار، ئۇزۇقلۇنىش ناچارلاشقاڭلار، جىڭەر، بۆرەك فۇنكسييىسى ناچارلاشقاڭ ياكى قان كېسەللىكلىرى ئەگىشىپ كەلگەنلەرگە

ئىشلىتىلمىيدۇ. ③ باشقىلار: داۋالاشتىن ئىلگىرى ۋە داۋالاش جىريانىدا بۇرەك ۋە جىڭەر فۇنكسييسىنى تەكشۈرۈش كېرەك. **【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】** مېتوترپكسات ئاۋسەتلىكىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇل سۇيۇقلۇقى: 25mg/1ml، ھەر قىبپى 1/2ml ئامپۇل، ھەر قىبپى 1/20ml 1 ئامپۇل. مېتوترپكسات ئاۋسەتلىكىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇل: ھەر ئامپۇل 500mg/20ml ترپسان فىنلاندىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇل سۇيۇقلۇقى: 25mg/ml، بوتۇلكا/20ml، قاپ/1 بوتۇلكا.

مېسنا

(美斯那，Mesna)

【باشقۇ نامى】 美安
【ئاساسىي تەركىبى】 مېسنا.
【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىك】 يۇقىرى دوزىلىق ئىفوسمامىد (异环磷酰胺) ياكى سىكلوفوسفامىد (环磷酰胺) نىڭ زەھەرلىك مېتاپولىزم ھاسلاتى بىلەن رېڭاكسىيىگە كىرىشكەندىن كېيىن، زەھەرسىز مەھسۇلات ھاسىل بولۇپ، سۇيىدۇك ئارقىلىق تىز سۈرگۈتتە چىقىرىلىپ، خىمىيلىك داۋالاش كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان قاناشچان دوۋساق ياللىقى قاتارلىق سۇيىدۇك ئاچىرىتىش سىستېمىسى ئېپتېلىيىسىگە بولغان زەھەرچانلىقىنىڭ ئالدىنى ئالدى. بۇ دورا ئوکۇل قىلىنغاندىن كېيىن، $t_{1/2}$ 1.5h تەخمىنەن بولىدۇ.
【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 ئۆسمىگە قارشى خىمىيلىك داۋالاش دورسى ئىفوسمامىد ياكى سىكلوفوسفامىد بىلەن بىرگە ئىشلىتىپ، سۇيىدۇك ئاچىرىتىش سىستېمىسىنى قوغىنخۇچى دورا قىلىنىدۇ.
【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا تېمىتىلىدۇ. دائىملىق مىقدارى خىمىيلىك داۋالاش دوزسىنىڭ 20% بولۇپ، ئۆچ قېتىمغا بولۇپ خىمىيلىك داۋالاش بىلەن بىرگە، خىمىيلىك داۋالاشتىن كېيىنلىكى 4h، 8h تە ۋېناغا تېمىتىلىدۇ.
【ناچار تەسىرى】 داۋالاش مىقدارى بويىچە دورا بېرىلسە، ئادەتتە

ناچار تەسلىرى كۆرۈمىدۇ. مىقدارى هدر kg بىدهن ئېغىرلىقىغا ~ 60mg 70 دن ئىشىپ كەتكىنده، ئۇدا بىر نەچچە كۈن ئىشلىتىلسە، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، سپاز مىلىق قورساق ئاغىرش، ئىچ سۈرۈش قاتارلىقلار پەيدا بولىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 مەزكۈر دورا پەقت خىمېلىك داۋالاش دورىلىرىنىڭ سۈيۈك ئاجىرىتىش سىستېمىسىنى زەخىملەندۈرۈشىدىن قوغداش رولىنى ئۇينىدۇ.

【ياسالىممىسى ۋە ئۆلچەمى】 مېسنا گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. ئۆكۈل سۈيۈقلۈقى: هدر ئامپۇلى 400mg/4ml، قاپ/15 ئامپۇل.

فېنلىئالانن مۇستارد (苯内氨酸氮芥, Phenylalanine Mustard)

【باشقۇ نامى】 ئالكېران (爱可兰, Alkeran), مېلفالان 马法兰, (美法仑, Melphalan)

【ئاساسىي تەركىبى】 فېنلىئالانن مۇستارد.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا بىر خىل قوش ئىقتىدارلىق ئالكىلاشتۇرغۇچى دورا بولۇپ، دېئوكسى رىبۇنۇكلىپىشكى كىسلاتسىدىكى تىئوگۇزاندىن (硫鸟嘌呤吟) نىڭ 7 - ئازوتى بىلەن كۆۋالپىنتىلىق بىرىكىش ئارقىلىق ئالكىللشىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئىككى دانه دېئوكسى رىبۇنۇكلىپىشكى كىسلاتا قاچىلانما تۇتىشىپ، ھۈجىرە رىپلىكتاسىسيسى (ھۈجىرەلەرنىڭ قايتا ياسىلىشى) نى توسىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىر】 كۆپ ئورۇندا پەيدا بولىدىغان يىلىك ئۆسمىسى، ئاخىرقى دەۋرىلىك تۇخۇمدان بىزى راكى، ئەمچەك راكى، يامان سۇپەتلىك قارا پىگەپتىن ئۆسمىسى، يۇمشاق توقۇلما ساركومىسى، ھەققىي قىزىل قان شارچىسى كۆپپىش كېسىلى، بالسلىاردىكى ئاخىرقى دەۋرىلىك نېرۋا ئانا ھۈجىرە ئۆسمىسىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۆپ ئورۇندا پەيدا بولىدىغان يىلىك ئۆسمىسى: كۈنگە هدر kg بىدهن ئېغىرلىقىغا 0.15mg 40mg قوشۇپ ئىچىلىدۇ. دورا پىرىنىزون (强的松) تابلىتكىسىدىن كۈنگە تابلىتكىسىدىن كۈنگە 0.15mg قوشۇپ ئىچىلىدۇ.

ئىشلىتىپ 6 ~ 4 ھەپتىدىن كېيىن ئىككىنچى داۋالاش باسقۇچى ئېلىپ بېرىلىدۇ. باشقا ئۆسمىلەرگە كۈنگە 8mg ~ 2 ئىچىلىدۇ. كۈنلۈك ئەڭ يۇقىرى مىقدارى 10mg، ئومۇمىي مىقدارى 100mg ٹەتراپىدا بولىدۇ. «ناچار قەسىرى» يىلىك تورمۇزلىنىش، كۆڭۈل ئىلىشىش، قۇسۇش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، ئاشقازان ياللۇغى، داغلىق دۆڭچە ئەسۋە، قىچىش قاتارلىقلار ئىنتايىن ئاز كۆرۈلىدۇ.

【دېقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تىسىرى: ئۆپپراتىسىدىن كېيىن سىكلوفوسفامىد بىلەن بىرگە ئىشلەتسە بۆرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولماسىق كېلىپ چىقىدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا زىيادە سىزگۈرلۈك تارихى بارلارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ئالكىران ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى، 2mg، قاپ/25 تابلىپ.

كالتسىؤم لېئۇكۈۋورىن (甲酰四氢叶酸钙, Calcium Leucovorin)

【باشا نامى】 كالتسىؤم فولىنات (Calcium Folinate) ئانترپكس (安叶酸钙, Antrex) . 甲叶钙, 确昧力, 立可林 (Antrix) .

【ئاساسىي تەركىبى】 كالتسىؤم لېئۇكۈۋورىن. «فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىتلىكى】 بۇ دورا فولىك كىسلاتانىڭ بەدەندىكى ئاكىتپلاشقان شەكلى بولۇپ، زىيادە مىقداردىكى فولىك كىسلاتانى بىلەن قارشىلاشقۇچى ماددىلارنىڭ بەدەندىنى زەھەرلەش رېئاكسىيىسىنى «قاييتۇرۇش» تىسىرىگە ئىنگە. مېتوترپكسات (甲氨蝶呤) نىڭ نورمال ھۆجەيرىلەرنى زەخىمىلەندۈرۈش دەرىجىسىنى چەكلەيدۇ، ئۆز ئارا رىقابەتلەشىش تىسىرى ئارقىلىق مېتوترپكساتنىڭ يىلىك ۋە ئاشقازان، ئۇچىي شىللەق پەرسىگە بولغان رېئاكسىيىسىنى قاييتۇرالايدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 فولىك كىسلاتانى بىلەن قارشىلاشقۇچى دورىلارنىڭ زەھەرسىز لەندۈرگۈچىسى قىلىنىدۇ، ئېغىز ياللۇغى مەنبەلىك ئىچ سۈرۈش، ئۆز ئىلىشىش ناچارلىشىش، ھامىلدارلىق مىزگىلى ياكى بۇۋاقلىق مەزگىلىدە پەيدا بولىدىغان زور گۆدەك قىزىل قان

هۇجەيرىلىك قان ئازلىقىمىۇ ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 زور گۆدەك قىزىل قان ھۇجەيرىلىك قان ئازلىق: 1mg كۈنگ بىر قېتىم ئىچىلىدىٰ ياكى مۇسکۇلغا ئوکۇل قىلىنىدۇ. فولىك كىسلاتاسىنىڭ مېتابوليزىمغا قارشى دورىلاردىن زەھەرلىنىش: ئوتتۇرا دەرىجىلىك زەھەرلىنىش بولسا بىر قېتىمدا 12mg، ھەركۈنى توت قېتىم مۇسکۇلغا ئوکۇل قىلىنىدۇ. ئېخىر دەرىجىلىك زەھەرلىنىش بولسا 12h، 75mg ئىچىدە ئېناغا تېمىتىلىپ بولىنىدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىن مۇسکۇلغا ئوکۇل قىلىشقا ئۆزگەرتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئەسۋە چىقىش: يەلتاشما ياكى زىققە قاتارلىق باشقا ئاللىرىگىلىك رېئاكسىيەلر ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنىي قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: يامان سۈپەتلەك قان ئازلىقنى ياكى باشقما زور ئانا قىزىل قان ھۇجەيرىلىك قان ئازلىقنى داۋالاشتىن ۋەتامىن B_{12} بېتىشمەندەر. ② باشقىلار: بىماردا كىسلاتالق سۈيدۈك، قورساقا سۇ چۈشۈش، سۈسىزلىنىش، ئاشقازان، ئۆچىي يولى توسوْلۇش، كۆكەك بوشلۇققا سۈيۈقلۈق سررغىش ياكى بۇرەك فۇنكىسىسى توسۇنلۇققا ئۇچراش قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلگەنде، مىتوترپىكتەن بىلەن زەھەرسىزلەندۈرۈپ داۋالاشتا ئېھىتىيات قىلىش لازىم؛ كۆپ مىقداردىكى مىتوترپىكتەن قوبۇل قىلىپ بۇ دورا بىلەن زەھەرسىزلىنىدىغانلارنى لاپوراتورىيلىك تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش كېرەك؛ بۇ دورىغا يورۇقلۇقنىڭ بىۋاستىه چۈشۈشى ۋە ئىسسىقلقى بىلەن ئۇچراشىشىدىن ساقلىنىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 立可林 ئاسترالىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇل سۈيۈقلۈقى: ھەر ئامپۇلى 15ml/2ml، قاپ/5 ئامپۇل؛ ھەر ئامپۇلى 100mg/10ml، قاپ/1 ئامپۇل؛ ھەر ئامپۇلى 300mg/30ml، قاپ/1 ئامپۇل.

ئاترېكىس فىنلاندىيىدە ئىشلەنگەن. پاراشوكلىق ئوکۇلى: بوتۇلకا/350mg، قاپ/1 بوتۇلكا، تابلېتى: تابلېت/15mg، بوتۇلکا/10 تابلېت، بوتۇلکا/30 تابلېت، بوتۇلکا/100 تابلېت؛ ئوکۇلى: ھەر ئامپۇلى 6mg/2ml؛ ھەر ئامپۇلى 15mg/5ml، ھەر ئامپۇلى 30mg/10ml.

ئاؤسترالىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇل سۈيۈقلۈقى: ھەر ئامپۇلى 确咅力

3mg/ml، قاپ/10 ئامپول؛ هر ئامپولى 30mg/3ml، قاپ/5 ئامپول؛
 هر ئامپولى 100mg/10ml، قاپ/5 ئامپول؛ هر بوتۆلکىسى
 100mg/10ml، قاپ/1 بوتۆلکا؛ هر بوتۆلکىسى 200ml/20ml،
 قاپ/1 بوتۆلکا؛ هر بوتۆلکىسى 50mg/5ml، قاپ/5 بوتۆلکا، هر
 بوتۆلکىسى 300mg/30ml، قاپ/1 بوتۆلکا.

بلىئومىتسىن (博来霉素，Bleomycin)

【ئاساسىي تەركىبى】 بلىئومىتسىن.
【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ بىر تۈرلۈك ئىشقارلىق
 پولىپېپتىد تۈرىدىكى كەڭ تەسىرلىك ئۆسمىگە قارشى دورا بولۇپ،
 ھۇجمىرى دەۋرىنىڭ غەيرىي خاسلىقىغا ئىگە دورا، مىزكۈر دورا
 قاسىراقسىمان راكنى تاللاپ تورمۇزلايدۇ. ئوكۇل قىلغاندىن كېيىن Tmax
 تەخمىنەن $t_{1/2}$ 30min، t_{∞} 1.5h بولىدۇ.
【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىكلىرى】 نەپس يولى،
 قىزىلئۆڭىچەج، تېرە، سۈيدۈك ئاجرىتىش - كۆپپىش ئەزاسى، ئۇرۇقدان
 توقۇلمىسىنىڭ قاسىراقسىمان ھۇجمىرى راكى، يامان سۈپەتلىك لىمفا
 ئۆسمىسى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ،
 ۋېناغا تېمىتىلىدۇ، ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ ياكى تېرە ئاستىغا دورا
 بېرىلىدۇ. هر قىتىمدا 30mg ~ 15، هر ھەپتىدە 2 ~ 1 قىتىم
 ئىشلىتىلىدۇ. ئومۇمىي مىقدارى 300mg غا يەتكۈزۈلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 تېرە شىللىق پەردىسى زەخىملىنىش، قايىتما
 خاراكتېرلىك چاچ چۈشۈش، ئېغىر دەرىجىدىكى ئۆپكە زەخىملىنىش
 مەنبەلىك نەپس قىينىلىشىش، ھەيز كېسىلىش، ئىسپەرما كەچىل
 بولۇش، دورا قىزىتىمىسى رىئاكسىيىسى قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى:
 سىلوسپورىن (环胞菌素) بىلەن بىر گە ئىشلەتكەندە دىققەت قىلىش لازىم،
 زەھىرى ئازايىتلەغان تىرىك ۋاكسىتا بىلەن بىر گە ئىشلىتىلسە، پۇتۇن بەدەن
 خاراكتېرلىك كېسەللىك، ھەتتا ئۆلۈم خەۋپى كېلىپ چىقىدۇ. ② مەنى:

قىلىنىدىغان ئەھۋالار: ئېغىر دەرىجىدە نەپەسىنىش قىيىنلاشقانلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: ئۆپكە فۇنكسييىسىنى تەپسىلى كۆزىتىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 بلىئۇمىتسىن ياپونىيىدە ئىشلەنگەن. ئۆكۈل سۈيۈقلۈقى: ئامپۇل/15mg، ئامپۇل/5mg.

فارمۇرۇبىتسىن

(表阿霉素，Pharmorubicin)

【باشقا نامى】 ئېپىرۇبىتسىن (表柔比星，Epirubicin).

【ئاساسىي تەركىبى】 فارمۇرۇبىتسىن.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ بىر خىل ئاتراتپىن ھالقىلىق ئۆسمىگە قارشى دورا بولۇپ، ھۇجمىرىگە تېزلىكتە سىڭىپ ئۆتۈپ، ھۇجمىرى يادروسىغا كىرسىپ، نۇكلىئىك كىسالاتانىڭ سىنتېزلىنىش ۋە يىسپىلىق بولۇنۇشىنى تورمۇزلايدۇ، جىڭىر ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، بولسا $t_{1/2}$ 40h.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىدر】 ئەمچەك راكى، يامان سۈپەتلىك لىمفا ئۆسمىسى، يۇماشاق توقۇلما ساركومىسى ۋە ئاشقازان راكىغا ئىشلىتىلىدۇ. بۇ دورىنىڭ يەنە يامان سۈپەتلىك قارا پىغمېپتى ئۆسمىسى، بوغماق ئۇچىمى راكىخىمۇ قارشى ئاكتىپچانلىقى بار. راكقا قارشى باشقا دورىلار بىلدەن بىر لەشتۈرۈپ ئۆپكە راكى ۋە تۇخۇمدان راكىنى داۋالاشقا بولىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ. يەككە ئىشلىتىش مىقدارى $5\text{min} \sim 90\text{mg/m}^2$ ، 60 ~ 3 ئىچىمde بەدەنگە ئۆكۈل قىلىنىدۇ، كېسەللىك ئەھۋالىغا قاراپ 21 كۈن ئۆتكەندىن كېيىن قايتا ئىشلىتىلىدۇ. جىڭىر فۇنكسييىسى تولۇق بولمىغانلارغا دورا مىقدارى كېمەيتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش، شەلۋەرەپ كەتكەن ئاشقازان ياللۇغى، تىلىنىڭ ئىككى تەرىپى ۋە تىل ئاستى بېزى ياللۇغى، يۇقىرى قىزىتما، چاچ چۈشۈش، يىلىك تورمۇزلىنىش ۋە يۈرەكى زەھەرلەش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، قىزىش، تىترەش، يەلتاشما

ۋە ئالاپگىيلىك رېئاكسىيلر ئاندا - ساندا كۆرۈلدۈ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تىسىرى: هېپارىن بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. ② مەنىئى قىلىنىدەغان ئەھۋاللار: ئىلگىرى توپسىگە قارشى دورىلارنى ئىشلىتىپ ياكى رادىئۇئاكتىپلىق داۋالاش ئېلىپ بېرىپ يىلىكى روشنەن ھالدا تورمۇز لانغانلار، ئانتراتىپىن ھالقىلىق دورىلار يۇقىرى دوزىدا ئىشلىتىلگەنلەر، يېقىندا ياكى ئىلگىرى يۈرەك كېسىلى بولغانلارغا ئىشلىتىلمەيدۇ. ③ باشقىلار: بىرىنچى داۋالاش مەزگىلىدە قىزىل قان ھۈجىرىسى، ئاق قان ھۈجىرىسى، قان پلاستىنكلەرنى چوقۇم تېسلىي كۆزىتىش؛ جىڭىر فۇنكىسىسىنى تەكشۈرۈش ۋە يۈرەكنى كۆزىتىش لازىم. 【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 فارمۇرۇبىتسىن ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇل سۈيۈقلۈقى: ئامپۇل/10mg، ئامپۇل/50mg، قاپ/1 ئامپۇل.

سىسىپلاتىن (顺铂, Cisplatin)

【باشقى نامى】 سىسىپلاتىن - فائۇلدىن (锡铂, Cisplatin - Fauldin) ـ 顺氯氨铂，威力顺铂
【ئاساسىي تەركىبى】 سىسىپلاتىن.
【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ پلاتىنا تۈرىدىكى مېتاللىق كومپلېكس بىرىكىمە بولۇپ، راڭ ھۈجىرىسىدىكى DNA بىلەن بىرىكىپ، راڭ ھۈجىرىسىنىڭ يۆنلىشىنى تورمۇزلايدۇ. بۇ دورا ئاساسلىقى بۆرەك، جىڭىر ۋە ئۇچىيدىن قوبۇل قىلىندۇ.
【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىكەر】 ئۇرۇقدان راڭى، تۇخۇمدان راڭى، بالىانقۇ ئىچى پەردىسى راڭى، قۇلاق - بۇرۇن - كېكىردهك راڭى، قىزىلئۇشىڭەج راڭى ۋە دوۋساق راڭىغا ئىشلىتىدۇ.
ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىش شىرت. يەككە داۋالاش: 50 ~ 100kg/m², ھەر 6 ~ 3 ھەپتىن بىر قېتىم ئوکۇل قىلىنىدۇ ياكى 20mg/m² ~ 15، ئۇدا بەش كۈن ئوکۇل قىلىنىدۇ؛ بىرلەشمە دورا ئىشلىتىش: بىرگە ئىشلىتىدىغان دورىنىڭ

خۇسۇسىيىتى ۋە زەھەرچانلىقىغا ئاساسەن مىقدارى تەڭشىلىدۇ.

«ناچار تەسىرى» كۆكۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش، قەۋزىيەت، ئىشتىها تۇتۇلۇش، ئاق قان ھۈجمىرسى ۋە قان پلاستىنكلىرى كېمىيىش، قان ئاز لق، نېرۋا ئۇچلىرى كېسىللېكلىرى، سېزىم ۋە كۆرۈش سېزىمى توسقۇنلۇققا ئۇچراش، بۇرەكىنى زەھەرلەش، قۇلاق غوشۇلداش ۋە گاسلىق قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. ترانسېئامىنزا ئۆرلەش ناھايىتى كەم ئۇچرايدۇ.

«دىققەت قىلىدىغان ئىشلار» ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: سىسلو سپورن (环胞菌素) بىلەن بىر گە ئىشلىتىلە، ئىممۇنىنى تورمۇزلاش تەسىرى كۆچىيىدۇ؛ زەھىرى ئاز ايتىلغان تىرىك ۋاكسىنا بىلەن بىر گە ئىشلىتىلە، جانغا زامن پۇتنون بەدهن دائىرىلىك كېسىللېك پەيدا قىلىشى مۇمكىن؛ ئامىنوگلىكوزىد تۈرىدىكى دورىلار بىلەن بىر گە ئىشلەتكىنە، بۇرەك ۋە ئاڭلاش ئىزالرىغا بولغان زەھەرچانلىق تەسىرى كۆچىيىدۇ. ② مەنى قىلىنىدىغان ئەھۋالار: پلاتىنا تۇغۇندىلىرىغا زىيادە سەزگۈرلەر، بۇرەك فۇنكىسىيىسى تولۇق بولىغانلار، ئاڭلاش ئىقتىدارى زەخملەنگەنلەر، قان كېسىلى بارلار، يىلىكىنڭ قايىتا ئىشلىنىشى ئېغىر دەرىجىدە توسقۇنلۇققا ئۇچرىغۇچىلارغا ئىشلىتىلمىدۇ. ③ باشقىلار: ھەر قېتىم داۋالاش ئېلىپ بېرىشتىن ئىلگىرى ھېماتولوگىيلىك تەپسىلى تەكشورۇش ئېلىپ بېرىش كېرەك؛ داۋالاشنىڭ ئالدى - كەينىدە، جىڭىر، بۇرەك فۇنكىسىيىسى، ئاڭلاش ئىقتىدارى، ئېلىكترولىتلار، نېرۋا سىستېمىسى ۋە قان سىستېمىلىرىغا نسبەتەن تەكشورۇش ئېلىپ بېرىش لازىم.

«ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى» سىپلاتىن - فائۇلدىن ئاۋاسترالىيىدە ئىشلەنگەن. ئوكۇل سۈيۈقلۈقى: ئامپۇل/10mg، ئامپۇل/50mg، ئامپۇل/100mg.

威 威力顺铂
力顺铂
ئاۋاسترالىيىدە ئىشلەنگەن. ئوكۇل سۈيۈقلۈقى: ھەر ئامپۇل
. 10mg/20ml

كارموفُور (卡莫氟，Carmofur)

【باشقا نامى】 مغۇرول (嗜福祿，Mifurol) . 卡莫福

【ئاساسىي تەركىبى】 كارموفُور.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ئىچكىنده تېز سۈمۈرلۈدۇ. بىدەننە ئاستا - ئاستا فلوئوروئۇراتسىل (氟尿嘧啶) قويۇپ بېرىپ، RNA، DNA ۋە ئاقسىلىنىڭ سىنتېزلىنىشىگە توسقۇنلۇق قىلىش ياكى كاشىلا قىلىش ئارقىلىق ئۆسمىگە قارشى رولىنى جارى قىلدۇردى. ئۆسمىگە قارشى دائىرسى فتۇرافۇر (呋尿嘧啶) ۋە فلوئوروئۇراتسىلدىن كەڭ، $t_{1/2}$ ~ 4h، جىڭىر، بۇرەك ۋە ئاشقازان دىۋازىدىكى قويۇقلۇقى بىر قىدەر يۇقىرى، ئاساسلىقى سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدى.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەككەر】 ھەزمىم يولى راكى (ئاشقازان راكى، بوغماق ئۈچىي راكى، تۈز ئۈچىي راكى)، ئەمچەك راكى.

【مىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئادەتتە كۈننەگە ھەر kg بىدەن ئېخىرىلىقىغا 12mg ~ 18mg، 4 ~ 2 قېتىمغا بولۇپ ئىچىلىدۇ. بىر كۈنلۈك ئومۇمىي مىقدارنى 900mg دىن ئاشۇرۇۋېتىشكە بولمايدۇ.

【ناچىلار تەسىرى】 گەپ - سۆزى، يۈرۈش - تۈرۈشى، سېزىمى توسقۇنلۇققا ئۈچۈش، ئىستە تۆتۈش قابلىقىتى چىكىنىش، BUN، ALP، GPT، GOT پلاستىنكلەرى، ئاق قان ھۈجىرسى كېمىشىش، قىچىش قاتارلىقلار، قان ئازلىق، قان ئاندا - ساندا پىيدا بولىدۇ، بىزىدە قەۋىزىيەت، ئىچ سۈرۈش كۆرۈلەتلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ياشانغانلار، جىڭىر، بۇرەك فۇنكىسىيىسى تولۇق بولىغانلار، ھامىلىدارلارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ دورا ئىچكەندىن كېيىن ئىسپىرت تەركىبى بار ئىچىملىكلىرىنى ئىچمەسلەك كېرەك.

【ياسالىمسى ۋە ئۇلچىمى】 مغۇرول يابۇنىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپ، 100mg، قاپ/100 تابلىپ.

مېركاپتوپورىن (巯嘌呤，Mercaptourine)

【باشقا نامى】 پۇرى - نېتول (乐疾宁, Puri - Nethol) ۋە ئاساسىي تەركىبى】 مېركاپتوپورىن.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىك】 بۇ دورا بىدەنگە كىرگەندىن كېيىن ئاكتىپچانلىققا ئىگە 6 - مېركاپتوپورىنلىق نۇكلىئىك كىسلاتا (6 - 6) غا ئايلىنىپ، RNA نىڭ سىنتېزلىنىشنى تورمۇزلاپ، راك ھۈجمەيرسىنىڭ ئۆسۈشىنى توسىدۇ. ئىچكەندە شۇمۇرۇلۇشى تولۇق بولمايدۇ، پۇتون بىدەنگە تارقىلىسىدۇ، ئاز قىسىمى مېڭە - يۈلۈن سۈيۈقلۈقىغا كىرىدۇ، جىڭەرە مېتابوليزىلىنىدۇ، 24h تە ~ 5 ى ئىسلى پېتى سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدى، 1.5ht_{1/2}

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك لىمغا ھۈجمەيرسى مەنبىلىك ۋە دانچە ھۈجمەيرلىك ئاق قان كېسىلى، سوزۇلما خاراكتېرىلىك دانچە ھۈجمەيرلىك ئاق قان كېسىلىك ئىشلىتىلىدۇ، تىۋىتلىق پەرده ئېپتېلىيە راكى، يامان سۈپەتلەك ئۆزۈمىسىمان تۆرەلمىگىمۇ ئۇنۇم بېرىدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئاق قان كېسىلىنى داۋالاشتا كۈنگە ھەر kg بىدەن ئېغىزلىقىغا 3mg ~ 3mg، 1.5 ~ 2 قېتىمغا بۆلۈپ ئىچىلىدۇ، داۋالاش مۇددىتى 4 ~ 2 ئاي بولىدۇ، تىۋىتلىق پەرده ئېپتېلىيە راكىنى داۋالاشتا كۈنگە ھەر kg بىدەن ئېغىزلىقىغا 6mg، ئۇدا 10 كۈن ئېچىلىدۇ، 4 ~ 3 ھەپتە ئۆتكەندىن كېيىن داۋالاش مۇددىتى قايتا تەكرالىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاق قان ھۈجمەيرسى قان پلاستىنلىكلىرى كېمىيىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىشتىهاسى توتۇلۇش، ئېغىز بوشلۇقى ۋە ئۈچەي يۈلى يارىسى، ئۆت قېيىۋېلىش مەنبىلىك سېرىقلىق، ئەسوھ چىقىش، ھەيز كېسىلىش، ئىسپېرما كېمىيىش، ئۆسمە ھۈجمەيرسى ئېرىش يىغىندى ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلدەن بولغان تەسىرى:

بۇ دورا سىسلوپورن (环胞菌素) بىلەن بىلە ئىشلىتىسى ئىممۇنتىنىڭ تورمۇزلىنىشى كۈچىيدۇ. زەھرى ئازايىتلغان تىرىك ۋاكسينا بىلەن بىرگە ئىشلىتىسى پۇتون بەدەن خاراكتېرىلىك، ھەتتا جانغا زامىن كېلىنلىكلىرىنىڭ پەيدا بولۇش خەترى كېلىپ چىقىدۇ. ② مەنى ئىشلىتىغان ئەھۋاللار: ھامىلىدار ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ③ باشقىلار: ھەر قېتىم دورا ئىشلىتىشىن ئىلگىرى قان رايىنى ئىنچىكلىق بىلەن تەكشۈرۈش؛ جىڭىر فۇنكسييىسىنى كۆزىتىش؛ ئۆسمە ھۈجەيرسى كۆپلەپ ئېرىنگەنде يۇقىرى سۈيدۈك كىسلاتالىق قان كېسىلى ۋە سۈيدۈك كىسلاتا تۈزلىرىنىڭ چۆكۈۋلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك؛ دورا ئىشلىتىۋاتقان مەزگىلدە بالا ئېمىتىش چەكلەندىدۇ.
『ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى』 پۇرى - نېتول ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن.

تابلىپتى: تابلىپتى، 50mg، قاپ/25 تابلىپت.

تۆتنىچى باب نېرۋا سىستېمىسىغا تەسىر قىلغۇچى دورىلار

1 § . ئاغرىق پەسەيتكۈچى دورىلار

ترامادول ھىdroخlorid

(盐酸曲马多，Tramadol Hydrochloride)

【باشقىنامى】 مابرۇن (马伯龙, Mabron)，تراماكوتىن

. Tramal (奇曼丁, Tramcontin)

【ئاساسىي تەركىبى】 ترا ما دول ھىdroخlorid.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىك】 بۇ تاللاشچانلىقى بولىغان ئېپيون ئاكسيپتوردىنى قوزغاتقۇچى بىر تۈرلۈك دورا بولۇپ، μ - ئاكسيپتورىغا قارىتا بىر قەدر يۇقىرى بىر كىش كۈچىگە ئىنگە، مورفینغا ئۇخشاش مەركەز خاراكتېرىلىك ئاغرىق پەسەيتىش ۋە يۆتەل توختىتىش تەسىرىگە ئىنگە، ئادەمنىڭ بۇ دورىغا بېقىنىشچانلىقى ئازاراق بولىدۇ، نەپەسى تورمۇزلاش تەسىرى يوق. ئىچكەندە ياخشى سۈمۈرۈلىدۇ، $2 \sim 3h$ T_{max} جىڭىرددە بېتابولزىلىنىپ، بۆرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، $t_{1/2}$ بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 ئوتتۇرا، ئېغىر دەرىجىدىكى ئۆتكۈز ياكى سوزۇلما خاراكتېرىلىك ئاغرىش ھەممە دىتاگىنىز قويۇش تەدبىرى ياكى داۋالاشتىن پەيدا بولغان ئاغرىشلارغا ئىشلىلىدۇ. 【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مىقدارى ئاغرىش دەرىجىسىگە ئاساسەن بېكتىلىدۇ، ھەر قېتىمدا 50mg، ئەگەر ئۇنۇمى كۆڭۈلىدىكىدەك بولىمسا، 1h تىن كېپىن يەن 50mg ئىچىلىدۇ، كۈنلۈك مىقدارىنى كۈننەنگە 400mg ئاشۇرۇۋېتىشكە بولمايدۇ. ھەر قېتىمدا 100mg، كۈننەنگە بىر قېتىم مۇسكۇلغَا ياكى ۋېناغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ. شاپچە ياسالىمىسى ھەر قېتىمدا بىر دانىدىن كۈننەنگە 3 ~ 2 قېتىم مەقىئەتكە سېلىنىدۇ. جىڭىر،

بۇرەك فۇنىكتىسىسى تولۇق بولىخان بىمارلارغا ئەھۋالغا قاراپ ئىشلىتىلدى.

【ناچار تەسىرى】 باش قېيش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، تىرىلەش، ئېغىز قۇرۇش ۋە ئۇيقوسراش قاتارلىقلار كۆرۈلدۈد. يۈرەك سېلىش، بىدەن تۈرقى خاراكتېرىلىك تۆۋەن قان بېسىمى ياكى يۈرەك قان تومۇرى مەنبىلىك كوللاپىش قاتارلىقلار ئاز كۆرۈلدۈد.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى ئىسپىرت، تىنچلاندۇرغۇچى دورا، ئاغرىقى پەسىتىكۈچى دورا ياكى باشقۇ مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسى دورىلرى بىلەن بىرگە ئىشلىتىسى ئۇتكۈر خاراكتېرىلىك زەھەرلىنىش كېلىپ چىقىدۇ؛ دىئازبىام تۈرىدىكى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە بۇ دورىنىڭ نېرۋا سىستېمىسسغا بولغان تەسىرى كۈچىيەدۇ. ② مەنىقىلىنىدىغان ئەھۋالا: مونوئامن ئوكسیدازانى تورمۇزلىغۇچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ③ باشقىلار: ھامىلىدار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار، جىڭىر، بۇرەك فۇنىكتىسىسى تولۇق بولىخانلار، يۈرەك قان تومۇر كېسەللەكلىرى بىمارلىرىغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدىدۇ؛ شۇپۇرلار ياكى ماشىنىدا مەشغۇلات قىلغۇچىلارنىڭ ئىنكاسىسغا تەسىر كۆرسىتىشى مۇمكىن؛ ئادەملەرنىڭ بۇ دورىغا بېقىنلىشچانلىقى ئازراق، ئىمما بېقىنلىقى يىللاردىن بېرى خۇمار پەيدا قىلىدىغانلىقىغا ئائىت مەلۇماتلار بار.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 مابرون سىپرۇستا ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/50mg، قاپ/10 دانه، ئوڭۇل سۇيۇقلۇقى: ھەر ئامپۇلى 100mg/2ml

ترامadol گېրمانىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/50mg، قاپ/10 دانه، قاپ/30 دانه؛ ئوڭۇل سۇيۇقلۇقى: ھەر ئامپۇلى 50mg/ml، ھەر ئامپۇلى 100mg/2ml، قاپ/5 ئامپۇل. تېمىتىلىدىغان ياسالىمىسى: ml، 100mg/ml، شامچە ياسالىمىسى: دانه/100mg، قاپ/5 دانه.

فلۇنارىزېن ھىdroxلورىد

(盐酸氟桂利嗪，Flunarizene Hydrochloride)

【باشقا نامى】 سېبىلىئۇم (西比灵，Sibelium) ، مىتانال

· 氟桂嗪，(米他兰，Mitanal)

【ئاساسىي تەركىبى】 فلۇنارىزېن ھىdroxلورىد.

『فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى』 بۇ تاللاش خاراكتېرىلىك كالتسىي بىلەن قارشلاشقاۋچى دورا بولۇپ، Ca^{2+} نىڭ پەردىدىن ھالقىپ ھۇجىرە ئىچىگە كىرىشنى توسوش ئارقىلىق، ھۇجەيرىدىكى كالتسىينىڭ درېجىسىدىن تاشقىرى ئارتىسپ كېتىشى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان زەخىملەنىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ، يۇرەكىنىڭ قىسىرىشى ۋە ئۆتكۈزۈشىگە تىسرى كۆرسەتمىيدۇ، ئىچىكەندىن كېيىن T_{\max} ~ 4h، $t_{1/2}$ 18 كۈن، جىڭىردى پلازماما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نسبىتى 90%， جىڭىردى مېتابولىزىمىلىنىپ، گەندە ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

『مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر』 تېپىك ياكى تېپىك بولمىغان شەققىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ، دەھلىز (قۇلاقتىكى) فۇنكىسيسى قالايمىقانلىشىش كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان باش قېيىش ئالامىتىگە قارىتا داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

『ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى』 شەققىنىڭ ئالدىنى ئېلىش خاراكتېرىلىك داۋالاشتا: دەسلەپكى مىقدارى كۈنگە 10mg بولىدۇ، 65 ياشتن يۇقىرى بىمارلار كۈنگە 5mg دىن ھەر كۈنى كەچتە ئىچىدۇ. قاباداپ داۋالاش مىقدارى يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش، ھەر ھەپتىدە بەش كۈن ئىچلىدۇ، ئالته ئاي ئىشلەتكەندىن كېيىن توختىتىلىدۇ، قايىتا قوز غالغاندا دەسلەپكى مىقدارىدىن باشلاپ قايىتا ئىشلىتىلىدۇ.

『ناچار تەسىرى』 ئۇيقوسراش، چارچاش، بەدەن ئېغىرلىقى ئېشىپ كېتىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، خامۇشلۇق كېسىلى ناگاندا كۆرۈلىدۇ، ياشانغانلاردا پىرامىدا سىرتقى سىستېمىسى ئالامەتلىرى ئۇئايلا پېيدا بولىدۇ. ئاشقازان كۆيۈپ ئىچىشىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، ئاشقازان ئاغرشىش، ئۇيقوسزىلىق، تەشۈشلىنىش، سوت ئېقىش، ئېغىز قۇرۇش، مۇسکۇل ئاغرشىش ۋە ئەسۋە قاتارلىقلار ئىنتايىن ئاز كۆرۈلىدۇ.

『دىققەت قىلىدىغان ئىشلار』 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئىسپىرت، ئۇيقوس دورىسى ياكى تنچلاندۇرغۇچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى زىيادە تنچلاندۇرۇش تەسىرى كۆرۈلىدۇ. ② باشقىلار: ھامىلىدارلار، بالا ئىمپىتىۋاتقان ئاياللار، خامۇشلۇق كېسىلى تارىخى بارلار پاركىنسون كېسىلى ياكى باشقا پىرامىدا سىرتقى سىستېمىسى كېسەللىكلەرى بارلارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ. بۇ دورا يەنە ماشىنا مەشخۇلاتى بىلەن شوغۇللانغۇچىلارنىڭ

ئىقتىدارىغا تىسىر كۆرسىتىدۇ؛ ئىگەر بىماردا چارچاش ھادىسىسى تەدرىجىي ئېخىرلاشسا ياكى دورا ئۇنۇمى تۆۋەنلەپ كەتسە، داۋالاشنى توختىتىش كېرەك؛ دورا مىقدارى زىياادە كۆپ بولۇپ كەتكەندە تىنچلەندۈرۈش تەسىرى ۋە ماغدىزلىنىش پەيدا بولىدۇ، بۇنى ئاكتىپلاشقان كۆمۈر، قۇسـتۇرغۇچى دورىلار، ئاشقازاننى يۈيۈش ۋە قۇۋۇتـلەندۈرۈپ داۋالاش ئۇسـۇلى ئارقىلىق بىر تەرەپ قىلىشقا بولىدۇ، نۆۋەتتە بۇنىڭ ئالاھىدە ئۇنۇملۇك زەھەر قايـتۇرغۇچى دورىسى يوق، باش قېيىش پەيدا بولغاندا، ئالامـتلىرىنى كونـتـرـول قىلىپ بولغاندىن كېيىن دورىنى توختىتىش كېرەك، دەـسلـەـپـىـكـى داۋالاش مۇددىتى ئادەتتە ئىككى ئايـدىـن تۆۋەن بولىدۇ. «ياسالـىـمىـسى ۋـە ئۇـلـچـىـمى~» مىتـانـالـ يـاـپـونـىـمـىـدـە ئىـشـلـەـنـگـەـنـ.

تابلىكتى: تابلىكتى 10mg، قاپ/100 تابلىكتى.

2. قىزىتىما قايـتۇرۇپ، ئاغـرـىـقـ توختـاتـقـۇـچـى دورـىـلـار

ئاتـسـپـتـامـىـنـوـفـېـنـ

(对乙酰氨基酚，Acetaminophen)

【باـشـقاـنـامـى】 Paracetamol，扑热息痛
كاـپـلىـتـ (泰诺，Tylenol Cold Caplet)
كـوـئـۇـگـ لـىـكـوـئـىـدـ (酚麻美敏口服液，Cough Liquid)
Tylenol Children's Cold (泰诺儿童感冒)
ئـاـسـاسـىـيـ تـەـرـكـىـبـىـ】 ئاتـسـپـتـامـىـنـوـفـېـنـ.

【فارـماـكـولـوـگـىـلـىـكـ ئـالـاـھـىـدـىـلـىـكـ】 بو ئامىنوبىن زىن تۈرىدىكى قىزىتىما قايـتۇرۇپ، ئاغـرـىـقـ توختـاتـقـۇـچـى دورـىـ بـولـۇـپـ، تـىـسـىـرـ قـىـلىـشـ مـېـخـانـىـزـمىـ ئـاـسـپـىـرـىـنـ بـىـلـەـنـ ئـوـخـشـىـشـ كـېـتـىـدـۇـ. ئـىـچـكـەـنـدـەـ تـېـزـ، تـولـۇـقـ سـۆـمـۈـرـۈـلـىـدـۇـ، ئـاـسـاسـلىـقـىـ جـىـگـەـرـەـ مـېـتـاـبـولـىـزـ مـىـنـىـدـۇـ، $t_{1/2} \sim 1$ h مـېـتـاـبـولـىـزـمـ ھـاسـلـاتـىـ ئـاـسـاسـەـنـ سـۆـيـدـۈـكـ ئـارـقـىـلىـقـ چـىـقـىـرـىـلـىـدـۇـ.

【مـۇـۋـاـپـىـقـ كـېـلـىـدـىـغـانـ كـېـسـهـلـىـلـكـلـەـرـ】 باـشـ ئـاغـرـىـشـ، چـىـشـ ئـاغـرـىـشـ، ھـېـزـ ئـاغـرـىـتـىـپـ كـېـلىـشـ، بـوـغـۇـمـ ئـاغـرـىـشـ، مـۇـسـكـۇـلـ ئـاغـرـىـشـ، تـۇـغـۇـتـىـنـ كـېـيـىـنـ ۋـەـ ئـوـپـېـرـاـتـىـيـىـدـىـنـ كـېـيـىـنـكـىـ ئـاغـرـىـشـ، يـىـنـىـكـ ۋـەـ ئـوتـتـۇـرـاـ

دەريجىدىكى راك مەنبىلەك ئاغرىش، زۇكامىدىن بولغان قىزش ۋە باشقا يېقىمىزلىنىش ئالامەتلەرنى ياخشىلاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 2000mg ~ 500mg كۈنگە 4 ~ 3 قېتىم ئىچىلىدۇ، 24h دىن ئاشۇرۇلمايدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئالالېرىگىيلەك رېئاكسىيە ئاز كۆرۈلدۈ، ئېغىر دەريجىدىكى يۇتۇنچاق - كېكىر دەك ئاغرىش، قىزش، باش ئاغرىش، كۆكۈل ئېلىشىش ياكى قۇسۇش ئىنتايىن ئاز كۆرۈلدۈ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ئاتسېتامىنوفىن تەركىبى بولغان باشقا دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتشىكە بولمايدۇ؛ ھامىلدار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ ئەگەر ئۇنۇمى ياخشى بولمىسا ياكى قىزىرىش، ئىشىش قاتارلىق يېڭى ئالامەتلەر پەيدا بولسا، باشقا داۋا لاش ئۈسۈلىنى قوللىنىشنى ئويلىشىش كېرەك؛ ھاراق ئىچكۈچىلەرگە ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 تىلىپنۇل كولد كاپلىت ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. پەردەلىك تابلېتى: تابلېت/500mg، قاپ/10 تابلېت؛ ئاستا تەسىرىلىك تابلېتى: تابلېت/650mg.

تىلىپنۇل خىلدەر بىلدەر كولد ياكى كۆئۈگ لىكۈئىد ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. ئىچىلىدىغان سۈيۈقلۈقى، بوتۇلكا/100ml.

فورتولىن (幸福止痛素，Fortolin)

【ئاساسىي تەركىبى】 ئاتسېتامىنوفىن (醋氨酚) .

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىدىكى پروستاگلاندىن (前列腺素) نىڭ سىنتېزلىنىشنى تورمۇزلاش ۋە ئاغرىش سېزىمىنىڭ ئاخىرقى نېرۋا ئۇچىلىرىدىكى ئىمپۇلىسىنى ئۈزۈپ تاشلاش ئارقىلىق ئاغرىق پەسىيتسىدۇ. توۋەنكى كۆرۈش دۆڭچىسىدىكى بەدەن تېمپېراتۇرسىنى تەڭشەش مەركىزىگە تەسىر كۆرسىتىش ئارقىلىق، ئەترابېتىكى قان تومۇرلارنى كېڭىتىپ، قىزىتما قايتۇرۇش رولىنى ئۇينىайдۇ. ئىچكەندىن كېيىن سۈمۈرۈلۈشى تېز، تولۇق

بولىدۇ، بىدمۇن سۈيۈقلۈقىغا تەكشى تارقىلىدۇ، ئاساسلىقى جىڭىردى مېتابولىزملەنىدۇ، $t_{1/2} = 1\sim 4\text{h}$ ، ئىچكەندىن كېيىن $0.5\sim 2\text{h}$ Tmax تەسىرىنىڭ داۋام قىلىش ۋاقتى $4\text{h} \sim 3$ ، بۆرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 باش ئاغرىش، قىزش، چىش ئاغرىش، مۇسکۇل تېلىپ ئاغرىش، هەيز ئاغرىتىپ كېلىش، بوغۇم ياللۇغى ئاغرىقى ۋە نېرۋا ئاغرىقىغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار $1000\text{mg} \sim 500$ ، كۈنگە $4 \sim 3$ قېتىم ئىچىدۇ؛ $12 \sim 7$ ياشلىق باللار ~ 200 دىن كۈنگە $4 \sim 3$ قېتىم ئىچىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاللىرىگىيلىك رېئاكسييە تاسادىپسى كۆرۈلۈپ قالىدۇ، ئۇزۇن مەزگىل كۆپ مىقداردا ئىشلەتكەندە قان پلاستىنكلەرى كېمىيىش ۋە جىڭىرنى زەھەرلەش كېلىپ چىقىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ئىچلىدىغان ئۇيۇشقا قارشى دوربىلارنىڭ تەسىرىنى كۈچەيتىدۇ؛ جىڭىر، بۆرەك فۇنكسييمىسى زەخىمىلەنگەنلەر، ئىسپىرتتن زەھەرلەنگەنلەر، ھامىلىدار ۋە بالا ئېمىتتۇۋاقان ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 فورتولىن شىاشگاڭىدا ئىشلەنگەن.

تابلىتى: تابلىت، 500mg ، قاپ/12 تابلىت.

سۇماترپتان (舒马曲坦, Sumatriptan)

【باشقى نامى】 ئىمigran (英明格, Imigran).
【ئاساسىي تەركىبى】 سۇماترپتان.
【فارماكاولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ بىر خىل يۇقىرى تاللاشچانلىققا ئىنگە 5 - هىدروكىسى تەرىپتامن (羟色胺 5-HT) - 5-ئاكسېپتۈرىنى قوزغانقۇچى دورا. (5-HT₁-5-ئاكسېپتۈرى شەققە بىلەن مۇناسىۋەتلىك). ئىچكەندىن كېيىن تېز سۇمۇرۇلىدۇ، 45min Tmax، دەسلەپكى دورا تەسىرى مەۋجۇت، ئۇيۇلۇگىيلىك پايدەلىنىش دەرىجىسى تەخىمىمنەن 14%؛ تېرىه ئاستىغا ئوكتۇرۇنىش تەرىپتامن كېيىن 25min Tmax $t_{1/2} = 12\text{h}$ بولىدۇ. مېتالizm ھاسىلاتى ئاساسەن سۈيىدۇك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 ئۆتكۈر خاراكتېرلىك

دۇرېيلىك شەقىقە ۋە چىگىش خاراكتېرىلىك باش ئاغرىشنى داۋالاشقا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەرقېتىمدا 100mg، كۈنگە 3 ~ 2 قېتىم ئىچلىيدۇ. تېرى ئاستىغا ئوکۇل قىلغاندا ھەر قېتىمدا 6mg ئوکۇل قىلىنىدۇ، ئەگەر كېسەللەك قايta قوز غالسا، 1h ئىچىدە تېرى ئاستىغا يەن بىر قېتىم ئوکۇل قىلساقا بولىدۇ، 2h ئىچىدە ئەڭ كۆپ بولغاندا ئىككى قېتىم ئوکۇل قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئوکۇل قىلىنغان ئورۇن ئاغرىش، ئۇيۇشۇش سېزىمى پەيدا بولۇش، كۆيىگەندەك سېزىم پەيدا بولۇش، جىددىيەلىشىش، يۈز قىسىمى قىزىرىش، باش قېيىش، ماغدۇرسىزلىنىش، چارچاش، قان بېسىمى ۋاقتىلىق يۈقرىلاش قاتارلىقلار كۆرۈلدۇ.

【دېقىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئېرگوتامىن (麦角胺) بىلەن بىرگە ئىشلىتىلە قان تومۇرلار سېپازمىلىنىش رېئاكسيسى يۈز بېرىشى مۇمكىن. ② مەنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: مونوامىن ئوكسیدازا (单胺氧化酶) نى تورمۇزلىغۇچى دورىلار، 5-HT - نىڭ قايta سۈمۈرلۈشنى تاللاپ تورمۇزلىغۇچى دورىلار ياكى لىستىي ياسالىمىلىرى بىلەن داۋالىتىۋاتقان بىمارلار، قان يېتىشىمەسىلىك خاراكتېرىلىك يۈرەك كېسىلى بىمارلىرى، يۈرەك مۇسکۇل تىقلىمىسى تارىخى بارلار ۋە يۈرەك سانجىقى بىمارلىرىغا ئىشلىتىش چەكلەنىدۇ.

③ باشقىلار: ۋېنغا ئوکۇل قىلىش مۇۋاپىق ئەمەس.
【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 ئىمگىران ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن.

تابلىتى: تابلىت/50mg؛ ئوکۇلى: 6mg/0.5ml، ئاپېپول/0.5ml.

3 . تىترەشچان پالەچىكە قارشى دورىلار

بروموكرپىتن (溴隐亭, Bromocriptine)

【باشقا نامى】 奥贝一溴隐亭，甲磺酸溴隐亭

سېروكرپىتن 溴麦角隐亭, (Serocyptin)

【ئاساسىي تەركىبى】 برومومكرپىتن مېزىلات (甲磺酸溴隐亭).

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ، دوپامىن ئاكسىپپتۇرىنى

تالاپ قوزغاتقۇچى دورا، ھېپوفىز ئالدى يابراچە ھورمۇنى سوت ئاجرىتىش ماددىسىنىڭ ئاجرلىشىنى تورمۇزلايدۇ، باشقا ھېپوفىز ھورمونلرى (垂体激素)غا تىسرى كۆرسەتمەيدۇ، سوت ئاجرىتىش ماددىسى زىيادە كۆپىش كەلتۈرۈپ چىقارغان ھەرخىل كېسەللەككەرنى داۋاالاشقا ئىشلىتىلدى. مىقدارى بىر قىدەر يۇقىرى بولغاندا، دويمىن ئاكسيپيتورىنى قوزغىتىپ، تىترەش، قېتىپ قېلىش، ھەرىكتى ئاستىلاش ۋە پاركىنسون كېسلىنىڭ باشقا ئالامەتلەرنى ياخشىلايدۇ. ئىچكىندە تېز ھەم تولۇق سۈمۈرۈلىدۇ، T_{max} 3h - 1، ئاساسلىقى جىڭىرەدە مېتابوليزملەنىدۇ، $t_{1/2}$ 15h، ئاساسلىقى جىڭىر ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكتى نسبىتى 96%.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەككەر】 سوت ئاجرىتىش ماددىسى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ھەيىز قالىمىقاتلىشىش ۋە تۇغماسلقى كېسلى، ئەرلەردەكى سوت ئاجرىتىش ماددىسى يۇقىرلاش مەنبىلەك قان كېسلىدىن بولغان جىنسى ئىقتىدار تۆۋەنلەش، سوت ئاجرىتىش ماددىسى ئۆسسىسىنى ئۆپپەرتىسىسىز داۋاالاشلارغا ئىشلىتىلدى. پاركىنسون كېسلى ۋە مېڭە ياللۇغىدىن كېيىنكى پاركىنسون يىغىندى ئالامەتلەرىگە قارىتا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 1.25mg كۈنگە 3 ~ 2 قېتىم ئىچىلىدۇ، پاركىنسون كېسلى ياكى مېڭە ياللۇغىدىن كېيىنكى پاركىنسون يىغىندى ئالامىتى: بىرнچى ھەپتىسى كۈنگە 1.25mg ئىشلىتىلدى، كېيىن مىقدارىنى تىدرىجىي تەڭشىپ، كۈنگە 1.25mg كۆپەيتىپ، 3 ~ 2 قېتىمغا بۆلۈپ تاماق ۋاقتىدا ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش قېيش، چارچاش، كۆڭۈل ئېلىشىش، تۆۋەن قان بېسىمى كۆرۈلىدۇ. يۇقىرى دوزىدا ئىشلەتكەندە قەۋزىيەت بولۇش، ئۇيقوسراش كېلىپ چىقىدۇ، نېرۋىسى چېچىلىش، ھەرىكت خاراكتېرلىك ھاياجانلىنىش، خىاليي سېزىم، ھەرىكت توسالغۇغا ئۇچراش، ئىچىز قۇرۇش ۋە تۆۋەنكى مۇچىلەر سپازملەنىش قاتارلىقلار تاسادىپى كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دوربىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئېرگۈزىن (麦角生物碱) ياكى سىمپاتىكىسمان قان تومۇر

قىسىقىرىتقةۇچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، قان تومۇرنى قىسىقىرىتىش، قان بېسىم يۇقىرلاش خەترىنى پەيدا قىلىدۇ؛ ماکرولىدىپسلار (大环内酯类) (سپرامىتسىن يەنى 螺旋霉素 سىرتىدا) بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، بۇ دورىنىڭ قاندىكى قویۇقلۇقى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۇلار: ئېرگۈزىنغا زىيادە سەزگۈرلەر، ھامىلىدارلىقتىن زەھەرلىنىش كېسىلى، تۇغۇتىن كېيىنكى ياكى چىللە مەزگىلىدىكى يۇقىرى قان بېسىم بىمارلىرىغا ئىشلىتىش چەكللىنىدۇ. ③ باشقىلار: ھەزىم يولى يارسى، روھى پائالىيەت توسقۇنلۇققا ئۇچراش ياكى ئېغىر دەرىجىدە يۈرەك قان تومۇر كېسەللىكلىرى تارىخى بارلارغا ئەھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ بىمارنىڭ ماشىنا ھەيدەش ۋە ماشىندا مەشغۇلات ئېلىپ بېرىش ئىقتىدارىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ؛ ئۆزۈن مەزگىل يۇقىرى دوزىدا ئىشلەتكەندە پاركىنسون كېسىلى بىمارلىرىنىڭ كۆكىرەك پەردىسىگە سۈيۈقلۈق سەرغىيىدۇ ياكى قورساق پەرددە كەينى تالالىشىن ھادىسى كۆرۈلىدۇ. ھېپوفىز بىز ئۆسمىسى بارلار ھامىلىدار بولغاندا بۇ دورىنى ئىشلىتىشنى توختىتىش ھەمە ھامىلىدارلىق مەزگىلىدە تەپسىلى كۆزىتىش كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 برومۆكرېپتن - گېدىئۇن ۋېنگرېيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى، 2.5mg/، قاپ/30 تابلىپتى.

پارلودبىل شۇپىتسارىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى، 2.5mg/، قاپ/30 تابلىپتى؛ تابلىپتى، 2.5mg/، قاپ/100 تابلىپتى.

سپروكرېپتن ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى، 2.5mg/، قاپ/30 تابلىپتى.

، كانادادا ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى، 2.5mg/، قاپ/30 تابلىپتى، بوتولكا/30 تابلىپتى، بوتولكا/60 تابلىپتى.

لېۋەدوپا/بېنസېرازىدە

(苄丝肼，Benserazide/Levodopa，左旋多巴)

【باشقىا نامى】 مادوپار (美多巴，Madopar).

【ئاساسىي تەركىبى】 ھەر بىر تابلىپتىدا 200mg لېۋەدوپا، 50mg بېنസېرازىدە بولىدۇ.

『فارماکولوگیسلیک ٹالاھیدملکی』 لېۋەدۇپا پاركىنسون كېسىلىنىڭ ئالامەتلەرنى ياخشلايدۇ. بېنېپرازىد ئەتراب لېۋەدۇپانىڭ پارچىلىنىشنى تورمۇزلاپ، تېخىمۇ كۆپ لېۋەدۇپانى مېڭە قىسىمغا توشۇپ بېرىپ، دوپامىنغا ئايلاندۇردى.

『مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكلەر』 پاركىنسون كېسىلىگە سىمپىتوملۇق پاركىنسون يەخندى ئالامەتلەرى (مېڭە ياللۇغىدىن كېيىنكى، ئارتىپرىيە قېتىش خاراكتېرلىك ياكى زەھەرلىنىش خاراكتېرلىك) گە ئىشلىلىدۇ.

『ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى』 دەسلەپكى مىقدارى 125mg، كۈنگە ئۇچ قېتىم ئىچىلىدۇ. 2 - ھەپتىسىدىن باشلاپ كۈنگە 125mg دىن تاكى مۇۋاپق مىقدارغا يەتكۈچە قوشۇپ بېرىلىدۇ، ئۇنۇمۇك مىقدارى ئادەتتە كۈنگە 500mg ~ 100 بولۇپ، 4 ~ 3 قېتىمغا بۆلۈپ ئىچىلىدۇ. قامداش مىقدارى ھەر قېتىمدا 250mg بولۇپ، كۈنگە ئۇچ قېتىم ئىچىلىدۇ.

『ناچار تەسىرى』 يېنىك دەرىجىدىكى ئاشقازان - ئۇچىي يولى رېئاكسىسى، يۈرەك رىتىمىسىزلىقى، بەدهن تۇرقى خاراكتېرلىك تۆۋەن قان بېسىمى، ئۇيقوسوسىزلىق، ئەنسىزلىنىش قاتارلىقلار تاسادىپى كۆرۈلۈپ قالىدۇ، خاموشلۇق ۋە روھى كېسىل، ئىختىيارسىز ھەرىكەت قىلىش، مەسىلىن: ئۇسۇل كېسىلىگە ئوخشاش ھەرىكەت قىلىش ياكى قول - پۇت ئۆزلۈكىسىز تارتىشىپ تۇرۇش قاتارلىقلار ئىنتايىن ئاز كۆرۈلدى.

『دىققەت قىلىدىغان ئىشلار』 ① دوربىلار بىلەن بولغان تەسىرى: مونوئامىن ئوكسىدازانى (单胺氧化酶) نى تورمۇزلىغۇچى دوربىلار، سكلىوپروپان (环丙烷) ياكى فلوكتان (烷氤) قاتارلىق ناركوز دوربىلرى بىلەن بىرگە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ؛ رېزپرپىن (利血平) ۋە ھەپتىل - دوپا (巴-甲基多巴) قاتارلىق دوربىلار بۇ دورىنىڭ تەسىرىگە قارشى تۆردى. ② مەئىي قىلىنىدىغان ئەھۇلالار: ئېغىر دەرىجىدىكى ئىچىكى ئاجراتما كېسەللىكلەرى بىمارلىرى، بۆرەك، جىڭەر، يۈرەك كېسىلى بىمارلىرى، روھى كېسىللەر، 25 ياشتنى تۆۋەن بىمارلاار ياكى ھامىلىدارلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: ئاشقازان، 12 بارماق ئۇچىي يارسى، سۆڭۈك يۇمشاش كېسىلى، يۈرەك مۇسکۇل تىقلىمىسى، تاجىسىمان ئارتىپرىيىگە قان يېتىشىمەسىلىك، يۈرەك رىتىمىسىزلىقى ۋە

گلاۋى كوما بىمارلىرىغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.
【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 مادوپار شۇبىيتسارىيىدە ئىشلىنگەن.
 تابلىپتى: تابلىپتى/250mg، قاپ/40 تابلىپت.

كاربىدوپا/لېۋودوپا

(左旋多巴, Levodopa/Carbidopa, 卡比多巴)

【باشقا نامى】 سىنېمېت (息宁, Sinemet).

【ئاساسىي تەركىبى】 كاربىدوپا، لېۋودوپا.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 لېۋودوپا پاركىنسون كېسىلى ئالامەتلەرنى ياخشىلایدۇ، كاربىدوپا ئىتراب لېۋودوپانىڭ كاربوبوكسلىزلىنىشنى تورمۇزلايدۇ. بۇ دورا 6h ~ 4 ئىچىدە ئۇزۇملىك تەركىب قويۇپ بېرىدۇ، بۇ دورىنىڭ قان پلازمىسىدىكى لېۋودوپا سەۋىيىسىنى ئۆزگەرتىشى بىر قەدر كىچىك بولىدۇ.
【مۇۋاپىسق كېلىدىغان كېسىللەكلەر】 پاركىنسون كېسىلىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 بۇ دورا ئىچىلىدۇ. لېۋودوپا ئىشلەتمىگەنلەرگە بېرىلىدىغان دەسلەپكى مىقدارى ھەر قېتىمدا تەسىرى تىزگىنلىنىدىغان تابلىپتىدىن 250mg، كۈنگە ئىككى قېتىم؛ بىر قەدر كۆپ مىقداردىكى لېۋودوپاغا ئېھتىياجلىق بولغانلارغا، تەسىرى تىزگىنلىنىدىغان تابلىپتىدىن 1000mg ~ 250 كۈنگە ئىككى قېتىم ئىشلىتىلىدۇ، دورا ئىچىش ئارىلىقى 6h تىن تۆۋەن بولمايدۇ. ئادەتتىكى لېۋودوپا/دېكاربوبوكسidaزانى تورمۇزلىخۇچى مۇرەككىپ ياسالىملارنى ئىشلىتىپ داۋىلىنىۋاتقانلارغا، كلىنىكىلىق ئۇنۇمىگە قاراپ بۇ دورىنىڭ مىقدارى تەڭشىلىدۇ. تەسىرى تىزگىنلىنىدىغان تابلىپت دورىنى ئىچىكەندە چايىپ يۇتۇشا ياكى دورىنى ئېزىپ ئىچىشكە بولمايدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ھەرىكەت تو سۇقۇنلۇققا ئۇچراش ئەڭ كۆپ كۆرۈلىدۇ. كۆڭۈل ئېلىشىش، ئېلىشىپ قېلىش، باش قېيىش، ئۇسۇل كېسىلى، ئېخىز قۇرۇش قاتارلىقلار كۆپ كۆرۈلىدۇ. چۈشى بۇز ؤلۇش، مۇسکۇل تەرەڭلىكى تۆۋەنلەش، ئۇيغۇرسۇزلىق، خامۇشلىق، ئىشتىها تۆتۈلۈش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ، باش ئاغرىش، قەۋزىيەت

بولۇش، يۆنلىشىنى بىرق ئېتىش توسقۇنلۇققا ئۇچراش، سېزىم نورمالسىزلىنىش، نەپەس قىيىنلىشىش، بىدەن تۇرقى خاراكتېرلىك تۆۋەن قان بېسىمى، بۇرەك سېلىش، ئاشقازان - ئۇچىي بولى ئاغرىش، مۇسکۇل سپازمىلىنىش، كۆكىرەك ئاغرىش، بىدەن ئېغىرىلىقى تۆۋەنلەش قاتارلىقلار ئىنتايىن كەم كۆرۈلدى.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 بىزى قان بېسىمنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە بىدەن تۇرقى خاراكتېرلىك تۆۋەن قان بېسىمى پەيدا بولىدۇ؛ خامۇشلۇققا قارشى ترسىكلەك تۈرىدىكى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتىلسە، يۇقىرى قان بېسىمى ۋە ھەرىكەت توسقۇنلۇققا ئۇچراش ناھايىتى كەم كۆرۈلدى، فېتوتىئازىن تۇرى (吩噬嘯类) ۋە بۇتىرو فىپىنون تۇرى (丁酰苯类) دىكى دورىلار لېۋەددوپانىڭ ئۇنۇمىنى تۆۋەنلىتىشى مۇمكىن.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 سىنېمېت ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى/250mg، قاپ/30 تابلىپتى. سىنېمېت ئاۋسترا利يىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى/125mg، قاپ/100 تابلىپتى.

توبىرامات (托吡酯, Topiramate)

【باشقا نامى】 توپاماكس (妥泰, Topamax)
【ئاساسىي تەركىبى】 توبىرامات.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 8 - ئامىنۇ بۇتىرىك كىسلاتا (GABA, 4-氨基丁酸) خلور ئىئۇننى ھۈچەيرە ئىچىگە بىتەككەش ئىقتىدارىنى كۆچىيتىدۇ، تورمۇزلىغۇچى نېرۋا ئۆتكۈزگۈچى ماددىسىنىڭ تەسىرىنى كۆچىيتىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، يەنە كاربۇنك ئاھىدرارا زىزۋەپىزىم (碳酸酐酶同功酶) كېيىن تېز، تولۇق سۈمۈرۈلدى، T_{max} 2h تىزگىنلەيدۇ. ئىچكەندىن كېيىن تېز، تولۇق چىقىرىلىدۇ. $t_{1/2}$ 21h تەخمىنەن بولىدۇ. ئاساسلىقى بۇرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 تۇتقاڭ قوزغۇلىشىنى دىئالىزى بۇ دورىنىڭ چىقىرىلىشىنى تېزلىتىدۇ.

داۋالاشنى كۈچەيتىشكە ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر كۈنى كەچتە 50mg دىن باشلاپ، بىر ھەپتە ئىچىلدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن ھەر ھەپتىسى 50 ~ 100mg كۆپىتىلىپ، ئىككى قېتىمغا بولۇپ ئىچىلدۇ، مىقدارىنى كلىنىكلىق داۋالاش ئۇنۇمىگە ئاساسىن تەڭشەپ تۇرۇش كېرىدك.

【ناچار تەسىرى】 ھەركەت تەڭپۇڭلۇقى بۇزۇلۇش، دەققىتى چېچىلىش، ئۇيغۇسى خىرەلىشىش، باش قېيىش، چارچاش، سېزىم نورمالسىزلىنىش، ئۇيقوسراش ۋە تەپەككۈر نورمالسىزلىنىش قاتارلىقلار دائىم كۆرۈلدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، يەنە تەشۋىشلىنىش، ئۇنۇتقاقلقى، سۆزلىيەلمىسىك، خامۇشلۇق، نەرسىلەر قوش كۆرۈنۈش، كەپىييات تۇراقسىز بولۇش، كۆڭۈل ئېلىشىش، كۆز ئالىمىسى تىترەش، سۆز قابىلىيتسى توسقۇنلۇققا ئۇچراش، كۆرۈش سېزىمى نورمالسىزلىنىش ۋە بىدەن ئېغىرلىقى تۆۋەندەش قاتارلىقلار كۆرۈلدۇ.

【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: فېبنتوئىن (苯妥英) ياكى كاربامازپىن (卡马西平) نى قوشۇپ ئىشلەتكەنде ياكى ئىشلىتىشنى توختانقاندا، داۋالاش ئۇنۇمىگە قاراپ دورا مىقدارىنى مۇۋاپىق تەڭشەش لازىم. ② باشقىلار: دورا توختىتىشتا مىقدارىنى تەدرىجىي كېمەيتىپ توختىتىش لازىم؛ بىر قىسىم بىمارلاردا بۆرەكتە تاش پېيدا بولۇش خەترىنى ئاشۇرۇشى مۇمكىن؛ هامىلىدارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ بۇ دورا تابلېتىنى ئېزىپ پارچىلاشقا بولمايدۇ، بۇ دورىنى ئىشلەتكەنде يېمەكلىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرمىайдۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 توباماماكس پورتۇڭالىيىدە ئىشلەنگەن. تابلېتى: تابلېت/25mg، تابلېت/50mg، تابلېت/100mg، قاپ/60 تابلېت.

ئېپېرىزون ھىdroxloride

(盐酸乙苯哌丙酮，Eperisone Hydrochloride)

【باشقا نامى】 مىئونال (妙纳，Myonal)

【ئاساسىي تەركىبى】 ئېپېرىزون ھىdroxloride.

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 مەركىزىي نېرۋا

سېستېمېسىغا تىسرى كۆرسىتىپ، سۆڭكەك مۇسکۇلىنىڭ جىددىلىك
هالىتنى ياخشلايدۇ؛ كالىتسىي ئىئونى بىلەن قارشىلىش ۋە قان تومۇر
سلق مۇسکۇل سىمپاتىك نېرۋىسىنى تىزگىنلەش ئارقىلىق قان تومۇرنى
كېڭىھىتىپ، قان ئېقىمىنى كۆپىتىدۇ؛ بۇلۇن ئاغرىش سېزىمىنى
ئۆتكۈزگۈچى ماددىسى بىلەن قارشىلىش ئارقىلىق، ئاغرىش رېفلىكىسىنى
تىزگىنلەيدۇ؛ باش قېبىش هادىسىنى ياخشلايدۇ، بۇ دورىنى ئىچكىندىن
كېيىن T_{max} 1.9h ~ 1.6 ~ 1.8h $t_{1/2}$ ~ 1.9h بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەككەر】 مۇسکۇللارانىڭ
جىددىلىشىش هالىتنى ياخشلاش، سپاز مىلىق پالەچنى ياخشلاش، باش
قېبىش ياكى قۇلاق غوڭۇلداشنى ياخشلاشقا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار ھەر قېتىمدا
50mg، كۈنگە ئۆچ قېتىم تاماقتنى كېيىن ئىچىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 شوك، جىڭىر، بۆرەك فۇنكىسييسى
نورمالسىزلىنىش، قىزىل قان ھۇجەيرىسى سانى ۋە (ھېموگلوبىن) قان
ئاكسىلى نورمالسىزلىنىش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا پەيدا بولىدۇ. ئۇنچىدىن
باشقا، يەن ئەسۋە، قىچىشقان، ئۇيقوسىزلىق، بەدەن قېتىپ قېلىش، توت
مۇچە كۈيۈشۈش، تىترەش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىشتىها
تۆتۈلۈش، ئاشقازان يېقىمىزلىنىش، ئۇسساش، قۇزىيەت بولۇش ياكى
ئىچ سۈرۈش، قورساق ئاغرىش، قورساق كۆپۈش قاتارلىقلار كۆرۈلەدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى:
مېتوكاربامال (甲氧卡巴莫) بىلەن بىرگە ئىشلىلىسە، كۆزنىڭ تەڭشەش
ئىقتىدارى توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. ② باشقىلار: دورا ئىشلىتۈۋانقان
مەزگىلە ماشىنا ھىدەشكە ياكى ماشىنلاردا مەشغۇلات ئېلىپ بېرىشقا
بولمايدۇ؛ جىڭىر فۇنكىسييسى توسقۇنلۇققا ئۇچرىغانلارغا، بالا
ئېمىتتۈۋانقان ئاياللارغا ئېوتىيات بىلەن ئىشلىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىسى】 مىئونال يابونىيىدە
ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى/50mg، قاپ/20 تابلىپت، تابلىپت/50mg،
قاپ/100 تابلىپت.

باكلوفين (巴氯芬，Baclofen)

【باشقانامى】 سپيناكس (脊舒，Spinax)，لىئورېسال (力奥来素，Lioresal)

【ئاساسىي تەركىبى】 باكلوفين.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا نېرۋا ئۆتكۈزۈشنى تورمۇزلىخۇچى ياسالىمغا ئوخشىشپ كېتىدىغان ماددا بولۇپ، يىلىك يەككە ھۇجىھىرە ئۆسۈكى ۋە كۆپ ھۇجىھىرە ئۆسۈكىنىڭ رېقلىكىسىنى بىرلا ۋاقىتتا تورمۇزلىيالايدۇ. كۆپ ئورۇنلۇق قېتىشتىن پىديا بولغان سپازمىلىنىش ئالامەتلەرنى يېنىكلىتىپ، پۇككۈچى مۇسکۇللارنىڭ سپازمىلىنىشى ۋە ئىگىشىپ كەلگەن ئاغرۇقىنى پەسىتىپ، تۇنقاقلىق تارتىشىش ۋە مۇسکۇلنىنىش تىسترىشنى ياخشىلایدۇ، مەزكۇر دورا تېز سۈرەتتە سۈمۈرۈلدۈ ۋە چىقىرىلدى. ئاساسلىقى ئەسلى پېتى بۇرەك ئارقىلىق چىقىرىلدى.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىدە】 يىلىك ۋە چوڭ مېڭ كېسەللەكلىرى ياكى زەخىمىلىنىشتىن بولغان مۇسکۇل سپازمىلىنىشقا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 دەسلەپكى مىقدارى ھەرقېتىمدا 5mg بولۇپ، كۈنگە ئۈچ قېتىم ئىچىلدى. ئۈچ كۈندىن كېيىن 5mg كۆپەيتىپ، تاكى كۆڭۈلدىكىدەك داۋالاش ئۇزۇمى كۆرۈلگىچە داۋاملاشتۇرۇلدۇ. ئەڭ يۇقىرى مىقدارى كۈنگە 80mg (ھەر قېتىمدا 20mg دىن كۈنگە توت قېتىم) بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 چارچاش، ئۇيقوسراش، ھەرىكەت ئىقتىدارى تەڭپۇڭسىزلىنىش، نەپەس ۋە بۇرەك قان تومۇرلار تورمۇزلىنىش، زەئىپلىشىش، ھېرىش ۋە باش قېيىش قاتارلىقلار كۆرۈلدۈ، باش ئاغرۇش، ئۇيقوسزلىق، تۆۋەن قان بېسىمى، كۆڭۈل ئېلىشىش، كۈزۈيەت، سۈيدۈك قېتىم سانى كۆپىيىش قاتارلىقلار ئاز كۆرۈلدۈ.

【دىقىدت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئىسپەرت ياكى مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنى تورمۇزلىخۇچى باشقا دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە تەسىرى ئۆزئارا كۆچىيىدۇ. ② مەنئى

قىلىنىدىغان ئەمۇالار: بۇ دورىخا زىياده سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ③ باشقىلار: دورا ئىشلەتكەندىن كېپىن ماشىنا ھېيدەش ياكى ماشىنىدا مەشغۇلات قىلىشقا توغرا كەلسە چوقۇم ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك؛ دورا توختىتىشا مىقدارى تەدرىجى كېمەيتىلىپ توختىتىلىدۇ؛ بۆرەك فۇنكسييسى تولۇق بولىغانلارغا دورا مىقدارىنى تەڭشەپ ئىشلىتىش كېرەك؛ سەكتىگە گىرىپتار بولغانلارنىڭ بۇ دورىخا چىدامچانلىقى بىر قەدەر ناچار بولىدۇ.

【ياسالمىسى ۋە ئۆلچەمى】 سېنىاكس تەيۋەندە ئىشلەنگەن.

تابلىپتى: تابلىپتى 10mg، قاپ/20 تابلىپت.
لىئوربىسال شۇبىيتسارىيەدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى:
 تابلىپتى 10mg، تابلىپتى 25mg، قاپ/30 تابلىپت.

§ 4 . تۇتقاقلىققا قارشى دورىلار

سودىئۇم ۋالپروئات (丙戊酸钠，Sodium Valproate)

【باشقا نامى】 دېپاکىن (Depakine) ، Epilim (德巴金)

【ئاساسىي تەركىبى】 سودىئۇم ۋالپروئات.

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ كەڭ تەسىرلىك تارتىشىشقا قارشى دورا بولۇپ، كۆپ خىل تۇتقاقلىقنىڭ ھەممىسىگە ئۇنۇم بېرىدۇ، تۇتقاقلىققا قارشى تەسىرىنىڭ مېخانىزمى مېڭىدىكى 4 - ئامىنوبۇتىرىك كىسلاقاتاسىنىڭ قويۇقلۇقسى يۈقىرى كۆتۈرۈش بىلەن مۇناسىۋەتلەك بولۇشى مۇمكىن. $t_{1/2}$ ~ 6 h، ئاساسلىقى جىڭىرەدە مېتابولىزملەنتىپ، سۈرۈدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىدەر】 ئادىدى خاراكتېرلىك تۇتقاقلق قوزغىلىش، مۇرەككىپ خاراكتېرلىك ھوشىنى يوقىتىشنىڭ قوزغىلىشىغا ئىشلىتىلىدۇ، باشقا دورىلار بىلەن بىرلەشتۈرۈپ كۆپ خىل قوزغىلىشچان (ھوشىنى يوقىتىشنىڭ قوزغىلىشىنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ) تۇتقاقلىقلارنى داۋالاشقا بولىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 دەسلەپكى مىقدارى كۈنگە

هر kg بىدەن ئېخىرىلىقىغا 15mg بولۇپ، بىر قېتىم ئىچىلىدۇ. ھەر ھەپتە ئۇدا ئىشلەتكەندىن كېيىن كۈنىگە ھەر kg بىدەن ئېخىرىلىقىغا 10mg ~ 5 كۆپەيتىلىپ، تاکى تۇتقاقلىق كوتىرۇل قىلىنخىچە داۋاملاشتۇرۇلدۇ، ئەڭ يۇقىرى مىقدارى كۈنىگە ھەر kg بىدەن ئېخىرىلىقىغا 60mg ئىچىلىدۇ، ئەگەر كۈنلۈك مىقدارى 250mg 250mg دىن ئېشىپ كەتسە، بىرنەچە قېتىمغا بولۇپ ئىشلىتىش لازىم.

【ناچار تەسىرى】 كۆئۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ھزىم قىلىش ناچارلىشىش، ئىچ سۈرۈش، قورساق قىسىمى تارتىشىش، قەۋزىيەت، تىنچلىنىش، قان پلاستىنكلىرى ئازىيىش، ALT، AST ۋە LDH يۇقىرىلاش قاتارلىقلار كۆرۈلدۈدۇ. قان زەردابىدىكى بىلىر ۋىبن يۇقىرىلاش ۋە باشقا جىڭىر فۇنكسىيىسى كۆرسەتكۈچلىرى نورمالسىزلىنىش، ئېخىرى بولغاندا جىڭىر فۇنكسىيىسى زەئىپلىشىش قاتارلىقلار ئاندا - سنادا كۆرۈلەندۈدۇ؛ كەيپىيياتى نورمالسىز بولۇش، خامۇشلۇق، ھۇجۇم خاراكتېرىلىك قىلىمىشلار، كۆپ ھەرىكت قىلىش، ئاق قان ھۈچىرىسى، قان پلاستىنكلىرى كېمىيىش، كىسلاتا خۇمار ھۈچىرىلدەر كۆپىيىش، قان ئازلىق، يىلىك تورمۇزلىنىش، ھېيز قالايىقانلىشىش، ئىككىلەمچى ھەيز تۇتۇلۇش قاتارلىقلار تاسادىپى كۆرۈلۈپ قالىدۇ. ئۆتكۈر ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغى، ھەرىكتە ئەڭكەشلىكى بوزۇلۇش، باش ئاغرغىش، كۆز ئالمىسى تىترەش، نەرسىلەر قوش كۆرۈنۈش، سۆزلەش تو سقۇنلۇققا ئۇچراش، باش قېيىش، ئەمچەك يوغىناش ۋە سوت ئېقىش، ئەسۋە چىقىش، كۆپ شەكىللەك قىزىل داغ پەيدا بولۇش، مۇسکۇل كۈچسۈزلىنىش، قالقانبىز ئېقتىدارى نورمالسىزلىنىش، يۇقىرى ئاممىياكلىق قان كېسىلى، قاندا شېكىر يۇقىرىلاش، چاچ ۋە موپىلار ۋاقتىلىق چۈشۈپ كېتىش ياكى كۆپىيىش قاتارلىقلار ئىنتايىن كەم كۆرۈلەندۈدۇ.

【دېقىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئەڭ ياخشىسى بىرلىكتە ئىشلىتىلگەن تۇتقاقلىقا قارشى باشقا دورىلارنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقىنى ئۆلچەپ چىقىش؛ فېنوباربىتال (苯巴比妥) بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە فېنوباربىتالنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقى ئېشىپ، مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىنىڭ ئېغىر دەرىجىدە تورمۇزلىنىشى كېلىپ چىقىدۇ؛ قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نسبىتى يۇقىرى بولغان دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، دورىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقى

يۇقىرىلايدۇ؛ كلونازېپام (氯硝西洋) بىلەن بىرگە ئىشلەتكىندە ئەس - هوشىنى يوقىتىش حالىتى پەيدا بولۇشى مۇمكىن. ② باشقىلار: بالا ئېمىتۋاتقان ئاياللار ۋە جىڭىر كېسىلى تارىخى بارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتلىدۇ؛ دورا ئىچىۋاتقان مىزگىلدە ماشىنا ھېيدەشكە ۋە ماشىندا مەشخۇلات ئېلىپ بېرىشقا بولمايدۇ؛ داۋالىنىۋاتقان مىزگىلدە قان پلاستىنكلېرىنىڭ سانىنى قىرەللەك تەكشۈرۈپ تۇرۇش ۋە قان ئۇيۇش تەجىرىبىسى ئىشلەش كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمىسى】 دېپاكىن فرانسييىدە ئىشلەنگەن. ئاستا تەسىرىلىك تابلىقى: تابلىق/500mg. بوتۇلكا/30 تابلىق؛ ئۆكۈلى: ئامپۇل/400mg، قاپ/1 ئامپۇل. ئېپىلىم ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. شېكەرلىك قىيامى: 200mg/5ml، بوتۇلكا/100ml ياكى بوتۇلكا/300ml.

كاربامازېپين (卡马西平，Carbamazepine)

【باشقا نامى】 تېگرپتول (Tegretol)، كارپىن (得理多，Carpine).
【ئاساسىي تەركىبى】 كاربامازېپين.
【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورىنىڭ تۇتقاقلىققا قارشى تەسىرى كلۇتامىك كىسلاتا (谷氨酸) نىڭ قويۇپ بېرىلىشىنى كېمەيتىش ۋە نېرۋا پەردىسىنى مۇقىملاشتۇرۇش ئارقىلىق بارلىققا كېلىشى، غالجىرىلىققا قارشى تەسىرى دوپامىن (多巴胺) ۋە نور ئادېپتالىن (去甲肾上腺素) نىڭ تۆپلىشىنى تورمۇزلاشتىن بارلىققا كېلىشى مۇمكىن. مەزكۇر دورىنىڭ سۈمۈرۈلۈشى ئاستا ھەم تولۇق بولىدۇ، قاندىكى قويۇقلۇقىنىڭ يەككە تەنلەر بويىچە پەرقى چوڭ بولۇپ، داۋالاش قويۇقلۇقى دائىرسى تاخمىنەن $12\mu\text{g}/\text{ml} \sim 4\mu\text{g}$ بولىدۇ، جىڭىرەدە مېتابوليزملەنىدۇ، گەنده ۋە سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىلىلىكىلەر】 تۇتقاقلىق، ئەسەبىلىك كېسىلى، قۇتراش ۋە خامۇشلۇق كېسىلى، هاراق تاشلاش يىخىندى ئالامەتلەرى؛ كۆپ ئورۇنلۇق قېتىشتن كېلىپ چىقىدىغان ئۈچلۈك نېرۋا ئاغرىش ۋە بىرلەمچى ئۈچلۈك نېرۋا ئاغرىش، بىرلەمچى تىل - يۇقۇنچاق

نېرۋىسى ئاغرش؛ دىئاپىت كېسلىدىكى نېرۋا كېسەللەك ئۆزگىرىشى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئاغرش؛ مەركىزىي نېرۋا مەنبىلىك كۆپ سىيىش كېسلى، نېرۋا - ئىچكى ئاجراتما مەنبىلىك كۆپ سىيىش ۋە چاڭقاش.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 تۇتقاقيقىق: ھەر قېتىمدا ~ 200mg ~ 100 كۈننە 2 ~ 1 قېتىم ئىچىلىدۇ، تەدرىجىي ھالدا ئەڭ ياخشى داۋااش ئۇنۇمى كۆرۈلگىچە كۆپىتىلىدۇ، ئادەتتە ھەر قېتىمدا 400mg دىن كۈننە 3 ~ 2 قېتىم ئىچىلىدۇ. ئۈچلۈك نېرۋا ئاغرش:

كۈننە 400mg ~ 200 دىن كۈننە 4 ~ 3 قېتىم ئىچىلىدۇ، ئاندىن تەدرىجىي ھەر قېتىمدا 200mg دىن كۈننە 4 ~ 3 قېتىم ئىچىلىدۇ، ھاراق تاشلاش يىخىندى ئالامەتلەرى: 200mg دىن كۈننە 4 ~ 3 ئىچىلىدۇ. مەركىزىي نېرۋا مەنبىلىك كۆپ سىيىش كېسلى: ھەر قېتىمدا 200mg دىن كۈننە 3 ~ 2 قېتىم ئىچىلىدۇ، دىئاپىت كېسلى، نېرۋا كېسەللەك ئۆزگىرىشى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئاغرقىق: ھەر قېتىمدا 200mg دىن كۈننە 4 ~ 2 قېتىم ئىچىلىدۇ. ئىسەبىيلىك كېسلى ۋە قۇتراش، خامۇشلۇق كېسلى:

كۈننە 600mg ~ 400، 3 ~ 2 قېتىمغا بولۇپ ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش قېيىش، باش ئاغرش، ھەرىكتە تەڭكەشلىكى بۈزۈلۈش، ئۈيۈسۈرۈش، نەرسىلەرنى قوش كۆرۈش، يەلتاشما، كىسلاتاخۇمار ھۇجمىرىلدەر كۆپىيىش، قان پلاستىنكلەرى ۋە ئاق قان ھۈچەپىسى كېمىيىش، ترانسىئامىنازا ئۆرلەش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، سۈلۈق ئىشىقى، بەدەن سۈيۈقلۈقى يېخلىپ قېلىش، بەدەن ئېغىرلىقى ئېشىش، نەپەس قىيىنلىشىش، ئۆپكە ياللۇغى قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، يۈرەكىنىڭ ئىمپۇلس ئۆتكۈزۈشى توسىقۇنلۇققا ئۈچراش ناھايىتى ئاز ئۈچرەيدۇ.

【دىقىقتەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: مونۇئامىن ٹوکسىدازا (单胺氧化酶) ئارقىلىق مېتابولىز ملىنىدىغان دورىلار ۋە فېننتوئىن ناتىرى (苯妥英钠) نىڭ قاندىكى قويۇقلۇقىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئېرىتىرومتىسىن (红霉素)， رىمىفون (异烟肼)، ۋېرآپامىل (维拉帕米)， دىلتىئازىپ (地尔硫卓)، فلوئوكسبېتىن (氟西汀)， دىرېپىنال (达那唑)، دانازول (达那唑)، نىكوتىنامىد (烟酰胺) قاتارلىقلار بۇ دورىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ؛ لىتىي تۆزى،

مېتوكلوپراميد (甲氯普胺)، تىنچلاندۇرۇش دورىلىرى بىلەن بىرگە ئىشلەتكىننە، نېرۋا سىستېمىسىغا بولغان ناچار تىسرىنى كۈچەيتىدۇ؛ فېنوباربىتال (苯巴比妥) ، فېنتوئىن ناتريي (苯妥英钠) ، ئېلامىدون (扑痛酮) ، تېۇفىللەن (茶碱) ، كلونازپام (氯硝西泮)، دېپروپىلاتېتامىد (丙戌酰胺) قاتارلىق دورىلار بۇ دورىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقىنى تۆۋەنلىتىدەيدۇ؛ بىزى سۈيدۈك ھېدىگۈچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكىننە تۆۋەن ناترىيلىق قان كېسىلى پەيدا بولۇشى مۇمكىن؛ قۇتۇسىز لانمايدىغان مۇسکۇل بوشاقۇچى دورىلارغا نىسبەتن قارىمۇ قارشى تەسىرگە ئىگە بولىدۇ. ② مەنىقىلىنىدىغان ئەھۇاللار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر، دالانچە - قېرىنچە ئۆتكۈزۈشى توسلۇغانلار، يىلىك تورمۇزانغان تارىخى بارلار ياكى ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئارىلاپ پەيدا بولىدىغان پورفيرىن كېسىلىگە گىرىپتار بولغۇچىلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ؛ مونوئامىن ئۆكسىدازانى تورمۇزلىغۇچى دورىلار بىلەن بىلە ئىشلىتىش مەنىقىلىنىدى. ③ باشىلار: قەرەللىك حالدا ھېماتولوگىيلىك تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش لازىم؛ ئارىلاش تېپلىق تۇتقاقلىققا ئەگىشىپ كەلگەن تېپك بولمىغان هوشىنى يوقىتىش قوزغالغۇچىلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ يۈرەك كېسىلى، جىڭىر، بۆرەك كېسىلى تارىخى بارلار، باشقۇدا دورىلارغا نىسبەتن ھېماتولوگىيلىك ناچار تەسىر تارىخى بارلار ياكى بۇ دورا بىلەن داۋالاش كۈرسى ئاخىر لاشتۇرۇلغانلارغا كۆزىتىش شەرتى ئاستىدا بۇ دورىنى ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئىشلىتىش لازىم؛ داۋالاش، جەريانىدا كۆز بېسىمى ئۆرلىكۈچىلەرگە بولغان كۆزىتىشنى كۈچەيتىش، ئەڭ ياخشىسى بۇ دورىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقىنى ئۆلچەپ تۇرۇش، ھابىلىدار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 تېگرىتول شۇپىتسارىيىدە ئىشلەنگەن.
 تابلېتى: تابلېت/200mg، قاپ/30 تابلېت؛ شېكەرلىك قىيامى: 2%
 . 100mg/5ml
 كارپىن تايياندىتا ئىشلەنگەن. تابلېتى: تابلېت/200mg،
 قاپ/50 تابلېت.

لاموتريگين (拉莫三疊，Lamotrigine)

【باشقى نامى】 لامكتال (利必通，Lamictal)
【ئاساسىي تەركىبى】 لاموتريگين.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 نېرۋا ھۈجىرىسىنىڭ گلۇتامىك كىسلاتانى پاتولوگىيلىك قويۇپ بېرىشنى تورمۇزلايدۇ، گلۇتامىك كىسلاتانىڭ ھەرىكەت پۇتنىسىئالىنىڭ شىدەتلىك قوزغىلىشنى پېيدا قىلىشنىمۇ تورمۇزلايدۇ. ئىچكەندىن كېيىن تېز، تولۇق سۇمۇرۇلىدۇ، T_{max} 2.5h $t_{1/2}$ 35h， 24 بولىدۇ، ئاساسلىقى بۆرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىدلىكىلەر】 تۇتقاق قوزغىلىش.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 دەسلېپىدە 25mg كۈنگە بىر قېتىم، ئۇدا ئىككى ھەپتە ئىچلىدۇ، كېيىن 50mg 50 دىن كۈنگە بىر قېتىم، ئۇدا ئىككى ھەپتە ئىچلىدۇ، ئاندىن ھەر 2 ~ 1 ھەپتىنى ئۆتكۈزۈپ مىقدارى كۆپەيتىلىدۇ، ئەڭ كۆپ بولغاندا ~ 100mg ~ 50 غىچە بولىدۇ، ئادەتتە ئەڭ ياخشى داۋالاش ئۇنۇمىگە ئېرىشكىلى بولىدىغان قامىداش مىقدارى كۈنگە 200mg ~ 100 بولۇپ، 2 ~ 1 قېتىمغا بۆلۈپ ئىچلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرىش، چارچاش، ئىسۇھ چىشى، كۆڭۈل ئېلىشىش، باش قېيىش، ئۇيقوسراش، ئۇيقوسلىق قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، قان تومۇرلاردا بىيىلما خاراكتېرىلىك قان ئۇيۇش، كۆپ زەزار زەئىپلىشىش، Stevens — Johnson يىغىندى ئالاھىتلىرى ۋە زەھەرلىنىش خاراكتېرىلىك يۈزه تېرە بېكروزلىنىپ ئېرىش كېسىلى قاتارلىقلار ناھايىتى ئاز كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: فېنوباربىستال (苯巴比妥)، پرمىدون (扑米酮) لار بۇ دورىنىڭ مېتابولىزملىنىشىنى ئاشۇرىدۇ؛ سودىئوم ۋالپروئات (丙戊酸钠) بۇ دورىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. ② باشقىلار: ئۇزۇن مىزگىل داۋالغاندا فولىك كىسلاتاناسىنىڭ مېتابولىزملىنىشىغا توسىقۇنلۇق

قىلىشى مۇمكىن.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 لامكتال ئېنگلىيىدە ئىشلەنگەن.
تابلىپتى: تابلىپت/50mg، تابلىپت/100mg، قاپ/30 تابلىپت.

گاباپېنتىن

(加巴喷丁，Gabapentin)

【باشقما نامى】 نېئۇرۇوتتن (Neurontin, 诺立汀)

【ئاساسىي تەركىبى】 گاباپېنتىن.

【فارمالوگىيىلىك ئالاهىدىلىكى】 بۇ ئامىنولېيدىسىز تۈرى (非氨脂类) دىكى تۈتقاقلىققا قارشى دورا. ئىچكەندە ئاشقازان - ئۈچىي ئارقىلىق سۈمۈرۈلدۈ، 3h Tmax، تارقىلىشى كەڭ، ئاساسلىقى ئىسى پېتى بۆرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، $t_{1/2} \sim 7\text{h}$ 5 بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 بىر قىسىم تۈتقاقلىق قوزغىلىش ۋە ئىككىلەمچى پۇتون بىدەنلىك قوزغىلىشنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ. دائىملقى داۋالاش ئۇنۇم بىرمىگەن ياكى تۈتقاقلىققا قارشى دائىملقى دورىلارغا بىرداشلىق بىرەلمىدىغان بىمارلارغا ئىشلىتىلىدۇ. 【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قىتىمدا ~ 200 دن، كۈنگە ئۈچ قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ناچار تىسىرى】 ئۇيقوسراش، باش قېيىش، چارچاش قاتارلىقلار دائىم كۆرۈلەدۇ. كۆز ئالىمىسى تىترەش، باش ئاغىرىش، نەرسىلەرنى قوش كۆرۈش، بۇرۇن ياللىۇنى، يۇتقۇچاڭ ياللىۇنى، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، تارتىشىش، بەدەن ئېغىرلىقى تۇۋەنلىش، ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش، ئىستە تۇتۇش توسىقۇنلۇققا ئۇچراش قاتارلىقلار كۆرۈلەدۇ؛ يۇتلۇ ئاسادىپىي كۆرۈلۈپ قالىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 نېئۇرۇوتتن گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن.
كاپسۇلى: دانە/100mg، دانە/300mg، دانە/400mg، قاپ/28 دانە، قاپ/56 دانە.

5 . سۆڭەك مۇسکۇلىنى بوشاتقۇچى دورىلار

ۋېكۈرونیئۇم برومید (维库溴铵, Vecuronium Bromide)

【باشقا نامى】 نوركۈرون (Norcuron) . (万可松)

【ئاساسىي تەركىبى】 ۋېكۈرونیئۇم برومید.

【فارماکولوگىسىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ ۇوتۇراھاھ ئۇنۇملۇك قۇتۇپسىز لانمايدىغان مۇسکۇل بوشاتقۇچى دورا بولۇپ، تەسىرى پانكۈرونیئۇم برومید (泮库溴铵) بىلەن ئوخشىشىدۇ، مۇسکۇل بوشىتىش تەسىرى پانكۈرونیئۇم برومىدىن $1/3$ ھەسىسە كۈچلۈك، $t_{1/2}$ ٢٤min ، بىر قىسىمى مېتابولىزىملىنىپ، سۈيدۈك ۋە ئۆت سۈيۈقلۈقى ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 كانايغا نېچە كىرگۈزگەن چاغدىكى مۇسکۇل بوشىتىشا ۋە تاشقى بۆلۈم گۇپپراتسىيىسى ياكى سۈنئىي ئەپسەلەندۈرگەن چاغدىكى سۆڭەك مۇسکۇلىنى بوشىتىشا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلارغا، تۈنجى قىتمىم ھەر kg بىدەن ئېخىرلىقىغا ~ 0.08 ـ 0.1mg ۋېنغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، ھەر kg بىدەن ئېخىرلىقىغا ~ 0.03 ـ 0.05mg تولۇقلاشقا بولىدى. بالىلارغا ئىشلىتىلىدىغان دەسلەپكى مىقدارى ۋە تولۇقلاش مىقدارى چوڭلارنىڭكىدىن سەل يۈقىرى بولىدى.

【ناچار تەسىرى】 بۇ دورىنىڭ قان تومۇرغى بولغان تەسىرى بىر قەدەر كىچىك بولىدى.

【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 تۈبۈكۈرۈرنىن تۈرى (筒筒毒碱类) دىكى دورىلارغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ؛ ئېيىغا توشىغان بۇ ئاقلارغا ئىشلىتىش مۇۋاپىق ئەممەس؛ جىنگەر قاتقان، ئۆت قېيىپ قالغان ۋە ياكى ئېخىر دەرجىدىكى بۆرەك فۇنكسىيىسى تولۇق بولمۇخانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 نوركۈرون گوللاندىيىدە ئىشلەنگەن. ئۆكۈلى: بوتۇلكا/4mg، قاپ/50 بوتۇلكا.

پانکورونیئوم برومید (泮庫溴铵，Pancuronium Bromide)

【باشقا نامى】 پاۋۇلۇن (潘龙，Pavulon) . (巴夫龙，Pavulon)

【ئاساسىي تەركىسى】 پانکورونیئوم برومید.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ سۇئىي ئۇسۇلدا سىنتېزلىنگەن قۇۇقىزىلانمايدىغان رىقابىت خاراكتېرىلىك مۇسکۇل بوشاقۇچى دورا بولۇپ، مۇسکۇل بوشىتىش تەسىرى كۈچلۈك، تەسىر قىلىش ۋاقتى تۈبۈكۈرارىن (碱箭毒碱) بىلەن ئوخشىشپ كېتىدۇ. ئۇدا ئىشلىتىلسە بەدەندە يىخلىپ قالمايدۇ. ۋېنىغا ئوكۇل قىلغاندىن كېين تېز ئۇنۇم بېرىدۇ، قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نىسبىتى تەخمىنەن 80%， ئاساسلىقى ئەسىلى پېتى يۈرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.
【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 هەر خىل ئۇپراتسىيلىرىڭە ئىشلىتىلىدۇ، كاناپىغا نېيچە كىرگۈزۈشتە ئىشلىتىشكىمۇ بولىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مۇسکۇلغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، چوڭلارغا ئىشلىتىلىدىغان دەسلىپى مىقدارى هەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا ~ 80 بولىدۇ. زۆرۈر تېپىلغاندا هەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا ~ 100 μ g كۆپەيتىلىدۇ. باللارغا ئىشلىتىلىدىغان دەسلىپى مىقدارى ~ 20 μ g بەدەن ئېغىرلىقىغا ~ 30، تولۇقلاش مىقدارى هەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا ~ 40 μ g بەدەن ئېغىرلىقىغا ~ 10 بولىدۇ. پۇرتىپ ناركوز قىلىش دورىلىرى بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە دورا مىقدارى ئازىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 شۆلگىينى كۆپەيتىدۇ، يۈرەك رىتىمى، قان بېسىمى ۋە يۈرەكىنىڭ چىقىرىش مىقدارىنى سەل ئاشۇرۇدۇ. سەزگۈر بىمارلاردا يۈرەك رىتىمىزلىقىنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن، كاناپىچە سپازمىلىنىش ۋە ئاللىپەرىگىلىك رېئاكسىيلىر ئاندا - ساندا كۆرۈلدى.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: پۇرتىپ ناركوز قىلىش دورىلىرى، ماگنى تۆزى ۋە ئامىنۇگىلىكىزىدە تۈرىدىكى ئانتىبىئوتىك دورىلار بۇ دورىنىڭ تەسىرىنى كۈچەيتىدۇ؛ ئاتىسىتىلخولىن، خولىن ئىستېرازارغا قارشى دورىلار ۋە كالىي تۆزى تەرىپىدىن چەكلەنىدۇ. ② مەنىقى قىلىنىدىغان ئەھۋالار: ئېغىر ئۇتىدىغان

مۇسکۇل جانسىزلىنىش كېسىلى بارلارغا، ئېغىر دەرىجىدىكى بۆرەك فۇنكسىيىسى تو سقۇنلۇققا ئۇچرىغۇچىلارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ③ باشقىلار: ھامىلىدار ئاياللارغا ئەھتىيات بىلدەن ئىشلىتىلىدۇ، شۆلگەينىڭ ئاچرىلىشى كۆپىيگەندە، ناركوز قىلىشنىڭ ئالدىدا ئەھۋالغا قاراپ ئاتروپىن ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

【 ياسالىمىسى ۋە ٹۈلچىمى】 پاۋۇلون ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن.

ئوكۇلى: ھەر ئامپۇلى 4mg/2ml .

پاۋۇلون گوللانىدىيىدە ئىشلەنگەن. ئوكۇلى: ھەر ئامپۇلى

. 4mg/2ml

6 § . خولىنغا قارشى دورىلار

سکوپولامىن

(东莨菪碱, Scopolamine)

【 باشقا نامى】 سکوپودېرم TTS (使保定缓释贴剂, ScopodermTTS)

【 ئاساسىي تەركىبى】 سکوپولامىن.

【 فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ، سکوپولامىننىڭ تېرىگە چاپلىنىدىغان پلاستېرى بولۇپ، 1 - قەۋۇت يېپىشقاق قەۋۇتىدە سکوپولامىننىڭ زەربىدار مىقدارى بولىدۇ، 2 - قەۋۇت ئاكتىپ ماددا قەۋىتىدە ئۈچ كۈنلۈك دورا مىقدارى بولىدۇ، 3 - قەۋۇتى بولسا تىزگىنىلىكىڭۈچى پەرده بولۇپ، دورىنىڭ قامداش مىقدارى بويىچە ئۈزۈكىسىز، مۇقىم سۈرئەتتە قويۇپ بېرىلىشىگە كاپالا تىلىك قىلىدۇ.

【 مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكىلەر】 ماشىنا، پاراخوت، ئايروپىلانلارغا ئولتۇرغاندا پەيدا بولىدىغان باش قېيىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【 ئىشلىتىش ٹۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ماشىنغا ئولتۇرۇشتىن 6h ~ 5 ئىلگىرى، قۇلاقنىڭ كەينىدىكى قۇرغاق مويىسىز قىسىمغا بىر تال چاپلىنىدۇ. قىستا مۇسائىلىق ساياهەتتە چاپلىغان دورىنى بالدۇرراق ئېلىۋېتىشكە بولىدۇ، ئەگەر ئۇزۇن ۋاقتى ئىشلىتىشكە توغرا كەلسە، 72h تىن كېيىن بېئىسى ئالماشتۇرۇلدۇ.

«ناچار تەسىرى» بىنىك ھەم ۋاقتىلىق ئېغىز قۇرۇش دائمى كۆرۈلسە، ئۇيقوسراش، قان بېسىم سەل تۆۋەنلەش، قارىچۇق چوڭىش، كۆرۈش سېزىمى ۋاقتىلىق خەلپىشىش، نېرۋىسى چېچىلش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلسە.

【دىقىقتە قىلىدىغان ئىشلار】 سىكوبولامىنغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ؛ گلاۋىكوما، ئاشقازان چىقىش ئېغىزى توسوۇلۇش، ئۇچىي توسوۇلۇش ياكى سۈيدۈك يولى توسوۇلۇشتىن سىيىش قىيىنلاشقاڭ بىمارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ ماشىنا ھەيدىگەن ۋە ماشىندا مەشغۇلات ئېلىپ بارىغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ بۇ دورىنى ئىشلىتىۋاتقان مەزگىلدە ھاراق ئىچىشكە بولمايدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 سىكوبودىرم شۇپىتسارىيىدە ئىشلەنگەن. تېرىدىن ئۆتىدىغان قويۇپ بېرىلىشى تىزگىنلىنىدىغان پلاستىر پىرەدە: پلاستىر/1.5mg، 2.5cm².

7 . مېڭە قان تومۇرلىرىنى كېڭەيتكۈچى دورىلار

کو - دېرگوتىرىن مېزىلات
(甲磺酸二茎麦角碱，Co-dergocrine Mesylate)

【باشقانىمى】 ترىگوگىن (弟哥靜，Trigogine) ، بېرىنان (培磊能，Perenan).

【ئاساسىي تەركىبى】 کو - دېرگوتىرىن مېزىلات.

【فارماکولوگىيلىك ٹالاھىدىلىكى】 مېڭە ھۇجدىرسىنىڭ مېتابولىزم تەسىرىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ئەتراب قان تومۇر فۇنكسييىسى بۇز ۋۇشنىمۇ ئۇنۇملۇك ياخشىلaidۇ.

【مۇۋاپىق كېسىللەكلىر】 ياشانغانلارنىڭ روھىي جەھەتتىكى چېكىنىش ئالامەتلەرى، قېرىلىقىتىكى دۆتلىشىش كېسىلى، مېڭە قان تومۇر تاسادىپىيلىقى، ئەتراب قان تومۇر توسقۇنلۇققا ئۇچراش، قان تومۇر مەنبىلىك كېسىللەكلىر پەيدا قىلغان يۇقىرى قان بېسىمى قاتارلىقلارغا

ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 6mg ~ 3، تاماق بىلەن بىرگە ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 بۇرۇن پۇتۇش، ئاشقازان - ئۈچەيلەر ۋاقتىلىق يېقىمىزلىنىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 بۇرەك ھەرىكتى ئېغىر دەرىجىدە ئاستىلغانلارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ترىگوگىن تايلاندى ئىشلەنگەن. تابلىتى: تابلىت/1mg، قاپ/20 تابلىت، قاپ/50 تابلىت، قاپ/100 تابلىت.

پەپنان كورىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دان/2.5mg.

بۇفلومېدىل (丁咯地尔, Buflomedil)

【باشقا نامى】 甲氧毗丁苯， فونزىلان (活脑灵, Fonzylane) .
【ئاساسىي تەركىبى】 بۇفلومېدىل.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا قان تومۇرلارنى تالاپ كېڭىيەتىش تەسىرىگە ئىنگە، ئۇنىڭ تەسىر قىلىش مېخانىزمى دۈرىنىڭ C_{2+} توشۇلۇشغا كاشلا قىلىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ، يەن قىزىل قان ھۈچىرى پەردىسىنىڭ شەكىل ئۆزگەرتىشنى ئۆزگەرتىپ، قان پلاستىنكلەرنىڭ توپلىشىشغا قارشى تۇرۇپ، قان يېتىشىگەن توقۇلۇمىلارنىڭ ئوكسىگەن قوبۇل قىلىشنى ياخشىلایدۇ، ئىچكەندە سۇمۇرۇلۇشى تېز، تارقىلىشى كەڭ بولىدۇ، T_{max} تەخىمنىن 3h، $t_{1/2}$ 2h بولىدۇ. ئاساسلىقى جىڭىر ئارقىلىق مېتابولىزملەنیپ، بۇرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 مېڭىگە قان يېتىشىمەسىلىك، قان تومۇرلار كېسىلى، Raynaud كېسىلى، قۇلاق قۇلۇلىسى كاشىلىغا ئۈچۈراش كېسىلى، ئۇششۇك ۋە ئوكسىگەن يېتىشىمەسىلىكتىن كېلىپ چىقىدىغان ئاغرىشلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 600mg ~ 450،

3 ~ 2 قېتىمغا بۆلۈپ ئىچىلىدۇ، كۈنىگە 200mg ~ 50 مۇسکۇلغا، ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ ياكى ۋېناغا تېمىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 يۈز قىسى قىزىرىش، باش ئاغىرىش، باش قېيىش، ئاشقازان - ئۈچھىي يېقىمىزلىنىش كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقتەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەندى قىلىنىدىغان ئەھۋالار:

ئۆتكۈر خاراكتېرلىك مېڭىگە قان قۇيۇلۇش، ئارتىپرىيە ئېغىر دەرىجىدە قاناشلارغا ھىمەدە ھامىلىدار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىشلىملىش چەكلەنىدۇ. ② باشقىلار: جىڭىر كېسەللەكلىرى بارلارغا ئەھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ ماشىنا ھەيدەش ۋە ماشىنلاردا مەشكۇلات ئېلىپ بېرىش ئىقتىدارغا تىسىر يەتكۈزىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 فونزىلان فرانسييىدە ئىشلەنگەن.

تابلىپتى: تابلىپتى 150mg، قاپ/30 تابلىپتى، تابلىپتى 300mg، قاپ/20

تابلىپتى؛ ئوكۇلى: ھەر ئامپۇلى 50mg/5ml، قاپ/5 ئامپۇل.

نیمودىپىن

(尼莫地平，Nimodipine)

【باشقا نامى】 نىمۇتۆپ (尼膜同，Nimotop)

【ئاساسىي تەركىبى】 نىمودىپىن.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا كالتسىينىڭ يولغا مۇناسىۋەتلەك بولغان ئاكسىپتۇر بىلەن خاس حالدا ئەسلىگە يېنىشچان بىرىكىپ، C_{2+}^{2+} نىڭ نېرۋا ھۇجىرىسىگە ئېقىپ كىرىشىنى تەڭشىپ، نېۋەرۇنى قوغىدۇپ، ئۇنىڭ فۇنكسىيىسىنى تۇراقلالاشتۇرىدۇ، قان يېتىشىمەسلەككە بولغان چىدامچانلىقىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. مېڭ قان تومۇرلىرىنى كېڭىيەتىپ، مېڭىنىڭ قان بىلەن تەمنلىشىنى ياخشىلايدۇ، چوڭ مېڭ زەخىملەنگەن ۋە قان ئېقىپ كىرىش يېتىرلىك بولمىغان ئورۇنغا ئېقىپ كىرىدىغان قاننى كۆپەيتىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىھەر】 ئالاھىدىلىرى روشن بولغان قېرىلىقتىكى مېڭ فۇنكسىيىسى تو سۇقۇنلۇققا ئۇچراشقا، ئۆمۈچۈك تورسىمان پەرده ئاستى بوشلۇقى قانخانىدىن كېيىن قان تومۇرلا رانىڭ سپازمىلىنىشى كەلتۈرۈپ چىقارغان قان يېتىشىمەسلەكتىن بولغان نېرۋا

زەخىمىلىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش وە داۋالاشقا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى وە مقدارى】 قېرىلىقتكى مېڭ فۇنكسىيىسى تو سقۇنلۇققا ئۇچراشقا ھەر قېتىمدا 30mg، كۇنىگە ئۇچ قېتىم ئىچىلىدۇ. ئۆمۈچۈك تۈرسىمان پەردە ئاستى بوشلۇقى قانسخانىنى كېيىنكى قان تومۇرلارنىڭ سپازمىلىنىشى كەلتۈرۈپ چىقارغان قان يېتىشىمىلىكتىن بولغان نېرۋا زەخىمىلىنىشكە، دەسلىپكى 2h تە 500 μ g/h دورا بېرىلىپ، ئەگەر 2tىن كېيىن يېقىمىزلىنىش كۆرۈلمىسى، 2mg/h گىچە كۆپىتىپ، ۋېنافا تېمىتىش داۋاملاشتۇرۇلدۇ، 14 ~ 5 كۇن داۋالغاندىن كېيىن، يەنە يەتتە كۇن ئەتراپىدا ئىچىلىدۇ، ئىچىش مقدارى ھەر قېتىمدا 60mg دىن كۇنىگە ئۇچ قېتىم بولىدۇ. 【ناچار تەسىرى】 تېرىه قىزىرىش، قان بېسىم تۆۋەنلىش، يۈرەك سوقۇشى زىيادە ئاستلاش، باش قېيش، باش ئاغرش، كۆڭۈل ئېلىشىش، ئاشقازان - ئۇچەي يېقىمىزلىنىش، جىڭىر، بۆرەك فۇنكسىيىسى زەخىمىلىنىش، مۇچە ئۇچلىرىدا سۈلۈق ئىششىق پەيدا بولۇش قاتارلىقلار. مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسى رېئاكسىيىسى، قان پلاستىنكلرى كېمىش ئاز كۆرۈلدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: تۈتقاقلۇققا قارشى دورىلارنى ئۆزۈن مەزگىل ئىشلەتكەنде، بۇ دورا تابلىپتىنىڭ بىمۇلوكىيلىك پايدىلىنىش دەرجىسىنى روشن تۆۋەنلىتىدۇ؛ بىرگە ئىشلىتىلگەن قان بېسىمنى تۆۋەنلىتكۈچى دورىلارنىڭ قان بېسىمنى تۆۋەنلىتىش تەسىرىنى كۈچىتىدۇ؛ بۆرەكى زەھەرلىدىغان دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىسى، بۆرەك فۇنكسىيىسى چېكىنىشى ئېغىرلاشتۇرىدۇ؛ ② ئاكسېپتۈرىنى تو سقۇچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەنде، قان بېسىم تۆۋەنلىيدۇ، ھەتتا يۈرەك زەئىپلىكى كېلىپ چىقىدۇ؛ ③ ئاكسېپتۈرىنى تو سقۇچى دورىلار، تارتىشقا قارشى دورىلار بۇ دورىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقىنى يۈقرى كۆتۈرىدۇ. ④ مەنىئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: جىڭىر فۇنكسىيىسى ئېغىر دەرجىدە زەخىملەنگەنلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ⑤ باشقىلار: بۆرەك فۇنكسىيىسى ئېغىر دەرجىدە زەخىملەنگەن، يۈرەك قان تومۇرلار فۇنكسىيىسى ئېغىر دەرجىدە زەخىملەنگەن وە تۆۋەن قان بېسىمى بىمارلىرىغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى.

【ياسالىمىسى وە ئۆلچىمى】 نىمو توب گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن.

پەرە يالستىلغان تابلىتى، تابلىت/30mg، قاپ/20 تابلىت؛ ئوكۇل سۇيۇقلۇقى: ھەر ئامپۇلى 10mg/50ml

نىتسېرىگولىن

(尼麦角林，Nicergoline)

【باشقۇ نامى】 سېرىمىئۇن (腦通，Sermion)

【ئاساسىي تەركىبى】 نىتسېرىگولىن.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا لىزېرىگىك كىسلاتا (麦角酸) نىڭ تۇغۇندىسى بولۇپ، « - ئاكسيپيتورنى توسوپ، قان تومۇرلارنى كېڭىيەتىپ ھەمدە مېڭە ھۇچىرىرسىنىڭ مېتابولىزملەتنىشنى كۈچەيتىپ، قاندىكى ئوكسىگېن ۋە گلۈكۈزىنىڭ ئىشلىتىلىشنى ئاشۇرىدۇ، دۆپاميننىڭ مېتابولىزملەتنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، نېرۋا ئۆتكۈزۈشنى غىدىقلاش ئارقىلىق، روھى ۋە كەپپىياتىكى نورمال سىزلىقنى ياخشىلایدۇ. ئىچكەندە تېز سۈمۈرۈلدۈ، سۈيۈدۈك ئارقىلىق جىڭىر ئارقىلىق مېتابولىزملەتنىپ، ~ 1.5 ~ $2h$ Tmax

سۈيۈدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكىلەر】 ئۆتكۈر ياكى سوزۇلما خاراكتېرلىك مېڭە قان تومۇرلىرى توsequonluوققا ئۇچراش ياكى مېڭىنىڭ مېتابولىزム فۇنكسييسى ناچارلىشىش، ئۆتكۈر ياكى سوزۇلما خاراكتېرلىك ئەتراپ قان ئايلىشى توsequonluوققا ئۇچراش، باش ئاغرىش، ئارقىلىق منبىلەك يۈقىرى قان بېسىم بۆھراننى داۋالاشتا، سوزۇلما خاراكتېرلىك مېڭە فۇنكسييسى توsequonluوققا ئۇچراش، ھەركەت قىلىش بىئەپ بولۇش، سۆزلىش توsequonluوققا ئۇچراش قاتارلىق ئالامەتلەر، سەكتىدىن كېپىنىكى يارتا پالىچ بىمارلىرىنىڭ نېرۋىسىنى ئەسىلىگە كەلتۈرۈشتە قوشۇمچە داۋالاش قىلىنىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا $10 \sim 20mg$ كۈنگە ئۇچ قېتىم ئىچىلىدۇ. مۇسکۇلغَا ئوكۇل قىلغاندا ياكى ۋېناغا تېمىتقاندا، ھەر قېتىمدا $4mg \sim 2$ ، كۈنگە $2 \sim 1$ قېتىم ئىشلىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان - ئۇچىي يولى يېنىك يېقىمىسىزلىنىش،

بۇز قىسىمى قىزىرىش، ئۇيقوس سىراش، ئۇيقوس سىزلىق كۆرۈلىدۇ.
【دىقىھەت قىلىدىغان ئىشلار】 يۇقىرى قان بېسىمغا قارشى دورىلارنىڭ تىسىرىنى كۈچدىتىدۇ؛ ئوکۇل قىلغاندا ۋاقتلىق ئۇرۇش خاراكتېرىلىك قان بېسىمى تۆۋەنلەش ۋە باش قېيىش تاسادىپى كۆرۈلۈپ قالىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 سېرىمىئۇن ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. شېكىر ياللىغان تابلىقى: تابلىت/10mg، قاپ/30 تابلىت، قاپ/50 تابلىت؛ ئوکۇلى: بوتولكا/4mg.

ۋېنپوتىپتىن (长春西汀，Vinpocetine)

【باشقۇ نامى】 ۋېنپوتىپتىن - كۆزىكس (考维，Vinpocetine-Covex)

【ئاساسىي تەركىبى】 ئاپۇۋىنکامىن كىلاتا

ئىستېرى (阿朴长春胺酸乙酯)

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا فوسفو دىئستېرى ازا (磷酸二酯酶) نىڭ ئاكتىپچانلىقىنى تورمۇلاش، قان پلاستىنلىكلىرىنىڭ توپلىشىشىنى توسۇش ۋە قىزىل قان ھۇجمىرىسىنىڭ ئادېنۈزىن (腺苜) نى سۇمۇرۇشنى كېمەيتىش تەسىرىگە ئىگە، مېڭە قان ئېقىمىنى كۆپەيتىپ، مېڭە قان تومۇرلىرىنىڭ قارشىلىقىنى ئازايىتىدۇ، مېڭىدىكى ئۇكىسىگەن ۋە گلۇكوزنىڭ ئىشلىتىلىش نىسبىتىنى ئاشۇرىدۇ. ئىچىگەندىن كېيىن ئۇچىيدە سۇمۇرۇلۇدۇ، بىئولوگىيلىك پايدىلىنىش نىسبىتى تەخمىنەن $t_{1/2} = 5h$.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىللەكىلەر】 مېڭە قان ئايلىنىشى تو سۇنۇلۇققا ئۇچراشتىن كېلىپ چىققان ھەر خىل كېسىللەكىلەر پەيدا قىلغان ئالامەتلەر، ئارىلاپ مېڭە قان تومۇرى فۇنكسىيىسى تو لۇق بولما سالق، قان تومۇرلار توسۇلۇش، قان يېتىشىمە سىلىكتىن بولغان مېڭە توسۇلۇش، ئارىتېرىيە قېتىش.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 5mg 5 دىن كۈنىگە ئۈچ قېتىم ئىچلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 قان بېسىمىنى يېنىك دەرىجىدە تۆۋەنلىكتىدۇ،

بۇرەك ھەرىكتى زىيادە تېزلىشىش ۋە مۇددەتتىن تاشقىرى قىسىمرىاش، قېرىنچىنىڭ قوزغىلىش ۋاقتى ئۇزىراش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلدۈ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ھامىلىدارلار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ۋېنپوتىپتن - كوۋېكس ئىسپانىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىتى: تابلىت/5mg، قاب/25 تابلىت، قاب/50 تابلىت.

بېتاخىستىن مېزىلات

(甲胺乙毗啶，Betahistine Mesylate)

【باشقا نامى】 (敏使朗，Merislon) ، مېرسلون (倍他斯汀，Merislon)

مېتسىئوسېر (美克乐，Micioser).

【ئاساسىي تەركىبى】 مېتاخىستىن مېزىلات.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ، ھىستامىننىڭ توغۇندىسى بولۇپ، چوڭ مېڭ، كىچىك مېڭ، مېڭدە غولى ۋە ئىچكى قولۇقلاردىكى قان ئايلىنىشنى تاللاپ ئاشۇرىدۇ. ئىچكى قولاق قان ئايلىنىشنى توسۇلۇشنى ياخشىلاش ۋە مېڭ قان ئېقىمىنى ياخشىلاش تەسىرىنگ ئىنگ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىكەر】 مېنئىر كېسىلى (قولاق مەنېبەلىك باش قېيش كېسىلى)، ئەتراپ خاراكتېرىلىك باش قېيش كېسىلىنگ ئىگىشىپ كەلگەن باش قېيش ۋە تەڭپۇڭلۇق توسقۇنلۇققا ئۇچراش، باش ئاغرىش ۋە قولاق غۇڭۇلداش.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار ھەر قېتىمدا 16mg ~ 8 دىن، كۇنىڭ ئۇچ قېتىم تاماقتىن كېيمىن ئىچىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئەسۋە قاتارلىق ئالامەتلەر كۆرۈلدۈ، ناگاندا ئۇيقۇسراس كېلىپ چىقىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ھەزمىم خاراكتېرىلىك يارا تارىخى بارلار ياكى ھەرىكتەچان خاراكتېرىلىك يارىغا گىرىپتار بولغانلار، كاتانىچە زىقىسى، بۇرەك ئۇستى بىز يىلىك ماددا ئۆسسىسى بىمارلىرىغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ ياشانغانلارغا ئىشلەتكەنде دورا، مىقدارىنى تەڭشىشكە

دېقىقت قىلىش كېرەك؛ ھامىلدارلار ۋە ھامىلدارلىق ئېھتىمالى بار ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى. ئاسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 مېرسىلون ياپونىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىقى: تابلىق/6mg، قاپ/30 تابلىق، قاپ/100 تابلىق. مىتسئۇسپر ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىقى: تابلىق/8mg، قاپ/50 تابلىق.

دېھىدر و ئېر گوتامىن (双氢麦角胺, Dihydroergotamine)

【باشقانى نامى】 سېڭلور.
【ئاساسىي تەركىبى】 دېھىدر و ئېر گوتامىن مېتانپسىلوفونات (甲磺酸双氢麦角胺)
【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ، α - ئاكسيپيتورنى توسىقۇچى دورا بولۇپ، دېھىدر و ئېر گوتوكىسىن مېز بلات (甲磺酸二氢麦角碱) بىلەن تەسىرى ئۇخشىشىپ كېتىندۇ.
【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىدلىكىلەر】 شەقىقە ۋە قان تومۇر مەنبىلىك باش ئاغرىقىغا ئىشلىتىلدى.
【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قىتىدا 3mg ~ 1، كۈننە 3 ~ 2 قىتىم ئىچلىدى.
【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئىج سورۇش، سۇلۇق ئىششىق قاتارلىقلار كۆرۈلدى.
【دېقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 تاجىستان ئارتىرىيلىك يۈرەك كېسىلى بىمارلىرىغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى.
【ئاسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 سېڭلور، فرانسىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/5mg، قاپ/30 دانه.

نافتىدر و فۇريل (萘呋胺, Naftidrofuryl)

【باشقانى نامى】 پراكسىلېن (必来循宁, Praxilene)
نافتىلان (克拉瑞啶, Naftilan).

【ئاساسىي تەركىبى】 نافتىدروفۇريل .
【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ، قان تومۇرلارنى كېڭىتىكۈچى دورا بولۇپ، مېڭە قان تومۇرى ۋە ئەتراپ قان تومۇرلىرىغا بىۋاسىتە تىسىر كۆرسىتىدۇ، قان يېتىشىمگەن قان تومۇرلارغا نىسبەتن قوش بىسلق تىسىرگە ئىنگە. ئىچكەندە تېز سۇمۇرۇلدۇ، مېڭە قان توسوۇقىدىن ئۆتەلەيدۇ، $t_{1/2} = 60\text{min}$ ~ 40. ئاساسلىقى جىڭىردىه مېتابوليزملەنىپ، ئۆت ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، ئاز قىسىمى سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 مېڭە توسوۇلۇش، مېڭە قان تومۇر تاسادىپىيلىقى ئاسارتى، ئومۇرتقا نېڭىزى ئارتىپ يېسىسگە قان يېتىشىمە سلمكتىن كېلىپ چىققان باش قېبىش، سەكتىنىڭ ئەسلىگە كېلىش باسقۇچى ياكى ئارىلاپ ئاقساش ۋە ئەتراپ قان تومۇرلار سپاز مىلىنىش كېسەللىكلەرى قاتارلىقلارغا ھەمدە رايىناۋۇد كېسىلىنى قوشۇمچە داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 200mg ~ 100، كۈنگە 3 ~ 2 قېتىم، تاماقتا سۇ بىلەن ئىچلىدۇ.
【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان - ئۇچىي يولى يېقىمىزلىنىش ۋە ئەسۋە قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: يۈرەك رىتىمىزلىقىغا قارشى دورىلار ياكى β - ئاكسېپتۆرنى توسوقۇچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە يۈرەكىنى تورمۇزلاش تىسىرى كۈچىيىدۇ.
 ② مەنتى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا زىيادە ھەزگۈرلەر، دالانچە - قېرىنچە ئۆتكۈزۈشى توسلۇخانلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: جىڭىر، بۆرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولمىغانلار، ھامىلىدار ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمسى ۋە ئۇلچىمى】 پراكسلين فرانسىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپ/200mg، قاپ/20 تابلىپت؛ كاپسۇلى: دانه/mg 100.

8 . باشقىلار

سېربېرولىزىن (施普善, Cerebrolysin)

【باشقما نامى】 · 脑蛋白水解物，脑活素
【ئاساسىي تەركىبى】 ئامىنۇ كىسلاتا، تۆۋەن مولېكۈلىق
پىپىتىد.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىك】 بۇ دورا نېرۋا
ھۇچىرىسىدىكى ئاقسىلىك سىنتېزلىنىشىگە پايدىلىق ھەمە رېسىپرا تۈرىيە
(نېپەس زەنجىرى) گە تەسر كۆرسىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە
مۇناسىۋەتلەك ھورمۇنلارنىڭ ھاسىل بولۇشنى غىنديقلادىدۇ، مەركىزىي
نېرۋا سىستېمىسىنى زەھەرلىك ماددىلارنىڭ زەخمىلىشىدىن ئۈنۈملۈك
قوغداپ، ئۇكىسىگەن بېتىشىمەسىلىككە قارشى تۇرۇش ئىقتىدارىنى يۈقىرى
كۆتۈردىدۇ، چوڭ مېڭىنىڭ يېتىلىشىنى تېزلىتىپ، پەرق ئېتىش
ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ. بۇ دورا يەنە هوشىغا كەلتۈرۈش رولغىمۇ ئىگە،
بۇنى ئېلىپكىتر ئارقىلىق شوڭ قىلىپ داۋالاشنىڭ قوشۇمچە دورسى
قىلىشىقىمۇ بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 دىققىتى ۋە ئەستە تۇتۇشى
توصۇنلۇققا ئۇچىرخان ئۇرۇغان خاراكتېرلىك مېڭ كېسىلى مەنبىلىك
يىغىندى كېسەللىك ئالامەتلەرى، بىرلەمچى دۆتلىك، قان تومۇر مەنبىلىك
دۆتلىك، ئارىلاشما دۆتلىك، ئاپوپىلېكسىيە ۋە مېڭ ئۇپېراتىسىيىسىدىن
كېيىنكى مېڭ فۇنكسىيىسى توصۇنلۇققا ئۇچراش، مېڭ ئۇرۇلۇپ
زەخىملەنىش ياكى مېڭ سىلىكىنىش ئاسارتەلىرى، مېڭ قان تومۇرلىرىنىڭ
كومپېنساتىسىلىك ئىقتىدارى توصۇنلۇققا ئۇچراش، نېرۋا ئاجزىلىق ۋە
زەئىپلىشىش ئالامەتلەرىگە ئىشلىتىلدىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 30ml ~ 20 نى 5% لىك
250ml گلۈكوزا ياكى فىزىئولوگىيلىك تۆز سۈيىدە سۈيۈلدۈرۈپ، ۋېناغا
ئاستا - ئاستا تېمىتىلىدۇ. كېسەللىك ئەھۋالى يېنىكەكلىرگە ياكى كۆپ
مىقداردا دورا ئىشلىتىلگەندىن كېيىن داۋالاش ئۈنۈمى قامدىلىنىدىغانلارغا

مۇسکۇلغا، تېرە ئاستىخا ياكى ۋېناغا ھەر قېتىمدا 5ml ~ 1 ئوكۇل قىلىشقا بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئوكۇل قىلىش بىك تېز بولۇپ كەتسە، يېنىك دەرىجىدە ئىسىش سېزىمى پىدا بولىدۇ، توڭلاب تىترەش، يېنىك دەرىجىدە قىزىرىش سېزىمى ئاز كۆرۈلدى.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر، تۇتقاقلقىنىڭ داۋاملىشىش ھالىتى، تۇتقاقلقىنىڭ چوڭ قوزغىلىشى، ئېغىر دەرىجىدە بۆرەك فۇنكىسىيىسى تولۇق بولماسىلىقلارغا ئىشلىش چەكلىنىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 سېرىپرولسىن ئاۋستىرالىيىدە ئىشلەنگەن. ئوكۇل سۈيۈقلۈقى: ئامپۇل/1ml، قاپ/10 ئامپۇل، ئامپۇل/2ml، قاپ/10 ئامپۇل، ئامپۇل/5ml، قاپ/5 ئامپۇل، ئامپۇل/10ml، قاپ/5 ئامپۇل.

زولmitriptan

(佐米曲普坦，Zolmitriptan)

【باشقا نامى】 زومىگ (Zomig) · (佐米格，Zomig)

【ئاساسىي تەركىبى】 زولmitriptan.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ HT_{1D} - 5 ئاكسيپتورنى تاللاپ قوزغاتقۇچى دورا. قان تومۇرلارنىڭ قىسىقىنى ۋە نېرۋا چىپتىدىنىڭ قويۇپ بېرىلىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئىچكەندىن كېيىن تېز سۈمۈرۈلدى، مۇتلق بىئولوگىيلىك پايدىلىنىش دەرىجىسى تەخمىنەن 40%， جىڭىرەدە مېتابولىزملىنىدۇ. ۋېنادىن بېرىلىگەندىن كېيىن، CL 2.5 ~ 3h t_{1/2} ھەر kg بەدهن ئېغىرلىقىغا 10ml بولىدۇ، ئاساسلىقى مېتابولىزم ھاسىلاتى شەكلىدە سۈيۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 شەقىقە.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 بىر قېتىمدا 2.5mg ئىچىلىدۇ. ئەگەر 24h ئىچىدە كېسەللىك ئالامىتى داۋاملىق كۆرۈلسى ياكى قايىتا قوزغالسا، يەنە بىر قېتىم دورا ئىچىلسە ئۇنۇمى بولىدۇ، تەكىرار قوزغالغاندا، 24h تىكى ئىشلىتىلگەن ئومۇمىي دورا

مقدارى 15mg دىن ئاشۇر وۇپتىلمەيدۇ. شەققىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئىشلىتىلمەيدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىش، باش قېيىش، ئۇيقوسراش، ماغدۇرسىزلىنىش، ئېخىز قۇرۇش قاتارلىقلار دائىم كۆرۈلدۇ، سېزىم نورمالسىزلىنىش ياكى سېزىم توسقۇنلۇققا ئۇچراش، مۇسکۇللار ئاغرىش، مۇسکۇل كۈچسزلىنىش، قان بېسىم قىسقا مۇددەتلەك يۇقىرىلاش قاتارلىق ناچار تەسىرلەر كۆرۈلدۈ.

【دېقىقتە قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: $HT_{ID} - 5$ نى قوزغانقاچى باشقا دورىلارنى ئىشلىتىشىن ساقلىنىش كېرەك؛ موكلوبىمىد (吗氯贝胺) ئىشلەتكەندىن كېيىن، بۇ دورىنىڭ ئەڭىرى سىزىق ئاستىدىكى يۈزى ئاشىدۇ. ② مەنىڭ قىلىنىدىغان ئەھۋالار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر، قان بېسىمى تىزگىنلەنمىگەنلەر، سىمپتوملۇق پاركىنسون يىخىندى ئالامتى، يۈرەك يان يولىنىڭ ئۆتكۈزۈشى بىلەن مۇناسىۋەتلەك يۈرەك رىتىمىزلىقى بارلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: باشقا ئېغىر دەرىجىدىكى نېرۋا كېسىللەكلىرىنىڭ ئېھتىماللىقىنى چىقىرىپ تاشلاشقا دېقىقتە قىلىش لازىم؛ بالىلار، ياشانغانلار، جىڭىرى زەخىملەنگەنلەر، ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاقان ئاياللار، قان يېتىشىمەسىلىكتىن بولغان يۈرەك كېسىلى بىمارلىرىغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 زومىگ ئەنگلىيده ئىشلەنگەن. تابلىت 2.5mg، تابلىت 5mg.

بەشىنچى باب نەپەسىلىنىش سىستېمىسىغا تەسىر قىلغۇچى دورىلار

1 . بەلغەم بوشاتقۇچى دورىلار

ئامبروكسول ھيدروخلورىد
(盐酸氨溴索，Ambroxol Hydrochloride)

【باشقى نامى】 ئامبروخېكسال (Ambrohexal)
مۇكوسولۋان (Mucosolvan) 兰勃素，
【ئاساسىي تەركىبى】 ئامبروكسول ھيدروخلورىد.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورىنىڭ شىلىمىشىق
بەلغەمنىڭ چىقىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش ۋە ئاجرمىلارنى ئېرىتىش
تەسىرى بار. ئىچكەندە تېز سۈمۈرۈلىدۇ، T_{max} 0.5~3h $t_{1/2}$ 4~5h،
توقۇلمىلارغا تارقىلىشى تېز بولىدۇ، قان پلازا ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش
نىسبىتى تەخمىنەن 90%， ئاساسلىق جىڭىرەدە مېتابوليزملەنىپ، بۇرەك
ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 بەلغەمنىڭ ئاجرىلىشى
زىيادە كۆپ بولۇش ۋە بەلغەم چىقىرىش ئىقتىدارى ناچارلىشىشقا قوشۇلۇپ
كەلگەن ئۆتكۈر، سوزۇلما خاراكتېرىلىك نېپەس يولى كېسەللىكلىرىگە
ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار ھەر قېتىمدا
30mg كۈنىگە ئۈچ قېتىم، بالىلار كۈنىگە ھەر kg بىدەن ئېغىرىلىقىغا
1.2 ~ 1.6mg.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان - ئۈچەي رېئاكسىيىسى ۋە
ئاللىرىگىيلىك رېئاكسىيە ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋانقان
ئاياللار، گلاۋىكوما بىمارلىرىغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ئامبروخېكسال گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. تابلېتى: تابلېت/30mg، قاپ/10 تابلېت. **شىائىڭاڭاڭا ئىشلەنگەن.** ئاستا تەسرىلىك كاپسۇلى: دانە/75mg، قاپ/10 دانە. **مۇكوسولۇان** گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. تابلېتى: تابلېت/30mg، قاپ/20 تابلېت ياكى قاپ/50 تابلېت؛ ئوكتۇلى: هەر ئامپۇلى 15mg/2ml، قاپ/5 ئامپۇل، قاپ/10 ئامپۇل.

سبىر اپىپتازا (舍雷肽酶，Serrapeptase)

【باشقۇنامى】 داسېن (Dasen) (达先, Dasen) ، سېرادادا (Seradase) (沙雷肽酶，释炎达).

【ئاساسىي تەركىبى】 سېرراپىپتازا.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ، ئاقىسلىنى ھىدرولىزلىغۇچى ياسالما بولۇپ، سۈپىتى ئۆزگەرگەن ئاقىسل، بىرادرىكىنىنوجەن (缓激肽原) ۋە سېللۇلۇزوا لەختىسىنى تېزلىكتە پارچىلاپ، يىرىڭى، بىلەم، قان لەختىسى قاتارلىقلارنى سۈيۈلدۈرۈدۇ ھەمەدە ئىقىپ چىقىپ كېتىشنى ئۈچۈلەشتۈرۈپ، جاراھەت يۈزىنىڭ تازىلىنىشىنى تېزلىتىپ، بىغلىما گۆش توقۇلمىسىنىڭ ئۆسۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈدۇ. ئىچكەندە سۈمۈرۈلۈش سىقدارى بىر قەدر 1az، T_{max} 1h تەخمىنەن، تەسىرىنىڭ داۋاملىشىش ۋاقتى تەخمىنەن 5h ~ 4، تارقىلىشى كەڭ، ئاساسلىق مېتابولىزم ھاسىلاتى ۋە دورىنىڭ بىر قىسىمى ئەسىلىدىكى پېتى گەندە ۋە سۈيۈلۈك ئارقىلىق چىقىرىلەدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىكەر】 ئۇپېراتسىيىدىن كېيىنكى ۋە زەخىمىلىنىشتن بولغان ياللۇغلىنىش، ھەرخىل ياللۇغلىق سۈلۈق ئىشىق، قانلىق ئىشىق، ئۇپېراتسىيىدىن كېيىنكى چاپلىشىش، ھەمەدە بۇرۇن كاۋىنكى ياللۇغى، سوت بېزى ياللۇغى، دوۋساق ياللۇغى، يان ئۇرۇقدان ياللۇغى، چىش ئۆقۈرى يېرىڭىلىق ئىشىقى، ئۇتۇرا قۇلاق ياللۇغى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. كاناچە ياللۇغى، ئۆپكە تۈپېر كۈلىيۈزى، كاناچە زىققىسى ۋە ناركوزىدىن كېيىنكى بىلەم چىقىرىش

قىيىنلىشىلارغىمۇ ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ڈۈسۈلى ۋە مىقدارى】 ھەرقېتىمدا $10\text{mg} \sim 5$ كۈنىگە ئۈچ قېتىم تاماقتنى كېيىن ئىچىلىدۇ. مىقدارى بىمارنىڭ بېشى ۋە كېسىللەك ئەھۋالغا قاراپ ئاشۇرۇلدى ياكى كېمىيتىلدى، داۋالاش مۇددىتى $15 \sim 7$ كۈنگىچە بولىدۇ. ئىچكەندە چايىنماستىن پۇتۇن پېتى يۇتۇۋېتىش كېرەك.

【ناچار تەسىرى】 ئىچى سۈرۈش، ئىشتىهاسى تۇتۇلۇش، ئاشقازان يېقىمىزلىنىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش قاتارلىقلار كۆرۈلدى. بۇرۇن قاناش ۋە قانلىق بەلغەم تاسادىپى كۆرۈلدى، ئاز بىر قىسىم بىسمارلاردا گەسۋە چىقىش، تېرە قىزىرىش قاتارلىق ئالبىرگىيلىك رېئاكىسيه پەيدا بولىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: پېھىنتىسىللىن، ئامپىتسىللىن، سۇلېپېننەتسىللىن(磺苄青霉素) قاتارلىق ئاتىتېئۇنىڭ دورىلارنىڭ باكتېرىيىگە قارشى تەسىرىنى كۆچەيتىدۇ؛ قان ئۇيۇشقا قارشى دورىلار بىلەن ماسلىشىش تەسىرىگە ئىگە؛ قان ئۇيۇنچۇچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىلە قىسىمن قارشىلىشىش تەسىرىگە ئىگە بولىدۇ، شۇڭا قان ئۇيۇش نورمال بولمىغانلارنى تېپسىلى كۆزىتىش كېرەك. ② باشقىلار: جىڭىر، بۇرەك فۇنكىسىمىسى ئېغىر دەرجىدە تولۇق بولىمىغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى، داۋالاش مۇددىتى ئۇزۇن بولۇپ كېتىشتىن ساقلىنىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ٹۇلچىمى】 داسېن يابونىيىدە ئىشلەنگەن. تابلېتى: تابلېت 5mg/.

سېرادازا تەيۋەندە ئىشلەنگەن. ئۇچىدە ئېرىگۈچى تابلېتى: تابلېت 10mg/20 قاپ/.

ئاتىپتىم سىستېمىن (乙酰半胱氨酸，Acetylcysteine)

【باشقا نامى】 مۇكوسوف (美可舒，Mucosof)，فلۇئىمۇتسىل (富露施，Fluimucil).

【ئاساسىي تەركىبى】 N - ئاتىپتىم سىستېمىن.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىك】 شىلمىشق ئاقسىل بىرىكمىسى ۋە نۇكلىپنىڭ كىسلاتانى پارچىلايدۇ. شىلمىشق بىلەمدىنى سۈيۈلدۈرۈپ، بىلەمدىنىڭ يېپىشقا قالىقىنى تۆۋەنلىتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىرگە تۈكچىلەرنىڭ تەۋرىنىش چاستوتىسىنى ئاشۇرۇپ، بىلەمدى ئوشىي چىقىرىۋېتىدۇ، ئوكىسىدىلەخۇچىغا قارشى تەسىرىگىمۇ ئىگە.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىدەر】 قويۇق شىلمىشق ئاجرەملار زىيادە كۆپ بولغان نېپەس يولى يۇقۇملىنىشقا ئىشلىتىلدى. مەسىلەن: ئۆتكۈر، سوزۇلما خاراكتېرلىك كانايىچە ياللۇغى، ئۆپكە ھاۋالىق ئىششىقى، كانايىچىلار كېڭىشىش ۋە قويۇق شىلمىشق ماددىلاردىن توسوۇلۇش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار ھەر قېتىمدا 200mg 2 دن كۈنىگە 3 ~ 2 قېتىم، باللار ھەر قېتىمدا 100mg 1 دن كۈنىگە 4 ~ 2 قېتىم ئىچىدۇ. ئىچىشتىن ئىلگىرى ئازراق سۇ قوشۇپ ئېرىتىلدى.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش ئاندا - ساندا كۆرۈلدى، ئەسۋە چىقىش ۋە كانايىچە سىپازمىلىنىش قاتارلىق ئاللىپرگىيلىك رېئاكسىيە ناھايىتى كەم كۆرۈلدى.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: مېتال ياسالىملىرىنىڭ چىقىرىلىشىنى ئاشۇرۇپ، بېننەتلىلىنىڭ باكتېرىيىگە قارشى ئاكتىپچانلىقىنى ئاجىزلاشتۇردى، شۇڭا قوشۇپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. ② باشقىلار: ئېغىر كانايىچە زىققىسى، دىئاپىت كېسىلى بىمارلىرىغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى.

【ياسالىملىسى ۋە ئۆلچەمى】 مۇكوسوف تايلاندىتا ئىشلىنگەن. پاراشوكى: ھەر بولقى 5g/100mg، قاپ/12 بولاق، قاپ/20 بولاق، قاپ/100 بولاق.

فلۇئمۇتسىل ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. كۆپكەلەشتۈرۈلگەن تابلىپتى: تابلىپتى، 600mg، قاپ/20 تابلىپتى.

2 . زىقىنى پەسىيتكۈچى دورىلار

سالبۇتامول

(沙丁胺醇，Salbutamol)

- (全宁碟，Ventodisks) ۋېنتودىسكس
- (爱纳灵，Etinoline) ، ئېتىنولىن (全特宁，Volmax)
- (瑞普宁，Respolin) ، ۋېنتنولىن (喘乐宁，VentoLin)
- 【ئاساسىي تەركىبى】 سالبۇتامول.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ ئادرېنالىن ئىقتىدارلىق β_2 - ئاكسيپتورنى تاللاپ قوزغانتۇچى دورا بولۇپ، يۈرەك مۇسکۇلىدىكى β_1 - ئاكسيپتورغا تەسىرى يوق دېيدىرلىك. قان تومۇر ۋە بالىيانقۇ سىلمق مۇسکۇللەرنى بوشىشىش، كۆز ئىچكى بېسىمىنى تۆۋەنلىشىش تەسىرىگىمۇ ئىگە. ئىچكەندىكى بىئولوگىيلىك پايدىلىنىش دەرىجىسى %30 ئىچپ 30min ~ 15 تىن كېيىن ئۇنۇم بېرىدۇ، 4h Tmax ~ 2 بولىدۇ. تۇمانلاشتۇرۇپ سۇمۇرگەندە 5min ~ 1 تا ئۇنۇمى كۆرۈلدى. 1h Tmax ، تەسىرى 6h ~ 4 داۋاملىشىدۇ. $t_{1/2}$ 4 ~ 6h ، كۆپ قىسى جىڭىرەدە مېتابولىزملەنىپ، مېتالزم ھاسلاتى شەكىلde سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 كانايىچە زىقىسى، ھاسراپ نەپەسلىنىش تېپلىق كانايىچە ياللۇغى، ئۆپكە ھاۋالىق ئىشىشىقى، كانايىچىلار سپازملىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. قوزغالغان زىقىنى توختىشىشا تۇمانلاشتۇرۇپ سۇمۇرتولىدۇ، زىققە قوزغلۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتى ئىچىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار ھەر قېتىمدا 2 ~ 4mg كۈنگە 3 ~ 4 قېتىم، بالىلار ھەر قېتىمدا ھەر kg بەدەن 0.1 ~ 0.15mg كۈنگە 2 قېتىم ئىچىدى. تۇمانلاشتۇرۇپ سۇمۇرگەندە ھەر قېتىمدا 0.1 ~ 0.2mg ئىشلىتىلىدۇ،

زۆرۈر بولغاندا ھەر 4h بىر قېتىم تەكرالىنىدۇ، ئەمما 24h ئىچىدە 8 ~ 6 قېتىمدىن ئېشىپ كەتمەسىلىكى كېرەك.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، كۆپ تەرلەش، باش قېيىش، مۇسکۇل ۋە قول بارماقلىرى تىترەش، يۈرەك سېلىش قاتارلىقلار دائىم كۆرۈللىدۇ. كۆزنى قاماشتۇرۇش، ئېغىز قۇرۇش، يۈقرى قان بېسىمى، ئۆبىقۇسزىلىق قاتارلىقلار ئاز كۆرۈللىدۇ، مىقدارى بىر قەدەر كۆپ بولغاندا يۈرەك قېرىنچە مەنبىلەك بالدۇر سوقۇش پەيدا بولىدۇ، كاناچىسى كېڭىھىگەن بىمارلار تۇمانلاشتۇرۇپ سۈمۈرسە قان تۆكۈرۈش پەيدا بولىدىغانلىقىغا ئائىت مەلۇماتلار بار.

【دىقىقتە قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئېپراتورپىئۇم برومید (异丙托溴铵) بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، زىقىنى بېسىش ئۇنىۇمى ئاشىدۇ؛ ② - ئاكسيپىتۇرنى توسىقۇچى دورىلاردىن پروپرأنولول (普萘洛尔) مەزكۇر دورىنىڭ كاناچىنى كېڭىتىش تەسىرى بىلەن قارشىلىشايدۇ. ئادىپنانلىن ئىقتىدارلىق ئاكسيپىتۇرنى غىندىقلېلىخۇچى باشقا دورىلار بىلەن بىرلا ۋاقتىتا ئىشلەتكەندە زەھەرلىنىش رېئاكسىسىي ئۆكایلا پەيدا بولىدۇ. ③ باشقىلار: يۈرەك فۇنكىسىسى تولۇق بولىمىغانلار، يۈقرى قان بېسىمى بارلار، قالقانسىمانبەز خىزمىتى كۈچىيىپ كەتكەنلەر ۋە ھامىلىدارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ۋېنտودىسكس ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. سۈمۈرۈلمىدىغان پاراشوكلىق ياسالىمىسى: چىلانما/200 μg , چىلانما/400 μg , تەخسى/8 چىلانما، قاب/15 تەخسى.

ۋۆلماكس ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپت/4, 4mg، تابلىپت/8, 8mg، قاب/28 تابلىپت/.

ۋېنتوولىن ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپت/2, 2mg، قاب/100 تابلىپت.

ئېتىنولىن فرانتىسىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپت/2, 2mg، قاب/100 تابلىپت.

رېسپۇلىن ئاۋستىرالىيىدە ئىشلەنگەن. تۇمانلاشتۇرۇلمىدىغان ياسالىمىسى: پۇركۈش/100 μg , بوتۇلكا/400 پۇركۈم.

تېربۇتالىن (特布他林, Terbutaline)

【باشقا نامى】 بىرکانىل تۈرپۇخالىرى

· (博利康尼, Bricanyl) (博利康尼都保, Bricanyl Turbuhaler)

【ئاساسىي تەركىبى】 تېربۇتالىن سولفات.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ β_2 - ئاكسيپيتورنى تاللاپ قوزغانقۇچى دورا بولۇپ، ئۇنىڭ كاناچىلارنى كېڭىتىش تەسىرى سالبۇتامول بىلەن ٹۇخشىش كېتىدۇ. ئىچكىندە بىئولوگىيلىك پايدىلىنىش دەرىجىسى تەسىرى پەيدا بولىدۇ، 4h ~ 2t تەسىرى يۇقىرى زىقىنى پەسىيەتىش تەسىرى پەيدا بولىدۇ، 4h ~ 7h تەرى ئاستىغا ئوكۇل قىلىپ 15min ~ 5 ten كېيىن ئۇنىمى كۆرۈلۈپ، 1h ~ 0.5t يۇقىرى پەللەگ يېتىدۇ ھەمde 4h ~ 1.5d داۋاملىشىدۇ؛ سۈمۈرۈپ بىر نىچچە منۇت ئىچىدە ئۇنىمى كۆرۈلۈپ 6h داۋاملىشىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 كاناچە زىقىسى، ھاسىراپ نەپەسلىنىش تېلىق كاناچە ياللۇغى ۋە سوزۇلما توسوۇلۇش خاراكتېرىلىك ئۆپكە كېسەللىكلىرىدىكى كاناچە سپازمىلىنىش قاتارلىقلار. بۇ دورا ۋېناغا ئۇدا تېمتىلسا بالياتقۇ سلىق مۇسکۇلىدىكى β_2 - ئاكسيپيتورنى قوزغىتىپ، ئۆزلۈكىدىن يۈز بېرىدىغان بالياتقۇ قىسىرىشنى ۋە ئۆكستوتىسىن (催产素) كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان بالياتقۇ قىسىرىشنى تورمۇزلاپ، ۋاقتى توشماي تۇغۇشنىڭ ئالىدىن ئالىدۇ، ھامىلە تۈنجلۇقۇشغا ئىشلىتىش پېرىنسېپىمۇ يۇقىرىقىدەك بولىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 پۇركۈپ سۈمۈرۈلىدۇ. ھەر 6h تە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 2 ~ 1 قېتىم بىسىپ پۇركۈپ چىقىرىلىدۇ. 【ناچار تەسىرى】 ئېغىز قۇرۇش، بۇرۇن پۇنۇش، دېمى سىقىش، كۆرۈلىدۇ، يۈرەك سېلىش، باش ئاغرش، ئاشقازان، ئۇچىي يولى رېئاكسىيىسى قاتارلىقلار ئاز كۆرۈلىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى:

ئادىپنالىن، ئىزوپروپيل نور ئادىپنالىن (异丙肾上腺素) بىلەن بىرگە ئىشلىتىلىسە يۈرەك رېتىمىزلىقى ئوڭىاي پەيدا بولىدۇ. ② باشقىلار: تاجسىمان ئارتپرىيلىك يۈرەك كېسىلى بارلاار، يۈرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولىمغاڭلار، يۇقىرى قان بېسىمى بارلاار، قالقانسىمان بىز ئىقتىدارى ئىشىپ كەتكەنلەر، دىئاپىت كېسىلى بارلاار ۋە ھامىلىدارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 بىر كانىل تۇربۇخالىپر شۇبىيتىسارىيىدە ئىشلەنگەن. قۇرۇتۇلغان پاراشوكلۇق سۈمۈرۈلمىسى ياسالىمىسى: پۇركۈش 0.5mg ، بوتۇلكا/200 پۇركۈم. بىر كانىل شۇبىيتىسىيىدە ئىشلەنگەن. تۇمانلاشتۇرۇلدىغان ئېرتىمىسى: 2ml، ئامپۇل $2.5\text{mg}/\text{ml}$.

بۇدېسونىد (布地奈德，Budesonide)

【باشقا نامى】 پۇلەمكىورت (普米克，Pulmicort)，
ئىنفلامىمەد (英福美，Inflammide)， پۇلەمكىورت تۇربۇخالىپر
(普米克都保，Pulmicort Turbuhaler)
【ئاساسىي تەركىبى】 بۇدېسونىد.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا بىر تۇرلۇك گالوگېنلاشىغان گلۈكۈرتسكۆئىد (糖皮质激素). زىيادە سىزگۈرلۈكە قارشى تۇرۇش، قىچىشىنى بېشىش ۋە سىرغىشا قارشى تەسىرى كۆرۈنەرلىك بولۇپ، ئۆپكە فۇنكسييىسىنى ياخشىلاب، هاۋا يولىنىڭ يۇقىرى رېڭاكسىيچانلىقىنى تۇۋەتلىتىدۇ ھەمە ئالامەتلەرنى ياخشىلайдۇ. سۈمۈرتوش ئارقىلىق دورا بەرگەندە، 90% ئى جىڭەردىكى بىرىنچى ئۆتكىدە مېتابوليزملەنىش ئۇنۇمدارلىقى ئارقىلىق ئاكتىپلىقىنى يوقىتىدۇ، 1mg سۈمۈرۈلگەندىن كېيىن 30min Tmax بولىدۇ، سۈيدۈك ۋە گەندە ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىر】 كاناچە زىقىسى.
【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئومۇمن ئالغاندا مىقدارى يەككە تەنلەر بويىچە بولىدۇ، چوڭلار ۋە 12 ياشتىن يۇقىرى باللارغا

دەسلەپكى مىقدارى كۈنگە $400\mu\text{g}$ دىن $2400\mu\text{g}$ غىچە بولۇپ، 4 ~ 2 قېتىمغا بۆلۈپ بېرىلىدۇ؛ قامداش مىقدارى $400\mu\text{g}$ ~ 200 دىن كۈنگە ئىككى قېتىم، 12 ~ 6 ياشلىق بالسالارغا كۈنگە $400\mu\text{g}$ ~ 200، كۈنگە ئىككى قېتىم بۇرۇن بوشلۇققىغا پۇركۈلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 تېرىه زىيادە سەزگۈرلۈك رېئاكسىسى، يۇتقۇنچاق قىسىمى يېنىك دەرىجىدە غىدىقلەنىش، يۇتىلىش ۋە قايتما خاراكتېرىلىك ئاۋاز پۇتۇپ قېلىش قاتارلىقلار دائم كۆرۈلىدۇ. بۇ ئالامەتلەرنى قوشۇمچە ئوسكۈنلەرنى ئىشلىتىپ سۈمۈرلۈش ئارقىلىق ياخشىلاشقا بولىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: ئوتتۇرا، ئېغىر دەرىجىدە كانايىچىلىرى كېڭىيگەن بىمارلارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ، ئالىتە ياشتنى تۆۋەن بالسالارغا ئىشلىتىش تەكتىلەنمەيدۇ. ② باشقىلار: ئۆپكە تۈپېركۈلىيۈزى، كانايىچە زەمبۇرۇغى ۋە زەمبۇرۇغىلاردىن يۇقۇملانغۇچىلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى، ھامىلىدارلەق مەزگىلىدە ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 پۇلمىكورت ئاۋاشتىرىلىدە ئىشلەنگەن. تۇمانلاشتۇرۇلدىغان دۇغ لەيلىمە ئېرىتىمىسى: ھەر ئامپۇلى $500\mu\text{g}/2\text{ml}$ ياكى ھەر ئامپۇلى $1\text{mg}/2\text{ml}$ ، قاپ/30 ئامپۇل.

ئىنفلامىمىد جەنۇبىي ئافرىقىدا ئىشلەنگەن. تۇمانلاشتۇرۇلدىغان ياسالىمىسى: پۇركۈش/ $100\mu\text{g}$ ياكى پۇركۈش/ $200\mu\text{g}$ ، دانە/15ml. پۇلمىكورت تۈرۈخالىپ شۇبېتىسىدە ئىشلەنگەن. پارашوكلۇق سۈمۈرۈلدىغان ياسالىمىسى: پۇركۈش/ $100\mu\text{g}$ ، دانە/200 پۇركۈم، پۇركۈش/ $200\mu\text{g}$ ، دانە/100 پۇركۈم، دانە/200 پۇركۈم.

زافىرلۇكاست (扎鲁司特，Zafirlukast)

【باشقا نامى】 ئاکكولات (Accolate)

【ئاساسىي تەركىبى】 زافىرلۇكاست.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ھاۋا يوللىرىدا دەرىجىدىن تاشقىرى سەزگۈرلۈك رېئاكسىسى پېيدا قىلىدىغان ئاق

ترىئىپتېنۋىد ئاكسىپتۇرى (白三烯受体) نى ئالاھىدە تورمۇزلاپ، ئاق ترىئىپتېنۋىدلىق پولىپپېتىد (白三烯多肽) كەلتۈرۈپ چىقارغان ھاوا يوللىرى سۈلۈق ئىشىش، كانايچە سلىق مۇسکۇلى قىسىقىرىش ۋە ياللۇغۇق ھۈجەيرىلەر ئىنفلاتاسىيلىنىش قاتارلىقلارنىڭ ئۇنىملۇك ئالدىنى ئالىدۇ، پروستاگلانдин (前列腺素)، ترومبوکسان (血栓素)， خولىن ئىقتىدارلىق ئاكسىپتۇر ۋە ھىستامىن ئاكسىپتۇرغا تىسرى كۆرسەتمىيدۇ. ھەر خىل غىنەقلاشلار كەلتۈرۈپ چىقارغان كانايچە سپازمىسىنى تورمۇزلايدۇ، ھەر خىل ئاتىگىنلار كەلتۈرۈپ چىقارغان بالدۇر ۋە كېچىكپ پەيدا بولىدىغان رېئاكسىيلىرنىمۇ ئازايلايدۇ. ئىچىكەندە T_{max} تاخىمنەن 3h، قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نسبىتى % 99%， $t_{1/2}$ تاخىمنەن 10h بولىدۇ. تولۇق مېتابولزملىنىپ، كۆپ قىسىمى گەندە ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، قالغان قىسىمى سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىپ كېتىدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كىسەلىكلىر】 زىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۆزۈن مۇددەتلىك داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە بىقدارى】 ھەر قېتىمدا 20mg 20 دىن كۈنگە ئىككى قېتىم ئىچىلىدۇ، مىقدارىنى تىدرىجىي ھالدا ھەر قېتىمدا 40mg غىچە كۆپەيتىشكە بولىدۇ، كۈنگە ئىككى قېتىم ئىچىلىدۇ، يېمەكلىك بۇ دورىنىڭ بىئولوگىيلىك پايدىلىنىش دەرىجىسىنى تۆۋەنلىكتىدىغان بولغاچا، غىزانغاندا ئىچىشتىن ساقلىنىش كېرەك.

【ناچار تەسىرى】 بىنىك دەرىجىدە باش ئاغرىش ياكى ئاشقازان - ئۇچىي رېئاكسىيىسى كۆرۈلىدۇ، ئەسوھ چىقىش ۋە ترانسئامىنزا ئۆرلەش ئاز كۆرۈلىدۇ. قان تومۇر نېرۋىسى مەنبىلىك سۈلۈق ئىشىش قاتارلىق ئاللىپرگىيلىك رېئاكسىيە ناھايىتى ئاز كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دوربىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئېرىترومىتسىن، تېۋوفىللەن (茶碱)， تېرفىنمازىن (特非那丁) لار بىلەن بىرگە ئىشلىتىسى، بۇ دورىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقى تۆۋەنلىدىدۇ؛ ۋارفارىن (华法令) بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە، ترومبوگېن ۋاقتى ئۆزۈرىайдۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورغا زىيادە سەزگۈرلەر ۋە 12 ياشتنى تۆۋەن باللارغا ئىشلىتىش چەكللىنىدۇ. ③ باشقىلار: ھامىلىدار ۋە بالا ئېمىتىۋانقان ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن

ئىشلىتىلدى.

【ياسالمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ئاككولات ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن.
تابلىپتى: تابلىپت/20، تابلىپ/40mg، قاپ/14 تابلىپ، قاپ/28
تابلىپت.

ئېپراتروپىئوم برومید

(异丙托溴铵，Ipratropium Bromide)

【باشقانامى】 ئاتروۋېنىت (爱喘乐，Atrovent)，ئاتروۋېنىت
(爱全乐，Atrovent)

【ئاساسىي تەركىبى】 ئېپراتروپىئوم برومید.

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ئاتروپين كۈواتپىنارى ئامىن تۈزى (阿托品季胺盐) نىڭ توغۇندىسى بولۇپ، ئاتسېتىل خولىن بىلەن كاناچە سلىق مۇسکۇلىدىكى M - ئاكسېپتۈرۈنىڭ بىرىكىشىنى رىقاپەتلىك تورمۇزلاپ، گۇئانوزىن سىكلازا (鸟甘环化酶) نىڭ ئاكتىپچانلىقىنى تورمۇزلاپ، GTP نىڭ CGMP ھاسىل قىلىشنى كېمەيتىش ئارقىلىق كاناچىلارنى كېڭىيەتىدۇ. ئېغىز ئارقىلىق سۇمۇرۇلگەندىن كېيىن، 90% يۇتۇلۇپ، ھەزمىم يولغا كىرىدۇ، بىر قىسىمى ئىدىسىلى پېتى گەندە ئارقىلىق چىقىرىلدى، يەنە بىر قىسىمى مېتابوليزملەنلىپ، ئاكتىپسىز لانغان ھاسىلاتقا ئايلىنىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 كاناچە زىقىسى، ھاسىراپ نەپسىلىنىش خاراكتېرلىك كاناچە ياللۇغى، سوزۇلما توسوۇلۇش خاراكتېرلىك نەپەس يولى كېسەللىكلىرى ۋە ئۆپكە ھاۋالىق ئىشىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى. β - ئاكسېپتۈرنى قوزغانتۇچى دورىلار ئەكس تەسىر بىرگەن ياكى دورىغا چىدامچانلىق شەكىللەنگەن بىمارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە تولىمۇ مۇۋاپىق كېلىنىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قىتىمدا 80 μ g ~ 40 دن كۈنگە 6 ~ 3 قىتىم تۇماڭلاشتۇرۇپ سۇمۇرۇلدۇ، كېسلى تۇرالىق باسقۇچتىكى بىمارلارغا ئەھۋالغا قاراپ مىقدارى كېمەيتىلدى.

【ناچار تەسىرى】 ئېغىز قۇرۇش، ئاغزى ئاچىق بولۇش، كېكىر دەك قىچىشىش، قۇرۇق يۇتەل قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلدۈ.

ئىستايىن ئاز بىر قىسىم بىمارلاردا مۇسکۇل تىترەش پەيدا بولىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: زىققە جىددىي قوزغالغاندا β_2 - ئاكسېپتۆرنى قوزغانقۇچى دورىلار بىلەن ماسلىشىش تەسىرىگە ئىگە بولىدۇ؛ سالبۇتامول (舒喘灵) بىلەن 2h ئارىلىق تاشلاپ ئالماشتۇرۇپ ئىشلەتكەندە، ئۇنىمىنى يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىدۇ؛ تېۋوفىللەن (茶碱) بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە، تېۋوفىللەنىڭ مقدارىنى كېمەيتىشكە بولىدۇ؛ ئالبۇتېرول (沙丁胺醇)، دىسودئۇم كروموجىلتىسات (色甘酸二钠) قاتارلىقلار بىلەن ماسلىشىش تەسىرىگە ئىگە. ② باشقىلار: ھامىلىدار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىشلىتش چەكلەندىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ئاتروۋېنىت گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن: تۇمانلاشتۇرۇلىدىغان ياسالىمىسى، پۇركۈش/20 μg , ھەر بوتۇلكىسى پۇركۈم 200ml/100ml.

ئاتروۋېنىت ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تۇمانلاشتۇرۇپ سۇمۇرۇش سۇيۇقلۇقى، دانه/250 μg , دانه/500 μg , قاپ/20 دانه.

فورموتېرول (福莫特罗, Formoterol)

【باشقى نامى】 ئاتوك (安通克, Atock).

【ئاساسىي تەركىبى】 فورموتېرول فۇمارت (富马酸福莫特罗) . فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىك β_2 - ئاكسېپتۆرنى قوزغانقۇچى دورا بولۇپ، كۈچلۈك ھەم ئۆزلۈكىسىز داۋام قىلىدىغان كاناچە كېڭىيەتىش تەسىرىگە ئىگە، زىيادە سەزگۈرلۈك كەقارشى تۇرۇش ۋە قىل قان تومۇرلارنىڭ ئۆتكۈزۈشچانلىقىنىڭ ئېشىشىنى تورمۇزلاش تەسىرىگىمۇ ئىگە. ئىچكىدەن 1h T_{max} ~ 0.5 $t_{1/2}$ بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كىسىدىلىكلىر】 كاناچە زىققىسى، ئۆتكۈزۈپ سوزۇلما خاراكتېرىلىك كاناچە ياللۇغى، ھاسىراپ نەپەسلەنىش خاراكتېرىلىك كاناچە ياللۇغى ۋە ئۆپكە ھاۋالق ئىشىشى كەلتۈرۈپ چىقارغان نەپەس قىيىنلىشىش قاتارلىق كۆپ خىل ئالامەتلەرنى ياخشىلاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۈنىگە $160\mu\text{g} \sim 80\mu\text{g}$ نى ئىككى قېتىمغا بولۇپ ئىچىدۇ. بالىلار ھەر kg بىدەن ئېغىرىلىقىغا كۈنىگە $4\mu\text{g}$ نى 3 ~ 2 قېتىمغا بولۇپ ئىچىدۇ، يىشى، كېسىللەك ئەھۇزىنىڭ ئوخشىما سلىقىغا قاراپ دورا مىقدارى مۇۋاپىق ئاشۇرۇلىدۇ. ياكى كېمىيەتلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 تىترەش، يۈرەك سېلىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلدى؛ داۋاملىق كۆپ مىقداردا ئىشلەتكىننە يۈرەك رىتمىسىزلىقى كېلىپ چىقىشى مۇمكىن.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 قالقانىسمانبىز ئىقتىدارى ئېشىپ كېتىش، يۈقرى قان بېسىم كېسىلى، يۈرەك كېسىلى ۋە دىئاپىت كېسىلى بىمارلىرىغا، ھامىلىدارلارغا ئۇتۇپيات بىلەن ئىشلەتكىننە ياشانغان بىمارلارغا ئەھۇزالغا قاراپ دورا مىقدارى كېمىيەتلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ئاتوك يايپونىيىدە ئىشلەتكىننەن. تابلىقى: تابلىق/40، قاپ/100 تابلىق؛ قۇرۇتۇلغان شېكىرلىك قىيامى: 0.5g/40 μg ، بولاق/8g

سالمېتېرول (沙美特罗, Salmeterol)

【باشقانامى】 سېرىپدىكس (施立碟, Seredisks) سېرىپۋېنىت (施立稳, Serevent)، سېرىپۋېنىت ئاككۇخالپىر (施立稳准纳器, Serevent Accuhaler).

【ئاساسىي تەركىبى】 سالمېتېرول.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 يېڭى تېپلىق ئۇزۇن ئۇنۇملىك β_2 - ئاكسېپتورنى تاللاپ قوزغانقۇچى دورا. زورايغان ھۇجىرىلدەرنىڭ ئاللىرىگىيلىك رېئاكسىيە ۋاستىچىسىنى قويۇپ بېرىشىنى تورمۇزلاش رولىغا ئىنگە بولۇپ، سۇمۇرۇلگەن ئانتىگەن (抗原) قوزغانقان دەسلەپكى مەزگىللىك ۋە كېچىكىپ پەيدا بولىدىغان رېئاكسىيلىرىنى تىزگىنلەپ، ھاۋا يوللىرىنىڭ يۈقرى رېئاكسىيچانلىقىنى تۆۋەنلىتىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىللەكلەر】 زىقىدە، ھاسىراپ نەپسىلىنىش خاراكتېرلىك كاناچە ياللۇغى ۋە قايتىما خاراكتېرلىك ھاۋا

يوللىرى توسلۇش.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 پاراشوكلۇق تۇمانلاشتۇرۇلۇپ سۈمۈرۈلىدۇ؛ چوڭلار ھەر قېتىمدا $50\mu\text{g}$ ، كۈنگە ئىككى قېتىم سۈمۈرۈدۇ؛ بالىلار ھەر قېتىمدا $25\mu\text{g}$ كۈنگە ئىككى قېتىم سۈمۈرۈدۇ، تۇمانلاشتۇرۇپ سۈمۈرۈش مىقدارى، ئىشلىتىش ئۇسۇلى يۇقىرىقىدىكىگە ئۇخشاش بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 تىترەش، يۈرەك سېلىش، باش ئاغرسى قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ئۆتكۈر خاراكتېرلىك زىققە قوزغىلىشقا ئىشلىتىلمىدۇ. بۇ ۋاقىتنا ئالدى بىلەن قىسا ئۇنۇملۇك β_2 - ئاكسىپپىورنى قوزغانقۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 سېرىبىدىكس ئىنگلىيىدە ئىشلەنگەن. قۇرۇتۇلغان پاراشوكلۇق ياسالىمىسى: چىلانما/ $50\mu\text{g}$ ، قاپ/60 چىلانما. سېرىبىپىنت ئىنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تۇمانلاشتۇرۇلىدىغان ياسالىمىسى: پۇركۇش/ $25\mu\text{g}$ ، بوتوڭىكا/60 پۇركۇم، بوتوڭىكا/120 پۇركۇم، سېرىبىپىنت ئاڭكۇخالىپىر: قۇرۇتۇلغان پاراشوكلۇق ياسالىمىسى، چىلانما/ 50mg ، قاپ/60 چىلانما.

فېنوتېرول (非诺特罗, Fenoterol)

【باشقا نامى】 بېرۇتېك (备劳喘, Berotec).

【ئاساسىي تەركىبى】 (非诺特罗氢溴化物) (Fenoterol)

هيدروبروميد.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ بىر خىل ئۇنۇمى كۈچلۈك بولغان β_2 - ئاكسىپپىورنى تاللاپ قوزغانقۇچى دورا بولۇپ، يۈرەك β_1 - ئاكسىپپىورىغا بولغان تەسىرى ئىنتايىن كىچىك بولىدۇ. تۇمانلاشتۇرۇپ سۈمۈرۈپ ئۆچ منۇت ئىچىدە ئۇنۇمى كۆرۈلىدۇ ھەمde دورا ئۇنۇمى 8h غىچە ساقلىنىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 ئۆتكۈر خاراكتېرلىك زىققە قوزغىلىش، ھەرىكەت كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان زىققە ۋە كاناچە زىققىسىنىڭ

ئالدىنى ئېلىش، باشقۇقا قايتىما خاراكتېرىلىك ھاۋا يولى تارىيىش (مدىسلەن: سوزۇلما توسوْلۇش خاراكتېرىلىك كانايچە ياللۇغى) نىڭ ئالامىتىگە قارىتا داۋا اشقا ھەمەدە زىيادە سەزگۈرلۈك بۇرۇن ياللۇغىغىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 تۇمانلاشتۇرۇپ سۇمۇرۇلىدۇ. چوڭلارغا ھەر قېتىمدا 0.4mg، بالىلارغا ھەر قېتىمدا 0.2mg كۈنگە 4 ~ 3 قېتىم سۇمۇرۇتۇلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 تىترەش، يۈرەك سېلىش، تەشۈشلىنىش، باش ئاغىش، يېلىك ئورۇن غىدىقلەنىش، ئاللىپىرىگىلىك رېئاكسىيە، تۆۋەن كالىيلق قان كېسىلى قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ.

【دقىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: β - ئاكسيپتۇرنى قوزغانقاچى دورىلار، خولىن ئىقتىدارىغا قارشى دورىلار، كسانتنىن تۈرى (黄嘌呤类) دىكىلەرنىڭ تۇغۇندىسى ۋە كورتسكۆئىد (皮质激素) مەزكۇر دورا ئۇنۇمىنى كۈچىتىدۇ؛ ② - ئاكسيپتۇرنى تو سقۇچى دورىلار بۇ دورىنىڭ دورا ئۇنۇمىنى تۆۋەنلىتىدۇ. ③ باشقىلار: دىئابىت كېسىلى، يېقىنى مەزگىللەك يۈرەك مۇسکۇل تىقلىمىسى ياكى ئېغىر دەرىجىدىكى ئورگان خاراكتېرىلىك يۈرەك قان تومۇر كېسىلىلىكلىرىگە گىرىپتار بولغانلارغا ۋە قالقانبىز ئىقتىدارى كۈچىيگەن بىمارلارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ ھامىلىدار، بالا ئېمىستىۋاتقان ئاياللارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 بېروتېك گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. تۇمانلاشتۇرۇلىدىغان ياسالىمىسى: پۇركۇش/0.2mg، دان/15ml.

بامبۇتېرول (班布特罗, Bambuterol)

【باشقۇقا نامى】 بامبېك (Bambec).
【ئاساسىي تەركىبى】 بامبۇتېرول ھىدرۆخلورىد.
【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ β_2 - ئاكسيپتۇرنى قوزغانقاچى دورا تېربۇتالىن (特布他林) نىڭ ئاساسىي دورسى بولۇپ، ئاساسلىقى β_2 - ئاكسيپتۇرنى غىدىقلەپ، كانايچە سىلىق مۇسکۇلىنى بوشىتىدۇ، ئىچكى مەنبېلىك ۋاستىچى ماددا كەلتۈرۈپ چىقارغان قان

تولۇش، سۈلۈق ئىشىق قاتارلىقلارنى تىزگىنلەپ، شىللەق پەردىدىكى مويilarنىڭ چىقرىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرىدۇ، 6h Tmax ~ 2، ئۇنۇملىك تىسرى قىلىش ۋاقتى ئاز بولغاندا 24h قىچە داۋاملىشدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 كانايىچە زىقىسى، سوزۇلما خاراكتېرىلىك كانايىچە ياللۇغى، ئۆپكە ھاۋالىق ئىشىقى ۋە باشقا كانايىچە سپازمىلىنىش قوشۇلۇپ كەلگەن ئۆپكە كېسەللىكلەرى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەركۈنى ئۇخلاشتىن ئىلگىرى بىر قېتىم ئىچىلىدۇ، مىقدارى بىمارغا قاراپ ئوخشاش بولمايدۇ. چوڭلارغا تەۋسىيە قىلىنىدىغان دەسلەپكى مىقدارى 10mg، 1 ~ 2 ھەپتىدىن كېبىن 20mg غىچە كۆپەيتلىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 تىترەش، باش ئاغرىش، يۈرەك سېلىش، مۇسکۇللار سپازمىلىنىش كۆرۈلىدۇ، بىر قىسىم بىمارلاردا ئىسۋە پەيدا بولۇشى مۇمكىن.

【دىققەت قىلىنىدىغان ئىشلار】 ① مەنى ئىلىنىدىغان ئەھۋالار: تېرىبۇتالىن ۋە بۇ دورىغا زىيادە سىزگۈرلەرگە، قېلىنلاشقان يۈرەك مۇسکۇل كېسەللىكى بارلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدى. ② باشقىلار: تىزگىنلەنمىگەن قالقانبىز خىزمىتى ئېشىپ كەتكەن بىمارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتلىدۇ؛ دىئابىت كېسىلىگە گىرىپتار بولغانلار بۇ دورىنى ئىشلەتكەندە قاندىكى شېكەر مىقدارىنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىنىڭ مىقدارىنى مۇۋاپىق ئاشۇرۇش تەۋسىيە قىلىنىدۇ؛ جىڭەر، بۇرەك فۇنكسييىسى ئېغىر دەرىجىدە تولۇق بولىغانلارغا ئىشلىتلىدىغان دۇردا مىقدارى چوقۇم يەككە تەنلەر بىلەن ئىشلىتلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 بامېيك شۇبىتىسىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتىن 10mg، تابلىپتىن 20mg، قاپ/10 تابلىپتى، بوتۇلکا/30 تابلىپتى، بوتۇلکا/100 تابلىپتى.

تېئۇفيلىن (茶碱，Theophylline)

【باشقا نامى】 تېئۇۋېپىت (希爾文，Theovent)，پروتېئۇ

· 埃斯玛隆 · (优瑞平, Protheo)

【ئاساسىي تەركىبى】 تېۋەفلىن.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 كوفېئىن تۈرىدىكى بىئۇئىشقارلارنىڭ بىرى بولۇپ، تىسرى قىلىش مېخانىزمى بەددەندىكى فوسفودىئىستېرازا (磷酸二酯酶) نىڭ سىكلىك ئادېنۈزىن فوسفات فوسفاتنىڭ قويۇقلۇقىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئارقىلىق، سىكلىك ئادېنۈزىن (环磷酸腺苷) قا قارىتا مېتابولىزمنى تىزگىنلىپ، كاناچىلارنى كېڭىيەتىش ھەمە زىيادە سەزگۈرلۈك ۋاستىچىسىنىڭ قويۇپ بېرىلىشنى توسوشتىن ئىبارەت. يۈرەك مۇسکۇلىنىڭ قىسىقىرىشىنى كۈچدەيتىش، يۈرەككىنىڭ قان چىقىرىش مىقدارىنى ئاشۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدەش ۋە مەركىزىي نېرۋىنى غىنيدىلاش تەسىرىگىمۇ ئىنگە. ئىچكەندە تولۇق سۈمۈرۈلىدۇ، بىئولوگىيلىك پايىدىلىنىش دەرىجىسى 96%， بۇ دورىنىڭ قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نىسبىتى 60%， ئاساسلىقى جىڭەردە مېتابولىزملەندىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىللەتكەر】 كاناچە سپازملىنىش خاراكتېرلىك زىققە، سوزۇلما خاراكتېرلىك كاناچە ياللۇغى ۋە ئۆپكە ھاۋالىق ئىششىقىغا ئىشلىتىلىدۇ. يۈرەك مەنبەلىك زىققە ۋە يۈرەك مەنبەلىك سۇلۇق ئىششىقلارغىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مىقدارى يەككە تەنلەر بويچە بولىدۇ، كېسىللەتكەر ئالامەتلەرى، ئۆپكە فۇنكسىيىسى ۋە دورىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقىغا ئاساسەن مىقدارى تەڭشىلىدۇ، دەسلەپكى مىقدارى كۈنگە ھەر kg بەدهن ئېغىرلىقىغا 8mg ~ 7 بولىدۇ؛ دائىمىلىق مىقدارى چوڭلارنىڭ كۈنگە ھەر kg بەدهن ئېغىرلىقىغا 12mg غا يەتكۈزۈلۈپ، ئىككى قېتىمغا ۋە بولۇپ ئىشلىتىلىدۇ. 16 ~ 13 ياشتىكىلەر ھەر قېتىمدا 0.25g دىن، 9 ~ 12 ياشتىكىلەر ھەر قېتىمدا 0.25g ~ 0.125 دىن كۈنگە ئىككى قېتىم تاماقتىن كېيىن ئىچىدۇ، ئىچكەندە چايىنىمايلا يۇنۇۋېتىش كېرەك.

【ناچار تەسىرى】 يۈرەك ھەرىكتى زىيادە تېزلىشىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، قورساقنىڭ يۇقىرى قىسىمى تارتىشىش، باش ئاغرىش، ھاياجانلىنىش، ئۇيقوسىزلىق قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. زەھەرلەنگەندە تارتىشىش ئالامەتلەرى پەيدا بولىدۇ، ئەمما بالىلاردا دورا ئىشلەتكەن دەسلەپكى مەزگىلىدila تارتىشىش ئالامەتلەرى پەيدا بولۇشى

مۇمكىن.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئېبىدىرىن، سىمپاتىك نېرۋىسىمان كانايىچە كېڭىتىكۈچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە زەھەرچانلىقى ئاشىدۇ؛ سپروفلىوكساتىن (环丙沙星)， ئېرىترومېتسىن، پروپرانونلول ۋە ئىچىلىدىغان ھامىلىدارلىقتىن ساقلىنىش دورىلىرى بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، بۇ دورىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقى ئاشىدۇ؛ ريفاپىنس (利福平) بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە بۇ دورىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقى تۆۋەنلىيدۇ؛ باربital تۈرىدىكى دورىلار، كاربامازبېسىن (卡马西平) ۋە باشقا جىڭگەر مىكروزوما (肝微粒体) فېرمېنتىنى يېتەكلىكىچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، بۇ دورىنىڭ مېتابوليزمىلىنىش ۋە چىقىرىلىشىنى تېزلىتىدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۇلالار: تېئوفىللەن ۋە تېئوفىللەن تۆغۇندىلىرىغا زىيادە سەزگۈرلەر، 30 ئايلىقتىن تۆۋەن بالىلارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ③ باشقىلار: يۈرەك، جىڭگەر ۋە تاجسىمان ئارتىرىيىسىنىڭ ئىقتىدارى تولۇق بولمىغانلار، قالقانسىمان بەز ئىقتىدارى ئېشىپ كەتكۈچىلەر، تۇتقاقيق تارىخى بارلار، ئاشقازان، 12 بارماق ئۈچەي يارسى بارلار ياكى سېمىز كىشىلەرگە ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە تۇلچىمى】 تېئوژپىت فرانسييىدە ئىشلەنگەن. ئۇزۇن ئۇنۇملۇك كاپسۇلى: دانە/125mg، دانە/250mg، قاپ/100 دان. بىروتېسو بېلگىيىدە ئىشلەنگەن. ئاستا تەسىرلىك تابلىپتى: تابلىپ/400mg، تابلىپ/600mg، قاپ/8 تابلىپ.

ئاسامېتۇن (阿斯美，Asmeton)

【ئاساسىي تەركىبى】 مېتوكسفېنادرىن ھيدروخلورىد، ناركوتىن (那可汀)، ئامىنوفىللەن (氮茶碱) خلورپروفېنپىریدامىن (马来酸氯苯吡胺).

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىسى】 بۇ دورا بىر خىل مۇرەككەپ ياسالما بولۇپ، كانايىچە سىلق مۇسکۇلىنىڭ تارتىشىشىنى تورمۇزلايدۇ، زىيادە سەزگۈرلۈككە قارشى تەسىرگە ئىنگە.

『مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر』 يۆتەل، بىلخەم كۆپىش، زىققە.

『ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى』 15 ياشتنىن يۈقىرىلار ھەر قېتىمدا ئىككى تال، كۈنىگە ئۇچ قېتىم تاماقتنىن كېيىن ئىچىدۇ. سەككىز ياشتنىن يۈقىرى 15 ياشتنىن تۆۋەن بالسالارغا دورا مىقدارىنىڭ يېرىمى كېمىيەتلىپ، كۈنىگە ئۇچ قېتىم ئىچۈرۈلەدۇ.

『ناچار تەسىرى』 ئەسۋە چىقىش، قىزىرىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، تاماق يېڭىگۈسى كەلمەسلەك، باش قېيىش، سىيىش، قىيىنلىشىش، ئۇيقوپ سراش قاتارلىقلار كۆرۈلەدۇ.

『دىققەت قىلىدىغان ئىشلار』 ① مەئىي قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: 8 ياشقا توشىغان بالسالارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: بۇ دورىنىڭ كۈچلۈك دورا ترکىبى بار بولۇپ، بىلگىلەرنىڭ ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارغا قاتىق ئەسلى قىلىش، باشقا يۆتەل توختىتىپ بىلخەم بوشاتقۇچى دورىلار، زۇڭام دورىلىرى، ھىستامىنغا قارشى دورىلار، تنچلاندۇرغۇچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىچىشكە قەتىشى بولمايدۇ؛ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر، تېنى ئاچىز لار، يۈقىرى قىزىتقانلار، يۈرەك كېسىلى بارلار، يۈقىرى قان بېسىمى بارلار، گلاۋىكوما بارلار، سىيىش قىيىنلاشقاڭ بىمارلار ۋە ھامىلىدارلارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلەدۇ.

『ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى』 ئاسىپتون يابۇنىيەت ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: قاب/100 دانه.

بېكلومېتازون دېپروپىئونات

(二丙酸倍氯米松，Beclomethasone Dipropionate)

『باشقا نامى』 ئالدىتىسن (安得新，Aldecin) بېكودىسكس (必酮碟，Beconase)， بېكواناز (伯克纳，Becodisks).

『ئاساسىي تەركىبى』 بېكلومېتازون دېپروپىئونات.

『فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى』 بۇ ئۇزۇن ئۇنۇمۇلۇك بەدەن سىرتىدىن ئىشلىتىلىدىغان گلۈكۈرتكۈۋەتلىق دورا بولۇپ، ياللۇققا قارشى تۇرۇش، زىيادە سەزگۈرلۈكە قارشى تۇرۇش ۋە قىچىشىنى توختىتىش قاتارلىق تەسىرى بار. سۇمۇرگەندىن كېيىن تېزلىكتە

ئۆپكە ئارقىلىق سۈمۈرلىدۇ، بىئولوگىلىك پايدىلىنىش دەرىجىسى 10~25% .

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 زىقىنى داۋالايدۇ، بولۇپمىز پۇتۇن بەدەنلىك گلۈكۈرتكۈئىد ياكى ئادرېنىوكورتىكوتروپىن (促肾上腺皮质激素) گە بېقىندىغان ھەمەدە كانايچىنى كېڭىيتىكۈچى دورىلارنى دائم ئىشلىتىش زۆرۈر بولغان بىمارلارغا مۇۋاپىق كېلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 تۇمانلاشتۇرۇلۇپ سۈمۈرلىدۇ. چوڭلارغا ھەر قېتىمدا $100\mu\text{g}$ 10 دن كۈنگە 4 ~ 3 قېتىم، كېسىلىي ئېغىز بولغانلار دەسىلىپ كۈنگە $800\mu\text{g}$ ~ 600 غىچە ئىشلىتىلدى، كۈنلىك ئەڭ چوڭ مىقدارى 1mg 1 دن ئاشۇرۇلمايدۇ. بالىلارغا ھەر قېتىمدا $100\mu\text{g}$ ~ 50 غا كۈنگە 4 ~ 2 قېتىم ئىشلىتىلدى، مىقدارى يېشى ۋە كېسىلىك ئەۋالىغا قاراپ تەڭشىلىدۇ، كۈنلىك ئەڭ يۇقىرى مىقدارى 0.8mg بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاز بىر قىسىم بىمارلاردا ئاۋاز پۇتۇپ قېلىش، ئېغىز بوشلۇقى ۋە يۇتقۇنچاق - كېكىردهك ئاق تەسۋىسمان زەمبۇرۇغدىن يۇقۇملىنىش كېلىپ چىقىدۇ.

【دىقىقتىقلىدىغان ئىشلار】 گلۈكۈرتكۈئىد ياكى ئادرېنىوكورتىكوتروپىن بىلەن پۇتۇن بەدەنلىك داۋالاش ئارقىلىق، ھېپوفىز بۇرەك ئاستى بىز ئىقتسىدارى تولۇق بولماسىلىق كېلىپ چىقىش ئېھىتىمالى بار بىمارلارغا بۇ دورىنى ئاماشتۇرۇپ ئىشلەتكەندە ئالاھىدە ئېھىتىيات قىلىش، تۇبىركۈلۈز بىمارلىرىغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ئالدىپتىس بىلگىيىدە ئىشلەنگەن. سۈمۈرلىدىغان ياسالىمىسى: قۇتا/200 پۇركۈم؛ بۇرۇنغا پۇركۈلۈدىغان ياسالىمىسى: قۇتا/200 پۇركۈم.

بېكودىسىن ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. سۈمۈرلىدىغان دورا پاراشوکى: بولاق/ $100\mu\text{g}$ ، بولاق/ $200\mu\text{g}$ ، قاپ/ 120 بولاق.

بېكۈناز ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. بۇرۇنغا پۇركۈلۈدىغان ياسالىمىسى: % 0.05%， 200 پۇركۈم/دانه.

فلوتکازون پروپیونات (丙酸氟替卡松，Fluticasone Propionate)

【باشقا نامى】 فلیکسوتید (辅舒酮，Flixotide)，فلیکسوناز (辅舒碟，Flixotide Rotadisk) (辅舒良，Flixonase)
【ئاساسىي تەركىبى】 فلوتنکازون پروپیونات.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىك】 بۇ ترفلۇئورىدىلىق گلۈكۈرتسىكۆئىد (三氟糖皮质激素) قا تۇه دورا. سۈمۈرۈلگەندىن كېيىن ئۆپكىدىكى ياللۇغقا كۈچلۈك قارشى تۈرۈش تەشىرىگە ئىگە، هاۋا يولغا نىسبەتەن بىرقەدر يۇقىرى دەرجىدە تاللاشچانلىققا ئىگە. ئىچكىندە بىئولوگىيلىك پايدىلىنىش دەرجىسى تۆۋەن بولىدۇ، $t_{1/2}$ 3h، تارقىلىش ھەجىمى تەخىىنەن 250L بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەلىكلىك】 زىقە ئالامەتلەرنى يېنىكلىتىپ، كېسەلىك ئەھۋالىنىڭ يامانلىشىپ كېتىشنى توسوشقا ۋە زىقىنىڭ ئالدىنى ئېلىش خاراكتېرىلىك داۋالاشقا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 سۈمۈرۈلدى، ئالدىنى ئېلىش خاراكتېرىلىك داۋالاشتا، ئالامىتى كۆرۈلمىگەن ئەھۋالىمۇ دورىنى قەرەلىك ئىشلىتىش لازىم. بىمارلارنىڭ ئەھۋالىغا ئاساسەن دورا مىقدارى تەڭشىلىدۇ، چوڭلار ۋە 16 ياشتىن يۇقىرى بىمارلارغا ~ 100 دىن كۈنىگە ئىككى قېتىم، تۆڭ ياشتىن يۇقىرى باللارغا ~ 100 μg دىن كۈنىگە ئىككى قېتىم ئىشلىلىدۇ. بۇ دورا بىلەن داۋالاشنى تۈيۈقىسىز توختىتىپ قويۇشقا بولمايدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئېغىز بوشلۇقى ۋە يۇتقۇنجاق ئاق تەسۋىسمان زەمبۇرۇغدىن يۇقۇملۇنىش، ئۇنى پۇتۇپ قېلىش، كاناچىclar ئەكسىچە سپازملىنىش پېيدا بولىدۇ؛ ئاز بىر قىسىم بىمارلار ئۆزۈن مەزگىل كۆپ مىقداردا ئىشلەتكەندە پۇتون بەدەنلىك تەسىر پېيدا قىلىدۇ. ئاللىرىگىيلىك رېئاكسىيەردىن ئەسۋە چىقىش، يۈز ياكى تىل سۇلۇق ئىشىش قاتارلىقلار كۆرۈلدى.

【دېقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنىقىلىنىدىغان ئەھۋاللار: ھەرقانداق تېتىكى فلوتنکازون پروپیونات (丙酸氟替卡松)غا زىيادە

سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: ھاسىلدارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ. زىققىنىڭ ئۆتكۈر قوزغىلىشىغا ئىشلىتىلمىدىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 فلىكسوتىد ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن: تۇمانلاشتۇرۇلىدىغان ياسالىمىسى: پۇرکۈش/ $25\mu\text{g}$ ، پۇرکۈش/ $50\mu\text{g}$ ، پۇرکۈش/ $125\mu\text{g}$ ، پۇرکۈش/ $250\mu\text{g}$ ، دانە/60 پۇرکۈم ياكى دانە/120 پۇرکۈم.

فلىكسوناز ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. سۇدا ئېرىيدىغان بۇرۇنغا پۇرکۈلگۈچى ياسالىمىسى: پۇرکۈش/ $50\mu\text{g}$ ، بوتۇلكا/120 پۇرکۈم.

فلىكسوتىد روتابىسىك ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. قۇرۇنۇلغان پاراشوكلۇق ياسالىمىسى: بولاق/ $50\mu\text{g}$ ، بولاق/ $100\mu\text{g}$ ، بولاق/ $250\mu\text{g}$ ، بولاق/ $500\mu\text{g}$ ، قاپ/ 15×4 بولاق.

ئالتنىچى باب ھەزمىم سىستېمىسىغا تەسىر قىلغۇچى دورىلار

1 . كىسلاتاغا قارشى دورىلار

ئومېپرازول
(奥美拉唑, Omeprazole)

【باشقا نامى】 لوسېك (金洛克) OMP, (洛赛克, Losec)
【ئاساسىي تەركىبى】 ناترىي ئومېپرازول.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ «پروتون پومېپسى»نى تورمۇزلىسغۇچى دورا بولۇپ، ئاشقازان دۇزارى ھۈچىرىرسىگە تەسىر كۆرسىتىپ، K^+ , H^+ , ATP فېرەمنىتىنىڭ ئاكتسىچانلىقىنى تورمۇزلايدۇ. ئىچكەندىن كېيىن T_{max} ~ 0.5 h, 1h ئىچىدە ئۇنۇمى تۈرۈلۈپ، تەسىرى 24h تىن ئارتۇق داۋاملىشدۇ. ئاساسىن ئاشقازان، ئۇچە يى پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نسبتى % 95. ئاشقازان، ئۇچە يى يولىغا تارقىلىدۇ، تەخىندىن 80% ئى سۈيدۈك ئارقىلىق، قالغان قىسىمى گەندە ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەككەر】 ئاشقازان، 12 بارماق ئۇچىدى يارىسى، يېنىشتىن بولغان قىزىلئۆڭگەچ ياللۇغى ۋە گاسترىن ئۆسمىسى (胃必素瘤).

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئاشقازان، 12 بارماق ئۇچىدى يارىسى ۋە تەتتۈر ئېقىش خاراكتېرىلىك قىزىلئۆڭگەچ ياللۇغى: ھەر قېتىمدا 20mg كۈنگە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ، داۋالاش مۇددىتى 4 ~ 2 ھەپتە: داۋالاش قىيىن بولغان ھەزمىم خاراكتېرىلىك يارا ۋە گاسترىن ئۆسمىسى: ئەھەغا قاراپ مىقدارى ئاشۇرۇلىدۇ. ئېغىر كېسەللەرگە ھەر كۈنى بىر قېتىم 40mg ۋېنىغا تېمىتىلىدۇ، گاسترىن ئۆسمىسى بىمارلىرىغا ئىشلىتىلىدىغان دورا مىقدارى يەككە تەنلەر بويىچە بولۇشى كېرىك.

【ناچار تەسلىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، باش ئاغرىش، باش قېيىش، ئىچ سۈرۈش، قورساق كۆپۈش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. ئەسۋە چىقىش، ئەتراپ نېرۋا ياللۇغى قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ.

【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دوربىلار بىلەن بولغان تەسلىرى: جىگەر دە ئوكسیدلىنىپ مېتابوليزملەنىدىغان دوربىلارنىڭ بەددەندىن چىقىرىلىشىنى ئاستىلىتىدۇ. ② باشقىلار: ھامىلىدارلارغا ئادەتتە ئىشلىتىلمىدۇ. بالا ئېمىتىۋاچان ئاياللار، جىگەر، بۇرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولمغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلمىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 لوسيبك شۇبىتىسىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/20mg، بوتۇل/3 دانه، بوتۇل/14 دانه؛ پاراشوكلۇق ئۆكۈلى، ئامپۇل/40mg، قاپ/1 ئامپۇل، قاپ/5 ئامپۇل. OMP كورىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىكتى: تابلىكتى/20mg، قاپ/14 تابلىكتى.

لانسوپرازول

(兰索拉唑，Lansoprazole)

【باشقا نامى】 تاكېپرون (达克普隆) .
【ئاساسىي تەركىبى】 لانسوپرازول.

【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 پروتون پومپىسىنى تورمۇزلىخۇچى دورا، ئاشقازان دېۋارى ھۈجىرلىسىنىڭ كىسلاالتىق شارائىتىدا ئاكتىپچانلىققا ئىگە سۈلغىلئامىن تۈغۈندىسى (亚磺酰胺衍生物) غا ئايلىنىدۇ، بۇ تۈغۈندىدا پروتون پومپىسىدىكى ATP-K⁺, H⁺ فېرمېنتىنى پاسىپلاشتۇرۇش ئارقىلىق، مەركىز ۋە ئەتراپ تەرىپىدىن تەڭشىلىدىغان ئاشقازان كىسلاتسىنىڭ ئاجرىلىشىنى تورمۇزلايدۇ. ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ. 24h كېيىن 13% ~ 14% ى چىقىپ كېتىدۇ. 【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 ئاشقازان ۋە 12 بارماق ئۈچىي يارىسى، يېنىشتىن بولغان قىزىلئۈچگەچ ياللۇغى ۋە گاسترىن ئۆزىمىسى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۈنگە بىر قېتىم 30mg نى ئەتىگەن ياكى كەچتە ئىچىدۇ، داۋالاش مۇددىتى 8 ~ 2 ھەپتە.
【ناچار تەسىرى】 ئەسۋە چىقىش، قىچىشقاڭ قاتارلىق ئاللىرىگىيلىك رېئاكسىيە ۋە قەۋزىيەت، ئىچ سۈرۈش، ئېغىز قۇرۇش، باش ئاغرىش، چارچاش، ئۇيۇقۇسۇزلىق قاتارلىقلار كۆرۈلدۈ، ترانسئامينازا ئۆرلەش، ئاق قان ھۆجەيرىسى كېمىيىش ئاندا - ساندا كۆرۈلدۈ.

【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: دىئازپام، سودىئوم فېنتوتىن (苯妥英钠) نىڭ مېتابولىزملىنىش تەسىرىنى كېچىكتۈرىدۇ. ② مەئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلەننيدۇ. ③ باشقىلار: ھامىلىدار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار، دورىغا زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بارلار، ياشانغانلار، جىڭىر فۇنكسييىسى زەخىملەتكەنلەرگە ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدۇ؛ بالىرغا ئىشلىتىش تەۋسىيە قىلىنمايدۇ.
【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 تاڭپىرون ياپونىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/ 30mg.

پانتوپرازول (泮托拉唑，Pantoprazole)

【باشاقا نامى】 پانتولوك (潘妥洛克，Pantoloc)
【ئاساسىي تەركىبى】 پانتوپرازول.
【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 يېڭى تىپتىكى پروتون پومپىسىنى تورمۇزلىغۇچى دورا. ئاشقازان دىۋارى ھۆجەيرىسىگە تەسىر كۆرسىتىپ، كىسلاقاتلىق شارائىستا ئاكتىپلاشقان پروتون ATP-K⁺, H⁺ پېرىمېنندىكى سۇلغىدرىپ بىلەن بىرىكىپ، فېرىمېنتنىڭ ئاكتىپچانلىقىنى تورمۇزلاش ئارقىلىق، ئاشقازان كىسلاراتاسىنىڭ ئاجرلىشىنى تىزگىنلىدۇ.
【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاشقازان، 12 بارماق ئۈچەي يارىسى، يېنىشتىن بولغان قىزىلئۇڭكەچ ياللۇغى.
【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 هەر قېتىمدا 40mg، كۈنگە

بىر قېتىم ئىچىلدۇ. ئايىرم بىمارلارغا كۈنگە 80mg ئىشلىشكە بولىدۇ. 12 بارماق ئۈچىي يارسىنى داۋالاش مۇددىتى 4 ~ 2 ھەپتە، ئاشقازان يارسى ۋە تەتۈر ئېقىش خاراكتېرىلىك قىزىلئۆڭگەج ياللۇغىنى داۋالاش مۇددىتى 8 ~ 4 ھەپتە بولىدۇ. داۋالاش مۇددىتىنى 8 ھەپتىدىن ئاشۇر ۋە بىتىشكە بولمايدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، قورساق ئاغرىش، قورساق كۆپۈش، ئىچ سۈرۈش، ئەسوھ چىقىش، تېرىبلەر قىچىشىش، باش ئاغرىش، باش قېبىش قاتارلىقلار كۆرۈلەندۇ. سۈلۈق تىشىق، قىزىش ۋە كۆرۈش قۇۋۇقتى ئۆتكۈنچى توسقۇنلۇققا ئۇچراش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلەندۇ.

【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: سۈمۈرۈلۈشى pH قىممىتىگە باخلىق بولغان دورىلاردىن مەسىلەن: كېپتووكونازول (酮康唑) بىلەن بىرگە ئىچكىننە، بۇ دورىنىڭ ئۇنىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە كۆرسەتكەن تەسىرىنى ئۆيلىشىش كېرەك. ② مەنىنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر ۋە جىمگەر فۇنكىسيمىسى ناچارلاشقانلارغا ئىشلىتش چەكلەندى. ③ باشىلار: نېرۋا مەنبەلىك ھەزىم قىلىش ناچارلىشىش قاتارلىق بىننىك دەرىجىدىكى ئاشقازان - ئۈچەي يولى كېسەللىكلىرىنى داۋالاشقا ئىشلىتىلمىدە؛ ھامىلدار، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار ۋە باللارغا ئېھوتىيات بىلەن ئىشلىتىلەندۇ.

【ياسالىمسى ۋە ئۇلچىمى】 پاتنولوك گېرمانىيەدە ئىشلىنگەن. ئۇچىدە ئېرىگۈچى تابلىتى: *تابلىت/40mg، بونتولكا/14 تابلىت، بونتولكا/28 تابلىت.

ربامىپىد (瑞巴派特, Rebamipide)

【باشقا نامى】 مۇكوستا (Mucosta) . (膜固思达)

【ئاساسىي تەركىبى】 ربامىپىد.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىملىكى】 بۇ دورا ئاشقازان شىللەق پەردىسىنى پروستاگلانдин₂E₂نىڭ مىقدارىنى ئاشۇر ۋېپ، ئاشقازان شىللەق پەردىسىنى قوغدايدۇ، ئاشقازان شىللەق پەردىسى سىرتقى قەۋىتىدىكى

شىلىمىشىق سۈيۈقلۈق مىقدارى ۋە ئېرىشچان شىلىمىشىق سۈيۈقلۈق مىقدارىنى ئاشۇرۇپ، ئاشقازان ئىشقارلىق ماددىسىنىڭ ئاجرلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاشقازان شىللەق پەردىسىدىكى قان ئېقىمىنى ئاشۇرىدۇ. ھيدروكىسل گۈركىن رادikalلىنى يوقتىپ، ئاشقازان چىقىش ئېغىزى بۇرما تاياقچە باكتېرىيىسى كەلتۈرۈپ چىقارغان نېيتىرال خۇمار دانىچە ھۈجىرىه پېرئوكسیدىنىڭ ھاسىل بولۇشى ۋە ئاشقازان شىللەق پەردىسىنىڭ زەخىملىنىشىنى تورمۇزلايدۇ. ئىچكەندە تېز سۈمۈرۈلدۇ 2h، T_{max} $t_{1/2}$ 1.5h، ئۇدا دورا بەرگەندە يىخلېپ قېلىش بايقالىغان. قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نسبىتى 98.6~98.4%. 【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىرى】 ئاشقازان يارسى، ئۆتكۈر، سوزۇلما خاراكتېرىلىك ئاشقازان ياللۇغى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئاشقازان يارسى: چوڭلار ھەر قېتىمدا بىر تابلىت (100mg) تىن كۈنگە ئۆچ قېتىم ئەتقىگەندە، كەچتە ۋە ئۇخلاشتىن ئىلگىرى ئىچىدۇ؛ ئۆتكۈر، سوزۇلما خاراكتېرىلىك ئاشقازان ياللۇغى: چوڭلار ھەر قېتىمدا بىر تابلىتتىن كۈنگە ئۆچ قېتىم ئىچىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئەسوھ چىقىش، قىچىشىش، دورا ئەسۋىسىدەك ھۆل تەمرەتكە پەيدا بولۇش، باش قېيىش، ئۇيقوسراش، قەۋزىيەت، قورساق كۆپۈش، ئىچ سۈرۈش، قورساق ئاغرىش، كېكىرىش، قۇسۇش، ھېق تۇتۇش قاتارلىقلار كۆرۈلدۇ، تەم سېزىمى نورمالسىزلىنىش، ئۇسساش، چىراىي قىزىرىش، قىزىش، ئاق قان ھۈجىرىسى كېمېيىش، قان پلاستىنكلىرى ئازىيىش، سېرىقلىق چۈشۈش، ترانسىئامىتزا نورمالسىزلىنىش، ھېيز نورمالسىزلىنىش، ئەمچەك يوفىناش، ئەمچەك ئاغرىش، سوت چىقىش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلدۇ.

【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ياشانغان بىمارلار ھەزمىم سىستېمىسىغا بولغان ئەكس تەسىرىگە دەققەت قىلىشى لازىم، ھامىلىدارلار، باللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار دورا ئىشلەتكەندە بالا ئېمىتىشتىن ساقلىنىش لازىم. 【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 مۇكosta ياپونىيىدە ئىشلەنگەن. پەردىلىك تابلىتى: تابلىت/100mg، بولاق/12 تابلىت.

كوللوئىدال بىسمۇت سۇبىسترات (胶体碱式枸橼酸铋, Colloidal Bismuth subcitrate)

【باشقانامى】 دى - نول (De-Nol), ۋېنترىسول (德诺, De-Nol), تريپوتاتسىمۇم (胶体次枸橼酸铋钾, ventrisol) دىستراتوبىسمۇتات (三钾二枸橼酸铋, Tripotassium Dicitra tobismuthate).

【ئاساسىي تەركىبى】 كوللوئىدال بىسمۇت سۇبىسترات.
【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ئاشقازان كىسلاقاتىنى تىزگىنلىمەيدۇ، ئاشقازان كىسلاقاتىنى شارائىتىدا بىسمۇت ئوكسىدى كوللوئىد چۆكىمىسى ھاسىل بولۇپ، بىر قەۋەت قوغدىغۇچى پەرده شەكىللەنىپ، يارا يۈزىنى قوغدايدۇ، يارىنىڭ ئەسلىگە كېلىش ۋە ساقىيىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ، ئىچكى مەنبەلىك پروستاگلاندىنىنىڭ سىنتېزلىنىشى ۋە يېپىشقاق ئاقسىزلىنىڭ ئاجىرىلىشىنى غىدىقلاش ئارقىلىق ئاشقازان شىلىق پەردىسىگە نىسبەتن قوغداش رولىنى ئوبىنайдۇ. بۇ دورىنىڭ ئاشقازان چىقىش ئېغىزى بۇرما تاياقچە باكتېرىيىسىگە نىسبەتن باكتېرىيە ئۇلتۇرۇش تەسىرى بولۇپ، يارا قايتا قوزغىلىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. بۇ دورىنىڭ ھەزم قىلىنىپ سۈمۈرۈلۈشى ئىنتايىن قىيىن بولۇپ, $t_{1/2}$ 30 ~ 20 كۈن بولىدۇ، ئاساسلىقى بۇرەك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كىسەللىكلىرى】 ئاشقازان, 12 بارماق ئۇچىي يارىسى، ئاشقازان چىقىش ئېغىزى بۇرما تاياقچە باكتېرىيىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئاشقازان ياللۇغى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەركۈنى ئەتىگەن، كەچلىك تاماققىن 0.5h ئىلگىرى ھەر قېتىمدا 240mg ياكى كۈنگە ئۈچ ۋاخ تاماققىن ۋە ئۇخلاشتىن 0.5h ئىلگىرى ھەر قېتىمدا 120mg ئېچلىدۇ، داۋالاش مۇددىتى 8 ~ 4 ھەپتە بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 قارا تىرەت (قارىمايسىمان تەرەتكە ئۇخشىمايدۇ) پېيدا بولىدۇ، يەندە كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، قەۋىزىيەت بولۇش، ئىچ سۈرۈش ۋە ئاللىرىگىيلىك رېئاكسىيە قاتار لقلار كۆرۈلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى:

كىسلاتاغا قارشى دورىلار، كالا سۇتى بۇ دورىنىڭ تەسىرىگە توسىقۇنلۇق قىلىدۇ؛ تېتراستىكلين (四环素) بىلەن بىرگە ئىشلىتىسى ئېتراستىكليننىڭ سۈمۈرۈلۈشكە تەسىر يەتكۈزىدۇ؛ ئاموکستىسللىن (阿莫西林) قاتارلىق ئاتتىبىئۇتكى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە ئاشقازان چىقىش ئېغىزى بۇرما تاياقچە باكتېرىيىسىگە نىسبەتن ماسلىشىپ باكتېرىيىگە قارشى تۇرۇش تەسىرىگە ئىگە بولىدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھەلالار: ھامىلدارلار ۋە بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر، ئېخىر بۆرەك كېسىلى بارلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ؛ بۇ دورىنى ئىشلىتىۋاقان مەزگىلە بىسۈتىنىڭ باشقا ياسالىمىلىرىنى ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. ③ باشقىلار: مېڭە قان تومۇر كېسەللەكلىرى ۋە تاجسىمان ئارتېرىيىلىك يۈرەك كېسىلى بارلارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 دى - نول گوللاندىيىدە ئىشلەتگەن.

تابلىپتى: تابلىپتى/120mg، قاپ/40 تابلىپت.

ۋېنترسول گوللاندىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى/120mg، قاپ/112 تابلىپت.

سەمپتىدىن (西咪替丁，Cimetidine)

【ئاساسىي تەركىبى】 سەمپتىدىن.
【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 H₂- ئاكسيپتورنى توسىقۇچى دورا، ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ئاجرىلىشىنى كۆرۈنەرلىك تىزگىنلەيدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئاشقازان كىسلاتاسىنىڭ ئاجرىلىش مىقدارى ۋە ھىdroگپن ئىئونىنىڭ قويۇقلۇقىنى ئازايىتىدۇ. بىمارلارنىڭ يېرىمىدا دېگۈدەك دورا توختىتلەغاندىن كېپىن 12 بارماق ئۈچەي يارىسى ياكى ئاشقازان يارىسى قايىتا قوزغىلىدۇ، ئىچكەندىن كېپىن تېز سۈمۈرۈلىدۇ، $t_{1/2}$ 1.5h Tmax 1 ~ 2h، ئاساسلىقى ئەسلى پېتى سۈيىدۇك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىر】 ئاشقازان، 12 بارماق ئۈچەي يارىسى، يېنىشتىن بولغان قىزىلئۆڭگەچ ياللۇغى، گاسترن ئۆسەمىسى، يۇقىرى ھەزىم يولى يارىسى ياكى شەلۋەرەش كەلتۈرۈپ

چقارغان قاناش.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ ياكى ۋېناغا تېمىتىلىدۇ. ئاربلاپ دورا بىرگەندە، ۋېنادىن تېمىتىش مىقدارى 2h ئىچىدە \geq h/150mg لىك سۈرئەت بىلەن كۈنىگە كۆپ قېتىم تېمىتىلىدۇ؛ ئۇلاپ دورا بىرگەندە، 24h ئىچىدە \geq h/75mg لىك سۈرئەت بىلەن تېمىتىلىدۇ. ۋېناغا ئاستا - ئاستا ئوکۇل قىلىنسىمۇ بولىدۇ، چوڭلاردىكى ئاشقازان ياكى 12 بارماق ئۇچىي يارىسى، يېنىشتىن بولغان قىزلىئۇڭگەچ ياللۇغىخا كۈنىگە 1600mg ~ 800؛ گاسترىن ئۇسسىسگە ئىشلەتكەندە كۈنىگە 2000mg غا يېتكۈزۈلىدۇ. بالسالارغا كۈنىگە 3 ~ 2 قېتىم ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ، بىر ياشتنى يۇقىرى بالسالارغا كۈنىگە هەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 25mg ~ 20؛ 1 ئايلىق بالسالارغا كۈنىگە هەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 20mg؛ بىر ئايلىقتىن توۋەتلەرگە كۈنىگە هەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 15mg ~ 10 ئىشلىتىلىدۇ. جىڭىر، بۇرەك فۇنكىسيسى تولۇق بولىغانلارنىڭ دورا مىقدارىنى تەڭشىشكە دەققەت قىلىش لازىم.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغىرىش، باش قېيىش، ماغدۇرسىزلىنىش، قەۋزىيەت ياكى ئىچ سۈرۈش، ئىسوھ، ترانسېئامىنىزا ئۆرلۈش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. سىنۇسلۇق يۈرەك ھەرىكتى زىيادە تېزلىشىش ۋە يۈرەك ھەرىكتى زىيادە ئاستىلاش، دالانچە - قېرىنچە ئۇتكۈزۈشى توسوۇلۇش قاتارلىقلار ناھايىتى ئاز كۆرۈلىدۇ. ياشاخان ۋە جىڭىر، بۇرەك فۇنكىسيسى تولۇق بولىغان بىمارلارغا زور مىقداردا ئىشلەتكەندە روھىي توسقۇنلۇققا ئۇچرايدۇ. كۆپ مىقداردا ئۇزۇن مەزگىل ئىشلىتىلسە ئاتلىمۇق ھورموونغا قارشى تۈرگاندەك تەسىر پىدا بولىدۇ، مەسىلىن: ئەرلەرنىڭ ئەمچىكى يوغىشاش، سۇت ئېقىش قاتارلىقلار.

【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دوربلاپ بىلەن بولغان تەسىرى: ۋارفارىن (华法林)، فېنتوئن ناتريي (苯妥英呐)，تېۋوفىللەن (茶碱)， فېنوباربیتال (苯巴比妥)، دىئازىپام (地西泮)، پروپرأنولول (普萘洛尔) قاتارلىقلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە، يۇقىرىقى دوربلارنىڭ جىڭىردىكى بىئولوگىيلىك ٹۈزگىرىشى تورمۇزلىنىدۇ. ② مەنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: H₂ - ئاكسىپتۈرنى توسقۇچى دوربلارغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلەنىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 سىمېتىدىن گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: 200mg/2ml، قاپ/580 ئامپۇل.

رانیتیدین (雷尼替丁, Ranitidine)

【باشقا نامى】 زانتاك (善卫得, Zantac).

【ئاساسىي تەركىبى】 رانیتیدين هيدروخلوريد.

【فارماکولوگىيلىك ٹالاھىدىلىكى】 H₂ - ئاكسبىپتورنى تو سقۇچى دورا. ئاساسىي ئاشقازان كىسلاتسىسى ۋە قوزغىتلغان ئاشقازان كىسلاتسىنىڭ ئاجرىلىشىنى تىزگىنلىپ ئاجرىلىش مىقدارىنى كېمىيتسىپ، كىسلاتسالق دەرىجىسى ۋە پىپىسىنىڭ مىقدارىنى تۆۋەنلىتىدۇ. تورمۇزلاش تەسىرى سىمپتىدىن كۈچلۈك بولىدۇ. ئىچكەندە تېز سۈمۈرۈلدۈ، تەخمىنەن 50% بولىدۇ، ئاساسلىقى ئىسىلى پىتى سۈيۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 ئاشقازان، 12 بارماق ئۈچىي يارىسى، يېنىشتن بولغان قىزىلئۇڭىچ ياللۇغى، گاسترىن ئۆسمىسى، يۇقىرىقى ھەزم يولى يارىسى ياكى شەلۋەرەش كەلتۈرۈپ چىقارغان قاناش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىش تۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 150mg 150 دن كۈنىگە ئىككى قېتىم ياكى 300mg 300 دن ئۇخلاشتىن ئىلگىرى بىر قېتىم ئىچلىدۇ. داۋالاش مۇددىتى 8 ~ 4 ھەپتە، قامداش مىقدارى ھەر كۈنى 600 600mg كەچتە 150mg بولىدۇ. گاسترىن ئۆسمىسىگە كۈنىگە 1200mg 1200mg بىر ئىشلىتىلىدۇ. يارا قاناشتا داۋالاشتا ھەر قېتىمدا 50mg 50mg ~ 25، ھەر 6h ~ 4 تە بىر قېتىم مۇسکۇلغا ياكى ۋېناغا ئاستا - ئاستا ئوكۇل قىلىنىدۇ، ئوپپراتسىيىدىن ئىلگىرى ۋېناغا 100mg 100mg ئوكۇل قىلىنىدۇ، ۋېناغا ئېمىتىشتا، 300mg 300mg ئوكۇل ئىلگىرى 5% 5% 100ml 100ml ئوكۇل سۈيۈقلۈقىغا قوشۇپ، 30min 30min ئىچىدە تېمىتىپ بولىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرىش، باش قېيىش، كۆڭۈل ئېلىتىش، قەۋزىيەت، ئەسۋە قاتارلىقلار دائىم كۆرۈلىدۇ، قايتما خاراكتېرىلىك جىگەر زەخىمىلىنىش، قان پلاستىنكلەرى كېمىيىش ۋە يۈرەك ھەرىكتى زىيادە ئاستىلاش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ.

【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار:
 بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىش چەكلەندى. ② باشقىلار:
 ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاتقا نالار، سەككىز ياشتن تۆۋەنلەر، جىڭىر،
 بۇرەك فۇنكسىيىسى تولۇق بولمىغانلارغا ئېھتىيات بىلدەن ئىشلىتىلىدۇ.
 【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 زانتاك ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى:
 تابلىپت / 150mg، تابلىپت / 300mg، قاپ / 10 تابلىپت؛ ئوكۇلى، ھەر
 ئامپۇللى 50ml/2ml، قاپ / 5 ئامپۇل.

فاموتىدىن

(法莫替丁，Famotidine)

【باشقا نامى】 گاستېرى (Gaster) ياكى كۈئاماتپىل 溃疡克 (高舒达).
 . (卡玛特，Quamatel)

【ئاساسىي تەركىبى】 فاموتىدىن.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىك】 H_2 - ئاكسېپتورنى تورمۇزلىغۇچى دورا، ئاشقازان كىسلاتسىنىڭ ئاجربىلىشنى تىزگىنلەش تەسىرى سىمېتىدىندىن ۋە رانتىدىندىن كۈچلۈك. پېپسىنىڭ ئاجربىلىشىنىڭ تورمۇزلايدۇ. ئىچكەندە تېز سۈمۈرلەدۇ، تەخمىنەن بىر سائىته ئۇنۇم بېرىپ، تەسىرى 12h داۋاملىشىدۇ. ئاساسلىقى ئەسلى پېتى ۋە مېتابولىزم ھاسلاتى 8 - ئوكسىدى شەكىلىدە سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىللەكىلەر】 ئاشقازان، 12 بارماق ئۈچىي يارىسى، يېنىشتنىن بولغان قىزىلئۇڭگەج ياللۇغى، گاسترىن ئۆسمىسى، ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئاشقازان شىللەق پەزىسى قاناش.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئاشقازان، 12 بارماق ئۈچىي يارىسى ۋە يېنىشتنىن بولغان قىزىلئۇڭگەج ياللۇغىنى داۋالاش: چوڭلارغا ھەر قېتىمدا 20mg دىن كۈنگە ئىككى قېتىم ۋىنماغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، ئەتىگەنلىك ۋە كەچلىك تاماقتنى كېپىن ئىچىدۇ، ھەزمىم يولى قاناشنى داۋالاش: ھەر قېتىمدا 20mg، كۈنگە ئىككى قېتىم؛ گاسترىن ئۆسمىسىنى داۋالاش: ھەر قېتىمدا 20mg، ھەر 6h تە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش قېيىش، ئۇيقوسىزلىق، ئېغىز قۇرۇش، قەۋزىيەت، ئىچ سۈرۈش، ئەسۋە، ترانسِئامينازا ئۆتكۈنچى يۇقىرلاش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. قان تومۇر نېرۋىسى مەنبىلىك، سۈلۈق ئىشىش، مۇسکۇل ئاغرىش، زەھەرلىنىش خاراكتېرىلىك ئېپدىپرما (يۇزه تېرى) بوشىش قاتارلىقلار ناھايىتى ئاز كۆرۈلىدۇ.

【دېقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئاشقازان - ئۈچىيگە ئىشلىلىدىغان دورىلار بىلەن بىرلا ۋاقتىتا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ، ئىشلىتىش توغرى كەلگەندە ئاز بولغاندا 2h ئارىلىق قويۇش كېرەك. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: H_2 - ئاكسېپتۇرنى تو سقۇچى دورىلارغا زىياده سەزگۈرلەر، ئېغىز دەرىجىدىكى بۆرەك ئىقتىدارى تولۇق بولمىغانلار، ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ③ باشقىلار: باللار ۋە جىڭەر، بۆرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولمىغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىلىدۇ، ئاشقازان راکى ئىنكار قىلىنغاندىن كېيىن ئىشلىلىدۇ.

【ياسالىمسى ۋە ئۆلچىمى】 گاستېر يابونىيىدە ئىشلىنىڭدن. پاراشوكلۇق ئوکۇلى، ئامپۇل، 20mg/قاب/10 ئامپۇل؛ تابلېتى: 20mg/تابلېت، قاب/10 تابلېت، قاب/30 تابلېت. تابلېت، قاب/10 تابلېت، قاب/30 تابلېت. كۈئاماتېل ۋېنگىرىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: ئامپۇل/20mg، قاب/5 ئامپۇل.

نىزاتىدىن

(尼扎替丁，Nizatidine)

【باشقا نامى】 ئاكسىد (Axit，爱希，Axit)

【ئاساسىي تەركىبى】 نىزاتىدىن.

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 H_2 - ئاكسېپتۇرنى تو سقۇچى دورا. يارىغا قارشى تەسىرى سىمبىتىدىنىن 4 ~ 3 ھەسسى كۈچلۈك، رانتىدىن بىلەن ئوخشاش. ئىچكەندىن كېيىن Tmax تەخمىنەن $t_{1/2}$ ~ 1 h، CL ~ 1000ml/min، 1.6h، قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نسبىتى 35%， 24h ئىچىدە سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ، يىغىلىپ قېلىش تەسىرى يوق.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ھەرىكەتچان ئاشقازان ۋە 12 بارماق ئۈچەي يارىسى، ھەرىكەتچان 12 بارماق ئۈچەي يارىسى ساقايغاندىن كېيىنكى ئالدىنى ئېلىشقا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەرىكەتچان 12 بارماق ئۈچەي يارىسى ساقايغاندىن كېيىنكى قايتا قوزغىلىشقا: ئۇخلاشتىن ئىلگىرى 300mg ، كۈنگە بىر قېتىم ياكى ھەر قېتىمدا 150mg 150 دن كۈنگە ئىككى قېتىم ئىچىلدى. ئاشقازان يارىسىغا: ئۇخلاشتىن ئىلگىرى 300mg ، كۈنگە بىر قېتىم ئىچىلدى. 12 بارماق ئۈچەي يارىسى ساقايغاندىن كېيىن قايتا قوزغىلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا: ئۇخلاشتىن ئىلگىرى 150mg ، كۈنگە بىر قېتىم ئىچىلدى.

【ناچار تىسىرى】 قۇسۇش، قەۋزىيەت بولۇش، ئىچ سۈرۈش، قورساق كۆپۈش، ئېغىز قۇرۇش، قىزىش، بۇرۇن ياللۇغى، يۈقۈنچاڭ ياللۇغى، بۇرۇن كاۋىكى ياللۇغى، يۈتلىش قاتارلىقلار كۆرۈلدى. ئاللىرىگىلىك رېئاكسىيە، مەسىلەن: ئەسوھ، قىچىشقاق قاتارلىقلار ئاندا — ساندا كۆرۈلدى؛ ترانسإستامىنازا ياكى ALP يۈقىرىلاش، سېرىقلىق چۈشۈش قاتارلىقلار ئىنتايىن ئاز كۆرۈلدى.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 دورىغا زىيادە سىزگۈرۈك تارىخى بارلار، جىڭىر، بۆرەك فۇنكسىيىسى تولۇق بولىغانلار، ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاچان ئاياللار ۋە بالىلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى.

【ياسالىمىسى ۋە مۇلچىمى】 ئاكىسىد ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دان/150mg، قاپ/7 دانە، بوتۇلكا/60 دانە؛ دان/300mg، قاپ/7 دانە، بوتۇلكا/30 دانە.

مىزوپروستول (米索前列醇，Misoprostol)

【باشقا نامى】 سىتوتك (喜克溃，Cytotec).

【ئاساسىي تەركىبى】 مىزوپروستول.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ پروستاگلاندىن₁E₁ نىڭ توغۇندىسى بولۇپ، ئاشقازان كىسلاقاتى، بېپىسىننىڭ ئاچرىلىشنى تىزگىنلەپ، غىدقىلاش ئارقىلىق شىلىمىشىق سۈيۇقلۇقنى ئاچرىتىپ،

ئاشقازان شىللق پەردىسىنى قوغدىدۇ ھەمەدە 12 بارماق ئۈچىنىڭ ھىدروکاربونات تۈزلىرىنى ئاچرىتىپ چىقىرىشنى غىدىقلاب، ئاشقازان كىسلاطاسىنىڭ نېيىتىراللىشىغا ماسلىشىدۇ. ئاشقازان شىللق پەردىسىنىڭ قان ئىقىمىنى ئاشۇرۇپ، يارا شەكىللەنىشنىڭ ئالدىنى ئالدۇ. شۇنداقلا يارىنىڭ ساقىيىشنى تېزلىتىدۇ. ئىچكەندە تېز سۈمۈرۈلىدۇ، $t_{1/2}$ 1.6 ~ 1.8h Tmax 0.5h. قان پلازمَا ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نسبىتى 80% ~ 90%. ئاساسىن جىگەر، بۆرەك، ئاشقازان ۋە ئۈچەي قاتارلىق توقۇلمىلارغا تارقىلىدۇ، ئاشقازان سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

『مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەلىكلىرى』 ئاشقازان ۋە 12 بارماق ئۈچەي يارىسىغا ئىشلىتىلىدۇ، ستروئىدىسىز (非甾体) ياللۇغقا قارشى دورىلار كەلتۈرۈپ چىقارغان ئاشقازان شىللق پەردىسىنىڭ زەخىمىلىنىشىگىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

『ئىشلىتىش تۇسۇلى ۋە مقدارى』 ئاشقازان ۋە 12 بارماق ئۈچەي يارىسى: ھەر قېتىمدا $200\mu\text{g}$ دىن كۈنگە توت قېتىم، تاماقتن ۋە ئۇخلاشتىن ئىلگىرى ئىچىلىدۇ، داۋالاش مۇددىتى 8 ~ 4 ھەپتە؛ ياللۇغلىنىشقا قارشى دورىلار كەلتۈرۈپ چىقارغان ھەزىم خاراكتېرىلىك يارىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتا ھەر قېتىمدا $200\mu\text{g}$ كۈنگە 4 ~ 2 قېتىم ئىچىلىدۇ.

『ناچار تەسىرى』 تەرەت سۇيۇق كېلىش، ئىچ سۈرۈش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ. كۆڭۈل ئېلىشىش، باش ئارىش، باش قېيش ۋە تېرىلىر قىچىشىش قاتارلىقلار تاسادىپى كۆرۈلۈپ قالدى، ئاياللاردا ھەيز زىياده كۆپ كېلىش، جىنسى يۈل قاناش كۆرۈلىدۇ.

『دىققەت قىلىدىغان ئىشلار』 ① مەئى قىلىنىدىغان ئەھەللىار: ھامىلىدارلار، بالا ئىمىتۋاچان ئاياللار ۋە بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈزۈرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: بالىلار، مېڭە قان تومۇر كېسەلىكى ۋە تاجىسىمان ئارتېرىيلىك يۈرەك كېسىلى بارلارغا ئېوتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

『ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى』 ستوتىك ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلېتى: تابلېت/ $200\mu\text{g}$ ، قاپ/28 تابلېت، قاپ/30 تابلېت، قاپ/120 تابلېت.

تېپرېنون

(替普瑞酮，Teprenone)

【باشقا نامى】 سېلېپېكس (施维舒, Selbex)

【ئاساسىي تەركىبى】 تېپرېنون.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ئاشقازان شىللق پەردىسىدىكى گلۈكولپىپد ئارقىلىق ماددىسىنىڭ بىئۇسنتىزلىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يۇقىرى مولېكۈلىلىق گلىكۆپروتېئن (糖蛋白) ۋە فوسفولپىپد (磷脂) نىڭ قويۇقلۇقىنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق ئاشقازان شىللق پەردىسىنىڭ قوغدىنىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىدۇ. ئاشقازان شىللق پەردىسىدىكى₂ PGE₂ نىڭ بىئۇسنتىزلىنىش ئىقتىدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، ئاشقازان شىللق پەردىسى زەخىمىلىنىشنىڭ ئىسلىگە كېلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئاشقازان شىللق پەردىسىدىكى قان ئېقىمىنى ياخشلايدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەلىكلىك】 ئاشقازان يارسى، ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئاشقازان ياللۇغى، سوزۇلما خاراكتېرىلىك ئاشقازان ياللۇغىنىڭ ئۆتكۈر ئېغىرىلىشىش مەزگىلىدىكى ئاشقازان شىللق پەردىسىنىڭ كېسەلىك ئۆزگەرىشىنى ياخشلايدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كاپسۇلى: ھەر قېتىمدا بىر دان (50mg)， كۈنگە ئۈچ قېتىم تاماڭتىن 30min كېيىن ئىچىلىدۇ. 【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرىش، قەۋزىيەت، قورساق ئاغرىش، فورساق كۆپۈش، ئۇساش، ترانسئامىنازا يۇقىرىلاش قاتارلىclar كۆرۈلىدۇ، ئەسۋە، خولېستېرىن (膽固醇) يۇقىرىلاش ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ.

【دەقىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 H₂ - ئاكسبېتۇرنى تو سقۇچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە داۋالاش ئۇنۇمى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ؛ ھامىلىدارلار، بالىلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمسى ۋە ئۇلچىمى】 سېلېپېكس يابۇنىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دان/50mg، قاپ/100 دان.

پىرېنژېپىن (哌仑西平, Pirenzepine)

【باشقا نامى】 گاستروزېپىن (Gastrozepine) (善全平)
【ئاساسىي تەركىبى】 پىرېنژېپىن دېھىدروخلوريد (二盐酸哌仑西平)
【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىك】 M - ئاكسېپتور بىلەن تاللاش خاراكتېرىلىك قارشلاشقۇچى دورا بولۇپ، ئاشقازان دىۋارى ھۇجەيرسىدىكى M - ئاكسېپتور بىلەن يۇقىرى دەرىجىدە بىرىكىش كۈچىگە ئىگە، ئاشقازان كىسلاتسىنىڭ ئاچرىلىشىنى تىزگىنلەيدۇ، ئەمما شۆلگەي ئاچرىلىش، ئاشقازان - ئۇچىي سلىق مۇسکۇلى، يۈرەك قان تومۇرى، كۆز، سۈيدۈك ئاچرىنىش سىستېمىسى سلىق مۇسکۇلى ۋە مېڭدىكى خولىنغا قارشى تەسىرى نسبەتن ئاچىزراق بولىدۇ. ئىچكەندە سۈمۈرۈلۈشى ناچار، شۇنداقلا يېمەكلىكىنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ، بىسۇلوكىيلىك پايدىلىنىش دەرىجىسى 25%， 3h Tmax، مۇسکۇلغا ئوکۇل قىلىنسا ياخشى سۈمۈرۈلىدۇ. بەدهنە كەڭ تارقىلىدۇ، مېڭ قان توسوۇقىدىن ئۆتەلمەيدۇ، قان پلازا مەقسىلى بىلەن بىرىكىش نىسبىتى تەخمىنەن 10%. مېتابوليزملەنىشى ئاستا، $t_{1/2}$ 12h ~ 10، ئاساسلىقى گەندە ئارقىلىقى چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىكەر】 ئاشقازان، 12 بارماق ئۇچىي يارىسى، غىنديلىنىشتن بولغان يارا، ئۆتكۈز خاراكتېرىلىك ئاشقازان شىللەق پەردىسى قاناش ۋە گاستربىن ئۆسمىسى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 هەر قېتىمدا 50mg، كۇنىڭ ئىككى قېتىم، ئەتىگەنلىك ۋە كەچلىك تاماڭقىن ئىلگىرى ئىچىلىدۇ، داۋالاش مۇددىتى 8 ~ 4 ھەپتە.

【ناچار تەسىرى】 ئېغىز قۇرۇش، كۆرۈش خېرەلىشىش، قەۋزىيەت، ئىچ سۈرۈش، باش ئاغرىش، ئېلىش قاتارلىقلار دائىم كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئېتاتنول (乙醇) ۋە كوفېئىن (咖啡因) بۇ دورىنىڭ تەسىرىنى تۆۋەنلىتىدۇ، H₂-ئاكسېپتور بىلەن قارشلاشقۇچى دورىلار بۇ دورىنىڭ تەسىرىنى:

كۈچەيتىدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: ھامىلىدار ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ③ باشقىلار: گلاۋى كوما بارلار، مەزى بېزى يوغىنىخانلار ۋە جىڭىر، بۆرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولىمخانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 گاستروزېپس گېرمانىيە ئىشلەنگەن. تابلىتى: تابلىت/25mg، قاپ/20 تابلىت، قاپ/30 تابلىت.

ھيدروتالتىست

(铝碳酸镁, Hydrotalcite)

【باشقا نامى】 تالتىسىد (达喜, Talcid) ياكى 胃达喜 . (达喜, Talcid) ئاساسىي تەركىبى

ئىشقارلىق ھيدروتالتىست.

【فارکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ كىسلاتاغا قارشى دورا بولۇپ، ئاشقازان كىسلاتاسىنى نېيترالالاش تەسىرىگە ئىگە. داۋالاش ئۇنۇمى H₂ - ئاكسېپتۇرنى تو سقۇچى دورىلار بىلەن ئوششاش، 12 بارماق ئۆچەي شارچە قىسى يارسى بارلارغا دورا ئىشلىتىلگەندىن كېيىن كېسەللىك ئالامىتى تېزلىكتە يوقلىنىدۇ، بۇ دورا ئاساسىي جەھەتنىن سۈمۈرلەمدىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاشقازان يارسى، ئاشقازان ياللۇغى، ئاشقازان كىسلاتاسى زىيادە كۆپىش قاتارلىقلار.

【ئىشلىتىش مۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 1g ~ 0.5 دىن كۈنىگە ئۈچ قېتىم، ئىككى ۋاخلىق تاماق ئارلىقىدا ۋە ئۇخلاشتىن ئىلگىرى ئىچىلىنىدۇ. ئاشقازان يارسى بارلارغا سەككىز ھەپتە بىر داۋالاش مۇددىتى قىلىنىدۇ، 12 بارماق ئۆچەي شارچە قىسى يارىسخا گىربېتار بولغان بىمارلارغا ئالىتىنەت بىر داۋالاش مۇددىتى قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 قەۋزىيەت، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئۆچەي تو سولۇش كۆرۈلىنىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 سوزۇلما بۆرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولىمخانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدىدۇ؛ ئۇزۇن مەزگىل ئىشلەتكەندە قاندىكى ئالىيۇمىن مىقدارىنى قەرەللىك تەكشۈرۈش كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 تالتىسىد گېرمانىيە ئىشلەنگەن.

تابلېتى: تابلېت/500mg، قاپ/20 تابلېت.

2 § . ئاشقازاننى كۈچەيتىپ، ھەزىمنى ياخشىلىغۇچى دورىلار

لاكتازا

(乳糖酶, Lactase)

· (باشقا نامى) لاكتائىد ئۇلترا (Lactaid Ultra)

【ئاساسىي تەركىبى】 لاكتازا.

【فارماكولوگىيلىك ئالاهىدىلىكى】 يىمەكلىك (بولۇپمىز سوت ياسالىلىرى) تەركىبىدىكى لاكتوزا (乳糖)نى پارچىلайдۇ، بىر مولېكۇلا لاكتوزا لاكتازانىڭ تەسىرى بىلەن پارچىلىنىپ بىر مولېكۇلا گالاكتكوزا (半乳糖) ۋە بىر مولېكۇلا گلۈكۈزىغا ئايلىنىش ئارقىلىق ئادەم بەدىنىگە سۈمۈرۈلدۈ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 لاكتازا يېتىشمەسىك سەۋەبىدىن سوت ياسالىلىرىنى ئىستېمال قىلغاندىن كېپىن پەيدا بولىدىغان ئاشقازان، ئۇچىيلر كۆپۈش، ئۇچىي سىپازمىلىنىش ۋە ئىچ سۈرۈش قاتارلىق يېقىمىزلىنىش ئالامەتلەرىگە ئىشلىتىلدۈ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىم سوت ياسالىلىرىنى ئىستېمال قىلىشتىن ئىلگىرى بىر تابلېت ئىچىلدۇ، ئىگەر كېسەللەك ئالامەتلەرى ئېغىر بولسا، يەنە بىر تابلېت قوشۇپ ئىچىشكە بولىدۇ، ھەر قېتىمدا ئىككى تابلېتتن ئاشۇرۇۋېتىشكە بولمايدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 كۈنگە كۆپ قېتىم ئىچىشكە بولىدۇ، يەنە ھەر قېتىم سوت ياسالىلىرىنى ئىستېمال قىلىشتىن ئىلگىرى بىر تابلېت ئىچىلدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 لاكتائىد ئۇلترا ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. پەردەلىك تابلېتى: تابلېت/U9000، قاپ/12 تابلېت، قاپ/32 تابلېت.

ئۇتىلۇنستۇم برومید

(奥替溴铵, Otilonium Bromide)

【باشقى نامى】 سپاسومېن (斯巴敏, Spasmomen).

【ئاساسىي تەركىبى】 ئۇتىلۇنستۇم برومید.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ئۆچىي يولى سلىق مۇسکۇلىخا ئالاھىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ، مېخانىزمى كالىتسى ئىئۇنى بىلەن قارشىلاشقاچى دورىلارغا مۇخشىش كېتىدۇ. هەزمىم يولى سلىق مۇسکۇلىخا نىسبەتن كۈچلۈك سپازما بوشىتىش رولىنى جارى قىلدۇرالايدۇ. ئىچكىندە ئاز سۈمۈرلۈدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەككەر】 ھەزمىم يولىنىڭ ييراق ئۆچىدىكى ئۆچىينىڭ ئوڭاي غىدىقلەنىشىغا ياكى سپازما خاراكتېرىلىك ئاغزىشىغا ئىشتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 400mg، كۈنگە 3 ~ 2 قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ھازىرغىچە ناچار تەسىرىگە مۇناسىۋەتلىك مەلۇمات يوق.

【دېققەت قىلدىغان ئىشلار】 بۇ دورىخا زىيادە سەزگۈرلۈكى مەلۇم بولغان بىمارلارغا ئىشلىتىش چەكلەنىدۇ.

【ياسالىمسى ۋە ئۆلچەمى】 سپاسومېن ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن: شېكدر ياللىغان تابلىقى: تابلىق/400mg، قاپ/30 تابلىق.

داڭپىس

(达奇, Dages)

【ئاساسىي تەركىبى】 پېپسىن (胃蛋白酶), پاپائىن (木瓜蛋白酶), ئامىلازا (淀粉酶), ئۇرسودپوسكىغۇلىك كىسلاتا (熊去氧胆酸), سېللىولازا (熊去氧胆酸), پانكرېتاتن (胰酶), سېتېپىسىن (胰脂酶), سېتېپىسىن (胰脂酶).

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا قەتىلەر, ياغ, ئاقسىل, سېللىولوزالارنىڭ ھەزمىم قىلىنىشىغا ياردەم بېرىپ, ئۆچىدىكى يەلىنىڭ چىقىرىلىشى ۋە ئوت سۈيۈقلىقىنىڭ ئاجرلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش

ئىقتىدارىغا ئىگە، شۇنداقلا ئۇرسودپسو كىسغولىك كىسلاتاتسىنىڭ خولبىتپرىننىڭ سۈمۈرلۈشىنى تىزگىنلەش، ئۆت سۈيۈقلۈقى ھەيدەش ۋە ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ ئاجرتىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش تەسىرىگە ئىگە. بۇ دورا ئاشقازان، 12 بارماق ئۈچەي ۋە كىچىك ئۈچەي قىسىمدا ئېرىپ، ئېنىز منىڭ ئاكتىپچانلىقى ھەرقايىسىغا مۇۋاپق كېلىدىغان pH قىممىتى شارائىتدا ئەڭ يۇقىرى ئۇنۇمىنى جارى قىلدۇرىدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسىللەكلىدەر】 ئاشقازان - ئۈچەي يولى ۋە ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ ھەزم قىلىشى تولۇق بولماسلق، ئۆتكۈر، سوزۇلما خاراكتېرىلىك جىڭىر كېسىللەكلىرى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئۆتتىڭ ئاجرىرىلىشى يېتىشمەسىلىك، ئۆت يولى كېسىللەكلىرى سەۋىپىدىن ئۆت خالتىسى ئېلىۋېتىلگەنلەردىكى ھەزم قىلىشى ناچارلىشىش، كېسىللەكتىن كېيىن ئەسلىگە كېلىش دەۋرىدىكى زىيادە ئۆزۈلىنىش ۋە مايلق يېمەكلىكلىدەر كەلتۈرۈپ چىقارغان ھەزم قىلىش ناچارلىشىش، ئىشتىها تۇتۇلۇش، تاماقنى زىيادە كۆپ يېيىش، قورساق ئېسىلىش، قورساقنىڭ يۇقىرى قىسىمى كۆپۈش، گەندە مايلق كېلىش قاتارلىق ئالامەتلەرگە قارتىدا داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 2 ~ 1 دانە، كۈنگە ئۈچ قېتىم تاماقتنى كېيىن ئېچىلىدۇ.
【ناچار تەسىرى】 قۇسۇش، ئىچى سۈيۈق كېلىش ئالامىتىنىڭ يۇز بېرىش نسبىتى % 2 دن ئېشىپ كەتمىدەدۇ.

【دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 مەنتى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورا تەركىبىگە زىيادە سەزگۈرلۈك تارىخى بارلار، ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئېغىر جىڭىر ياللۇغى بولۇپ، جىڭىردىكى ئۆت نەچىسى توسۇلغانلار، ئۆت يولى تولۇق توسۇلغانلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 داگپىس كورىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانە/193mg، قاپ/20 دانە.

پانكرېئاتين (胰酶，Pancreatin)

【باشقانامى】 كرپئون (得每通，Creon)，لىكربئازا

· (消得良，Lincrease)

【ئاساسىي تەركىبى】 پانكرېئاتين.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ، پانكرېئاتيننىڭ ئورنۇغا ئىشلىتىلىدигان دورا بولۇپ، پانكرېئاتيننىڭ ئاجرلىشى يېتىرلىك بولماسىلىققا ئىشلىتىلىدۇ، ياغ، قەنت ۋە ئاقىسلارانى ھيدرولىزلاش تىسىرىگە ئىگ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ ئاجرىتىشى يېتىرلىك بولماسىلىقنى داۋالاشقا، پانكرېئاتيننىڭ ئورنۇغا ئىشلىتىلىدۇ، شۇنداقلا يەن ئاشقازان ئاستى بېزى ئاغرش، ياشانغانلاردىكى ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ ئاجرىتىشى يېتىرلىك بولماسىلىقلارغىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 دەسلەپكى مىقدارى ھەر قېتسىدا 300mg ~ 150 بولۇپ، تاماق بىلەن بىرگە ئىچىلىدۇ. ئاندىن كېسەللەك ئەھۋالغا قاراپ مىقدارى تەڭشىلىدۇ، ئۇنۇمۇك مىقدارى ئادەتتە كۈنىگ 2250mg ~ 750 بولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئىچ سۈرۈش، قەۋزىيەت بولۇش، ئاشقازان يېقىمىزلىنىش، كۆڭۈل ئېلىشىش ۋە ئىسۋە قاتارلىقلار ناگاندا كۆرۈلىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنىق قىلىنىدىغان ئەھۇلار: پانكرېئاتيننىڭ ئورنۇغا دەسىتىپ داۋالاشنى ئۆتكۈر خاراكتېرلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغىنىڭ دەسلەپكى باسقۇچىغا ئىشلىتش چەكلىنىدۇ، چوشتقا ئاقىسىلى ياسالىلىرىغا زىياده سەزگۈرلۈكى مەلۇم بولغانلارغا ئىشلىتش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: ھامىلىدارلىق مەزگىلى ۋە بالا ئېمىتىش مەزگىلىدىكى ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 كربئون گېرمانىيە ئىشلەنگەن. ئۇچىمیدە ئېرىگۈچى دانچە كاپسۇلى: دانه/150mg، قاپ/20 دانه، قاپ/50 دانه.

لىكىرپىزا فارانسييىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/370mg، قاپ/12 دانه، قاپ/24 دانه، قاپ/60 دانه.

3 . قۇسۇشنى توختاتقۇچى دورىلار

گرانىسيترون (格拉司琼，Granisetron)

· 格雷西隆，格尼西酮，康泉，(凯特瑞 Kytril) 【باشقا نامى】

· 格兰西龙

【ئاساسىي تەركىبى】 گرانىسيترون ھيدروخلوريد.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ، قۇسۇشنى توختىش رولغا ئىگە ئۇنۇمى كۈچلۈك ۋە يۇقىرى تاللاشچانلىققا ئىگە 5-HT₃-ئاكسبېپتورنى توسىقۇچى دورا. ئاساسلىقى جىڭىرددە مېتابوليزملىنىپ، گەندە ۋە سۈيىدۈك ئارقىلىق بىدەن سرتىغا چىقىرىلىدۇ، قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نىسبىتى تەخمىنەن 65% «مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەككەر» خىمىلىك داۋالاش كەلتۈرۈپ چىقارغان كۆخۈل ئېلىشىش ۋە قۇسۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلارنى ھۈجمىرە زەھرى بىلەن داۋالاشتا تابلىقى ھەر قېتىمدا 1mg 1 دىن كۈنگە ئىككى قېتىم ئىچىلىدۇ. بىرىنچى قېتىملق مىقدارى ھۈجمىرە زەھرى بىلەن داۋالاشتن 1h ئىلگىرى ئىچىلىدۇ؛ ئوكۇل سۈيۈقۇلىقى چوڭلارغا 3mg ۋېناغا تېمىتىلىدۇ، 24h ئىچىدە ئەڭ كۆپ بولغاندا ئۆچ قېتىم، ھەر قېتىمدا 3mg ئىشلىتىلىدۇ. ئەڭ يۇقىرى مىقدارى كۈنگە 9mg 9 دىن ئاشۇرۇلمايدۇ، ھەر قېتىملق داۋالاش مۇددىتىگە ئۇدا بېش كۈن ئىشلىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرىش، قەۋىزىيەت بولۇش، ئۇيقبۇرساڭ، ئىچى سۈرۈش، ترانسئامىنازا ئۆرلەش ئەڭ كۆپ كۆرۈلىدۇ، بىزىدە قان بېسىمى ئۆتكۈنچى خاراكتېرىلىك ئۆزگىرىدى، دورا توختىلغاندىن كېيىن ئەسلىگە كېلىدۇ.

【دىقىقتە قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنىقىلىنىدىغان ئەھۇلار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلەنىدۇ. ② باشقىلار: هامىلىدارلار، بالىلار، سۇس ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئۆچەي توسوۇلۇشلاردا

ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى؛ بالا ئېميتىش مىزگىلىدىكى ئاياللار بۇ دورىنى ئىشلەتكەندە بالا ئېميتىمىسىلىكى لازىم؛ باشقا دورىلار بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچەمى】 كىترىپل ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىقى: تابلىت/1mg، قاپ/10 تابلىت؛ ئوكۇل سۇيۇقلۇقى: قاپ/5 ئامپۇل، 3mg/2ml.

ترىپۇپىسبېترون (托烷司琼, Triopisetron)

【باشقا نامى】 ناۋوبان (欧必停, Navoban) . 托品西隆，
【ئاساسىي تەركىسى】 ترىپۇپىسبېترون هىدروخلورىد.
【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ ئەتراب نېۋرونلىرى ۋە مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىدىكى $HT-5$ -ئاكسېپتۈرنى تاللاپ قارشىلاشقاچى دورا. ئىچكەندە تولۇق سۈمۈرۈلدى، T_{max} 3h. بىئولوگىيلىك پايدىلىنىش دەرجىسى مىقدارىنىڭ ئارتىشىغا ئېگىشىپ يۇقىرى كۆتۈرۈلدى. ئىچكەندە $t_{1/2} = 42h$. ۋېناغا ئوكۇل قىلغاندا $30h$ $t_{1/2}$ بولىدۇ، مېتابولىزم ھاسلاتى سۈيدۈك ياكى ئۆت ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 خىمېلىك داۋالاش كەلتۈرۈپ چىقارغان كۆكۈل ئېلىشىش ۋە قۇسۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاشقا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار كۈنگە 5mg ئىچىدۇ، داۋالاش مۇددىتى ئالىتە كۈن بولىدۇ. خىمېلىك داۋالاشنىڭ ئىلىگىرى ئالدى بىلەن ۋېناغا تېمىتىپ، 6 ~ 2 - كۈنى ئېچىشكە بولىدۇ، ئەتىگەنلىك تاماقتىن ئىلىگىرى ئىچىلىدۇ. ئىككى ياشتنىن چوڭ بالىلارغا هەر kg بىدهن ئېغىرلىقىغا $200\mu g$ ، ئەڭ يۇقىرى بولغاندا كۈنگە 5mg بېرىلىدۇ، داۋالاش مۇددىتى ئالىتە كۈن، ئىشلىتىش ئۇسۇلى چوڭلار بىلەن ئوخشاش.

【ناچار تەسىرى】 ئۆتكۈنچى باش ئاگرىش، قۇزىيەت، باش قېيىش، چارچاش ۋە ئاشقازان - ئۇچەي ئىقتىدارى قالايمىقانلىشىش دائىم

كۆرۈلدۈ.

【دېقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: رىفامپىن (利福平) ياكى باشقا جىگەر دورا فېرمېنتىنى يېتە كىلگۈچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكىنده، بۇ دورىنىڭ قان پلازمىسىدىكى قويۇقلۇقى تۆۋەتلەيدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر ۋە ھامىلىدار لارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: بالا ئېميتىش مەزگىلىدىكى ئاياللارغا دورا ئىشلەتكىنده بالا ئېميتىمىسىلىكى كېرەك؛ يۇقرى قان بىسىمى تىزگىنلەنىگەن بىمارلار دورا ئىشلەتكىندىن كېيىن قان بىسىمى يۇقرىلايدۇ؛ كاپسۇلى تاماق بىلەن بىرگە ئىچىلسە بۇ دورىنىڭ سۈمۈرلۈشى سەل كېچىكىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ناۋوبان شۇپىتسارىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه/5mg، قاپ/5 دانە؛ ئوكۇل سۈيۈقلۈقى، ھەر ئامپۇلى، قاپ/1 ئامپۇل، قاپ/5mg/5ml

ئۇندانسېترون (昂丹司琼，Ondansetron)

【باشقا نامى】 زوفران (枢复宁，Zofran)
【ئاساسىي تەركىبى】 ئۇندانسېترون ھىدروخلورىد.
【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ بىر تۈرلۈك يۇقرى ئۇنۇملىك، يۇقرى ئاللاشچانلىققا ئىگە_{5-HT}-5-ئاكسېپتۆر بىلەن قارشىلاشقاچى دورا. ئىچكەندىن كېيىن 1.5h Tmax، بىئولوگىيلىك پايدىلىنىش دەرىجىسى تەخمىنەن 60%， قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نىسبىتى 70% ~ 60 بولىدۇ، ئاساسەن جىگەردە مېتابوليزملەنىپ، گەندە ۋە سۈيدۈك ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.
【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەلىكلىكەر】 خىمېلىك داۋالاش ۋە رادئۋاكتىپلىق داۋالاش كەلتۈرۈپ چىقارغان كۆكۈل ئېلىشىش، قۇسۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.
【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلارغا خىمېلىك داۋالاشتن 15min ئىلگىرى 8mg ئاستا - ئاستا ۋېناغا ئوكۇل قىلىنىدۇ، ياكى ۋېناغا تېمىتىلىدۇ، ئاندىن 1mg/h ۋېناغا جەمئىي 24h تېمىتىلىدۇ،

ئاندىن كېيىن ئىچىشىكە ئۆزگەرتىلىپ، ھەر قېتىمدا 8mg، كۈنگە ئىككى قېتىم، ئۇدا بەش كۈن ئىچىلىدۇ. بالىلارغا خمىيلىك داۋالاشتىن ئىلگىرى 5mg/m² ئاستا - ئاستا ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ، 12h، 12 تىن كېيىن يەڭى 4mg ئىچىلىدۇ، خمىيلىك داۋالاشتىن كېيىن ھەر قېتىمدا 4mg دىن كۈنگە ئىككى قېتىم، ئۇدا بەش كۈن ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرىش، باش قىسى، قورساقنىڭ يۇقىرى قىسىمى قىزىخاندەك بولۇش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، ترانسستائامىنازا يۇقىرىلاش تاسادىپسى كۆرۈلۈپ قالىدۇ.

【دېقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورا ياسالىمىسى ھەر قانداق بىر تەركىبىگە زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ② باشقىلار: ھامىلىدار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئىاللارغا ئىشلىتىش تەكتىلەنمەيدۇ؛ ۋېناغا ئوکۇل قىلىش سۈرئىتى بەك تېز بولۇپ كەتمەسىلىكى كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 زوفران ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپ/4mg، قاپ/10 تابلىپ، قاپ/100 تابلىپ، تابلىپ/8mg، قاپ/15 تابلىپ، قاپ/30 تابلىپ، قاپ/100 تابلىپ؛ ئوکۇل سۈيۈقلۈقى، ئامپۇل/4mg، ئامپۇل/8mg، قاپ/5 ئامپۇل.

ئاز اسپترون (阿扎司琼，Azasetron)

【باشقا نامى】 سېروتون (苏罗同, Serotone).

【ئاساسىي تەركىبى】 ئازاسپترون ھىدرۆخلورид.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ئوندانسپترون بىلەن ئوخشاش.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىر】 ئۆسمىگە قارشى دورىلار كەلتۈرۈپ چىقارغان كەڭۈل ئېلىشىش ۋە قۇسۇشقا ئىشلىتىلىدۇ. 【ئىشلىتىش قۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېناغا ئوکۇل قىلىنىدۇ. چۈڭلارغا ئىشلىتىش مىقدارى ھەر قېتىمدا 10mg بولۇپ، كۈنگە بىر قېتىم ئىشلىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرىش، تەشۋىشلىنىش، كالپۇك

قۇرغاقلىشىش، چىرايى تاثرىش، يۈرەك سېلىش، تىترەش، چارچاش ۋە ئىسۋە قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئېپتىپوسىد (鬼臼乙叉昔) ئوکۇل سۈيۈقلۈقى ياكى ناتىرى فلۇموكىسىپ (氟氧头孢钠) ٹوکۇل سۈيۈقلۈقى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئىشلەتكەندە، بۇ دورىنىڭ تەركىبى تۆۋەنلىشى مۇمكىن. ② باشقلار: بىزەك فۇنكسىيىسى تولۇق بولمىغانلار ۋە ياشاغانلار، ھامىلدارلار ۋە بالىلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ؛ بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار دورا ئىشلەتكەندە بالا ئېمىتىشنى توختىتىش كېرەك. 【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 سېروتون يابونىيىدە ئىشلەتكەن. ئوکۇل سۈيۈقلۈقى: هەر ئامپۇلى 10mg/2ml، قاپ/5 ئامپۇل.

4 . ئىچ سۈرۈشنى توختاتقۇچى دورىلار

دىئوكتاخىپدرال سىمېكتىت (双八面体蒙脱石， Dioctahedral Smectite)

【باشقى نامى】 سىمېكتا (思密达, Smectite).

【ئاساسىي تەركىبى】 دىئوكتاخىپدرال سىمېكتىت.

【فارماكولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 ھەزمىم يولدىكى ۋىرۇس، باكتىرىنىيە ۋە ئۇلاردىن ھاسىل بولغان توکسەن (毒素)غا قارىتا تۇرماقلاشتۇرۇش، تورمۇزلاش تەسىرىگە ئىگە؛ ھەزمىم يولى شىلىمىشقا پەردىسىنى كۈچلۈك قاپلاش ئىقتىدارغا ئىگە ھەممە شىلىق سۈيۈقلۈقىنى كەندت ئاقسىلى بىلەن ئۆزئارا بىرىكىش ئارقىلىق، شىلىق پەرددە توسوۇقىنىڭ ھۈجۈمچى ئامىللاردىن مۇداپىشىلىنىش ئىقتىدارنى ئەسلىكە كەلتۈرىدۇ ھەممە يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. قانغا سۈمۈرۈلۈپ كىرمەيدۇ، پەقدەت ھەزمىم يولى شىلىق پەردىسى سىرتقى يۈزىگلا تارقىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىكى】 قىزىلئۆگەچ ياللۇغى، ئاشقازان ياللۇغى، بوغماق ئۇچەي ياللۇغى، فۇنكسىيىلىك بوغماق ئۇچەي كېسىلى ئالامىتىگە قارىتا داۋالاش، چوڭلار ۋە بالىلاردىكى ئۆتكۈر، سوزۇلما خاراكتېرىلىك ئىچ سۈرۈش.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 بىر خالتا دورىنى 50ml ئىلمان سۇغا سېلىپ، ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن ئىچىلىدۇ. چوڭلار يەنى بىر هەر قېتىمدا بىر خالتىدىن كۈنىگە ئۆچ قېتىم ئىچىدى. بالىلارغا يەنى بىر ياشتىن تۆۋەنلەرگە كۈنىگە بىر خالتىنى ئۆچ قېتىمغا بۆلۈپ ئىچۈرۈلىدۇ. 2 ~ 1 ياشلىقلارغا كۈنىگە 2 ~ 1 خالتا، ئۆچ قېتىمغا بۆلۈپ ئىچۈرۈلىدۇ. تۇرگۇزۇپ ھەممەل قىلىش ئۇسۇلى: ھەر قېتىمدا 3 ~ 1 خالتىنى ~ 50 ئىلمان سۇغا سېلىپ، كۈنىگە 3 ~ 1 قېتىم ھەممەل قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 قەۋازىيەت تاسادىپىي كۆرۈلۈپ قالىندۇ.
【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك ئىچ سۈرۈشنى داۋالخاندا، سۈسلىنىشنى تۈزۈتىشكە دىققەت قىلىش، ئەگەر باشقا دورىلارنى ئىچىش توغرا كەلسە، بىلگىلىك ئارىلىق ئۆتكۈزۈپ ئىشلىتىش كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 سېبكتا فرانسييىدە ئىشلەنگەن.
 پاراشوكى: خالتا/3g، قاب/10 خالتا، قاب/30 خالتا.

5 . سۈرگۈ دورىلىرى

لاكتۇلوزا (乳果糖, Lactulose)

【باشقا نامى】 دۇفالاك (杜秘克, Duphalac).

【ئاساسىي تەركىبى】 لاكتۇلوزا.

【فارماکولوگىيىلەك ئالاھىدىلىكى】 بۇ لاكتوزانىڭ سىنتېزلىنگەن تۇغۇندىسى، ئۇچەي بوشلۇقىنىڭ ئىچكى ئۇسموس بىسىمنى يۈقرى كۆتۈرۈش، ئۇچىنىڭ لۆمۈلدەش ھەرىكتىنى ئىلگىرى سۈرۈش، قاندىكى ئامونىياكىنى تۆۋەنلىتىش، قەنتىنی پارچىلىغۇچى باكتېرىيىنىڭ كۆپىيىشنى ئىلگىرى سۈرۈش، ئامونىياك ۋە باشقا ئېندوتوكسین (ئىچكى زەھەر) نىڭ ھاسىل بولۇشىنى كېمەيتىش قاتارلىق رولى بار.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسىللەكلىكەر】 قەۋازىيەت، جىڭىر

مەنبىلىك مېڭە كېسىلى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 قۇزىيەت: داۋالاش مىقدارى بىمارلارنىڭ ئەھۋالغا قاراپ تەشلىدۇ. چوڭلار دەسلەپتە (داۋالاشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىكى ئۇج كۈن) كۈننە 45ml ~ 15 ئىچىدۇ، قامداش مىقدارى كۈننە 25ml ~ 10 بولىدۇ. باللارغا داۋالاشنىڭ ئالدىنلىقى ئۇج كۈننە كۈننە 10ml ~ 5 ئىچىرۈلدۈ؛ كۆدەك باللارغا كۈننە 5ml، كۈننە بىر قېتىم ئەتكىنلىك تاماقتىن كېيىن ئىچىرۈلدۈ ياكى كۈنلۈك مىقدارىنى ئىككى قېتىمغا بولۇپ، ئەتكىن ۋە كەچتە بىر قېتىمدىن ئىچىرۈلدۈ. جىڭىر مەنبىلىك مېڭە كېسىلى: جىڭىر مەنبىلىك هوشىزلىنىشنى داۋالاشتا، دەسلەپكى باسقۇچىدا ۋە جىڭىر مەنبىلىك هوشىزلىنىشنى داۋالاشدا، دەسلەپكى مىقدارى ھەر قېتىمدا 50ml ~ 30 دن كۈننە ئۇج قېتىم بېرىلىدۇ، قامداش مىقدارى كېسىلىك ئەھۋالغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئۇچەي- ئاشقازان كۆپۈش، مىقدارى زىيادە كۆپ بولۇپ كەتسە ئىچ سۈرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەئىي قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: گالاكتوزىلىق قان كېسىلى، تۆۋەن گالاكتوزىلىق ئۆز وۇلۇقلارنى ئىستېمال قىلىشى كېرىك بولغانلار، لاكتوزىغا چىدامىسىز لار، ئۇچىمىي توسۇلغانلار ھەمە بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرۈرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقilar: دائىملىق مىقدارىنى دىئابىت كېسىلىگە گىرپىتار بولغۇچىلارغا ئىشلىتىشكە بولىدۇ؛ يۇقىرى دوزىلىقى دىئابىت كېسىلىگە گىرپىتار بولغۇچىلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 دۇفالاڭ گوللاندىيىدە ئىشلىنىگەن. ئىچلىدىغان سۈيۈقلۈقى: بونۇلما/300ml، خالتا/15ml، قاپ/6 خالتا، پاراشوكى: خالتا/10g، قۇتا/150g.

6 . سپازمنى بوشاتقۇچى دورىلار

ئالۋېرىن سترات (枸橼酸阿尔维林，Alverine Citrate)

【باشقا نامى】 سپاسمونال (斯莫纳，Spasmonal).

【ئاساسىي تەركىبى】 ئالۋېرىن سترات.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىك】 بۇ دورا سلىق مۇسکۇلغۇ باۋاستە تىسىر قىلىپ، ئىئۇن يولى ئېلىكتر پوتېنسىتالىنىڭ سەزگۈرلۈك دەرىجىسى ۋە فوسفات كىسلاتا — ئىنۇزىتول (肌醇) نىڭ مېتابولىزىملىنىش يولى قاتارلىقلارغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. سلىق مۇسکۇلارغا بولغان تەسىرى تاللاشچانلىققا ئىنگە بولۇپ، ئاساسلىقى ئاشقازان - ئۈچەي يولى ۋە سۈيدۈك ئاچرىتىش سىستېمىسىغا تەسىر قىلىدۇ، خولىنغا قارشى دورىلارنى ئىشلىتىشكە بولمايدىغان بىمارلارغا ئىشلىتىدۇ. نورمال مىقدارنىڭ كاناي ۋە قان تومۇر سلىق مۇسکۇلغۇ بولغان تەسىرى يوق دېيەرلىك.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىك】 ئۈچەي ئۇڭاي غىدقىلىنىش بىخىندى ئالامەتلەرى، ئۈچەي ئاغرىتىپ كېلىش، بالىياقۇ سپازمىلىنىش، سۈيدۈك بولى تېشى ياكى يۇقۇملىنىش كەلتۈرۈپ چىقارغان سپازمى خاراكتېرىلىك ئاغرىش، تۆۋەنكى سۈيدۈك يولى يۇقۇملىنىش كەلتۈرۈپ چىقارغان سىيش قېتىم سانى كۆپىيىش، دوۋساق سپازمىلىنىش ۋە باشقا خىلدىكى سپازمىلىق ئاغرىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار ھەر قېتىمدا ~ 60 دن كۈنىگە ئۆچ قېتىم ئىچىدۇ؛ 12 ~ 8 ياشلىق بالىلار ھەر قېتىمدا 60mg دن كۈنىگە ئۆچ قېتىم ئىچىدۇ، 8 ياشىن تۆۋەنلەرگە مىقدارى كېدىتىلىدۇ. چاينىمايلا سۇ بىلەن يۇتولىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان، ئۈچەي يېقىمىزلىنىش، ئۇيقوسراش، باش قېيىش، باش ئاغرىش، ئېغىز قۇرۇش، تۆۋەن قان بىسىمى قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان

تىسىرى: ترسىكلىك تۇرىدىكى خامۇشلۇققا قارشى دورىلار، پروكائيناميد (普魯卡因胺) ياكى تۇغۇندىسى، H₁- ئاكسىپېتورنى توسىقۇچى دورىلار بۇ دورىنىڭ تىسىرىنى كۈچىتىدۇ؛ دېفلۇكان (氟康唑)، مىكوانازول (咪康唑)، پۇتۇن بەدەنلىك خولىن ئىقتىدارلىق دورىلار بۇ دورىنىڭ تىسىرىنى تۆۋەنلىكتىدۇ. ② مەنىق قىلىنىدىغان ئەھۇاللار: پالدەچىلىنىشلىك ئۈچىدى توسوۇلغانلار ۋە بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەرگە ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ؛ مەزى بېزى ئۆسەمىسى بىمارلىرىغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. ③ باشقىلار: ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدۇ. «ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى» سېپاسمونان ئەنگلىيىدە ئىشلەنگەن. كاپسۇلى: دانه، 60mg، قاپ/6 دانه، قاپ/20 دانه.

مېبېۋېرېن (美贝维林, Mebeverine)

«باشقا نامى» دۇسپاتالىن (杜适林, Duspatalin) .
«ئاساسىي تەركىبى» مېبېۋېرېن ھيدروخلورىد.
«فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىسى» بۇ بىر خىل سپازمنى بوشاقۇچى دورا بولۇپ، سپازملاڭىغان بوغماق ئۈچىدى سىلمق مۇسکۇلغا تاللاپ تىسىر قىلىدۇ. ئاتروپىننىڭ ناچار تىسىرىگە ئوخشىپ كېتىدىغان ئەكس تىسىرى يوق، گلاؤكوما ياكى مەزى بېزى يوغىنىشان بىمارلارغا ئىشلىتىشكە بولمادۇ.
«مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىر» بوغماق ئۈچىنىڭ سپازملىنىش مەنبىلىك فۇنكسىيىسى بۇزۇلۇش، بىرلەمچى خاراكتېرلىك ئۈچىدى ئوڭاي غىدىقلەنىش يىخىندى ئالامەتلەرىگە ئىشلىتىلدۇ. بوغماق ئۈچىدى يان خالىتسى شەككىللەنىش ياكى يان خالىتا ياللۇغى، كلون كېسىلى 12 (克隆病)، ئۆت يولى فۇنكسىيىسى توسىقۇنلۇققا ئۇچراش، ئاشقازان ۋە بارماق ئۈچىدى يارسى، ھەزمىم يولىنىڭ ئالاھىدە ياكى غەيرىي ئالاھىدە ياللۇغى قاتارلىقلاردىن ئىككىلەمچى كېلىپ چىققان ئۇچىدى ئوڭاي غىدىقلەنىش يىخىندى ئالامەتلەرىنى قوشۇمچە داۋالايدۇ.
«ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى» ھەر قېتمىدا بىر تابلىپ (135mg) كۈنىگە ئۆج قېتم ئىچىلىدۇ، تاماقتىن 20min ئىلگىرى

ئىچكەن ياخشى.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرىش، ئاشقازان، ئۈچەي يېقىمىزلىنىش كۆرۈلدى؛ ئاللىرىگىيلىك رېئاكسىيە تاسادىپىي كۆرۈلۈپ قالىدۇ؛ بۇرەكى زەھەرلەش، نەپسلىنىش سىستېمىسى ئالامەتلەرى، جىڭىر ياللۇغى، قايىتا ئىشلىنىشى توسقۇنلۇققا ئۈچرەش خاراكتېرىلىك قان ئازلىق، ئاق قان ھۆجەپرسى ۋە قان پلاستىنكلېرى كېمىش، يۈرەك مۇسکۇل ياللۇغى، ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغى ۋە ئەتراب نېرۋەسىدىكى كېسەللىك ئۆزگۈرىشى، بۇرە چاقىسىسمان يىخىندى ئالامەتلەر قاتارلىقلار ناھايىتى ئاز كۆرۈلدى.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ھامىلىدارلارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 دۇسپاتالىن گوللەندىيىدە ئىشلەنگەن.

تابلىتى: تابلىت/135mg، قاپ/20 تابلىت، قاپ/50 تابلىت.

دروتاؤپرمن

(屈他维林，Drotaverine)

【باشقى نامى】 نو - سپا (No-Spa)

【ئاساسىي تەركىبى】 دروتاؤپرمن ھىدرۆخلورىد.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 سپازما بوشانتۇچى دورا، ھەرخىل سلىق مۇسکۇللارنىڭ سپازمىلىنىشنى ياخشىلایدۇ ۋە ئالدىنى ئالىدۇ، ئىماما خولىنغا قارشى تەسىرى يوق.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 ئاشقازان - ئۈچەي، ئۆت يولى، سۈيدۈك يولى ۋە بالىياتقۇ سپازمىلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 چوڭلار ھەر قېتىمدا ~ 80mg ~ 40 دن كۈنگە ئۇچ قېتىم ئىچىدۇ؛ ئالىتە ياشتنى يۈقىرى بالىلارغا ھەر قېتىمدا 40mg ~ 3 دن كۈنگە 2 قېتىم ئىچۈرۈلدى؛ ئالىتە ياشتنى تۆۋەن بالىلارغا ھەر قېتىمدا 20mg ~ 3 دن كۈنگە 2 قېتىم ئىچۈرۈلدى. چوڭلارغا ھەر قېتىمدا 80mg ~ 40 دن كۈنگە 3 ~ 1 قېتىم تېرىه ئاستىغا ياكى مۇسکۇلغا ئۆكۈل قىلىنىدۇ؛ ۋېناغا ئاستا - ئاستا ئۆكۈل قىلغاندا، ھەر قېتىمدا 80mg

ئىشلىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرش، باش قېيىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، يۈرەك سېلىش ۋە تۆۋەن قان بېسىمى قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلىدۇ. 【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنى قىلىنىدىغان ئەھۇالار: جىڭىر، بۆرەك فۇنكسييىسى ئېغىر دەرجىدە زەخىملەنگەنلەر ۋە يۈرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولىغانلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: ھامىلىدارلار، بالا ئېمىتىۋاتقانلارغا ئېھىتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ.

【ياسالىمسى ۋە ئۆلچىمى】 نو - سپا ۋېنگرېيىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپت/40mg، قاپ/20 تابلىپ؛ ئۆكۈلى: ھەر ئامپۇلى قاپ/5 ئامپۇل، قاپ/40mg/2ml

7 . ھەزىم يولىدىكى قاناشنى توختانقۇچى دورىلار

ئوكترپئوتىد (奥曲肽，Octreotide)

【باشقا نامى】 ساندوستاتن (善得定，Sandostatin) .

【ئاساسىي تەركىبى】 ئوكترپئوتىد.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 ئورگانىزمنىڭ ئۆسۈشىنى تورمۇزلىغۇچى ماددا ئوكتوپىپتىد (八肽) نىڭ سۇنىشى سىنتېزلىتكەن تۇغۇندىسى بولۇپ، تەسىرى تېبىئى ئۆسۈشىنى تورمۇزلىغۇچى ماددىنىڭ تەسىرى بىلەن ئوخشاشىپ كېتىدۇ ھەمە تەسىرى كۈچلۈك ھەم ئۇزۇنخېچە داۋاملىشىدۇ. ئۆستۈرگۈچى ھورموننى ۋە ھېپۆفز ئالدىنىقى يايپىقىدىن ئاچىرىلىپ چىقىدىغان تىروتروپين (促甲状腺激素) نى تورمۇزلايدۇ؛ ئاشقازان - ئۇچىي يولى، ئاشقازان ئاستى بېزىنىڭ پولىپېپتىد ئاچىرىتىشىنى تورمۇزلايدۇ؛ ھەزىم يولىنىڭ سۈمۈرۈشىنى تورمۇزلاش ۋە ئۆستۈرگۈچى ھورموننى تورمۇزلاش ئارقىلىق قاندىكى شېكىر مىقدارىنى تۆۋەنلىتىدۇ؛ ئاشقازان - ئۇچىي يەرنىڭ لۆمۈلدەش ھەرىكتىنىمۇ تورمۇزلاپ، ئىچكى ئىزالارنىڭ قان ئېقىمىنى كېمەيتىدۇ ۋە قاپقا ۋېننانىڭ

『مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى』 ئاساسەن قاپقا ۋېنائىڭ يۇقىرى بېسىمى كەلتۈرۈپ چىقارغان قىزىلئۆڭگەچ ۋېنائىنىڭ ئىگىرى - بۈگىرى كېڭىيىشىدىن بولغان قاناش، غىدقىلىنىش يارسى ۋە ھەزم يولى قاناش، ئوتకۇر خاراكتېرىلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغى، ئاشقازان - ئۈچەي يولى ئاقمىسى، ھەزم قىلىش سىستېمىسى ئىچكى سىكربىتىسىيە ئۆسسىسى، مۇچە ئۈچلىرى زورىيىش كېسىلى، قالقانىسمانبەز خىزمىتى كۈچىپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

『ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى』 ۋېناغا، تېرە ئاستىغا ئوکۇل قىلىنندۇ. قاپقا ۋېنائىڭ يۇقىرى بېسىمىدىن بولغان قاناش: 0.1mg ۋېناغا ئوکۇل قىلىنندۇ، ئاندىن ھەر 2h تە 0.5mg ۋېناغا تېمىتىلىپ ئۇدا 48h ~ 24 داۋاملاشتۇرۇلىدۇ؛ ھەزم يولى قاناش، ھەر قېتىمدا 0.1mg دىن كۈنگە ئۇچ قېتىم تېرە ئاستىغا ئوکۇل قىلىنندۇ؛ ئوتكۇر خاراكتېرىلىك ئاشقازان ئاستى بېزى ياللۇغى: 0.1mg دىن ھەر 6h تە بىر قېتىم تېرە ئاستىغا ئوکۇل قىلىنندۇ، ئۇدا 7 ~ 3 كۈن ئىشلىتىلدى؛ ھەزم يولى ئاقمىسى، ئۆسمە، مۇچە ئۈچلىرى زورىيىش كېسىلى قاتارلىقلار: 0.1mg تېرە ئاستىغا ئوکۇل قىلىنندۇ، ھەر 8h تە بىر قېتىم، ئۇدا 14 ~ 10 كۈن ئىشلىتىلدى.

『ناچار تەسىرى』 تاماق بېگۈسى كەلمەسىلىك، كۆكۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، قورساق كۆپۈش، قورساق ئاغىرش، ئىچ سۈرۈش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ؛ ئوکۇل قىلىنغان ئورۇن ئاغىرش، يىڭىنە سانجىلغا نەتكەن سېزىم پىيدا بولۇش، قىزىرىپ ئىشىش كېلىپ چىقىدۇ؛ جىگەر - ئۆت فۇنكىسىسى تو سقۇنلۇققا ئۇچراش ئاز كۆرۈلىدۇ.

『دىققەت قىلىدىغان ئىشلار』 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى: ئۈچەي يولىنىڭ سىكلۇسپورىن (环孢素) نى سۈمۈرۈشىنى تۆۋەنلىتىدۇ ھەمدە سىمبىتىدىنىنىڭ سۈمۈرۈلۈشىنى ئاستىلىتىدۇ. ② مەنئى قىلىنيدىغان

ئەھالار: بۇ دورىغا زىياده سەزگۈرلەر، ھامىلىدارلار ۋە بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: بۆرەك، ئاشقازان ئاستى بېزى ئىقتىدارى تولۇق بولىغانلار، ئۆت تېشى ۋە ئاشقازان ئاستى بېزى ئارچىسى ئۆسمىسگە گىرىپتار بولغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتلىنىدۇ؛ قاندىكى شېكەر مىقدارىنى تۆۋەنلىتكۈچى دورا ئىچىۋاتقان ياكى ئىنسۇلىن ئوكۇل قىلىۋاتقان دىئابىت كېسىلى بارلارغا بۇ دورىنى ئىشلىتكەندە، قاندىكى شېكەرنىڭ قويۇقلۇقىنى ئۆلچەش، قاندىكى شېكەرنى تۆۋەنلىتكۈچى دورىنىڭ مىقدارىنى ئۆز ۋاقتىدا تەڭشىپ تۈرۈش، باللارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم.

【باسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ساندوستاتىن شۇبىيتسارىيىدە ئىشلەنگەن. ئوكۇل: ھەر ئامپۇلى 0.1mg/ml ، قاپ/5 ئامپۇل.

تېرلىپرېسسىن (特利加压素，Terlipressin)

【باشقا نامى】 گلىپرېسسىن (可利新，Glypressin) .
【ئاساسىي تەركىبى】 تېرلىپرېسسىن.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ پروھورمون (激素原) بولۇپ، بەدەندە ئېنざىم تەسىرىدىن پارچىلىنىش ئارقىلىق پېرسىن (加压素) قويۇپ بېرىدۇ، ئۆزىنىڭ پېرسىنغا ئوخشاش ئاكتىپچانلىقى بولمايدۇ. قاپقا ۋېبانىڭ بېسىمنى تۆۋەنلىتىدۇ، ئارتېرىيە قان بېسىمدا روشن ئۆزگىرىش پەيدا قىلىمايدۇ، تالا ئاقسىلىنىڭ ئېرىتىش تەسىرىنىمۇ ئاشۇرمائىدۇ. ئوكۇل قىلغاندىن كېسىن ئۇنۇمى كۆرۈلۈش ۋاقتى 5min دىن ئاز بولىدۇ، تەسىرى 5h ~ 3 داۋام قىلىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىر】 قىزىلئۆڭەج ۋېناسىنىڭ ئەگرى - بۇگرى كېڭىيىشىدىن بولغان قاناش.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ۋېنانغا ئوكۇل قىلىنىدۇ. ئۆتكۈز خاراكتېرىلىك قىزىلئۆڭەج ۋېناسى ئەگرى - بۇگرى كېڭىيىشىنى بولغان قاناش: باشلىنىش مىقدارى 2mg بولۇپ، ۋېنانغا ئاستا ئوكۇل قىلىنىدۇ (1min تىن ئاشۇرۇلدۇ)، شۇنىڭ بىلەن بىرگە قان بېسىم، يۈرەك سوقۇش قېتىمى ئۆلچىنىدۇ. قامداش مىقدارى: ھەر 4h

تە ئېنادىن $2\text{mg} \sim 1$ دورا بېرلىپ، $36\text{h} \sim 24$ داۋاملاشتۇرۇلدۇ، يەنى تاكى قاناش تىزگىنلەنگەنگە قىدەر ئىشلىتىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 قورساق ساتىجىپ ئاغوش، باش ئاغوش، چىرايى قىسقا ۋاقتىلىق تاتىرىش، ئارتبىرىدە قان بېسىمى ئۆرلەش.

【دىقىقتە قىلىدىغان ئىشلار】 ھامىلىدارلارغا ئىشلىتىلمەيدۇ، يۇقىرى قان بېسىم، يۈرەك فۇنكسىيىسى ياكى بۇرەك فۇنكسىيىسى تولۇق بولىمىغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلىدۇ. ئىشلىتىۋاچان ۋاقتىتا بىمارنىڭ قان بېسىمى، قېنىدىكى ناتىرى، كالتسىي قاتارلىقلارنى دائىم ئۆلچەپ تۈرۈش لازىم. تىبىيارلانغان دورا ئېرىتىمىسى چوقۇم 12h ئىچىدە ئىشلىتىلىپ بولۇشى كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 گلىپرسىن گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. توڭلىتىپ قۇرۇنۇلغان پاراشوكلۇق ئوکۇلۇ: ئامپۇل/ 1mg .

٨ . جىگەر ۋە ئۆتكە ئىشلىتىلىدىغان دورىلار

ئۇر سودپىئو كىسىخولىك كىسلاた (熊去氧胆酸，Ursodeoxycholic Acid)

【باشقا نامى】 ئۇزرسوفالك (优思费，Ursofalk).

【ئاساسىي تەركىبى】 ئۇر سودپىئو كىسىخولىك كىسلاتا.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ئىچكى مەنبىلىك ئۆت كىسلاتاسىنىڭ ئاچىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، قايىتا سۈمۈرۈلۈشىنى ئازايتىدۇ؛ ھىدروفوبىك ئۆت كىسلاتاسىنىڭ ھۈچەيرىنى زەھىرلەش تەسىرى بىلەن قارشىلىشىپ، جىڭىر ھۈچەيرە پەردىسىنى قوغدايدۇ؛ خولېستېرول تېشىنى ئېرىتىدۇ ھەمدە ئىممۇنتنى تەڭشەش رولىنى ئوينىدۇ.

【مۇۋاپىق كىلىدىغان كېسەللەكلەر】 خولېستېروللۇق ئۆت تېشى، بىرلەمچى ئۆت قېيىپ قېلىش مەنبىلىك جىڭىر قېتىش، بىرلەمچى قېتىش مەنبىلىك ئۆت نىچىسى ياللۇغى، ئۆت سۈيۈقلۈقى تەتتۈر ئېقىشلىق ئۆت ياللۇغى.

【ئىشلىتش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 خولېستېروللۇق ئۆت تېشى:
 كۈنگە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 10mg ئىچىلىدۇ؛ بىرلەمچى ئۆت قېيىپ
 قېلىش مەنبىلەك جىڭىر قېتىش، بىرلەمچى قېتىش مەنبىلەك ئۆت نېچىسى
 ياللۇغى؛ كۈنگە ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا 15mg ئىچىلىدۇ؛ ئۆت
 سۈيۈقلۈقى تەتۈر ئېقىش مەنبىلەك ئاشقازان ياللۇغى: ھەر قېتىمدا
 250mg ئۆخلاشتىن ئىلگىرى ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئىچ سۈرۈش، قەۋازىيەت، زىيادە سەزگۈرلۈك،
 باش ئاغرش، باش قېيىش، ئاشقازان ئاغرش، ئاشقازان ئاستى بېزى
 ياللۇغى ۋە يۈرەك ھەرىكتى زىيادە تېزلىشىش كۆرۈلدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 خولېستېرامىن رېزىن (消胆胺)，
 كولېستېپول (考来替泊) ۋە ئالىيۇمن ھيدروكسىدىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
 كىسلاتاغا قارشى دورىلار بۇ دورىنىڭ سۈمۈرۈلۈشىنى ئازايىتىدۇ؛ ئۆتكۈر
 خاراكتېرلىك ئۆت سىستېمىسى يۈقۈملەنىش، ئۆت يولى توسوۇش،
 ھامىلىدارلار ۋە بالا ئېمەتىش مەزگىلىدىكى ئاياللارغا ئىشلىش
 چەكلەندىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 ئۇرسوفالك گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن.
 كاپسۇلى: دانە 250mg، قاپ/25 دانە.

پروتوبورفىرىن دىسۇدىئۇم (原卟啉钠，Protoporphyrin Disodium)

【باشقا نامى】 پرولمون (Prolmon).
 【ئاساسىي تەركىبى】 پروتوبورفىرىن دىسۇدىئۇم.
 【فارماكولوگىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ جىڭىر فۇنكسييىسىنى
 ياخشىلىغۇچى دورا بولۇپ، ھۇجىرىنىڭ نەپەسلەنىشنى ئىلگىرى
 سۈرۈش، ئاقسىل ۋە قەنتىلەرنىڭ مېتابولزمىنى ياخشلاش،
 كومپلېمنتلىق بىرىشكە قارشى تۈرۈش قاتارلىق رولى بار.
 【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلىك】 ئۆتكۈر خاراكتېرلىك
 جىڭىر ياللۇغى، سوزۇلما خاراكتېرلىك سۆرەلمە جىڭىر ياللۇغى، سوزۇلما
 خاراكتېرلىك ھەرىكتەچان جىڭىر ياللۇغىغا ئىشلىتلىدۇ، جىڭىر قېتىش،
 ئۆت خالتا ياللۇغى، ئۆت تېشى قاتارلىقلار غىمۇ ئىشلىتلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتمىدا 20mg ~ 10g، كۈنىگە ئۇچىلىدۇ، بالىلارغا مىقدارى سەل كېمىدەيتىلىدۇ.
 【ناچار تەسىرى】 تېرىنگە پىيگىبىنت ئولتۇرۇش دائىم كۆرۈلىدۇ، دورا توختاتقانىدىن كېيىن يوقاپ كېتىدۇ. باش قېيىش، قورساقنىڭ يۇقىرى قىسى ئاغرش، ئەسۋە قاتارلىقلارمۇ كۆرۈلىدۇ.

【دىقىقت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنى قىلىنىدىغان ئەمەرىتىسى:
 جەمەتىدە ئىرسىيەت خاراكتېرىلىك پورفرين كېسىلى (卟啉症) تارىخى بارلارغا ئىشلىتىش چەكلەندىدۇ. ② باشقىلار: ياز كۇنلۇرى دورا ئىشلەتكەنە كۈن ئۇرۇ بىۋاستە چوشۇپ قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم. رىبوفلاۋىن (核黃素) قوشۇپ ئىچكەنە پىيگىبىنت ئولتۇرۇشۇنى يېنىكلەتكىلى بولىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 پرولىمون يابونىيىدە ئىشلەنگەن.
 تابلېتى: تابلېت/ 20mg .

گلۇتاٽىئۇن (谷胱甘肽, Glutathione)

【باشقى نامى】 تاد (Tad). گلۇتاٽىئۇن (泰特, Gluthion) (古拉定).
 【ئاساسىي تەركىبى】 ئوكسىدىسىزلىنىش تېلىق گلۇتاٽىئۇن.
 【فارماکولوگىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا بەدەندىكى ترkarboksil كىسلاٽا ئايلىنىشى (三羧酸循环) ۋە قىدت مېتابولىزىمغا قاتىشىپ، بەدەندىكى كۆپ خىل ئېنزمى ئاكىتپلاشتۇرۇپ، قىدت، ياغ ۋە ئاكسىلىنىڭ مېتابولىزىملەنىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە ھۈچىريلەرنىڭ مېتابولىزىملەنىش جەريانىنى كوتىرۇل قىلىدۇ. ئوكۇل قىلىنغانىدىن كېيىن ئاساسلىقى جىڭىر، بۇرەك ۋە مۇسكۇللارغا تارقىلىدۇ، مېڭىگە تارقىلىشى ئاز بولىدۇ. بەدەندە مېتابولىزىملەنغانىدىن كېيىن سۇلغاتات كىسلاٽا ۋە سۈيدۈك كىسلاٽاسىغا ئايلىنىپ چىقىرىلىدۇ، $t_{1/2}$ 24h.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 جىڭىر كېسىلى، ئېغىر مېتابالار، ئاكرىلونىتىرىل (丙烯腈)، فتۇرلۇق ماددىلار، كاربون چالا ئوكسىدى ۋە ئورگانىك ئېرىتكۈچىلەردىن زەھەرلىنىش؛ ئۆسمىنگە قارشى دورىلار، تۇبىر كۈلۈزغا قارشى دورىلار، مەركىزىي نېرۇشىغا تەنسىر قىلغۇچى

دوربلار، پاراتسیتامول (对乙酰氨基酚) قاتارلەق دوربلاردىن زەھەرلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ؛ رادىئۇئاكتىپلىق زەھىملىنىش، ئاللىپرگىيلىك رېئاكسىيە ۋە ھەرخىل سەۋىبلەر كەلتۈرۈپ چىقارغان پېڭىنەت ئولتۇرۇشۇشىقىمۇ ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مۇسکۇلغَا ياكى ۋېباغا ئوکۇل قىلىنىدۇ، ھەر قېتىمدا 50 ~ 100mg، كۆنگە 2 ~ 1 قېتىم ياكى كۆنگە ~ 300 مۇسکۇلغَا ياكى ئاستا - ئاستا ۋېباغا ئوکۇل قىلىنىدۇ. 【ناچار تەسىرى】 ئەسۋە چىقىش، تاماق يېڭۈسى كەلمەسلەك، كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئاشقازان ئاغرىش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈسىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 پاراشوكلۇق ئوکۇلى ۋىتامىن C ئوکۇل سۇيۇقلۇقىدىن 4ml ~ 2 دە ئېرتىكەندىن كېيىن ئىشلىتىلىدۇ؛ ئوکۇل قىلىغاندا ۋىتامىن B₆، ۋىتامىن K₃، كالتسىي پانتوپنات، ھىستامىنغا قارشى ياسالىملار، سۇلۇفونىلامىد ياسالىمىسى ۋە تېتراستىكلەن ياسالىمىسى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ؛ بۇ دورىنى ئېرتىكەندىن كېيىن دەرھال ئىشلىتىش، ئېشپ قالغان قىسىمىنى ساقلاپ قويۇپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ؛ بۇ دورىنى نور چۈشمەيدىغان ئورۇندا ساقلاش كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 تاد ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: بوتۇلكا 0.646g، قاپ/5 بوتۇلكا (600 泰特)， بوتۇلكا 0.323g، قاپ/5 بوتۇلكا (300 泰特) . گلۇتىئون ئىتالىيىدە ئىشلەنگەن. ئوکۇلى: ئاپۇل/300mg، ئامپۇل/600mg، قاپ/10 ئامپۇل.

ھېپا - مېرزا (阿波莫斯，Hepa—Merz)

【ئاساسىي تەركىبى】 L - ئورنىتن (L-鸟氨酸)，L - ئاسپارتىك كىسلاتا (L-天门冬氨酸). 【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 جىڭىر ھۇجمىرىه مېتابولىزمىغا بىۋاسىتە قاتىنىشپ، جىڭىرنىڭ زەھەرسىزلەندۈرۈش

ئىقتىدارنى كۈچەيتىدۇ، قاندىكى زىيادە يۇقىرىلىغان ئاممۇنىياكنى تېزلىكتە تۆۋەنلىتىپ، جىڭىر ھۆجەيرسىنىڭ ئۆزلۈكىدىن ئەسلىگە كېلىش ۋە، قايتا ئۆسۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئارقىلىق جىڭىر فۇنكسييىسىنى ياخشىلاپ، ئورگانىزمنىڭ ئېپىرگىيە تەڭپۈڭۈلىقىنى ئەسلىگە كەلتۈرىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 جىڭىر قېتىش، جىڭىرگە ياغ ئولتۇرۇش ۋە جىڭىر ياللۇغى كەلتۈرۈپ چىقارغان قاندا ئاممۇنىياك يۇقىرىلاش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئۆتكۈر، سوز ئۆلما خاراكتېرىلىك جىڭىر كېسلىگە ئىشلىتىلىدۇ، بولۇپمۇ جىڭىر مەنبىلىك مېڭە كېسلىگە ئۇنۇم بېرىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئۆتكۈر خاراكتېرىلىك جىڭىر ياللۇغى، 20ml ~ 10 كۈننەگە بىر قېتىم ۋېناغا تېمىتىلىدۇ. سوز ئۆلما خاراكتېرىلىك جىڭىر ياللۇغى ۋە جىڭىر قېتىش: 40ml ~ 20 كۈننەگە بىر قېتىم ۋېناغا تېمىتىلىدۇ. كېسلى ئېغىر بىمارلار: دەسلەپكى 6h ئىچىدە 80ml، كېيىن ھەر 6h تا 40ml ۋېناغا تېمىتىلىدۇ، بىرنىچى كۈنندىكى مىقدارى 200mlغا يەتكۈزۈلدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ۋېناغا كۆپ مىقداردا ئوکۇل قىلىنسا يېنىك ۋە ئوتتۇرا دەرىجىدىكى ھەزم يولى رېئاكسىيىسى كېلىپ چىقىدۇ. مەسىلەن: كۆكۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، مىقدارى كېمەيتىلسە ياكى تېمىتىش سۈرئىتى ئاستىلىتىسا، يۇقىرىقى رېئاكسىييلەر كۆرۈنۈرلىك يېنىكىلەيدۇ.

【دېقىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 بۇرەك فۇنكسييىسى ئېغىر دەرىجىدە زەئىپەشكەنلەر، سۇت كىسالاتاسى ياكى مېتىل ئىسپەرتىن زەھەرلەنگەنلەر، فرۇكتوزا - سوربىتول (果糖-山梨糖醇) گە چىدامسىز لار ۋە، فرۇكتوزا - 1، 6 - ديفوسفاتازا (果糖-1,6-二磷酸酶) كەمچىلىك كېسلى بارلارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ؛ كۆپ مىقداردا ئىشلەتكىدە، قان ۋە سۈيدۈكتىكى ئۇرپىشانىڭ مىقدارنى ئۆلچەشكە دەققەت قىلىش لازىم.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 ھېپا - مېرىز گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن.

ئوکۇل سۇبۇقلۇقى: 5g/10ml، ئامپۇل/10ml، قاپ/5 ئامپۇل.

9 . باشقىلار

سۇلغاسالازىن (柳氮磺胺吡啶，Sulfasalazine))

【باشقا نامى】 سالازوپىرىن (Salazopyrin) ، سالازوپىرىن (Salazopyrin) ، سۇلغاسالازىن (Sulfasalazine).

【فارماكولوگىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ئۇچىي يولىدىكى باكتېرىيە تەرىپىدىن 5 - ئامىنۇ سالتسىلىك كىسلاتا (氨基水杨酸 - 5-Salicylic acid) ۋە سۇلغاسالازىن (磺胺吡啶) گە پارچىلىنىدۇ، سۇلغاسالازىننىڭ ئۇچىي يولىدىكى باكتېرىيە تۆپىغا بولغان تەسىرى ناھايىتى ئاجزى، 5 - ئامىنۇ سالتسىلىك كىسلاتا پروستاگلاندىننىڭ سىنتېزلىنىشنى تىزگىنلىپ، ياللۇغا قارشى تەسىرگە ئىگە بولىدى.

【مۇھۇرلىق كېلىدىغان كېسەللىكلىرى】 يارلىق بوغماق ئۇچىي ياللۇغى ۋە تۈز ئۇچىي ياللۇغى، كلون كېسىلى ۋە باشقا ئورگان خاراكتېرىلىك بوغماق ئۇچىي كېسىلى، رېماتوئىدىلىق كۆپ بوغۇم ياللۇغى.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئاشقازان - ئۇچىي يولي كېسەللىكلىرى: كۈنگە 6g ~ 4, 6 ~ 3 قېتىمغا بۆلۈپ ئىچىلىدۇ، ئاتىپتىلاشتۇرۇشى ئاستا بولغانلارنىڭ قاندا ئۇنۇمۇلۇك دورا قويۇقلۇقى ھاسىل بولۇشى ئۇچۇن 3 ~ 2 كۈن كېتىدۇ. قامداپ داۋا الاشتا كۈنگە تۆت تابلىپ ئىككى قېتىمغا بۆلۈپ ئىچىلىدۇ. رېماتوئىدىلىق كېسەللىكلىرى: كۈنگە 2g، ھەر ھەپتىسىگە 500mg باسقۇچلۇق ئىشلىتىلىدۇ، ئاز دېگىندە تۆت ھەپتىدە دورىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقى ئۇنۇمۇلۇك قويۇقلۇققا يېتىدۇ. بالىلارنى داۋا الاش مىقدارى: كۈنگە ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 50 ~ 100 mg، قامداش مىقدارى كۈنگە ھەر kg بىدەن ئېغىرلىقىغا 50 ~ 75mg بولىدۇ. بالىلارنىڭ ئاتىپتىلاشتۇرۇشىنىڭ تىز، ئاستىلىق دەرىجىسىگە ئاساسىن دورا مىقدارنى تەڭشەش لازىم.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، قان ئېرىشچان كەم قانلىق، نېيتراال دانىچە ھۇچىرىلەر كېمىيىش، قان پلاستىنلىرى كېمىيىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ، يىلىكىنىڭ يېتلىشى تولۇق بولماسلق،

ئەسۋە، يەلتاشما، قىزىش، زىيادە سەزگۈرلۈك، كىسلاتاخۇمار دانچە ھۈجەيرىلەر كۆپىيىش، Lyell يىغىندى ئالامىتى، سۈيدۈك قوڭۇر رەڭدە كېلىش، ئۇرۇق كەملىك كېسىلى قاتارلىقلار ناھايىتى ئاز كۆرۈلدى. 『دىققەت قىلىدىغان ئىشلار』^① دورىلار بىلەن بولغان تىسىرى: دىگۈكسىن (地高辛) بىلەن بىرگە ئىشلەتكەننە، دىگۈكسىنىڭ قاندىكى قويۇقلۇقى 50% تۆۋەنلىشى مۇمكىن. قان ئۇيۇشقا قارشى دورىلار، ئىچىلىدىغان قاندىكى شېكىر مىقدارىنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلار، ناترىي تىئۇپېنتال (硫喷妥钠)，مېتوتېپكىسات (甲氨蝶呤) قاتارلىقلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىلسە، تىسىرى ئۇزىرلەپ، زەھەرچانلىقى ئاشىدۇ.^② مەنى ئىلىنىدىغان ئەھۋاللار: سۇلغانىلامىدلار ۋە سالىتىلىك كىسلاتا تۈرىدىكىلەرگە زىيادە سەزگۈرلەر، گلۈكۈزا - 6 - فوسفات دىھىدرۇگىنازا - 6 - 磷酸脱氢酶 (葡萄糖) كەملەر، بالدۇر تۇغۇلغان ۋە يېڭى تۇغۇلغان بالسالارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ.^③ باشقىلار: سۇ بىلەن تەمنىلەشكە كاپالەتلىك قىلىش؛ ئۇزۇن مەزگىل دورا ئىشلەتكەننە، قان رايى ۋە بۆرەك فۇنكىسىسىنى تەكشۈرۈش؛ تېرىه ئالامەتلەرى ۋە قان سىستېمىسى قالايمىقاتلىشىش پەيدا بولسا، دورىنى دەرھال توختىتىش لازىم. 『ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى』 سالازوپىرىن شۇپىتىسىيىدە ئىشلەنگەن. ئۇچىيىدە ئېرىگۈچى تابلىكتى: تابلىت/ 500mg.

يەتنىچى باب سۈيدۈك ئاجرىتىش سىستېمىسىغا تەسىر قىلغۇچى دورىلار

ئالپروستاديل
(前列地尔, Alprostadol)

【باشقانامى】 كاۋېرچىكت (凯威捷, Caverject) ، پروستاكلاندىن E_1 (保达新, Prostavasin) ، پروستاكلاندىن E_1 (前列腺素 E_1)

【ئاساسىي تەركبى】 قان تومۇرنى كېڭىتىش، قان پلاستىنكلېرىنىڭ توپلىشىنى تىزگىنلەش، ئاشقازان - ئۇچىي يولىنىڭ ئاجرىتىشىنى تىزگىنلەش ۋە ئۇچىي، بالىاقۇ سىلىق مۇسکۇلىنى غىدىقلاش قاتارلىق تەسىرلەرگە ئىگە، زەكر تىكلىنىشى توسقۇنلۇققا ئۇچراشنى داۋااش بىلكىم زەكر توقۇلمىسىدىكى E_1 - ئادرېنالىن ئىقتىدارلىق ئاكتىپېتۈرۈنىڭ ئاكتىپچانلىقىنى تىزگىنلەش ۋە بۇلۇتسىمان تەندىكى سىلىق مۇسکۇللارىنى كېڭىتىش ئارقىلىق ئەمەلگە ئېشى مۇمكىن. ۋېنادىن دوزا برگەندىن كېيىن، تېزلىكتە ئاكتىپېسىز لانغان مېتابولىزم ھاسلاتىغا ئايلىنىدۇ، $t_{1/2}$ 1min دىن ئاز بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكىلەر】 نېرۋا مەنبىلىك، قان تومۇر مەنبىلىك، يۈرەك مەنبىلىك ياكى ئاربلاش مەنبىلىك زەكرنىڭ تىكلىنىشى توسقۇنلۇققا ئۇچراشقا باشا ئۇسۇل ئارقىلىق دئاگىنۇز قويۇشتا قوشۇمچە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 زەكر بۇلۇتسىمان تەنچىسىگە ئۆكۈل قىلىنىدۇ، پروستاكلاندىن E_1 نىڭ مىقدارىنى دوختۇرۇنىڭ كۆرسەتمىسىدە يەككە تەنلىر بويىچە بېكىتىش لازىم.

【ناچار تەسىرى】 زەكر ئاغرىش، ئۆزلۈكىسىز تىكلىنىش ياكى

نورمالسىز تىكلىنىش قاتارلىقلار دائم كۆرۈلدۈ، زەكردە قىزىل ئىسۋە پەيدا بولۇش، سۇلۇق ئىشىش، تالالىشىش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلدۈ. تۆۋەن قان بېسىمى، يەرلىك ئورۇن ئاغرىش ناھايىتى ئاز كۆرۈلدۈ.

【دەققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دوربىلار بىلەن بولغان تەسىرى: باشقا دوربىلار بىلەن بىرگە ئىشلىتىش ياكى ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىش تەكىستەنميدۇ. ② مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۇللار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەر، ئورغاقسىمان ھۇجىرىلىك قان ئازلىق كېسىلى بارلار، كۆپ ئورۇنلۇق يىلىك ئۆسمىسى بارلار، ئاق قان كېسىلى بارلار، جىنسى يولي ئاناتومىيلىك غەيرىيلەر، زەكر تېنى ساختىلار ۋە بالسالارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: نورمالسىز تىكلىنىشنى داۋالاش بىلگىلەنگەن داۋالاش پرسىنسيپىغا ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك؛ زەكر مۇڭگۈزلىشىش، بۇلۇتسىمان تەن تالالىشىش پېرىونىيە كېسىلى (佩罗尼病) كېلىپ چىقىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۇچۇن بىمارنىڭ قەرەللىك تەكشۈرۈشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ، ئەگەر يۈقرىقى ئەھۇللار يۈز بىرسە دورىنى دەرھال توختىتىش لازىم؛ قان ئۇيۇشقا قارشى دوربىلارنى ئىشلەتكەندە بىمارلاردا بۇلۇتسىمان تەن ئىچىگە بۇ دورىنى ئوکۇل قىلغاندىن كېيىن، قاناش كۆپىيىش خاھىشى پەيدا بولىدۇ؛ بۇ دورىنى ئىشلىتىشتن ئىلگىرى زەكر تىكلىنىش توسىقۇنلۇققا ئۇچراشنىڭ كېسىللىك سەۋەبىگە ئىنلىق دىئاگنوز قويۇش كېرەك.

【ياسالىممىسى ۋە قۇلچىمى】 كاۋپىرىجىك بىلگىيىدە ئىشلەنگەن. پاراشوكلىق ئوکۇلى: بوتۇلكا/ $20\mu\text{g}$ ، بوتۇلكا/ $10\mu\text{g}$. پروستاۋاسىن گېرمانىيىدە ئىشلەنگەن. پاراشوكلىق ئوکۇلى: بوتۇلكا/ $20\mu\text{g}$ ، قاب/ 10 بوتۇلكا.

ئالفۇزوسىن (阿咗哩嗪, Alfuzosin)

【باشقا نامى】 كساترال (桑塔, Xatral) .
【ئاساسىي تەركىبى】 ئالفۇزوسىن ھيدروخلوريد.
【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بىر تۈرلۈك نېرۋا ئۆسۈكچىسى ئارقا پەردىسىدىكى $t_{1/2}$ - ئادىپنالىن ئىقتىدارلىق ئاكسيپيتور بىلەن تاللاپ قارشلاشقۇچى دورا بولۇپ، سۈيدۈك يولىنىڭ بىسمىنى تۆۋەنلىتىپ، سۈيدۈكىنىڭ ئېقىش قارشىلىق كۈچىنى ئازايىتىدۇ.
ياخشى سۈمۈرۈلىدۇ، ئوتتۇرۇچە بىئولوگىيلىك پايدىلىنىش دەرىجىسى % 64، T_{max} 3h $t_{1/2}$ ~ 0.5 ~ 3، قان پلازما ئاقسىلى بىلەن بىرىكىش نسبىتى % 90، ئۆت ۋە گەندە ئارقىلىق چىقىرىلىدۇ.
【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 ياخشى سۈپەتلىك مەزى بىزى ئۆسۈش كەلتۈرۈپ چىقارغان بىر قىسىم فۇنكسييلىك ئالامەتلەر ۋە يۇقىرى قان بىسмиغا ئىشلىلىدۇ.
【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 2.5mg دىن كۈننەگە ئۈچ قېتىم ئىچىلىدۇ. ياش ۋە كلىنىكلىق داۋالاش ئۇنۇمىڭ قاراپ مىقدارى تەڭشىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 كۆڭۈل ئېلىشىش، ئاشقازان ئاغرىش، ئىچ سۇرۇش، بىنىك دەرىجىدە هوشىزلىنىش، باش ئاغرىش، قاتارلىقلار دائىم كۆرۈلىدۇ؛ ئېغىز قۇرۇش، يۈرەك سېلىش، كۆكىرەك ئاغرىش، ماغدۇرسىزلىنىش، ئۆيقۇسراش، قىچىشىش، قىزىرىش قاتارلىقلار ئاز كۆرۈلىدۇ، يۇقىرى قان بىسىمى بارلاردا يۈرەك سېلىش، ئۆرە تۇرۇش خاراكتېرىلىك تۆۋەن قان بىسىمى، سۇلۇق ئىشىش قاتارلىقلار كۆرۈلىدۇ.
【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① دورىلار بىلەن بولغان تەسىرى:
ـ ئاكسيپيتورنى توسقۇچى باشقا دورىلار، كالتسىي بىلەن قارشلاشقۇچى $t_{1/2}$ - بىئولىرى ناركوز دورىلرى بىلەن بىرگە ئىشلىشىكە دورىلار، پۈتون بىدەنلىك ناركوز دورىلرى بىلەن بىرگە ئىشلىشىكە بولمايدۇ. ② مەنىئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈرلەرگە، ئۆرە تۇرۇش خاراكتېرىلىك تۆۋەن قان بىسىمى بار بىمارلارغا ئىشلىنىش چەكلىنىدۇ. ③ باشقىلار: ـ ئاكسيپيتورنى توسقۇچى

دورىلارغا دەرىجىدىن تاشقىرى زىيادە سەزگۈرلۈك رېئاكسىسى پەيدا بولىدىغانلارغا، قان بېسىمنى چۈشۈرگۈچى دورا ئىچىۋاتقانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدى، تاجىسمان ئارتىپرىيلىك يۈرەك كېلى بىمارلىرىغا بۇ دورىنى يالغۇز ئىشلىتىشكە بولمايدۇ؛ ئىگەر يۈرەك سانجىقى قوز غالسا ياكى ئېغىرلاشى دورا ئىشلىتىشنى توختىتىش كېرەك؛ يېشى 65 ياشتن ئاشقان بىمارلارغا ئىشلىتىلىدىغان كۈندىلىك مىقدارى 7.5mg دىن ئېشىپ كەتمەسىلىكى كېرەك.

【ياسالىمىسى ۋە ئۆلچىمى】 كىساترال فرانسييىدە ئىشلەنگەن. شېڭەر ياللىخان تابلىتى: تابلىت/2.5mg، قاپ/15 تابلىت، قاپ/30 تابلىت.

پروستات (普适泰，Prostat)

【باشقۇ نامى】 سېرنىلتون (舍尼通，Cernilton).

【ئاساسىي تەركىبى】 ھەر بىر تابلىتىدا گۈل چىڭى چەككىلەنمىسى P5 دىن mg 70mg EA - 10 دىن 4mg بار.

【فارماكولوگىسىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا ئاندرۇگىن ئاكسىپپىتۈرنى توسوش تەسىرىگە ئىگە بولۇپ، دوۋىساق سۈيدۈك قىستاش مۇسکۇلى ۋە سۈيدۈك يولى سىلىق مۇسکۇلىنى كېڭىيەتىپ، مەزى بېزى ئېپپىتېلىيە ھۇجەيرىسىنىڭ تۇسۇشنى تىزگىنلەپ، ئىچكى مەنبىلىك ياللۇغ ۋاسىتىچىسىنىڭ سىنتېزلىنىشنى تورمۇزلايدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا، يەنە ياللۇغقا قارشى تۇرۇش، سۈلۈق ئىشىشقا قارشى تۇرۇش تەسىرىگە ئىگە.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىكلەر】 ياخشى سۈپەتلىك مەزى بېزى تۇسۇپ قېلىش، سوزۇلما، باكتېرىيىسىز مەزى بېزى ياللۇغى ۋە مەزى بېزى ئاغرىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش تۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنىگە ئىككى قېتىم، ئەتسىگەندە ۋە كەچتە بىر تالدىن ئىچىلىدۇ، داۋالاش مۇددىتى 6 ~ 3 ئاي، ئىگەر زۆرۈر تېپىلسا داۋاملىق ئىچىشكە بولمايدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ناچار تەسىر پەيدا قىلىدىغانلىقىغا ئائىت مەلۇمات يوق.

【دېقىدت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار بالسالارغا ئىشلىتىش چەكلىنىدۇ. ② باشقىلار: ئۆي تېپپېر اتۇرسىدا قۇرغاق ئورۇندا ساقلاش كېرەك. 【ياسالمىسى ۋە تۈلچىمى】 سېرىنكتون شۇپىتىسىدە ئىشلەنگەن. پەردىلىك تابلىپتى: تابلىپتى 70mg+4mg، قاپ/14 تابلىپت.

سېفاسابال

(西发通, Cefasabal)

باشقىقا نامى 保前列

【ئاساسىي تەركىبى】 (一枝黄花) 锯叶棕果， ئالتۇن شاخ (七叶树) ۋۇرۇقى چەككىلەنمىسى، ئېسکۇلۇس دەرىخى (七叶树) ۋۇرۇقى چەككىلەنمىسى. 【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 قان تولۇشنى ئازايىش، ياللۇغ قايتۇرۇش، ئىشىقىنى يوقىتىش تەسىرىگە ئىگە. مۆتىدىل سۈيدۈك ھېيدەيدۇ، بەدەندىكى سۇنىڭ ماددا ئالمىشى كېچىكىش كەلتۈرۈپ چىقارغان باش قېيىش، ئۇچەي يولى فۇنكسىيىسى توسقۇنلۇقتا ئۇچىراش قاتارلىقلارنى ياخشىلایدۇ. سۈيدۈك ئاجرىتىش، كۆپپىش سىستېمىسىدىكى تاياقچە باكتېرىيىلەرنى تىزگىنلىكىدۇ ھەم يوقىتىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەككەر】 I ، II دەۋرىدىكى مەزى بېزى ئۆسۈپ قېلىش، ئۆتكۈر، سوزۇلما خاراكتېرىلىك مەزى بېزى ياللۇغى، ئۆتكۈر، سوزۇلما خاراكتېرىلىك دوۋساق ياللۇغى ھەممە سۈيدۈك ئاجرىتىش، كۆپپىش سىستېمىسىنىڭ يۇقۇملىنىشغا ئىشلىتىلدىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئۆتكۈر مەزگىلەدە ھەر قېتىمدا ئىككى تابلىپتىن كۈنگە تۆت قېتىم ئىچىلىدۇ. ياخشىلىنىش باسقۇچىدا ھەر قېتىمدا بىر تابلىپتىن كۈنگە ئۇچ قېتىم تاماقتىن ئىلگىرى ئىچىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ناچار تەسىرىگە ئائىت مەلۇمات يوق. 【دېقىدت قىلىدىغان ئىشلار】 داۋالاش مەزگىلەدە تۇرمۇش رىتىملق بولۇشى، ئاچچىق ۋە زىيادە سەزگۈرلۈكىنى ئوڭاي كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان يېمەكلىكلىرىنى ئىستېمال قىلىشتىن ساقلىنىش لازىم. 【ياسالمىسى ۋە ئۇلچىمى】 سېفاسابال كېرمانىيىدە ئىشلەنگەن.

تابلىتى: تابلىت/0.25g، قاپ/100 تابلىت.

ۋاسوپرېسىن (血管加压素，Vasopressin)

【باشقا نامى】 پىترېسىن (必压生，Pitressin

【ئاساسىي تەركىبى】 ۋاسوپرېسىن.

【فارماكولوغىيىلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا بۇرەك كانالچىلىرىنىڭ سۇنى قايىتا سۇمۇرۇشىنى كۈچەيتىش ئارقىلىق سۇيدۇك ھەيدەشكە قارشى تۇرۇش رولىنى ئوبىنайдۇ. ئۆچەي يولى سىلىق مۇسکۇلۇنى ۋە بارلىق قان تومۇرلار قىننغا بىۋاستە تەسىر كۆرسىتىپ، ئۇلارنى قورۇيدۇ. چوڭ ۋېبا سىلىق مۇسکۇلۇغا بولغان تەسىرى بولسا بىر قىدەر سۇس بولىدۇ.

【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللەكلىمەر】 كۆپ سىيش كېسىلى، قىزلىئۆخىچ ۋېناسى ئەگرى - بۇگرى كېڭىيىپ قاناش، ئۇپپراتسىيىدىن كېيىن قورساق كۆپۈش، قورساقتىكى يەلنى ھەيدەش قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 يەككە تەنلەر بويىچە بېرىلىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 قورساق قىسمى سپازمىلىنىش، كۆڭۈل ئېلىشىش، يەل كېلىش قاتارلىقلار، ئاللىبرگىيىلىك رېئاكسىيە، يۇرەك سوقۇش توختاپ قېلىش، كالپۇكى ئاققىش، تارتىشىش، چارچاش، باش ئېغىرلىشىش، كانايىچە قىسىقىرىش قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈللىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 تۇتقاقلق، شەققە، زىققە، يۇرەك زەئىپلىشىش، سۇلۇق ئىشىق ھەمدە توساشىن ھۈجىرە سىرتىدىكى سۇيۇقلۇق كۆپىيىپ، خەتەر پەيدا بولۇش ئېھىتىماللىقى بار بىمارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىلىدۇ.

【ياسالىمىسى ۋە ئۇلچىمى】 پىترېسىن ئامېرىكىدا ئىشلەنگەن. ئوكۇل سۇيۇقلۇقى: ئامپۇل/20IU.

تامسۇلوسىن ھيدرو خلورىد (盐酸坦索罗辛, Tamsulosin Hydrochloride)

【باشقا نامى】 خارنال (Harnal) .

【ئاساسىي تەركىبى】 تامسۇلوسىن ھيدرو خلورىد.

【فارماکولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ آ - ئاكسبېتورنىڭ سۇب تىپى $t_{1/2}$ بىلەن ئالاھىدە قارشلاشقاچى دورا. ئۇ، يۇقىرى تاللاشچانلىققا ئىگە توسوش تەسىرىگە ئىگە بولۇپ، سۈيدۈك يولىنىڭ بېسىمنى ياخشىلادىپ، سۈيدۈك چىقىرىشنى راۋانلاشتۇردى، ئىچىكىندە T_{max} 6.8h، $t_{1/2}$ 10h بولۇدۇ.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسەللەكلەر】 مەزى بىزى ئۆسۈپ قبلش كەلتۈرۈپ چىقارغان سۈيدۈك چىقىرىش توسقۇنلۇققا ئۈچۈراشقا ئىشلىتىلدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مقدارى】 چوڭلار ھەر قېتىمدا 0.2mg دىن كۈنگە بىر قېتىم، تاماقتنى كېيىن ئىجىددۇ. بېشى ۋە كېسەللەك ئالامەتلەرىگە قاراپ مقدارى ئاشۇرۇپ، كېمەيتىلدۇ. 【ناچار تەسىرى】 باش قېبىش، يول يۈرۈش قۇلايىزلىشىش ۋە چارچاش سېزىمى پەيدا بولۇش، كۆخۈل ئېلىشىش، قۇسۇش، ئاشقازان يېقىمىزلىنىش، قورساق ئاغرىش، تاماق يېگۈسى كەلمەسلەك، ترانسئامىنازا ۋە LDH يۇقىرلاش، بۇرۇن بۇتۇش، سۈلۈق ئىشىق، يۇتۇش قىينىلىشىش ۋە ئىسۋە قاتارلىقلار ئاندا - ساندا كۆرۈلدى.

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ① مەنئى قىلىنىدىغان ئەھۋاللار: بۇ دورىغا زىيادە سەزگۈزىلەر ۋە بۇرەك فۇنكسييىسى تولۇق بولىغان بىمارلارغا ئىشلىتىش چەكلەنىدۇ. ② باشقىلار: بەدهن تۇرقى خاراكتېرىلىك تۆۋەن قان بېسىمى بىمارلىرى، بۇرەك فۇنكسييىسى ئاجىز بولغان ياشانغانلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتىلدۇ؛ مقدارى زىيادە كۆپ بولۇپ كەتسە، قان بېسىم تۆۋەنلەشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن؛ قان بېسىمنى تۆۋەنلەتكۈچى دورىلار بىلەن بىرگە ئىشلەتكەندە، قان بېسىمنىڭ ئۆزگىرىشىگە دىققەت قىلىش، كاپسۇل ئىچىدىكى دانىچىلارنى چاينىما سلىق لازىم.

【ياسالمىسى ۋە ئۇلچىمى】 خارنال يابونىيىدە ئىشلەنگەن.
كاپسۇلى: دانه/0.2mg، قاپ/10 دانه.

تادېنان (通尿灵， Tadenan)

【ئاساسىي تەركىبى】 ئافرقا تۇنگومو (脅果木) چەككىلەنمىسى.
 【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ ياخشى سۈپەتلەك مەزى
 بېرى ئۆسۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان ئۆستۈرگۈچى فاكتورنى
 تورمۇزلىغۇچى دورا بولۇپ، مەزى بېزىدىكى تالا توقۇلمىسىنىڭ ئۆسۈشىنى
 ئۇنۇملۇك تىزگىنىلەيدۇ، شۇنداقلا دوۋساق دىۋارىنىڭ تالالاششىنى
 تورمۇزلاپ، دوۋساق دىۋارىنىڭ ئېلاستىكلىقىنى ياخشىلاش ئارقىلىق
 دوۋساق فۇنكسييىسىنى قوغداش رولىنى ئوينىدۇ. يەنە ياللۇغا قارشى
 تورۇش ۋە سۈلۈق ئىشىشقا قارشى تۇرۇش ئاكىتىپچانلىقىغا ئىگە بولۇپ،
 ئۇنۇمى تېز، ئوتتۇرا ھېساب بىلەن تۆت ھەپتە دورا ئىشلەتكەندىن كېيىن
 كېسەللىك ئالامەتلەرىدە ياخشىلىنىش پەيدا بولىدۇ. 8 ~ 6 ھەپتىدە
 كېسەللىك ئالامەتلەرىنىڭ ياخشىلىنىش ئەڭ يۇقىرى دەرىجىگە يېتىدۇ.
 【مۇۋاپىق كېلىدىغان كېسەللىككەر】 ياخشى سۈپەتلەك مەزى
 بېرى ئۆسۈشى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان سۈيدۈك چىقىرىش توسمۇنلۇقا
 ئۇچراشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ئەتىگەن ۋە كەچتە
 50 دن تاماقتنى ئىلگىرى ئېچىلىدۇ، 8 ~ 6 ھەپتە بىر داۋالاش
 مۇددىتى قىلىنىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 ئاشقازان، ئۇچىي يولى يېقىمىزلىنىش ئاندا -
 ساندا كۆرۈلەندۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 دورا ئىشلىتىۋاتقان مەزگىلەدە مەزى
 بېزىنى قائىدىلىك تەكشۈرۈپ تورۇش كېرەك.

【ياسالمىسى ۋە ئۇلچىمى】 تادېنان فرانسىيىدە ئىشلەنگەن.
 تابلىپتى: تابلىپتى/50mg، كاپسۇلى: دانه/50mg، قاپ/10 دانه.

دېسموپېسسىن ئاتىپتات

(醋酸去氨加压素，Desmopressin Acetate)

【باشقا نامى】 مىنيرىن (Minirin) ، ئوكتوستىم (依他停，Octostim)

【ئاساسىي تەركىبى】 دېسموپېسسىن ئاتىپتات.

【فارماكولوگىيلىك ئالاھىدىلىكى】 بۇ دورا سۈيدۈكنىڭ ئوسىمۇس بېسىمىنى ئارقىلىق سۈيدۈكنىڭ چىقىرىلىشنى ئازايىتىپ، سىيىش قېتىم سانى ۋە كېچىدە سىيىشنى ئازايىتىدۇ. ئوخشىمغان ئورۇندىكى سۈيدۈك يولى يۈقۈمىلىنىشا دىئاگنوز قويۇش دورسى قىلىندۇ. قاناشنى تىزگىنلەش ۋە قاناشنىڭ ئالدىنى ئېلىشىقىمۇ ئىشلىتىلدى.

【مۇۋاپق كېلىدىغان كېسىللەكلەر】 مەركەز خاراكتېرىلىك كۆپ سىيىش كېسىلى، بۇرەكىنىڭ سۈيدۈكنى قويۇلدۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆلچەش، قاناشقا مايللىق كېسىلى، قاناشقا ماينەلىك قاناشقا مايللىق كېسىلى ۋە باشقا قاناش ئالامەتلەرىنگە ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش تۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مەركەز خاراكتېرىلىك كۆپ سىيىش كېسىلى: هەر قېتىمدا 0.1mg دىن كۈننەگە ئۆچ قېتىم ئىچىلىدۇ. داۋالاش ئۇنۇمىگە ئاساسەن مىقدارى تەڭشىلىدۇ، ۋېناغا ئوكۇل قىلىشتا چوڭلارغا ھەر قېتىمدا $4\mu\text{g} \sim 1$ ؛ بىر ياشتنى يۇقىرى بالسلارغە ھەر قېتىمدا $0.4\mu\text{g} \sim 0.2$ كۈننەگە $2 \sim 1$ قېتىم ئىشلىتىلدى. بۇرەكىنىڭ سۈيدۈكنى قويۇلدۇرۇش ئىقتىدارىنى ئۆلچەش: چوڭلارغا ئىشلىتكەندە مۇسکۇلغا ياكى تېرى ئاستىغا $4\mu\text{g}$ ئوكۇل قىلىنىدۇ؛ بىر ياشتنى يۇقىرى بالسلارغە $2\mu\text{g} \sim 1$ ، بىر ياشتنى تۆۋەن بالسلارغە $0.4\mu\text{g}$ ئىشلىتىلدى. گۈدەك بالسلارغە بۇرۇن بوشلۇقىدىن دورا بېرىلىدۇ. قاناش ۋە ئوپېراتسىيىدىن ئىلگىرى قاناشنىڭ ئالدىنى ئېلىش: ھەر kg بەدەن ئېغىرلىقىغا $0.3\mu\text{g}$ مىقدار بويىچە دورا بېرىلىدۇ.

【ناچار تەسىرى】 باش ئاغرش، كۆڭۈل ئېلىشىش، ئاشقازان ئاغرش ئاز كۆرۈلىدۇ. يۇقىرى دوزىدا ئوكۇل قىلىنسا قىسا ۋاقتىلىق قان بېسىم تۆۋەنلەش، رېفلىكسلىق يۈرەك سوقۇشى تېزلىشىش ۋە يۈز

قىسىمى قىزىرىش قاتارلىقلار كېلىپ چىقىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 گۆددەك ۋە ياشانغانلار، بىدەن سۇيۇقلۇقدىكى ئېلىكترونلىتلارنىڭ تەڭپۇڭلۇقى بۇز ولغانلار، باش ئىچكى بېسىمى يۇقىرىلىغان بىمارلارغا ئېھتىيات بىلەن ئىشلىتلىدۇ. بۆرەكىنىڭ سۇيىدۇكىنى قويۇلدۇرۇش ئۇقتىدارىنى ئۆلچىگەندە، بىر ياشتنىن توۋەن بالسالارغا دوختۇرخانىدا ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزتىلگەن شارائىتتا ئىشلىتىش كېرەك؛ قاناش كۆرۈلگەن، سۇيىدۇك ھەيدىگۈچى دورىلارغا ئېھتىياجلىق بولغان بىمارلارغا چوقۇم مۇۋاپىق تەدبىر قوللىنىپ، بىدەن سۇيۇقلۇقىنىڭ زىيادە تۆپلىشىپ قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

【ياسالىممىسى ۋە ئۆلچىمى】 مىنرىن شۇبىيتىسىدە ئىشلەنگەن. تابلىپتى: تابلىپتى/100 μ g، تابلىپتى/200 μ g، قاپ/15 تابلىپتى، قاپ/30 تابلىپتى؛ بۇرۇنغا بۇركۇلىدىغان ياسالىممىسى: 100 μ g/ml، ئامپۇل 2.5ml، ئامپۇل 5ml؛ بۇرۇنغا تېمىتىلىدىغان ياسالىممىسى: 100 μ g/ml، ئامپۇل 2.5ml؛ ئوكۇلى: هەر ئامپۇل 4 μ g/ml، قاپ/10 ئامپۇل.

ئوكىتوستىم شۇبىيتىسىدە ئىشلەنگەن. ئوكۇلى: هەر ئامپۇل 15 μ g/ml، قاپ/10 ئامپۇل، ئامپۇل 2ml، قاپ/10 ئامپۇل.