

كىرىش سۆز

ئۇيغۇر خەلقنىڭ تۇزاق تارىخي دەۋولەردىن بۇيان كېسەللەك بىلەن كۈرمىش قىلىشى جەريانىدا تەدرىجىي شەكىللەنگەن ۋە تۇزىگە خلىس نەزەرىيىتى تاساسقا ئىگە بولغان ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ئىلمى ۋەتىنمىز ئەئەننىڭ تېبابەتچىلىك ئىلمىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسىمىدۇر. نەچچە مىڭ يىللاردىن بېرى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك-دۇرىگەرلىك ئىلى شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت خەلقنىڭ كېسەللەككەرنىڭ ئالدىنى بېلىش-داۋالاش، ساقلىق ساقلاش ۋە مىللەي تەرقىيياتى ئىلگىرى سۈرۈش جەھەتلەرەدە ئىنتايىن مۇھىم رول تۇينىپ كەلدى. مىللەي تېبابەت دورىلىرىنى باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش، مىللەي تېبابەت دورىلىرىنىڭ سۈپىتنى تۇستۇرۇش، مىللەي تېبابەتچىلىك-دۇرىگەرلىك ئىشلىرىنىڭ تەرقىيياتىنى يەنمىءۇ ئىلگىرى سو-رۇش تۈچۈن، سەھىيە منىسلىرىلىقى (سەھىيە دووا [1993] 64-نۇمۇرلۇق) «مىللەي تېبابەت دورىلىرىنىڭ ئۆلچىمىنى تۇزۇپ چىقىش توغرىسىدا ئۇقتۇرۇش»نى تارقىتىپ، ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنىڭ ئۆلچىمىنى تۇزۇپ چىقىش خىزمىتىنى تۇرۇنلاشتۇرغانىدى. سەھىيە منىسلىرىلىقىنىڭ فارماكۆپىيە كومىتېتى ۋە شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە نازارىتىنىڭ تەشكىللەشى، شۇنداقلا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق دورا تەكشۈرۈش تۇرنى، قەشقەر ۋىلايەتلەك دورا تەكشۈرۈش تۇرنى، خوتەن ۋىلايەتلەك دورا تەكشۈرۈش تۇرنى قاتارلىق تۇرۇنلارنىڭ تىرىشىپ خىزمەت قىلىشى، كەڭ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك، دۇرىگەرلىك خىزمەتچە-لىرى ۋە جەممىيەتتىكى ھەر ساھىنىڭ تۇرتاق قوللىشى ئارقىسىدا، كۆپلەگەن ئۇيغۇر تېبابەتچىلىك دورا ماتپىياللىرى ۋە تېبىyar دورا ياسالىلىرىنىڭ ئۆلچىمىنى يېزىپ چىقىش خىزمىتى تاماملىنىپ، ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ۋە دۇرىگەرلىككىن ئەكشۈرۈشىدىن تۇتى. بۇلارنىڭ ئىچىدىكى منىسلىرىلىق ئۆلچىمى شەرتلىرىگە مۇۋاپىق كېلىدىغان دورا تۈرلىرى تۈركۈم باسقۇچ بويىچە رەتلىنىپ، ئۇيغۇر تېبابەت دورا ئۆلچىمى قىلىنماقچى.

فارماكۆپىيە كومىتېتى مۇناسىۋەتلىك مۇتاخىسىسىلەرنى تەشكىللەپ، تەكشۈرۈپ بېكتىكەن 1-تۈر- كۈمەدە رەتلىنىڭ ئۇيغۇر تېبابەت دورا ماتپىيالى 115 خىل، تېبىyar دورا رېتىپلىرى 87 خىل بولۇپ، «جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى سەھىيە منىسلىرىلىقى دورا ئۆلچىمى (ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرى قىسى)» منىسلىرىلىقىز تەرىپىدىن تەستىقلەنلىپ، بىلان قىلىنىدى. مەزكۇر ئۆلچەم دۆلەتتىمىزدىكى ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش، تىجارەت قىلىش، ئىشلىتىش ۋە نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش بىلەن شۇغۇللانغا- چىلارنىڭ قانۇنىي ئاساسى بولالايدۇ.

مەزكۇر كىتابقا كىرگۈزۈلگەن ئۇيغۇر تېبابەت دورا ئۆلچىمى 1998-يىلى 10-ئاينىڭ 1-كۈنىدىن ئېتىبارمۇن يولغا قوبۇلدۇ.

ئىزاهات

1. سەھىيە منىستىرلىقنىڭ تۇيغۇر تېبابىت دورا ماتېرىياللىرى ۋە تەبىyar دورا ياسالىملىرىنىڭ منىستىرلىق دەرىجىلىك بىرلىككە كەلگەن تۇلچىمىنى تۈزۈپ چىقش توغرىسىدىكى تۇرۇنلاشتۇرۇشغا ئىسائىن، شىنجاڭ تۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق سەھىيە نازارىتىنىڭ تەشكىللىشى بىلەن تۇيغۇر تېبابىت دورىلىرىنىڭ منىستىرلىق دەرىجىلىك تۇلچىمى يېزىپ چىقلغان بولۇپ، فارماکوپىيە كومىتېتى تەرىپىدىن تېخنىكىلىق تەكشۈرۈش بېلىپ بېرىلىپ، شۇنداقلا ئالاقدار مۇتەخەسسىلەر تەرىپىدىن تۇرۇكىنالى تەكشۈرۈش، ئەڭ ئاخىرىدا فارماکوپىيە كومىتېتى تەكشۈرۈپ بېكىتىلگەن ھەممە سەھىيە منىستىرلىقغا يولىنىپ، تەستىقلانىغان مەزكۇر تۇلچىمىدىكى دورا 202 خىل بولۇپ، بۇنىڭ تىچىدە تۇيغۇر تېبابىت دورا ماتېرىياللىرى 115 خىل، تەبىyar دورا ياسالىملىرى 87 خىل مەزكۇر توپلامغا كىرگۈزۈلۈپ، منىستىرلىق بۇلان قىلغان تۇلچىم قىلىنىدى.
2. مەزكۇر تۇلچىمەدە، جۇڭگو فارماکوپىيىسىنىڭ 1995-يىللەق نەشرىدىكى پايدىلىنىش قائىدىلىرى ۋە قوشۇمچىلار ئاسلىس قىلىنىپ، تېكىستە قوشۇمچىلارنىڭ تۇرگە ئاييرىلىش رەت نومۇرى ئىمساكەرتىلىدى.
3. جۇڭگو فارماکوپىيىسى 1995-يىللەق نەشرگە كىرگۈزۈلۈمگەن مەجۇن ۋە گۈلقەفت قاتارلىق تۇيغۇر تېبابىتىدە كۆپ ئىشلىلىدىغان دورا ياسالىملىرى ھەققىدە شىنجاڭ تۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق دورا تەكشۈرۈش نۇرنى دورا ياساش نۇمۇمىي پىرىنسىپلىرىنى تۈزۈپ چىققان بولۇپ، فارماکوپىيە كومىتېتىنىڭ تەكشۈرۈپ بېكىتىشىدىن تۇتۇپ، مەزكۇر تۇلچىمەكە كىرگۈزۈلدى.
4. جۇڭگو فارماکوپىيىسە ۋە منىستىرلىق بۇلان قىلغان تۇلچىمەكە ئىلگىرى كىرگۈزۈلگەن تۇيغۇر تېبابىتىدە كۆپ ئىشلىلىدىغان دورا ماتېرىياللىرى مەزكۇر تۇلچىمەكە تەكار كىرگۈزۈلەندى.

سەھىيە منىستىرلىقى فارماکوپىيە كومىتېتى
1998-يىل 7-ئاى

مۇندىر رىجە

دورىلار

1	قەلمىپۇر يېغى
2	ئارىيا
3	پەرفېيون
4	لاچىندانە
5	زېرىق مېۋسى
6	قۇرۇق سايىشا ئۈزۈم
7	سېمىز نۇت ئۇرۇقى
8	بىنەپىشە
9	بىنەپىشەپشىگۈل
10	ئۇق يىلان
11	سۆئلىپ مىسرى
12	بىستى پايدەنچ
13	ھەرزەنجۇش
14	گاۋىزبان
15	كالا ئۇتى
16	بۇقا چۈيىسى
17	تاتلىق بادام
18	ئۇنار
19	ئۇناركۈلى
20	ئۇنىبەر
21	ئىتئۈرۈمى
22	گىل مەختۇم
23	شائىرەنجى
24	بەرمەنگى كابىلە
25	ئەرمۇدۇن ئۇرۇقى
26	پەربۇن
27	نارجل
28	سوقىمونىيا
30	تاۋۇز ئۇرۇقى
31	بەسباسە
32	سازەج

33	زەرنەپ
35	زاراڭرا ئۇرۇقى
36	زاراڭرا يېغى
37	ياقۇت
38	چالغۇر ئۇرۇقى
39	كەرمىشە ئۇرۇقى
41	سەقەنقۇر
42	جىىگە
43	قول يىلىنى
44	ئۇدبىلىسان
45	غارىقۇن
46	ئاقىرقەرها
47	ئەرمىب يېلىمى
48	جۇۋىنە
50	ئۇشەق
51	كالزىرە
53	لاجۇۋەرد
54	ئۇشىنە
55	كەپە يىلتىزى پوستى
56	يانتقاشىكىرى
57	ئاچچىق بادام
58	ئاچچىق ئەمەن
60	كەكەرە ئۇرۇقى
61	بېدە ئۇرۇقى
63	جىنتىيانا
64	ئېينۇلا
65	تومۇر دورىسى
66	سەرخىس
67	پىندىق
68	سەۋسەن يىلتىزى
69	زېيھان ئۇرۇقى
71	كاۋا ئۇرۇقى
72	پىلپىل يىلتىزى
73	دۇم بەدىيان

74	ئارپىبەدەيان يىلتىزى پوستى
75	چاققاڭقۇت ئۇرۇقى
76	ئاچچىقتاۋۇز
77	چىلاپا
78	خېنە يوپۇرمىقى
79	ھوپارىقۇن
81	سۆرۈتجان
82	بادىمنجى بۇيا چىنى
84	ئىزخىر
85	ھەببۈلئاس
86	بابۇنە
87	زەيتۇن يېغى
88	زۇپا
89	ئىسبەغۇل
90	ئادراسىمان ئۇرۇقى
91	ئادراسىمان
92	پىلە غوزسى
93	جاۋوشىر
94	قارا كۆز بەدىيان
95	سەرىپستان
96	قۇندۇز قەھرى
98	تەرتىز
99	غۇنچىشۇرۇم
100	چۆپچىن
101	لوبىيا
102	سېرىق نۇت
103	پالاك ئۇرۇقى
104	تەرخەمەك ئۇرۇقى
105	يَاۋا پىياز
106	ئىتىياڭقى ئۇرۇقى
107	ئىتىياڭقى يوپۇرمىقى
108	قۇشقاچ مېڭىسى
109	كېۋەز چىچىكى
110	قەنبىل

111	قارا قىچا
112	قارا چۈمۈلە
113	بۇچقۇن پاقا
114	ئازغان مۇنچىقى
116	بېھى ئۇرۇقى
117	بېھى
118	ئاق لەيلىگۈل
119	قوغۇن ئۇرۇقى
120	شىنجاڭ ئارچا مېۋسى
121	قارىئۇرۇڭ
122	كىسلەنچۈڭ
123	نېلىپەر
124	ئۇستقۇددۇس
125	مەستىكى رۇمى
126	نوقۇت
127	سۇماق

تەيیار دورىلار

129	ئارىپبەدىيان ئەرقى
130	قۇرسى جاۋارىش نامىلە
131	قۇرسى كەھرىۋا
132	مەجۇنى نۇجاھ
134	پىننە گۇلقەنتى
135	مەجۇنى جاۋارىش مەرۋايت
137	شىپابى مەزى بىزى تۈچىملىكى
139	غار-غار سۆيى
141	قۇرسى شاھىتەرە
143	قۇرسى ئىمساك
145	ئەنجىباھار شەربىتى
147	نانخا جەۋەھەرى
149	تەنكار كاپسۇلى
151	قۇرسى لوغانزىيا
153	قۇرسى جاۋارىش زەرئۇنى
155	قۇرسى جاۋارىش ئۇدتۇرۇش
157	مامراان كاپسۇلى

159	قۇرسى كېرىت
160	قۇرسى سۈزاب
161	بۇزۇرى جەۋھەرى
162	مەلھىمى بۇۋاسىر
164	قۇرسى مۇقەل
166	ھەبىۋئائىش شەربىتى
167	سۇفۇپى قەشىپ
169	قۇرسى كاڭىنەج
170	ئانار پوستى تازىلىق سۇيۇقلۇقى
173	ھەبى مارى بەرمىس
175	قۇرسى بابۇچى
176	سۇفۇپى ھېلىلە سىياه
178	زىماتى بەرمىس
179	مەجۇنى تۇرىفلى ئامان
180	قۇرسى پەرفېيون
181	كالىزىرە ئۇكۇلۇ
183	قىزىلگۈل ئىچىملىكى
184	گۈلقەنت
186	سۇمبىل ئىچىملىكى
187	ھەبى لوبۇنى كەبىر
189	قۇرسى مەسەها
191	مەجۇنى تۇرىفلى كەبىر
192	قۇرسى كۈندۈر
194	دىنار شەربىتى
196	ئۇرىشىم ئىچىملىكى
198	بىندىپىشە شەربىتى
200	قۇرسى زىبابىت
202	سەندەمل شەربىتى
204	مۇنزىچ جەۋھەرى
206	بادام جەۋھەرى
208	زىماتى كالىزىرە
210	زەپەر ئىچىملىكى
212	قۇرسى غارىقۇن
213	ھەبى كالىزىرە
214	ئادراسىمان ئۇرۇقى مەلھىمى

قەلەھىپۇر يېغى

丁香油 Ding xiang you
OLEUM CARYOPHYLLI

بۇ دورا مىركىس ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك قەلمەپۇر Eugenia caryophyllata Thunb نىڭ قورۇغان غۇنچىسىنى سۇ ھورىدا پارلاندۇرۇپ تېلىنغان تۇچۇچان مايدىن ئىبارەت. «شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» بۇ، ئاچ سېرىق ياكى رەڭىز سۈزۈك مايسىمان ئېرىتمە بولۇپ، ئالاھىدە خۇش پۇراقلق كېلىدۇ. تۇستىنى تۇچۇق قوبىغاندا ياكى ئۇزۇن ۋاقت ساقلىغاندا تەدرىجىي قويۇلۇپ، رەڭىگى سارغۇچ قوشۇر رەڭىگە ئۆزگەرىدۇ. بۇ دورا ئېتىل ئالکوھۇل، ئېتىر ياكى قاتىق سىركە كىسلاتسىدا ئاسان ئېرىدى، سۇدا ئاساسەن ئېرىمەيدۇ.

【تەكشۈرۈش】 نىسپىي زىچلىقى 1.038~1.060 بولۇشى (قوشۇمچە VII A) كېرەك.

【تەبىئىتى】 3-دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ھەممە ئەزىزلىقى قۇۋۇملىپ، نېرۇتىلارنى ئۆزۈقلەندۈرۈدۇ، جاھىل بەلغەمنى بوشىتىدۇ. 3-دەرىجىلىك سوغۇق دورا (مىسىلەن: نېيىون) نىڭ زەھىرىنى كېسىدۇ. زىققە، بەلغۇم كۆپ بولۇش، ئېغىزى سېسىق پۇراش، كۆكىرەك پەرەدە ياللۇغى (زاتلىجىنبە) فاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. بەدمەن سىرتىدىن ھەر خىل سوغۇقتىن بولغان ئاغرىشلارغا، مۇچىلەر ئۇيۇشۇپ قىلىش، ئۇششۇك ۋە مېڭە-يۈلۈن كېسەللەكلىرىدىن كېلىپ چىقىلۇن پالىچ (لۇقا) لەرگە سۈرەكمىشكە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش تۈسۈلى ۋە مىقدارى】 1-3g بەدمەن سىرتىغا مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

【ساقلاش】 ئاغزىنى مەھكەم ئېتىپ، قلاڭغۇ، سالقىن جايىدا ساقلىنىدى.

ئارپا

大麦 Da mai
FRUCTUS HORDIMI

بۇ دورا باشاقلىقلار ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئارپا *Hordeum vulgareL* نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقان دېنى بولۇپ، ياز پىسىلى دېنى پىشقاندا، يەر ئۆستى قىسىنى ئورۇپ، ئاپاتا قۇرۇتۇپ، دېنىسى سوقۇپ، ئەخلەتلەرىدىن ئايىرىپ تەبىيارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا موکا شەكىللەك، ئىككى ئۇچى ئۇچلۇق بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 6.5~10mm، دىئامېتىرى 2.5~4mm، قېلىنلىقى 1.5~2.5mm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى سارغۇچ، دۈمبه تەرىپى يۇمىلاق بولۇپ، ئۇنى تاشقى گۈل چىنسى ئوراپ تۇرىدۇ. بىش تومۇرلۇق، ئۇچ تەرىپىدىكى ئۇزۇن قىلىرىقى ئۇزۇلۇپ چوشكەن بولىدۇ، قورساق تەرىپىنى ئىچكى گۈل چىنسى ئوراپ تۇرغان بولۇپ، بىر تال تىك تېرىقچىسى بولىدۇ. ئىچكى-تاشقى گۈل چىنسىنى ئېلىشەتكەندىن كېيىن، دان پوستى سېرىق بولىدۇ، ئۇنىڭ جىسمى قاتىقى، كەسمە يۈزى ئاقۇش، تالقاندەك بولىدۇ، پۇرمىайдۇ، تەمى سەل قېرىق بولىدۇ. مىڭ دانسىنىڭ تېغىرلىقى تەخىمنەن 30g كېلىدۇ.

【يەرقەلەندۈرۈش】 مەزكۇر دورىنىڭ كۆندىلەك كەسمە يۈزىدە: يۈزە پوستى هۇجەيرىسى بىر قاتار ئۇزۇنچاق چاسا شەكىللە ئۇرۇنلاشقان، كېپەكلىشكەن قەۋىتى بىر قانچە رەت بېسىلىپ يايپلاق بولۇپ قالغان هۇجەيرىلەردىن ئىبارەت. ئۇرۇق پوستى ئىچكى قەۋىتىنىڭ نېپىز دىۋار هۇجەيرىلىرى ئۇزۇنچاق چاسا شەكىلگە يېقىنراق ياكى ئۇزۇنچاق چاسا شەكىللە بولىدۇ. تۆرەلمە سوت قەۋىتىگە كراخمال دانىچىلىرى تولغان بولىدۇ.

پاراشوكى ئاچ سېرىق رەڭلىك، گۈل چىنە سرتقى پوست قەۋەت هۇجەيرىسى سېرىق، ئۇزۇنلۇقى 56~184 μm ، دىئامېتىرى 8~19 μm ، دىوارى سەل-پەل قېلىن، دولقۇنىسىمان ئەگرلىشكەن بولىدۇ. پۇرۇپكا هۇجەيرە هىلال ئايىسىمان، ئىچىدە قوڭۇر رەڭلىك ماددىلار بولىدۇ. كەمنىبىلىق هۇجەيرە بىر قەدر كىچىك، يايپلاق-دۇگىلەك شەكىللە بولىدۇ. كراخمال دانىچىلىرى يۇمىلاق، سوقىچاق ياكى توخۇمسى-مان بولۇپ، كىندىك توچىكسىنى چاكسىمان، «八» شەكىللەك ياكى تاقا شەكىللەك بولىدۇ. دىئامېتىرى 8~29 μm كېلىدۇ. كۆندىلەك هۇجەيرە دىۋارى نېپىز، ئۇزۇنلۇقى 144 μm ~40 μm ، دىئامېتىرى 13~24 μm كېلىدۇ. بەزلىرى سەل-پەل ئۇششاق تەسۋىسىمان قېلىنىغان بولىدۇ. يەككە هۇجەيرىلەر بەزسىز تۇتىلىرىنىڭ دىئامېتىرى 18 μm ~8 μm ، دىۋارىنىڭ قېلىنلىقى 6~3 μm كېلىدۇ.

【تەبىئىتى】 1-دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 بەدەندە سەپىرا، قان خىلىتلىرىنىڭ كۆپىيىشنى تۆۋەنلى-تىپ، بەلغىم بوشىتىپ، توسالغۇلارنى ئاچىدۇ، قان كۆپەيتىپ، تېرىلەرنى سىلىقلاشتۇرۇدۇ. خىلىت پەيدا قىلىپ ئۆسۈزۈلۈقىنى باسىدۇ. جىڭەرنى ھاراھات قاپىلاب قىزىتمىداش، ئاغىزى قۇرۇپ، ئىچى تىتىلداش، قۇرۇق يۆتەل، تېرىلەر قىچىشىش، گال-كېكىرەتكە، قولتۇق ئاستى، قولاق ئارقىسى ئىشىش ئاغرىش فاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 3 دىن كۆپىنچە باشقا دورىلارغا قوشۇپ ئىشلىلىدۇ. يەككە ئىشلەتكەندە 50g~20 قايىنتىپ ئىچىلىدۇ. بەدەن سرتىغا مۇۋاپق مىقداردا ئىشلىتىلە بولىدۇ.

【ساقلاش】 سايە، سالقىن، قۇرغاق جايىدا ساقلاپ، مىتە چوشۇشتن ساقلىنىش لازىم.

پەرفیوں

大戟脂 Da ji zhi
EUPHORBIUM

بۇ دورا يالمانقۇلاق ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك ياقلىق پەرفیوں Euphorbia resinifera Berger نىڭ سېغىزىمىان ئاچراتىمىسى بولۇپ، مەزكۇر تۆسۈملۈك غولىنىڭ قىرىلىق قىسىمى قوۋۇزىقىنى پىچاڭ بىلەن تىلىپ، ئۇقىپ چىققان سوتىمىان شىرىسىنى يېغۇپلىپ، سايىدا قۇروتۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 مەزكۇر دورا تەرتىپىسىز مونە كىسىمان ياكى تامچىسىمان ماددا بولۇپ، چوڭ-كىچىكلىكى بىردهك بولمايدۇ، دىئامېتىرى 3cm غا يىتىدۇ. رەڭگى قارامتۇل سېرىق ياكى سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، هوڭ، يېڭىسىنىڭ رەڭگى ئاچراق، جىسىمى چۈرۈك كېلىدۇ. بېزلىرىدە مەزكۇر تۆسۈملۈك نىڭ يىپۇرماق پارچىلىرى، چېچىكى ۋە مېۋىلىرى ئارىلاش بولىدۇ. پۇرىقى ئاچىزراق بولۇپ، قىزدۇرغاندا بىز مېيىغا ئوخشاش خوش پۇرىقى كېلىدۇ. تەمى قېرىق، ئاچچىق ھەمەدە ئالاھىدىرەك بولىدۇ. پاراشوكى ئورگانىزم شىلىق پەردىلىرىنى كۈچلۈك غىدىقلاب، چۈشكۈردى.

بۇ دورا سىركە كىسلاقاتىسا تولۇق دېگۈدەك ئېرىدى ھەمەدە ئىككى ھەمسىسى 75% لىك ئىسپىرت، ئۇچ ھەمسىسى نېفت ئېرىدىدا ئېرىدى.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنىڭ پاراشوكى سارغۇچ ئاق رەڭلىك بولۇپ، ئۇنىڭدا نۇرغۇنلىغان دانىچىسىمان ماددىلار بولىدۇ. قىزدۇرغاندىن كېيىن ياغ تامچىسىدەك ھالەتكە كېلىدۇ ھەمەدە ئۇنىڭدا ئاز مقداردا تۆسۈملۈك تالالرى ۋە نەمچىلەرنى كۆرۈشكە بولىدۇ.

(2) مەزكۇر دورا پاراشوكىدىن 0.01g 0.01g، نېفت ئېرىدىن 10ml قوشۇپ، چالغىتقاندىن كېيىن بىر سائىت چۆكتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيۈقلىقىنى پىروپىرىكىغا قۇيۇپ، تەركىبىدە ئاز مقداردا نىترات كىسلاقاتىسى بولغان سۇلۇفات كىسلاقاتىسى سۈيۈقلىقىغا ئاستا-ئاستا بىر نەچچە تامچە تامغۇزاندا، ئىككى خىل سۈيۈقلىقنىڭ تۇتاشقان چېڭىسى قىزىل رەڭگە ئۆزگەرىدى.

【تەكشۈرۈش】 ئومۇمىي كۈلى 10.0% (قوشۇمچە K IX) دىن ئېشىپ كېتىشكە بولمايدۇ.

【تەبىئىتى】 4-دەرىجىدە قۇرۇق ىسىسىق. رىش تەسىرى بار. بەلغەم خىلىتىدىن بولغان لەقۋا، يۈز پالچى، ھۆشىزلىق، تىرىمەش كېلىلى، قورساقا سۇ چۈشۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. يۇقىرىقى كېسەللەكەرنى داۋالاشقا ياغ بىلەن تەڭشەپ، بەدەن سەرتىدىن چېپلىدۇ.

【ئىشلىتىلىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە بىر قىتىم، ھەر قىتىمدا 0.2~0.4g دىن ئىشلىتىلىدۇ.

【دىققەت】 مەزكۇر دورا زەھەرلىك بولۇپ، دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىشلىتىش لازىم.

【ساقلاش】 ئېغىزىنى مەھكەم ئېتىپ، سالقىن، قۇرغاق جايىدا ساقلاش لازىم.

WS₃-BW-0004-98

لَا حِنْدَانَه

小豆蔻 Xiao dou kou
FRUCTUS CARDAMOMI

بۇ دورا زەنجۇھۇل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك لاچىندانه Elettaria cardamomum White et. Maton نىڭ قۇرۇق تۇلغان، بېتىلگەن مېۋسى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىلىدە يىغۇپلىنىپ، سالقىندا قۇرۇق تۇلۇدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا ئۆزۈنچاڭ تۇخۇم سىمان، ئىككى تەرىپى ئۇچلۇق، ئۇچىسىز ئۇچ قىرلق بولىدۇ، ئۇرۇنلۇقى 10mm ~ 20mm، دىنامېتىرى 5 ~ 10mm كېلىدۇ. سرتقى يىۋى ئاچ قوڭۇر رەڭلىكتىن كۈل رەڭ ئاقۇش رەڭگىچە، سىرتىدا ئۇشاق تىك سىزىقچىلار بولىدۇ. ئۇستى ئۇچىدا تۇۋۇرۇك بېغى پۇلتىيىپ چىققان، تۇۋى قىسمىدا ئۇبىقۇپ كەتكەن ساپاپ ئىزى بولىدۇ. مېۋى پوستى مۇستەھكم بولۇپ ئاسان يېرىلمىيەدۇ. ئۇرۇقدىنى ئۇچ خانىلىق بولۇپ، ئۇتتۇرا ئۇقىدا تۆرەلمە تەكتى ئۇرۇنلىشىدۇ. ھەر بىر خانىدا 5 ~ 9 تال ئۇرۇق بولىدۇ. ئۇرۇقى ئۆزۈنچاڭ تۇخۇم سىمان ياكى 3 ~ 4 تەرمىلىك بولىدۇ.

ئۆزۈنلۈقى 3 ~ 4mm، قېلىنىلىقى تەخمىنەن 3mm كېلىدۇ. سرتقى يىۋى سۇس جۈزە رەڭ ياكى قارامتۇل قىزغۇچۇج رەڭلىك، دۇمبىھ تەرىپى ئازاراق بۇلتايغان، قورساق تەرىپىدە تېرىقىسىمان سىزىقى بولىدۇ. سىرتىنى رەڭسىز نېپىز پەرسىمان ساختا پوست ئوراپ تۇرىدۇ. ئۇزۇلگەن يىۋى ئاچ بولۇپ، كۈچلۈك خۇش پۇرالقىق، تەمى سەل قېرىق، ئاچىچىق بولىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 مەزكۇر دورا مېۋە پۇستىنىڭ كۆنديلەڭ كىسمە يۈزىدە، نۇتۇردا پۇست ھۈجىرسىدە قوڭۇر رەڭلىك سېغىزى بولىدۇ. تۇتكۈزگۈچ نەمىچە غىلىپىنىڭ سىرتقى تەرىپىدە تالالار تۈركۈمى بولۇپ، تالالرىنىڭ دىئامېتىرى $20\text{ }\mu\text{m}$ ~ $12\text{ }\mu\text{m}$ ، دىۋارى سەل قېلىنراق بولىدۇ.

ئۇرۇقنىڭ كۆنديلەڭ كىسمە يۈزىدە: پۇست ھۈجىرىلەر بىر رەت تىزىلغان بولۇپ، شەكلى تۇزۇن، يۇمىلاق ياكى تۇزۇنچاق چاسا شەكلىدە بولىدۇ. تۇزۇنلۇقى $50\text{ }\mu\text{m}$ ~ $80\text{ }\mu\text{m}$ ، كەڭلىكى $40\text{ }\mu\text{m}$ ~ $50\text{ }\mu\text{m}$ كېلىدۇ.

پىكىمېت ھۈجىرىلەرى بىر رەت تىزىلغان، دىۋارى نېپىز، يايلاق بولىدۇ. ياغ ھۈجىرىلەرى تۇزۇن چاسا شەكلىدە بىر رەت تىزىلىپ، كىسىمىسى $180\text{ }\mu\text{m}$ ~ $240\text{ }\mu\text{m}$ ، دىئامېتىرى $60\text{ }\mu\text{m}$ ~ $80\text{ }\mu\text{m}$ كېلىدۇ. ئىچكى تۇرۇق پۇستى بىر رەت تىزىلغان تۇزۇن چاسا تاش ھۈجىرىلەردىن ئىبارەت بولۇپ، تۇزۇنلۇقى $50\text{ }\mu\text{m}$ ~ $60\text{ }\mu\text{m}$ ، كەڭلىكى تەخىمنەن $40\text{ }\mu\text{m}$ ، توغرىسىغا تۇزارغان، ئىچكى ۋە يان تەرەپ دىۋارى ناھايىتى قىلىن، ھۈجىرى بوشلۇقى سىرتقى تەرمىتە ناھايىتى كىچىك، ئىچىگە كەرىمنىلىق ماددىلار چايلاشقان بولىدۇ.

2- ده حجه قهقهه تسسق:

«تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» ئاشقازاننى كۈچەيتىپ، تۇزۇقلۇنىشقا ياردىم بېرىدۇ. نىج سۈرۈش، قەي قىلىشنى توخىتىدۇ، ئېغىزنى خۇشبۇي قىلىپ، كۆكۈلنى خۇشخۇي قىلىدۇ. قورسقى ئڭىزىپ، ئاشقازاننى كۆپۈش، ئىشتەسسى تۇتۇلۇپ، كېكىرىش، ئۇغىزى پۇراپ، كۆكلى ئېلىشىش، ئىچى سۈرۈپ، ھە يولۇش، ئېغىن، تىللەرغا جاراھەت حىقىش، شەققە قاتار لەقلاغا،غا ئىشلىتىلدى.

۳~۶g گل پرورشی مقداری ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میکروگرام

ساقلاش】 قورغاق جايда ساقلىنىدۇ.

زىرىق مېۋسى

小檗果 Xiao bo guo

FRUCTUS BERBERIS

بۇ دورا زىرىق ئائىلىسىدىكى تۇسۇملۇك قىزىل مېۋلىك زىرىق Berberis nummularia Bge نىڭ قۇرۇتۇلغان، بېتلەگەن مېۋسى بولۇپ، كۈز پىمىلىدە يىغۇبىلىنىپ، ئاپاتا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا تۇخۇمسىمان، سوقچاق ياكى يۇملاقراق بولۇپ، تۇزۇنلۇقى 7~12mm، كەڭلىكى 5~8mm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى سىلىق ياكى ئازراق قورۇتۇغان، رەڭگى قارامتۇل سۆسۈن بولۇپ، ئادەتتە سىرتىنى كۈل رەڭ ئاقۇش تۇپسىمان قىرو قاپلاب تۇرىدۇ. مېۋە پوستى نېپىز ھەم چۈرۈك بولۇپ، ناھايىتى ئاسان بېزلىدۇ. بېزلىگەن يۈزى قارامتۇل سۆسۈن رەڭدە بولىدۇ. بەزىدە مېۋە ساپقى ڭۈچرايدۇ. تۇزۇنلۇقى تەخىمنەن 5mm كېلىدۇ. مېۋە ساپقى بار تۈرۈندا 3~6 قارامتۇل سۆسۈن رەڭلىك، تۇچى تەرىپى ئازراق بېڭلىگەن، تۇقۇ تەرىپى دىقماق، تۇزۇنلۇقى تەخىمنەن 5mm كېلىدىغان سىلىق تۇرۇقلىرى بولىدۇ. پۇرېق ئاجز، تەمى سەل چۈچۈمەل كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 مەزكۇر دورىنىڭ تالقىنى قارامتۇل سۆسۈن رەڭلىك كېلىدۇ. مېۋە پوستىنىڭ رىشاتكىسىمان تاش ھۈجەيرىلىرى ئاچ سېرىق رەڭلىك بولۇپ، تۇزۇنلۇقى تەخىمنەن 80 μm ، كەڭلىكى 20~40 μm كېلىدۇ. ئىچىدە قارامتۇل سۆسۈن ماددىلار بولىدۇ. ٹۇتۇرا مېۋە پوستىدىكى نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلەر تەرتىپىز بولۇپ، ئىچىكە نۇرغۇن قارامتۇل سۆسۈن رەڭلىك ماددىلار ۋە ئاز مقداردا دانىچىسىمان ماددىلار تولغان بولىدۇ. نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلەرنىڭ تۇتۇرسىدا دائىم تۇزۇنچاق چاسا شەكىلىك تاش ھۈجەيرىلە دنى تۇچراقلى بولىدۇ. تۇنىڭ رەڭگى ئاچ سېرىق، ھۈجەيرە بوشلۇقى چواڭ بولۇپ، تۇزۇنلۇقى تەخىمنەن 120 μm ، كەڭلىكى 6 μm كېلىدۇ. ھۈجەيرە بوشلۇقىدا پىكىپىنتىلىق ماددىلار بولىدۇ. مېۋە ئىچىكى پوست ھۈجەيرىلىرى چاسا شەكىلدەرەك بولۇپ، دىۋارى توشۇكلىك، رەڭگى ئاچ سېرىق، ئىچىدە پىكىپىنت بار بولىدۇ. تۇرۇق پوستىنىڭ رىشاتكىسىمان ھۈجەيرىلىرىنىڭ سرتقى دىۋارى قىلىن، كۈل رەڭ ئاقۇش رەڭلىك، مۇڭگۈز لىشكەن ماددىدەك، تۇزۇنچاق چاسا شەكىلىك بولىدۇ. تۇزۇنلۇقى تەخىمنەن 100 μm ، كەڭلىكى 20~50 μm كېلىدۇ. تۇرۇق پوستىنىڭ تاش ھۈجەيرىلىرى رەقىزىز، بوشلۇقى كىچىك بولۇپ، دىۋارىدا توشۇك ۋە توشۇكلىك سىزىقچىلار بولىدۇ. تۆرەلمە سوت ھۈجەيرىلىرى كۆپ بۇرۇچەكلىك بولۇپ، تۇنىڭدا تۇپسىمان دانىچىلار ۋە ياغ تامىچىلىرى بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 مۇتىدلە.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئاشقازاننى كۈچلەندۈرۈپ، مىجەزنى تەڭشەيدىدۇ. خىلتى كۆپەيتىپ، تۇسسىزلۇقى باسىدۇ. قىزىتىمىنى ياندۇرۇپ، زەھەر قايتۇرۇدۇ. ھەزىم قىلىش ناچارلىق، ئىچى سورۇپ توختىماللىق، ئېغىزى قۇرۇش، ئېغىزغا جاراھەت چىقىش، گال ئاغرىقلىرىغا تىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش تۇسۇلى ۋە مقدارى】 3~6g

【ساقلاش】 قۇرغاق جايىدا ساقلىنىدى. بېسلىشتىن ساقلىنىش لازىم.

قۇرۇق سايىۋا ئۆزۈم

马奶子葡萄干 Ma nai zi Pu tao gan

FRUCTUS VITIS MANAIZI

بۇ دورا ئۆزۈم ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك ئۆزۈم Vitis Vinifera. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقان مېۋسى بولۇپ، كۈز پەسىلى مېۋسى پىشقان چاغدا يىغىۋېلىنىپ، شامالدا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 مەزكۇر دورا قىسقا سىلىندرىسىمان ياكى موکىسىمان شەكىلده بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 3cm~2cm، كەڭلىكى 1.5cm~1 كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى سارغۇچ بىشىل ياكى قىزغۇچ قوڭۇز رەگىدە بولۇپ، نۇرغۇنلىغان تىك قورۇق سىزىقچىلىرى بولىدۇ. مېۋە پوستى نېپىز ھەم يۇشاشق بولۇپ، مېۋە ئىتى ئۇڭاي ئېزىلىدۇ. ئىچىدە دائىم 3~1 تال، ئۇچبۇرجهك تۇخۇمىسىمان ئۇرۇقى بولىدۇ، پۇرۇقى ئاجىزراق، تەمى سەل چۈچۈمەل، تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 مەزكۇر دورىنىڭ تالقىنى سارغۇچ قوڭۇز رەگىدە، چاپلىشاڭغۇ ھالەتتە بولىدۇ. مېۋە سىرتقى پوستى ھۈجەيرىلىرى كۆپ بۇرجهكلىك بولۇپ، بەزلىرىدە كىرسىتالىدەك دەستىلەر بولىدۇ. مېۋە ئۆتۈرۈپ بىستىدىكى نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلىر چوڭ بولۇپ، ئۇنىڭدا غۇزىمەك كىرسىتالىلار ۋە قەمنىلەر بولىدۇ. مېۋە ئىچىكى پوستىدىكى ھۈجەيرىلەر دە نۇرغۇنلىغان قەنتلىك چاسا كىرسىتالىلار بولىدۇ. ئۇرۇق پوست ھۈجەيرىسى ئۆزۈن سوقىچاقراق، ئۇششاق، دىۋارلىرىدىكى تۆشۈكىلەر ئېنىق بولىدۇ. ئۇرۇق ئىچىكى پوستى تور سىزىقلق ھۈجەيرىلەردىن ئىبارەت. تۆرمە سوت ھۈجەيرىسىدە نۇرغۇنلىغان دانىچىسىمان ماددىلار ۋە ياخ تامىچىلىرى بولىدۇ. تالا، نىيچىلىرى ئۇششاق، كىچىك بولىدۇ.

【تەبئىتى】 1-دەرىجىدە قۇرۇق ئىسسق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 بەدەننى چىڭتىدۇ، خىلتىلارنى پىشۇرىدۇ. تو سالغۇلارنى ئىچىپ، ئىشىشىقنى ياندۇرىدۇ. بەدەننى ئاجىزلاپ، قېنى ئازايغانلار، جىڭرى ئاجىزلاپ، قەۋزىيەت بولغانلارغا، بەدەن خىلتىلىرى قويۇلغانلار، ئىچىكى ئەزىزلاردა تو سۇلۇش بولغانلار، بەدەن جۇدەپ كەتكەنلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 10~30g

【ساقلاش】 شامال ئۆتۈشىدىغان قۇرغاق جايىدا ساقلاپ، مىتە چۈشۈشتىن ساقلىنىش لازىم.

سېمىز ئوت ئۇرۇقى

马齿苋子 Ma chi xian zi
SEMEN PORTULACAE

بۇ دورا سېمىز ئوت ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سېمىز ئوت Portulaca olera ceal نىڭ قۇرۇقى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىللەرىدە ئۇرۇقى پىشقانىدا، پۇتۇن چۆپىنى يىغىپ ئاپتاتا قۇرۇتۇپ، ئۇرۇقىنى قىقىپ چۈشۈرۈپ، تازىلاب، يىغىپ ئېلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا يايپلاق، يۇمىلاق ياكى بۇرەك شەكلىدە بولۇپ، دىئامېتىرى 0.7~1.1mm، قېلىنلىقى 0.4mm. سىرتقى يۈزى قارا ياكى قارامتۇل قوڭۇر رەڭىدە بولۇپ، سەل پارقرايدۇ. ئاناتومىيە مىكروسكۆپىدا كۆزەتكەندە، سىرتقى يۈزىدە زىچ رەتلىك تىزىلغان دانىچە ئۆسۈكچىلەر كۆرۈلدى. يان تەرىپىدىكى سەل تۇيمان جايىدا كۈل دەڭ ئۇرۇق كىندىكى بولىدۇ. تۆرەلمە سۇتى ئاق، يېرىم سۈزۈك، پۇرۇقى ئاجىز، تەمى سۇس بولۇپ، مىڭ دانه ئۇرۇقنىڭ تېغىرلىقى تەخمىنەن 0.18g كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ پاراشوکى سۇس قىزغۇچۇ قوڭۇر رەڭلىك، ئۇرۇق پوستى ھۈجەيرىدە سى سۇس قوڭۇر رەڭلىك بولۇپ، دىئامېتىرى 30~75 μm ، دەوارى قېلىن، ئىچىدە رەتلىك تىزىلغان دانىسمان ئۆسۈكچىلەر بولىدۇ. ئۇرۇق يوستى ئاستى ھۈجەيرىسى سۇس قىزغۇچۇ قوڭۇر رەڭلىك بولۇپ، ئۇنىڭىدا قوڭۇر رەڭلىك، رەتسىز كۆپ بۇرەك شەكلى كەنەپەر بار. ھۈجەيرە ئارىلىق بوشلۇقى چۈگۈرەن بولىدۇ. شىلىمىشقى ماددا پارچىلىرى خېلى كۆپ ئۇچرايدىلغان بولۇپ، يەككە حالدا تاراققى كۆرۈنىدۇ ياكى 2~5 دانىسى قوشۇلۇپ تۇرىدۇ. دىئامېتىرى 150 μm ~120. ئاق ياكى قوش قەۋەتلىك بولۇپ، ئىچىدە تۆچىكسىمان شىلىمىشقى ماددا دانىچىلىرى بولىدۇ. دىئامېتىرى 150 μm ~80 μm كېلىدۇ. تو موچە نىچىلىرى پەلەمپەي سىزىقى شەكلىدە بولۇپ، ئاز ئۇچرايدۇ، دىئامېتىرى 25 μm ~15 كېلىدۇ. تاش ھۈجەيرىلىرىنىڭ دىئامېتىرى 10 μm ~30 μm بولۇپ، شەكلى يۇمىلاق، كۆپ بۇرەك شەكلى يۇمىلاق ئۆچ بۇرەك شەكلى بولىدۇ ھەممە ئانىچە كۆپ كۆرۈلمىدۇ. كالىسى ئۆكىسالات كىرسىتالى تاراققى بولۇپ، دىئامېتىرى 10~25 μm كېلىدۇ. ماي تامچىلىرى ناھايىتى كۆپ، رەڭگى سېرىق، شەكلى يۇمىلاق، چوڭ-كىچىكلىكى ھەر خىل، تاراققى ياكى بىر قانچىسى توبلاشقان حالدا كۆرۈلدى. كراخمال دانىچىلىرى يەككە دانىچىلەر بولۇپ، قەھۋەت سىزىقلەرى ئېنىق بولمايدۇ، كىندىك نۇقتىسى تۆچىكسىمان ياكى «八» شەكىلىك بولىدۇ. تۆرەلمە سۇت ھۈجەيرىسىنىڭ دەوارى نېپىز بولۇپ، ھۈجەيرە ئارىلىق بوشلۇقى بولمايدۇ. ئىچىدە سېرىق مومنە كىچىلەر بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 2-دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سەگىتىپ خىلت پەيدا قىلىدۇ، سۈيىدۈكىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئۆسۈزۈلۈقى باسىدۇ. ئۇرگانىزىمىدىكى سەۋۇدا خىلىتىنىڭ بۇقىرىلىشىنى تۆۋەنلىتىدۇ. ئىسىقلۇقى ئېشىپ كەتكەن كىسەللەككەر، ئاشقازان كېسىلى، باش ئاغرىش، بالىياقۇ ياللۇغى، مېڭە پەرددە ياللۇغى، سۈيىدۈك يۈول ياللۇغى ۋە قىزىتمىلىق تەپ قاتارلىقلارنى داۋالاشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 3~5g

【ساقلاش】 سالقىن، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ. مىتە چۈشۈشتىن ساقلىنىش كېرەك.

WS₃-BW-0008-98

دینہ دشہ

天山堇菜 Tian shan Jin cai

HERBA VIOLAE TIANSHANICAE

بۇ دورا كۈلبىنەپشە ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك بىنەپشە *Viola tianshanica* Maxim نىڭ قۇرۇق چۆپى بولۇپ، ياز پىسلىدە تۇنجى چىچە كىلگەندە كولاپ بىلىپ، ئاپتاتىا قۇرقۇنۇپ، نەخلمەتلەرى تازىلىۋىتىلىدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىيەتى】 بۇ دورنىڭ كۆپىنچىسى پۇرلىشىپ پارچىلىنىپ كېتىدۇ. پۇتۇنلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 3~7cm كېلىدۇ. غول يىلتىزى تومراق، كونۇس شەكىللەك بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 0.5~2cm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى سوْس بېغىر رەگدىن ئاقۇش كۈل رەڭگىچە بولىدۇ، رەتسز، تىك پۈرۈكلىرى بولىدۇ. يىلتىز غولىدا هالقىسىمان سىزىقلار ۋە يوپۇرماق سېپى قالداوقلىرى بولىدۇ. يوپۇرماقلىرى پۇرلەشكەن بولۇپ، ساق يوپۇرماقلىرى نەمدىلىپ ئىچىلغاندىن كېپىن قوشۇق شەكىلگە ياكى سوقىچاق شەكىلگە كېلىدۇ، رەڭگى كۈل رەڭ يېشىل، ئۆچى دەقامىق، تۈۋىي پانا شەكىللەك، تۆۋەنگە سوزۇلغان، ساپىقى ئۇزۇن بولىدۇ. چىچىكى كۆكۈش كۈل رەڭ، كۈل كاسىسى 5 پارچە، تىمنى شەكىللەك، كۈل بەرگى 5 يايلاق، تەتھۈر قوبۇلغان تۇخوم شەكىللەك، ئىككى تەرىپى سىممېتىك، كۆكۈش كۈل رەڭ، سەل خۇش پۇرماق، تەھى سەل قىرتاق بولىدۇ.

【پەقلەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ پاراشوکى سارغۇچ يېشىل رەڭلىك، ھاۋا كاۋاڭچىلىرى تۇراقىز شەكىلده، ئۇزۇن تۇقى تەخمىنەن $40\mu\text{m}$ ، قىسقا تۇقى تەخمىنەن $30\mu\text{m}$ كېلىدۇ. قاشا ھۆجىھىرىلىرىنىڭ تەركىبىدە كالتىسىي تۈكىسالات چاسا كرسىتاللىرى بولىدۇ. نېیز دىۋارلىق ھۆجىھىلىر تەركىبىدە نۇرغۇنلە خان كالتىسىي تۈكىسالات كرسىتال توپلىرى بولۇپ، دىئامېتىرى $18\sim60\mu\text{m}$ كېلىدۇ. تومۇرچە سىزىقلىرى بۇرما ياكى تور شەكىلde بولۇپ، دىئامېتىرى $30\sim9\mu\text{m}$ ، كۈل بەرگى سرتقى پوستى ھۆجىھىلىرى شورىغۇچىسمان بولىدۇ. كۈل چېڭى دانىچىلىرى ئاز تۇچىرايدۇ، شەكلى يۇملاقراق، چاڭدان ئىچكى دىۋار ھۆجىھىرسى تۇچبۇرچەكلىك بولۇپ، ھۆجىھىر دىۋارى ئۆزىگە خلس قېلىنلاشقان، دىۋار تۆشۈكى ئىنىق بولىدۇ.

لایقلاشتۇرۇش】 ئىمپۇلتۇرى تازىلىنىدۇ.

برنجهی دهنجده هول سوغوق. **【تەبىئىتى】**

«نهسلىرى وە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» غەيرىي تېبئىي سەپارانى يېنىك سۈرگۈزۈپ، قاننىڭ ئىسىقلقىلىقى ئېشىپ كېتىشنى تەڭشەيدۇ، خىلىت پەيدا قىلىپ نۇسۇزلۇقنى باسىدۇ، تەرلىتىپ قىزىتما قايتىرۇدۇ. ئىسىقتىن بولغان زۇكام، قىزىتما، باش ئاغرىش، گال ئاغرىش، مۇچىلەر سۇشىش، باللاردىكى دۆيىلىنىشنى داۋالايدۇ. بەدمەن سرتىدىن چاقلا-جاراھەت، غەلۋىرەك ئۇلغىش قاتار لقىلارغا ئىشلىتىلدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 6~12g . بەم سىرىتىدىن ئىشلەتكەندە مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

سالقىن، قۇرۇق ئورۇندادا ساقلىنىدۇ.

بىنەپىشگۈلى

天山堇菜花 Tian shan Jin cai hua
FLOS VIOLAE TIANSHANICAE

بۇ دورا گۈلبىنەپىشە ئائىلىسىدىكى بىنەپىشە Viola tianshanica Maxim نىڭ قۇرۇق گۈلى بولۇپ، ياز پىسلىدە چىچەكلىگەندە گۈلى يىغىپ تېلىنىپ، سايىدا ياكى ئاپتاتا قۇرۇتۇلدۇ. يەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا كۆپىنچە قورۇلۇپ، يۆكىلىپ تۇرىلدۇ. ئاسان ئۇۋىلىدۇ. رەتسىز بولىدۇ. بېجىرىملىرىنىڭ تېچىلغاندىن كېيىن 5 دانه گۈل چىنسى كۆرۈنىدۇ. ئۇنىڭ رەڭىسى سارغۇچ بېشىل ياكى سارغۇچ تېقىش بېشىل رەڭىدە بولۇپ، تىمنىھ شەكىللەك، ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 2mm كېلىدۇ. گۈل بەرگى 5 پارچە، ئىككى تەرىپى سىممېتىك، گۈل بەرگىسى تەتۈر قويۇلغان تۇخۇم شەكىلдە، توۋەنلىكى بىر پارچىسى چوڭراق ھەممە ئارىلىق قالدۇرغان بولىدۇ. ئارىلىقى خالتا شەكىللەك بولۇپ، يان بەرگىلىرى كىچىكىرەك، گۈلى كۆكۈش كۈل رەڭىدىن سۇس كۆك رەڭىچە بولىدۇ، ئۇزۇنلۇقى 5~12mm كېلىدۇ. ئانلىقى 5 دانه، چاڭدىنى يايپلاق كەڭ، سېرىق رەڭلىك، ئانلىق يىپى بەك قىستا. ئانلىقى بىر دانه، ئۇرۇقدىنى بىر دانه بولىدۇ. بەزىدە يىپتەك ئىنچىكە گۈل ساپاقلىرى كۆرۈنىدۇ. پۇرۇقى ئاجىز، تەمى سۇس بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ پاراشوكى كۆكۈش كۈل دەڭ. كۈل چاڭ خالتسى ئىچىكى دەۋار ھۇچىرىلىرى ئۇزىنگە خلس قېلىلاشقان، دەۋار تۆشۈكچىلىرى تېنىق بولىدۇ. ھاۋا تۆشۈكلىرى ئاز، تۇراقىسىز، قوشۇمچە مۇھاپىزەت ھۇچىرىلىرى كۆپىنچە 4~3 دانه بولىدۇ. گۈل بەرگىسى سرتقى پۇستى ھۇچىرىلىرى شورىغۇچىسىمان؛ نېپىز دەۋار ھۇچىرىلىرى چوڭراق بولۇپ، بەزىلىرىدە كىچىك چاسا كىرسىتال كۆرۈلەندۈ. توپلاشقان كىرسىتاللار ئاز ئۇچرايدۇ. تومۇرچە سىزىقلىرى بۇرما ياكى تور شەكىلдە بولىدۇ. گۈل چىڭى دانچىلىرىنىڭ كۆپىنچىسى 3 تېرىقچە شەكىلдە. بەزىدە يەككە ياكى 3~2 دانه ھۇچىرىلىك بەز تۇشتىلىرى كۆرۈلەندۈ. تالالىرى ئۇزۇنچاق موکا شەكىللەك بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 بىرىنچى دەرىجىدە سوغۇق، ئىككىنجى دەرىجىدە ھۆل. ئەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 زەھەر قايتۇرۇش، قىزىتىما ياندۇرۇش، تەرىلىتىپ ئىشىش ياندۇرۇش تەسىرى بار. ئىسىقتىن بولغان زۇكام، قىزىتىما، گال ئاغرىش، كۆز ئىشىش، ئۆپكە ياللۇغى، يارا-جاراھەتلەرگە ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 5~15g
【ساقلاش】 سالقىن، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

ئوق يیلان

中介蝮蛇 Zhong jie Fu she

AGKIS TRODON HALIS

بۇ دورا زەھەرلىك قارا يیلان ئائىسىدىكى هايۋان ئوق يیلان Agkistrodon halys pallas. intermediums (strauch) يېڭى ياكى قۇرۇتۇلغان تېنى بولۇپ، كۆپىنچە ياز، كۆز پەسىللەرىدە تۇنۇلۇپ، قورسقىنى يېرىپ، ئىچ باغرىنى ئىلىپ تاشلاپ، پاڭز يۇيۇپ تازىلاپ، شۇ بېتى ئىشلىتىلىدۇ ياكى قورساق بوشلۇقغا ئاش تۇزىنى تەكشى سېپپ، ياغاج تاختا بىلەن قورساق قىسىنى كېرىپ ئېچىپ قۇرۇغاندىن كېپىن ياغاج تاختا ئىلىۋېتىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ خىل يیلاننىڭ ئۇزۇنلۇقى 60cm~50， تۈز چۈنۈقسىمان، بېشى ئۇچبۇرجدەك شەكلىدە، سەل يايپلاق، كۆز ئالدىدا مەڭز ئۇيمىنى بولىدۇ، تۇمۇق قاسىراقلىرى ئېنىق، بۇرۇن ئارىلىق قاسىراقلىرى كەڭ، باش دۇمىبىلەرىدە سىممېتىرىك چوڭ قاسىراقلار بولىدۇ. چىكە قىسىدا بىر تال قارا سىزىق بولۇپ، ئۇنىڭ تۇستۇنکى گىرۋىتكىدە ناھايىتى ئېنىق بىر تال ئىنچىكە ئاڭ سىزىقچىسى بولىدۇ. دۇمبىه قاسىراقلىرى قىرقىق بولۇپ 23~21، 17 قاتار، گەۋەدىسىنىڭ دۇمبىه تەرىپى كۈل رەڭ قوڭۇر رەڭلىك بولۇپ، قارا نەقىشلىق توق بېغىرەڭ ئالىتالىقلارلىرى بولىدۇ. نەمما پەرق ناھايىتى چوڭ بولۇپ، بەزىلىرى ئوڭ-سوغا گىرەلشىپ تىزىلىپ، ئۆزىڭارا گىرەلەشكەن زەنجىرسىمان داغلارنى شەكىلەندۈرۈدۇ ياكى قېنىق-سۇس سىزىقلار نۆۋەتلىشىپ دولقۇنسىمان كۆندىلەڭ داغ ھاسىل قىلىدۇ ياكى تاراقق دەتسىز داغ تۆچكىلىرى بولىدۇ؛ ئېنىڭ ئان تەرىپىدە بىر قاتار قارامتۇل قوڭۇر رەڭلىك داغ تۆچكىلىرى بولىدۇ؛ قورساق تەرىپى ئاقۇش كۈل رەڭ ياكى قوڭۇر كۈل رەڭ بولۇپ، قارا داغلار ئارىلاشقان بولىدۇ، قۇيرۇقى قىسقا ۋە ئىنچىكە بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق قىسىق، زەھەرلىك.

【تەسىز ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سوغۇقتىن بولغان يەلىنى ھەيدەيدۇ، ھۆللۈكىنى يوقىتىپ، پەيەرنى بوشتىدۇ. بوغۇم سۆڭەكلەر ئاغرىش، مۇرمە دۇمبىه ئاغرىش، پۇت-قوللار قولىشىش، يارتا پالماچلىك، سېざما، ئېغىز، كۆزلىر مايماقلىشىلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 2.0~4.5g. سوقۇپ پاراشوك قلىپ، ئىلمان قابىنات سۇ بىلەن ئىچىلىدۇ ياكى باشقا دورىلار بىلەن قوشۇپ ئىشلىتىلىدۇ. يېڭى يیلان مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

【ساڭلاش】 شامال ئۆتۈشىدىغان قۇرۇق ئورۇندادا ساقلىنىدۇ، مىتە چوشۇشىمن ساقلىنىش كېرەك.

سۆئلەپ ھىسىرى

中亚白及 Zhong ya bai ji
TUBER SALEP

مەزكۇر دورا تۈلكە مايىقى ئائىلىسىدىكى تۇسۇملۇك قالپاقسىمان تۈلكە مايىقى *L. orchis morio*, ئەركەك تۈلكە مايىقى *L. orchis maculata*. چىپار يوپۇرماقلىق تۈلكە مايىقى *L. orchis chlorantha* Gust. قاتارلىقلارنىڭ قۇرۇتۇلغان تۈگۈنەك غولى بولۇپ، ياز، كۈزدە قېزىۋېلىپ، ئەخلىتلەرنى تازىلاپ، قىيانق سۇغا بېسىپ سۈزۈۋېلىپ، ئىپتاپتا قۇرۇتۇلدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىسىتى】 مەزكۇر دورا تۇخۇمىسىمان، سوقچاق، يۇمىلاقراق ياكى ئالقانسىمان بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 1.5~4cm، دىئامېتىرى 0.5~1 cm.

سەرتقى يۈزى سارغۇچ ئاق رەڭلىكتىن سۇس كۈل رەڭگىچە بولۇپ، ئازراق ئىنچىكە قورۇقلەرى بولىدۇ، بەزىدە قورۇقلەرى تومىلىشىدۇ؛ جىسى قاتىقى، بېغرى، زىچ بولۇپ، سەل يېرىم سۈزۈك كېلىدۇ. ئۆزۈلگەن يۈزى مۇڭكۈزىمىان بولىدۇ، بۇراقىزى، تەمى سۇس بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 مەزكۇر دورىنىڭ تالقىنى ئاقۇش ياكى ئاچ سېرىق بولىدۇ. نېپىز دىۋار ھۈجەيرىدە لىرى كراخمال دانىچىلار ياكى كراخمال دانىچە پارچىلىرى بىلەن تولغان بولىدۇ. يېپىشقاق ھۈجەيرىلەرى تەركىبىدە بەلغەم خىلىتلىرى بولۇپ، مېتلىن كۆكى تېرىتىمىسىدە بويغاندا كۆك رەڭگە ئۆزگەرىدۇ. سۇيۇق يود تېرىتىمىسىدىن بىر تامىچە قوشسا، كراخمال دانىچىلىرى كۆكىرىپ، يېپىشقاق سۇيۇقلىقى سېرىق ياكى قوڭۇر رەڭگە ئۆزگەرىدۇ. نېچە ھۈجەيرە سىزىقى بۇرمىسىمان ياكى پەلمەپەيسىمان بولىدۇ، ئۆتكۈزگۈچى تومۇر سىزىقى تورمىسىمان ياكى تۆشكۈلۈك بولىدۇ، كالتسىي ئۆكსالات كرستال تۇتأتاملىرى شىلىمشق ھۈجەيرىدە ساقلىنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 سۇ تەركىبى سۇ تەركىبىنى ئۆلچەمش ئۆسۈلى بويىچە ئۆلچىگەندە 12% (قوشۇمچە: K₂H₃O₂، H₂SiO₃)، ئۆمۈمىي كۈلى 3% (قوشۇمچە K₂O) ئاشمايدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسىق. 【ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 باھنى قۇۋۇقتەپ، مەننىي كۆپەيتىدۇ. يۈرەكىنى قۇۋۇختادىپ، قان كۆپەيتىدۇ. باھ ئاچىزلىقىدىن بولغان مەننىي بالدۇر كېتىش، نېرۋىسى چارچىش، قان ئازلىق، ئۇرۇقنىڭ ئازلىقىدىن بالا تاپالماسلق، مۇسکۇل، مۇچىلەر تارتىشىش، پالمچىلەك، دۆتلىك، چاچ چۈشۈش، ئىشتىها سىزلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 5~8g
【ساقلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرغاق ئۇرۇندا ساقلىنىدۇ.

بىستى پايەنج چىنى 水龙骨 Shui long gu RHIZOMA POLYPODII

مەزكۇر دورا چىلىپايدى ئائىلسىدىكى تۆسۈملۈك ياشۇرۇپا بىستى پايەنج polypodium vulgareL نىڭ قۇروقۇلغان يىلتىز غولى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىلىدە يىغىۋېلىپ، ئەخلەتلەرنى تازىلاپ، پاكسىز بىيۇپ، ئاپتاتا قۇروقۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسوسىيىتى】 مەزكۇر دورا ئىنچىكە سىلىندىرسىمان، سەل-پەل ئەگرى، بەزىلىرى شاخلانغان بولىدۇ. تۈزۈنلۈقى 5~10cm، دىئامېتىرى 3~4cm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزىنىڭ رەگىنى سارغۇچ سۆسۈن رەگىدىن جىڭىر رەگىچە بولىدۇ ۋە بويىغا كەتكەن پۈرۈك سىزىقچىلىرى بولىدۇ، بىر تەرىپىدە چاچما يىلتىز ئىزلىرى ياكى بىر قىسىم قالدۇق چاچما يىلتىزى بولىدۇ. جىسىمى قاتىققى هەم چۈرۈك بولۇپ، ئۇڭاي سۇنىدۇ. سۇنغان يۈزى نىسبەتنەن سىلىق بولۇپ، سېرىق رەڭلىكتەن سارغۇچ پېشىل رەگىدە بولىدۇ. پۇرنىقى ئاڭىز، تەمى تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 توغرا كىسمە يۈزىدە: يۈزە پوست ھۈچىرىسى بىر قاتار تىزىلغان، شەكلى سوقىچاق، سىرتقى تېمى سەل قېلىن، نېپىز تام ھۈچىرىلىرى يۈمىلاقلاراق ياكى كۆپ بۇرۇچەكلىك كېلىدۇ. تەركىبىدە نۇرغۇنلىخان ماي تامىچىسى ياكى ئاز ساندىكى دانىچىسىمان ماددىلار بولىدۇ. تۈنكۈزگۈچى نېيىچىلىرى دەستىسى ئەتراپى ئۇۋوشىم، سىرتقى تەرىپىدە ئىچكى تېرىقە قەۋەت ھۈچىرىسى بىر رەت تىزىلغان بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

【تەسلىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەبىرىي تەبىئىي سەپىرانى تازىلايدۇ، زەھەر قايتۇردىو، سۈيدۈك ھەيدەيدىدۇ. ھۆللۈكتىن بولغان ھەر خىل غەلۋەرەك، جازاھەتلەرگە، تېرىق قىچىشىش، زەھەرلىك يىلان چىقۇۋېلىش، سېيگەندە ئاغرىشلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش تۆسۈلى ۋە مىقدارى】 5~15g

【سافلاش】 قۇرۇق ئۇرۇندا ساقلىنىدۇ.

مهزکۇر نجۇش

牛至 Niu zhi

HERBA ORIGANI

مەزكۇر دورا كالپوكىسمان كۈللۈكلىر ئائىلسىدىكى تۆسۈملۈك مەرزەنجۇش *origanum vulgare* L. نىڭ قۇرۇنلۇغان پۇتۇن چۆپى بولۇپ، ياز، كۆز پەسىلى چىچەكلىگەندە يىغۇيلىنىپ، تەخلەتلەرىنى تازىلاپ، ئاپتايىتا قۇرۇنلىدۇ.

【شەكلى وە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا 20~70cm ىېڭىزلىكتە تۆسىدۇ. يىلتىزى تىنچىكە بولۇپ، تۇشاق دىئامېتىرى 4mm~2 كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى كۈل رەڭ قوڭۇر، ئازراق بېكىلگەن ھەممە سەل-پەل تەۋىرىشم بولىدۇ، تۇرۇلگەن يۈزى سارغۇچ ئاق كېلىدۇ. غولى توت قىرقىق، تۇستى قىسىمى سەل-پەل شاخلانغان، سىرتقى يۈزى سۆسۈن ياكى سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، زىچ يىپىنچىلىرى ئاستىدا تۇشاق تۇشتىچىلار يوشۇرۇنغان بولىدۇ. يوپۇرمىقى قارىمۇ قارشى تۆسەكەن، ئازراق تۇرۇلگەن بولىدۇ، قېتى ئېچىلغاندىن كېپىن يوپۇرماقلىرى تۇخۇمىسمان، ھەمتتا كەڭ تۇخۇمىسمان ھالەتكە كېلىدۇ. تۇزۇنلىقى 0.6~1.8cm، كەڭلىكى 0.4~1.2cm، كەڭلىك، 0.5~2.5mm، تۇت بىلەن تۇرالغان بولىدۇ. كۈل رېتى چوققىسىدا تۆسىدۇ. كۈل چىنسى قوڭۇراراق شەكىلىك، 5 پارچە، كېچىك، قاتقىق مۇنسى يايلاق تۇخۇمىسمان، قىزغۇچ قوڭۇر رەڭدە بولىدۇ. خۇشبۇي پۇرايدۇ، تەمى سەل قېرىق بولىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 مەزكۇر دورىنىڭ توغرا كىسىمە يۈزى: سىرتقى پۇستى بىر قەۋەت كېلىگەن يۆنلىشتە تۇزارغان يايلاق ھۇجمىرىدىن ئىبارەت بولۇپ، سىرتقى پۇستىدا بەزىدە ھاۋا تۆشۈلگىرى، بەزسىمان قاسىراق، بەز تۇشتىلىرى وە غەميرى بەز تۇشتىچىلىرىنى كۆرگىلى بولىدۇ. پۇست قەۋەتى 6~5 قاتار كىسىمە يۆنلىش بويىچە تۇزارغان نېپىز دىۋار ھۇجمىرىسىدىن تەركىب تاپقان، تەۋىرىشم پۇست قىسىمە نېپىز دىۋار ھۇجمىرى وە غەلۇر نېچىلەردىن تەركىب تاپقان بولۇپ، تار ھالقىسمان بولىدۇ. شەكىلىنىش قەۋەتى ھالقىسمان 1~2 قاتار يايلاق چاسا ھۇجمىرىدىن تەركىب تاپىدۇ. ياغاج قىسىمە تۇتكۈزگۈچى نېچە، نېچە پلازمىسى، ياغاج تالاسى، ياغاج نېپىز تام ھۇجمىرىسى وە ياغاج چاچما سىزىقىلىرىدىن تەركىب تاپىدۇ. تۇزەك قىسىم ھۇجمىرىسى يۇمىلاقراق بولۇپ، شالاڭ تۇرۇنلىشىدۇ، مەركەز ھۇجمىرىسى نىسبەتەن چوڭ بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق، تىككىنچى دەرىجىدە ئىسىق. **【تەسىرى وە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】** سوغۇقتىن بولغان يەلنى تارقىسىدۇ، ھۆللىكىن بولغان توسالغۇلارنى ئاچىدۇ، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تازىلايدۇ، سۈيدۈك ھەيدەپ، ھەيزىنى راۋانلاشتۇردىدۇ، تۇزۇقلۇقىنىڭ شومۇرۇلۇشنى كۈچەيتىدۇ. يېشىقان غەيرىي تەبىئىي خىلىتلق يۆتىل، زىققە، زۇكام، باش ئاغرىش، تومۇرلار توسۇلۇش خاراكتېرىلىك نەپىسى قىستاپ، دېمى سىقلىش، بەدمىن تۇرۇقلاش، ئىچى تىتتىت بولۇپ، چارچاش، ئىشتىها سىزلىق، سۈيدۈك ئازىيىپ، مۇچىلەر ئىشىش قاتار لىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش تۆسۈلى وە مىقدارى】 9g
【ساقلاش】 سايە، سالقىن، قۇرغاق جايىدا ساقلىنىدۇ.

گاوزبان

**牛舌草 Niu she cao
HERBA ANCHUSAEE**

هزکور دورا نه گلکوت تائیلسیدیکی سُتالیه کاژیبان Anchusa italicica Retz نیک قوروقتلغان پوتون چوپی بولوپ، یاز پهسلی گولی پیچلغاندا یه رُوستی قسمینی مورثیبلپ، تاپاتپنا قوروقتلدلو. **【شکلی ۋە خۇسۇسىتى】** مزکور دورنیڭ كۆپىنچىسى پوتون بولىمۇدۇ، غولى كۆپىنچە سۇنغان، تۇزۇن-قسقىلىقى ھر خل، قىرلىق، سرتقى يۈزى سۇس بېشىل، تۇزۇنىسىغا كەتكەندىن كېيىن پۇلتىپ چىققان سىزىقلرى بولوپ، ئاڭ رەڭلىك قاتتىق تىكىنى ۋە تىكىنى چوشۇپ كەتكەندىن كېيىن پۇلتىپ چىققان تىكىن ئىزلىرى بولىدۇ، جىسى قاتتىق ھەم چۈرۈك، تۇرۇلەن يۈزى سارغۇچ ئاڭ، كۆپىنچىلىرىنىڭ ئوتتۇرسى كاۋاڭ بولىدۇ، يوپۇرمىقى كۆپىنچە تىتلىپ، قاتلىشىپ ياكى پۇرلىشىپ قالغان بولوپ، ئالدى يۈزى سارغۇچ بېشىل، ئارقا يۈزى سۇس سارغۇچ بېشىل رەڭلىك، ھەر سىككى يۈزىدە نورغۇنلىغان ئاڭ رەڭلىك قاتتىق تىكەنلىرى بولىدۇ ياكى تىكەن چوشۇپ كەتكەندىن كېيىن ئاڭ داغلىق ئىزى قالىدۇ. يوپۇرماق ساپىق تۈچ قىرلىق، كۆپىنچە بىگلىكەن بولىدۇ، تۇستىدە ئاڭ تىكىنى ۋە تىكەن ئىزى بولىدۇ، يوپۇرماق تومۇرىنىڭ سىككى تەربىيى كۆپىنچە تۇستى يۈزىگە تۇرۇلۇپ تۇردىدۇ، پوتون يوپۇرماقنىڭ قېتى بىچلغاندىن كېيىن، تۇچى تەربىيى دىقماق، يوپۇرماق قېلىن، تولۇق گىرۋەكلىك بولوپ، كالا تىلىغا ئوخشاش، ھالەتكە كېلىدۇ. يۇنقى تاجىز خۇش بۇراقلىق، تەمى سۇس، بىشىقاق بولىدۇ.

پەرقەندۈرۈش مەزكۇر دورا تالقىنى سارغۇچ يېشىل بولىدۇ. يەككە ھۇجمىرىلىك غەيرىي بەز تۈشتىچىلىرى كۆپ بولىدۇ، ئۇزۇنلۇقى $150\text{--}1000\mu\text{m}$ كېلىدۇ. ھاوا توشۇكچىلىرى تۇراقىسىز شەكىلدە بولۇپ، ئۇزۇن دىئامېتىرى $40\text{--}60\mu\text{m}$ ، قىسقا دىئامېتىرى $25\mu\text{m}$ كېلىدۇ. يۈزە پوست ھۇجمىرىلىك رىدە تاياقسىمان ناچ سېرىق كرستىللەرى بولىدۇ. كراخمال دانىچىلىرى يۇمىلاقاراق بولۇپ، دىئامېتىرى $6\mu\text{m}$ دىن ئاشمايدۇ. كىندىك نۇقتىسى ئېنىق بولمايدۇ. شىلمىشق ماددىلار كۆپىركەك بولىدۇ. تومۇرلىرى كۆپىنچە بۇرمىسمان سىزىقلقىق بولۇپ، گىرۋەكلىرىدە توشۇك سىزىقللىرى بولىدۇ. تورسىمان سىزىقچىلار ئاز ئۈچۈرلەيدۇ. گۈل توۋۇرۇكى پارچىلىرىدا تۈبتىلار بولىدۇ.

تەبىئىتى بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل نىسىق. **تەسلىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى** بەدەننى سالقىنلىتپ، خۇشخۇي قىلىدۇ. باشقۇرغاچى ئۇزالار ۋە سەزگۈ ئۇزالارنىڭ خىزمىتىنى كۈچەيتىدۇ. تەبىئىي كۈچلەر (قۇۋايمى تەبىئىي)نى كۈچەيتىپ، چوڭ تەرمەتى راۋانلاشتۇردىدۇ. يۈرەك سېلىش، ئۇيقوسلىق، كۆڭلى بىئاراملق، باش ئاغריש، ئىنكاسى سوْسلىق، قەۋىيەتلىك، كە ئىشلىتىلدىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 6~12g

ساقلاش】 قُوْدُوقْ تُورُونْدا ساقلىنىدۇ.

كالا ئۆتى

牛胆汁 Niu dan zhi

BILLIS BOVIS

بۇ كالا ئائىلىسىدىكى ھايۋانات كالا Bostaurusdomesticus Gmelin نىڭ ئۆتى بولۇپ، كالنى سويعاندا دەرھال ئۆت خالتىسىنى چىقىرىۋىلىپ، سايىغا ئىسىپ قۇرۇتۇلدى ياكى ئۆت خالتىسىنى بېرىپ، ئۆت سۇيۇقلۇقنى قاچىغا تېلىپ، ئۇغزىنى ھم تېتىپ قويۇپ ساقلىنىدۇ ياكى قىزىتىپ قۇرۇتۇپ ساقلىنىدۇ. 【شەكل ۋە خۇسۇسىيىتى】 يىڭى ئۆت سۇيۇقلۇقى يېشىلغا مايل ياكى توق بېغىر رەڭ، سەل سۈرۈك سۇيۇقلۇق بولۇپ، ئازراق بېپىشقاڭ كېلىدۇ، سەل قۇرۇتۇلغاندىن كېپىن قويۇقلۇشىدۇ، پۇتونلەي قۇرۇغاندا يېشىلغا مايل قاتىق ھالىتكە كېلىدۇ. ئۇۋاتىلسا پارچىلىنىدۇ. بېلىقتەك پۇرایدۇ، تەمى قېرىق بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) مۇۋاپىق مقداردىكى ئۆت سۇيۇقلۇقغا 1ml خلوروفورم (chloroform) قوشۇپ، تەكشى تازىلاشتۇرۇپ، ئاندىن سۇلقات كىسلاتسى ۋە 30% لىك قويۇق ھيدروگېن پېروكسىد (hydrogen peroxide) ھەرقايىسىدىن ئىككى تامچىدىن قوشۇپ چالغىقاندا، خلوروفورم قەۋىتى يېشىل رەڭگە كىرىدۇ.

(2) مەزكۇر دورىدىن مۇۋاپىق مقداردا تېلىپ 1ml تۆز كىسلاتسى، 10ml خلوروفورم قوشۇپ، تولۇق چالغىتىپ، تىنج قويۇپ قوبىسا، خلوروفورم قەۋىتى سارغۇچ قوڭۇر رەڭگە كىرىدۇ. ئاندىن خلوروفورم قەۋىتىنى ئايىرىپ تېلىپ، بارىي ھيدروكسىد (Barium hydroxide) تەجربىه سۇيۇقلۇقىدىن 5ml قوشۇپ، چالغىقاندا سارغۇچ قوڭۇر دەڭلىك چۆكمە ھاسىل بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 تۆتنىچى دەرىجىدە قۇرۇق تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 بەدەندىكى غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تازىلايدۇ، بىوتەل توختىتىپ، تۇشىق ياندۇردى، توسالغۇلارنى تېچىش، جاراھەتلەرنى قورۇيدۇ. بېپىشقاڭ بەلغەملەك زىققە، گال ئىشىش، كۆز كېسەللىكلىرى، قۇلاق جاراھتى، سوڭى چىقىپ قېلىش، بۇۋاسىر قاتار لىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 قۇرۇق تالقىنى 3g ~ 0.1g. بەدەن سىرتىغا مۇۋاپىق مقداردا ئىشلىلىدۇ.

【ساقلاش】 سالقىن، سايى، قۇرغاق ئۇرۇندا ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0016-98

بُوْقا چُويىسى

牛鞭 Niu bian

PENIS BOVIS

بۇ دورا كالا ئائىلسىدىكى هايۋان Bos taurus domesticus Gmelin ياكى قوتاز
Bos grunniens Linnaeus نىڭ قۇرۇتۇلغان زەكىرىدۇر.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا ئۇزۇن سىلىندر شەكىللەك، سەل يايپلاق، بەزىلىرى نەكمەچ ياكى تۈرۈلگەن ھالىتتە بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 40cm ~ 20، دىئامېتىرى 2.5cm ~ 1.0 كېلىدۇ. سىرتقى كۆرۈنۈشى قىزغۇچ قوڭۇر دەكلەكتەن سارغۇچ قوڭۇر دەكلەكتىچە بولىدۇ. يېرىم سۈزۈك كېلىدۇ ياكى سۈزۈك بولمايدۇ. ئۇستى تۈستىدە بىر تالدىن ئېنىق ياكى ئېنىقسز ئۇيىمان ئېرىقچىسى بولىدۇ. زەكمە بېشى كونۇسسىمان بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 10cm ~ 7 كېلىدۇ، ئۇستى قىسىمى سىلق ياكى ئويۇققان، ئۇستى تەرىپى سىلق ياكى شالاڭ، زىچلىقى ئۇخشىمىغان ھالقىسىمان پۇرۇملۇك بولىدۇ، زەكمە بېشى تەدرىجىي تۇچالانغان بولىدۇ؛ خەتنىلىك تېرسى تومپىيىپ تۇرمىدۇ، زەكمەنىڭ تۇۋى تەرىپى مۇستەھكم يۇمشاق توقۇلما تالالاردىن تۈرۈلدۈ. جىسمى قاتىق بولۇپ، ئاسان سۇنمىدۇ. كۆندىلەڭ كىسىمە يۈزىدە ئۇچ توشۇك (ئۇستۇنکى ئىككىسى قان تومۇر، تۆۋەنکى چوڭراق بىرسى سۈپىدۇك يىلى ئېغىزى) بولىدۇ. سەل سىبىسىق يۇرمايدۇ.

تہبیثیت، نسق۔

«تەسىرى وە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» بۇرەكى كۈچەيتىپ، ئاشقازاننى قىزىتىدۇ، باھنى قۇۋۇۋەتە لەپ، چىققىنى داۋالايدۇ. بۇرەك زەنپىلىكىدىن بەل ئاغرىش، سوغۇقتىن بولغان ئاشقازان ئاغرىش، جىنسىي ھەۋس ئاچىزلاش وە چىقىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 30~60g. يۈمىشاق پىشۇرۇپ، ئۇششاڭ توغراب، مۇۋاپىق مىقداردا تۆز قوشۇپ ئىشلىتلىدۇ.

【ساقلاش】 هم قاچلاب، سایه، سالقىن، قۇرۇق ئۇرۇندا ساقلىنىدۇ.

تاتلىق بادام 巴旦仁 Ba dan ren SEMEN AMYGDALI DULCIS

بۇ دورا ئازغان ئائىسىدىكى ئۆسۈملۈك تاتلىق بادام Amygdalus communis L. نىڭ قۇرۇتۇلغان بېتىلگەن ئۇرۇقى بولۇپ، ياز، كۆز پەسىلى مېۋسى پىشقانىدا، يىغۇچىلىپ مېغىزىنى ئايروپىلىپ، ئاپتىپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

【شەكلى وە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا يايلاق، ئۇزۇنچاق، تۇخوم شەكللىك بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 2.2~3.5cm، كەڭلىكى 1.5cm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى قىزغۇچۇ قوڭۇر، ئۇچى سەل ئۇچلۇق، تۇۋى قىسىمى يۇملاق كېلىدۇ. قوشۇلۇش نۇقتىسىدىن ئۇستىگە قارىغان نۇرغۇن ئۆتكۈزگۈچى نىيىچىلەر تۇنامى بولۇپ، قارامتۇل سىزىقچە ھاسىل قىلىدۇ. ئۇرۇق پۇستى نېپىز، ئۇرۇق پەللىسى ئىككى پارچە، سوت رەڭ، ياغلىق بولىدۇ. ئازراق پۇرابىدۇ، تەمى تاتلىق.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ تالقىنى ئاچ سېرىق، تاش ھۈجەيرىسى سېرىق رەڭلىك، ئۇزۇن، سوقىچاق، ئۇزۇنلۇقى 120~60 μm ، بوشلۇق گىرۋىكىدە سىزىق تۆشۈكلىرى بولىدۇ. يىپۈرمەن ئەت ھۈجەيرىسى يۇملاقراق ياكى كۆپ بۇرچەكلىك بولۇپ، تەركىبىدە كۆپلىگەن ئاقسىل دانىچىلىرى وە ياغ تامىچىلىرى بولىدۇ. تۆرەلمە سوت ھۈجەيرىسى ئۇزۇنچاق چاسا ياكى كۆپ بۇرچەكلىك، دىۋارى سەل قېلىن بولۇپ، تەركىبىدە ياغ تامىچىسى وە ئاقسىل دانىچىلىرى بولىدۇ.

【لايىقلاشتۇرۇش】 ئىشلىتىدىغان چاغدا شاكىلى ئېلىۋېتىلىدۇ.

【تەبىئىتى】 بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسىق.

【تەسىرى وە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئۇزۇقلاندۇرۇغۇچى كۈچنى مۇھاپىزىت قىلىش، بەدەمنى كۈچھىتپ، مېڭىنى ساغلاملاشتۇرۇش، كۆزنى روشنلەشتۈرۈپ، چىراينى ياخشىلاش، ئۇچەينى سىلىقلاشتۇرۇپ، يۆتەلنى توخىتىش تەسىرى بار. تېنى ئاجىز، يۆتىلىپ بەلغەم تۈكۈرگەن، ئىچى تىتلەپ، قەۋرىيىت بولغان، كۆرۈش قۇقۇقى ئاجىزلاپ، چىراينى خۇنۇكلىشىلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى وە مىقدارى】 30~50g

【ساقلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرغاق جايىدا ساقلىنىدۇ، مىتە چۈشۈشتىن ساقلىنىش لازىم.

ئانار

石榴 Shi liu

FRUCTUS GRANATII

بۇ دورا ئانار ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك ئانار دەرسىي Punica granatum L. پىشقاڭ مېۋسى بولۇپ، كۈزدە مېۋسى پىشىپ، رەڭگى قىزازغان ياكى سارغا ياغاندىن كېپىن ئۆزۈۋىلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇنىڭ شەكلى ئاساسەن شارسىمان بولۇپ، دىئامېتىرى 4~12cm كېلىدۇ. پوستى خۇرۇمەك قىلىن، سرتقى يۈزى قىزىل ياكى سېرىق بولىدۇ. ئۇرۇقىنىڭ كۆپى سۇس سېرىق گۆشلۈك، ئۇرۇقدان تەختى ئۆستىگە جايلىشىدۇ. ئۇرۇقى قىرلىق، شەكلى كۆپىنچە ھەر خىل، ئۇرۇنلۇقى 0.5~1.0cm، كەڭلىكى 0.3~0.8cm كېلىدۇ. ئۇرۇقىنىڭ پوستى قىزىل ياكى قېنىق قىزىل، پارقراق، يېرىم سۈزۈك، نۇرلۇق، ئېتى شىرىلىك بولىدۇ؛ ئۇرۇقىنىڭ ئىچكى پوستى ئاق، قاتىق، ئۇرۇق مېغىزى بىر دانە بولىدۇ. سەل پۇرايدۇ، تەمى چۈچۈملە، تاتلىق كېلىدۇ.

【لايىقلاشتۇرۇش】 ئىشلىتىدىغان چاغدا پوستىنى سوپۇپ، ئېتى، شىرىلىك ئۇرۇقى ئېلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 مۆتىدىل.

【تەسلىرى ۋە ئاساسىي داؤالايدىغىنى】 يات ماددىلارنى تازىلاب، تېرىنى سىلىقلاشتۇرۇپ، چىraiيىنى ياخشىلایدۇ. يۈرەككە مەنپەت قىلىپ، قان كۆپەيتىدۇ. يۈرەك سېلىش، كەم قانلىق، تومۇلار داۋان بولماسلق، ئىچى تىتىداش، يۆتىلىش، گال-كېكىرەك ئاغرىش، بەدمەن ئۇرۇقلاشلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 ئۇرۇقىدىن 9~9g 6 ئىشلىلىدۇ ياكى ئۇرۇقىنى سىقىپ، شەرسىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئىچىلىدۇ.

【ساقلاش】 شامال ئۇنىشىدىغان، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

ئانار گولى

石榴花 Shi liu hua
FLOS GRANATI

بۇ ئانار ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئانار *Punica granatum L.*

گولى بېچىلىپ ئۆزلۈكىدىن تۆكۈلگەن گول بەرگىسى يىغۇنىنىپ، سالقىن ئورۇندا قۇرۇتۇلدۇ.
【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا پۇرلۇشۇلغان، بەزىلىرى ئۇۋىلىپ كەتكەن بولىدۇ.
پۇتنىلىرىنىڭ قېتى بېچىلىغاندىن كېسىن تۇخۇم شەكىلگە ياكى تۇخۇمىسىمان ھالىتكە كېلىدۇ. ئۇزۇنلۇقى 20~30mm، كەڭلىكى 25mm~20mm كېلىدۇ. گول بەرگىسى قىزىل ياكى قارامتۇل قىزىل، پەيسمان تومۇرلۇق كېلىدۇ، ئاساسلىق تومۇرىنىڭ تۇۋى قىسىمى كەڭ بولۇپ، ئۇچى تەرىپى تەدرىجىي ئىنچىكىلەيدۇ.
ئۇچى يۈمىلاق، گرۇپىكى سەل دولقۇنىسىمان بولۇپ، شالاڭ ھەم تېبىز، دىقماق ھەرە چىشىسىمان، تۇۋى قىسىمى كەڭ شىناسىمان ياكى يۈمىلاقلاراق بولىدۇ. گولى نېبىز ھەم چۈرۈك بولغاچقا، ئۇڭاي ئۇۋىلىپ كېتىدۇ. پۇرقى ئاجىز، تەمى قىرتاقلاق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 مەزكۇر دورىنىڭ تالقىنىنىڭ رەڭگى قوڭۇر قىزىل بولىدۇ. گول تاجىسىنىڭ يۈزە پوست ھۈچەيرىسىنىڭ سرتى كۆپ بۇرچەكلىك ياكى تەرتىپىز شەكىلده، تېمى دولقۇنىسىمان نەگىلەشكەن بولۇپ، سرتقى يۈزىدە ئۇششاق، زىج، ئەگمەچ مۇڭگۈزىسىمان سىزىقچىلار بولىدۇ. يان تەرىپىدىن قارىغاندا سرتقى تېمى تېشىغا توپىيىپ چىققان، شورىغۇچىسىمان، گرۇپەكلىرى سەل دولقۇنسەمان بولىدۇ. بۇرمىسىمان نەيچىلىرىنىڭ دىئامېتىرى 10~20 μm دىئامېتىرى 14~22 μm بولۇپ، ئۇچ دانه تۆشۈك ئېرىقچىسى بولىدۇ. نېبىز تام ھۈچەيرىلىرى يۈمىلاقلاراق ياكى ئۇزۇن يۈمىلاق بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى درىجىدە قۇرۇق سوغوق.

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 قورۇش، ئىچى سۈرۈشنى توختىش، تەرلەشنى ۋە قانىنى توختىش خۇسۇسىتىگە ئىگە. ئۇزۇن مەزگىل ئىچى سۈرۈشكە ئىشلىتىلدۇ. بەدمىن سرتىدىن قاناش توختىمالىق، بېغىز-تىل جاراھەتلەرى، سوڭى چىقىپ قېلىش، بۇۋاسىر، بېغىزى پۇراش، چىش ئالغىش، تېرىه قىچىشىلارغا ئىشلىتىلدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 1~6g

【ساقلاش】 شامال ئۆتۈشۈپ تۈرىدىغان، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0020-98

ئەنۋەر

龙涎香 Long xian xiang
AMBERA GRISEA

هزكُور دورا نیپار کت ٹالیلسیدیکی هایوان نیپار کت Physeter catodon Linnaeus نیک نُوچهی یولی ئاجرالمیلریننگ قورۇتوغاننى بولۇپ، هەر قانداق ۋاقتتا يەغۇپلىپ، قورۇتوڭسا بولىدۇ. «شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» بۇ دورا مومغا تۇخشاش سۈزۈك بولمغان، چوڭ-كىچىكلىكى ھەر خىل كاللهك ماددا بولۇپ، رەڭگى كۈل رەڭ يېشىل، سارغۇچ قوڭۇر ياكى قارامتۇل قوڭۇر بولىدۇ. بەزىدە خىلمۇ خىل رەڭلىك داغ سىزىقچىلىرى ۋە ئاق قىرولىرى بولىدۇ. ئالاھىدە كۈچلۈك خۇش پۇراقلق بولۇپ، ئۇزۇن ۋاقت پۇرایدۇ، تەمى سەل چۈچۈملەن تاتلىق بولۇپ، چايىنغاندا چىشقا چاپلىشىۋالىدۇ. «پەرقلەندۈرۈش» (1) هەزكُور دورىدىن ئاز مقداردا ئېلىپ كۆيىدۈرسە، ئالدى بىلەن پۈۋە كچىلەر پەيدا بولۇپ ئاندىن ياغ سررغىپ چىقىدۇ، يورۇق سېرىق ئوت يالقۇنى چىقىپ، سەل خۇش پۇراق پۇرایدۇ، قالدۇقى قارا رەڭلىك بولىدۇ.

(2) مهزکور دوربندی تالقیننی سوپیوق گلتسپرین ببلهن قاچیلغاندا، کۆپلیگەن تەرتىپسىز قوگۇر رەئىلىك كالله كچىلەر وە كۆپلیگەن ئاچ سېرىق ياغ تامچىلىرى كۆرۈلەدۇ. قۇتۇپلانغان مىكروسكوبتا نۇر چاقنىش ھادىسىسى كۆرۈلمىدۇ. پېقىت ئاييرىم توچىكلار جۈزە رەڭ قىزىل ياكى كۆكۈش رەڭگە كېرىدى.

(3) مهزکور دوربىدىن 50mg ىېلىپ، ئۇنىڭغا 5ml بېتىل سپېرىت قوشۇپ تېرىتىپ، سۈزۈپ، سۈرۈلگەن سوپىقلىقۇقىدىن مۇۋاپىق مقداردا ئېلىپ بېتىل سپېرىت قوشۇپ سوپىلدۈرۈپ، نۇر بولۇش فوتومېتىر ئۇسۇلىدا (قوشۇمچە VA) ئۆلچىگەنده، 275nm ۋە 306nm دولقۇن ئۇزۇنلىقۇقى قىسىمدا ئەڭ چوڭ مقداردا شۇمۇرلۇدۇ.

تەبىئىتى ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

«تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» تەبىئىي كۈچ (قوۋاپىي تەبىئىي)، ھياتى كۈچ (قوۋاپىي ھېۋانىيە)، روهىي كۈچ (قوۋاپىي نەفسانىيە) قاتارلىق تۈچ كۈچنى تولۇقلاش، ھياتلىق روهى (روھىي ھېۋانىيە)، پائالىيەت روهى، ئۇزۇقلۇنىش روهى قاتارلىق تۈچ روهنى قۇۋوڭتىلەش، بىورەك ھەرىكتىنى تەگىشىپ، ھەزىمنى ياخشىلاپ، ئاشقازاننى كۈچەيتىش، زەھەرنى قايتۇرۇپ، ئىشىشقىنى ياندۇرۇش تەسىرى بار. ئىچكى ئەزالىنىڭ سوغۇقتىن بولغان زەنپىلىكى، جىنسىي مۇناسىۋەتنىڭ زىيادە بولۇشىدىن بەدەن ئاجىزلىشىش، ئۇزۇن ۋاقت ئىچ سۈرۈش، يۈرىكى سېلىپ، ئىچى تىتىلداش، روهىي چوشكۈنلۈك، بەل-تىز ماغدۇرسىزلىشىش، باھ زەنپىلىشىش، باش قېيش، ئۇنۇتقاقيقىق، قۇلاق-بۇرۇنغا جاراھەت چىقىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلەدۇ. بولۇمە باشانغانلىنىڭ ئىشلىتىشىگە باپ كىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۈسۈلى 【 0.5g 】 **ساقلاش** 【 تىغىزنى مەھكەم ئىتىپ، سايىه، سالقىن ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

ئىنتۇزۇمى

龙葵果 Long kui guo
FRUCTUS SOLANINIGRI

بۇ چەيزە ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئىتتۈزۈمى Solanum nigrum L.نىڭ قۇرۇتۇلغان، ئاساسەن پىشقانى مېۋسى بولۇپ، ياز، كۆز پەسىلى يىغۇبىلىنىپ، ئاپتاتا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىسىتى】 مەزكۇر دورا شارسىمانراق ھەم قۇرۇلغان بولۇپ، دىئامېتىرى 2~5mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى قارا قوڭۇر، قىزغۇچ ياكى سارغۇچ بىشل كېلىدۇ، ئۆچىدا بىر دانه يۇمىلاق ئانلىق تۇۋۇرۇكى ئىزى بولىدۇ. تۆۋەنکى ئۆچىدا بەزىدە بىر تال ئىنچىكە مېۋە ساپىقى بولىدۇ. تېنى ئاسان ئۆۋىلىپ كېتىدۇ. تۇرۇقىنىڭ كۆپىلارقاق يايپلاق، سارغۇچ ئاق رەڭلىك بولىدۇ. پۇرقى ئاجىز، تەمى چۈچۈمەلەك، سەل قىرتاق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 مەزكۇر دورىنىڭ كۆنديلەڭ كىسمە يۈزىدە: مېۋە سىرتقى پوستى بىر قاتار تاش ھۈچەيرلەردىن تۈرۈلگەن بولۇپ، سىرتقى تېمى ئۆيمان-دۆڭ كېلىدۇ. مېۋە ئۆتتۈرۈ پوستىدا بىر قانچە رەت نېپىز تام ھۈچەيرلەرى بولۇپ، ئادەتتە 3~5 قاتار تىزلىدۇ. مېۋە ئىچىكى ھۈچەيرلەرى ئادەتتە ئېنىق بولمايدۇ. تۇرۇقىنىڭ سىرتقى پوستىدا بىر قاتار تاش ھۈچەيرە بولۇپ، سىرتىنى تۇرۇق تۈشتۈچىلەرى قاپلاب تۇرىدۇ، بۇنىڭ ئىچىدە 3~2 رەت بىسىلغان نېپىز تام ھۈچەيرىسى بولىدۇ. ئەڭ ئىچىكى قىسىدا بىر قەۋەت ئۇزۇن چالسا شەكىللەك ھۈچەيرلەر بولىدۇ. تۆرەلمە ۋە تۆرەلمە يايپاق ھۈچەيرىسىدە ئالېرون دانچىلەرى ھەمدە ياغ تامچىلەرى بولىدۇ.

تالقىنىڭ رەڭكى قوڭۇر، قوڭۇر سېرىق ياكى سارغۇچ بىشل بولىدۇ. مېۋە سىرتقى پوستى تاش ھۈچەيرلەرى كۆپ بۇرۇجەكلىك ياكى يۇمىلاقراق بولۇپ، نۇرغۇنلۇغان تور سىزىقچىلەرى بولىدۇ. تۆرەلمە سۇتى ۋە تۇرۇق پەللە ھۈچەيرىسىدە ئالېرون دانچىلەرى ۋە ياغ تامچىلەرى بولىدۇ. مېۋە پوستى ۋە تۇرۇق پوستى تاش ھۈچەيرلەرنىڭ دىئامېتىرى 50~150μm كېلىدۇ. تۇرۇق تۇشتىلەرى يەككە ھۈچەيرلەك يېڭىنىسىمان تۈشتىن ئىبارەت.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قان تەڭشەپ، زەھەر قايتۇرىدۇ، قىزىتما ياندۇرۇپ، ئۆسسىز لۇقنى باسىدۇ، قورۇپ، ئىشىقىن ياندۇرىدۇ. ئىسىقتىن بولغان كاناي ياللۇغى، يۇتقۇنچاق ياللۇغى، ئاشقازان ياللۇغى، جىڭگەر ياللۇغىغا ئىشلىلىدۇ. باش ئاغرىش، مېڭە پەرەدە ياللۇغى، قۇلاق، بۇرۇن، كۆز كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا سىرتىدىن چىپلىدۇ ياكى سىرتىدىن يۇيۇشقا ئىشلىلىدۇ؛ ئاشقازان-كىندىكە ئېزىپ چاپسا، ئىشىقىن ياندۇرۇپ، ئاغرىق توختىتىدۇ. ئاشقازان ئاغرىش، ئاشقازان كۆپۈشنى داۋالايدۇ؛ قاينىتىپ ئېلىنغان سۇيۇقلۇقى بىلەن ئېغىز چايقىسا، چىش مىلىكى ئىشىقىنى داۋالايدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 6~10g. مېۋە شەربىتى، كاسىنە شەربىتىدىن تەڭ مىقدار ئېلىپ قوشۇپ ئىچىسىمۇ بولىدۇ.

【ساقلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرغاق ئۇرۇندا ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0022-98

گل مه ختوم
白石脂 Bai shi zhi
HALLOYSITUM ALBI

بۇ كەرمنىي تۆزى تۈرىدىكى مىنپارال ماددا گاۋىلىك توبىسى (ئاق چىنە توبىسى) بولۇپ، تەركىبىدە سۇ تۇتقان ئالىيۇمن سىلىكات بولىدۇ، قېزىۋالغاندىن كېيىن ئەخلمەتلەرى تازىلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيەتى】 بۇ دورا تەرتىپىزز كاللهڭ ماددا بولۇپ، چوڭ-كىچىكلىكى ئوخشاش-مایدۇ. رەڭكى ئاق، سىلىق ياغىدەك بولىدۇ. جىسمى يۇمىشاق بولۇپ، ئۇڭاي ئۇۋوشلىپ كېتىدۇ. سۇ سۇمۇرۇشچانلىقى كۈچلۈك بولۇپ، يالسا تىلغا بىيىشىدۇ، چاينىسا قۇمۇدەك بىللىنىمەيدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 (1) بۇنىڭ پاراشوكى ئاق رەڭلىك بولۇپ، چوڭ-كىچىكلىكى ئوخشاشمايدىغان يېرىم سۈزۈك، شەكىلىسىز كاللهڭ ماددا بولۇپ كۆرۈنىدۇ. رەڭكى ئاچ سېرىق ياكى ئاق كېلىدۇ، قىرى بولمايدۇ، تورىسىمان سىزىچىلىرى بولىدۇ. گاھىدا ئاچ قىزىل، قىزغۇچ قارا ياكى قارا رەڭلىك سۈزۈك بولمىغان كاللهكچىلەر ئۇچرايدۇ.

(2) مەزكۇر دورا تالقىنىدىن تەخىمنەن 0.5g بىلپ سۈيىق تۇز كىسلاتاسىدىن 5ml قوشۇپ، چالغىتىپ بىر سائەت تۇرغۇزۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيىقلۇقتىن ئاييرىم-ئاييرىم 1ml دىن بىلپ ئىككى پىروبرىكىغا قاچىلاپ، بىرسىگە ناتىرىي ھىدرۆكسىد سىناق سۈيىقلۇقىدىن ئىشقاڭلىق خۇسۇسىيەتكە ئۆزگەر-گىچە قوشقاندا، ئاق بېلىمسىمان چۆكمە ھاسىل بولىدۇ، ئاندىن مەزكۇر چۆكمە كۆپ مقداردىكى ناتىرىي ھىدرۆكسىد سىناق ئېرىتمىسىدە ئېرىتىلىدۇ. يەنە بىر پىروبرىكىغا تامىمىيەك سۈبى سىناق ئېرىتمىسى ئاق بېلىمسىمان چۆكمە ھاسىل بولغانغا قەدەر قوشۇلىدۇ. ئاندىن ئۇنىڭغا ئالىزارىن ناتىرىي سۇلغات ئىندىكانتۇر ئېرىتمىسىدىن بىر نەچچە تامىچە تېمىتقاندا، چۆكمە دەرھال گىلاس رەڭگىگە كىرىدۇ.

«تمسّرى وَهُ ئاساسى داۋالايدىغىنى» قورۇپ قان توختىش، زەھەر قايىتۇرۇش، بەدەندىكى ھۆللۈكى ئېلىش تەمسىرى بار. يۈنەل، قان تۈكۈرۈش، ئاشقازان ئاجزىلاش، قورساق ئاغرش، چوڭ تەرەتسىن قان كېلىش، ماخاۋ كېسىلى وَهُ زەھەرلىك ھاشاراتلا، چىقۇبلىشلارغا ئىشلىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى 】 1~3g

ساقلاش】 قورۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

شاترەنجى

白花丹 Bai hua dan

PLUMBINIS

بۇ بەھمن ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك شاترەنجى Plumbago zeylanis L. نىڭ يوبۇرماقىسىز قۇرۇتۇلۇ. خان غول شېخى بولۇپ، يىل بوبىي يېغۇپلىشقا بولىدۇ. يوبۇرمىقىنى ئېلىۋېتىپ، ئاپتاتا قۇرۇتۇلۇدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا يۈمىلاق تۈۋۈرۈمىسان بولۇپ، دىئامېتىرى 0.7cm ~ 0.2cm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى سارغۇچ بېشىلدىن ئاچ قوڭۇر دەگىكچە بولۇپ بوغۇملىرى ئېنىق، ئىنچىكە، تىك كەتكەن قىرلىرى بولىدۇ. جىسمى يەڭىل، قاتىق بولۇپ، ئۇڭاي سۇنىدۇ، سۇغان قىسىم پۇستى تالاسىمان، ئىچكى قەۋىتى دانچىسىمان، ئۆزىكى ئاچ، يۈمىشاق خۇددى بۇلۇتتەك بولىدۇ. پۇرقى ئاجز، تەمى سۇسراق بولىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 توغرا كىسىم بۈزى: بۈزە پۇست ھۈجەيرىسى بىر رەت تىزىلغان بولۇپ، سرتىنى مۇڭگۈز قەۋوتتىپ تۇرىدۇ. ئىچكى تەرىپىدە قېلىن مۇڭگۈز ھۈجەيرىلىرى 3~2 رەت تىزىلىدۇ، قىرلىق بۇرچەكلىرىدە 6~8 قاتارغا يېتىدۇ. پۇستى قەۋوتتىپ تام ھۈجەيرىلىرىنىڭ ئاز ساندىكلىرىدە قوڭۇر سېرىق مونەكچىلەر بولىدۇ. ئۆتۈرۈرۇ تۈۋۈرۈك غلاپىدا 3~6 قاتار تالالار بولۇپ، دولقۇنىسىمان تىزىلىپ ھالقا ھاسىل قىلىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى نەيچىلەر دەستىسىنىڭ سىرتى ئەۋرىشىم كېلىدۇ، تومۇرلىرى يالغۇز ياكى بىر نەچىدىن توپلىشىپ توغرىسىغا تىزىلىدۇ. ياغاج تالالار توبى ھالقىسىمان تىزىلىدۇ. ئۆزەك قىسىم نېپىز تام ھۈجەيرىلىرى ئۆزۈنچاقي تۇخۇمىسىمان بولۇپ، يەككە پېرىق تۆشۈكلىرى بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئۆزىنچى دەرىجىدە قۇرۇق تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غېرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تازىلاب، ھۆل سوغۇق يەلنى ھېيدىدەيدۇ. ئاؤازنى ئىچىپ، يۈنقولۇچاق ئاغرىشقا مەنپەت قىلىدۇ، ھەزىمنى ياخشىلاب، بەدەنگە قۇۋۇتتىپ، تېرىنى ساغلاملاشتۇرىدۇ. ئاۋەكىسىل، تەڭىگە تەمەرتىكە، چىيقات-جاراھەت، ئۆلۈك ھامىلە چۈشۈرۈش، بەل-دۇبىھ ئاغرىش، ئەرلىك جىنسىي ئاچىزلىق، ئىشتەھاسىزلىق، گال ئاغرىش ۋە بوغۇم ئاغىشلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 1~3g

【دىققەت】 زىيادا مىقداردا ئىچسە، ئۆپىكىگە زەرەر يەتكۈزۈدۇ.

【ساقلاش】 شامال ئۆتۈشىدىغان، قۇرغاق ئۇرۇندا ساقلىنىدۇ.

بەرەنگى كابىلە

白花酸藤果 Bai hua suan teng guo
FRUCTUS EMBELIAE

بۇ ئاردىزىيە ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بەرەنگى كابىلە *Embeliaribes* Burm. f نىڭ قۇرۇتۇلغان بېۋىسى بولۇپ، يازنىڭ ئاخىرى، كۈزنىڭ بېشى مېۋىسى پىشاي دېكەندە يىغۇپلىپ، ئاپتاتا قۇرۇتۇلدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا شار شەكىللەك بولۇپ، قارامۇچقا ئۇخشادىپ كېتىدۇ. دىئامېتەرى 2~6mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى كۈل دەڭ قوڭۇر رەگدىن قارامتۇل قىزىل رەڭگىچە بولىدۇ. قورۇلغان سىزىقچىلىرى بولىدۇ. لوپا ئۇيىنەكتە قارغاندا گۈل ساپىقى ئۇنىڭ ئۇچى تەرمىنە يۈمىلاق توچكىسىمان، ئاىستى ئۇچىندا مېۋە پوستىغا زىچ چاپلاشقان، سەل-پەل تومىپىپ چىققان، ساقلىنىپ قالغان گۈل كاسىسىنى كۆرۈشكە بولىدۇ. بەزى مېۋىلەردىن 3mm~1 ئۆزۈنلۈقتىكى ئىنچىكە مېۋە ساپىقى بولىدۇ. مېۋە پوستى چۈرۈك بولۇپ، ئوڭاي توڭولۇپ چۈشىدۇ. ئۇرۇقى فاتىق، ئۇرۇق پوستى قوڭۇر رەڭلىك بولۇپ، ئۇنىڭ تۈۋىي قىسىدا بىر دانە سوقىچاق ئويمان تۆشۈك كۆرۈنىدۇ. پۇرقى ئاجزى، تەمى سەل چۈچۈمەلەك تاتلىق بولىدۇ.

【پەرقىلەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ كۆندىلەك كەممە يۈزىدە: مېۋە سىرتقى پوستى ھۈجەيرىسى بىر قاتار تىزىلغان، ھۈجەيرىلەر يېپىلاق، رەتلىك تىزىلغان، سىرتىنى مۇڭگۈز قەۋەت قاپىلغان، ئىچىدە بىر رەت سىرتقى مېۋە پوستىغا ئوخشادىلغان تۆۋەنگى پوست ھۈجەيرىلەرى بار بولۇپ، ئىككى قەۋەت ھۈجەيرىلەر تەركىبىدە ئوخشاشلا قوڭۇر قىزىل رەڭلىك ماددىلار بولىدۇ. مېۋە ئوتتۇرا پوستىنىڭ نېپىز تام ھۈجەيرىلەرى 4~7 قەۋەت، ھۈجەيرىلەرى سەل چۈك، يۈمىلاقراق، سوقىچاق ياكى كۆپ بۇرچەكلىك بولىدۇ، بەزىلىرىنىڭ تەركىبىدە قوڭۇر ماددىلار بولىدۇ؛ مېۋە ئىچىكى پوستى 2~1 رەت تىزىلغان كۈل دەڭ سېرىق، ئۆزۈنچاق چاسا تاش ھۈجەيرىلەردىن ئىبارەت. ئۇرۇق پوستى ھۈجەيرىسى بىر قاتار بولۇپ، سارغۇچ قوڭۇرەگە بولىدۇ، لېكىن مېۋە ساپىقىنىڭ تۆرەلمە سۇتى قىسىمغا چوڭقۇر پاتقان قىسىدا ھۈجەيرىلەر كۆپ قاتار تىزىلغان بولىدۇ. تۆرەلمە سوت ھۈجەيرىسى يۈمىلاقراق، تېمى قېلىن بولىدۇ. تالقىنى سۇس قوڭۇر دەڭدە بولىدۇ. مېۋە سىرتقى پوستى ھۈجەيرىسى سوقىچاق، تەركىبىدە قوڭۇر ماددىلار تۇتقان بولىدۇ. ئۇرۇقىنىڭ ئىچىكى پوستى تاش ھۈجەيرىلەرى كۈل دەڭ سارغۇچ، تېمى قېلىن، سىزىقلق تۆشۈكلەر قاپىلغان بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 50~180 μm كەڭلىكى 50~50 μm كېلىدۇ. تۆرەلمە سوت ھۈجەيرىلەرى كۆپ بۇرچەكلىك ياكى يۈمىلاقراق، تېمى نسبەتەن قېلىن، بەزىلىرىدە سىزىقلق تۆشۈكچىلەر بولىدۇ. تالالرىنىڭ ئىككى ئۇچى نسبەتەن ئۆچىز بولۇپ، دىئامېتىرى 15~30 μm كېلىدۇ. ئۆتكۈزگۈچ تومۇرلىرىدا تۆشۈكلىك سىزىقچىلىرى بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچىي دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قويۇق خىلىتلارنى تازىلاب، ئۇسسىزلۇقنى قاندۇرۇپ، ئاغرىق باسىدۇ، مەددە ئۆلتۈرۈپ، تەرمىنى تەڭشەيدۇ. ئىچى تىت-تىت بولۇپ، بېغىزى قۇرۇش، ئىشتىهاسى توتۇلۇپ، قەۋزىيەت بولىدۇ، بوغۇم، سۆڭەكلىك ئاغرىش، ئۇچەي مەددە قۇرتىلىرعا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 5~10g

【ساقلاش】 سايى، سالقىن، قۇرغاق ئۇرۇندادا ساقلىنىدۇ.

ئەرمۇدۇن ئۇرۇقى

白蜡树子 Bai la shu zi
SEMENFPAXINI

بۇ ئەرمۇدۇن ئائىلىسىدىكى تۇسۇملۇك ئەرمۇدۇن *Fraxinus chinensis* Roxb ۋە چوڭ يىپپۇرماقلىق ئەرمۇدۇن *Fraxinus rhynchophylla* Hance ، شۇنداقلا شۇ ئۇرۇقداشتىكى كۆپ خل تۇسۇملۇكلىرى نىڭ قۇرۇقتۇلغان ئۇرۇقى بولۇپ، كۈزدە مېۋسى پىشاندا يىغۇۋىلىپ، شاكلىنى ئېلىۋېتىپ ئاپتاپا قۇرۇقتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا يايپلاق تۇرۇرۇكسىمان، ئىككى تەربىيى تەدرىجىي ئۇچلانغان، تۇزۇنلۇقى 1. 1~1. 5cm، دىئامېتىرى 1. 3~3. 5mm، قېلىنلىقى 1. 3mm~1. 3mm سىرتقى يۈزى ئاچ، ئاچ سېرىق، قوڭۇر، هەتتا قېنىق قوڭۇر رەڭلىك، يۈزى سلىق، سەل تىك ئىنچىكە سىزىقچىلار بولىدۇ. پۇرقى ئاجىز، تەمسىزدەك، سەل قىرتاق كېلىدۇ.

【پەرقەندۇرۇش】 بۇ دورىنىڭ كۆندىلەڭ كەممە يۈزىدە: ئۇرۇق پۇستى ھۈجمەيرىسى 3~4 قەۋەت. قوڭۇر سېرىق رەڭلىك، ھۈجمەيرىسى نىسبەتنەن كىچىك، بىر سىزىققا تىزىلغان بولۇپ، سىرتىدا چوڭ سوقىچاراق ھۈجمەيرى بولىدۇ. تۆرەلمە سوت ھۈجمەيرىسىنىڭ ئەڭ سىرتقى قەۋىتى ئۇرۇق پۇستىغا يېقىن جايلاشقان بولۇپ، تېمى قېلىن، ھۈجمەيرىلىرى چاسا ياكى تۇزۇنچاڭ چاسا، توغرىسىغا تىزىلغان، ئۇرۇق پەلىسى ئىككى تال، ئاچ سارغۇچى يېشىل رەڭلىك، گىرۋەك ھۈجمەيرىسى كىچىك، چاسا شەكىللەك، ئۇنىڭ ئائىلىسىدىكى بىر قەۋەت ھۈجمەيرى چاسا شەكىلگە يېقىتراتق بولىدۇ. تالقىنى قوڭۇر رەڭلىك، تورسىمان تومۇرلۇق ۋە بۇرمىسىمان تومۇرلۇق كېلىدۇ. ئۇرۇق پۇست ھۈجمەيرىسى چاسا، نىسبەتنەن چوڭ بولىدۇ. تۆرەلمە سوت ھۈجمەيرىسى كۆپ بۇرقەكلىك كېلىدۇ ۋە تەركىبىدە ياغ تامچىسى بولىدۇ. نىپىز تام ھۈجمەيرىسى تەسۋىسىمان قېلىنلىغان بولۇپ، كالتسىي تۇكىسالات كىرىستال توبىلىرى ۋە چاسا كىرىستاللارنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئۇرۇق پەللە ھۈجمەيرىسى يۇمىلاقراق بولۇپ، تەركىبىدە ياغ تامچىسى ۋە ئالېرون دانچىلىرى بار.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يەل ھەيدەپ، ئاغرىق بېسىش، يۈرەككە قۇۋۇھەت بېرىپ، يۇتەل پەسەيتىش، سۈپىدۇك راۋانلاشتۇرۇش، تاش چۈشۈرۈش تەسىرى بار. كۆكىرەك، بېقىن ئاغرىش، نېرۋا ئاجىزلىق، يۈرۈكى سېلىپ، نەپسى قىستاش، يۇتەل، زىققە، كىچىك تەرەت ماڭماسلىق، ئەرلىك جىنسى ئاجىزلىقلارغا تىشلىتىلىدۇ؛ يەرلىك ئۇرۇنغا ئىشلەتسە، توغماسلىقنى داۋالايدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 9g

【ساقلاش】 سايىھ، سالقىن، قۇرغاق ئورۇندادا ساقلىنىدۇ، مىتە چۈشۈشتىن ساقلىنىش كېرەك.

پەربۇن

对叶大戟果 Dui ye da ji guo

FRUCTUS EUPHORBIAE SORORIAE

بۇ يالماقۇلاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك پەربۇن Euphorbia sororia Schrenk نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقانى مېۋسى بولۇپ، كۈزدە مېۋسى پىشقانىدا بۇقۇن چۆپىنى ئورىۋىلىپ، ئاپتاتا قۇرۇقۇپ، مېۋسى قېقۇۋىلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورىنىڭ شەكلى شارسىمان، ئادمته يۇملاق ئۇج قىرلىق بولۇپ، دىئامېتىرى 4~5mm كېلىدۇ. ئۇستۇنکى ئۇچى سەل كەڭ، مەركىزىي قىسىدا ئىنتايىن قىسقا ئانلىق بويىنى بولىدۇ، ئانلىق بويىنى بېشىنى لوپا ئەينەكتە كۆرگەندە ئۇج يېرىق، يايپاقلىرى كىچىك ئۇج بۇرۇچەكلىك بولىدۇ؛ تۆۋەنكى ئۇچى سەل تار بولۇپ، لوپا ئەينەكتە كۆرگەندە سەل تومپىيپ چىققان توچىسىمان مېۋە ساپاق ئىزى كۆرۈنىدۇ. مېۋسىنىڭ سرتى سىلىق، سارغۇچ يېشىل، كۈل رەڭ سارغۇچ ئاڭ ياكى سارغۇچ قوڭۇر رەڭدە بولىدۇ، لوپا ئەينەكتە تورسىمان سىزىقچىلار كۆرۈنىدۇ. مېۋە شوپىكى نېیز، شۆپۈكىنى سوپۇۋەتكەندىن كېيىن مېۋە شۆپۈكى سىلىق، رەڭگى سۇسراق كېلىدۇ. ئۇرۇقى توخۇم شەكلىدە ياكى سوقىچاڭ، ئاڭ رەڭلىكتىن قوڭۇر رەڭگىچە بولىدۇ. لوپا ئەينەكتە كۆرگەندە دۇبىه تەرىپىدە ياكاڭقا ئۇخشاش ئېگىز-پەس سىزىقچىلار بولىدۇ. ئاستى تەرىپىدە بىر ئۇقۇر ئېرىق (ئۇرۇق كىندىكى) نى كۆرگىلى بولىدۇ. ئۇرۇقنىڭ بىر ئۇچىدا چوڭراق يۇسلاق نۇقتا (ئانلىق توشواڭ) بولىدۇ. پۇرمىايدۇ ياكى سەل پۇرایدۇ، تەمى سەل تۈزۈق ھەم خۇش پۇرالق بۇرۇيدۇ، سەل-پەل گالنى قورۇيدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ تالقىنى يېشىل قوڭۇر رەڭلىك بولۇپ، مېۋسىنىڭ سرتىقى پوست ھۇجمىرسى كۆپ بۇرۇچەكلىك ياكى سوقىچاڭراق كېلىدۇ. مېۋە پوستى ئاستى ھۇجمىرسى كۆپ بۇرۇچەكلىك ياكى چاساسىمان، تېمى سەل قېلىنراق بولۇپ، دائىم دېڭۈدەك مېۋە سرتىقى پوستى بىلەن تۇتۇشۇپ تۇرۇدۇ. مېۋە نۇتۇرۇا پوست ھۇجمىرە تېمى نېیز بولىدۇ. ئۇرۇقنىڭ بىزە پوست ھۇجمىرسى نىسبەتەن كىچىك، چاسا ياكى كۆپ بۇرۇچەكلىك بولىدۇ. ئۇرۇق پوستىدا رىشاتكىسىمان قېلىن دەۋارلىق ھۇجمىرەلەر قاتار تىزىلغان، رەڭگى سارغۇچ قوڭۇر بولىدۇ. تۆرمە سوت ھۇجمىرسىدە ياغلار ئىنتايىن كۆپ بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 ئارىلاشىلىرى (يىپۈرمەق، غوللىرى) 3% تىن (قوشۇمچە A IX) ئاشماسلىقى لازىم.

【سۇ تەركىبى】 سۇ تەركىبىنى ئۆلچەمش ئۇسۇلى بىلەن ئۆلچىگەندە 12% تىن (قوشۇمچە H IX ئۇسۇلى) ئاشماسلىقى لازىم.

【تەبىئىتى】 ئۇچىنجى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داؤالايدىغىنى】 سوغۇق يەلىنى ھەيدىدە. توسالغۇلارنى ئاچىدۇ، ھۆللىكىنى ئېلىپ، ئىشتەمانى ياخشىلایدۇ. مېڭىنى ساغلاملاشتۇرۇپ، زېھىنى ئۆنكۈر قىلىدۇ. قورساق كۆپۈش، ئاشقازان ئاجىزلىشىش، ئىشتەهاسلىق، ئۇنۇتقاڭلىق، راۋان سۆزلىيەلمەسىلىك، مۇچىلەر پالەچىلىكى، تېرى كېسەللەكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3~6g

【ساقلاش】 سايى، سالقىن، قۇرغاق ئۇرۇندا ساقلىنىدۇ.

نارجل

奶桃 Nai tao

SEmen COCOIS

بۇ پالما ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كوكۇس مېۋىسى Cocos nuciferaL. تىندو ئىپپىرمىسى (تۆرەلمە سوتى) بولۇپ، مېۋىسى پىشاندا ئۇرۇۋېلىنىپ، پوسىنى بېرىپ ئۇرۇقى بېلىنىدۇ، مىۋە گۆشىنىڭ شىرىنىسى چىقىۋىتىلىپ، ئاپتاپتا سەل قۇرۇتۇلۇدۇ.

【شەكلى وە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا يۈرەك شەكىللەك بولۇپ، دىئامېتىرى 5~10cm كېلىدۇ. بىزىلىرى ئۇرتۇرىدىن ئىككى پارچە بولۇنگەن بولۇدۇ. ئۇرۇقنىڭ پوسىنى نېپىز، قوڭۇر سۆسۈن رەڭلىك، نۇرغۇن ئۇيۇق تورىمىان سىزىقچىلىرى بولۇپ، بىر تەرىپىدە (دۇمبه تەرمەپ) بىر نەچىچە تال تىك سىزىقچىلىرى بولۇدۇ. تۆرەلمە سوتى قىلىن، ئاق رەڭلىك بولۇدۇ. قىلىنلىقى 7~13mm كېلىدۇ. ئىچى كاۋاك، يېڭى ۋاقتىدا تەملىك، قۇرۇغاندا قاتىقراق، سۇنغان يۈزى سىلىق، ئاق وە مايسىمان بولۇدۇ. پۇرۇقى ئاجىز، تەمى سەل ئاچچىق كېلىدۇ.

رەڭگى سارغىيىپ قالغان، ئېچغان وە ئاچچىق يۈرەق پەيدا بولۇپ قالغانلىرىنى دورىغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. 【بەرقەلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنىڭ پاراشوکى ئاق رەڭلىك، ياغىمان كېلىدۇ. هۇجەيرىلىرى ئۇزۇنچاڭ كونۇسسىمان ياكى تار سوقىچاڭ شەكىلدە بولۇپ، رەڭگى سۇس سېرىقىتنى قوڭۇر سېرىققىچە بولۇدۇ. ئۇزۇنلۇقى 30~70 μm ، دىئامېتىرى 10~20 μm كېلىدۇ. ئۆتكۈزگۈچ كاناللىرى توشۇكلىك سىزىق ياكى بۇزما سىزىقلق بولۇپ، دىئامېتىرى 30~30 μm كېلىدۇ. تۆرەلمە سوت هۇجەيرىلىرى كۆپ بۇرۇچەكلىك ياكى تىك توت تەرمىلىك بولۇپ، تەركىيىدە ماي تامچىلىرى وە ئازراق قوڭۇر مونەكلىر بولۇدۇ. ئۇرۇق پوسىنى هۇجەيرىلىرى قوڭۇر رەڭلىك، تەرىپىز بولۇدۇ.

(2) بۇ دورىنىڭ 5g 0.5g سۇسز ئىتىل ئالكوهولغا بىر سائەت چىلاپ، ھەر ۋاقت چالغىتىپ، سۈزۈپ سىناق ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. يەنە سېلىشتۈرۈما دورا 1 β -ستىوستاندىن 1mg 1ml 1ml ئىتىل ئالكوهول قوشۇپ، سېلىشتۈرۈما ئېرىتمە تەبىارلىنىدۇ. ئاندىن نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېلىشتۈرۈش ئۆسۈلۈدا (VI B) تەحرىبە ئىشلىنىدۇ، يەنە نېپىز قەۋەت سىلىتسى يېلىمى 5 لق نېپىز تاختىغا يۈقىرىقى ئىككى خل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايسىسىدىن 1m 4 دن ئىلىپ، ئايرىم-ئايرىم جايغا تېمىتىپ، بۇنىڭغا تىل ئاتىسىتات (1:5) بىسىلدۈرگۈچى قىلىنىپ بىسىلدۈرۈلەندۇ؛ ئاندىن ئۇنىڭغا 5% لىك ئىتاناول فوسفومولبىدات ئېرىتمىسىنى پۇرکۆپ، داغ نۇقتىنىڭ رەڭگى روشهنلەشكىچە قىزدۇرۇلۇدۇ. تەكشۈرۈلگۈچى دورا رەڭ سېپىكتىرىدا سېلىشتۈرگۈچى دورا رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ جايىدا ئوخشاش رەڭلىك داغ توچىكسى نامايان بولۇدۇ.

【تېبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى وە ئاساسىسى داۋا ئايدىغىنى】 بەدەنى قۇۋۇچەتلىكىدۇ. بۇرەكىنى قىزىتىپ، باھنى قۇۋۇچەتلىكىدۇ، قانىنى كۆپەيتىپ، جىڭىرگە مەنپىئەت قىلىدى. غەيرىسى تەبىئى بەلغىم خىلىتى وە سېپارادىن بولغان بەدەن ئاجىزلىشىش، ھارغىنلىق وە جىنسىي ئاجىزلىق، ئىنكاسى سۇسلىشىش، سوت كەملىك، جىڭىر ئاجىزلىشىپ ئۇرۇقلالىشارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى وە مىقدارى】 10~15g

【ساقلاش】 ھاۋا ئۆتۈشىدىغان، سالقىن، سايىھ جايغا قويۇلۇدۇ، مىتە چۈشۈشتىن ساقلىنىشى كېرەك.

WS₃-BW-0028-98

سو چھو نیا

司卡摩尼亞脂 Si ka mo ni ya zhi

RESINA SCAMMONIAE

بۇ دورا يۈگىمەچ كۈللۈكىلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سوچىمنىيا Convovulus scammonia L. نىڭ يىلتىز قىسىمىدىكى سوتىمان سرغىما ماددىنى قۇرۇتۇپ، پىشىقلاب ئىشلىپ تېبىارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا ئادەتتە يايپىلاق كالىھىسىمان ماددا بولۇپ، دئامېتىرى 15~10cm، قېلىنلىقى تەخمىنەن 1.5cm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى قارامتۇل كۈل رەكىدىن قوڭۇر رەڭىكىچە بولىدۇ، كۈل رەڭ چاڭ-تۇزانلىرى بولىدۇ. جىسىمى چۈرۈك بولۇپ ئاسان پارچىلىنىدۇ، بىڭى ۋاقتىدا پارچىلانغان يۈزى پارقراق، دېۋەرقايدەك بولىدۇ ھەم تۇشاشق تۆشۈكچىلىرى بولىدۇ. رەڭىكى تۇتۇق قوڭۇر بىلەن قارا قوڭۇر رەڭ ئارىلىقىدا بولىدۇ. پۇرىقى پىشاقنىڭ پۇرېقىغا ئوخشىپ كېتىدۇ، تەمى ئىنتايىن ئاچىچق كېلىدۇ. يېقىنى يىللاردىن بۇيان ئەنگلىيەدىن ئىمپورت قىلىپ كىرگۈزۈلگەن مەھسۇلاتلار نوغۇچ شەكلىدە بولۇپ، ئۇزۇنلىقۇ تەخمىنەن 18cm، دئامېتىرى 2cm، ئېغىرلىقى 100g كېلىدۇ.

پەرقلەندۈرۈش (1) بۇ دورىنىڭ 5mg 2. تالقىنى 50ml لىق مېزۇر كىغا قۇيۇپ، مېتىل سىپېرتىنى شكارە سىزىقىغىچە قوشۇپ تېرىتىپ، سېپكىترو فوتومېتىر (قوشۇمچە A) ئۆسۈلىدا تۈچىگەن 219nm لىق دەلگۈن ئۆنىدا نەڭ كۆپ سۈمىرەللىدۇ.

(2) 10ml لق تُبَغْزِلْق پِرُوبِرْكِنْغا بُو دورىدىن 0.1g سېلىپ، 5ml مېتىل تُسْپِيرْت قوشۇپ چايقاب تېرىتكەندىن كېيىن 2 سائىت تۇرگۇزۇپ، تۇستىگە سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقى سىناق تېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. نېيىز قەۋەتلىك رەڭ سېلىشتۇرۇش (قوشۇمچە VB) تەجريبىسى بويىچە سىناق تېرىتىمىسىدىن 1ml 5 ئېلىپ، سودىئۇم كاربوكسىمېتىل سېللازا بېپىشىتۇرغۇچى قىلىنغان نېيىز قەۋەت سىلتىسي يېلىمى G لق تاختىغا تېمىتلىپ، خلوروفورم-مېتىل تُسْپِيرْت (19:1) بېسىلدۈرگۇچى قىلىنىپ بېسىلدۈرۈلدى، ئاندىن بۇنى ئۇلترا سىنھىش نۇر لامپىسىدا (365nm) تەكشۈرۈپ كۆرگەندە، 7 يالتراق نۇقتا كۆرۈندى. (3) 0.1g سوچىمۇنىياغا 10ml ناتىريي هيدروكىسىد سىناق تېرىتىمىسى قوشۇپ قاينىتىلىدۇ. سوچۇغان دىن كېيىن ئۇنىڭغا تۆز كىسلالاتىسى قوشۇپ، كىسلالاتالاشتۇرغاندا سۈزۈڭ ئەلتەتە تۇرۇشى، دەرھاللا دۇغ باك، جەكمە هاسا يەلماسلىق كېڭەك.

تەكشۈرۈش قۇرۇغاندا يوقىلىدىغان تۈغىرلىقى 5.0% دىن (قوشۇمچە G IX) ئاشماسلىقى كېرىگەك.

ئومۇمىي كۈلى】 0.5 % دىن (قوشۇمچە K IX) ئاشماسىلىقى كىزىك.

سۇلۇق ئېرىتىمىسى بۇ دورىنىڭ تالقىنдин 1gنى توغرا جىڭلەپ ئېلىپ، 20ml سۇ قوشۇپ، ئۇلترا ئۇوازلىق ئىپپاراتتا 2 سائەت بىر تەھىپ قىلغاندىن كېپىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيىقۇقۇنى تولۇق قۇرۇقتۇپ، ئېغىرىلىق مۇقىملاشتۇرۇغان يارلاندۇرۇش قاچىسىغا قۇيۇپ، سۇغا سېلىپ يارلاندۇرۇپ، 100°C تا بىغىرلىقى

مۇقىملاشقۇچە قۇرۇتۇلغاندا، تىرىپى 20% دىن ئاشماسىلىقى كېرەك.

【ئىكستراكتى】 ئېفرىدا ئېرىيىدىغان ئېكستراكتى: بۇ دورىنىڭ تالقىنىدىن 1g توغرا جىڭلاب ئېلىپ، 50ml ئېفر قوشۇپ، 15 مىنۇت كۈچەپ چايقغاندىن كېيىن سۈزۈپ، تىرىپىنى يەنە 10ml ئېفر بىلەن چايقاب سۈزۈۋېلىپ، ئىككىسىنى بىرلەشتۈرۈپ، قۇرۇتۇپ، ئېغىرلىقى مۇقىملاشتۇرۇلغان پارلاندۇرۇش قاچىدە سىغا قۇيۇپ، ئېفرىنى پارلاندۇرۇۋەتكەندىن كېيىن 100% ئېغىرلىقى مۇقىملاشقۇچە قۇرۇتسىلا بولىدۇ.

بۇ دورىنىڭ تەركىبىدىكى ئېفرىدا ئېكستراكتى 60.0% دىن ئاز بولماسىلىقى كېرەك.

【تەبىتى】 تۇچىنچى دەرىجىدە ئىسىق، ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق، زەھەرلىك.

【تەسلى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي نورمال خىلىتلارنى ھېيدەپ، ھۆل سوغۇق ۋە يەلدىن بولغان توسالغۇلارنى تاچىدۇ. چوڭ-كىچىك تەرمىنى راۋانلاشتۇرىدۇ ۋە ئاشقازاننى ساغلاملاشتۇرىدۇ، بوغۇملار ئاغرىش، ئىستىسا ۋە قەۋزىيەت، ئاشقازان ئاجىزلىشپ، ئىشتىها كېمىيىش، زەھەرلىك يىلان چېقتوپلىش، كۆزى قىزىرىپ ئىشىش، باش قېيىش، باش ئاغرىشلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 0.2~0.6g

【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 سوغۇقچان كېسەللەر ۋە ھامىلىدارلارغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

【ساقلاش】 قۇرغاق جايغا قويۇلدۇ.

WS₃—BW—0029—98

تاۋۇز ئۇرۇقى

西瓜子 Xi gua zi

SEMEN CITRULLI VULGARE

بۇ قاپاق ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك تاۋۇز Citrullus vulgaris Sehrad. نىڭ قۇرۇتۇلغان يېتىلگەن ئۇرۇقى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىللەرىدە پىشقاڭ تاۋۇزنى يېگەندە ئۇرۇقىنى يىغىۋىلىپ، پاڭزە يېپىپ، ئاپتىپا قۇرۇتۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا يېپلاق كەڭ تۇخۇمىسىمان ياكى تۇخۇمىسىمان شەكىلدە بولۇپ، نۇزۇنلۇقى 7~15mm، كەڭلىكى 10mm~5، قېلىنلىقى 3mm~2 كېلىدۇ. سرتقى يۈزى قارا، قوڭۇر قىزغۇچى، پارقراق، ئۇستى ئۇچى ئۇچلۇقراق، ئائى ئۇچسز، ئۇرۇق پۇستى قاتىق، ئاڭ رەڭلىك بولىدۇ. پۇرقى ئاجزى، تەمى سەل تاتلىق ھەم مەززىلىك كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدە: ئەڭ سرتقى قەۋىتى شىلمىشقا سۈبۈقلۈق قەۋەت بولۇپ، ئۇرۇق پۇستىنىڭ سرتقى يۈزە پۇست ھۈجەيرىلىرى يۈمىلاقراق، كىچىركەك بولىدۇ. ئائىستىقى پۇست قەۋىتىدىكى قېلىن تاملىق ھۈجەيرىلەر چوڭ، ئىچىدە نۇرغۇن ئالپرون دانىچىلىرى بولىدۇ. تاش ھۈجەيرە قەۋىتىدە بىر قاتار ھۈجەيرە بولۇپ، چاسراق شەكىلدە، قوڭۇر سېرىق كېلىدۇ. ئۇرۇق سېچكى پۇستى ھۈجەيرىلىرى تالاسىمان موکا شەكىللەك، ئۇرۇق پەللىسى ھۈجەيرىلىرى نىسبەتنەن كىچىك بولۇپ، تەركىبىدە ئالپرون دانىچىلىرى ۋە ياغ تامىچىلىرى بولىدۇ.

【تەبئىتى】 ئىككىنچى درىجىدە ھۆل سوغۇق.

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 بەدەننى يۇمىشتىدۇ، بەدەننە ئېشىپ كەتكەن سەپرا ماددىسىنى تازىلایدۇ. سۈيدۈكىنى راۋانلاشتۇرۇپ، تاشنى چۈشۈرۈدۇ. قاندا سەپرا ماددىسىنىڭ ئېشىپ كېتىشى، ئاپتىپ ئۆتۈش، ئىسىستىما، ئۇرۇقلاش، ئىسىستىن بولغان قان قۇسۇش، قان بېسىم يۈقىرىلىق ۋە سىل كېسەللەرىگە ئىشلىتىلدى. تاۋۇز ئۇرۇقىنى ئېزىپ، شىرىنسىنى چىقىرىپ، سۈيدۈك راۋان بولماسىلىق، سۈيدۈك بولى تېشىغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 15~30g

【ساقلاش】 شامال ئۇتۇشىدىغان، قۇرغاق جايغا قويۇلدى. مىتە چۈشۈشتىن ساقلىنىش كېرەك.

بە سپاسە

肉豆蔻衣 Rou dou kou yi ARILLUS MYRISTICAE

بۇ مۇسکات دەرىخى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك مۇسکات دەرىخى
نىڭ قۇرۇقۇلغان ساختا ئۇرۇق پوستى بولۇپ، مۇسکات ئۇرۇقىنى يىغىنالىدا ئۇنىڭ ساختا ئۇرۇق پوستى
سوپۇۋېلىنىپ، ئاپتايپا قۇرۇقۇلسا.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا يايپلاق، بولۇنگەن يايلاقەتك، شاخلانغان شەكىلدە ياكى
يېرىم كانايىسمان ھالەتتە بولۇپ، كۆپىنچە قاتلىنىپ يېسىسلاڭان بولىدۇ، ئۇرۇنلۇقى تەخمىنەن
25mm، قىلىنلىقى تەخمىنەن 1mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى سۇس قىزغۇچ قوڭۇر ياكى كاۋا چىچىكىگە
مايل قوڭۇر رەڭ، يېرىم سۈزۈك، سەل ئاڭ قىرو باغلىغان، ئېتى ياغلىق، پۇراقلق، تەمى قېرىق، ئاچچىق
كېلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داؤالايدىغىنى】 مېڭىنى قۇۋوشتلەپ، جىڭەرنى كۈچەيتىدۇ، ھۆللۈكىنى
ھېيدەپ، ئاشقازاننى ساغلاملاشتۇرىدۇ، سوغۇق يەللەرنى تارىقىتىدۇ، مەننىي كۆپەيتىپ، باھنى قۇۋوشتلەيدۇ.
مېڭە ئاجىزلىق، ئۇنۇتقاقلق، جىڭەر زەنپىلشىپ، مەننىي ئازىيىش، ئىشتىهاسىزلىق، ئۇرەنلىك ئاجىزلىشىش،
سوغۇقى ئېشىپ، تال زەنپىلشىش، ئىچى سۈرۈش، قان قۇسۇشلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 6~9g. باللارغا دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىچكۈزۈلە.

【ساقلاش】 قۇرغاعق جايغا قويۇلسا.

WS₃-BW-0031-98

سازه ج
肉桂叶 Rou gui ye
FOLIUM CINNAMOMI

بۇ كامفورا ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك دارچىن Cinnamomum cassia Presl. نىڭ قۇرۇقۇلغان يوپۇرمىقى بولۇپ، ياز پەسىلىدە دارچىن بۈكۈ-باراقسان بولغان مەزگىلەدە يوپۇرمىقىنى يىغىپ، ئاپتاتىقا قۇرۇقۇلىسىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا كەڭ تەمىنلىكى، تەمىنلىكى ياكى ئۇزۇنچاق يۇمىلاق شەكىلde بولۇپ، ئۇزۇنلىقى 17cm ~ 8cm، كەڭلىكى 3 ~ 6cm كېلىدۇ. ئۇچى سەل ئۇچلۇق، تۈۋى ئۇچىز، تولۇق گىرۋەكلىك، جىسمى تېرىدەك، ئۆستى يۈزى ئاچ بېشل، سىلق، تۇشىسىز، تائىسى يۈزى ساراغۇچ بېشل، شالاڭ، يۇمران تۇشتۇ قاپىلغان، 3 تال يىپۇرماق تومۇرى روشەن كۆتۈرۈلۈپ چىققان، ئىنچىكە تومۇرمى تۇغىسىغا تەكشى تارقالغان. تېنى تېرىدەك چىك بولىدۇ، پۇرقى خۇشبىي، تەمى سەل ئاحىجىق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ تالقىنى سارغۇچ قوڭۇر بېشىل، كراخمال دانىچىلىرى كۆپ بۇرجهكىلەك ياكى يۇملاقراق شەكىلەدە بولۇپ، دىئامېتىرى $10\mu\text{m}$ ~ $2\mu\text{m}$ كېلىدۇ. قېلىن دېۋار تالالرى ئۇزۇنچاڭ موکسىمان ياكى تەرتىپسز بولۇپ، دىئامېتىرى تەخمىنەن $20\mu\text{m}$ كېلىدۇ. تاش ھۇچىرىلىرى يۇملاقراق ياكى ئۇزۇنچاڭ يۇملاق بولۇپ، دىئامېتىرى $50\mu\text{m}$ ~ $30\mu\text{m}$ كېلىدۇ. ئۆتكۈزگۈچ كاناللىرى توشۇكلىك بولۇپ، دىئامېتىرى $30\mu\text{m}$ ~ $20\mu\text{m}$ كېلىدۇ. ياغ ھۇچىرىلىرى يۇملاقراق بولۇپ، بەزىدە سېرىق ئاجرالىلار ئۆچرایدۇ.

تىكىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

«تھسری ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» سوغۇق يەلنى تارقىتىپ، مېكىنى ساغلاملاشتۇردىو ۋە ئۆپكىنى ياشارتىدۇ. سۈيدۈك ۋە ھەيز ماكىدۇرىدۇ. سوغۇق يەل توسوۇلۇپ قېلىش، كونا يىۋەل، چارچاپ ماغۇورىسىن لىنىش، نەپس قىسىلىش، سۈيدۈك ئازىيىش، ھەيز تۇقۇلۇشلارغا ئىشلىتىلدىو.

ئىشلىش ئۆسۈلۈ ۋە مىقدارى [5~10g]

【ساقلاش】 قۇرغاق جايغا قويۇلدى.

زەرنەپ

红豆杉 Hong dou shan

CAULIS ET FOLIUM TAXI

بۇ تاكسوس دەرىخى ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك ھىمالايا زەرنەپ دەرىخى Taxus wallichiana Zucc. نىڭ قۇرۇتۇلغان شاخ ۋە يوپۇرمىقى بولۇپ، ياز، كۈز كۈنلىرى يېغىپ، ئاپتالىتا قۇرۇتۇلدى. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا كۆپىنچە 15cm ~ 3 ئۇزۇنلىقتا قەلمىچە قىلىپ توغرىلىدۇ. كونا شېخىنىڭ قۇۋىزىقى كۈل رەڭ قوڭۇر ياكى سۇس كۈل رەڭگە مايل جىڭەرەڭ، سەل يېرىك بولۇپ، ئاسانلا پارچە-پارچە بولۇپ سوپۇلدۇ، ياغاج قىسىمىنىڭ قۇۋىزاققا تۇتاشقان يۈزى سارغۇچ ئاڭ ياكى ئاڭ دەڭلىك، ئىچكى قىسىمى سۇس سارغۇچ ئاڭ دەڭلىك بولۇپ، ئۇڭايلىقچە سۇنمىدۇ. ئىككى يىللۇق نوتىسىنىڭ قۇۋىزىقى قوڭۇر رەڭ، شۇ يىللۇق بېكى نوتىسى قوڭۇرغا مايل بېشل بولۇپ، يوپۇرماق تەرتىپىدەك تىزىلغان پۇلتايغان قالدقۇق غوللىرى ئۇچرايدۇ. غولى توم بولۇپ، كونا شېخىنىڭ دىئامېتىرى 0.5 ~ 2cm، ئىككى يىللۇق شېخىنىڭ 1 ~ 2mm كېلىدۇ. شۇ يىللۇق نوتىسى ئىككى يىللۇق شېخى بىلەن ئوخشاش توملىقتا ياكى سەل ئىنچىكە بولىدۇ. يوپۇرمىقى يېسىمان بولۇپ، ئادەتتە نىسبەتەن تۈز، ئاستى-ئۇستىنىڭ كەڭلىكى ئاساسەن ئوخشاش ياكى ئۇستى ئۇچى سەل تاراق بولىدۇ. ئالدى تەرىپىدە پۇلتىيپ چىققان ئۇچى بولىدۇ. تۇۋىنىڭ ئىككى تەرىپى سىممېتىرىك، ئۇزۇنلىقۇ 1.5mm ~ 3cm، كەڭلىكى 1.5mm، غول تومۇرى ئاراق تەرىپىگە قىلانغان، گىرۋەكلىرى تەتۈرسىگە قاتلانغان بولىدۇ. پۇرقى خۇشبۇي، تەمى سەل قىراتاڭ كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) يۇمران شېخىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدە: يۈزەكى پوست ھۈجەيرىلىرى بىر قاتار تىزىلغان، چاسىراق، دىئامېتىرىغا قاراپ سوزۇلغان، سىرتىنى مۇڭگۈز ماددىلىق قەۋىتى ئورىغان، مۇڭگۈزلىشكەن قەۋىتىنىڭ قەۋەت سىزىقى ئېنىق بولىدۇ. قۇۋىزاق قەۋىتى ھۈجەيرىلىرى كۆپ بۇرجەكلىك ياكى تىك توت بۇلۇڭلۇق، 20 نەچچە قەۋەت بولۇپ، پوستىغا يېقىن جايىدا دائىم قوڭۇر سېرىق تاش ھۈجەيرىلىرى ۋە قوڭۇر سېرىق تۈگۈنەكلىر بولىدۇ. ئەۋرىشىم پوست قىسىمغا يېقىن ھۈجەيرىلەرde كراخمال دانىچىلىرى نىسبەتەن كۆپ بولۇپ، كراخمال غىلاب قەۋىتىنى ھاسىل قىلغان، ئەۋرىشىم پوست قىسىم تاراق بولىدۇ، شەكىللەنىش قەۋىتى ئانچە ئېنىق بولمايدۇ. ياغاچلىق قىسىمى كەڭ بولۇپ، ئۇتۇرسىدا ئۆرەك بولىدۇ.

(2) يوپۇرماق غول تومۇرىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدە: ئۇستى ھۈجەيرىسى بىر قاتار تىزىلغان، سوقىچاق بولۇپ، ئازغۇنە كەسكەن سىزىقنى بويلاپ سوزۇلغان، سىرتىنى مۇڭگۈزلىشكەن قەۋىتى ئورىغان، قۇۋىزاق ئاستى ھۈجەيرىلىرى تىك توت تەرمىلىك ياكى كۆپ بۇرجەكلىك، دىئامېتىرىنى بويلاپ ئۇزازغان بولىدۇ؛ ئاستى پوست ھۈجەيرىلىرى ئۇستى پوست ھۈجەيرىلىرىدىن چوڭ، چاسىراق، مۇڭگۈزلىشكەن قەۋىتى ئېنىق ئەمسى، قۇۋىزاق ئاستى ھۈجەيرىلىرى سوقىچاق بولىدۇ. ئۇتۇرسىدا سىرتى ئەۋرىشىم

ئۆتكۈزگۈچى كاناللار بولۇپ، ئۆتكۈزگۈچى كاناللار سرتىغا بىر قاتار ئوششاق ھوجىرىلەر تىزىلىپ، ئىچكى قوۋازق قەۋىتنى هاسىل قىلىدۇ. يوپۇرماق بىتىنىڭ ھوجىرىلىرى شالاڭ تىزىلىدۇ.

(3) بۇ دورىنىڭ تالقىنى قوڭۇر بېشل بولىدۇ. ھاۋا توشۇكچىلىرى سېرىق، يوپۇرمقىنىڭ ھاۋا توشۇكچىسى قوشۇمچە مۇھاپىزەت ھوجىرىسى 4 دانە، غول قوۋىنلىنىڭ ھاۋا توشۇكچە قوشۇمچە مۇھاپىزەت ھوجىرىسى $8\sim4$ گىچە، ھاۋا توشۇكچىسىنىڭ دىئامېتىرى تەخمىنەن $50\mu\text{m}$ بولىدۇ. يوپۇرماق ئەت ھوجىرىلىرىدە نۇرغۇن كراخمال دانىچىلىرى ۋە قوڭۇر رەڭ ماددىلار بولىدۇ. قوۋازق قەۋەت ھوجىرىلىرى تىك تۆت تەرمەپلىك ياكى چاسىراق بولۇپ، كراخمال دانىچىلىرى بولىدۇ. نەيچىسىمان ھوجىرىدىه تورسىمان، توشۇكسىمان ۋە بۇرمىسىمان سزىقچىلار بولىدۇ. ياغاج تالالرى قېلىن ۋە نېپىز تاملق دەپ ئىككىگە بولۇنىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەربىي تەبىئىي خىلىتلارنى تازىلايدۇ، يۈرەكىنى كۈچىتىدۇ، ئىشتىهانى ئاچىدۇ، مېڭىگە مەنپەئەت قىلىدۇ. روھنى كۆتۈرۈپ، كۆڭۈلىنى خۇشخۇي قىلىدۇ. ئاشقازاننى ئىللەتىپ، جىڭەرگە مەنپەئەت قىلىدۇ. نېرۇا ئاچىزلىقى، يۈرەك سېلىش، نېپىس قىسىلىش، يۆتىلىش، دېمى سىقىش، ئىشتىهاسىزلىق، ھەزم ناچارلىق، يۈز نېرۋىسى پالىچى، پالەچىلىكەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3~7g

【ساقلاش】 سايىه، سالقىن جايىغا قويۇلىدۇ.

زاراڭزا ئۇرۇقى

红花子 Hong hua zi
SEMEN CARTHAMI

بۇ مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك زاراڭزا Carthamus tinctorius L. نىڭ قۇرۇتۇلغان مېۋسى بولۇپ، كۈزدە مېۋسى پىشقاڭدا غولىنى ئۇرۇپ يىغىۋىلىپ، مېۋسى قېقىپ چۈشۈرۈۋېلىنىدۇ.

【شەكلى وە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورىنىڭ شەكلى تەتۈر تۇخۇمسمان، سەل يايپلاق بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 7~9mm، كەڭلىكى 3.5~5.4mm، سىرتقى يۈزى ئاڭ رەڭلىك، ئۇستى ئۇچى سۇس قوڭۇر رەڭ، سەل پارقراق كېلىدۇ. 4 تال ئۇزۇنلىققىرى بولۇپ، ئالدى ئۇچى كېلىكەندەك توت بۇرجىكى چوقچىيىپ چىققان، ئۇتتۇرسى سەل توپىغاڭان، تۇۋى ئۇچىسىز، مېۋە كىندىكى يۇمىلاق چىكتىسمان بولىدۇ. مېۋە شوپۇكى قاتىق بولۇپ، ئىچىدە بىر تال ئۇرۇقى بولىدۇ. ئۇرۇقى تەتۈر تۇخۇمسمان، سەل يايپلاق، ئۇزۇنلۇقى 5~7mm، كەڭلىكى 3.9mm~2.8 بولىدۇ. سىرتقى يۈزى سۇس قوڭۇر رەڭ، ئۇچى دىقماق، ئاستى ئۇچلۇق، ئۇرۇق پوستى نېپز بولىدۇ. پەللە يىپۇرمىقى 2 تال، قىلىن، ياغلىق بولىدۇ. يۇرۇقى ئاجزى، تەمى ئاچقىك كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 بۇ دورا مېۋە پوستىنىڭ تالقىنى ئاچ سېرىق، مېۋە پوستى سىرتقى پوست ھۈجەيرىلىرى ئاچ سېرىق؛ كۆرۈنۈشى كۆپ قىرلىق، سەل ئۇزازغان بولىدۇ. ھۈجەيرىلەر ئارىلىق قەۋىتىنى بىنق بولمايدۇ. كەتراب تېمى مارجانىسمان قىلىنلاشقان بولىدۇ. كەسمە يۈزى يايپلاق چاسا، تېمى قىلىن بولىدۇ. تۇتتۇرا مېۋە پوستى ھۈجەيرىلىرى ئاچ سېرىق، دىۋارلىرى سەل قىلىن، كۆپ بۇرۇچەكلىك، سەل ئۇزازغان بولىدۇ. تاش ھۈجەيرىلىرى تاراققى جايلاشقان، يۇمىلاقراق، تىك توت بۇلۇڭلۇق، يۇمىلاق ئۇچبۇرۇچەك شەكىللەك ياكى باشقا تەرتىپىسىز شەكىللەرە بولىدۇ. ئۇزۇن ئۇقنىنىڭ دىئامېتىرى 75μm~35، قىسقا ئۇقنىنىڭ دىئامېتىرى 35μm~15، تېمىنىڭ قىلىنلىقى 5~15μm كېلىدۇ. توشۇكچىلىرى سوقىچاق، ھۈجەيرە بوشلۇقى چوڭ، توشۇك ئېرىقچىسى ئىنق بولىدۇ. تالالىرى تۇنام شەكىللەندۈرگەن ياكى تاراققى، شەكلى موکىسىمان، ئالدى ئۇچى ئۇچلۇق ياكى دىقماق بولۇپ، دىئامېتىرى 10~30μm، ئۇزۇنلۇقى 120μm~70 كېلىدۇ. تېمى قىلىن، توشۇكچىلىرى چىكتىسمان بولىدۇ. ياخ تامچىلىرى ئاچ سېرىق شار شەكىللەك، چوڭ-كىچىكلىكى ھەر خىل كېلىدۇ. قىلىن دىۋارلىق ھۈجەيرىلەر-نىڭ ئۇزۇنلۇقى 100μm~120μmغا يىتىدۇ، تېمى قىلىن، ھۈجەيرە تېمى دولىتونىسىمان ئەگر بىلەشكەن بولۇپ، شەكلى تەرتىپىسىز بولغان قىزغۇچقۇڭۇر رەڭ تۈكۈنچىلەرنى كۆرگىلى بولىدۇ.

【تەبىيىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە ئىسىق، بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

【تەسىرى وە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەiriyi تەبىيىي قويۇق خىلىتلارنى يەڭىل سۈرىدۇ. بەلغىم چىقىرىپ، چوڭ تەرەتنى ماڭعۇزىدۇ، ھېيزىنى تەڭشىدۇ، باھنى كۈچەيتىدۇ. غەiriyi تەبىيىي بەلغىم وە سەۋادىن بولغان كىسەللەر، بەلغىم چىقىماسلقى، يۈرەك سېلىش، دەم سىقىش، قورساق ئاغرىش، قەۋزىيەت، بەدىنى ئۇرۇقلاب قىچىشىش، قۇرت-قوڭغۇز چىقۇپلىش، بەدەندە تاش پەيدا بولۇش، جىنسىي ئاجزلىق، ھەيز قالايمقانلىشىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى وە مىقدارى】 5~7g

【ساڭلاش】 سالقىن، قۇرغانقى جايىدا قويۇلدۇ.

WS₃—BW—0034—98

زاراڭزا يېغى

红花子油 Hong hua zi you

OLEUM CARTHAMI

بۇ مۇرەككىپ گۈللۈكلىرى ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك زاراڭزا Carthamus tinctorius L. نىڭ قۇرۇقۇلغان مېۋىسىنى يانجىپ چىقارغان يېغىدىن تىبارەت. «شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» بۇ سېرىق ياكى ئالتۇن رەڭلىك سۈزۈك ياغسىمان سۇيۇقلۇق بولۇپ، خۇش پۇراقلقى، غەيرىي پۇرتقى يوق. بۇ دورا ئېفسر قاتارلىق ئورگانىك بېرىتكۈچلىرەدە تېرىيدۇ. «تەكشۈرۈش» كىسلاتالىق قىممىتى 1.0 دىن (قوشۇمچە IXN) چوڭ بولماسىلىقى كېرەك. «سوپۇنلىشىش قىممىتى» 190.6~186.0 (قوشۇمچە IXN) بولۇشى كېرەك. «يودلىشىش قىممىتى» 142~148 (قوشۇمچە IXN) بولۇشى كېرەك. «تەبىئىتى» تىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق تىسىق. «تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى» غەيرىي تەبىئىي بەلغەمنى پىشۇرىدۇ، سوغۇق يەلىنى تارقىتىدۇ، سۈيدۈكىنى راۋانلاشتۇرىدۇ ۋە ھەيزىنى تەڭشەيدۇ. غەيرىي تەبىئىي بەلغەمدىن بولغان كىسەللىكلىرى، بوغۇملار ئاغرۇش، سۈيدۈك راۋان بولماسىلىق، ھەيز قالايىمىقاتلىشىلارغا تىشلىتىلىدۇ. «ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى» مۇۋاپىق مىقداردا ئىچكۈزۈلىدۇ ياكى سىرتتن تىشلىتىلىدۇ. «ساقلالاش» ئاغزىنى ھىم ئېتىپ، سالقىن، سايە جايىدا ساقلىنىدۇ.

ياقوت

红宝石 Hong bao shi
RUBY

بۇ قىزىل رەڭلىك، سوزۇك، قاتىق كريستال مەدەن قىزىل ياقۇت (Ruby) تىن ئىبارەت. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ ئالىتە قىرلىق سوغاسىمان ياكى سىلىندىر شەكىللەك جىسم بولۇپ، قىزىل رەڭنىڭ ئۆزگۈرىشى بىر قىمەر چوڭراق يەنى ھال رەڭ، بېلىق قاسىرىقىسىمان قىزىل، سۆسۈن قىزىل رەڭدىن قارامتۇل قىزىل رەڭگىچە ھەر خىل بولىدۇ. مەزكۇر جىسم كريستالنىڭ تەركىبىدە ئاز مىقداردا خром (Cr₂O₃) ئۆكسىد (III) مىقداردا خروم (Cr₂O₃) بولغاچقا، كۆزگە كۆرۈنىدىغان نۇردا قىزىل، ئۇلترا بىنەپشە نۇردا ئۇچۇق قىزىل جۇلالىق نۇر چىقىرىدۇ. قوش نۇر سۇندۇرۇش رولىغا ئىگە، جىمى قاتىق، چۈرۈك كېلىدۇ، سوقۇلغاندا ئاسان پاچىلىنىدۇ.

【تەبىيىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 كۆڭۈلىنى ئېچىپ، زېھىنى ئۆتكۈرلەشتۈرىدۇ، يۈرەكىنى كۈچەيتىپ، مېڭىكە مەنپەئەت قىلىدۇ، قانىنى تەڭشەپ، زەھەر قايىتۇرىدۇ. ئېلىشىپ قېلىش، باش قېيش، زېھىنى ئاجىزلىق، يۈرەك سېلىش، بىئارام بولۇش، تۇتقاقلق، خولپاراغا ئىشلىتلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 0.25~0.5g

【ساقلاش】 قۇرغاق جايغا قويۇلدۇ.

WS₃—BW—0036—98

چامغۇر ئۇرۇقى

芫荽子 Wu jing zi

SEMEN BRASSICAE RAPAE

بۇ كېرىست گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك چامغۇر Brassica rapa L. نىڭ پىشقانى ۋە قۇرۇتۇلغان ئۇرۇقى بولۇپ، ياز كۈنلىرى چامغۇر بىتىلگەندە كۆكىنى ئورۇۋېلىپ، ئاپتاتا قۇرۇتۇپ، قېقىپ ئۇرۇقنى يىغۇۋېلىپ، ئەخلىەتلىرى تازىلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا يۇملاق، دىئامېتىرى 1.8mm ~ 1.2mm، سىرتقى يۈزى قوڭۇرەڭ، ئاز ساندىكىلىرى قېنىق قوڭۇر دەگىدىن سۈس قوڭۇرەڭكىچە بولىدۇ. ئۇرۇق كىندىكى تۇخۇمىسىمان، سىلىق، رەڭگى سۇس كېلىدۇ. ئۇرۇق پوستى نېپىز بولۇپ، بارماق بىلەن ئېزىۋەتكىلى بولىدۇ. ئۇرۇق پەللەسى ئىككى تال، ئۇچۇق سېرىق رەڭلىك، پۇرۇق ئاچىزراق، تەمى سەل ئاچىچق كېلىدۇ.
【پەرقەلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنىڭ تالقىنى سارغۇچ قوڭۇرەڭ، قاشاسىمان ھۈچەيرىلەر بىر-بىرىگە قوشۇلغان، سېرىق رەڭلىك بولىدۇ. ئۇرۇق پوستى پوست ھۈچەيرىلەرى يۇملاقلار، سىزىقچىلىرى بار. ئىچكى تۆرەلمە سوت ھۈچەيرىلەرى چاسىراق بولۇپ، كۆپىنچە قاشاسىمان ھۈچەيرىلەر بىلەن تۇشاشقان بولىدۇ. ئۇرۇق پەللەسى ھۈچەيرىلەرى ئۇششاق بولۇپ، ئىچىدە ياغ تامىچىلىرى بولىدۇ. ئىچكى ئۇرۇق پوستى تورىسىمان ھۈچەيرىلەردىن ئىبارەت.

(2) بۇ دورىنىڭ تالقىنىدىن 0.5g 5ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ چالغىتىپ، 3~2 سائەت تىندۇرغاندىن كېپىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقى سىناق ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن β-ستوستېرول سېلىشتۇرما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا بېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml دا 1mg دا لق ئېرىتمە تەبىيارلاپ، سېلىشتۇرما ئېرىتمە تەبىيارلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېلىشتۇرۇش ئۆسۈلەدا (قوشۇمچە B VI) تەجربىسى ئىشلەپ، يۇقىرىقى ئىككى خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml دىن ئېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سىلىتىسى بېلىمى G لق تاختىغا ئايىرم-ئايىرم تېمىتىلىدۇ، بۇنىڭغا ئۇئىل-ئېتىپ-بېتىل ئاتىپتات (5:1) بىسىلدۈرگۈچى قىلىنىپ بىسىلدۈرۈلەدۇ، ئاندىن تاختىنى ئېلىپ سايىدا قۇرۇتۇپ، 5% لىك فوسფومولىبىدات بېتىل ئىسپىرت ئېرىتمىسىنى پۇركۈپ، C 105 تا بىر نەچىچە منۇت قافلاپ قۇرۇتۇلەدۇ. سىناق ئېرىتمىنىڭ رەڭگىنى سېلىشتۇرغاندا، سېلىشتۇرما ئېرىتمىنىڭ ئۆزىگە مۇناسىپ ئۇرۇندا ئۇخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【لايىقلاشتۇرۇش】 چامغۇر ئۇرۇقىنى قورۇش: پاكسە چامغۇر ئۇرۇقى يالغۇز قورۇش ئۆسۈلەدا (قوشۇمچە B II) يەڭىل ئېتىلغۇچە قورۇلەدۇ.

【تەبىئىتى】 ئۇچىنجى دەرىجىدە ئىسىق. بىرىنچى دەرىجىدە ھۆل.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 بۆرەكەكە مەنپەئەت قىلىپ، باھنى كۈچەيتىدۇ، ئاشقازاننى كۈچەيتىپ، ھەزىمنى ياخشىلایدۇ، يەللەرنى تارقىتىپ، سۈيدۈكىنى راۋانلاشتۇرۇدۇ. جىنسىي ھەۋەس سۈسلە-شىش، يۆتىلىش، نەپىس قىسىلىش، بەل سىرقراپ ئاغرىپ، مۇچىلەر بوشاب كېتىش، سۈيدۈك راۋان بولماسلق، چىرايى خۇنۇكلىشىلەرگە ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 5~10g

【ساقلاش】 شامال ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان، قۇرغاق جايغا قويۇلەدۇ.

كەرەپىشە ئۇرۇقى

芹菜子 Qin cai zi
FRUCTUS APII

بۇ كۈنلۈكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كەرەپىشە Apiumgraveolens L. نىڭ پىشقان قۇرۇتۇلغان مېۋىسى بولۇپ، ياز، كۈز كۈنلىرى مېۋىسى پىشقاندا مېۋە باشقىنى ئورۇۋېلىپ، ئاپتاتا قۇرۇتۇپ، مېۋىسى قېقىپ چۈشۈرۈۋېلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىسىتى】 بۇ دورا شارسىماناڭ ياكى كەڭ تۇخۇمىسىمان بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 1~1.5mm، دىئامېتىرى 1~1.2mm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى سۇر يېشىلدىن قوڭۇرغا يېقىن سارغۇچى يېشىل رەڭگىچە بولىدۇ؛ بۇ لۇنمە مېۋىسى تۇخۇمىسىمان، ئۆچى ئۇچلۇقراق، ئائىلىق بويىنى تۈۋى سافلىنىپ قالغان، شەكلى كونۇسىسىمان، تېڭى دىقماق، قورساق تەرمەكە سەل ئېكىلگەن، دۇمبە قۇۋۇرغىسى 3 تال، ئازراق كۆتۈرۈلۈپ چىقلان، يان قۇۋۇرغىسى 2 تال، ھەممىسى سارغۇچۇ ئاڭ رەڭلىك بولىدۇ. توغرا كەسمە يۈزى بېش بۇرجه كلىك، قۇۋۇرغۇ ئارىلىق ياغ كاناللىرى كۆپىنچە بىر تالدىن (بەزىدە 2 تالدىن)، تۇتاشقان يۈزىدە ئىككى تالدىن بولىدۇ. پۇرقى خۇشبۇيى، شۇنداقلا ئالاھىدە كەرەپىشە پۇرقى بار، تەمى ئاچقىق، سەل تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنىڭ تالقىنى قارامتۇل سارغۇچى يېشىل، سرتقى مېۋە پوسىتى ھۈجەيرىلىرى چاسىراق ياكى ئۆچبۇرجه كلىك، تېمى قىلىن، سارغۇچۇ قوڭۇرەك بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 4~8 μm 40 كېلىدۇ. كەرەپىشە تىستىدىلىرى سارغۇچۇ قوڭۇر، ھۈجەيرىلىرى كۆپ بۇرجه كلىك بولۇپ، بەزىدە ياغسىمان كېلىدۇ. ياغ نېچە تىستىدىلىرى سارغۇچۇ قوڭۇر، ھۈجەيرىلىرى كۆپ بۇرجه كلىك بولۇپ، ئاچىرىمىلارنى كۆرگىلى بولىدۇ. تۆرەلمە سوتى ۋە ئۇرۇق پەللىسى ھۈجەيرىلىرى كۆپ بۇرجه كلىك بولۇپ، تەركىبىدە ئالېرون دانىچىلىرى، كراخمال دانىچىلىرى ۋە ياغ تامچىلىرى بولىدۇ. ياغاج تالا ھۈجەيرىلىرى ئۇزۇنچاق شەكىلدە، ئۆچى ئۇچلۇق، تېمى قىلىن بولۇپ، دىئامېتىرى 20 μm ~5 كېلىدۇ. ياغ ھۈجەيرىلىرى سوقىچاراق بولۇپ، دىئامېتىرى 45 μm ~20 كېلىدۇ. ياغ تامچىلىرى خېلى كۆپ بولۇپ، ھەر قانداق ئورۇندا كۆرگىلى بولىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى نېچىسى بۇرمىسىمان ياكى تورمىسىمان بولۇپ، دىئامېتىرى 5~20 μm كېلىدۇ.

(2) بۇ دورىنىڭ 0.5g تالقىنغا 5ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، چالقىتقاندىن كېيىن بىر سائەت تىندۇرۇپ سۈزۈلىدۇ. سۈزۈۋېلىنىغان ئېرىتمە تۆۋەندىكى تەجرىبىگە ئىشلىتىلىدۇ: ① ئېرىتمىدىن 0.5ml 5% لىك ناترىي نىترىت ئېرىتمىسى ۋە 5% ئالىيۇمن نىترات ئېرىتمىسىنى ھەر قايىسىدىن بىر تامچىدىن قوشۇپ ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، يەنە 5% لىك ناترىي ھىدروكىسد ئېرىتمىسىدىن 5~4 تامىچە ئېمىتقاندا، ئېرىتمە قارامتۇل قىزىل رەڭگە كىرىدۇ. ② سۈزۈۋېلىنىغان ئېرىتمىدىن 1ml 1 ئېلىپ، ئۇنىڭغا 3~2 تېمىم تۇز كىسلاتاسى ۋە ئازراق ماڭنىي پاراشوكى قوشۇپ، ۋاننا قازاندا 3~2 منۇت

قىزدۇرغاندا، ئېرىتىمە سېرىق رەڭگە كىرىدۇ.

【تەبىئىتى】 ىىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ىسسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ھۆل سوغۇقتىن بولغان توسالغۇلارنى ئاچىدۇ، ئاشقازاننى كۈچھىتىپ، ھەزىمنى ياخشلايدۇ، يەللەرنى تارقىتىپ، ىىشىق قايتۇرىدۇ، تاشنى چۈشۈرۈپ، ئاغرىق توخىتىدۇ، ھەر خىل دورىلارنى تەڭشىيدۇ، سۈرگە دورىلىرىنىڭ تەسىرىنى كۈچھىتىدۇ، جىنسىي ھەۋمىسىنى قوزغايدۇ. ھۆل سوغۇقتىن بولغان چوڭ-كىچىك بوغۇملار ئاغرىقى، گەڭگە ئاغرىش، بېقىن ئاغرىش، بەدەندە تاش پەيدا بولۇش، قەي قىلىش، قانلىق تەرمەت كېلىش، ئالدى پىشاب تۇتۇلۇش، ھەيز كەلمەسلىك، ئۇلۇك ھامىلە چۈشىمەسلىك ۋە ئىچكى ئەزاlardىكى ھۆل سوغۇقتىن بولغان كېسەللىكلەرگە ىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 6~12g

【ساقلاش】 سالقىن، سايىه، قۇرغاق جايغا قويۇلۇدۇ.

سەقەنقۇر

沙龙子 Sha long zi
SCINCUS OFFICINALIS

بۇ يۈگىرەك كەسلەنچۈك ئائىلىسىدىكى ھايۋان سەقەنقۇر Scincus officinalis Linnaeus نىڭ قۇرۇتۇلغان تېنى بولۇپ، ھەرقانداق ۋاقتىتا ئۇنى تۇتۇشقا بولىدۇ، ئىچكى ئەزالىرىنى ئېلىشىتىپ، ئىچىگە تۇز سېلىپ، ئاپتايىتا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ يۇملاق ئۇزۇنچاق شەكىلde بولۇپ، باش ۋە تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 10.5cm ~ 8cm، قۇيرۇقنىڭ ئۇزۇنلۇقى 3cm ~ 5.5cm كېلىدۇ. بېشى كىچىكىرەك، يۇملاق، ئۇزۇنچاق، تۇمىشۇقى توم، سەل تاراق بولىدۇ. بۇرۇن توشۇكى تۇمىشۇقنىڭ ئۇستىدە، تۇمىشۇق قاسىرىقى چوڭ بىر پارچە. دۆمبىسى كاۋا چىچىكى رەڭ، ئىككى يان تەرىپى ئاقۇش كۈل رەڭ بولۇپ، ھەر بىر تەرىپىدە 7 ~ 5 تال قارا دېغى بولىدۇ. قورسىقى ئاڭ رەڭ، پۇتون بەدىنى لاكتەك پارقراق بولۇپ، بېشىدىن باشقا جايىلىرىنى چوڭ چوڭ يۇملاق فاسىرالار باستۇرما شەكىلde يىپپ تۇرىدۇ، دۇبىھ ئۇمۇرتقىسى ئۇزۇنسىغا قىرسىمان پۇلتىيىپ چىقىدۇ. تۆت پۇتى ئىچىكە ھەم قىسقا، بەش بارماقلق بولۇپ، چۆرىسى تارغاقسىمان، قۇيرۇقى تەدرىجىي ئىنچىكىلىگەن بولىدۇ. تېنى سېسىق پۇرايدۇ، تەمى سەل تۇز لۇق كېلىدۇ.

【تەبىئتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 باھنى قۇۋۇقتىلەپ، بەدەننى كۈچلەندۈرۈدۇ، پەيلەرنى چىكىتىپ، سۈيدۈكىنى راۋانلاشتۇردى، سوغۇقنى ھېيدەپ، ئاغرىق توختىتىدۇ. جىنسىي ھەۋمۇس ئاجزىلىق، جىنسىي مۇناسىۋەت ئۇتكۈزمەسىلىك، مەنىي ئازىيىپ، تېنى ئاجزىلاش، يارتا پالەھلىك، پۇت- قول تىرەمەش، بوغۇم-تۇستۇخانلىرى ئاغرىش، سۈيدۈك راۋان بولماسىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3g

【دېقىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 15 ياشتن كىچىك بالىلار ئىچىش مەنىي قىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ھاۋا ئۇتۇشۇپ تۇرىدىغان، قۇرغاق جايغا قويۇلدۇ، مىتە چۈشۈشتىن ساقلىنىدۇ.

حگدہ

沙枣 Sha zao

FRUCTUS ELAEAGNI

بۇ دورا جىنگىدە ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك جىنگىدە Elaeagnus angustifolia L. نىڭ قۇرۇق تۇلغان پىشىق مېۋسى بولۇپ، كۈز پەسىلى مېۋسى پىشاندا يىغىتىلىنىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلدۇ. «شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» بۇ دورا ئۇزۇنچاقاراق، سوقىچاق ياكى دۈگىلەككە مايسىلاراق بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى $3.0\text{--}8.0$ cm، دىئامېتىرى $0.5\text{--}1.5$ cm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى سېرىق، ئاقوش سېرىق ياكى ساراغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، پارقراق بولۇپ، سرتقىنى شالاڭ كۈمۈش رەڭلىك قاسىراق ئوراپ تۇردى. مېۋە ئېتى بوش، ئاقوش سېرىق رەڭلىك بولۇپ، ئازاراق ئىلاستىكلىققا ئىنگە. ئۇرۇقى ئۇزۇن سوقىچاق، قاتىققى بولۇپ، يۈزىدە 8 تال قىرى بولىدۇ. بىر تەرىپى ئۇچلۇق كېلىدۇ. ئىچىدە بىر تال ئۇرۇقى بولىدۇ. بەرەق، سەل، خۇشىيى، تەمم، تاتلىق، حۇجۇمەلەك كېلىدۇ.

پەرقلەندۈرۈش (1) بۇ دورا مېۋە ئېتىنىڭ پاراشوکى ئاقۇش سېرىق رەڭلىك بولۇپ، سىرتقى پوست ھۇچىرىسى سېرىق ياكى سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، رەتسىز يۇمىلاق ياكى سوقىچاق كېلىدۇ. مېۋە ئەت ھۇچىرىسى تۆشۈك سىزىقچىلىق، شەكلى ھەر خىل بولۇپ، تەڭگىسىمان تۇشىچىلارنى كۆرگىلى بولىدۇ. تالالىرى يىپسىمان بولۇپ، دىئامېتىرى $2\sim4\text{mm}$ كېلىدۇ. كراخمال دانىچىلىرى كۆپ، يەككە ياكى $3\sim2$ دانىچىلىرى قوشۇلغان، شەكلى يۇمىلاق ياكى سوقىچاق بولۇپ، دىئامېتىرى $5\mu\text{m}\sim3\text{ }\mu\text{m}$ كېلىدۇ. ئۆتكۈزگۈچ نېيچىلىرى بۇرمىسىمان ياكى تۆشۈك سىزىقلىق بولىدۇ.

(2) بۇ دورا تالقىندىن 5g ئېلىپ، ئېغىردا مايسىز لاندۇرغاندىن كېيىن سوكسلېت (Soxhlet) ئايىرىپ ئېلىش قاچىسغا قويۇپ، 100ml ئىسپىرت قوشۇپ، ئايىرىپ ئېلىنىدىغان ئېرىتىمە 20ml قويۇلغانغا قىدەر 2 سائىم قايىتۇرۇپ ئاققۇزۇلسا، ئاندىن قويۇلدۇرغان ئېرىتىمىدىن 2ml 2 ئېلىپ، تۆز كىسلاتسىدىن 5 تامىچە ۋە ماڭنىي تالقىندىن ئازراق قوشۇپ، سۇ ۋانسىسىدا 3 منۇت قىزىتىلسا، قىزىل دەڭكە كىرىدى.

«تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» بەدەنلىق قۇۋۇقتەندۈردى، يۈرەكىنى كۈچەيتىدۇ، روهنى تۇرغاپ، ئىچى سۈرۈش ۋە قۇسۇشنى توختىتىدۇ، ئاشقا زاندىكى يەللەرنىڭ يۈقرىغا تۇرلىشىنى ۋە غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنىڭ تۆۋەنلىشىنى توسايدىدۇ، ئۇنىڭ چىچىكى ئاياللارنىڭ جىنسىي ھەۋسىنى كۈچەيتىدۇ، چارچاپ ماغدۇرسىزلىنىش، تۇزۇن مەزگىل ئىچى سۈرۈش، ئاشقا زان ئاجىزلاپ كېتىش، كۆڭۈل ېلىشىپ، تەختىماء، قەسمەش، باش، ئاغىب، بىئام بولۇش، ئاياللاردىكى، جىنسىي ھەۋمىز، ئاحىز لىقلار،غا ئىشلىتىلدۇ.

ئىشلىتىش ئۈسۈلى وە مىقدارى 【 30~50g 】 سابە وە سالقىن ئۇنىغا قوبىلەدۇ، كۆكىرىش، قۇوت حوشۇشنىڭ ئالدى ىلىنىدۇ.

قول يىلىنى

沙虎 Sha hu

TERATOSCINCI PRZEWALSKII

بۇ دورا گېكکونلار ئائىلسىدىكى ھايۋان غەربىي رايون قول يىلىنى Teratoscincus przewalskii Strauch نىڭ قۇرۇتۇلغان تېنى بولۇپ، ياز پەسىلەدە تۈنۈپ، ئاپتالپتا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورىنىڭ قۇرۇتۇلغىنى تۈگۈلۈپ قالغان بولۇپ، تېنىنىڭ ئۇزۇنلۇقى (تۇمۇقىدىن تارتىپ قۇيىرۇقىغىچە) 15cm~10 كېلىدۇ. دۇمبىه قىسىمى قارامتۇل قوڭۇر كۈل رەڭ بولۇپ، كۆپ قىسىم تېرىلىرى پارچە-پارچە بولۇپ تۆكۈلۈدۇ، قورساق قىسىمى سارغۇچ كۈل رەڭ ياكى ئاچ سېرىق رەڭدە بولۇپ، ئومۇرتقىسى دۇمبىه قىسىنىڭ ئوتتۇرسىدا ئۇزۇنسىغا قىرانغان بولىدۇ. بېشى سەل تار، تۇخۇم شەكلىدە، تۇمۇقى سەل ئۇچلۇقراق، كۆزى باشنىڭ ئارقا ئىككى تەرىپىگە جايلاشقان، ئىچىگە ئۇلتۇرۇشقان، قۇلاق توشۇكى ئىنتايىن ئېنىق، كۆزىنىڭ كەينىگە جايلاشقان، قۇلاق توشۇكى كلاپانى يېرىم ئاي شەكلىدە پۇلتايغان بولىدۇ. باش ئارقا قىسىدىكى تەڭكىچىلەر دانىچىسىمان بولۇپ، بەدىنى ۋە پۇت-قوللىرى ھەر كۆنىكىسىمان كىچىك تەڭكىچىلەر بىلەن قۇيىرۇقى كاھىشىسىمان چوڭ تەڭكىچىلەر بىلەن بېپىلىپ تۇرىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سوغ يەلىنى ھەيدەيدىدۇ، زەھەر ياندۇرۇپ، باھنى قۇۋۇھەتلەيىدۇ. بەدەنىنىڭ سوغۇقى ئېشىپ كېتىش، باھ ئاجىزلىق، ھەر خىل سەپكۈن، زەھەرلىك ھاشارات چىقىۋېلىش لارغا ئىشلىتىلدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 5~9g

【ساقلاش】 شامال ئۆتۈشىدىغان، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ، قۇرتالاپ كېتىشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ.

ئۇدېلسان

没药枝 Mo yao zhi

RAMULUS MYRRHAE

بۇ دورا زەيتۇن دەرىخى ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك مۇرمەككى دەرىخى Commiphora myrrha Engl نىڭ قۇرۇتۇلغان شېخى بولۇپ، شېخنى كېسىپ، توغراب، سايىدا قۇرۇقىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 مەزكۇر دورا ئۇزۇن سىلىندىر شەكىللىك، ئۇزۇن-قسقىلىقى ھەر خىل بولۇپ، تومىرىنىڭ دىئامېتىرى 10cm كېلىدۇ. قوقۇزقى نېپىز بولۇپ، پارچە-پارچە بولۇپ سوپۇلغان، سىرتقى قەۋىتى كۈل رەڭ قوڭۇردىن كۈل رەڭ يېشىل رەڭگىچە بولىدۇ. سىچكى قەۋىتى كۈل رەڭ يېشىلدىن زەيتۇن يېشىل رەڭگىچە بولىدۇ. سىرتقى يۈزى سىلىق ياكى تاك قورۇقچىلار، كىچىك پۇتاق ئىزلىرى ۋە توچىسىمان توشۇكچىلەر بولىدۇ. جىسمى قاتىقى، كەسمە يۈزى ياغاچ جىسمىدا سارغۇچ ئاق رەڭلىكتىن سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىككىچە بولىدۇ ھەمەدە ھالقىسىمان ۋە چاچما نۇرسىمان سىزىقچىلارنى كۆرگىلى بولىدۇ. كىچىك پۇتاقلارى تىكەنسىمان بولۇپ، ئۇنىڭدا 5~3 دانە تىكەنسىمان بولۇنمه پۇتاقلار بولىدۇ. پۇرقى ئالاھىدە خۇشبوۇي، تەمى قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 مەزكۇر دورا تالقىنىدىن 2g ئېلىپ، ئۇنىڭغا 10ml ئېفر قوشۇپ، چالغىتىپ سۈزۈلىدۇ. سۈزۈلگەن سۇبۇقلۇقنى ئىككى ئۆلۈشكە بولۇپ، پارلاندۇرۇش قاچىسىدا پارلاندۇرۇلۇدۇ. بىر قاچىدىكى قالدۇق ماددا ئۆستىگە نىترات كىسلاتاسىدىن بىر نەچچە تامىچە تېمىتىلسا، بېغىر رەڭگە كىرىدۇ؛ يەنە بىر قاچىدىكى قالدۇق ماددا ئۆستىگە ۋانلىن تۆز كىسلاた تەجربىه سۇيۇقلۇقىدىن بىر نەچچە تامىچە تېمىتىلسا، قىزىل رەڭگە كىرىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئۇچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 ئۇزۇقلاندۇرغۇچى كۈچنى ئاشۇرۇپ، توسالغۇلارنى ئې-چىپ، يەللەرنى راۋانلاشتۇردى، زەھەر ياندۇرۇپ، سوغۇقنى ھەيدەيدىدۇ. بېشى قېپىپ، كۆزى تورلىشىش، دېمى سىقلىپ ھاسراش، تۇنقاقلقى، پالەج، ئۇيقوسلىق، ئاشقازان سوۋۇپ، بېقىن ئاغرىشلارغا ئىشلىتىلەدۇ؛ جىنسىي يولى سىرتىدىن ئىسلەغاندا، بالىاتقۇدىكى ھۆل سوغۇقنى يوقىتىدۇ، توى قىلىپ ئۇزۇنغاچە تۇغىغانلارغا مەنپەئەت قىلىدۇ؛ زەھەرلىك يىلان چىقىۋالغاندا سىرتىن سۈرکىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 2g~1g. بەدەن سىرتىغا مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلۇدۇ.

【ساقلاش】 سايىھە ئۇرۇق ئۇرۇندا ساقلىنىلىدۇ، قۇرت چۈشۈشنىڭ ئالدى ئېلىنىدى.

غارىقۇن

阿里红 A li hong

SCLEROTIUM FOMITIS OFFICINALIS

بۇ دورا كۆپ كاۋاكلىق زەمبۇرۇغۇلار ئائىلسىدىكى زەمبۇرۇغۇ—دورىغا ئىشلىتىلىدىغان غارىقۇن Fomesofficinalis (Vill. exFr.) Ames يىغىپ قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۈسۈسىتى】 مەزكۇر دورا كۆپىنچە تاقا شەكىللەك ياكى رەتسىز تۇسمە شەكىللەك بولۇپ، غول قىسىدىن تۇسکەن يۈزى يايپلاق، چوڭ-كىچىكلىكى ھەر خىل بولىدۇ، دىئامېتىرى 8~30cm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى ئاچ سېرىق ياكى كۈل رەڭ قوڭۇر دەڭلىك، سەل يېرىك بولىدۇ، بەزىدە ئۇخشاشش مەركەزلىك حالقلار ياكى رەتسىز، گىرۋەكلىرى دىقماق يوچۇقلارنى كۆرگىلى بولىدۇ. زەمبۇرۇغۇ كانلى كۆپ قەۋەتلىك، يۇملاق بولۇپ، بەزىدە سوبى يولۇپ چۈشىدۇ، زەمبۇرۇغۇ تېنىنىڭ ئىچكى قىسى ئاچ ياكى ئاچ سېرىق بولىدۇ. سۇندۇرغاندا چالاڭ-تۇزان ئۇچۇپ چىقىدۇ. زەمبۇرۇغۇ ئېتى يۇمىشاق، تاشپاخىتىدەك بولىدۇ. پۇرىقى ئاجىز، تەمى قېرىقى، بەزلىرى سەل تاتلىق بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) مەزكۇر دورىنىڭ پاراشوكى ساراغۇچ كۈل رەڭ بولىدۇ. ئاممىيەك سىناق ئېرىتىسىكە چىلغاندىن كېيىن دەڭسز شاخلانغان زەمبۇرۇغۇ يېچىلىرى كۆرۈنىدۇ. توساق بولمايدۇ، دىئامېتىرى 3~4μm كېلىدۇ. سپورسى يۇملاق ياكى تۇخۇمسىمان، دەڭسز، دىئامېتىرى 3.5~5μm كېلىدۇ. خلورال هىدراتتا قىزىتىپ چىلغاندىن كېيىن نۇرغۇنلىغان زەمبۇرۇغۇ يېچە كاللهكلىرى كۆرۈنىدۇ. شەكلى تۇخۇمسىمان ياكى سوقىچاق بولۇپ، دىئامېتىرى 150μm~100 كېلىدۇ. گىرۋەكلىرىدە نۇرغۇنلىقان ئەگرى-بۈگىرى ئېكىلگەن ياكى سوزۇلغان زەمبۇرۇغۇ يېچىلىرى بولىدۇ.

(2) مەزكۇر دورىدىن 0.1gغا ئېتىل ئاتىپتاتىن 2ml قوشۇپ چالغىقاندىن كېيىن بىر سائەت تىندۇرۇپ سۈزۈلەنەن ئېرىتىمە ئۇلترا بىنەپشە نۇر چىرىغى ئاستىغا قويۇلسا، ئاچ كۆڭ جۇلالق نۇر بولۇپ كۆرۈنىدۇ. يەنە 0.5ml سۇلغات كىسلاتاسىنى پروپىركا تېمىنى بولىتىپ ئاستا قۇيغاندا، بېشىل جۇلالق نۇر كۆرۈنىدۇ، ئۇلترا بىنەپشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىغا قويۇپ كۆزەتكەنده، ئۇچۇق سېرىق جۇلالق نۇر بولۇپ كۆرۈنىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق، بىرىنچى دەرىجىدە ئىسىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 مۇرەككەپ غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتى، سەۋدا ۋە سەپرانى سۈرۈپ، قويۇق خىلىتلارنى يۇمىشتىدۇ. سوغ يەللەرنى تارقىتىپ، زەھەر ياندۇرۇدۇ، توسالغۇلارنى ئاچىدۇ. ھەر خىل مۇرەككەپ غەيرىي تەبىئىي سەۋدا، بەلغەم خىلىتى، سەپرادرىن بولغان سېرىقلقى چۈشۈش، جىگەر، تال يوغىناش، سۈيدۈك ۋە ھەيز تۇتۇلۇش، يۆتىلىپ نەپسى سىقىلىش، بەلغەم چىقىرالماسلق، قان تۈكۈرۈش ۋە ئۇچەي كېسەللىكلىرىنگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3~9g

【ساقلاش】 شامال ئۆتۈشىدىغان، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىلىدۇ.

ئاقرقەرە

阿納其根 A na qi gen

RADIX ANACYCLI PYRETHRI

بۇ دورا مۇرەككىپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك-دەم ئاقرقەرەسى DC (L.) نىڭ قۇرۇقىلىغان يىلتىرى بولۇپ، ئەتىياز، كۆز پەسىلىرىدە كولاب ئېلىپ، پاكسىز يۈغاندىن كېسىن، توغراب ئاپتايتا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 مەزكۇر دورا سىلىندىر ياكى ئۆزۈن كونۇس شەكىللىك، بەزىلىرى قۇرۇق سۆڭەكتەك بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 15cm~5، دىئامېتىرى 0.5~2cm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى سارغۇچ قوڭۇردىن كۈل رەڭ قوڭۇر رەڭكىچە بولىدۇ. روشن تىك ئېرىقچىلار ۋە ئاز ساندا يان يىلتىز ئىزلىرى بولىدۇ. بەزىلىرىدە تورسىمان قۇرۇقلار بولىدۇ. يىلتىنىڭ باش قىسىمى سەل چوڭايغان بولۇپ، بەزىلىرىدە يوبۇرماق تۈۋى تالالرى قالدۇقى بولىدۇ. جىسىمى قاتىقى، سۇنغان يۈز قوۋۇق قىسىمى قوڭۇر رەڭدە، ياغاج قىسىمى سارغۇچ قوڭۇر رەڭدە بولىدۇ. پۇرىقى ئالاھىدە خۇش پۇرافلىق، ئازراق غىدىقلاش سېزىمى بولىدۇ، تەمى قېرىق، ئاچچىق بولۇپ، تىلىنى قورۇپدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنىڭ كەسمە يۈزىدىن قارىغاندا، پۇرۇپكا ھۈجمىرىلىرى بىر قانچە فاتار تىزىلغان، سېرىق رەڭلىك بولۇپ، پۇستى قەشتى كەڭ، ھۈجمىرىلىرى سوقىچاڭ ياكى دۈگىلەرەك، شەكىللىمەندۈرگۈچى قەشتى روشن، ھۈجمىرىلىرى كىچىك ھەم يايلاق، ئىچكى پۇست قەشتى ئېنىقسز بولىدۇ. ياغاج قىسىدىكى ئۆتكۈزگۈچى كانالچىلار يەككە ھالدا توغرا يۆنلىشته تىزىلغان، ئۆزەك قىسىمى كىچىكەك بولىدۇ.

(2) مەزكۇر دورىنىڭ تالقىنى سارغۇچ كۈل رەڭ، پۇرۇپكا ھۈجمىرىلىرى چاسىراق ياكى كۆپ قىرلىق، سۇس سېرىق رەڭلىك بولىدۇ. تاش ھۈجمىرىلىرى توب ياكى تارفاقتىن ئەلەتتە چاسىراق، ئۆچ قىرلىق ياكى كۆپ تەرەپلىك بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 30~110μm، كەڭلىكى 20~50μm تۆشۈك ئېرىقچىلىرى روشن بولىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى كانالچىلار تورسىمان بولۇپ، دىئامېتىرى 20~90μm كېلىدۇ. ياغاج قىسىمى نېپىز دىۋارلىق ھۈجمىرىلىر چاسىراق ياكى ئۆزۈنچاڭ چاسا بولىدۇ. كراخمال دانىچىلىرى يەككە ياكى كۆپ دانىچىلىق بولۇپ، دىئامېتىرى 8~3 μm كېلىدۇ. كىندىك نۇقتىسى توچكىسىمان بولىدۇ ياكى روشن بولمايدۇ. ياغ ھۈجمىرىلىرى شارسىمان شەكىلдە، ئاچ سېرىق رەڭلىك بولۇپ، دىئامېتىرى 20~100μm كېلىدۇ. ئىنولېنلارنى ھەممە جايىدا كۆرگىلى بولىدۇ. شەكلى رەتسىز كېلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئۆچىنچى درېجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتلىرىنى تازىلاپ، توسالغۇلار-نى ئاچىدۇ، ئاغرىق توختىتىدۇ. غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتلىن بولغان پالەچىلىك، يۈز پالىچى، تىترىش، تىلى ئېغىرىلىشىش ۋە كونا يۆتەل قاتار لىقلاردا ئىشلىتىلىدۇ؛ ياغ بىلەن تەڭشەپ تېرىگە سۈركىسە تەرلىتىپ، قىزىتما ياندۇردىۇ؛ قوۋۇزغا سۈركىسە، مېڭىنى قىزىتىپ، نەزىلىنى توسىدۇ؛ جىنسىي ئەزا قىسىمغا سۈركەلسە، سوغ مىجهز كىشىلەردە باھ ئاجىزلىقنى، مەننى چىقىرىش قىينلىقنى داۋالايدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 1g

【ساقلالاش】 سايىدا، سالقىن ۋە قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

ئەرەب بېلىمى 阿拉伯胶 A la bo jiao UMMI RABICUM

بۇ دورا پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئەرمب بېلىم دەرىخى Acacia senegal willd ۋە ئۇنىڭغا ئۇرۇقداش بولغان باشقا ئۆسۈملۈكلىرىدىن سرغىپ چىقىپ تامچىسىمان كاللهكىلەشكەن بېلىم بولۇپ، ئەخلمەتلەرىدىن تازىلاب قۇرۇقۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا يۇمىلاقاق دانىچە ياكى كۆپ بۇرچەكلىك پارچە كاللهك ماددا بولۇپ، چوڭ-كىچىكلىكى بىردىك بولمايدۇ. رەگىسىز ياكى ئاچ سېرىق يېرىم سۈزۈك كېلىدۇ. ئادمته سىرتقى يۈزى يېرىلىپ نۇرغۇنلىغان تورسىمان سىزىقچىلارنى ھاسىل قىلىدۇ. جىسمى چۈرۈك بولۇپ، ئاسان پارچىلىنىدۇ، پارچىلانغان يۈزى ئەينەكسىمان بولۇپ، مەرۋايىتتەك پارقرايدۇ. پۇرېقى ئاجز، تەمى سۇس بولۇپ، سېغىزدەك سېزىم بېرىدۇ.

بۇ دورا ئىسپىرتتا ئېرىمەيدۇ. ئىككى ھەسسە مىقداردىكى سوغۇق سۇدا ھەممىسى ئېرىپ، يېرىم سۈزۈك بېېشقاق ئېرىتمىگە ئايلىنىدۇ، ئازاراق كىسلاتا خاراكتېرىگە ئىگە.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) مەزكۇر دورىنىڭ 10% لىك سۇدىكى ئېرىتمىسىدىن 1ml غا تەڭ مىقداردا ئىشقاڭىزىن تارتات سىناق ئېرىتمىسى قوشۇپ، قابىناۋانقان سۇغا 10~5 منۇت چىلغاندا قىزغۇچ قوڭۇر رەڭگە كىرىپ، ئازاراق چۆكمە ھاسىل بولىدۇ.

(2) بۇ دورىنىڭ 10% لىك سۇدىكى ئېرىتمىسىگە تۆمۈر خلورىد سىناق ئېرىتمىسى قوشۇلسا، سارغۇچ قوڭۇر رەڭگە كىرىدۇ.

(3) بۇ دورىنىڭ 10% لىك سۇدىكى ئېرىتمىسىگە ئىشقاڭىزى پلۇمبى ئاتىپتات ئېرىتمىسى قوشۇلسا، ئاق چۆكمە ھاسىل بولىدۇ.
【تەبىئىتى】 مۆتىدىل.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئاۋازنى ئېچىپ، گالنى سىلىقلاشتۇرىدۇ، نەزلىنى توسىدۇ. سۈرگە دورىلىرىغا قوشۇلىدۇ. بەلغەمنى يۇمىشىتىپ، مەيدىنى بوشىتىدۇ. غەيرىي تەبىئىي سەپرانى سۈرىدى. گال-بوغۇز قۇرغاقلىشىپ ئاغرىش، ئاۋازى يۈتۈش، يۆتىلىپ بەلغەم تۈكۈرۈش، كۆكەرەك ئاغرىش، كاناي ياللۇغى قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 1~3g
【ساقلاش】 قۇرۇق ئۇرۇندا ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0045-98

جۇۋەنە

阿育魏果 A yu wei guo
FRUCTUS TRACHYSPERMI

بۇ دورا كۈنلۈكىسىمان گۈللۈكىلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك جۇۋىنە Trachyspermum ammi (L.) نىڭ قۇرۇق پىشقانى مېۋسى بولۇپ، كۈزدە مېۋسى پىشقانىدا يىغىپ قورۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 مەزكۇر دورا سوقىچاق ياكى كەڭرەك سوقىچاق، سەل يايپلاق بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى تەخمىنەن 2mm، دىئامېتىرى 1.5~2mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى ئاچ كۈل دەڭ قوڭۇر ياكى سارغۇچ بېشىل رەڭدە بولىدۇ. تۈچى تەرىپىدە پۇلتىتىپ چىققان ئانلىق بويىنىنىڭ قالدۇقلىرى كونۇس شەكىلдە ساقلانغان بولىدۇ. تۆۋى قىسىدا بەزىدە ئىنچىكە مېۋە ساپىقى بولىدۇ. بۆلۈنەمە مېۋسى ئۆزۈن تۇخۇمىسىمان بولۇپ، ئۆزۈنلىسىغا كەلگەن 5 تال قىرى بولىدۇ. قوۋۇرغا ئارىلىقلەرىدىكى ئۇيماڭلاشقان جايىنىڭ رەڭگى سەل قېنىق، سىرتقى يۈزىنى شۇرۇغۇچىسىمان توتۇچىلار ئۇراپ تۈرىدۇ. بىرىكىش يۈزى تەكشى، ئوتتۇرا قىسىمنىڭ رەڭگى سەل قېنىق بولىدۇ. توغرا كەسمە يۈزى ئۇچىسىز بەش بۇرۇچەكلىك بولۇپ، ئالاھىدە خۇش پۇرالقىق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنىڭ توغرا كەممە يۈزىدىن قارىغاندا، سىرتقى مېۋە پۇستى ھۈجەيرىسى بىر قاتار، تىك تۆت بۇلۇڭ ياكى كۆپ بۇرچەكلىك بولىدۇ. خېلى كۆپ دېگۈدەك شورىغۇچىسى مان يەككە ھۈجەيرىلىك بەز تۈتىچىلار، بەزسز تۈتىچىلار بولىدۇ. مېۋە ئوتتۇرا پۇست ھۈجەيرىسى 7 ~ 6 رەت تىزىلغان، كۆپ بۇرچەكلىك، ئۆزۈن يۇملاق، دۈكىلەكەرەك ياكى رەتسىز شەكىلدە بولۇپ، كېسىلگەن سىزىقى تەرمىپەك ئۆزىرىايدۇ، ئۇنىڭدا چوڭراق، سوقىچاق، سارغۇچ قوڭۇر رەكلىك 6 تال ياغ نېچىسى بولىدۇ. قىر ئارىلىقنىڭ ھەر بىرىدە بىر تالدىن، تۇتاشقانى يۈزىدە 2 تالدىن بولىدۇ. قىرىدا بىر دانە كاناللار باغلىمى، ۋە تۇتاشقانى يۈزىدە بىر تال ئۇرۇق قوۋۇرغا كانال باغلىمى بولىدۇ. مېۋە ئىچكى پۇست ھۈجەيرىسى بىر قەۋەت، ئۆزۈن چاسا بولۇپ، كېسىلگەن سىزىقى تەرمىپەك ئۆزىارغان بولىدۇ. ئۇرۇق پۇست ھۈجەيرىسى ئاچ سارغۇچ قوڭۇر رەكلىك بولىدۇ. تۆرەلمە سۈت ھۈجەيرىسى ئۆزۈنچاڭ چاسا، چاسا ياكى كۆپ بۇرچەكلىك بولۇپ، ئىچىدە ئالپىرون دانىچىلىرى، ياغ تامچىلىرى ۋە كېچىك چاسا كىرىستىل بولىدۇ. ئوتتۇرسىدا تۆرەلمە بولىدۇ.

ئۇنىڭ تالقىنى قوڭۇرغا مايل بىشل ياكى سارغۇچ بىشل رەڭلىك بولۇپ، يەككە ھۈجىرە بەز تۈتىچىلىرى شورىغۇچىسىمان، ئۆزۈنلۈقى $50\text{--}270\mu\text{m}$ كېلىدۇ. يەككە ھۈجىرە بەزسىز، تۈتىچىلىرى-نىڭ ئۆزۈنلۈقى $50\text{--}120\mu\text{m}$ كېلىدۇ. تۆرەلمە سوت ھۈجىرەلىرى كۆپ بۇرچەكلىك بولۇپ، تەركىبىدە ياغ تامچىلىرى ۋە ئالپرون دانىچىلىرى بولىدۇ. بەزىدە كىچىك چاسا كرسىتالارنى كۆڭلى بولىدۇ. ياغاج تالالرى گىرۇنىكىدە ھۈجىرە پوست توشۇكى بولۇپ، دىئامېتىرى $20\text{--}90\mu\text{m}$ كېلىدۇ. ئۇرۇق ئىچكى پوستى تورىسىمان ھۈجىرەلەر دېۋارى ياخالاشقان بولىدۇ.

(2) مەزكۇر دورا تالقىنىدىن ئاز مىقداردا ئېلىپ مىكرو مىقداردا سۈبلىماتسىيە قىلىنسا، يىڭىندەك سېرىق كرسىتاللارنى كۆرگىلى بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئۇچىنجى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسلىتى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ھۆللۈكلهرنى قۇرۇتۇش، سوغۇق يەل تارقىتىش، ئىشتىها ئېچىش، تاش چۈشۈرۈش، تېرە كېسەللەكلىرىنى داۋالاش تەسلىتى بار بولۇپ، سوغۇقتىن بولغان پالماچ، پەي-مۇسکۇللار بوشاش، ئاشقازان سوغۇقتىن ئاغرىش، كۆپ ھېق توۇش، كۆكلى ئېلىشىپ، تاماق يېگۈسى كەلمىسىك، سۈيدۈك راۋان بولماسلق، بەدەندە تاش پەيدا بولۇش، تېرە قىچىشىش، بەرسى، ھۆل تەمرەتكە قاتارلىقلارغا ئىشلىتلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3~5g. سىرتقا مۇۋاپىق مىقداردا سۈرەتلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ئىسىقتىن بولغان باش ئاغرىققا ئىشلىتلىمەيدۇ.

【ساقلاش】 شامال ئۇتۇشىدىغان سالقىن، سايىه ئورۇندا ساقلىنىلىدۇ.

ئۇشەق

阿莫尼亞脂 A mo ni ya zhi

RESINA AMMONIACI

بۇ دورا كۈنلۈكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك تەرسۇس Dorema ammoniacum D. Don. نىڭ يېلىمى بولۇپ، ئەتىيازنىڭ ئاخىرى، يازىنىڭ دەسلەپىكى مەزگىلى تولۇق چىچەكلىپ مېۋە تۇتاي دېگەندە، غول قىسىنى تىلىپ ئۇنىڭدىن ئېقىپ چىققان سۈتسىمان يېلىمىنى يىغىپ، سايىدا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا سوت تامىچىسىدەك ياكى بوغۇملىق كاللاك ماددا بولۇپ، دئامېتىرى 0.3~3cm كېلىدۇ. رەگىنى ئاچ سېرىق بولۇپ، تىنج قوپىپ قويىسا، رەگىنى قېنىقلىشىدۇ، سوۋوغاڭاندا چۈرۈك، ئىسىقتا يۇمىشاق ھەم يېپىشقاق بولۇپ قالىدۇ، لېكىن ئېرىپ كەتمەيدۇ. يېگىدىن سۇنغانلىرىنىڭ يۈزى سوتتەك ئاچ قوڭۇر رەگىدىن ئاچ قوڭۇر رەگىچە بولۇپ، شامغا ئوخشاش پارقرايدۇ. پۇرىقى ئالاھىدە، تەمى ئاپچىق ھەم قېرىق بولىدۇ.
بۇ دورا ئىسپىرت، ئېفىر، سىركە كىسلاتسى ۋە ئىشقارلىق سۇيۇقلۇقلاردا ئېرىدى، سۇدا ئازراق ئېرىدى.

【پەرقەندەرۈش】 (1) مەزكۇر دورا تالقىنىدىن 5g 5ml مېتىل ئالکوهول قوشۇپ 30 منۇت چىلاپ سۈزۈلدى. سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنى ئۇلترا بىنەپشە نۇر چىرىغى (254nm) ئاستىدا كۆزتەكەندە كۆكۈش بېغىرەڭ يالىتراق نۇر بولۇپ كۆرۈنىدۇ.

(2) مەزكۇر دورا تالقىنىدىن 1g 3ml ئېفىر قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ سۈزۈلدى. سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇققا تۆمۈر ترى خلورىد سىناق ئېرىتىسىدىن بىر تامىچە قوشۇپ، يەنە ناترى كاربۇناتتنى ئاز مقداردا قوشقاندا بېغىر رەگىھە كېرىدى.

(3) مەزكۇر دورا تالقىنىدىن 1g 10ml سۇ قوشۇپ، تولۇق ئارىلاشتۇرۇپ سۈتسىمان ھالەتكە كەلتۈرۈپ، ئازراق ئاقارتىش تالقىنى قوشۇلسا، سارغۇچقۇزىلەرنىڭ قىزىل رەگىھە كېرىدى.

【تەكشۈرۈش】 ئۆمۈمى كۈلى % 7 دىن (قوشۇمچە K IX) ئېشىپ كەتمەسلىكى كېرەك.
【ئىكىستىراكتى】 مەزكۇر دورىدىن 2g ئۆلچەپ ئېلىپ ئېتىل ئىسپىرت ئېرىتكۈچى قىلىنىدۇ. ئاندىن ئىسپىرتتا ئېرىدىغان ئىكىستىراكتىنى ئۆلچەش گۈشۈلىدىكى قىزىتىپ چىلاش ئۆسۈلى (قوشۇمچە X A) دا ئۆلچەنگەندە 60% دىن ئاز بولماسىلىقى كېرەك.

【تەبىشىتى】 بىرىنچى دەرىجىدە ئىسىق، ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.
【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سوغۇققىن بولغان يەللەرنى تارقىتىپ، ھۆلۈكىنى ھېيدىدە. دۇ، تەرمىنى بۇمشىتىدۇ، ۇرگانىزمنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىكى غېرىپى تەبىئى خىلىتلارنى سۈرۈپ، جىڭەر، تالدىكى توسالغۇلارنى ئاچىدۇ. سوغۇققىن بولغان بوغۇم ئاغرىش، بوغۇملار قېتىۋېلىش، تېرە قاتىقلىشىش، قولتۇق ئاستى ۋە بويۇن قىسىنى لىمفا سىلى، كونا يۆتەل، بەلغىم كۆپ كېلىش، چىرايى خۇنۇك بولۇش، قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ. باشقا دورىلار بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئىچىلسە، تۇتقاقلقىق، پالەچىلىك، رىماماتۋىدىلىق بوغۇم ياللۇغى قاتارلىقلارنى داۋالايدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 1g~2g. سىرتقا مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىلىدۇ.

【سافلاش】 سايىه ۋە قۇرۇق ئورۇندا ھىم ساقلىنىدۇ.

كالنبره

驱虫斑鸠菊 Qu chong ban jiu ju

FRUCTUS VERNONIAE

بۇ دورا مۇرەككىپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى كالنبره Vernonia anthelmintica willd نىڭ پىشقانى مېۋسى بولۇپ، كۈز پەسىلەدە مېۋسىنى قىزىپ تېلىپ ئاپتايقا قۇرۇقىلىدۇ. «شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» مەزكۇر دورا دۇم كۆمۈرۈلگەن سىلىندر ياكى كونۇس شەكىللەك بولۇپ، تۇزۇنلىقى 5mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى قوڭۇرغا مايىل يېشىل ياكى قىنقىق يېشىل رەڭدە، تۇزۇنلىقىغا پۇلتىيىپ چىققان 10 تال قىرى بار بولۇپ، چوڭايىش ئىينىكىدە كۆزەتكەندە قىرىدا بەزىزى تۈكچىلەرنىڭ، قوۋۇرغا ئارىلىق ئۇيمىنىدا بەز تۈكچىلەرنىڭ بارلىقى كۆرۈنىدۇ. تۇستى بۆلگى تۈز، ئاستى سەل ئىنچىكە بولىدۇ. ئالاهىدە پۇراقلقى، تەمى ئىنتايىن قېرقى بولىدۇ.

«پەرقلەندۈرۈش» بۇ دورىنىڭ توغرا كىسمە يۈزىدىن قارىغاندا، سىرتقى مېۋە پوست ھۈجەيرىسى بىر قاتار، چالا شەكىللەك بولۇپ، قىر قىسىدا قوڭۇر رەڭلىك يەككە ھۈجەيرە ۋە ئاپا شەكىللەك بەزىزى تۈكچىلەر؛ قوۋۇرغا ئارىلىق ئۇيمىنىدا قوڭۇرغا مايىل سېرىق رەڭلىك تۇخۇم ياكى شورىغۇچ شەكىللەك يەككە ھۈجەيرىلىك بەز تۈكچىلەرى كۆرۈنىدۇ. تۇتۇرا مېۋە پوست ھۈجەيرىسى كۆپ قەۋەتلىك بولۇپ، قىرىنىڭ تۇتۇرۇسىدا كانال باغلىمى، ياغاج قىسىمنىڭ ئىچكى تەرىپىدە تاش ھۈجەيرە توبى ۋە تالا توپلىرى تارقالغان بولىدۇ. ئەڭ ئىچكى تەرىپىدە تاش ھۈجەيرە بەلۇنلىقى بار بولۇپ، بىر قىردىن بىۋاسىتە تۇزىرلاپ، يەنە بىر قىردىكى تاش ھۈجەيرە بەلۇنلىقى بىلەن تۇتۇشىپ تۇرىدۇ. ھەر بىر قىردا تۇزاڭىلۇپ، 7 خېتى شەكىلىنى ھاسىل قىلىدۇ. نېپىز دىۋار ھۈجەيرىسى نۇرۇنلىغان كالتىسى ئۆكسالات كىرسىتالى ۋە سىلىندرى كىرسىتالاردىن تەركىب تاپىدۇ. ئىچكى مېۋە پوست ھۈجەيرىسى سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك كېلىدۇ. تۇرۇق پوست ھۈجەيرىسى ئىككى قەۋەت، سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك كېلىدۇ. تۆرمە سۇتى تەرەققىي قىلمىغان، 3~2 قەۋەت نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىدىن ئىبارەت بولۇپ، تۇتۇرۇسىدا 2 تال ئۇرۇق پەللەسى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئىچىدە تىك توت بۇلۇڭ شەكىللەك ھۈجەيرىلەر، ئۇنىڭ ئارىلىقىدا كانال باغلىمى بولىدۇ.

دورا تالقىنى قوڭۇرغا مايىل سېرىق رەڭلىك، تاش ھۈجەيرىسى بۇملاقلارقى، سوقىچاقى ياكى ئۇرۇچۇق شەكىللەك، توب ياكى يەككە تارقالغان، قوڭۇرغا مايىل سېرىق رەڭدە، ھۈجەيرە دىۋارى قېلىن بولۇپ، دىئامېتىرى 35 μm ~20 μm ، تۇزۇنلىقى 120 μm كېلىدۇ. تۆشۈك تېرىقچىسى روشن بولىدۇ. بەز تۈكچىلەرى يەككە ھۈجەيرىلىك تۇخۇم شەكىلدە بولۇپ، تۇزۇنلىقى 25 μm ~23 μm كېلىدۇ. بەزىزى تۈكچىلەرى يەككە ياكى ئاپا شەكىلدە بولۇپ، تۇزۇنلىقى 160 μm غا بىتىدۇ. بۇرما شەكىللەك كانالچىلىرىنىڭ دىئامېتىرى 25 μm ~15 μm كېلىدۇ. مېۋە پوست ھۈجەيرىلىرى چاسا ياكى سىلىندر شەكىللەك كىرسىتالاردىن تەركىب تاپقان. ئۇرۇق پوست ھۈجەيرىسى قوڭۇرغا مايىل سېرىق رەڭدە، ھۈجەيرە دىۋارى ئالاهىدە شەكىللەك

يەنى تورسىمان ھالەتتە بولىدۇ. تۆرەلمە سۈت ھۈچىرىسى كۆپ قىرقىز بولۇپ، ئىچىدە نۇرغۇنلىغان ياغ تامچىلىرى بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئۈچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسلىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غېرىي تەبىئى بەلعم خىلىتلىرىنى تازىلاپ، مەددە چۈشۈرۈدۇ، ئىشىق ياندۇرىدۇ، سوغۇقنى ھېيدەپ، ئاغرۇق پەسىيتىدۇ. ھۆل سوغۇقتىن بولغان ئاشقازان ئاغرۇقى ۋە جىڭەر كېسىلى، بەرمىس قاتارلىقلارغا ئىشلىتلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 5g

【ساقلالاش】 سايىھ، سالقىن، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

لاجۇۋەرد

青金石 Qing jin shi

LAPIS LAZULI

بۇ دورا سلىكات كىسلاتا تۈزلىرى تۈرىدىكى منبرال تاش بولۇپ، ئۇنىڭ ئاساسىي تەركىبى $\text{Na}_6\text{Ca}_2(\text{AlSiO}_4)_6(\text{SO}_4, \text{Cl}, \text{S})_2$ دىن ئىبارەت، قېزىپ ئالغاندىن كېيىن ئۇنىڭدىكى قۇم شېغىللار تازىلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا رەتسىز، يايپلاق، پارچىسىمان بولۇپ، هاۋا رەگدىن قېنىق كۆك رەك ياكى كۆك رەڭكىچە بولىدۇ. ئارىلىقلىرىدا ئاق داغ توچكىلىرى بولىدۇ. ياخىدەك پارقرايدۇ، سەل سۈزۈك بولىدۇ ياكى سۈزۈك بولمايدۇ. ئاق ۋە ئاچ كۆك رەڭلىك ئۇزۇن سىزىقلىرى بولىدۇ، جىسمى چۈرۈك بولۇپ، ئاسان پارچىلانمايدۇ، ئۇزۇلگەن يۈزى يېرىك بولىدۇ. پۇرافقىز، تەمسىز كېلىدۇ.

【لايىقلاشتۇرۇش】 سۇدا يۇيۇپ قۇرۇوتۇلدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى درېجىدە قۇرۇق تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تازىلاب، بەددەندىكى خىلىتلا-

رىنىڭ كۆپۈشىنى توسايدۇ، غەيرىي تەبىئىي سەۋىدارنىڭ پەيدا بولۇشىنى توسايدۇ، يۈرەكىنى ئاسراپ، قاننى تەڭشىيدۇ، ھېيزىنى راۋانلاشتۇرۇپ، توسالغۇلارنى ئاچىدۇ. مالېخۇلبا ۋە مۇسۇمە كېسەللىكى، قۇرتاپ تىنچلى-

نىالماسلىق، يۈرەك ئاچىزلىقى، قان توسالغۇسى، ھېيز تۇتۇلۇش، يۆتىلىش ۋە دېمى سىقىلىش قاتارلىقلارغا تىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 1~3g

【ساقلاش】 قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىلىدۇ.

ئۆشنه

松夢 Song Iuo

USNEA

بۇ دورا ئۆشنه ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك ئۆشنه Usnea diffracta Vain. نىڭ قۇروقۇلغان چۆپىدىن ئىبارەت بولۇپ، ياز، كۈز پىسىلەدە يېغىپ، ئاپتاتا قۇروقۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا يېپىسمان ھالەتتە بولۇپ، دائم يۆگىلىپ مونەك بولۇۋالىدۇ، ئىككى ئاچماق شاخلايدۇ، تۈۋى قىسىمدا شاخلىرى ئاز بولىدۇ، ئاخىرقى ئۈچلىرى ئىنچىكە بولۇپ، يېقا ئۆخشايىدۇ. سىرتقى يۈزى ئاقۇش سېرىق، كۈل رەڭگە مايىل بېشىل ياكى سارغۇچ بېشىل رەڭلىك بولۇپ، روشنەن ھالقىسمان بېرىقچىلىرى بولىدۇ. تارتىسا ئازراق سوزۇلىدۇ ھەممە مۇستەھكم ئاڭ ئېپىسمان ئوتتۇرا ئوقى ئاشكارىلىنىپ چىقىدۇ. جىسمى يېنىك، يۇمىشاق بولىدۇ، پۇرۇقى ئاجىز، تەمى سۇس ھەممە ئازراق ئاپچىق بولىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنىڭ تالقىنى ئاقۇش كۈل رەڭ، زەمبۇرۇغ بېچىلىرى رەڭسىز، ئىنچىكە، ئۇزۇن، ئەگر بىلەشكەن، شاخلانغان بولۇپ، دىئامېتىرى 3~7μm كېلىدۇ. تاراققى ياكى چىرمىشىپ مونەكچە بولۇۋالىدۇ، خلورال ھىدرات سىناق تېرىتىمىسىگە تەڭىسە، رەڭسىز سوزۇڭكە كاللهەك ھاسىل قىلىدۇ. سپورسىز رەڭسىز، سوقىچاڭ ياكى دۆگىلەك بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 25μm~10μm، دىئامېتىرى 7~12μm كېلىدۇ.

(2) بۇ دورا تالقىنىدىن 0.5g غا 5ml ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ چالىغىقاندىن كېيىن بىر سائىت تۇرغاۋۇپ سوزۇلىدۇ. سوزۇلگەن سۇيۇقلۇقىدىن 1ml غا تۇز كىسلاتسىسىدىن 3~2 تامىچە تېمىتىلسا ۋە ماڭنى تالقىنى ئازراق قوشۇلۇپ قىزىق سۇدا 5~3 منۇت تۇرغاۋۇسا، تېرىتىمە سارغۇچ قىزىل رەڭگە كېرىدۇ.

【تەبىئىتى】 مۆتىدىل.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئۇزۇقلاندۇرغاۋۇچى كۈچىنى قورۇيدۇ. تو سالغۇ تۆگۈنلەرنى بېشىدۇ، بىدەننى سەگىتىپ، يۈرەكىنى كۈچىتىدۇ، ھېيزىنى تەڭشىپ، باھقا مەنپىھەنەت قىلىدۇ. ئۇزۇن مەزگىل ئىچى سۈرۈش، كونا يۆتەل، يۈرۈكى سېلىپ ھاسىراش، تۇتقاڭلىق، روھىزلىنىش، ئىچى تىتىلداش، باھ ئاجىزلىقى، كۆڭلى ئېلىشىپ ياندۇرۇش، دېمى سىقىلىش، ھېيز نورمالسىزلىقى، زەھەرلىك يىلان چىقۇپىلىش قاتارلىقلاردا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 4~6g

【ساقلاش】 قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىلىدۇ.

كەپە يىلتىرى پوستى

刺山柑根皮 Ci shan gan gen pi
CORTEX CAPPARIS

بۇ دورا كەپە ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك بۆرە قوغۇنى Capparis spinosa L. نىڭ قۇرۇقۇلغان يىلتىز پوستى بولۇپ، ئەتىياز، كۈز پەسىلەدە يىلتىز قىسىمىنى كولاب ئېلىپ، پاڭز يۇيۇپ، يىلتىز پوستىنى سوپۇۋالاندىن كېيىن ئاپتايتا قۇرۇقۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا كاناي ياكى ئوقۇر شەكلىدە بولۇپ، ئۇزۇنلىقى 3~6cm، كەڭلىكى 0.2~0.3cm، قېلىنلىقى 0.1~0.9cm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى ئاقوش كۈل رەڭ ياكى سۇس سارغۇچ كۈل رەڭ بولۇپ، زىج توغرا سىزىقلار ۋە پۇلتىيىپ چىققان نۇرغۇنلىغان پوست تۆشۈكچىلىرى بولىدۇ. ئىچكى يۈزى ئاقوش رەڭلىك، سىلىقراق بولۇپ، بەزىلرىنده ئىنچىكە تىك سىزىقلار بولىدۇ. جىسىمى قاتىققى هەم چۈرۈك، ئۇزۇلگەن يۈزى تەكشىسىز، قەھوت-قەھوت پارچىسىمان كېلىدۇ. پۇرېقى تاڭىز، تەمى قېرىق، كېيىنچىرەك تاتلىق بولىدۇ.

【پەرقىلەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ تالقىنى سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، تاش ھۈچەيرلىرى سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك بولۇپ، كۆپىنچە تۆپ-تۆپ ياكى يەككە ھالىتتە تارقاق جايىلىشدۇ. شەكلى چاسراق ياكى ئۇزۇنچاق چالسا ياكى دۈگىلەك بولىدۇ. دىۋارىدا تۆشۈك بولىدۇ. تالالرى ئۇزۇن پېزىما شەكلىك، ئۇچى سەل ئۇچلۇق ياكى دىقماق كېلىدۇ. كالتىسى ئۇكىسالات كەرسىتەللەر ئۇششاقراق بولىدۇ. پۇرۇپكا ھۈچەيرلىرى ئاچ سېرىق رەڭلىك، كۆپ بۇرچەكلىك بولىدۇ.
【تەبىيىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىيىي بەلغىم خىلىتلىرىنى تازىلاپ، جىڭەر، تال قان تومۇزلىرىدىكى توسۇلۇشنى ئاچىدۇ، سوغۇقتىن بولغان يەللەرنى تارقىتىدۇ، سۈيدۈك ھېيدەيدۇ. ھۆل سوغۇقتىن بولغان پالچىلىك، جىمىغۇرلۇق، مۇچىلىرى ئۇيۇشۇش، چۈك، كىچىك بوغۇملار ئاغرىش، «ئىرۇنىنسا» (ئۇلتۇرغۇچ سۆگەك نېرۋىسى ئاغرىشقا ئۇخشىپ كېتىدۇ)، سۈيدۈك داۋان بولماسلق، ھەبىز راۋان بولماسلق، كۆكىرەك ئاغرىپ، بەلغىم كۆپ بولۇش، جىنسىي ھەۋىسى ئاجىزلاش قاتارلىقلارغا ئىشلىتلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 5~15g. سىرتقا مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتلىدۇ.
【ساقلاش】 قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىلىدۇ.

WS₃-BW-0051-98

پانٹا قشیکری

刺糖 Ci tang

SACCHARUM ALHAGI

بو دوا پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ياتق (Desv) M. B. Alhagi pseudoalhagi نىڭ غول شېخىدىن ئاچىرىلىپ چىققان شېكىر ماددىسى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىلىدە شېكىرى كۆپىرەك يىغىلغان تۈپىنى تاللاپ، ئاستىغا رمخت ياكى سۈلىڭ سېلىپ، كىچىك تاياق بىلەن يەڭىل ئۇرغاندا، شېكىر دانىچىلىرى توڭولىدۇ، ئۇنى يېغۇۋېلىي، ئەخىلەتلەرىدىن تازىلىنىدۇ.

«شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى» مەزكۇر دورا دانىچىسىمان بولۇپ، دىئامېتىرى 1~5mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى سۇس ئاقۇش سېرىقىن سارغۇچ قوڭۇر دەگىچە بولىدۇ، ئىچكى قىسىم سۇتتەك ئاڭ رەڭدىن ئاچ سېرىق دەگىچە، سەل بىپىشقاق بولىدۇ. ئاسان پارچىلىنىدۇ، ئازاراق پۇراقلق، تەمى تاتلىق بولىدۇ.

بۇ دورا سۇدا ئاسان ئېرىدۇ.

پەرقلەندۇرۇش (1) بۇ دورا تالقىندىن 0.5g 6ml سۇ قوشۇپ، 5 منۇت چالغىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىسى تەجرىبىگە ئىشلىتىلىدۇ. سۈزۈلگەن ئېرىتمىدىن 1ml غا ئىسقارلاققى مىس تارتقات سىناق ئېرىتمىسىدىن 5 ~ 4 تامىچە قوشۇپ، قايىناۋاتقان سۇدا 10 ~ 5 منۇت قىزدۇرغاندا سارغۇچ قىزىل، دەڭلىك جۆكمە هاسىل بولىدۇ.

(2) پەرقلەندۈرۈشىنىڭ (1) سىدىكى سۈزۈلۈرۈلگەن سۈبۈقلىقىنى تەجربىبە سۈبۈقلىقى قىلىپ، قەھەز رەڭ سېپىكتىرىدا يۇقىرى ئۆرلىتىش تەجربىسى (قوشۇمچە VII A) ئىشلىنىدۇ. تەجربىسە ئىشلىلىدىغان ئېرىتمىدىن 1m 10 نى فىلتەر قەغىزىكە تېمىتىپ، بۇتىل ئالكوهول-ئاتىپاتا كىسلاقاتىسى-سو 15ml بولغۇچە يۇقىرىغا يېيىلدۈرۈلۈپ، 3ml مېتىل ئىسپىرت ئارىلاشما سۈبۈقلىقى يېيىلدۈرۈغۇچى قىلىنىپ يېيىلدۈرۈلدى. ئاندىن ئۇنى سالقىندا قۇروتۇپ، α -نافتول سىناق ئېرىتمىسى پۇركۇلە، 3 دانە روشنە كۈك داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

برینچی دهنجده هول تنسق.

«تسنیری ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» غەيرىي تەبىئىي سەپارانى يوقتىپ، ئورگانىزىمىدىكى خىلىتلارنى تەڭشىدۇ. چوڭ تەرهەت قۇرغاقلىشىش، قۇرۇق ئىنじمچى، ئورۇقلالپ بەدەن ئاجىزلىشىش، باھ ئاجىزلىقى قاتارلىقلاردا ئىشلىتىلدى.

24~48g 【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】

شمال ئۆتۈشىدىغان، قۇرۇق ئورۇنغا قويۇلۇپ، چاڭ-تۈزان، نەملىكتىن ساقلىنىلىدۇ.【ساقلاش】

ئاچچق بادام

苦巴旦仁 Ku ba dan ren

SEMEN AMYGDALI AMARAE

بۇ دورا ئازغان ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك ئاچچق بادام Amygdalus communis L. var. amara L. نىڭ قۇرۇق پىشقانى تۇرۇقى بولۇپ، ياز، كۈزدە مېۋسى پىشقانىدا يىغۇشىلپ، مېغىزىنى ئالغاندىن كېيىن ئاپتاتىا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا يايپلاق ئۆزۈن تۆخۈمىسىمان بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 2.8cm~1.5cm، كەڭلىكى 13mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى خورماڭ، بىر ئۇچى ئۇچلۇقراق، تۆۋىي قىسىمى دۈگىلەكەك كېلىدۇ. بىر يان تەرىپى سەل نېپىز، يەنە بىر تەرىپى قېلىن دۈگىلەك بولىدۇ. دۈگىلەك تەرەپ گىرۋىكىدە يىپسىمان تۇرۇق كىندىكى بار بولۇپ، ئۇنىڭ قوشۇلغان نۇقتىسىدىن بۇقىرىغا قارىغان نۇرغۇنلىغان كاناللار باقلىمى بولىدۇ. تۇرۇق پوستى نېپىز، پەللە يىپۇرمىقى 2 تال، سوت رەڭلىك بولىدۇ. پۇرقى ئاجىز، تەمى قېرىق بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورا تۇرۇق پوستىنىڭ توغرا كەسمە بۈزىدە سىرتقى يۈزى بىر قەۋەت نېپىز دىۋار ھۈجەيرسىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇنىڭغا نۇرغۇنلىغان دۈگىلەكەك ياكى سوقىچاق سېرىق دەڭدىكى تاش ھۈجەيرلىرى تارقالغان بولىدۇ. ئۇنىڭدىكى سىزىقچىلار روشەن بولمايدۇ. تۆۋەنكى قىسىمى ھۈجەيرلىر پۇرلىشىپ قالغان ئۆزۈقلىنىش قەۋىتىدۇ. سىرتقى تۆرەلمە سوتى 3~1 قەۋەت جانسز ھۈجەيرلىردىن، ئىچىكى تۆرەلمە سوتى 2~1 قەۋەت چاسا شەكىللەك ھۈجەيرلىردىن تەركىب تاپقان بولۇپ، دىئامېتىرى 10~20μm كېلىدۇ، تەركىبىدە ئالپرون دانىچىلىرى ۋە ماي بولىدۇ. تۇرۇق پەللىسى ھۈجەيرلىرى دۈگىلەكەك ياكى كۆپ بۇرچەكلىك نېپىز دىۋار ھۈجەيرلىرىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئىچىكى چوڭ ھەم روشن ماي تامچىلىرى تولغان بولىدۇ.

بۇ دورىنىڭ تالقىنى ئاچ سېرىق بولىدۇ، تاش ھۈجەيرسى سېرىق دەڭلىك، كۆپىنچە يۈمىلاق سوزۇنچاق ياكى تۆخۈم شەكىللەك، ھۈجەيرە كاڭاڭچىسى چوڭ، گىرۋىكىدە ھۈجەيرە پوست تۆشۈكى بار بولۇپ، دىئامېتىرى 80~100μm كېلىدۇ. تۇرۇق پەللىسى ھۈجەيرلىرى دۈگىلەكەك ياكى كۆپ بۇرچەكلىك بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچىدە نۇرغۇنلىغان ئاقسىل دانىچىلىرى ۋە ياخ تامچىلىرى بولىدۇ. ئىچىكى تۆرەلمە سوت ھۈجەيرسى چاسىراق، دىۋارى سەل قېلىن بولۇپ، دىئامېتىرى 15~20μm كېلىدۇ. تەركىبىدە ماي تامچىلىرى بىلەن ئالپرون دانىچىلىرى بولىدۇ.

【لايقلاشتۇرۇش】 ئىشلەتكەندە پوستى ئېلىۋېتىلدى.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى درېجىدە قۇرۇق تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يۈتەلنى توخىتىپ، بەلغەمنى بوشىتىدۇ، بۆرەكە مەنپە. نەت قىلىپ، ئاشقازاننى ئىسرايدۇ. يۆتلىپ دېمى سىقلىش، تۇرۇقلالىش، قەۋزىيەت، مەنلى ئازىيىش، قولاق غوگۇلداش، ئىشتىها سىزلىق، ھېيز تۇتۇلۇش ۋە ھېيز قېنى ئاز كېلىش قاتار لىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 3~9g

【ساقلالاش】 سايىه، سالقىن ۋە قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىلىدۇ، مىتە چوشۇشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ.

ئاچقىق ئەمەن

苦艾 Ku ai

HERBA ABSINTHII

بۇ دورا مۇرەككىپ گۈللۈكلەر ئائىسىدىكى نۇسۇملۇك ئاچقىق ئەمەن Artemisia absinthium L. نىڭ يەر ئۇستىدىكى قۇرۇقۇلغان قىسىمى بولۇپ، ياز پەسىلى يېڭى چىچەكلىگەن مەزگىلە ئورۇۋىلىپ ئاپتايتا قۇرۇتۇلىدۇ.

【شەكىلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورىنىڭ غولى ۋە يوپۇرمىقى ئاقوش كۈل رەڭ بولۇپ، سىرتىنى نۇرغۇنلىغان يېسىمان تۈشتىلار ئۇراپ تۇرۇچا، تۇتقاندا قولغا يۇماشق بىلىنىدۇ. غولىدا نۇزۇنىسىغا كەتكەن قىرلار بولۇپ، توغرا كەسمە يۈزى ئاڭ رەڭلىك، نۇزەكلىك بولىدۇ. يوپۇرمىقى نۆھەتلىشىپ ئۆسىدۇ، تۆۋەنکى قىسىم يوپۇرمىقىنىڭ سېبى بولىدۇ، كۆپىنچىلىرى پارچىلىنىپ كەتكەن بولۇپ، پۇتۇن يوپۇرمىقىنى سۇدا نەملەپ قېتىنى ئاچقاندىن كېيىن 3~2 قۇلاق پەسىمان بۆلۈنگەن بولىدۇ. كىچىك يوپۇرماقلىرى نۇچبۇرجهك دۈكىلەك شەكىلە، نۇتتۇرا قىسىدىكى يوپۇرماقلىرى ساپىسىز، ئىككى قۇلاق پەسىمان بۆلۈنگەن، نۇستۇنکى قىسىدىكى يوپۇرماقلىرىمۇ پەسىمان بۆلۈنگەن بولىدۇ. نۇرغۇچى يوپۇرماقلىرى نۇچكە بۆلۈنىدۇ ياكى بۆلۈنمىيدۇ، بۆلۈنگەن پارچىلىرى يېسىمان نۇزۇن سوقىچاڭ، نۇچى دىقماق، پۇتۇن گىرۋەكلىك ياكى ھەر چىشىمان گىرۋەكلىك بولىدۇ. نۇرغۇنلىغان تۆۋەنگە ساڭگىلىغان باشىسىمان كۈل تىزمىسى بار بولۇپ، دىئامېتىرى 3~4mm كېلىدۇ. ئۆمۈمىي نۇرغۇچى يوپۇرماقلار 3~2 قەۋەت بولۇپ، كاھىشىمان تىزىلىغان بولىدۇ. سىرتقى قەۋىشىدىكى نۇرغۇچى يوپۇرماقلار يېسىمان بولۇپ، سىرتىنى زىچ تۈتىچىلار قاپلاب تۇرىدۇ. نىچكى تەرىپىدىكى نۇرغۇچى يوپۇرماقلار سوقىچاڭ شەكىلە، پەرسىمان بولىدۇ. كۈل تەڭلىك ئاڭ موپلۇق بولىدۇ، چىچىكى سارغۇچى يېشىل رەڭدە، نۇتتۇرۇسىدىكى چىچىكى قوش جىنسلىق، رۇمكىسىمان بولىدۇ: نۇتراپىدىكى چىچەكلىرى ئائىلىق چىچىكى بولۇپ، تار كاناي شەكىلە كېلىدۇ. خۇش پۇراقلىق، تەمى قېرىق بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورا غولىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدىن قارىغاندا، سىرتقى پوست ھۈجەيرىسى بىر قاتار، ھۈجەيرىلىرى نۇزۇن چاسا ياكى چاسا شەكىلە، سىرتىنى مۇڭگۈز ماددا قەۋىتى ئۇراپ تۇرۇغان ھەممە «T» شەكىللىك چوڭ بەز تۈكچىلىرى ئۆسکەن بولىدۇ. بەز تۈكچىلىرى ئاڭ كۆرۈلىدۇ. پوست قەۋىشىدىكى ھۈجەيرىلەر كۆپ بۇرچەكلىك، بىر نەچچە قاتار بولىدۇ، نىچكى پوست قەۋەت ھۈجەيرىسى بىر قاتار تار، نۇزۇن چاسا شەكىللىك، كاسپارىيان نۇقتىسى روشهن بولىدۇ. كانال باغلىمنىڭ سىرتى ئەۋرىشىم بولۇپ، ئەۋرىشىم قىسىمى بىلەن نىچكى پوست قەۋىتى ئارىلمىقىدا نۇتتۇرا تۈۋۈرۈك غىلىپى تالالرى بولىدۇ. ئىلىك (نۇزەك) ھۈجەيرىلىرى چوڭراق بولىدۇ.

بۇ دورىنىڭ تالقىنى كۈل رەڭ يېشىل كېلىدۇ. «T» شەكىللىك بەزسىز تۈكچىلىرى بولىدۇ. 4~2 دانە ھۈجەيرىدىن تەشكىل تاپقان سېبى بار بولۇپ، نۇستىدە توغرىسىغا كەلگەن ئىككى نۇچى

ئۆتكۈر، ئۇزۇن، نېپىز دىۋار ھۈجمىرىلىرى بولىدۇ. ھۈجمىرىنىڭ ئۇتۇرسى سېپى بىلەن تۇتىشىدۇ ھەمەدە ئاز ساندا يەككە ھۈجمىرىلىك بەزسىز تۈكچىلەر بولىدۇ. بەز تۈكچىلىرى كىچىك بولۇپ، ھەممىشە يۈزەكى تېرىھ ئىچىگە ئولتۇرۇشقان، شەكلى سوقىچاق بولىدۇ. بىزلەر كۆپسەنچە 4 جۇپ ھۈجمىرىدىن تەشكىل تاپقان، سېپى قىسا، ھاوا تۆشۈكچىلىرى تۇرالىسىز، قوغدىغۇچى ھۈجمىرىسى 5~4 دانە بولىدۇ. گۈل چېڭى دانىچىلىرى دۈگىلەكەك، ئۇچ تېرىقلق شەكىلە بولۇپ، دىئامېتىرى 25 μm ~20 كېلىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى كاناللىرى بۇرمىسىمان ۋە تۆشۈك سىزىقچىلىق بولىدۇ.

【تەبىئتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داؤالايدىغىنى】 سوغۇقتىن بولغان يەللەرنى تارقىتىپ، تو سالغۇلارنى ئاپىدۇ. ئاشقازاننى ساغلاملاشتۇردىدۇ، سۈيدۈك ۋە ھەيزىنى راۋانلاشتۇرۇپ، بەدەننىڭ تەبىئىي مايللىقىنى ئىلگىرى سۈرىدىدۇ. بىش ئاغرىش ۋە قېيىش، بوغۇم-ئۇستاخانلار ئاغرىش، ئاشقازان ئاچىزلاپ، ھەزمىدىن قېلىش، ھەمىز نورمالسىزلىقى، تېرە قىچىشىن، مۇچىلەر ئىشىش، نەزلە، زۇكام قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3~5g

【ساقلاش】 سايىھ، سالقىن، قۇرۇق ئورۇندادا ساقلىنىلىدۇ.

كەكە ئۇرۇقى

苦蒿子 Ku hao zi

FRUCTUS ACROPTILON REPENS

بۇ دورا مۇرەككەپ كۈللۈكلەر ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك كەكە Acroptilon repens(L.) DC. نىڭ قۇرۇتۇلغان مېۋسى بولۇپ، مېۋسى پىشقانىدا يىغىۋىلىپ، ئەخلەتلەرنى تازىلىۋىتىپ، ئاپتايتا قۇرۇتۇلدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا تۇخۇمسمان، سوقىچاق، سەل يايپلاق بولۇپ، تۇزۇنلۇقى 3~4mm، كەڭلىكى 1.5~2.3mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى ئاچ سارغۇچ ئاڭ بولۇپ، تېنىق بولمىغان ئۇزۇنىسىغا كەتكەن سىزىقچىلىرى بولىدۇ، تۇچى تەدرىجىي ئۇچلانغان، تۇقى دىقماق بولۇپ، يۇمىلاق مېۋە ساپاق ئىزى بار، مېۋە پوستى قاتىققى، پۇرۇقى ئاجىز، تەمى سەل قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 مەزكۇر دورىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدىن قارىغاندا، مېۋە سىرتقى پوستى بىر قاتار چاسىراق نېبىز دىۋار ھۈچىرىلىرىدىن ئىبارەت بولۇپ، كۆپىنچىلىرى يېرىلغان بولىدۇ. سىرتقىنى مۇڭگۈزلىشكەن قەۋىتى ئۇراپ تۇرىدۇ. مېۋە ئۇتتۇرا پوستى ھۈچىرىلىرى دۈكەلەكرەك، ھۈچىرى دىۋارى قېلىن، ئازراق ياغاچلاشقان بولىدۇ. مېۋە ئىچكى پوستى ھۈچىرىلىرى چاسا شەكىللىك، ھۈچىرى دىۋارى نېبىز بولۇپ، ئىچىدە سېرىق ماددىلار بولىدۇ. ئۇرۇق پوستىنىڭ ئەڭ سىرتقى قەۋىتىدە بىر نەچچە قاتار رىشاتكىسمان ھۈچىرىلىر بولۇپ، زىچ تىزىلغان، دىۋارى قېلىن، قەۋىت سىزىقچىلىرى روشن بولىدۇ. ئۇزۇقلۇنىش قەۋىتىدە بىر نەچچە قاتار نېبىز دىۋارلىق ھۈچىرىلىرى بولىدۇ. تۆرەلمە سۈت ھۈچىرىلىرى بىر نەچچە قاتار تىزىلغان بولۇپ، ئىچىدە ماي تامىچىلىرى بولىدۇ. ئۇرۇق پەللىسى ھۈچىرىسى ئىچىگە ئالىپرون دانىچىلىرى ۋە ماي تامىچىلىرى تولغان بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 سوغۇق.

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 قىزىتما قايتۇرۇپ، زەھەر ياندۇردى، تۈگۈنلەرنى يېشىپ، قاننى جانلاندۇردى، ئىشىق ياندۇرۇپ، ئاغرىق پەسەيتىدۇ. بوغۇملار قىزىرىش، ئىشىش، قىزىش، ئاغرىش، چىقىان، غەلۋىرىدەك چاقا-جاراھەتلەرگە مىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3~6g

【ساقلاش】 سايىه، سالقىن ۋە قۇرۇق ئۇرۇندا ساقلىنىلىدۇ.

بېدە ئۇرۇقى

苜蓿子 Mu xu zi

SEMEN MEDICAGINIS

بۇ دورا پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۇسۇملۇك كۆك گۈللىك بېدە Medicago sativa L. نىڭ قۇرۇق پىشقاڭ ئۇرۇقى بولۇپ، كۆز پەسىلىدە يىغۇۋىلىنىپ، ئاپتايىتا قۇرۇتۇلدى.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا بۆركە شەكىللەك بولۇپ، ئۇزۇنلىقى 2.0~2.7mm، كەڭلىكى 1.5mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى سارغۇچ قوڭۇر ياكى سارغۇچ يېشىل رەڭدە بولۇپ، چوڭراق بىر ئۇچىدا يانتۇ كەسمە يۈزى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئويماڭ يېرىدە توچكىسىمان ئۇرۇق كىندىرىكى بولىدۇ. ئۇرۇق پۇستى نېپىز، سىلىق ھەم پارقراق كېلىدۇ. سېسىق پۇرمىайдۇ، ئېچىغان پۇرچاق تەمى بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) مەزكۇر دورىنىڭ كۆندىلەك كەسمە يۈزىدە ئۇرۇق پۇستىنىڭ ئەڭ سىرتىدا بىر قاتار رىشاتكىسىمان ھۈجەيرىلەر بولۇپ، سىرتىنى مۇڭكۈز ماددا قەۋىتى ئۇرالپ تۇرىدۇ. رىشاتكىسىمان ھۈجەيرىلەرنىڭ ئۇستى ئۇچلۇق، سىرتقى تەرىپىدە نۇر بەلۇنغا بولىدۇ. ئىچى تەرىپىدە بىر قاتار تەرەك ھۈجەيرىلەر بولۇپ، پەلمەپەي شەكىللەك، ئۇستى تار، ئۇستى كەڭ، ئۇستى قىسىمدا چوڭ تېپتىكى ھۈجەيرە بوشلۇقى بار، سىرتى تەكشى، ئەتراپى قېلىن، يان تېمى گۈگۈسۈنسىمان قېلىنلىغان بولىدۇ. ئىچىدە 4~2 قاتار نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلەر ۋە خورمارەك پىگىمېت قەۋەتلەرى بولىدۇ. تۆرەلمە سوت ھۈجەيرىلە رىنىڭ ئەڭ سىرتقى تەرىپىدە بىر قاتار چالسا شەكىللەك ئالپرون قەۋىتى ھۈجەيرىلەرى بولىدۇ. ئىچىدىكى قاتاردىكى تۆرەلمە سوت ھۈجەيرىلەرى چوڭراق، دۈگىلەك كەڭ كېلىدۇ. ئۇرۇق پەللە سىرتقى پۇست ھۈجەيرىسى كېچىكەك بولىدۇ. رىشاتكىسىمان ھۈجەيرىلەر بىر نەچچە قاتار بولۇپ، تۆرەلمە سوت ھۈجەيرىلەرنىڭ تەركىبىدە ماي تامچىلىرى ۋە ئالپرون دانىچىلىرى بولىدۇ.

مەزكۇر دورىنىڭ تالقىنى سارغۇچ خورما رەڭلىك، ئۇرۇق سىرتقى پۇستى ھۈجەيرىسى پارچە-پارچە بولۇپ، توغرا كەسمە يۈزىدىن قارىغاندا، ھۈجەيرىلەرى بىر قاتار تىزىلىغان، ئۇزۇنلىقى 33μm كېلىدۇ، ئۇچى تەكشى ياكى ئۇچلۇق بولۇپ، سىرتىنى مۇڭكۈز لەشكەن قەۋىتى ئۇرالپ تۇرىدۇ، سىرتقى دىۋار تەرىپىنىڭ ئۇستى قېلىن بولۇپ، ئۇنىڭدا نۇر بەلۇنغا بولىدۇ؛ ئۇستىدىن قارىغاندا كۆپ بۇرچەكلىك، دىۋارى قېلىنراق، ھۈجەيرە بوشلۇقلەرى كېچىكەك، رەتسىز شاخالانغان ھالىتە، ئازراق تۆشۈك كېرىقچىلىرى بولىدۇ، ئۇستى يۈزىدىن قارىغاندا دۈگىلەك كەڭ ياكى يۈملاق كۆپ بۇرچەكلىك كۆرۈنۈپ، تەركىبىدە خورما رەڭ ماددىلار بولىدۇ. ئۇرۇق پۇستىدىكى تەرەك ھۈجەيرىلەر (تامچىغان) بىر قاتار بولۇپ، يان تەرىپىن قارىغاندا يېپىلاق دامبىل شەكىلدە، ئۇستى تار، ئۇستى كەڭ كۆرۈنىدۇ. دىئامېتىرى 17μm، كەسمى 25μm، يان دىۋارى قېلىن بولۇپ 10μm كېلىدۇ. ئەتراپ دىۋارىدا تىك ئۇزۇن سىزىقلار كۆرۈنىدۇ؛ ئۇستىدىن قارىغاندا دۈگىلەك كۆرۈنۈپ، دىئامېتىرى 20μm كېلىدۇ. زىچ بولغان گۈگۈسۈنسىمان قېلىنلىغان سىزىقچىلار بولۇپ، جۇخار گۈلگە ئۇخشايدۇ، ھۈجەيرە كاۋاكلىرى روشن بولىدۇ. تۆرەلمە

سۇت ھۈچىرىلىرى تەركىبىدە ماي تامچىلىرى ۋە ئالپرون دانىچىلىرى بولىدۇ.

(2) مەزكۇر دورا تالقىندىن 1g غا 0.5% لىك ئالكوهول ھىdroхlorid تېرىتمىسىدىن 7ml قوشۇپ، ئايلانىما ئىقىملىق سوۋۇتقۇچتا 10 مىنۇت تۇرغۇزۇپ سۈزۈلەدۇ، سۈزۈلگەن سۈبۈقلۈق ئاممىياك سىنان تېرىتمىسىدە نېيتىرالاشتۇرۇلۇپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتقۇلۇدۇ، قالدوقىغا 5% لىك تۇز كىسلاتسىدىن 2ml قوشۇپ تېرىتكەندىن كېيىن، مېركۇرىك پوتاسىسىم يودىد تېرىتمىسىدىن بىر قانچە تامىچە تېمىتىلسا، چۆكمەھاسىل بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داؤالايدىغىنى】 قان ۋە مەننىي ئىشلەپچىقىرىدۇ، ئۈچەيلەرنى سىلىقلاشتۇرۇپ، باھنى كۈچىتىدۇ، يوّتەل توختىتىپ، ئاغرىق پىسىتىدۇ. ھەيزىنى راۋانلاشتۇرۇدۇ، سۇت كەلتۈرىدۇ. بەدىنى ئورۇقلاب، قېنى ئازىيىپ كەتكەن، ھەيز تۇتۇلۇپ، سۇت ئازىيىپ كەتكەنلەرگە، قەۋرىيەت، باھ ئاجىزلىقى، يوّتەل ۋە دېمى سىقلыш، بوغۇم ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 2~3g. سىرتقا مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

【سافلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىلىپ، مىتە چۈشۈشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ.

جىنتىيانا

欧龙胆 Ou long dan

RADIX GENTIANAE LUTEAE

بۇ دورا جىنتىيانا ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك جىنتىيانا Gentiana luteal نىڭ قۇرۇق يىلتىزى ۋە يىلتىز غولى بولۇپ، كۆز پەسىلەدە كولاب ئېلىپ، ئەخىلەتلىرىنى تازىلاپ ئاپتايىتا تېز قۇرۇنۇلىدۇ ياكى ھۆل ۋاقتىدا تۈشىشاق قىلىپ توغراب قويۇلۇدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا ئۇزۇن تاياق شەكىللەك بولۇپ، ئۇزۇنلىقى 20~50cm، دىئامېتىرى 2~4cm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى ئاچ كۈل رەڭ قوڭۇر بولۇپ، پۇرۇم سىزىقلەرى بولىدۇ، ئۇچىدا ئۇزۇنىسىغا كەلگەن قورۇقلار بولىدۇ. كىچىك بۆلەك ياكى پارچىلار 10cm~2 ئۇزۇنلىقتا كېلىدۇ. كەسمە يۈزى ئاچ سېرىق، سىلىق بولۇپ، چاڭ-توزان بولىمايدۇ. شەكىللەندۈرگۈچى قەۋىتى روشن بولىدۇ. يىلتىزى سۇدا ئالاھىدە كۆپىدۇ ھەمدە ئېلاستىكلىق پىمدا قىلىپ سوزۇلۇدۇ ۋە ئېگىلىدۇ. يىلتىز غولى چوغىراق، تۇستى توم، ئاستى ئىنچىكە كېلىدۇ، توملىرى 6cm غا يىتىپ بارىدۇ، توغرىسىغا كەتكەن سىزىقىلىرى بولىدۇ. پۇرۇقى ئاجزى ھەم ئالاھىدەرەك، تەمى ئىنتايىن قېرىق بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورا يىلتىزىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدە: سىرتقى پۇرۇپكلىق قەۋەت بولۇپ، ئۇنىڭ ئىچى تۆۋەنلىكى پوستلاق قەۋەتتىن ئىبارەت. پوستلاق قەۋەتىنىڭ كۆپ قىسىمى خورمارەڭ، نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلەردىن تۈزۈلگەن بولۇپ، سۇدا ئالاھىدە كۆپىدۇ. ئەۋرىشىم پوست قىسىدا غەلۇرسىمان كانال تۆپلىرى بولىدۇ. نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلەردىن يىكەن ئۇچى چوڭلۇقىدىكى تۈشىشاق كالتىسى ئۆكسالات كريستاللىرىنى كۆرگىلى بولىدۇ. شەكىللەندۈرگۈچى قەۋىتى بىرنەچە قاتار ھۈجەيرىلەردىن تەشكىل تاپىدۇ، ياغاج ماددىلىق قىسىدا ئۆتكۈزگۈچى كاناللار ۋە غەلۇرسىمان كانال تۆپلىرى بولىدۇ. مەزكۇر دورا تالقىنى ئاچ سېرىق رەڭلىك بولۇپ، نۇرغۇن پارچىلانغان تۈشىشاق ماي تامىچىلىرى بولىدۇ. سۇدا كۆپىدۇ. ئۇنىڭدا نۇرغۇنلىغان تۈشىشاق ماي تامىچىلىرى بولىدۇ. كىچىك كالتىسى ئۆكسالات كريستاللىرىمۇ تاسادىپىي كۆرۈلۈپ قالدى. ئۆتكۈزگۈچى كاناللار تراپىتسىيە پەلەمپەي سىزىقى شەكىلە ۋە تورسىمان بولۇپ، دىئامېتىرى 30μm~15 كېلىدۇ. كراخمال دانىچىلىرى ئىنتايىن ئاز. پۇرۇپكلىق توقۇلما پارچىلىقنىڭ شەكلى رەتسىز بولىدۇ.

(2) مەزكۇر دورا تالقىنىدىن 30mg~20 نى سۇبلىماتىسىيە قىلىپ مىكروسكوبتا كۆزەتكەنە، ئاچ پېشىل رەڭدىكى ئۇزۇن كريستاللار كۆرۈلۈدۇ. قىسىملىرى يېغىلىپ توب (جىنتىيانا ماددىسى) بولۇۋالدۇ. سۇيۇق ئىشقار ئېرىتىسى قوشۇسا، سېرىق رەڭلىك ئېرىتىمكە ئايلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 جىنگەدىكى بۇزۇلغان غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تازىلاپ، بەدمىنىڭ تېبىئىي مایلىللىقنى ئاشۇرۇدۇ. جىڭىر، بېقىن ئافرىش، قورساق ئېسىلىش، هېيز تۇتۇلۇش، كۆز ۋە ئاغزى مايماق كېتىش، پالەچىلىنىش، بەدمەن ئاجىزلاپ كېتىش، چايان ۋە زەھەرلىك يىلان چىققۇپلىپ زەخىمىلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 1~3g

【ساقلاش】 قۇرۇق ئورۇنغا قويۇلۇدۇ.

WS₃-BW-0057-98

ئەينۇلا

欧李 Ou li

FRUCTUS PRUNI DOMESTICAE

بۇ دورا ئازغان ئائىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئېيىنۇلا Prunus domestical نىڭ پشاي دېگەن قۇرۇق مىۋىسى يولۇپ، مىۋىسى يىشاي دېگەندە يېغلىۋىلىپ، ئاپتاتا قۇرۇقتۇلىدۇ.

【شەكلى وە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا سوقىچاق بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 2.5cm ~ 5cm، كەڭلىكى 1.2cm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى قىرغۇچ سۆسۈن ياكى قارامتۇل سۆسۈن رەڭدە، يۈزى پۇرلەشكەن. ئۇچى سەل ئۇچلۇق، تۇۋى تۇز كەسکەندەك ياكى سەل ئۇچلۇق، ئىككى تەرىپى يايپلاق بولىدۇ. مېۋسىنىڭ بېتى قىلىنراق، قارامتۇل خورمارەڭ، يۇمشاق بولىدۇ. ئۇرۇقى قاتىق، يايپلاق سوقىچاچى، سارغۇچ خورمارەڭ لىك كېلىدۇ، پۇلتىپ چىققان ئىككى تەرىپىسىدە بىردىن چوڭقۇر ئېرچىچىسى بولۇپ، سرتقى يۈزى تەكشىسىز ياكى ئازراق ھەرە كۆننىكىسىمان بولىدۇ. ئۇرۇقى يايپلاق، ئۇزۇنراق يۈرهەك شەكىلدە، ئۇرۇق پۇستى سارغۇچ قوڭۇر دەڭلىك، ئۇرۇق پەللىسى 2 تال، ئاق رەڭلىك. پۇرېقى ئاجىزراق، تەمى چۈچۈمىدە تاشلىق بولىدۇ.

«پەرقلەندۈرۈش» مېۋە ئېتىنىڭ تالقىنى قارامتۇل خورمالەگىدە، سىرتقى يۈزى ھۆجەيرىسى سوقىدە چاق ياكى كۆپ بۇرۇچەكلىك، دىۋارى قېلىن بولۇپ، بەزىدە مۇڭگۈز ماددا قەۋىتى كۆرۈللىدۇ. مېۋە نەت ھۆجەيرىسى تەركىبىدە نۇرغۇنلىغان قىزغۇچ خورمالەك ماددىلار ھەممە كىرسىتال توپلىرى بولۇپ، دىئامىتىرى 10~50 μm كېلىدۇ. قىسقا تالالارنىڭ دىۋار تۆشۈكچىلىرى روشەن، ئۇزۇن تالالىرى ئۇزۇن ئۇرچۇق شەكلىك بولۇپ، دىئامىتىرى 25 μm ~10 كېلىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى كانالنىڭ تۆشۈك سىزىقچىلىرى، وە تورسىمان سىزىقچىلىرىنىڭ دىئامىتىرى 10~20 μm كېلىدۇ.

«تەسىسى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» غېرىي تەبىئى سەپارانى يوقىتىپ، قاننى تازىلاب، ئۇچەيلەرنى سىلىقلاشتۇرىدۇ. قاندا قۇرۇق تىسىق ئەچقىچىلىش، يۇقىرى قىزىما يانماسلق، تىنچىسزلىنىپ بىئام بولۇش، يېتلىش، يەلغەم حىقىمىسلق، قەقۇيىت، كۆكلى ئىلىش قۇسۇش، قاتال لىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 20~50g
【ساقلاتاش】 ساباه، سالقىن، قۇدۇق ئۇرۇندادا ساقلىنىدۇ.

تومۇر دورىسى

欧菝葜根 Ou ba qia gen
RADIX SARSAPARILLAE

بۇ دورا گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك زېراۋەندە يۈپۈرماقلقىق چۆپىچىن، Smilax aristolochiaeefolia Miller تازىلاپ، ئاپتاتىپا قۇرۇتۇلدى ياكى تۇتاملاپ باغلاب، كۈز پەسىلىدە كولاب ئېلىپ، يۈپىپ، تازىلاپ، ئاپتاتىپا قۇرۇتۇلدى ياكى تۇتاملاپ باغلاب، ئاپتاتىپا قۇرۇتۇلدى.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 مەزكۇر دورا ئىنچىكە، تۇزۇن سىلىنىدىر شەكىللەك بولۇپ، دىئامېتىرى 3~5mm كېلىدۇ. كۆپىنچىلىرى ئەگرى-بۇگرى حالدا تۇرۇنلۇقى 30cm~50cm لق كىچىك تۇتام قىلىپ باغلانغان بولىدۇ. سىرتقى يۈزى سارغۇچ قوڭۇر رەگدىن قىزغۇچ خورمارەگىچە بولىدۇ. تۇزۇنىسىغا كەتكەن ئېرىقچىلىق قىرى ھەممە شالاڭ چاچما يىلتىز ئىزلىرى بولىدۇ. بەزلىرىدە يىلتىزىمان عولى ۋە يەر ئۇستىدىكى غولى ساقلىنىپ قالغان بولىدۇ. يىلتىزىمان غولى توم، قىسقا، رەتسىز؛ يەر ئۇستىدىكى غولىنىڭ بوغۇم قىسىمى يوغىنىغان، ئاچ سارغۇچ خورمارەگىللەك، تۇزۇنىسىغا كەتكەن سىزنىچىلىرى بولىدۇ. جىسىمى سەل چۈرۈك بولۇپ، ئاسان سۇنىدۇ. تۇزۇلۇغۇن يۈزىنىڭ پوستى قىسىمى ئاچ سېرىق رەگىللەك، ياغاج قىسىنىڭ رەگىكى سەل قىنىق كېلىدۇ ھەممە نۇرغۇنلىغان تۇشىشاق تۆشۈكچىلىرى بولىدۇ. تۇزەك قىسىمى ئاچ رەگىللەك بولۇپ، ياغاج قىسىمى بىلەن پوستى قىسىمى ئاسان ئاجرايدۇ. تۇۋىلىپ تۇرىدى ھەممە ئازاراق يېپىشقاققى، سىلىق سېزىمى بولىدۇ. پۇرېقى ئاجىز، تىمى سەل ئاچىقى بولىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 مەزكۇر دورىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدىن قارىغاندا، يۈزە پوست ھۈجەيرىسى بىر قاتار چاسىراق شەكىلدە بولۇپ، كۆپ چاڭلاردا سوپىلۇپ چۈشىدۇ، سارغۇچ خورمارەڭ كېلىدۇ، تۆۋەندىكى پوست ھۈجەيرىسى 4~2 قاتار، كۆپ بۇرچەكلىك، دىۋارى سەل قېلىن بولىدۇ، پوست قەۋوتىدىكى نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلەر سوقىچاڭ ياكى دۈگىلەك، كۆپ رەت تىزىلغان بولۇپ، تەركىبىدە نۇرغۇنلىغان كراخمال دانىچىلىرى ھەممە يېڭىنىمىان كرسىتال تۇتاملىرى بولىدۇ. ئىچىكى پوست قەۋوتى بىر قاتار تاش ھۈجەيرىسى ياكى قېلىن دىۋارلىق ھۈجەيرىلەردىن ئىبارەت بولۇپ، چاسا شەكىلدە كېلىدۇ، كۆپىنچە كەسمە يۇنىلىشتە تۇزارغان بولىدۇ. تۇتتۇرۇ تۇۋۇرۇڭ غىلابى روشن، ھۈجەيرىلىرى سوقىچاقاراق، دىۋارى قېلىن بولىدۇ. بېلاستىك پوست قىسىدىكى غەلۇم نېيچە توپى ھۈجەيرىلىرى دۈگىلەك ياكى سوقىچاڭ بولىدۇ. ياغاج قىسىدىكى تۇتكۈزگۈچ كاناللار چوڭاراق، توغرسىغا تىزىلغان بولىدۇ. تۇزەك قىسىدىكى ھۈجەيرىدە لمىنىڭ دىۋارى نېپىز بولۇپ، ئىچىكە كراخمال دانىچىلىرى تولغان بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 تۇچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋا ئىدىغىنى】 تۇرگانىزمىدىكى خىلىتلارنى تەگىپۇڭلاشتۇرۇپ، غەيرىي تەبىئى سەۋادانى يوقىتىدۇ، سۈپىدۇك ھېيدەپ، تەرىلىتىدۇ. قان خىلىتى كۆيگەنلىكتىن بولغان ھەر خىلىتلىكلەر، سەۋادادىن بولغان باش ئاغرىش، پالەچىنىش، زىققە، مۇپايسىل، سۈپىدۇك راۋان بولماسىلىق، تەرلىمەسىلىك ۋە ھەر خىلىتلىكىن ئىشلىتىلدى.

【تىشلىتىش تۇسۇلى ۋە مىقدارى】 4~8g

【ساقلاش】 شامال تۇتۇشىدىغان قۇرۇق تۇرۇندا ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0059-98

سہر خس

欧绵马 Ou mian ma

RHIZOMA FILICIS MARIS

بۇ دورا سەرخىس ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سەرخىس ·Schott· (L.) Dryopteris filix mas نىڭ قورۇق تۈلغان يىلتىز غولى ۋە يۈپۈرماق سېپىنىڭ قالدۇقى بولۇپ، كۈز پەسىلىدە كولاب ئىلىپ، مەخلەتلەرنى تازىلاب، ئاپتايقا قورۇق تۈلسۈدۇ.

شەكلى وە خۇسۇسىتى مەزكۇر دورا سىلىندىر شەكىللەك بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 15cm ~ 10cm، دىئامېتىرى 2cm ~ 1cm كېلىدۇ. تۇنى يىپىپ تۇرغان يىپۇرماق سېبىي تۇۋى 5cm كېلىدۇ. تۇ، مۇرەككىپ كاھىشىمان تىزىلغان بولۇپ، ئۇزۇڭلاسا يېقىن تۇرغان يەردە خورماڭەڭ پەرسىمان تەڭگە يىپۇرماق پارچىلىرى بولىدۇ. سىرتقى يۈزى قارامتۇل خورماڭەڭ، ئۇزۇلگەن يۈزى ئاچ يېشىل، يىپۇرماق سېبىي تۇۋىنىڭ ئۇزۇنلۇقى تەخمىنەن 2cm ، دىئامېتىرى 0.7 ~ 1cm كېلىدۇ. سەل ئەگرى ھەم يان تەرمىكە يايپلاق، يېرىقى، ئاچىز، تەمى قىرىق بولىدۇ.

(2) بو دورا تالقىندىن 0.5g غا 2ml نېتىل ئىسپىرت قوشۇپ چالغىقاندىن كېيىن بىر سائەت قويۇپ، ئۆستىدىكى سۈزۈك تېرىتىمىنى ئايىپ ئېلىپ ئۇنىڭغا ئىشقاڭلاشقاڭغا قەدەر ناتىرىي هيدروكسىدى سىناق تېرىتىمىسى، قوشۇلدىو، تېرىتىمە ئۆحۈق سىرىق، دىگە كىرىدۇ.

تکشیفی موسسه پژوهی روزنامه ایران (۱۳۹۰) نشان می‌دهد که تمهیلیکی بزرگ است. در این مقاله، تکشیفی موسسه پژوهی روزنامه ایران (۱۳۹۰) نشان می‌دهد که تمهیلیکی بزرگ است. در این مقاله، تکشیفی موسسه پژوهی روزنامه ایران (۱۳۹۰) نشان می‌دهد که تمهیلیکی بزرگ است.

[تائیتی] سکنی ده بحده نسیق، بینجی ده بحده قووچ.

«تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» بەدەندىكى يات ماددىلارنى تازىلايدۇ. ھۆللۈكىن يوقتىسى دۇ. مۇرگانىزىمدا بەلغەم خىلىتلەرى كۆپىيپ كېتىش، ئاشقازان ناچىزلاپ زىرداپ يېنىش، پات-پات سىيىش، ئۇچىھى توسلىلىش، ئۇچىھى مەددە كىسەللەكلىرى بىگە ئىشلىتىلدى.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى 【 4~6g 】
ساقلاش 【 سايىھ، سالقىن، قۇدۇق ئۇرۇندادا ساقلىنىدۇ.

پىندىق

欧榛 Ou zhen
SEMEN CORYLI

بۇ دورا قىيىن ئائىلىسىدىكى ئۇسۇملۇك پىندىق *Corylus avellana*L. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقان ئۇرۇقى بولۇپ، كۈز پەسىلىدە مېۋسى پىشقاندا ئۇزۇپ تېلىپ، ئاپتاتىا قۇرۇتۇلدى. 【شەكللى ۋە خۇسۇسىيىتى】 مەزكۇر دورا تۇخۇمىسىمان، ئىككى يىنى سەل يايپلاق بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 1.0~1.6cm، كەڭلىكى 1.0~1.7cm، كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى سارغۇچ خورما رەگدىن بېخىرى گىچە بولۇپ، ئازراق ئۇزۇنىسىغا كەتكەن سىزقىچىلار كۆرۈندى. ئۇستى قىسىمى سەل يايپلاق، ئۇچىدا چىكتىسىمان پۇلتايىما بار. تۇۋى ئەرىپى دىقماق، تۇۋىدە سوقىچاق شەكىللەك رەڭگى سۇسلۇغان داشىرە بولۇپ، سارغۇچ خورما رەگدىن بېغىر رەڭگىچە بولىدۇ. قىرى تۇۋىدىن تۆت نەتراپقا گۈڭۈسۈنسە مان تىزىلىدۇ. سىرتقى شاكلى قاتىقى، قېلىنىلىقى 1mm~2mm، ئىچىدە يايپلاق، كونۇس شەكىللەك بىر تال ئۇرۇقى بولىدۇ. ئۇرۇقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 1.3cm، كەڭلىكى 0.8~1cm، كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى سارغۇچ خورما رەڭلىك بولۇپ، بىر نەچىچە تال خورما رەڭلىك دولقۇنىسىمان، ئۇزۇنىسىغا كەتكەن تومۇرىرى بولىدۇ. بىر تەرىپىكە ئېڭىلگەن، ئۇچى ئۇچىلۇق، تۇۋى توم، دىقماق كېلىدۇ. ئۇتۇرۇسىدا بىر تال ئىككى تەرىپىنى تۇشاشتۇرىدىغان تىك ئېرىقىچە بولىدۇ. ئۇرۇق پۇستى نېپىز، ئۇرۇق پەللىسى ئىككى تال، سوت رەڭگىدە، ياغلىق بولىدۇ. پۇرۇق ئاجىز، تەمى تاتلىق بولىدۇ.

【لایقلاشتۇرۇش】 مېۋە شاكلى ئېلىۋېتىلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 نورمال سەپرانىڭ شەكىللەنىشنى ئىلگىرى سۈرىدى. بەدەنى قورۇپ، قۇۋۇھەت بېرىدى. مېڭىنى ساغلاملاشتۇرىدى. جىنسىي ھەۋىسى ئاجىزلاش، جىنسىي ئاجىزلىق، كۆپ ئېتىلام بولۇش، پىكىر يۈرگۈزۈش ئاجىزلىق، بەل سىيقراب ماغدۇرسىزلىنىش، ئاشقازان ئاجىزلاپ، تاماق يېھەلمىسىلىكەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 30g

【ساقلاش】 سايى، سالقىن، قورۇق ئورۇنىدا ساقلىنىدى. مىتە چۈشۈشنىڭ ئالدى ئېلىنىدى.

WS₃—BW—0061—98

سەۋەن يىلتىزى

鳶尾根 Yuan wei gen

RHIZOMA IRIDIS HALOPHILAE

بۇ دورا چىغىرتماق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك شورلۇق سەۋەن Iris halophila Pall نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىز غولىدىن ئىبارەت بولۇپ، كۈز پەسىلەدە كولاب ئېلىنىپ، قالدۇق غولى ۋە چاچما يىلتىزلىرىنى تازىلاپ، يۈيۈپ، ئاپتاتا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا يەخىلىقىغان قىسقا تۈگۈنسىمان بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 3~12cm، دىئامېتىرى 1~1.5cm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى ئاچ قوڭۇر سىزىقىن قارامتۇل خورما رەڭىچە بولىدۇ، ئۆستى قىسىمدا ھالقىسىمان يۈپۈرماق ئىزى قالدۇقى بولىدۇ. بەزىلىرىنىڭ ئۆستى ئۆچى تەرەپتە غول قالدۇق تۇۋى ۋە يۈپۈرماق تۇۋى تالالرى ساقلىنىدۇ. ئاستىقى قىسىمدا ئاز مقداردا چاچما يىلتىزى ۋە يىلتىز ئىزلىرى بولىدۇ. جىسىمى سەل قاتىق بولىدۇ. بوغۇم قىسىمدىن ئاسان سۇنىدۇ. سۇنغان يۈزى ئېڭىز-پەس، سارغۇچ ئاچ رەڭىدە بولىدۇ. پۇرېقى ئاجىز، تەمى ئازراق قېرىق ھەم ئاچچىق بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 مەزكۇر دورا تالقىنى ئاقوش كۈل رەڭدىن سارغۇچ كۈل رەڭىچە بولىدۇ. سىلىندر كەرسىتاللار كۆپ بولۇپ، چوڭ تېتىكلىرىنىڭ ئۆزۈنلۈقى 500μm غا يېتىدۇ. كەڭلىكى 3~40μm كېلىدۇ. كراخمال دانىچىلىرى كۆپ بولۇپ، دىئامېتىرى 2~5μm كېلىدۇ. كىندىك نۇقتىسى كۆپىنچە روشن بولمايدۇ. تاش ھۇچىرىلىرى سوقىچا夸ق، ھۇچىرى كاۋاکلىرى كىچىك بولىدۇ. ئۆتكۈز-گۈچى كاناللىرى بۇرمىسىمان ياكى تورمىسىمان سىزىقلقىق بولىدۇ. نېيچىسىمان ھۇچىرىلىر گىرۇنىكىدە ھۇچىرى پۇست تۆشۈكى بولىدۇ. تالالرى ئۆزۈن، تۆشۈك ئېرىقچىسى بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسىق.

【تەسirى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى پىشۇرىدۇ ۋە تازىلايدۇ. بەدهننىڭ تەبىئىي مايللەقىنى ئالغا سۈرىدۇ. يۇتقۇنچاق، كېكىرددەك ئىشىشپ ئاغرىش، چىش ئاغرىش، غەلۋىرەك، ھۆل تەمرەتكە قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ؛ سەپكۈن، بەرمىن، تائۇق قاتارلىقلارغا سىرتنىن ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مقدارى】 3~5g سىرتقا مۇۋاپىق مقداردا ئىشلىلىدۇ.

【ساقلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىپ، مىتە چوشۇشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ.

رەيھان ئۇرۇقى

罗勒子 Luo le zi

FRUCTUS OCIMI BASILICI

بۇ دورا كالپۇكسمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك رەيھانگۇل Ocimum basilicumL نىڭ قۇرۇق مېۋسى بولۇپ، مېۋسى پىشقاڭدا يىغىۋىلىپ، ئاپتايتا قۇرۇنلۇپ، ئەخىلەتلەرىدىن تازىلىنىدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورىنىڭ كىچىك قاتىقى مېۋسى ياپلاق تۇخۇمسىمان بولۇپ، ئۇرۇنلۇقى 2.5~2.8mm، كەڭلىكى 1.7mm~1.4mm، قىلىنلىقى 0.8~1.1mm. سىرتقى يۈزى قارامتۇل قوڭۇر رەڭ بولۇپ، سەل پارقرايدۇ، ئاتاتومىيە مىكروسكۆپىدا قارىغاندا ئۇششاق، زىج تارقالغان سۆكەلسىمان ئۆسۈكچىلەر كۆرۈنىدۇ. ئۇچى دىقماق، كەسىمە شەكىللەك كېلىدۇ. تۈۋىدە ئۆتكۈر 3 قىرى بولىدۇ. ئۆتتۈرسىنىڭ ئارقا تەرمىكە يېقىنراق جايىدا ئاقوش كۈل رەڭ مېۋە كىندىكى بولىدۇ. ئارقا تەرمەپ مەركىزىدە بىر تال قىر بولۇپ، ئىككى تەرمىپىنىڭ ھەر قايىسىدا بىردىن بولىدۇ. مېۋە پۇستى قاتىقى بولۇپ، سۇغا چىلغاندىن كېيىن كۈچلۈك يېپىشقاڭلىشىدۇ. ئۇرۇقى بىر تال، سوقچاڭ، ئاچ سېرىق رەڭلىك، ئۇچى دىقماق، ئاستى تەرمىپىدە بىر تال ئۆسۈكچىسى بار بولىدۇ. قورساق قىسىمدا بىر تال ئاچ قوڭۇر رەڭلىك ئۇرۇق قوۋۇرغىسى بولۇپ، بىرلىشىش نۇقتىسى ئۆتتۈرۈ قىسىمىنىڭ سەل ئۇستىدە بولىدۇ. ئۇرۇق پۇستى نېپىز، پەردىسىمان كېلىدۇ. رەڭگى سارغۇچ ئاڭ، مایلىق بولىدۇ. تۆرەلمە يىلتىزى قىسقا، ئۇرۇق پەللەسى 2 تال، قېلىنراق بولىدۇ. سېسىق پۇرمىيەدۇ، تەمى سۇس بولىدۇ.

【پەرقىلەندۈرۈش】 (1) مەزكۇر دورىدىن 1g نى 10ml سۇغا چىلاپ قويغاندىن كېيىن، ئېرىتمە يېپىشقاڭ ھالىتىگە كەلگەندە مېۋسى ئېلىنىپ كۆزىتىلىدۇ، ئۇنىڭ يۈزەكى قەۋىتى كۈچلۈك يېپىشقاڭ ھالىتىگە كېلىپ، كۆپۈپ مەرۋايتىتەك شارچە بولۇالىدۇ، دىئامېتىرى تەخىنەن 3mm كېلىدۇ، ئۇنى فىلتر قەغىزىنىڭ ئۇستىگە قويۇپ دومىلاتقاندىن كېيىن سۇسىزلىنىپ، تەدرجىي ھالدا ئەسلىدىكى ھالىتىگە كېلىدۇ.

(2) بۇ دورىنىڭ تالقىنى قوڭۇر رەڭدە بولىدۇ. سىرتقى مېۋە پۇست ھۈچەيرىسى قارامتۇل قوڭۇر، ھۈچەيرىدە دىۋارى دولقۇنسىمان ئەگرلەشكەن، چاسراق ياكى ئۇزۇن چاسراق بولىدۇ. ئۆتتۈرۈ مېۋە پۇست ھۈچەيرىسى قىزغۇچ قوڭۇر، قېلىن بۇرچەكلىك ھۈچەيرى دىۋارى قىلا رەڭلىك بولۇپ، بۇرچىكىگە تېگىپ تۇرغان قىسىمى قېلىن بولىدۇ. ئۇرۇق سىرتقى پۇست ھۈچەيرىسى ئاچ قوڭۇر، كۆپ بۇرچەكلىك، دىۋارى سەل قېلىن، سىرتقى يۈزىنى زىج، ئۇششاق تورىسىمان سىزىقلار قاپىلغان بولىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى كاناللار پەلەمپەيسىمان بولۇپ، دىئامېتىرى 15~25 μm كېلىدۇ. تاش ھۈچەيرىلىرى توب ياكى تاراققى ھالدا، سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك بولۇپ، دىئامېتىرى 36 μm ~18 كېلىدۇ. ھۈچەيرە كاۋىكى چوڭ، توشۇك ئېرىقچىسى روشنەن ياكى ئانچە روشنەن بولمايدۇ. تالالرى موكا شەكىللەك، دىئامېتىرى تەخىنەن 20 μm بولىدۇ. دىۋار توشۇكچىسى ئېنىق بولمايدۇ. ماي تامچىلىرى كۆپ، سېرىق رەڭلىك، يۇمىلاق، چوڭ-كىچىك-

لىكى هەر خىل بولىدۇ. نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلەر يۇملاقراق، ئاچ سېرىق رەڭلىك، دىۋارى نېپىز بولىدۇ.
مېۋە پۇستىنىڭ سىرتقى يۈزىدىكى يېپىشقاق قەۋتى ئاقۇش كۈل دەڭ بولۇپ، سۇدا كۆپىدۇ.

【تەبىئىتى】 بىرىنچى درىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قان ۋە ئىچ ئۆتۈشنى توخىتىدۇ، ئىسىقتىن بولغان
يەلنى تارقىتىدۇ. تۇزۇنغا سوزۇلغان تولغان، يۈرهەك سېلىش، نېرۋا چارچاش، بۇۋاسىرلىق قاناشلارغا
ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 5~7g

【ساقلاش】 قۇرۇق ئۇرۇندادا ساقلىنىپ، مىتە چۈشۈشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ.

كاۋا ئۇرۇقى

南瓜子 Nan gua zi

SEMEN CUCURBITAE MOSCHATAE

بۇ دورا قاپاق ئائىلسىدىكى مۇسۇملۇك كاۋا (Cucurbita moschata (Duch.-Poiret) نىڭ قۇرۇق پىشقاڭ ئۇرۇقى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىلى كاۋا پىشقاڭدا ئۇرۇقى ئېلىنىپ، پاڭىزه يۈيۈلۈپ، ئاپتالىتا قۇرۇقلۇلدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا يايپلاق سوقىچاڭ، بىر ئۇچى سەل ئۇچلۇق بولۇپ، ئۇرۇنلۇقى 1.2cm ~ 2cm، كەڭلىكى 0.7 ~ 1.2cm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى سارغۇچ ئاق بولۇپ، تۈرىتسىمان تۈكچىلىرى بولىدۇ، چۆرسىسىدە سەل قىرى بولىدۇ. ئۇرۇق پۇستى قېلىنراق، ئۇرۇق كىندىكى ئۇچىنىڭ بىر تەرىپىگە جايلاشقان بولىدۇ. تۆرەلمە سۇتى يېشىل رەڭلىك، نېيز كېلىدۇ. ئۇرۇق پەللسى ئىككى تال، سېرىق رەڭلىك، قېلىن بولۇپ، تەركىبىدە ماي تامچىلىرى بولىدۇ. پۇرۇقى خۇشبۇي، تەمى تاتلىقراق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 توغرا كىسمە يۈزىدىن قارىغاندا، ئۇرۇق سىرتقى پۇست ھۈجمىرىسى يۈمىلاق ياكى سوقىچاڭ بولۇپ، بەزىلىرىدە پەيسىمان تۈكچىلەرنى كۈرۈشكە بولىدۇ. ئۇنىڭ ئىچى تاش ھۈجمىرى قەۋىتسىدىن ئىبارەت بولۇپ، تاش ھۈجمىرىلىرى چاسراق شەكىلده، سارغۇچ قوڭۇر دەڭ بولىدۇ. ئۇرۇق ئىچكى پۇستى تورسىمان ھۈجمىرىلەردىن تۈزۈلدى. يېشىل پۇست ھۈجمىرىلىرى ئاچ يېشىل رەڭلىك كېلىدۇ. تۆرەلمە سۇتى ۋە ئۇرۇق پەللە ھۈجمىرىلىرى تەركىبىدە ئالپرون دانىچىلىرى ۋە ياغ تامچىلىرى بولىدۇ.

مەزكۇر دورا تالقىنى ئاقۇش كۈل دەڭ، تاش ھۈجمىرىلىرى سوقىچاڭ، ھۈجمىرى كاۋىكى چوڭراق بولىدۇ. ئۇرۇق ئىچكى پۇست ھۈجمىرىلىرىدە تورسىمان سىزىقچىلار بولىدۇ. يېشىل پۇست ھۈجمىرىلىرى تەركىبىدە يېشىل رەڭلىك پىگەپت پارچىلىرى بولۇپ، پەيسىمان تۈكچىلەرنى كۆرگىلى بولىدۇ.

【تەبىئتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 تەرمىتى راۋانلاشتۇرۇپ، مەددىنى چۈشۈرۈدۇ. قەۋزىيەت، ئۇچەي يولى قىلقۇرتى، تۈتۈ مەددە، سازاڭ مەددە، تاسما مەددە قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 5~10g

【ساقلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرۇق ئۇرۇندا ساقلىنىدۇ.

پىلىپىل يىلتىزى

荜茇根 Bi ba gen

RADIX PIPERIS LONGI

بۇ دورا قارىمۇچ ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك پىلىپىل Piper longum نىڭ قۇرۇق يىلتىزلىق غولىدىن ئىبارەت بولۇپ، ياز، كۈز پەسىلىدە يىغۇرلىپ، شاخ يىغۇرماقلىرى ئېلىۋېتلىپ، ئاپتاتا قۇرۇتۇلدۇ.
【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا سىلىندىر شەكىللەك، كۆپىنچە ئېكىلگەن، ئۇزۇن-قسقىلىقى ھەر خىل بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 10mm ~ 30cm ، دىئامېتىرى 2 ~ 5mm . سىرتقى يۈزى قارامتۇل كۈل رەڭدىن سەل بېشىل رەڭىچە بولۇپ، ئۇزۇنىسىغا كەتكەن ئېرقچىلىرى ۋە ئېنىق بوغۇملىرى بولىدۇ. بوغۇملارنىڭ ئارىلىقى 15cm ~ 5mm . بوغۇم قىسىمى چوڭ بولۇپ، ئۇنىڭدىن تۇراقسىز يىلتىزلار ئۇسۇپ چىققان بولىدۇ. جىسى يىنىك، سەل ئەۋرىشىم بولۇپ، ئاسان سۇنىدۇ، سۈنغان يۈزى تەكشى بولمايدۇ، پوست قىسىمى نېپىز، ياغاج قىسىمى سارغۇچ ئاق، ئۇتۇرسى كاۋاكلق بولىدۇ. تۇراقسىز يىلتىزلىرى كۆپ، كۈل رەڭ قوڭۇر رەڭلىك بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 10cm ~ 3mm ، دىئامېتىرى 1 ~ 2mm . ئىچىدە ئاچ سېرىق رەڭلىك ياغاج پورى بولىدۇ، پۇرۇقى خۇشىيى، غىدقىلاش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە، تەمى دەسلەپتە قېرىق بولۇپ، كېپىن تىلى قورۇيدۇ.

【پەرقەمندۇرۇش】 (1) مەزكۇر دورا يىلتىزنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدىن قارىغاندا، سىرتقى پوست ھۇجەيرىسى بىر قەۋەت بولۇپ، سىرتىدا پۇرۇيىكلىق قەۋەت ۋە يىلتىز تۈكچىسى بولىدۇ. قۇۋازاق قەۋەت ھۇجەيرىسى كۆپ قەۋەتلىك بولۇپ، سىرتقى پوست قەۋىتىگە بېقىن بولغان ئۇرۇندادا تاراققى ھالدا تاش ھۇجەيرىسى بولىدۇ. ئىچىكى پوست قەۋەت ھۇجەيرىلىرى رەتلىك تىزىلغان بولۇپ، كاسپارىيان نۇقتىسى كۆرۈنىدۇ. ئەۋرىشىم پوست قىسىمى تار كېلىدۇ. ياغاج ماددا قىسىمى كەڭ بولۇپ، ئۆتكۈزگۈچى نېچىلىرى يەككە ھالدا توغرىسىغا تىزىلغان بولىدۇ. ئۆزەك قىسىمدا كاۋاڭ بوشلۇق بولۇپ، پوست قىسىمى ۋە ئۆزەك قىسىدىكى ھۇجەيرىلەر تەركىبىدە كۆپ مقداردا كراخمال دانىچىلىرى بولىدۇ.

(2) مەزكۇر دورا غول قىسىنىڭ تالقىنى كۈل رەڭگە مايل سارغۇچ بېشىل، تالالىرى كۆپ، دۈۋارى قېلىن بولۇپ، دىئامېتىرى 28μm ~ 10mm . كراخمال دانىچىلىرى كۆپ بولۇپ، كاللهكلىشۇالدۇ، ئۇنى نېپىز دۇوار ھۇجەيرىلىرنىڭ ھەممىلا بېرىدە ئۇچراتقىلى بولىدۇ، شەكلى يۇمىلاق، دىئامېتىرى 2μm ~ 6μm . ئۆتكۈزگۈچى نېچىلىرى توشۇك سىزىقلىق ۋە بۇرمىسان سىزىقلىق بولۇپ، دىئامېتىرى 10μm ~ 30μm . تاش ھۇجەيرىلىرى چالسا ياكى يۇمىلاق، ئۇزۇنچاق چالسا شەكلىدە بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سوغۇقتىن بولغان يەللەرنى تارقىتپ، ئىشتىهانى ئاچىدۇ، ھەزمىكە ياردەم بېرىدۇ، ئىشىشقىنى ياندۇرۇپ، ئاغرىق پەسەيتىدۇ. سوغۇقتىن بولغان ئۇستىخان-بوغۇم تاڭىرىش، بەل-پۇت سىرقىر اپ تاڭىرىش، ئاشقازان تاڭىزلىقىدىن ئىشتىهانى تۇنۇلۇش، جىگەر، تال توسوۇلۇش قاتار لقلارغا ئىشلىتلىدۇ. باشقا دورىلار بىلەن قوشۇپ ئىشلەتكەنде تۇتقاقلقىتىكى هوشىزلىقنى داۋالايدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مەقدارى】 3g . سىرتقا مۇۋاپق مقداردا ئىشلىتلىدۇ.

【ساقلاش】 سايىھ، سالقىن، قۇرۇق ئورۇندادا ساقلىنىلىدۇ.

رۇم بەدیان

茴芹果 Hui qia guo

FRUCTUS PIMPINELLAE ANISI

بۇ دورا كۈنلۈكىسمان گۈللۈكلىرى ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك رۇم بەدیان Pimpinella anisumL. نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشىق مېۋسى بولۇپ، ياز، كۈز پەسلىدە مېۋسى پىشقاندا، مېۋلىك شېخى تۈرۈقىلىنىپ، مېۋسىنى قېقىپ چۈشۈرۈپ، ئەخلىتلەرنى تازىلاپ، ئاپتاتا قۇرۇقۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا جۇپ ئاسما مېۋه بولۇپ، كۆپىنچە تۇتاش كېلىدۇ. ئاجرايدۇ. ئانلىرى ئاز تۇچرايدۇ. شەكلى تۇخۇمىسمان بولۇپ، تۇزۇنلۇقى 2.5~4mm، دىئامېتىرى تەخىمنەن 1.5mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى كۈل رەڭ يېشىل ياكى كۈل رەڭ قوڭۇر، تۇستى تۈچى تار، تۇقى كەڭ يۈمىلاق بولۇپ، مېۋه ساپقىنىڭ تۇزۇنلۇقى 1~3mm بولىدۇ ياكى مېۋه ساپقى بولمايدۇ. بۆلۈنە مېۋسىدە سەل بۇلتىيىپ چىققان 5 تال قوۋۇرغۇغا سىزىقچىلىرى بولۇپ، قوۋۇرغۇغا ئارىلىقلەرنىدا قىسقا يېرىك تۈكچىلەر بولىدۇ. بۆلۈنە مېۋسىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىنى ئاناتومىيە مىكروسكوبىدا كۆزتەكەندە، ئارقا يۈزىدە 30~20 دانە كىچىك ياخ دانىچىلىرى بولىدۇ. بىرىككەن يۈزىدە 3~2 دانە چوڭراق ياغدىنى بولىدۇ. خۇش پۇرالىق، تەمى تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۆلۈنە مېۋسىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدىن قارىغاندا، سىرتقى مېۋه پوستى بىر قاتار بولۇپ، سارغۇچ قوڭۇر رەڭ كېلىدۇ. سىرتقى يۈزىدە شورغۇچىسمان تۆسۈكچىلەر (مېۋه قىرى) ۋە قىسقا كونۇس شەكىلىك بەزىسىز تۈكچىلەر بولىدۇ. ئوتتۇرা مېۋه پوستى بىر نەچچە قەۋەت نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلىرىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ، ئارقا يۈزىدە 20~15 دانە كىچىك ماي نېچىلىرى بولىدۇ. بىرىكش يۈزىدىكى ماي نېچىلىرى چوڭراق، ئادەتتە 2 دانە بولىدۇ. مېۋه قىرىدىكى ئىنچىكە كاناللار تۇنامى ئەتراپىدا قېلىن دىۋارلىق تالالار بولىدۇ. مېۋه ئىچكى پوستى بىر قەۋەت كەسمە سىزىقى يۆنلىشتە تۈزۈرگەن ھۈجەيرىلەردىن ئىبارەت بولۇپ، كۆپىنچە تۇرۇق پوستىغا چىك چاپلىشىپ تۇرمايدۇ. تۇرۇق پوست ھۈجەيرىلىرىدە تورسىمان سىزىقچىلار بولىدۇ. تۆرەلمە سۈتى كۆپ ساندىكى قېلىن دىۋارلىق ھۈجەيرىلەر دەن تۈزۈلگەن، كۆپىنچە كۆپ قىرلق بولىدۇ، ئۇنىڭ تەركىبىدە ماي تامىچىلىرى، ئاپلۇن دانىچىلىرى ۋە كىچىك كىرسەتاللار بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سوغۇقتىن بولغان يەلنى تارقىتىپ، بەدەننىڭ تەبىئىي مايللىقىنى ئىلگىرى سۈردى. سۈيدۈكىنى، ھېيزىنى راۋانلاشتۇردى، تۈچەينى سىلىقلاشتۇرۇپ، ئاغرىق توختىتىدۇ. دېمى تۇتۇلۇش، نېپەس يېتىشمەسىلىك، غەيرىي بۇزۇق خىلىتلار تۆختاتپ قېلىش، سۈيدۈك تۇتۇلۇش، ھېيز تۇتۇلۇش، باش ئاغرىش، قورساق ئاغرىش، قورساق ئېسىلىش، پەي بوشاب كېتىش، لەقۇقالق، بەدەننىڭ تەبىئىي كۈچى ئاجىزلاپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش تۆسۈلى ۋە مىقدارى】 3~5g

【ساقلالاش】 قۇرۇق تۇرۇندا ساقلىنىدۇ.

ئارپىبهدىيان يىلتىزى پوستى

茴香根皮 Hui xiang gen pi CORTEX FOENICULI

بۇ دورا كۈنلۈكىسمان كۈللۈكلىرى ئائىلسىدىكى ئۇسۇملۇك ئارپىبهدىيان Foeniculum vulgare Mill نىڭ قۇرۇق يىلتىز پوستىدىن ئىبارەت بولۇپ، ياز، كۈز پىسىلىدە كولاب ئېلىپ، يىلتىز پوستىنى سویيۇۋېلىپ، ئاپتايىتا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا ئۇزۇن چىۋىقىسمان بىۆگەلمە نەيچە بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 5~15cm، دىئامېتىرى 3~10cm كېلىدۇ. سىرتقى بىزى ئاقۇش كۈل رەگدىن ئاچ سارغۇچ كۈل رەگىچە بولىدۇ. ئۇزۇنىسىغا كەتكەن پۇرۇلمە سىزىقچىلار ۋە يان تەرمىكە پۇلتىبىپ چىققان يۇملاق كەلكەن پوست توشۇكچىلىرى بولىدۇ؛ ئىچكى يۈزىنىڭ رەڭى يوقراق، سارغۇچ قوڭۇرەڭ، سەل سىلىق بولىدۇ. بەزىلىرىدە يىلتىز ياغىچىنىڭ پورلىرى قېقاڭالىدۇ. جىسىمى چۈرۈك بولۇپ، ئاسان سۇنىدۇ، سۇنغان يۈزى رەنتىز، ئاچ رەڭدە بولىدۇ، سەل خۇش پۇراقلقى، تەمى ئاۋۇال ئازاراق بار بولۇپ، كېپىن سۇسلىشىدۇ. **【پەرقەندۈرۈش】** مەزكۇر دورىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدىن قارىغاندا، ئەڭ سىرتقى قەۋىتى پۇرۇپكە لەق قەۋىت بولۇپ، كۆپىنچە 4~6 قاتار ھۈچەيرىلەر بولىدۇ. پوست قەۋىتى كەڭ. ئەۋرىشىم پوست قىسىدىكى غەۋىرسىمان نەيچىلىر توغرىسىغا تىزىلغان، زىچ بولۇپ، زىچ تەرىپىدە بىر رەت ھالقىسمان تىزىلغان ياغ دانلىرى بولىدۇ. ياغ دانلىرى نەتىرپىدا 14~9 دانه ئاچراتقۇچى ھۈچەيرىلەر بولىدۇ. چاجىما نۇرسىمان ھۈچەيرىلەر 5~2 قاتار بولۇپ، پوست قەۋىتىگە قاراپ تەدرىجىي كېڭىيگەن بولىدۇ. نېپىز دىۋارلىق ھۈچەيرىلەرنىڭ تەركىبىدە كراخمال دانىچىلىرى بولىدۇ.

بۇ دورا تالقىنى ئاقۇش رەڭلىك، ئۇتكۈزگۈچى كاناللىرى كۆپىنچە تور سىزىقلقى ۋە گىرۋەكلىرىدە سىزىقلق توشۇكچىلىر بار بولۇپ، دىئامېتىرى 40~100 μm كېلىدۇ. پۇرۇپكە ھۈچەيرىسى ئادەتتە بىر فانچە قەۋىت قاتلانغان بولۇپ، ئۇزۇن چىۋىقى شەكىلىك ياكى چاسىراق بولىدۇ. ئۇزۇنلۇقى 60~70 μm ، كەڭلىكى 37~50 μm كېلىدۇ. دىۋارى قىلىنراق بولىدۇ. تالالرى يەككە ياكى توپلاشقان بولۇپ، دىئامېتىرى 18~25 μm كېلىدۇ. كراخمال دانىچىلىرى ناھايىتى كۆپ، يەككە ھالىتتە، دۈكىلە كەڭ ياكى ئۇچبۇرۇچە كىسمان يۇملاقلاق بولۇپ، دىئامېتىرى 10~20 μm كېلىدۇ، كىندىك تۆچكىسى « ۸ » خېتى شەكىلىدە ياكى تۆچكىسمان بولىدۇ؛ قوش دانىچىلىرى كۆپىنچە 4~2 دانىچىلاردىن تۈزۈلگەن بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داؤالايدىغىنى】 سوغۇقتىن بولغان يەللەرنى تارقىتىدۇ، بۆرەك ۋە ئاشقازاننى ئىلىلىتىدۇ، سۇنى ھېيدەپ، ھۆللىوكنى يوقىتىدۇ، ئىشىشىنى ياندۇرۇپ، ئاعىرق پەسەيتىدۇ. سوغۇقتىن بولغان ئاشقازان ئاغرىش، قورساق قىسىمى يېقىمىزلىنىش، سۈبۈدۈك يولىدا تاش پېيدا بولۇش، سۈبۈدۈك ماڭماسلق، ئۇرۇقدان خالتىسى ئىشىش ئاغرىش، چۇقۇق، يۆتەل، كاناي ياللۇغى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 5~7g

【ساقلاش】 سايىھ، سالقىن، قۇرۇق ئورۇقىدا ساقلىنىدۇ.

چاققاقيوت ئۇرۇقى

尊麻子 Qian ma zi

FRUCTUS URTICAE

بۇ دورا چاققاقيوت Urtica cannabinaL نىڭ قۇرۇق پىشقان مېۋسى بولۇپ، كۈزدە مېۋسى پىشقانىدا، مېۋسى بار شاخلىرى ئۇرۇقىلىنىپ، تىپتىپتا قۇرۇققاندىن كېيىن، مېۋسىنى قىقمۇپ چۈشۈرۈپ، نەخلمەتلەرىدىن تازىلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىسىتى】 مەزكۇر دورا ئۇزۇن دۈگىلەك دۇمبا شەكىللەك ياكى موکىسىمان رومبا شەكىللەك بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 3~4mm، دىئامېتىرى 2mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى ئاقۇش كۈل رەڭدىن كۈل دەڭ قوڭۇر دەڭكىچە بولىدۇ، تىك يۇرۇملەرى بولىدۇ. چوڭايىتش نېينىكىدە قارىغاندا تورسىمان سىزىقچىلار، كىچىك تەڭكىچىلەر ۋە قىلتىرقلار كۆرۈندىدۇ. مېۋە پوستى ئىنتايىن ئاسان سوبۇلدى. ئۇرۇقى تۇخۇمىسمان، ئۇزۇنلۇقى تەخمىمنىن 2mm، دەڭگى سارغۇچ قوڭۇر كېلىدۇ. پۇرۇقى ئاجزى، تەمى سۇس بولىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ توغرى كەسمە يۈزىدىن قارىغاندا، سىرتقى مېۋە پوست ھۈجمىرسى بىر رەت تىزىلغان، دۈگىلەك كەركەن كېلىك سىزىق بۆنلىشتە ئۇزارغان بولۇپ، تەركىبىدە ئاچ سېرىق دانىچىسىمان ماددىلار بولىدۇ. ئۇتتۇرا مېۋە پوستى نېیز دىۋارلىق ھۈجمىرىلەردىن ئىبارەت، چوڭاراق تەركىبىدە كالتسىي ئۆكსالات كەرسىتالىرى بولىدۇ. نېچكى مېۋە پوستى تور تۆشۈكىسىمان ھۈجمىرىلەردىن ئىبارەت. ئۇرۇق سىرتقى پوستى بىر رەت سارغۇچ قوڭۇر دەڭلىك ھۈجمىرىلەردىن ئىبارەت. تۆرەلمە سۇتى ۋە ئۇرۇق پەللسى ھۈجمىرىلىرىدە ئاپلىرۇن دانىچىلىرى ۋە مای تامچىلىرى بولىدۇ.

پاراشوكى سارغۇچ بېشىل بولىدۇ. يۈزەكى پوست ھۈجمىرىلىرى سوقىچاقراق، گىرۋەكلىرى دولقۇنسى-خان، يەككە ھۈجمىرىلىرى بەز توكسىز بولىدۇ. بەزلىرىنىڭ تۈۋى قىسىدا قوڭۇر دەڭ ماددىلار بولىدۇ. مېۋە ئۇتتۇرا پوستى بىر قەدر چوڭاراق، نېیز دىۋارلىق ھۈجمىرىلەردىن ئىبارەت بولۇپ، نېچىدە كەرسىتال گۇزۇپىسىلىرى بولىدۇ. مېۋە نېچكى پوستى تور سىزىقلق ھۈجمىرىلەردىن ئىبارەت. ئۇرۇق پوستى ھۈجمىرىلەرلىرى سارغۇچ قوڭۇر دەڭلىك، زىچ تىزىلغان بولىدۇ. تۆرەلمە سۇت ھۈجمىرىلىرى كۆپ بۇرجهكلىك بولۇپ، تەركىبىدە كۆپ مقداردا مای تامچىلىرى بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 نىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قانىنى جانلاندۇرىنى، سپازمنى بوشىتىدۇ، سوغۇقتىن بولغان يەللەرنى تارقىتىدۇ، قويۇق خىلىتلارنى يۈمشتىدۇ. سوغۇقتىن بولغان بوغۇم ئاغرىش، مۇچىلەر ئۆبۈشۈش، دېمى سىقلىش، يۆتىلىش، جاھىل بەلغەم، مەننىي بالدار كېتىش، مەننىي تۇتالماسىق، كىچىك باللاردىكى تارتىشىش (دۆيلىنىش)، تۇغۇتتا شامالداش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مقدارى】 3~6g

【ساقلاش】 شامال ئۆتۈشىدىغان، قۇرغاق جايىدا ساقلىنىدۇ.

ئاچقىتاۋۇز

药西瓜 Yao xi gua

FRUCTUS COLOCYNTHIS

بۇ دورا قاپاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئاچقىقاۋۇز ·Citrullus colocynthis (L.) Schrad· قۇرۇق پىشقاڭ مېۋسى بولۇپ، ياز، كۈز پەسلىدە مېۋسى پىشىپ سارغا ياخاندا ئۈزۈۋىلىپ، ئاپتاتا قۇرۇق تولىدۇ ياكى بىرىپ ئاپتاتا قۇرۇق تولىدۇ.

«شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» مەزكۇر دورا يۈمىلاق شار شەكىللەك بولۇپ، دىئامېتىرى 3~10cm كېلىدۇ. سىرتقى يىۈزى سېرىق، ئاچ سېرىقتن سارغۇچ ئاڭ رەڭلىككىچە بولۇپ، تۈكسىز كېلىدۇ. مېۋە پوستى نېپىز، ئاز-تولا قورۇلغان، تۇچى تەرىپىدە ئانىلىق تۇمىشۇقنىڭ كۆتكى ساقلىنىپ قالغان، يەنە بىر تەرىپىدە مېۋە ساپىقىنىڭ قالدۇق ئىزى بار بولىدۇ. ئوتتۇرا مېۋە پوستى ۋە ئىچكى مېۋە پوستى قورۇپ كاۋاڭ بولۇپ قالدى. ئانىلىق يايراچىلىرى قوشۇلغان يېرىدىكى ئۇرۇق كۆتكى قىلىن بولۇپ، قورۇغاندا بولۇتسىمان ھالىتكە كېلىدۇ. ئۇنگىدا كۆپلەكەن ئۇرۇقلار بولىدۇ. ئۇرۇقنى يايلاق تۇخۇمسىمان بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 5~6mm كېلىدۇ، رەڭكى قوڭۇر سېرىق بولۇپ، سەل پارقىرايدۇ. ئۇرۇق پوستى سەل قاتىق بولۇپ، سىچىدە بوز رەڭلىك ئۇرۇق پەللىسى بولىدۇ. جىسمى يەڭىگىل، چۈرۈڭ بولۇپ، ئاسان پارچىلىنىدۇ. تەمى ئىنتايىن قېرىق كېلىدۇ.

«پەرقلەندۇرۇش» مېۋە پۇستىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدىن قارىغاندا، سىرتقى مېۋە پۇستى چالسا ياكى ئۇزۇنچاق چالا شەكىللىك، دۇۋارى قىلىن بىر رەت ھۇجەيرىلەردىن ئىبارەت بولۇپ، ئاچ سېرىق رەڭلىك كېلىدۇ. سىرتىنى مۇگكۈز ماددىلىق قەۋەت ئۇراپ تۇرىدۇ؛ ئۆتتۈرۈم مېۋە پۇستىدىكى نېيىز دىۋارلىق ھۇجەيرىلەر ئۇزۇنچاق چالا، سوقىچاق ياكى رەتسىز بولۇپ، ئارلىقلەرىغا تاش ھۇجەيرىلەرى توبى، ئۆتكۈزۈچى نېيىچە وە تالالار قىسقۇرۇلغان بولىدۇ. ئىچكى مېۋە پۇستى شەكلى چوڭ، نېيىز دۇۋار ھۇجەيرىلەرىدىن تۇرۇلدۇ.

تالقنى ناچ سېرىق رەڭلىك بولىدۇ. ئۇرۇق پوست هۇجمەيرلىرى دۈگىلەكرەك ياكى چاسراق، دىۋارى قېلىن بولىدۇ. تاش هۇجمەيرلىرى دۈگىلەكرەك، سوقىچاق ياكى رەتسىز بولۇپ، دىئامېتىرى $20\text{--}65\mu\text{m}$ كېلىدۇ. سىزىقلقىق تۆشۈكچىلىرى بولىدۇ. نېپىز دىۋارلىق هۇجمەيرلىر تەركىبىدە قىزغۇچ سېرىق تاياقسىمان ياكى دۈگىلەكرەك كىرسىتالار ۋە كراخمال دانىچىلىرى بولىدۇ. بۇرمىسىمان ئوتتكۈزگۈچى نەيچىنىڭ دىئامېتىرى $25\mu\text{m}$ كېلىدۇ.

【تەبىئى】 ئۈچىنچى دەرىجىدە ئىسىق، ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

«ندسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» غېرىپى تەبىئىي بەلغۇم خىلىتلىرى ۋە سەۋدانى تازىلايدۇ، سوغۇقىن بولغان ھۆللۈكىنى تارقىتىدۇ، تو سالغۇلارنى ئېچىپ، ئاغرۇق پەسەيتىدۇ، مەيدىنى بوشىتىپ، يوٗتەلنى توخىتىدۇ. باش ئاغرۇقى، شەققە، لەقولقى، تۇتقاقلقى، تۇنۇتقاقلقى، تۇستىخان-بۇغۇملار ئاغرۇش، دېمى تۇتۇلۇش، گاسلىق، كۆز تورلىشىش، سۇلۇق ئىشىق، قەۋزىيەت، سېرىقلقى چۈشۈش، زىققە قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

0.5~6g مقداری ۋە ئۆسۈلىش ئىشلىتىش

ساقلاش شامال ئۆتۈشىدىغان، قۇرۇق ئورۇندادا ساقلىنىدۇ.

چلاپا

药喇叭根 Yao la ba gen

TUBER JALAPAE

بۇ دورا يۆگىمەچ كۈللەر ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك خۇڭشۇ Ipomoea purga Hayne نىڭ قۇرۇتۇلغان تۈگۈنەك يىلتىزى بولۇپ، كۈزدە يېغۇشىلپ، يۈيۈپ-تازىلاب، ئاپتاتا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا تۇرچۇق شەكىللەك، شار شەكىللەك ياكى دەتسىز تۇخۇمىسمان بولۇپ، چوڭ-كىچىكلەكى ھەر خىل بولىدۇ. كىچىكلەرى ياكىقتهك، ئوتتۇرا ھاللىرى تۇخۇم-دەك، چوڭلەرى ئادەمنىڭ مۇشتۇمىدەك بولىدۇ. تۇزۇنلۇقى تەخىمنەن 15cm، دىئامېتىرى 10cm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزىدە تۇزۇنىسىغا كەتكەن قوروقلار، پوست توشۇكلىرى ۋە تورىسمان پۈرۈلسەر بولىدۇ. ئائىسى تەرىپىدە شاخلىق يىلتىزى بولىدۇ. تۇزۇن يىلتىزىلەرنىڭ ئۇچلۇق ياكى پىچاقتا كەسکەندەك ئىزى بولىدۇ. جىسىمى فاتىق بولۇپ، پارچىلىسا پوست قىسىمى تەكشى، مۇڭگۈزلمەشكەن قۇلۇلە قېپىغا ئۇخشاش، توق قوڭۇر، پارقىراق بولىدۇ. سىچكى قەۋىتىسىدىكى ياخېچى قالاشقان، سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك بولىدۇ. پۇرېقى ئاچز لازا پۇرېقىدا، تەمى سەل قېرىق بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 مەزكۇر دورىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدىن قارىغاندا، پۇرۇپكا ھۈجەيرىسى كۆپ رەت تىزىلغان، سىرتقى قەۋەت ھۈجەيرىسى چوڭراق، سېرىق رەڭلىك، ئىچكى قەۋىتى سېرىق رەڭلىك ياكى رەڭسىز، يايلاق تىك توت بۇلۇڭ شەكىللە بولىدۇ. پوست قەۋەت ھۈجەيرىسى 10 رەت، دىۋارى نېپىز، سوقىچاقاراق ياكى كۆپ بۇرچەكلىك بولۇپ، تەركىبىدە نۇرغۇنلىغان كراخمال دانىچىلىرى ۋە كەرسىتال گۇرۇپىلىرى بولىدۇ؛ ئاچراتقۇچى ھۈجەيرىلەر سوقىچاچ ياكى دۈگىلەكەك، ئاچ سېرىقتىن سېرىق رەڭگىچە بولۇپ، بەزلىرىدە سېرىق رەڭلىك تاش ھۈجەيرىلەرنى كۆرگىلى بولىدۇ. ھەر خىل تىپتىكى كاناللار باقلىمى ئارىلاپ-ئارىلاپ ئۇخشاش مەركەزلىك ھالقىسمان تىزىلغان، ھاسىل قىلغۇچى قەۋىتى دوشەن ھەم تار، ئۆتكۈزگۈچى نەيچىلەر ئاز چاچما نۇرسىمان تىزىلغان بولىدۇ.

بۇ دورا تالقىنى سارغۇچ قوڭۇردىن قارامتۇل كۈل رەڭگىچە بولىدۇ. كراخمال دانىچىلىرى كۆپ، يەككە ياكى قوشۇلغان، دۈگىلەك بولۇپ، دىئامېتىرى 15μm~5 كېلىدۇ. كالتسىي ئۆكسالات كەرسىتال-لىرى كۆپ بولۇپ، دىئامېتىرى 35μm~15 كېلىدۇ. پۇرۇپىكلىق ھۈجەيرىلەر سېرىق رەڭلىك ياكى رەڭسىز، تۇزۇنىچاچ چاسا ياكى كۆپ بۇرچەكلىك كېلىدۇ. ئاچراتما ھۈجەيرىلەرى كۆپ، سوقىچاچ، ئاچ سېرىق رەڭلىك بولىدۇ. تاش ھۈجەيرىلەرى سېرىق رەڭلىك، ئۆتكۈزگۈچى نەيچىلىرى تورىسمان ۋە توشۇڭ سىزىقلۇق بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋا ئايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتلىرىنى سۈرىدۇ، ئاغرىق توختىسىدۇ، بۆتەل پەسىتىسىدۇ. تۇزۇنىچە ساقايىمىغان باش ئاغرىش، ھۆل سوغۇقتنى بولغان بوغۇم ئاغرىش، بەل، تىز سىرقىراپ ئاغرىش، تۇتقاقيقىق، لەققا، قورساق ئاغرىش، يۆتلىش، بەلغەم كۆپ كېلىش، ئىسىق-سوغۇقلۇق ئالماشىپ كېلىش، سېرىقلەق چۈشۈش، ئىشىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 1.5~5g

【دېقىقتە قىلىدىلغان ئىشلار】 ھامىلدار ئاپاللار ۋە تېنى ئاچىزلارغا ئىشلىتىلمىدۇ.

【ساقلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىلىدۇ.

WS₃—BW—0070—98

خېنە يوپۇرەمىقى

指甲花叶 Zhi jia hua ye

FOLIUM LAWSONIAE

بۇ دورا غالچەك ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك خېنگۈلى L. lawsonia inermis نىڭ قۇرۇق يوپۇرمىقى بولۇپ، ياز پەسلىدە ئۇزۇۋېلىپ، ئاپتايلا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 مەزكۇر دورا كۆپىنچە يوگىلىپ ئۇۋېلىدۇ، پۇتونلىرىنى يېبىپ تۈزىلگەندىن كېيىن سوقچاق ياكى ئۇزۇن دۈكىلەك شەكىلگە كىرىدۇ، ناھايىتى ئازلىرى دۇم كۆفتۈرۈلگەن تۇخۇم شەكىلدى بولىدۇ. ئۇزۇنلۇقى 2~4cm، كەڭلىكى 1~1.5cm. سىرتقى يۈزى سارغۇچ يېشىل رەڭلىك بولۇپ، ئالدى تەرىپى جىددىي ئۇچلانغان، تۇقى شىنا شەكىللىك، تولۇق كىرۋەكلىك ياكى سەل دولاقۇنسىمان كېلىدۇ، قىسقا ساپىقى بولىدۇ. جىسمى چۈرۈك بولۇپ، ئاسان پارچىلىنىدۇ. پۇرقى تاجىز، تەمى سۇس ياكى سەل تۇزۇق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) مەزكۇر دورا تالقىنى سارغۇچ يېشىل رەڭلىك، تىش ھۈجىرىلىرى كۆپ بۇرۇچەكلىك ياكى سوقچاق كېلىدۇ. كەرسىتاللىرىنىڭ دىئامېتىرى 10~30μm، چاسا كەرسىتاللىرى چوڭراق بولىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى نېيچىلىرى كۆپىنچە بۇرۇمسىمان كېلىدۇ. تۆشۈك سىزىقلق ياكى تورسىمان سىزىقلقلىرى ئاز ئۇچرايدۇ. پىكىمېت پارچىلىرى قارامتۇل سۆسۈن ياكى سارغۇچ قوڭۇر كېلىدۇ.

(2) مەزكۇر دورا تالقىنىدىن 0.5g 5ml 5تىتيل ئىسپىرت قوشۇپ، چالغۇقاندىن كېيىن بىر سائىت تىندۈرۈپ سۈزۈلەندۈرۈپ. سۈزۈلگەن ئېرىتىمىدىن ئايىرم-ئايىرم 1ml 1تىلىپ، ئىككى پروپېركغا قۇيۇلدى، بىر پروپېركغا ناتىرىي ھىدرۆكىسىدى سىناق ئېرىتىمىسىدىن 2~1 تامچە تېمتىلسا، ئېرىتىمە قىرغۇچ قوڭۇر دەڭگە كىرىدۇ؛ يەنە بىر پروپېركغا تۇز كىسلا تاسىدىن 2~1 تامچە تېمتىلسا، ئېرىتىمە سېرىق دەڭگە كىرىدۇ.

【تەبىئىتى】 ھۆل تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 باھنى قۇۋۇتلمەندۈرۈپ، چاچ ئۆستۈرۈدۇ، ئاشقازاننى كۈچەيتىدۇ، قاننى تەڭشەيدۇ. جىنسىي ھەۋسى ئاجىلاش، زەكمەر قايىم بولماسىلىق، ئاشقازان ئاجىزلىقىدىن تامىقى ئازىتىش، تومۇرلار توسوۇلۇش، پەي ئاغرىش، قىزىتما، باش ئاغرىش، ئېغىز ۋە تىللارغا جاراھەت چىقىش، تېرە قىچىشىش، ھەر خىل قاناش، ئوتتا ۋە قايىناق سۇدا كۆپۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 3~4g. بەدەن سىرتىغا مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

【ساقلاش】 سايىھ، سالقىن، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىلىدۇ.

هوپارتقۇن

贯叶金丝桃 Guan ye jin si tao
HERBA HYPERICI PERFORAFI

بۇ دورا سېرىقچاي ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك هوپارتقۇن Hypericum perforatumL. نىڭ قۇرۇتۇلغان پۇقۇن چۆپى بولۇپ، ياز پەسىلى چىچەكلىگەن مەزگىلەدە يەر ئۇستى قىسىمىنى ئۇرۇۋىلىپ، ئەخلمەتلەرنى تازىلاپ، كەسلەپ، سالقىندا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 1. بۇ دورىنىڭ غولى سىلىندىرسىمان، تىك ئۆسىدۇ، كۆپ شاخلايدۇ، دىئامېتىرى 1~2mm كېلىدۇ، سرتقى يۈزى سارغۇچ بېشىل بولىدۇ. غولىنىڭ، شېخىنىڭ ئىككى تەرىپىدە بىر تالدىن تىك قىرى بولۇپ، جىسىمى سەل قاتىق كېلىدۇ. كىسىمە يۈزىنىڭ رەڭگى سارغۇچ ئاق، ئۇتتۇرىسى كاۋاڭ بولىدۇ. يوپۇرمىقى ئۇزۇن سوقىچاقتنى يېسىمان شەكىلىكچە بولۇپ، ئۇزۇشلۇقى 10~13mm، كەڭلىك 8~12mm كېلىدۇ. ئۇچى دىقماقى: تۇۋى دۈگىلەك كەڭ شىنا شەكىلىك كېلىدۇ. غولىنى سەل ئوراپ تۇرىدۇ. گىرۋىتكى تولۇق، بەزى گرۋەكلىرى ئىچىكە يۆگىلىپ قالىدۇ. يۈزىدە قىرا رەڭلىك بەز تەنچىلىرى بولىدۇ. كۈنلۈكىسىمان گۈل تىزمىسى ئۇچىدا ئۆسىدۇ. پۇرۇلۇپ تۇرىدۇ، رەڭگى سېرىق بولىدۇ، گۈل چىنسى ۋە گۈل بەرگىلىرىنىڭ گرۋەكلىرىدە قارا رەڭلىك بەز تەنچىلىرى بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) مەزكۇر دورا غولىنىڭ (دىئامېتىرى تەخمىنەن 1.5mm بولىدۇ) توغرا كىسىمە يۈزى: دۈگىلەك، ئىككى تەرىپىدە بىردىن قىرى بولىدۇ. يۈزەكى پوست ھۈچەيرلىرى بىر رەت تىزىلغان بولۇپ، قىridا قىلىن قىرلىق توقۇلما بولىدۇ. قوۋازاق قەۋوتى تار بولۇپ، سرتقى تەرىپىدە بىر، ئىككى قاتار توق بېشىل ماددىلىق ھۈچەيرلىر بولىدۇ. ئىچىكى قوۋازاق قەۋوتى ئېنىق بولۇپ، سارغۇچ بېشىل رەڭلىك ماددىلاردىن تەركىب تاپقان بىر قاتار ھۈچەيرلىر بولىدۇ. ئەۋرىشىم قىسىنىڭ سرتقى تەرىپىدە سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك ئاجرىتىپ چىقىرىش بوشلۇقى بولىدۇ. ياغاچلىق قىسىمە كەڭرەك بولۇپ، پۇتۇنلىي ياغاچلاشقان بولىدۇ، چاچما سىزىقچىلىرى روشنەن، ئۆتكۈزگۈچى نېيچىلىرى چاچما نۇرسىمان تىزىلىدۇ، تالالىرى نىسبەتەن كۆپ بولۇپ، ئۆزەك قىسىمە دۈگىلەك، دىۋارى نېيىز ھۈچەيرلىردىن تەركىب تاپقان، مەركىزى كاۋاڭ بولىدۇ.

غولىنىڭ تالقىنى سۇس بېشىل سېرىق بولىدۇ. ياغاچ تالاسى كۆپ، تۇتام ھاسىل قىلغان، بەزلىرى تارقاق يەكە حالاتتە، تۈز ياكى سەل ئېڭىلىگەن بولۇپ، دىئامېتىرى 16μm~9، ياغاچلاشقان بولىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى نېيچىلىرى كۆپىنچە بۇرما شەكىلىك ۋە تورسىمان سىزىقلىق بولۇپ، دىئامېتىرى 18~33μm كېلىدۇ. ياغاچلاشقان ياكى سەل ياغاچلاشقان بولىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى نېيچىسىنىڭ يېنىدا ئادەتتە ياغاچ تالالىرى ۋە ئۇزۇن چاسا شەكىلىك، ياغاچ نېيىز دىۋار ھۈچەيرلىرى بولىدۇ. چاسا، چاسراق ياكى كۆپ بۇرچەكلىك كېلىدۇ. دىئامېتىرى 80μm~40، ياغاچلاشقان، ھۈچەيرە پوست توشۇكى بار، توشۇك ئېرىقچىسى روشنەن بولىدۇ. سرتقى قوۋازاق ھۈچەيرىسى سۇس سارغۇچ بېشىل ياكى رەڭسىز

بوليىدۇ. سرتقى يۈزىدىن قارىغاندا ئۆزۈن چاسا ياكى ئۆزۈن كۆپ بۇرجهكلىك كۆرۈنىسىدۇ، مۇڭگۈزلىشكەن ئۆزۈن سىزىقلېرىنى كۆرۈشكە بولىدۇ. ئاجرىتىپ چقارغۇچى ھۇچىھىرىلىرى كۆپىنچە ئىنچىكە ئۆزۈن بولۇپ، تەركىبىدە سېرىق ئاجرىمىلىرى بولىدۇ.

(2) يۈپۈرماق شەكلى: ئۇستىنکى ۋە ئاستىنلىقى سرتقى قوۋازاق ھۇچىھىرىلىرىدە تۇراقىز ياكى ئۇخشاش بولىغان هاۋا توشۇكچىلىرى بولىدۇ. بەز تەڭكىچىسى ئاسان كۆرۈنىدىغان بولۇپ، يايپلاق يۈمىلاق، دئامېتىرى 50~90 μm ، ئىچىدە سېرىق رەڭلىك ماددا تۇتقان بولىدۇ. ئۇستىنکى سرتقى قوۋازاق ھۇچىھىرىلىرى كۆپ بۇرجهكلىكەك، ھۇچىھىر دىۋارى سەل دولقۇنسىمان ئېكىلىگەن، تەسۋىسمان قېلىنىلغان بولىدۇ. ئاستىنلىقى سرتقى قوۋازاق ھۇچىھىرىلىرىنىڭ دىۋارى نېپىز، ئىنچىكە تەسۋىسمان، هاۋا توشۇكچىلىرى ئىنتايىن كۆپ بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئۇچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق قۇسىق.

【تەسلىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ھۆل سوغۇقنى تەڭشەم، ھەيز راۋانلاشتۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدىمش خۇسۇسىتىگە ئىگە. سوغۇقتىن بولغان ئىشىشىقلارغا، سۈيدۈك راۋان بولماسىلقا، ئۇپىكىنى ياخشىلاشقا، بەل-پۇت ئاغرىقىلىرىغا ئىشلىتىلدى. كۆپۈك ۋە بوغۇم ياللۇغلىرىغا بەدمىن سرتىدىن چېپىلدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مقدارى】 2~3g. بەدمىن سرتىغا مۇۋاپىق مقداردا ئىشلىتىلدى.

【ساقلاش】 ئاپتاك كۆرمەيدىغان، نەم تارتىمايدىغان، سايە، سالقىن، هاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان جايىدا ساقلىنىدۇ.

سۆرۈنچان

秋水仙 Qiu shui xian
BULBUS COLCHICI

بۇ دورا گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سۆرۈنچان Colchicum autumnale L. نىڭ قۇرۇق تەڭگىسىمان غولى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىلى يىغۇپلىپ، ئەخىلەتلېرىدىن تازىلاپ سايىدا قۇرۇتىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا ئۇزۇن تۇخۇمىسىمان تېمىنە شەكىللەك بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 3~5cm، دىئامېتىرى 2.5cm~1، قىلىنلىقى 10mm~3 كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى كۈل رەڭگە مايل سارغۇچ ئاق رەڭلىك ياكى سۇس قوڭۇرغا مايل سېرىق بولۇپ، بەزىدە ئۇششاق زىچ تىك سىزىقچىلارنى كۆرگىلى بولىدۇ. سەل پارقرايدۇ. ئۇچى تەرىپى سەل ئۇچلۇق ياكى سۇنۇپ كەتكەن، تۆۋەن تەرىپى دىقاماق، ئىككى يېنى يايلاق، تۆۋىگە يېقىن يايلاق تەرىپىنىڭ سۇ يۈزىدە تەڭگىسىمان غول تەخسىنىڭ قالدۇقى بار بولىدۇ. ئادەتتە تەڭگىسىمان غول تەخسىنىڭ ئارقا تەرىپىدە ئۇزۇنىسىغا كەتكەن بىر تېيز ئېرىق بولىدۇ. جىسمى سەل قاتىق بولۇپ، ئاسان سۇنىدۇ، سۇنغان يۈزى ئاق ياكى سۇس كۈل رەڭگە مايل سېرىق، تالقانسىمان بولىدۇ، سەل خۇشبوئى پۇرايدۇ، تەمى ئاچقىق بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) تالقىنى ئاققۇش كۈل رەڭ بولىدۇ. كراخمال دانىچىسى كۆپ، دانىچىلىرى تاق ياكى قوش، كىندىك نۇقتىسى توچكىسىمان ياكى يىوچۇقسىمان بولىدۇ. بەزىلىرىدە قوش كىندىك نۇقتىلىرىنىمۇ كۆرگىلى بولىدۇ، شەكلى تۇخۇمىسىمان، يۈملاق ياكى سوقىچاچ بولۇپ، دىئامېتىرى 5~20 μm كېلىدۇ. ھۇچىرىرە پوست تۆشۈكى ياكى بۇرمىسىمان ئۆتكۈزۈچى نېيچە ۋە نېيچىسىمان ھۇچىرىلەرنى ئاندا-ساندا ئۇچراتقىلى بولىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 1g ئېلىپ، كىسلاتالق ئالكوهولدىن 5ml قوشۇپ، سۇ ۋاننسىدا بىر سائەت ئىسىتىپ، فىلتردىن ئۆتكۈزۈپ فىلترلاغان ئېرىتىمىسىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇلىدۇ، فالدۇقىغا 2ml سۇ قوشۇپ ئېرىتىپ، فىلتردىن ئۆتكۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىسىگە سۇلغات كىسلاتاسىدىن 0.5ml قوشۇلسا، ئېرىتىمە ئالتۇن رەڭگە كىرىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق، ئۇچىنچى دەرىجىدە ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئى يەلغىم خىلىتىنى تازىلاش، ئورگانىزمنىڭ چوڭقۇر قاتلاملىرىدىكى قويۇق غەيرىي تەبىئى خىلىتىلارنى سۈرۈش، يېېشقاق توسالغۇلارنى ئېچىش، ئىشىق ياندۇرۇش، ئاغرىق تۆختىش خۇسۇسىتىگە ئىگە. چوڭ-كىچىك بوغۇملار ئاغرىش (رېماتزىملق ۋە رېماتوتىدىلىق بوغۇم ياللۇغلىرى)، جىڭگەر ياللۇغى، سېرىقلق چوشۇش كېسىلى، بەل-تىزلار تېلىپ ئاغرىش، مۇرە، دۇمبە يېقىمىزلىقلەرىغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مقدارى】 1.5~3g

【ساقلاش】 شامال ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

بادرەنجى بۇيا چىنى

香青兰 Xiang qing lan

HERBA DRACOCEPHALI MOLDAVICAE

بۇ دورا كالپوكىسمان گوللۇكلىر ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك بادرەنجى بۇيا چىنى Dracocephalum moldavica L. نىڭ قۇرۇتۇلغان يەر يۈزىدىكى چۆپى بولۇپ، ياز پەسىلىدە گولى چىچە كلىگەندە ئورۇۋۇپ-لىپ، ئەخلىتلرىنى تازىلاپ، ئاپتايتا قۇرۇتۇلۇدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورىنىڭ غولى چاسا، توت قىرلىق، رەڭگى سارغۇچ يېشل ياكى قىزغۇچ سوٽسوٽ بولۇپ، بېسىلىپ ياتقان شالاڭ يۇمۇران تۈكۈلىرى بولىدۇ. جىسىمى يېنىك، پۇۋەكچىسىمان، سۇنغان يۈزى ئاق، ئۇتتۇرسى كاۋاڭ بولىدۇ، يوپۇرمىقى قارىمۇقاۋاشى ئۆسىدۇ، سېپى بار بولۇپ، كۆپىنچىسى چۈشۈپ كېتىدۇ ياكى ئۇۋىلىپ كېتىدۇ؛ پۇتۇنلىرىنىڭ شەكلى تېمىنە شەكىللەك ياكى تار تېمىنە شەكىللەك بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 5cm~2 كېلىدۇ. گىرەكلىرىدە ئۈچۈرچەك ھەرە چىشلىرى بولىدۇ، ئۇنى قىسىدىكى ئىككى چىشدا ئادەتتە قىلىتىرقى بولىدۇ. يوپۇرمىقىنىڭ ئىككى يۈزىدىكى تومۇرلىرىنى شالاڭ ئۇششاق تۇتىچىلار ئوراپ تۇرىدۇ. يوپۇرماق ئارقا يۈزىدە قوڭۇر رەڭلىك ئۇيمانلاشقان بەز نۇقتىلىرى بولىدۇ. ئايلانما كۈنلۈكىسمان گۈل تىزمىسى شاخلىرىنىڭ ئۆچىدا ئۆسىدۇ، ئۇرغۇچى يوپۇرماقلىرى ئۆزۈن يۇملاق بولۇپ، ھەر بىر تەرىپىدە 3~4 تالدىن ئۆزۈن تىكىنى، ئارقا يۈزىدە بەز نۇقتىلىرى بولىدۇ؛ گۈل كالسىسى كانايىسمان بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى تەخمىنەن 1cm كېلىدۇ. ئۆزۈنلىسىغا كەتكەن سىزىقچىلىرى بولىدۇ. ئۇچى تەرىپى بەشكە بولۇنكەن، بۆلەكلىرى ئارلىقىدا سۆگەلسىمان پۇلتايىملىار بولىدۇ. چىچىكى كۆپىنچە يىگىلمىپ كەتكەن، كۆككە مايل سوٽسوٽ رەڭلىك بولىدۇ. پۇرنى خۇشبۇيى، تەمى سەل ئاچچىق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 (1) غولىنىڭ توغرى كىسىمە يۈزى: سىرتقى قوۋىزىقىدا بىر قاتار ئۆزۈن چىسا شەكىللەك ھۈچەيرىلەر بولۇپ، سىرتىنى مۇڭكۈزلەشكەن قۇشتى ئوراپ تۇرىدۇ، هاۋا ئۆشۈكچىلىرى نىسبەتنى ئاز بولۇپ، شامالدۇرۇغۇچ بېشى شەكىللەك بەز تەڭگىچىلىرى بولىدۇ. بەزىز موبى 3~1 دانە ھۈچەيرىدىن تۆزۈلگەن، يۇملاق كونۇسسىمان، تۆز ياكى ئەگرى، دىۋارى قېلىن بولۇپ، سۆگەلسىمان ھۈررەكلىرى بولىدۇ. بەز مويلىرىنىڭ يەككە ھۈچەيرىلەك سېپى وە ئىككى ھۈچەيرىلەك بېشى بولىدۇ. قۇۋىزاق قۇشتى بىر نەچچە قاتار تىزىلغان نېپىز دىۋارلىق ھۈچەيرىلەر بولۇپ، توت قىرىقىدا بىر نەچچە قۇۋىزاق قۇشتى بىر نەچچە قاتار تىزىلغان نېپىز دىۋارلىق ھۈچەيرىلەر بولىدۇ. ئۇۋىشىم قۇۋىزاق قىسىمى وە قۇۋىزاق قەمۇقتە بىر قانچىلىغان تاق ياكى توپلىشىپ تىزىلغان وە ئارىلاپ ھالقا قەمۇقتە شەكىللەندۈرگەن سېرىق رەڭلىك قېلىن دىۋارلىق ھۈچەيرىلەر بولىدۇ. شەكىللەندۈرگۈچى قۇشتى ئانچە روشەن بولمايدۇ. ئۆتكۈزگۈچى نەيچىلەر دەستىسى سىرتقى ئۇۋىشىم تىپلىق، ياغاج ماددىلىق قىسىنىڭ توت قىرلىق جايى تەرقىقىي قىلغان، ئۆتكۈزگۈچى نەيچە وە تالالاردىن تۆزۈلگەن بولىدۇ. نۇرسىمان يېپىچىلار ھۈچەيرىسى بىر قاتار تىزىلغان، توت بولۇڭ

قىسىدا دىسلەپكى ياغاچلىق قىسم كۆرۈندى، تۇتكۈزگۈچى نېيچىسى چوڭراق، دىۋارى نېپىز بولۇپ، دىئامېترى $76\text{ }\mu\text{m}$ ~30 كېلىدۇ. مەركىزى تۇزمەك قىسم بولۇپ، نېپىز دىۋارلىق ھۇجمىرىلەردۇ.

(2) يوپۇرمىقىنىڭ توغرا كىسىم بىزى: تۇستىنلىك سرتقى پوست قىسىدا بىر قاتار نىسبەتنىن چۈچ كىسىم بىزىنى بويلاپ سوزۇلغان ھۇجمىرىلەر بولۇپ، تۇزۇن چالا شەكىللەك، رەتلەك تىزىلغان بولىدۇ. سرتقى دىۋارى قېلىنلاپ، مۇڭگۈز ماددا قەۋىتىنى تۇرىتىلدى. تۇستۇنلىك ۋە ئاستىنلىق سرتقى پوستى قەۋەتلىرىدە بەز تۈكۈچىسى ۋە كۆپ ھۇجمىرىلەك بەزسز تۈكچىلەر ۋە بەز تەڭكىچىسى بولىدۇ، بەز تۈكۈچىسىنىڭ بىر ھۇجمىرىلەك سېپى بولىدۇ. بېشى ئىككى دانە ھۇجمىرىدىن تۈزۈلدۈ. بەزسز تۈكچىلەر 3~1 غىچە ھۇجمىرىدىن تۈزۈلدۈ. شەكلى كونۇس شەكىللەك، تۈز ياكى ئەگىلمىشكەن بولۇپ، دىۋارىدا سۆگەلسىمان بىرى بار. بەز تەڭكىچىسىنىڭ بىر ھۇجمىرىلەك سېپى بولىدۇ. بەز بېشى 16~12 دانە ھۇجمىرىلەردىن تۈزۈلدۈ. دىئامېترى $112\text{ }\mu\text{m}$ ~77 كېلىدۇ. هاۋا توشۇكچىسى تىك ئوق شەكىلە بولىدۇ. دىشاڭىسىمان توقۇلمىلىرى ئىككى قاتار دىۋارى نېپىز ھۇجمىرىلەردىن تۈزۈلگەن بولۇپ، زىچ تىزىلدى. بۇلۇتسىمان توقۇلمىلىرى 5~3 قاتار رەتسىز ھۇجمىرىلەردىن تۈزۈلگەن بولۇپ، شالاڭ تىزىلدى. يوپۇرماق ئاساسىي تووفۇرى تۆۋەمنىڭ بۇلتايغان بولۇپ، سرتقى ئۇۋوشىم تىلىق تۇتكۈزگۈچى نېيچىلەر دەستىسىدىن ئىبارەت. ئۇۋوشىم پوست قىسىدىكى ھۇجمىرىلەر كۆپ بۇرجهكىلەك بولىدۇ. تۇستىنلىك ۋە ئاستىنلىق سرتقى پوست قەۋىتىنىڭ ئىچىكى تەرىپىدە بىر نەچىچە قەۋەت قېلىن بۇرجهكىلەك توقۇلمىلار بولىدۇ. تالقىنى سارغۇچى پېشىل، سرتقى پوست قەۋىتىدىكى هاۋا توشۇكچىلىرى تىك ئوق شەكىللەك بولىدۇ. غىبىرى بەز تۈكچىلەرى 4~1 دانە ھۇجمىرىدىن تۈزۈلگەن بولۇپ، تۇرۇنلۇقى $200\text{ }\mu\text{m}$ ~80، دىئامېترى $16\text{ }\mu\text{m}$ ~7 كېلىدۇ. كونۇس شەكىللەك، تۈز تىك ياكى ئەگىلمىشكەن بولۇپ، سرتقى بىزىدە سۆگەلسىمان ھۇرەكەلەر بولىدۇ، بەز تەڭكىچىسى چوڭراق، دىئامېترى $140\text{ }\mu\text{m}$ ~90 بولۇپ، 16~12 دانە ھۇجمىرىدىن تۈزۈلدۈ، ئىچىدە سۇس سېرىق ياخ تامىچلىرى بولىدۇ. تۇتكۈزگۈچى نېيچىسى تورسىمان، بۇرمسىمان سىزىقلقى بولۇپ، دىئامېترى $12\text{ }\mu\text{m}$ ~3 كېلىدۇ. گۈل چىڭى دانىچىسى سوقىچاڭ بولۇپ، 3 دانە بىخلەنىش توشۇكى بولىدۇ. تالالىرىنىڭ تۇزۇنلۇقى تەخمىنەن $720\text{ }\mu\text{m}$ ، دىئامېترى $26\text{ }\mu\text{m}$ كېلىدۇ. قېلىن دىۋارلىق ھۇجمىرىلەرنىڭ ھۇجمىرىھە پوست توشۇكى روشنەن بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يۈرەكىنى قۇۋۇمەتلىپ، مېڭىنى ئاسراش، جىڭەرنى مۇھاپىـ زەت قىلىپ، ئاشقازاننى ساغلاملاشتۇرۇش، سېزىم كۈچىنى كۈچەيتىپ، قوغدىنىش كۈچىنى تولۇقلاش، ئەقلىـپاراسەتنى زىيادە قىلىش، مېڭىدىكى توسالغۇلارنى ئېچىش خۇسۇسىيىتىگە ئىككى. يۈرەك ئېغىش، يۈرەك ئۇغۇش، باش قېيىپ، مېڭە چىتىقلۇش، ئىنكاسى سۇسلىشىش، سەزگۈ ئاجىزلاش، تەپەككۈر چېكىنىش، ئاشقازانـجىڭەر ئاجىزلاش، تۇرگانزىمنىڭ تەبىئىي قۇۋۇتى ئاجىزلاش قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىنىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 10~15g

【ساقلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0074—98

ئىز خىر چىنى

香茅 Xiang mao

HERBA CYMBOPONIS

بۇ دورا باشاقلىقلار ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئىز خىر . ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئوخشاش تۇرۇقداش بولغان بىر نەچچە خىل ئۆسۈملۈكىنىڭ قۇرۇقۇلغان غول يوپۇرمىقى بولۇپ، كۈز پەسىلىدە يىغۇپلىنىپ، يۈيپ تازىلاپ، ئاپتاتا قۇرۇقتۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا غولىنىڭ تۇرۇقۇلۇقى 20~60cm، دىئامېتىرى 2~3mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى سۇس سارغۇچ قوڭۇر ياكى سەل يېشىل، بوغۇملىرى توم بولىدۇ. جىسىمى چۈرۈك بولۇپ، ئاسان سۇنىدۇ، سۇنغان يۈزىنىڭ ئوتتۇرسى كاۋاڭ بولىدۇ. يوپۇرماق ئالقىنى تار چىۋىق شەكىللەك ياكى ئۇزۇن يىپ شەكىللەك بولۇپ، ئۇزۇقۇلۇقى 7~20cm، كەڭلىكى 1~5mm كېلىدۇ. يوپۇرماق غلىپىنىڭ تۈۋى كۆپىنچە ئۇۋىلىپ كېتىدۇ، ئۇستى تەرىپىدىكى يوپۇرماق غلىپى بوغۇم ئارىلىقىدىن قىسا بولىدۇ. يوپۇرماق تىلىنىڭ ئۇزۇقۇلۇقى 1.5mm~1، سارغۇچ ئاڭ رەڭلىك، پەردىكە ئوخشاش كېلىدۇ. بەزىلىرىدە شالاڭ كونۇسسىمان گۈل تىزىمىلىرى بولىدۇ. مېۋسى سۇس سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، سۆڭەكە كە ئوخشاش بولىدۇ. تۇرۇقۇلۇقى تەخىمنەن 5mm كېلىدۇ. ئالاهىدە خۇشبۇي پۇرايدۇ، چايىنسا تىلىنى قورۇپىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى درىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 تومۇرلاردىكى توسالغۇلارنى ئېچىش، قويۇق خىلىتلارنى بشۇرۇش، سوغۇق يەللەرنى ھەيدىمەش، ھەيزىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئاغرىق توختىش خۇسۇسىيىتىگە ئىكەنەتلىك، ئېغىز-كۈز مايماق كېتىش، دۆتلىك، ئۇنۇتقاڭلىقى، سەزگۈ ئىقتىدارى تۆۋەنلىمەش، ئاشقازان يېقىمىسىزلىقى، يەللەك ئاغرىقلار، قورساققا سۇ چۈشۈش، ھەيز توسۇلۇشلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 1~6g

【ساقلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

هەبۈلئاس

香桃木果 Xiang tao mu guo
RUCTUS MYRTI

بۇ دورا مىرتلىس ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ھېبۈلئاس Myrthus communis نىڭ پىشاي دەپ قالغان قۇرۇق مېۋىسى بولۇپ، مېۋىسى پىشاي دېگەننەدە يىغۇپلىپ، ئاپتاتىا قۇرۇتۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا چالسا يۈملاق ياكى تۇخۇمىسىمان بولۇپ، ئۇزۇنلىقى 5~9mm دىئامېتىرى 4~6mm كېلىدۇ. پىشقان مېۋىسىنىڭ سرتقى يۈزى قارامتۇل سۆسۈن ياكى قىزغۇچ قوڭۇر، خاملىرى سۇس سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك بولىدۇ. ئۇچىدا 5 يېرىقچە قورۇلۇپ قالغان كۈل كىلاسا يايپىقى بولىدۇ. ئاستى تەرىپىدە يۈملاق چىكتىسىمان مېۋە ساپىقىنىڭ ئىزى بولىدۇ، بەزلىرىدە ساقلىنىپ قالغان ئىنچىكە مېۋە ساپىقى بولىدۇ، ساپىقىنىڭ ئۇزۇنلىقى 1.5cm 1~1.5cm كېلىدۇ. مېۋە پۇستى نېيىز ھەم چۈرۈك، سرتقى يۈزى قورۇلغان بولۇپ، ئاسان ئېزلىپ كېلىدۇ. مېۋىسىنى يارغاندا، ئىچى 3~2 خانە(4 خانىلىق ئاز كۆرۈلە) لق بولۇپ، ھەر بىر خانىسىدا 3~2 تال بۆرەك شەكىللەك، ئاڭ، سىلىق ئۇرۇقلار بولىدۇ. ئازراق خۇش پۇرالقىق، تەمى سەل چۈچۈمەل تاتلىق، ئاندىن قاڭىسىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 مېۋە پۇستىنىڭ توغرا كەسمە يۈزى: سرتقى مېۋە بىر قاتار ئۇزۇن يۈملاق، كەسمىنى بويلاپ ئۇردارغان قىزغۇچ قوڭۇر سرتىنى مۇڭگۈز ماددا قەۋىتى ئۇرالپ تۇرغان ھۈجەيرىلەر بولىدۇ. ئوتتۇرا مېۋە پۇستىنىڭ سرتقى تەھېتىكى بىر نەچىچە قەۋىتى سرتقى مېۋە پۇستى ھۈجەيرىلەرى بىلەن ئۇخشاش بولۇپ، ئۇنىڭدىمۇ قىزغۇچ قوڭۇر ماددىلار بولىدۇ. ئوتتۇرسىدا چوڭ ياغ ھۈجەيرىلەرى بولۇپ، ئىچكىرىلىگەنسىرى ھۈجەيرىلەر تەدرىجىي چوڭىيىپ بارىدۇ. ھۈجەيرىلەرde كىرسىتال تۈركۈمى بولىدۇ.

تالقىنى سۇس قوڭۇر رەڭلىك، نېيىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلەرى چوڭراق بولۇپ، تەركىبىدە قىزغۇچ قوڭۇر ماددىلار ۋە كالتسىي ئۆكسالات كىرسىتال تۈركۈملىرى بولىدۇ. تاش ھۈجەيرىلەرى توب ياكى تارفاق، ھۈجەيرە كاۋىكى چوڭ، توشۇك ئېرىقچىسى روشن بولىدۇ. ئىچىكى ئۇرۇق پۇستىسىنى تورسىمان سىزىقلىق ھۈجەيرىلەر قىسقا موكا شەكىللەك بولىدۇ، ئۆتكۈزگۈچى نەيچىسىدە ھۈجەيرە پۇست توشۇكى بولىدۇ. ياغ ھۈجەيرىلەرنىڭ كۆپىنچىسى ئېزلىپ كەتكەن.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 روهنى ئۇرغۇتۇپ، كۆڭۈلى خۇشخۇي قىلىش، قان ۋە ئىچ سۈرۈشنى توختىتىش، يۈرەك، ئاشقازان قاتارلىق ئەزالارنى قۇۋۇتمىلەش، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تارقىتىش خۇسۇسىتىكە ئىگە. ئىچى تىتىلداش، ئىچى سۈرۈش، قانلىق تەرهەت قىلىش، قان قۇسۇش، بۇرۇن قانىش، ھەيز زىيادە كۆپ كېلىش، ئاشقازان زەنپىلىشىپ، بىمەكلىكەر ھەزىم بولماسىق، ھەر قايسى ئەزىز زەنپىلىشىلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3~5g
【ساقلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

بابۇنە

洋甘菊 Yang gan ju

HERBA CHAMOMILLAE

بۇ دورا مۇرەككەپ كۈللىكلىرى ئائىسىدىكى ئۆسۈملۈك بابۇنە Matricaria chamomilla L. نىڭ قۇرۇتۇلغان پۇتۇن چۆپىدىن ئىبارەت بولۇپ، ياز پەسىلىدە يېغۇبىلىپ، سالقىندا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورىنىڭ يىلتىزى ئىنچىكە، تۈز بولۇپ، دىئامېتىرى تەخىمنەن 1mm كېلىدۇ. غول، شاخلىرى ئىنچىكە ئاجزى، تىڭ قىرى بار بولۇپ، دىئامېتىرى 1~2mm كېلىدۇ؛ رەڭگى بېشىلدىن قىزغۇچقۇر دەڭىچە بولىدۇ. ئۇمۇمى ئورۇغۇچىسى يېرىم دۈكىلەك، ئىككى قەھەت، گىرۋەكلىرى كەڭ پەرسىمان، ئۇرۇن تۇخۇم شەكىللىك، ئىچكى ۋە سىرتقى قۇۋەتلىرى ئوخشاشلا بېشىل بولىدۇ. سىرتقى قەۋىتىدىكى ئورۇغۇچى يوپۇرماقلىرىدا تۇشتى بولىدۇ. كۈل تەكلىكى كونۇسسىمان بولۇپ، كەڭلىكى 1.5~2mm كېلىدۇ. كۈللىكە ئەر خىل شەكىللىك، گىرۋەك كەڭلىكى 2mm، ئالدى ئۇچى تېبىز يېرىلەغان بولىدۇ. تاجى يالپاراقچىسى كەڭ تۇخۇملىك، رەڭگى ئاڭ، كەڭلىكى 2mm، ئالدى ئۇچى تېبىز يېرىلەغان بولىدۇ. ئۇتتۇرىسىدىكى كۈلى قوش جىنسلىق، تۇرۇباسىمان، رەڭگى سېرىق بولۇپ، ئۇچى تەرىپى 5~4 پارچىغا بولۇنگەن بولىدۇ. خۇشبۇي پۇرایدۇ، تەمى ئاچچىق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 مەزكۇر دورا غولىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدە: سىرتقى پوست هۇجەيرىلىرى بىر رەت تىزىلغان، قۇۋىزاق قەۋۇتى تار بولۇپ، 4~2 رەت هۇجەيرىلىرىدىن تەركىب تاپىدۇ. ئۇتتۇرا تۇۋەرەك غلىپى تالا باغلىنى ئارىلاپ ئارىلاپ ئالقىسىمان تىزىلغان بولۇپ، ئۇتكۈزگۈچى نېيچىلەر باغلىمىنىڭ سىرتىغا جايلىشىدۇ. ئۇتكۈزگۈچى نېيچىلەر تۇتامى 9 دانه بولۇپ، سىرتقى ئەۋرىشىم تېپلىق، ئالقىسىمان تىزىلغان بولىدۇ. ئەۋرىشىم پوست قىسىمى تار، ياغاج قىسىمى تەرقىقى قىلغان. ئۆزەك قىسىمى نىسبەتەن كەڭ بولۇپ، چواڭ، نېبىز دىوارلىق هۇجەيرىلىرىدىن تۈزۈلگەن بولىدۇ.

تالقىنى بېشىل ياكى ساراغۇچقۇر بولىدۇ. كۈل تاجىسىنىڭ سىرتقى پوست هۇجەيرىلىرىدە بەز تۈكچىلىرى ۋە بەز تۈكچىلىرى بولمىغان كۆپ هۇجەيرىلىر بولىدۇ. كۈل چىڭى دانىچىسى دۈكىلەك، ئۇچقۇرۇق بولىدۇ. ئۇنىڭ سىرتىدا ئۇچىسىن ئۆسۈكچىلىرى بولۇپ، دىئامېتىرى 18~22μm كېلىدۇ. كۈل تاجى نېيچىسىدە تورىسىمان هۇجەيرىلىر تۈكچىسى بولۇپ، كەڭلىكى تەخىمنەن 30μm كېلىدۇ. كۈل ئانلىق بويىنىنىڭ سىرتقى پوست هۇجەيرىسىنىڭ سىرتقى دىوارى يۇلتايغان بولۇپ، شورۇغۇچقا ئۇخشادىدۇ. ئۇرۇقدان هۇجەيرىلىرى دەتسىز تۇخۇملىك بولۇپ، تورىسىمان تۆشۈكچىلىرى بولىدۇ. ئۇتكۈزگۈچى نېيچىسى بۇرما سىزنىلىق، بەزلىرى تۆشۈك سىزنىلىق بولىدۇ. چاڭدىنىنىڭ چاڭدان پاسىل هۇجەيرىسى چاساسىمان ياكى دەتسىز دۇمبا شەكىللىك، هۇجەيرىلىرى تەسۋىسىمان قېلىنىلغان، سىزنىق تۆشۈكچىسى چوڭراق بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 بىرئىچى دەرىجىدە قۇرۇق، ئىككىنچى دەرىجىدە ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 نېرۇنى قۇۋەتلىمش، ئاغرىق تۇختىش، ئىشىق ياندۇرۇش، تەرىلىش، تەردەت راۋانلاشتۇرۇش، سۈيدۈك ھېيدىش، ھېيز راۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىتىكى ئىكەن. ئۇرگانىزىمىدىكى غەيرىي تەبىئىي چىرىگەن خىلىتلارنى يوقىتىشقا، ئۇزۇغۇچە ساقايىغان باش ئاغرىقلىرىغا، قەۋزىيەت، تەرلىمەسىلىك، سۈيدۈك راۋان بولماسىلىق، ھېيز راۋان بولماسىلىق拉غا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 2~10g
【ساقلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

زەيتۇن يېغى

洋橄榄油 Yang gan lan you
OLEUM OLIVARUM

بۇ ئەرمۇدۇن ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك زەيتۇن دەرىخى . Olea europaea L. نىڭ پىشقان مېۋسىنىڭ يېغى بولۇپ، ياز پەسىلى مېۋسى پىشقاندا يىغۇۋېلىنىپ، سوغۇق بېسىم بىلەن يېغى ئايرۇۋېلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا سېرىق ياكى ساراغۇچ يېشل، سۈزۈك مايسىمان سۇيۇقلۇق بولۇپ، تەمى سەل ئالاھىدىرەك بولىدۇ.

بۇ دورا ئىسان ئېچىدۇ. C° 8 تا دۇغلىشىدۇ. C° 0 تا قىتىپ كرستاللىشىدۇ.
【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داؤالايدىغىنى】 خىلتىلارنى يۇمشىتىپ تارقىتىش، تىش چۈشۈرۈش، تۇغرىق توختىش، مەددە ئۆلتۈرۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. سۆڭەك، بوغۇم، پەيىلەر تۇغرىقىغا، بەدەننىڭ ھەر قايىسى جايىلىرىدا پەيدا بولغان تاشلارغا، تېرە يېرىكلىش، ئۇچەي يوللىرىدىكى ھەر خىل پارازىت مەددىلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 6~12g
【ساقلاش】 يېغىزى ھىم ئېتلىپ، سايىه، سالقىن، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

زۇپا

神香草 Shen xiang cao
HERBA HYSSOPI

بۇ كالپوكىسمان گۈللۈكلىر ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك زۇپا *Hyssopus cuspidatus* Boriss نىڭ قۇرۇتۇلغان يېر ئۇستى چۆپى بولۇپ، 7-8 ئايلارادا يېر ئۇستىدىكى قىسىمىنى ئورتىپلىپ، ئەخلمەتلەرنىنى تازىلاب، ئاپتايتا قۇرۇتۇلۇدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورىنىڭ ئىگىزلىكى 50cm ~ 15 كېلىدۇ. تۇۋىدىن كۆپ شاخلىنىدۇ. تۇۋىنىكى قىسىدىكى كونا شاخلىرىنىڭ رەڭگى قوڭۇر، شۇ يىلقى شاخلىرىنىڭ رەڭگى سارغۇچ يېشىل بولىدۇ. غولى بىلەنر-بىلەنمس تۆت قىرلىق، سىلىق كېلىدۇ. يوپۇرماقلىرى قارىمۇقاشارى ئۆسىدۇ، يېپىسمان شەكىلدە بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 1.3mm ~ 4cm، كەڭلىكى 2 ~ 3mm، گىرۋەكلىرى ئىچىگە يېڭىلەن، زىج بەز توچكىلىرى قاپلىغان بولىدۇ. كۈنلۈكىسمان گۈل تىزمىسى بىر تەرمىپكە قىيىسايان، گۈلى كۆك بىنەپىشەڭ، گۈل تاجى قوش كالپوكىسمان، ئۇزۇنلۇقى تەخىمنەن 10mm بولىدۇ. مېۋسى چاسا دۈگىلەك، ئۇچبۇرجدەك بولىدۇ. خۇش پۇراقلق، تەمى ئاچقىق، قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 يوپۇرماقلىرىنىڭ توغرا كەسمە بېزى: سىرتقى قوقۇزاق ھۈچەيرىسى بىر رەت تىزىلغان، ئۇزۇن چاسا شەكىللەك ياكى كۆپ بۇرچەكلىك، كېسىك سىزىق بويلاپ ئۇزارغان بولۇپ، سىرتىنى مۇڭگۈزلەشكەن قەۋەت ۋە مۇڭگۈز ماددىسىسىمان تال شەكىللەك تۈكىسمان ماددىلار ئوراپ تۇرىدۇ، بەز تەڭكىچىسى بولىدۇ. كۆپىنچىسى مۇڭگۈزلەشكەن قەۋەت ئىچىگە ئۇلتۇرۇشقان بولۇپ، دىمقامى كۈنۈس شەكىللەك ھۈرەك ھاسىل قىلىدۇ. رىشاتكاسىمان ھۈچەيرىلەر بۇقىرى-تۇۋەن ھەر قايىسىدا 3 ~ 2 قەۋەت بولىدۇ. يوپۇرماق ئۇتتۇرسىدا بىر چوڭ ئۆتكۈزگۈچى نەيچىلەر باغلىمى بولۇپ، ئىككى بىننىڭ ھەر بىر تەرمىپىدە 10 ~ 6 تالىچىق ئۇشىش ئۆتكۈزگۈچى نەيچىلەر باغلىمى بولىدۇ. رىشاتكاسىمان ھۈچەيرىلەر نۇرغۇنلىغان رەڭسىز يۇمۇلاق ياكى تۇخۇمىسمان كراخمال دانىچىلىرى بولىدۇ.

تالقىنى سارغۇچ يېشىل، هاۋا تۆشۈكچىلىرى تۈز ئۇق شەكىللەك بولۇپ، ئۇزۇن ئۇقى تەخىمنەن 30μm، قىسقا ئۇقى تەخىمنەن 20μm، بەز تەڭكىچىلىرى 100μm ~ 20 كېلىدۇ. غەيرىي بەز تۆكچىلىرى كۆپىنچە 1-2 ھۈچەيرىلەك بولىدۇ. گۈل چىڭى دانچىسى ئالىتە قىرلىق، دۈگىلەك ۋە ياكى سوقىچاق بولۇپ، دىئامېتىرى 40μm ~ 20 كېلىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى نەيچىسى بۇرمىسمان، تالالىرى تۆشۈكلىك بولۇپ، دىئامېتىرى تەخىمنەن 10μm كېلىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى پىشۇرۇش ۋە تازىلاش، ئۇرگانىزمنىڭ تەبىئىي مايىللەقىنى ئىلگىرى سۈرۈش، يۆتەل توحىتىش، بەلغەم بوشىتىش، زىققىنى بېسىپ، ئۆپىكىنى داۋانلاشتۇرۇش خۇسۇسىتىتىگە ئىنگە. كۆكەكتىكى قويۇق، جاھىل خىلىتلار، باش، كۆكەك ئاغرىش، دەم سقىش، كۆكەك-بېقىن ئاغرىش، كونا يۆتەل، بەلغەم كۆپىيىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【مۇقدارى ۋە مۇۋاپىق مۇقداردا ئىشلىتىلىدۇ.】

【ساقلاش】 سايى، سالقىن، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

ئىسەنەغۇل

蚤状车前子 Zao zhuang che qian zi

SEmen PLANTAGINIS PSYLLI

بۇ پاقييوپۇرمىقى ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك پاقييوپۇرمىقى . *Plantagopsisylum* L نىڭ پىشقانى قۇرۇق ئۇرۇقى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىلى ئۇرۇقى پىشقانىدا مېۋە باشقى يىغۇۋېلىنىپ، ئاپتايتا قۇرۇتۇلۇپ، ئۇرۇقى سوقۇۋېلىنىپ، ئەخىلەتلەرىدىن تازىلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قىيىقىمىان سوقىچاق شەكىلدە بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 2~3mm، كەڭلىكى 1~1.5mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى سارغۇچ قوڭۇدىن قلارامتۇل قوڭۇر رەڭگىچە بولىدۇ. ئادمەتە سىرتىنى كۈل رەڭ تېقىش پەردىسىمان ماددا ئوراپ تۇرىدى، دۆمبە تەرىپى توپىيىپ چىققان بولۇپ، ئوتتۇرسىدا بىر تال ئۆزۈنسىغا كەتكەن تار، ئۆزۈن قوڭۇر بەلۋاغ بولىدۇ. قورساق تەرىپى ئۇيماڭىنىشپ ئۆزۈنسىغا تېرىقچە شەكىللەنگەن بولۇپ، تېرىقچە تېڭى قوڭۇر رەڭلىك بولىدۇ. تېرىقچە تېڭىنىڭ مەركىزىگە يېقىن جايىدا بىر تال سوقىچاق ئۇرۇق كىندىكى بولۇپ، رەڭگى تېخىمۇ قېنىق، ئىككى ئۇچى دىقماق ياكى تەدرىجىي تارايىغان بولۇپ، سەل كەڭ بىر ئۇچىغا يېقىن قورساق تەرىپىدە دۈگىلەك حىكتىسىمان ئۇرۇق كورتىكى تۆشۈكى بولىدۇ. يۇرقى ئاحىز، تەمى سۇس كېلىدۇ.

【پەرقەندىرۇش】 (1) تالقىنى كۈل رەڭ سېرىنقتىن كۈل رەڭ قوڭۇر رەڭگىچە بولىدۇ. شىلىمىشقا ھۇچىرىلىرى ئۇزۇن چاسا شەكىللەك، ئۇچبۇرجهك ياكى ھەر خىل شەكىلەدە بولىدۇ. پىغمېنت ھۇچىرىلىدە. رى ئۇزۇن چاسا شەكىللەك بولۇپ، ئىچىدە سارغۇچ قوڭۇر دانىچىلار ياكى كالله كىسىمان ماددىلار بولىدۇ. تۆرەلمە سوت ھۇچىرىسى كۆپ بۇرجهكلىك بولۇپ، ئىچىدە كراخمال دانىچىلىرى ۋە ئالېرون دانىچىلىرى بولىدۇ. كراخمال دانىچىلىرىنىڭ كىندىك نۇققىسى روشنەن بولىدۇ. ئۇرۇق پەللەسى ھۇچىرىسىدە ماي تانىچىلىرى ۋە ئالېرون دانىچىلىرى بولىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن تەخىنەن 0.3g ئېلىپ، مېتىل ئالكوهولدىن 3ml قوشۇپ، بىر سائەت تۇرغۇزۇپ، فىلتىرىدىن ئۆتكۈزۈپ، فىلتىر ئېرىتىمىسىدىن 0.5ml 5% لىك ناتىرىي نىترىت، 5% ئالىيۇمن نىتراتلارنىڭ هەر قايسىسىدىن بىر تامىچە تېمىتىلسا، ئېرىتمە ئۆچۈق سېرىق رەگىھە ئۆزگەرىدۇ. ئاندىن يەنە 5% لىك ناتىرىي ھىدرۆكسىد ئېرىتىمىسىدىن 4~3 تامىچە تېمىتىلسا، دەرھال قىزىل رەگىھە ئۆزگەرىدۇ. **ئەكشۈرۈش** كىسلاقاتادا ئېرىمەيدىغان كۈل تەركىبى 2.0% تىن (قوشۇمچە K XI) ئېشىپ كىتىمەسىلىكى لازىم.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

«تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» قىزىتما پەسەيتىش، سۈبىدۇك ھېيدىم، ئىچ تۇتكۇنى توختىتىش، ئاغرۇق توختىتىش، ئىشىش ياندۇرۇش، كالغا پايدا قىلىش خۇسۇسىتىگە ئىگە. غەيرىي تەبىئىي سەپرادىن بولغان باش ئاغرىش، گال-كېكىردهك ئاغرىش، بوغۇم-ئۇستاخانلار ئاغرىش، پات-پات سىيىش، سىيىگەندە ئاغرىش، قان سىيىش، تولغانچ، بىغز، تىلغا جاراھەت چىقىشلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى 3~6g
ساقلاش سايىه، سالقىن، قۇرۇق جايدا ساقلىنىدۇ.

ئادراسمان ئۇرۇقى

骆驼蓬子 Luo tuo peng zi
SEMAN PEGANI

بۇ ئوغرىستكەن ئائىلسىدىكى ئۇسۇملۇك ئادراسمان *Peganum harmala* L. نىڭ پىشقانى قۇرۇق ئۇرۇقى بولۇپ، ياز، كۈز پىسىلى مېۋسى پىشقانىدا يەر ئۇستى چۆپىنى ئۇرۇپلىپ، ئۇرۇقىنى سوقۇپ بېلىپ، ئەخلىملىرىنى تازىلاب، ئاپتاپتا قۇرۇقىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا كونۇسىمان ئۇچبۇرجهك توت تەرمىلەك بولۇپ، ئۇرۇنلۇقى 2~4mm، ئوتتۇرا قىسىنىڭ دىئامېتىرى 1~2mm. سرتقى يۈزى قوڭۇر رەگدىن قارامتۇل رەڭىچە بولىدۇ. يۇقىرى ئۇچى ئۇچلۇقراق بولۇپ، كىندىك نۇقتىلىرىنى كۆرگىلى بولىدۇ، تۆۋەن ئۇچى دىقماق، چوڭايىتش ئەينىكىدە سرتقى يۈزى قورۇلۇپ ھەرە كۆنسىكە ئۇخشайдىغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ. سۇغا چىلاب قويسا كۆپۈپ، سرتقى يۈزى سىلىقلىشىدۇ. پۇرېقى ئاھىز، تەمى ئاچقىك كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 ئۇرۇقىنىڭ توغرا كىسمە يۈزى: سرتقى ئۇرۇق پوسىدىكى سرتقى پوست ھۇچىرىلىرى بىر قەۋەت زور ھۇچىرىلىرى قەۋىتىدىن ئىبارەت بولۇپ، سارغۇچ قوڭۇر، كىسمە سىزىق يۈنلىشىدە ئۇزارغان، ھۇچىرى دىۋارى نىسبەتن قىلىن بولىدۇ. ئىچكى دەوارىدا كىچىك تىكەنسىمان سرتقىنى مۇڭكۈز ماددا قەۋەت ئۇرالاپ تۇرغان ھۇرەرە كەلەرنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئاستى پوستىدا 4~3 قاتار نېپىز دىۋارلىق ھۇچىرىلىرى بولۇپ، شەكلى دۈگىلەك، كۆپ بۇرۇجەكلىك ياكى رەتسىز بولىدۇ، بىر ئۇچىدا بىر دانه ئۆتكۈزگۈچى نېچىلەر باಗلىمى بولىدۇ. ئىچكى قەۋىتى بىر قاتار سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك رىشانكىسىمان ھۇچىرىلىرىدىن ئىبارەت. ئىچكى ئۇرۇق پوسىتىدا بىر قەۋەت ھۇچىرى بار بولۇپ، رەڭى سارغۇچ قوڭۇر كېلىدۇ. ئۇنىڭدا ئۆتكۈزگۈچى نېچىلەرنى كۆرگىلى بولىدۇ. سرتقى تۆرەلمە سۇتى ھۇچىرىسى 1~2 قاتار بولۇپ، زەنلىپەشكەن تەركىبىدە پىكىمىت تۆتىغان بولىدۇ. ئىچكى تۆرەلمە سۇتى ھۇچىرىسى 5~6 قەۋەت بولىدۇ. ئۇرۇق پەللسى ھۇچىرىلىرى توغرىسىغا ئۇزارغان، ئىچكى تەرمەپ ھۇچىرىلىرى كۆپ بۇرۇجەكلىك، دۈگىلەرەك بولىدۇ. تۆرەلمە سۇتى ھۇچىرىلىرى ۋە ئۇرۇق پەللسى ھۇچىرىلىرىدە نۇرغۇن ياغ تامچىلىرى ۋە ئاقسىل دانچىلىرى بولىدۇ.

تالقىنى سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، گى كانت ھۇچىرىلىرى سارغۇچ قوڭۇر بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 170~270μm، كەڭلىكى 130~170μm كېلىدۇ. تۆرەلمە سۇتى ھۇچىرىلىرى كۆپ بۇرۇجەكلىك بولۇپ، تەركىبىدە نۇرغۇن ماي تامچىلىرى بولىدۇ. ئىچكى ئۇرۇق پوسىدىكى ھۇچىرىلىرى ئۇزۇن چاسا ياكى كۆپ بۇرۇجەكلىك، ھۇچىرى دىۋارى ھەر خىل قېلىنىغان بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئۇچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق. مەنپىيلىكى (جىنسى ئورگانلارنى) ئىلىلىش، قويوق خىلىتلارنى سۇرۇش، ھۆلۈك، يەلىنى ھەيدەش خۇسۇسىتىكە ئىگە. پەي-مۇسکۇللار بوشلۇپ كېتىش، بوغۇم-تۇستاخانلار ئاغرىش، سرتقى جىنسى ئەزا مۇزلاش، باھ ئاچىزلاش، سۈيدۈك ئازىيىش، يۆتەل، بەلغەم كۆپىيىش، يارتا پالىچ، ئۇنۇتقاقيق، هوشىدىن كېتىش، باش ئاغرىش، ھەيز قالىمچانلىشىلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 4~8g

【دىقەت】 كۆپ ئىستېمال قىلىنسا زەھەرلىدى. ئېھىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم.

【سافلاش】 قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

ئادراسمان

骆驼蓬草 Luo tuo peng cao

HERBA PEGANI

بۇ ئوغزىتىكەن ئائىلىسىدىكى ئوشوملۇك ئادراسمان *Peganum harmala* L. نىڭ قۇرۇقۇلغان يېر ئۇستى چۆپى بولۇپ، ياز پىسىلى چىچەكلىگەندە ئۇزۇۋېلىپ، ئاداپ، ئاپتاتا قورۇقتۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورىنىڭ ئومۇمىي ئۇزۇنلىقى 35cm ~ 15 كېلىدۇ. غولى دۈگىلەك تۈۋۈك شەكىللەك بولۇپ، كۆپ شاخلايدۇ، دىئامېتىرى 2~4mm سىرىقىسىز كېلىدۇ. سىرىقى يۈزى سارغۇچ بېشىل، سەل پارقراق بولۇپ، ئۇزۇنىغا سىزىقلەرى بولىدۇ. جىسىمى چۈرۈك، ئىسان سۇنىدۇ، سۇغان يۈزى سارغۇچ ئاڭ، مەركىزىدىكى ئۆزەك قىسىمى ئاڭ بولىدۇ. يوپۇرمىقى نۆۋەتلىشىپ ئۆسىدۇ. ساپقىسىز كېلىدۇ ياكى قىسقا ساپقى بولىدۇ. يوپۇرمىقى بۇغا مۇڭگۈزىسمان شاخلايدۇ، رەڭگى سۇس بېشىلدىن توق بېشىلغىچە بولىدۇ، بەزى كونا يوپۇرماقلىرى كۈل رەڭ ئاڭ بولۇپ، ئادەمته قورۇلۇپ قالىدۇ ياكى يۆكىشىۋالىدۇ، تۈزۈلەنەندىن كېپىن ئىككى قايتىلانغان پەيىسمان، تولۇق يېرىلغان حالاتكە (بۇغا مۇڭگۈزىسمان شاخلانىڭان) كېلىدۇ. يېرىق يابراقچىسى تانايىسمان، پارقراق، تۈۋىتسىز، قېلىن تېرىدەك بولىدۇ. كۈل بەرگى سۇس سېرىقتن سۇس قوڭۇر رەڭگىچە، ئائىلىقى 15 دانه بولىدۇ. پىشىغان مېۋسى شارىسمان، ئالاهىدە خوش پۇرماق، تەمى سەل ئاچقىق، ئۇزۇلۇق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 (1) تالقىنى سارغۇچ بېشىل، ئاچرىتىپ چىقىرىش بوشلۇقى دۈگىلەك، ئاڭ ساندىكىسى سوقىچاڭ، سېرىق بولۇپ، چوڭلىرى 500 μm غا يىتىدۇ، ھەرە كۆننىكىسمان سىزىقچىلىرى بولىدۇ. كۈل چىڭى دانىچىسى دۈگىلەك بولۇپ، ئۇج دانە بىخلىنىش توشۇكى بولىدۇ، دىئامېتىرى تەخمىنەن 40 μm كېلىدۇ. تىش ھۈچىرىلىرىنىڭ رەڭگى ئاچ سېرىق، ھەر خىل شەكىللەك بولۇپ، نۇرغۇن ھۈچىرىپ پۇست توشۇكلىرى بولىدۇ. يۇلتۇزۇسىمان توپچىلىرىنىڭ 10~4 دانە شاخچىلىرى بارلىرى نىسبەتەن چوڭ بولۇپ، تەركىبىدە دانىچىسىمان ماددىلار بولىدۇ.

(2) تالقىنىدىن 5g 0.1ئىلىپ، ئېتلى ئالكوهولدىن 5ml قوشۇپ چالغىتىپ، ئىككى سائەت تىندۇرۇپ، فىلتردىن ئوتکۈزۈپ، فىلترلىق ئېرىتمىسىدىن فىلتر قەغىزىگە بىر تامىچە تېمىتىپ، قۇرغانداندىن كېپىن ئۇلтра بىنەپىشە نۇرلۇق چىrag (365nm) ئاستىدا كۆزەتكەندە، ھاۋارەڭ يالتراق نۇر بېرىدۇ.

【تەكسۈرۈش】 ئاربلاشىسى (يىلتىزى، كونا شاخ غوللىرى) 4% دىن ئېشىپ كەتمەسلىكى (قوشۇمچە A IX) لازىم.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى درېجىدە قۇرۇق تىسىق، سەل زەھەرلىك.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئى بەلغەم خلىتىلارنى تازىلاش، ئىشىش ياندۇرۇپ، ئاغرىق تۆختىتىش، قاننى راۋانلاشتۇرۇش، ھەيزىنى تەڭشىش خۇسۇسىتىگە ئىكەن. بوغۇم، سۆگەكلىر ئاغرىش، يېقلىپ، ئۇرۇلۇپ زەھىملەنىش، ئۇزۇنغىچە باش ئاغرىش، تىترەشچان پالىچ، بەدەننىڭ يېرىسى پالەچىلىنىش، ھەيز توسوْلۇشلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3~6g

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ھاسىلدار ئاياللار ئېھتىيات قىلىپ ئىشلىتىش لازىم.

【ساقلاش】 قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

پىله غوزىسى

蚕茧 Can jian
SERICA GLUMA

بۇ پىله پەرۋانىسى ئائىلىسىدىكى ھاشارات، تۇيى پىلىسى Bomhyx mori L. نىڭ غوزىسى بولۇپ، پىله غوزىسىنى يېرىپ، پىله قۇرتى ۋە ئەخلىقتىرى تازىلاپ چىقىرۇتىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا ئۇزۇن سوقىچاق شەكىللەك ياكى ئۇتتۇرا قىسى مەل تارايغان بولۇپ، ئۇزۇنلىقى 3~4cm، دىئامېتىرى 1.5~2.0cm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى سوت رەڭ بولۇپ، رەتسىز پۇرۇم سىزىقلرى بولىدۇ ھەمدە ئۇنىڭغا چاپلىشىپ تۇرغان، تىۋاتىسمان يېپەكلەرى بولىدۇ. ئىچكى دىۋارىدا نېپىز يېپەك تورلۇق قەۋەت بولۇپ، دىۋارىنىڭ كەسمە يۈزىنى سەل ئاجراتسا نۇرغۇنلىغان روشهن غوزا قەۋەتلەرى كۆرۈنىدۇ، جىسمى يېنىك ھەم ئەۋرىشىم بولۇپ، ئاسانلىقچە تىتىلمائىدۇ. پۇرقى ئاجىز، تەمى سۇس كېلىدۇ.

【تەبىئىتى】 بىرىنچى درىجىدە قۇرۇق قۇسىقى.

【تەسلىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 نېرۇنغا مەنپەئەت قىلىپ، كۆڭۈلنى خۇشخۇي قىلىش، باھنى قۇۋۇقتىلىش، تىنچلاندۇرۇش، يۆتەل توختىش، زىققە بېسىش خۇسۇسىتىگە ئىگە. يۈرەك ئېغش، جىمىغۇرلۇق، نېرۋا ئاجىزلاشتىن ئەرمەنلىكى ئاجىزلاش، يۆتىلىپ دېمى سقىش، دىئابىت كېسىلى، تېرى كېسىلى، چاقا-جاراھەت، كۆز كېسەللىكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 5~10g

【ساقلاش】 سايىھ، سالقىن، شامال ئۇنوشۇپ تۇرىدىغان جايىدا مىتە چۈشۈرمەي ساقلىنىدۇ.

جاۋۇشىر

格蓬脂 Ge peng zhi

Galbanum

بۇ كۈنلۈكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك جاۋۇشىر Ferula galbaniflora Boissieret Buhse. نىڭ بېلىمىدىن ئىبارەت بولۇپ، ئەتىيازنىڭ ئاخىرى ۋە بش يازدا چىچەكلىپ مېۋە تۇقاندا، قىتسىغا بولۇپ غولنىڭ ئۇستۇنلىقى قىسىدىن تۆۋەنگە قارىتىپ يانتو كېسىپ، سىرغىپ چىققان سۈتسىمان بېلىمى يىغۇچىلىنىپ، سايىدا قۇرۇۋتۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا يۈمىلاق دانىچىسىمان، سوت تامچىسىدەك ياكى رەتسىز كاللهك ماددا بولۇپ، چوڭ دانىچىلىرى كۆك بۇرچاق چوڭلۇقىدا ياكى ئۇنىڭدىن سەل چوڭراق بولىدۇ. سىرتقى يۈزى سارغۇچ قوڭۇر ياكى قىزغۇچ قوڭۇر، يېرىك، جىسمى سەل يۇمشاق بولۇپ، سەل يېپىشقۇراق، سوزۇلۇشچان كېلىدۇ. سۇندۇرۇلغان يۈزى تەكشى بولمايدۇ، سارغۇچراق كېلىدۇ. سوت تامچىسىمان كەلگەنلىرى سەل-پەل يېرىم سۈزۈك بولۇپ، بەزىدە ئاچ كۆكۈش يېشىل رەڭلىك بولىدۇ. بۇرۇقى خۇشبۇيى هم ئالاھىدە، تەمى ئاچىچىق بولىدۇ. بەزىلىرىگە ئوت-چۆپ پارچىلىرى ۋە سۇس قىزغۇچ قوڭۇر مېۋىسى ئارىلاشقان بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 1g 0.1٪لىپ، ئېتل ئالكوهولدىن 5ml قوشۇپ، 5 منۇت قاتىقىچالغىتىپ، بىر سائەت تۇرۇزۇپ، فىلتردىن ئۇتكۈزۈپ، ئۇلترا بىنەپشە نۇرلۇق چىrag (365nm) تا كۆزەتكەننە، ئۇچۇق كۆكۈش بىنەپشە رەڭ يالتىراق نۇر كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 سۇ تەركىبى سۇ تەركىبىنى ئۆلچەمش ئۆسۈلىدا ئۆلچىگەننە 10٪ تىن (قوشۇم-چە: H—IX ئىككى ئۆسۈلە) ئېشىپ كەتمەسىلىكى لازىم.

【كۈلى】 ئۆمۈمىي كۈلى 7.0٪ تىن (قوشۇمچە: K IX) ئاشماسىلىقى لازىم.
【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سوغۇق يەلنى ھەيدەش، بەلغەمنى بوشىتىش، توصالىغۇ-لارنى ئېچىش، غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى ھەيدەش خۇسۇسىتىشكى ئىگە. جىڭەر ئىشىش، ئاشقازان بېسىلىش، ھۆللىۈكتىن مۇچىلەر ئاغرىش، بەدەننىڭ يېرىمى پالەچىلىنىش، يۆتەل، ئىشىشىق، ھەيز قالايمقانلى-شىش قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 1~3g

【ساقلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

قارا كۆز بەديان

莳萝子 Shi luo zi

FRUCTUS ANETHI

بۇ كۈنلۈكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سېرىقچىچەك Anethum graveolens L. نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشىق ئۇرۇقى بولۇپ، كۆزدە يىغۇيلىنىپ، ئادالاپ، سالقىندا قۇرۇقۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا جۇپ ئاسماق مېۋە بولۇپ، كۆپىنچىلىرى بۆلۈنمه مېۋىگە ئايىرىلغان، شەكلى كەڭ سوقىچاق بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 3~4mm، كەڭلىكى 2~3mm. سرتقى يۈزى قوڭۇر دەڭلىك بولۇپ، دۇمبه قىسىدا تۈچ تال غۇۋا قوۋۇرغا سىزىقى بولىدۇ، ئىككى يېنىدىكى قوۋۇرغا سىزىقى ئۇزىراپ قاناتسىمان بولىدۇ، ئاز ساندىكى بۆلۈنگەن ياكى بۆلۈنمىگەن جۇپ ئاسماق مېۋىلىرىنىڭ تۈۋىدە قالدۇق ساپىقى بولىدۇ، مېۋە ئەتراپىنىڭ گىرۇشىكىدە سارغۇچ ئاق قاناتلىرى بولىدۇ. خۇش پۇراقلق، تەمى ئاچىچقى، قېرىق بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۆلۈنمه مېۋىسىنىڭ توغرا كەسمە يۈزى: تۆت تەرىپى ئۇخشىغان ئۇزۇنلۇقتا، ئىككى تەرىپى ئالاھىدە ئۇزۇن بولۇپ، سوزۇلۇپ قاناتسىمان شەكلىگە كىرگەن بولىدۇ. سرتقى مېۋە پۇستىدا بىر قاتار ياپىلاق ھۈجمەيرىلەر بولۇپ، سىرتىنى مۇڭكۈزلەشكەن قەۋەت ئۇرالاپ تۇرىدۇ. ئۇتتۇرا مېۋە پۇستىدىكى نېپىز دېۋارلىق ھۈجمەيرىلەر ئىچىدە ماي نېيچىسىدىن ئالتسى بار بولۇپ، قوشۇلغۇچى بۈزى قىسىدىكىسى چۈگۈرەن بولىدۇ. قىرىنىڭ ئۇتتۇرا قىسىدا ئۆتكۈزگۈچى نېيچىلەر باغلىمى ئۇنىڭ ئەتراپىدا تۈرسىمان سىزىقلق ھۈجمەيرىلەر بولىدۇ. قوشۇلغۇچى يۈزى كەڭ بولۇپ، ئۇرۇق قىر ئۆتكۈزگۈچى نېيچىلەر باغلىمى بولىدۇ. ئىچىكى مېۋە پۇستى ھۈجمەيرىلەرى ياپىلاق، ئۇزۇن-قسقىقلقى ھەر خىل بولىدۇ. ئۇرۇق پۇستى ھۈجمەيرىلەرى ياپىلاق بولۇپ، قوڭۇر ماددىلاردىن تەركىب تاپىدۇ. تۆرمە سوت ھۈجمەيرىلەر رىنىڭ تەركىبىدە ياخ تامچىلىرى، ئالپرون دانىچىلىرى ۋە كالتسىي ئۇكسالات كرستاللىرى بولىدۇ.

【لايىقلاشتۇرۇش】 ئادالىنىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سوغۇق يەللەرنى تارقىتىش، خىلىتلارنى پىشۇرۇش، زەھەر قايتۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش، تىلش چۈشۈرۈش، سۈيدۈك ھەيدەش، ھەزىمگە ياردەم بېرىش، زىققىنى بېسىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. جىڭىر ئاجزىلاپ، ھۆلۈكى ئېشىش، بېقىن ئاغرىش، ھەزم ناچارلاش، يۆتىلىپ، بەلغەم كۆپىشىش، بەدەننە تاش پەيدا بولۇش، ھەمیز تۇنۇلۇپ، سۈيدۈك ئازىيىشلارغا ئىشلىلىدۇ؛ تۇغۇتنىن كېپىن تېنى ئاجزىلغان، پۇتون بەدەنى ئاغرىيدىغانلار قاينىتىپ سۈيدىدە ھوردىنىپ يۈيۈنسا، شىپا قىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 5g

【ساقلالاش】 سايىه، سالقىن، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

سەرپىستان

破布木果 Po bu mu guo

FRUCTUSCORDIAEDICHOTOMAE

بۇ دورا بوتا كۆز ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك سەرپىستان دەرىخى Cordia dichotoma Forst. f. نىڭ پىشقاڭ قۇرۇقۇلغان مېۋىسى بولۇپ، كۆز پېسىلى مېۋىسى پىشقاڭدا يېغۇپلىنىپ، ئاپتاتا قۇرۇقۇلۇدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا، كونۇسسىمان تۇخۇم شەكىللەك بولۇپ، ئادەتتە قورۇلۇپ تىك سىزىقچە ياكى تورسىمان رەتسىز قىرالارنى ھاسىل قىلىدۇ. تۇزۇنلۇقى 1.5cm ~ 1cm، ئۇتۇرۇقا قىسىنىڭ دىئامېتىرى 0.5 ~ 0.1cm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى قوڭۇر ياكى قارامتۇل قوڭۇر، تۇچى ئۇچلۇق بولۇپ، ئائىلىق بويىنىڭ چۈشۈپ كەتكەن ئۇزىنى كۆرگىلى بولىدۇ، تېگى تەكسى ياكى سەل كۆتۈرۈلگەن بولۇپ، بەزىلىرىدە ساقلىنىپ قالغان تېبىز رۇمىكسىمان گۈل كاسىسىنى ئۇچراقاتلى بولىدۇ، گۈل كاسىسىنىڭ رەنگى سارغۇچ كۈل كۆڭۈر كېلىدۇ. مېۋە پوستى نېبىز ئىچكى مېۋە پوستى سۆڭەتكەن قاتقى، توت خانىلىق، ئادەتتە 2 ~ 1 خانىلىق بولىدۇ. تولۇق يېتىلگەنلىرىنىڭ ھەر بىر خانىسا بىر دانىدىن ئۇرۇق بولىدۇ، ئۇچ دانە ئۇرۇق بولىدىغانلىرى ئاز ئۇچرايدۇ، توت تال ئۇرۇق بولىدىغانلىرى بولمايدۇ. سەل پۇراقلق ياكى پۇراقسز، تەمى چۈچۈمەل ۋە سەل تاتلىق بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورا تالقىنىڭ رەنگى قوڭۇردىن قارامتۇل قوڭۇرغۇچە بولىدۇ. تاش ھۈچىرىلىرى سۇس سېرىق، كۆپ بۇرۇجەكلىك دۈگىلەكسمان ياكى ئۇزۇن سوقىچاق بولۇپ، دىئامېتىرى 30 ~ 300μm كېلىدۇ. دىۋارى نېبىز ھەم ھۈچىرى پوست توشۇكى بولىدۇ. سرتقى پوست ھۈچىرىلىرى كۆپ بۇرۇجەكلىك ياكى دۈگىلەكسمان، دىۋارى تسوشىسىمان قىلىنلىغان، تالالىرى ئۇزۇن موکا شەكىللەك، دىئامېتىرى 30 ~ 10 μm بولىدۇ. تۆرەلمە سوت ھۈچىرىلىرى كۆپ بۇرۇجەكلىك بولۇپ، كرسىتالسىمان ماددىلار ۋە ياغ تامىچىلىرى بولىدۇ. ئۇتكۈزگۈچى نېيچىلىرىنىڭ كۆپى توشۇكلىك بولىدۇ.

(2) بۇ دورا تالقىنىدىن 1g 0.1ملىپ، 2ml ئېتىل ئالكوهول قوشۇپ، 3 سائىمت تۇرگۇزۇپ، فىلتردىن ئۇتكۈزۈپ، فىلترلىق ئېرىتمىسى مۇۋاپىق مقداردىكى ئېتىل ئالكوهولدا سۇيۇلدۇرغاندىن كېسىن، نۇر سېپىكتەر تۈسۈلدى (قوشۇمچە A 7) ئۆلچىگەندە، دولىقۇن ئۇزۇنلۇقى 286nm لق ئورۇندا ئەڭ كۆپ شۇمۇرۇلۇدۇ.

【تېبىئىتى】 مۆتىدىل.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغانلىقى】 غەيرىي تېبىئى بەلغىم خىلىتلەرنى پىشۇرۇش ۋە تازىلاش، سەپرە خىلىتى تەڭپۈكۈلۈقىنى تەڭشىم، ئۆپكىنى ياشارتىپ، يۆتەل توختىش، كۆڭلىنى ئازادە قىلىپ، بەلغىم ھېيدىمە خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. توختىماي يۆتىلىش، سەپرە كۈچىيپ كېتىش، توختىماي بەلغىم تۈكۈرۈش، گال قۇرۇپ قىچىشىلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش تۈسۈلى ۋە مىقدارى】 4 ~ 5g

【ساقلاش】 مىتە چۈشۈرمەي، سايىه، سالقىن، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

قۇندۇز قەھرى

海狸香 Hai li xiang
CASTOREUM

بۇ قۇندۇز لار ئائىلسىدىكى ھايۋان ياخۇپا، ئاسىيا قامسى Castor fiber Linnaeus ياكى كانادا قامسى Castorcanadensis Linnaeus نىڭ پۇراقلق ئۇرۇق خالتسىنىڭ ئاچرالىلىرى بولۇپ، ئۇنى تۈتۈۋالغاندىن كېيىن پۇراقلق خالتسىنى ئېلىپ تىسپىرتتا دېزىنفېكسىيەلەپ، سايىدا قۇرۇتۇلدۇ ياكى چالا قۇرغۇنچە سالقىن جايغا قويۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 ياخۇپا-ئاسىيا قۇندۇز قەھرى: يايلاق ئامۇتسىمان ياكى سەل يۈمىلاق تاياق شەكىللەك، جۈپلىشىپ چىتىلغان، ئازاراق بېسىلىپ يايلاقلانغان، پۇرلەشمىگەن ياكى ئازاراق تىك پۇرۇم سىزىقچىلىرى بار بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 12cm~6cm، كەڭلىكى 7cm~3cm كېلىدۇ. سىرتنى قىسىدىكى تېرى پەردىسى ئىنتايىن ئىسان سوپۇلۇپ كېتىدۇ، ئىچىدە ئاچرالىلار بار بولۇپ، يېڭى ۋاقتىدا قايماق رەڭلىك، ئۇماچىسىمان بولىدۇ. قويۇپ قوغاندىن كېيىن رەڭگى قېنلىشىپ، سارغۇچ قوڭۇردىن قارامتۇل قوڭۇر رەڭگە ئۇزگىرىدۇ ھەم ئاستا-ئاستا قاتىدۇ. يارغاندىن كېيىن ئىچىدىن سىرتىنى ئاق نېپىز پەردە ئۇرالا تۇرغان بۇغىدai دانلىرىدەك دانىچىلار چىقىدۇ، ئالاهىدە خۇشبۇي پۇرایدۇ، تەمى ئاچچىق، قېرىق بولىدۇ.

كانادا قۇندۇز قەھرى: يايلاق ئامۇتسىمان ياكى ئۇزۇن تۇخۇمىسىمان، جۈپ ھالەتتە چىتىلغان بولۇپ، سىرتنى بىزى قارامتۇل قوڭۇر ياكى قوڭۇردىن قىزغۇچ قوڭۇرغۇنچە بولىدۇ. پۇرۇملەرىدە بىر نەچچە تال تىك سىزىقچىلار بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 10cm~8cm، كەڭلىكى تەخىنەن 3cm كېلىدۇ. ئۇلانغان يېرىدە بىر كىچىك بېغىزى بولۇپ، ئىچىدە دېۋىر قايىسىمان ئاچرالىما بولىدۇ. يېڭى ۋاقتىدا رەڭگى ئاچ سارغۇچ قوڭۇر، ئۇماچىسىمان بولۇپ، تۇرغاندىن كېيىن تەدرىجىي قېتىپ، قوڭۇر ياكى قارامتۇل قوڭۇر رەڭگە كىرىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنىڭ تالقىنى سۇس سېرىقتنى سۇس قوڭۇر رەڭگىچە بولۇپ، چوڭ-كىچىكلىكى ھەر خىل، تەرتىپسىز، سارغۇچ قوڭۇر ياكى سۇس سېرىق دېۋىر قايىغا ئۇخشىپ كېتىدىغان مونە كېچىلەر كۆپ بولىدۇ. تۈۋۈركىسىمان كەرسىتەن ئۇزۇنلۇقى 50μm~45μm، دىئامېتىرى تەخىنەن 15μm كېلىدۇ. پولىارېزاتىسيه (نۇر ئېغىش) ھادىسىسى بولىدۇ. تۆكۈلۈپ چوشىكىن ئۇستۇنلىكى تېرى تو قوللىلىرى رەڭىسىز ياكى سۇس سېرىق بولىدۇ.

(2) بۇ دورا تالقىنىدىن 1g 0.5ml ئېلىپ، 5ml مېتىل ئالكوهول قوشۇپ، ئوبىدان ئېرىكىچە چالغىتىپ، فىلتەرىدىن ئوتتكۈزۈپ، فىلتەر لانغان ئېرىتمىسى سىنافقا ئىشلىتىلىدۇ. فىلتەر لانغان ئېرىتمىدىن 0.5ml ئېلىپ، ئۇنىڭغا 5% لىك ناتىرىي نىترىت ئېرىتمىسى ۋە 5% لىك ئالىيۇمن نىرات ئېرىتمىسى ھەر قايىسىسى دىن بىر تامىچە تېمىتىپ، تەكشى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن 5% لىك ناتىرىي ھىدروكىسد ئېرىتمىسىدىن 3~2

تامچە تېمىتىسا، ئېرىتمە دەرھال قىزىل رەڭگە كىرىدۇ.

(3) (2) مەزمۇندا كۆرسىتلەنگەن سىناقا تەبىارلانغان فىلتەرىلىق ئېرىتمىدىن ئاز مقداردا ئېلىپ ئۇنىڭغا مېتىل ئالكوهول قوشۇپ سۇيۇلدۇرۇپ، نۇر سېپتەر ئۇسۇلىدا (قوشۇمچە A V) ئۆلچىگەندە، دولقۇن ئۇزۇنلۇقى 279nm لق ئورۇندا شۇمۇرۇلۇشى ئەڭ چوڭ بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئۇچىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا ئىسىق، ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق.

【تەسلىتى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي چىرىگەن خىلىتلارنى ھەيدىمەن، بەدەننى ئىسىتىش، نېرۇنى ئوزۇقلاندۇرۇش، زەھەر قايىتۇرۇش، سۈيدۈك ھەيدىمەن، ھەيزىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئاغرقى توختىتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە. كۆكىرەك ئۇغىرىپ، يۈرەك سېلىش، ئاشقازان-مېگىنى ھۆللىك قاپلاپ كېتىش، توْقاقلىق، دېۋەڭلىك، پالىچ، مۇچىلەر تارتىشىش، باھ ئاجىزلاش، يۆتىلىپ دەم سقىش، ھەيز تۇنۇلۇپ، سۈيدۈك ئازىيىش، مۇچىلەر ئۇبىوشۇشلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مقدارى】 0.05~0.2g

【ساقلاش】 سايىھ، سالقىن، شامال ئۇتوشۇپ تۇرىدىغان، قۇرۇق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

تەرتىز

家独行菜子 Jia du xing cai zi
SEMENLEPIDIISATIVI

بۇ كېپىت گۈللۈكلىر ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك تۇدمىرى Lepidium sativum L. نىڭ پىشقان قۇرۇق ئۇرۇقى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىلى مېۋسى پىشقاندا مېۋلىك شېخى بىلەن قوشۇپ يىغۇشىپ، ئاپتالىتا قۇرۇتۇپ، مېۋسى قېقۇشىنىپ، ئەخىلتىرىدىن تازىلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا يايپلاق، تۇخۇم شەكىلىك بولۇپ، ئۇزۇنلوقى 2.5mm ~ 2mm، كەڭلىكى 1 ~ 1.5mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى قوڭۇرغۇ مايل قىزىل بولۇپ، ئىنتايىن كىچىك دانىچىسمان هۇرەكلىرى بولىدۇ. بىر ئۇچى دەقاماق بولۇپ، يەنە بىر ئۇچىدا ئىككى تال تىك ئېرىقچىسى بولىدۇ. تىيز ئېرىقچىنىڭ سىرتىنى قىسقا تۇتىچىلار ئۇرۇپ تۇرۇدۇ، ئۇرۇق كىندىكى ئۇيمان جايغا جايلاشقان. پۇرىقى تاڭىز، تەمى ئاچقىق، سەل قىرتاق بولۇپ، سوغَا سالسا بىپىشقانلىشىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 (1) ئۇرۇقى بىخ سۈرۈپ 3 ~ 2 كۈندىن كېيىن كۆزەتكەننە، ئىككى يايپراق پەللە يوبۇرمىقىنىڭ ھەر بىر پارچىسى تولۇق بولۇنگەن ياكى چوڭقۇر ئۇچىكە بولۇنگەن بولۇپ، ئوتتۇرسىدىكى يايپاچىسى چوڭ ھەم ئۇزۇن، ئىككى تەرمىتىكى يايپاچىسى قىسقا ھەم كىچىك بولىدۇ.

(2) بۇ دورا تالقىنىڭ رەڭگى سارغۇچۇ قوڭۇر ياكى سېرىق بولىدۇ. ئۇرۇق پۇستىدىكى رىشاتكىسىمان ھۈچەيرىلەر سېرىق، ياكى سارغۇچۇ قوڭۇر كېلىدۇ. توغرا كەسمە يۈزىدىن كۆزەتكەننە، چاسا ياكى چاسىراق ھۈچەيرىلەر بىر دەت تىزىلغان بولۇپ، سىرتقى دىۋارى ۋە يان دىۋارىنىڭ ئۇستۇنلىكى قىسىمى بەكەم نېپىز، يان دىۋارىنىڭ ئوتتۇرۇ ئاستىنىقى قىسىمى ۋە ئىچىكى دىۋارى قىلىنلىغان، سىرتقى يۈزى كۆپ بۇرچەكلىك ياكى ئۇزۇن كۆپ بۇرچەكلىك بولىدۇ. ئۇرۇق پۇستىنىڭ سىرتقى پوست ھۈچەيرىلەرى شىلىمشق ھۈچەيرىلەر دىن ئىبارەت بولۇپ، رەڭسىز ياكى سەل سارغۇچۇ كېلىدۇ. كەسمە يۈزىدىن قارىغاندا ئۇزۇن چاسا شەكىلىك، توغرىسىغا قاراپ ئۇزارغان، كۆپىنچىسى ئۇۋىلىپ كەتكەن بولۇپ، تەركىبىدە شىلىمشق ماددىلار بولىدۇ. سىرتقى يۈزى دۈگۈلەك كۆپ بۇرچەكلىك، ھۈچەيرە مەركىزىدىكى تالا ماددىسى تۇۋۇرۇكى دۈگۈلەك ياكى تەرتىپىز شەكىلىك بولۇپ، ئەترىپادا شىلىمشق ماددا سىزىقچىلىرىنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئىچىكى تۇرەلمە سۇت ھۈچەيرىلەرنىڭ سىرتقى يۈزى كۆپ بۇرچەكلىك، كەسمە يۈزىدىن قارىغاندا چاسا شەكىلىك بولۇپ، تەركىبىدە ئاپلۇن دانىچىلىرى ۋە ياغ تامىچىلىرى تۇتقان بولىدۇ. ئۇرۇق پەللەسى ھۈچەيرىلەرى سېرىق، پارە-پارە بولۇپ، ھەممىلا يەردە ئۇچىرادۇ. تەركىبىدە ياغ تامىچىسى تۇتىدۇ. پىگىنلىق قەۋىتى سېرىق، سارغۇچۇ قوڭۇر، ھۈچەيرىلەرى يىكلەگەن بولۇپ، چىڭىرسى ئېنىق بولمايدۇ. تاش ھۈچەيرىلەرى ئۇزۇن دۈگۈلەك بۇرچەكلىك، تۆشۈك ئېرىقچىسى (وشەن ياخاللاشقان بولىدۇ).

【تەبىئىتى】 ئۇچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق تۇسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەربىي تەبىئى بەلغىم خىلىتلارنى تازىلاش، سۈيدۈك ھېيدىمەش، باھ قۇۋۇقتىلىش، ئۆپىكىنى ياشارتىش، مەددە ئۆلۈرۈش، جاراھەتلەرنى ساقلىتىش خۇسۇسىتىگە ئىككى ئاشقازاننىڭ سوغۇقى ئېشىپ ئاغرىش، جىڭەر ئاجىزلاپ، تاماق ئازىيىش، باھ ئاجىزلىقى، يۆتىلىپ دېمى سىقسش، ھەيز راۋان بولماسلق، جاراھەت ساقايىماسلق، ئۇچەي پارازىت مەددىلەرىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 12g

【ساقلاش】 قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

غۇنچىئۈزۈم

琐琐葡萄 Suo suo pu tao
FRUCTUS VITIS SUO SUO

بۇ دورا ئۆزۈم ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئۆزۈم .Vitis viniferaL. نىڭ پىشقانى قۇرۇق مېۋسى بولۇپ، كۈز پىسىلى مېۋسى پىشقانىدا ساپىقى بىلەن كېسىۋىلىپ، سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا دۈگىلەك بولۇپ، دىئامېتىرى 7mm~2 كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى قارامتۇل قىزىل ياكى سارغۇچاراق يېشىل، ئېگىز-پىس پۇرلۇشكەن بولۇپ، ئۇچىدا بىر دانه توچىكسىمان ھۈرەكى بولىدۇ. تۈۋىنە قىزغۇچۇق قوڭۇر مېۋە ساپىقى ساقلانغان بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 2~6mm كېلىدۇ. جىسمى بىر قەدر ئۈمىشان، ئاسان ئېزلىدىغان بولۇپ، قەنت ماددىسى يوقىرى بولىدۇ. پۇرقى ئاجىز، تەمى تاتلىق، سەل چۈچۈمەل كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورا تالقىنىڭ رەڭگى قىزىل خىش رەڭلىك بولۇپ، مېۋە پوستى نېپىز دۇوارلىق ھۈجىرىلىرى تەركىبىدە كرسىتال توپى بولۇپ، دىئامېتىرى 18 μm ~8 كېلىدۇ. تالالرى موكا شەكىللەك، ھۈجىمەر كاۋىكى كىچىك، موم ماددىلىق قەۋىتى سېرىق، مېۋە ئەت ھۈجىرىلىرىدە دۈگىلەكىسىمان سارغۇچۇق قوڭۇر كاللهكىسىمان ماددىلار بولىدۇ.

(2) مەزكۇر دورىنىڭ يېرىك تالقىنىدىن 2g ئېلىپ، 5% لىك ئېتىل ئالكوهول ئېرتىمىسىدىن 10ml قوشۇپ، چالغىتىپ بىر سائىت تۇرغۇزۇلىدۇ. ئاندىن فiltىردىن ئۆتكۈزۈپ فiltىرلىق ئېرتىمىسىدىن 1ml ئېلىپ، ئۇنىڭغا تىشقاڭلىق مىس تارتات سىناق ئېرتىمىسىدىن 2ml قوشۇپ، قابىناۋاتقان سۇغا 5~3 منۇت چىلاپ قىزىدۇرغاندا، قىزغۇچۇق قوڭۇر چۆكمە ھاسىل بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 مۆتىدىل.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قان خىلتىنى تەڭشىم، بەدەننىڭ ئىسىسىقى ئېشىپ كېتىشنى تۆۋەنلىتىش، ئاشقازاننى مۆتىدىلەشتۈرۈپ، بەدەنگە مەنپەت يەتكۈزۈش خۇسۇسىيىتىگە ئىكە. قىزىپ يۆتىلىش، باش قېىپ، بەل تېلىپ ئاغرىش، ئاشقازان ئاجىزلاپ، غىزا ئازىيىش، بالىلارغا قىزىل چىقىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【تىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 15~30g

【ساقلاش】 سايى، سالقىن، شامال ئۆتكۈزۈپ تۇرۇدىغان ئۇرۇندا مىتە چۈشۈرمەي ساقلىنىدۇ.

چۆپچىن

菝葜 Ba qia

RHIZOMA SMILACIS CHINAE

بۇ دورا گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك چۆپچىن Smilax china L. نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىز غولى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىللەرىدە كولاب يىغۇپلىپ، چاچما يىلتىزلىرى ئېلىۋېتلىپ، يۇيۇپ، تازىملاپ قۇرۇتۇلىدۇ ياكى ھۆل ۋاقتىدا توغراب يالپاقلاپ قۇرۇتۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا رەتسىز، تۈۋەرەكسىمان ياكى كاللهكسىمان بولۇپ، سرتقى يۈزىنده ئۆسۈمىسىمان پۇلتىپ چىققان مىخىسىمان قالپاقلىرى بولىدۇ. ئۇزۇنلۇقى 5~30cm، دىئامېتىرى 2~4cm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى سارغۇچ قوڭۇر، ئۇيىمان-چوڭقۇر بولۇپ، قاتىققى چاچما يىلتىز قالدوقلرى بولىدۇ، بەزلىرىنىڭ ئۈچىدا غول ئىزلىرى بولىدۇ. جىسمى قاتىققى بولۇپ، توغراب يالپاقلانغانلىرى رەتسىز، چوڭ-كىچىكلىكى، قېلىن-نېپىزلىكى ھەر خىل، گىرۋەكلىرى رەتسىز بولىدۇ، كەممە يۈزى قىزغۇچ قوڭۇر ياكى سۇس قىزغۇچ قوڭۇر، تالالق بولىدۇ. پۇرېقى بولمايدۇ، تەمى سەل ئاچقىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنىڭ تالقىنى قىزغۇچ قوڭۇر رەڭلىك بولىدۇ. تاش ھوجەيرلىرى كۆپ بولۇپ، رەڭگى سارغۇچ قوڭۇر ياكى قىزغۇچ قوڭۇر، يەككە تاراقاق جايلاشقاڭ ياكى بىر نەچچىسى تۈپلىشىپ جايلاشقاڭ، شەكلى ئۇزۇن سوقىچاڭ، يۇملاقراقى، چاسراق ياكى تەرتىپسىز، تۆشۈك ئېرېقچىلەر رى ئىنچىكە زىچ، ھوجەيرە كاۋاكلىرى كىچىك، قەۋەت سىزىقلرى روشن بولىدۇ. تالالرىنىڭ كۆپى ئۇزۇلۇپ كەتكەن، دەستىلەنگەن ياكى تاراقاق، ياغاچلاشقاڭ، تۆشۈك ئېرېقچىسى روشن بولۇپ، ھوجەيرە كاۋاكلىرىدا يانتۇ شەكىللەك ھوجەيرە پوست تۆشۈكلىرى كۆرۈندۇ. كالتسىي ئۆكსالات يېڭىنىسىمان كېرسىتاللىرى كۆپىنچە دەستىلەنگەن بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 145μm~75 μm كېلىدۇ. كراخمال دانىچىلىرىنىڭ كۆپى تاق، دۈگىلەك شارسىمان ياكى چاسراق بولۇپ، دىئامېتىرى 20μm~5 μm كېلىدۇ. مۇرەككەپ دانىچىلىرى 4~2 دانىچىدىن تۆزۈلەندۇ. 7~5 دانىچىدىن تۆزۈلەنلىرى تاسادىپىي ئۆچراپ قالىدۇ. (2) بۇ دورا تالقىنىدىن 1g ئېلىپ، ئېتىل ئالكوهولدىن 5ml قوشۇپ، سۇ ۋانىسىدا ئىككى منۇت قاينىتىپ، فiltىرلىق ئېرىتىمىسىدىن 1ml ئېلىپ ئۇنىڭغا تۇز كىسلاقاتىسىدىن توت تامىچە قوشۇپ، سۇغا سېلىپ بىر منۇت قىزدۇرۇلغاندىن كېيىن، ئېرىتىمە قىزىل ياكى جۈزە رەڭگە كەرىدۇ.

【تەبىئىتى】 قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قان تازىلاش، رەتىس ئەزالار (يۈرەك، مېڭە، جىڭەر) نىڭ ئۇقتىدارنى كۈچەيتىش، باهنى قۇۋۇتلىمش، سۈبىدۇك ھېيدىمەش خۇسۇسىتىشكە ئىكە. قان خىلىتىنىڭ بۇزۇلۇشدىن بولغان باش ئاغرىقى، شەققە، باه ئاجىزلىقى، سۈبىدۇك ماڭماسلقى، تېرە جاراھەتلەرى، پالەچىلىپ مۇچىلەر مېبىپ بولۇش، ئۇستىخان-بوغۇم ئاغرىقلىرىغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 12~30g

【ساقلاش】 شامال ئۆتۈشۈپ تۈرىدىغان، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

لوبیا

菜豆 Cai dou

SEmen PHASEOLI VULGARIS

بۇ دورا پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك لوبیا Phaseolus vulgaris L. نىڭ پىشقاڭ قۇرۇق ئۇرۇقى بولۇپ، كۈز پىسىلى مېۋىسى پىشقانىدا ئۇرۇغۇچى قالسىرىقى بىلەن قوشۇپ ئۇرۇقىلىپ، ئاپتاتىپا قۇرۇتۇپ، ئۇرۇقىنى سوقۇۋىلىپ، ئەخىلەتلەرنى ئادالىۋەتكەندىن كېيىن يەنە ئاپتاتىقا سېلىپ قۇرۇتۇلدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا دۈگىلەك، ئۇزۇن دۈگىلەك ياكى بۇرەك شەكىللەك، ئىككى ئۇچى سەل قىيىاش تۈز كېلىگەندەك ياكى دىقماق، سەل يايپلاق بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 11~15mm، كەڭلىكى 10mm~8، قېلىنلىقى تەخمىنەن 6~9mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى ئاچ قىزىل ياكى ئاقوش كەلگەنلىرىدە رەتسىز قىرغۇچ سۆسۈن داغ نۇقتىلىرى ۋە سىزىقلار بولىدۇ؛ قىرغۇچ سۆسۈنلىرىدە شالاڭ ھەم ئۇشاشقان ئاچ داغ سىزىقلار بولىدۇ ياكى سىرتقى يۈزى پۇتۇنلەي ئاچ قىزىل ۋە قىرغۇچ سۆسۈن بولۇپ، داغ سىزىقچىلىرى بولمايدۇ. سىلىق، پارقراق كېلىدۇ. ئۇرۇق كىندىكى ئاچ رەڭلىك، سوقىچاڭ، سەل پۇلتىتىپ چىققان، ئۇزۇنلۇقى 2~2.5mm، كەڭلىكى 1~1.5mm بولۇپ، ئۇرۇق قورسقىنىڭ مەركىزىگە جايلاشقان، ئوتتۇرۇسى ئۇيىمانلىشىپ ئۇزۇنغا تېرىقچە شەكىللەندۈرگەن، دۇمبىسىدە بىر تال غۇۋا قىر ئۇمۇرلىقىسى بولىدۇ. جىسمى قاتىق بولۇپ، ئاسان ئېزىلمەيدۇ. ئۇرۇق پوستى تېرىگە ئوخشاش، ئۇرۇق پەللىسى ئىككى تال، سارغۇچ ئاچ رەڭلىك، قېلىن بولىدۇ. پۇرېقى ئاجزى، تەمى تەمسىزەك بولۇپ، چايىسا پۇرچاق تەمى چىقىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسلىق داۋالايدىغىنى】 بەدەننى قۇۋۇھتلەمش، سۈيدۈك ھەيدىمەش، ھەيزىنى راۋانلاشتۇرۇش، سۇت كەلتۈرۈش، مەنى كۆپەيتىش خۇسۇسىيىتىگە ئىكە. بەدەن زەپپىلىكى، سۈيدۈك ئازىيىپ ئىشىش، ھەيز قالايمقانلىشىش، سۇت تارتىلىپ چىرايى سارغىيىش، تېرىپىكلىشىش ۋە زەكەر ئاچزىلىقلرىغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 12g . بەدەن سىرتىغا مۇۋاپىق مىقداردا ئىشلىتىلىدۇ.

【ساقلاش】 قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

سېرىق ئوت

菟丝草 Tu si cao

HERAB CUSCUTAE

بۇ يۆگىمەچگۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سېرىق يۆگىمەچگۈل *Cuscuta chinensis* Lam. نىڭ قۇرۇقۇلغان يەر ئۆستى چۆپى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىللەرىنده ئورۇۋېلىپ، ئاپتالىتا قۇرۇتۇلىدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورىنىڭ غولى كۆپىنچە يۆگىشىپ ئۆسۈپ كاللهكلىشىۋالىدۇ. دەڭگى سارغۇچ قوڭۇر، ئىنچىكە بولۇپ، توملىرى 1mm غا يەتمىيدۇ. يۈپۈرمىقى رودمىنېتلىشىپ، تەڭكىسىمان حالىت شەكىللەندۈرگەن، كۆپىنچىلىرى چوشۇپ كەتكەن بولىدۇ. چىچىكى غول بوغۇمىدىن توپلىشىپ ئۆسۈپ چىقىدۇ ۋە شار شەكىللەك بولىدۇ. ئادەتتە دۈگىلەك ياكى يايلاق شار شەكىللەك سارغۇچ قوڭۇر مېۋسى بولىدۇ. پۇرېقى ئاجىز، تەمى قىرتاق كېلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئۇچىنچى دەرىجىدە ئىسىق، بىرىنچى دەرىجىننىڭ ئاخىرىدا قۇرۇق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي سەۋدا ۋە بەلغىم خىلىتلەرىنى تازىلاش خۇسۇسىيىتىگە ئىگە، بىش ئاغرىش، بىش قېيش، ئېلىشىپ قېلىش، تېرى بېرىكلىشىش، قەۋزىيەت، ئىشتىها تۇنۇلۇش، مۇچىلەر تارتىشىش، بوغۇم ئاغرىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. ياشانغانلار ئىچىپ بەرسە، غەيرىي تەبىئىي سەۋدا پەيدا بولۇشنىڭ ئالدىنى ئالدى.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 35~60g

【ساقلاش】 قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

پالهك ئۇرۇقى 菠菜子 Bo cai zi FRUCTUS SPINACIAE

بۇ لوپلا ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك پالهك Spinacia oleracea L. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشىق مېۋسى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىللىرىدە مېۋسى پىشقاندا مېۋە باشقىنى يىغىۋىلىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتقاندىن كېپىن، ئۇرۇقى قېقۇۋىلىنىپ، ئەخلمەتلەرى ئادالىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا ئۇچبۇرجهك يۇملاقاراق بولۇپ، دىئامېتىرى 2~3mm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى ئاقۇش كۈل رەڭ، سەل يېرىك بولۇپ، ئىككى ئۇچىدا ئادەتتە بىر تالدىن مۇڭگۈزىمىان تىكىنى بولىدۇ. مېۋە پوستى قاتىق بولۇپ، پارچىلغاندىن كېپىن، ئۇرۇق پوستى قېنىق قوڭۇر رەڭلىك، تۆرەلمە سوتى پاراشوكىمىان ئاق رەڭلىك كۆرۈنىدۇ. پۇراقسز، تەممى ئاجز بولىدۇ.
【پەرقەلەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ تالقىنى سۇس ئاقۇش كۈل رەڭدىن سۇس ساراغۇچ كۈل دەڭگىچە بولىدۇ. قېلىن دىۋارلىق ھۈجەيرىلىرى سېرىق رەڭلىك، سوقىچاقاراق ياكى كۆپ بۇرجهكلىك كېلىدۇ. سرتقى مېۋە پوستى ھۈجەيرىلىرى سوقىچاق بولۇپ، تەركىبىدە ئادەتتە دانىچىسىمان ماددىلار بولىدۇ، تۆرەلمە سوت ھۈجەيرىلىرى كۆپ بۇرجهكلىك، تەركىبىدە ئاقسىل دانىچىلىرى تۇقان بولىدۇ. ئۇتتۇرا مېۋە پوستى نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلىرى نىسبەتەن چوڭ بولۇپ، تەركىبىدە كالىسى ئۇكصالات كرسىتالىدەرى بولىدۇ. ئىچكى مېۋە پوستىدىكى تالالار چۈنق شەكىللەك، بەزلىرىنىڭ دىۋار تۆشۈكلىرى زىچ توپلانغان، ئۇرۇق پەللەسى ھۈجەيرىلىرى كىچىك بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي سەپرانى تازىلاش، قىزىتما ياندۇرۇش، سۈيىدۈك ھەيدەش، تەرتىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئاغرىق توختىش خۇسۇسىيىتىكە ئىگە، غەيرىي تەبىئىي سەپرا ئەدەپ كېتىش، قىزىتما يانماسلۇق، ماغدۇرسىزلىق، قەۋزىيەت، سۈيىدۈك راۋان بولماسلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 4~6g

【ساقلالاش】 شامال ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان، قۇرۇق جايىدا سافلىنىدۇ.

WS₃-BW-0093-98

تەرخەمەك ئۇرۇقى

黃瓜子 Huang gua zi
SEMEN CUCUMERIS

بۇ قاپاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك تەرخەمەك Cucumis sativus L. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشىشىق ئۇرۇقى بولۇپ، كۈزدە مېۋسى پىشاندا تەرخەمەكىنى ئۆزۈۋېلىپ، ئۇرۇقىنى ئېلىپ، پاكىزە يۈيۈپ، ئاپتاتا قۇرۇتۇلدى.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا يايپلاق موڭا شەكىللەك ياكى تار ئۆزۈن تۇخۇمسىمان بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 8~12mm، كەڭلىكى 3~5mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى سارغۇچ ئاق، سىلىق، سەل پارقراق كېلىدۇ. ئۇچى نسبىتەن تار، تەكشى كېسلىگەندەك بولۇپ، ئوتتۇرسىدا ئۇچلۇق پۇلتايىمىسى، تۆھەن تەرىپى ئۇچلۇق كېلىدۇ، ئاق رەڭلىك ئۇرۇق كىندىكى بولىدۇ. ئۇرۇق پۇستى تېرىدەك بولۇپ، يۇقىرى تەرىپىنى يارغاندا، ئاق رەڭلىك پەردىسمان تۆرەلمە سۇتى، ئىككى تال ئۇرۇق يەللىسى كۆرۈنىدۇ، پۇردىقى ئاحىز، تەمى تىتىقىز، سەل تاتلىق كېلىدۇ.

«پەرقلەندۈرۈش» (1) بۇ دورا تالقىنى ئاق رەڭلىك، تاش ھۈچىرىلىرى نۇزۇن دۈگلەك ياكى دۈگلەك كەركەك، بەزىلىرىنىڭ گىرۋەتكىلىرى دولقۇنسىمان، ئادەتتە ھۈچىرى پوست توشۇكى بار بولىدۇ. نۇرۇق پەللىسى ھۈچىرىلىرىدە ئاپىرون دانىچىلىرى ۋە ياغ تامىچىلىرى بولىدۇ. تۆرەلمە سوت ھۈچىرىلىرىدىمۇ ئاپىرون دانىچىلىرى ۋە ياغ تامىچىلىرى بولىدۇ. نۇتكۈزگۈچى نەيچىلىرى پۇرمىسىمان كېلىدۇ.

(2) مهکور دورا تالقندین 2g 0.07لیپ، میتل ٹالکوهولین 2ml قوشوپ، 3~2 ساعت توغرۇزۇپ، توختىماي چالغىتىپ، فiltىردىن ئوتتۇرۇپ، فiltىرلىق ئېرىتمىسى سىناق ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن كېيىن سېلىشتۈرمە ئېرىتمە ئۈچۈن β -ستوسىپرول لىپ، ئۇنىڭغا مېتل ٹالکوهول قوشوپ، ھەر 1mg دا توغان ئېرىتمە تېيارلاپ، سېلىشتۈرۈش ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. نېيىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۆسۈلدى (قوشۇمچە B VI)، يۇقىرىدىكى ئىككى خىل ئېرىتمىنىڭ ھەرقايىسىدىن 1ml 10 لىپ، ناتىرى كاربوكسېتيل سېلىلۇلۇزا بېپىشىتۇرغۇچ قىلىنغان كىرىمنىي بىلەمى G يالىتىلغان نېيىز قەۋەتلىك تاخىتا ئۇستىگە ئايىرم-ئايىرم تېمىتىلىدۇ. ئاندىن پېترولېتوم ئېتىر بىلەن مېتل ٹالکوهول (1:5) بېپىلدۈرگۈچى قىلىنىپ بېپىلدۈرۇپ، قۇرۇقتۇپ، 10% لىك ئېتىر سۇلغات ئېرىتمىسىنى پۇركۈپ، C 105 تا بىر نەھچە منۇت قىزدۇرۇلدى. سىنالغۇچى ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۇرغۇچى ئېرىتمىنىڭ ئۆزىگە مۇناسىپ رەڭ سېپىكتەر ئۇرىنىدا ئۇخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

«تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» سەپرا ماددىسى كۆپىيىشى تۇۋەنلىقىش، يۈتەل توختىتىش، ئاغرىق توختىتىش، تەرەت راۋانلاشتۇرۇش، سۈيدۈك ھېدەمەش خۇسۇسىتىگە ئىنگە. قىزىتىما يانماسلق، كىچىك تەرەت كۆيۈرۈپ كېلىش، سۈيدۈك تىمىپ كېلىش، ئاپتىپ تۇتۇپ تۈسلىش، ھەيز قالايمقاڭلىشىلا،غا ئىشلىتىلدى.

ئىشلىتىش ئۆسۈلى، وە مىقدارى [5~15g]

شمال نۆتاشۇپ تۈرىدىغان، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

يَاۋا پِياز

野葱 Ye cong

BULBUS ALLII PRATTILIS

بۇ گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك يَاۋا پِياز Allium prattil C. H. Wright. نىڭ قۇرۇتۇلۇ - خان تەڭگىسمان غولى بولۇپ، ياز، كۈز پەسىلىرىدە كولۇپلىپ، لاي-قۇم ۋە قالدۇق يوپۇرماقلىرىنى ئادالىۋىتىپ، ئاپتاتا قۇرۇتۇلۇدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا، دۈگىلەك تۇۋۇرۇكسىمان ياكى تار تۇخۇمىسىمان سېلىندرى شەكىللەك بولۇپ، دىئامېتىرى 0.5~1.5cm، ئۇزۇنلىقى 5~10cm كېلىدۇ. تەڭگىسمان غولىنىڭ سرتقى پوستى كونىلىرىنىڭ قىزغۇچۇ قوڭۇر ياكى قوڭۇر دەڭلىك، تالاسىمان ياكى غۇۋا تورسىمان بولىدۇ. جىسمى نېپىز پەرسىمان بولۇپ، ئادەتتە ئۇزۇنىسىغا بېرىق بولىدۇ. سىرتىنى قورۇلغان تالاسىمان يوپۇرماق غلاپى ئۇرۇپ تۇرىدۇ، چاچما يىلتىز قالدۇقلرى بولىدۇ. پۇرىقى ئاجىز، ئەمى سەل قېرىق بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئۇچىنچى دەرىجىدە ئىسىق، ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق. 【تەسلىرى ۋە ئاساسىي داؤالايدىغىنى】 بەدەننى تازىلاش، سوغۇق يەلنى ھەيدەش، يېپىشقاق قويۇق خىلىتلارنى يوقىتىش، چىراي ۋە تېرىنى پارقىرىتىش خۇسۇسىيەتلىرىكە ئىگە. سوغۇقتىن باش ئاغرىش، زۇكام، يۆتەل، چىراي خۇنۇكلىشىش، ھەزم ناچارلاش، بەلغەم كۆپىيىپ دەم سقىشلارغا ئىشلىتىلۇدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 4~6g
【ساقلاش】 سايە، سالقىن، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0095—98

ئىتىياڭقى ئۇرۇقى

曼陀罗子 Man tuo luo zi
SEMEN DATURAE

بۇ پىدىگەن ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك ئىتىياڭقى Datura stramonium L. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشىق ئۇرۇقى بولۇپ، كۈز پەسىلىدە مېۋسى پىشقاڭدا مېۋلىگەن شېخى بىلەن كېسىۋېلىپ، ئاپتايى قۇرۇتۇپ، ئۇرۇقى قېقۇپلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيەتى】 بۇ دورا بىرەك شەكىللەك، سەھل يايپلاق بولۇپ، ئۇزۇنلىق 3~4mm، كەڭلىكى 2.5~3.2mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى قارا ياكى قارامتۇل قوڭۇر بولۇپ، پۇلتىيپ چىققان تورسىمان سىزىچىلىرى كىچىك ۋىيمان نۇقتىسىنى قاپلىغان بولىدۇ. ئۇرۇق كىندىكى بىر بىنغا جايلاشقاڭ ۋە تەكشى بولىدۇ. پۇرىقى ئاجىز، تەمى ئاچچىق، قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ توغرا كەسمە يۈزى: سىرتقى ئۇرۇق پوستى چاسىراق بولۇپ، ئادەتتە تېڭى بىلەن يان تەرىپى قېلىن كېلىدۇ. ئىچكى قەۋىتىدە كېسىك سىزىقنى بويلاپ ئۇزازغان بىر نەچچە قاتار قوڭۇر دەڭلىك نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلەر بولىدۇ. سىرتقى تۆرەلمە سۈت ھۈجەيرىلەرى يايپلاق تىك تۆت بۇلۇڭ شەكىللەدە، كېسىك بويلاپ ئۇزارغان، ئۇرۇق پوستىنىڭ ئىچكى قەۋىتى بىلەن سىرتقى تۆرەلمە سۈتى ئارىسىدا كېرەكسىز قەۋىت بولىدۇ. ئىچكى تۆرەلمە ھۈجەيرىلەرى كۆپ بۇرۇچەكلىك، چوڭراق بولۇپ، تەركىبىدە ياغ تامچىلىرى ۋە ئاقسىز دانىچىلىرى بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 تۆتنىچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق، زەھەرلىك.

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 تىنچلاندۇرۇش، ئاغرىق توختىش، نېرۋىغا ئارام بېرىش، يۆتەل توختىش، زىققىنى بېسىش خۇسۇسىيەتلەرىگە ئىگە. بوغۇم ئاغرىقلەرى، ئاشقازان، قورساق ئاغرىش، يۆتىلىش دەم سقىشلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 0.05~0.1g

【ساقلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

ئىتىياڭقى يوپۇرەقى

曼陀罗叶 Man tuo luo ye
FOLIUM STRAMONII

بۇ پىدىگەن ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئىتىياڭقى Datura stramonium L. نىڭ قۇرۇقۇلغان يوپۇرەقى بولۇپ، ياز پەسىلىدە ئۆزۈۋېلىپ، ئاپتاتا قۇرۇقۇلۇدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا تۇخۇم شەكىللەك بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 5~20cm، كەڭلىكى 3~12cm كېلىدۇ. يوپۇرماق سېپى قارامتۇل قوڭۇر بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 5cm~1 كېلىدۇ. يوپۇرماق گىرۋىكى رەتسىز، چىشى كەم ھەرە چىشلىق، ئۆستۈنکى يۈزى قارامتۇل بېشىل بولىدۇ. تۇتى بولمايدۇ، ئاستىنىقى يۈزى سارغۇچ يېشىل، پارقراتق بولۇپ، يوپۇرماق تومۇرى بار جايىلارنى شالاڭ تۇتىچىلار ئوراپ تۇرىدۇ، جىسمى چۈرۈك بولۇپ، ئاسان ئۆۋېلىپ كېتىدۇ. پۇرىقى ئاھىدە، تەمى قىرتاق كېلىدۇ.

【پەرقەندەرۇش】 توغرا كەسمە يۈزى: سىرتقى پوست ھۈجەيرىلىرى بىر قاتار بولۇپ، سىرتىنى مۇڭگۈزلمەشكەن قەۋەت ئوراپ تۇرىدۇ، هاۋا توشۇكچىلىرى، بەز تۈكچىلىرى ۋە بەزسىز تۈكچىلىرى بولىدۇ. رىشاتكىسىمان ھۈجەيرىلىرى بىر قاتار بولۇپ، تەركىبىدە خلوروفيل بولىدۇ. بۇ لۇتسىمان توقۇلما ھۈجەيرىلىرى رەتسىز، رىشاتكىسىمان ھۈجەيرىلىرى قۇۋىتىگە يېقىن جايىدا كالتسىي ئۆكسالات كىرسىتال توبىلىرى تۇتقان بولىدۇ. نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلىرىدە توب كىرسىتاللاردىن باشقا چالسا كىرسىتاللار ۋە قۇمىسىمان كىرسىتاللار بولىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى نېچىلىرى دەستىسى ئەتراپى ئەۋرىشىم بولۇپ، سىرتقى پوست ھۈجەيرىلىرىكە يېقىن جايىنىڭ يۇقىرى-تۆۋىننىدە قىلىن بۇرۇچەكلىك توقۇلما لىلار بولىدۇ.

مەزكۇر دورا تالقىنىنىڭ رەڭگى سارغۇچ يېشىل بولۇپ، بەزسىز تۈكچىلىر 4~2 دانە ھۈجەيرىدىن؛ بەز تۈكچىلىر 2~1 دانە ھۈجەيرە سېپىدىن ۋە 8~1 دانە ھۈجەيرە بېشىدىن تۆزۈلەتلىدۇ. نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلىرىدە توب كىرسىتاللار، چالسا كىرسىتاللار ۋە قۇمىسىمان كىرسىتاللار بولىدۇ. هاۋا توشۇكچىسى سوقىچاڭ بولۇپ، 4~3 دانە قوشۇمچە قوغدىغۇچى ھۈجەيرىلىرىدىن تەركىب تاپىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى نېچىلىرى بۇرۇمىسىمان، ھالقىسىمان بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 تۆتىچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق، زەھەرلىك.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئاغىرقى توخىتىش، تىنچلاندۇرۇش، يۆتەل توخىتىش، زىقىنى بېسىش خۇسۇسىيەتلەرىكە ئىگە. بوجۇم ئاغىرقىلىرى، بەل-پۇتلار تېلىپ ئاغىرش، يۆتەل، پىكىرى چىچىلىپ، بىئارام بولۇشاڭارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 0.05~0.1g

【ساقلاش】 شامال ئۇنوشىپ تۇرىدىغان، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0097-98

قۇشقاچ ھېڭىسى
麻雀脑 Ma que nao
ENCEPHALON PASSERIS

بۇ لانخور قوشقىچى ئائىلسىدىكى ھاۋان قوشقاچ *Passer montanus* Linnaeus نىڭ قۇرۇتۇلغان بېشى (مېڭسى) بولۇپ، 3، 4-ئايىلاردا توتۇپ تەبىيارلىنىپ سايىدا قۇرۇتۇلدۇ.

«شەكلى وە خۇسۇسىتى» بۇ دورىنىڭ چوققىسىدىن قارىغاندا يۈملاقراق كونۇسىسىمان ياكى رومبا شەكلىگە يېقىنراق كېلىدۇ. تېكىدىن قارىغاندا سەل رومبا شەكلىلىك، ياندىن قارىغاندا سەل بېرىم دۇكىلەك شار شەكلىلىك كۆرۈنىدۇ. تۈزۈنلۈقى 2cm ~ 5cm ، كەڭلىكى 1.5cm ~ 1.4cm كېلىدۇ. ماڭلىيى-چوققىسى دۇكىلەك، ئاقۇش كۈل رەڭ، سىلق بولۇپ، بۇرۇن سۆڭىكى ئوتتۇرسىدىن تېبىز باشلىنىپ، ماڭلاي سۆڭىكىنىڭ ئوتتۇرسىخىچە بولغان جايىدا بىر دانه ئولتۇرۇشۇپ كەتكەن ئوقۇر بولۇپ، تۈزۈنلۈقى 1cm ~ 1.5cm ، كۆز چانقىنىڭ ئارىلىقى تەخمنىن 0.5cm كېلىدۇ. كۆز چانقى دۇكىلەك بولۇپ، دىئامېتىرى تەخمنىن 0.9cm كېلىدۇ. گەنجى سۆڭىكىنىڭ كەينى تەرىپىدە گەنجى سۆڭەك چوڭ توشۇكى ياكى ساقلىنىپ قالغان $2\sim 1$ بوغۇم بويۇن ئومۇرتقىسىنى كۆرگىلى بولىدۇ. بەزلىرىدە ئۆستۈنلىكى جاغ سۆڭىكى ساقلانغان بولىدۇ. ماڭلاي سۆڭىكى نېپىز ھەم چۈرۈڭ بولۇپ ئاسان ئاجرايدۇ، ئاچرىتىلسا ئىچىدىن قۇڭۇر دەڭلىك نېپىز پلاستىنكسىمىان مېڭ كۆرۈنىدۇ. پۇرېقى سەل سېسىق، تەمى تۈزۈلۈق كېلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ۋىسىق.

«تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» بەدەنلىق قىزىتىش، مەنلىك كۆپەيتىش، باھنى قوزغانلىش، بۇرەكىنى قۇۋۇچىلەتمەش، سەھرىتىش، ئىچ توختىتىش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش خۇسۇسىيەتلەرنىڭە ئىگە. ئۇستىرخا، بەدەن مۇزلاش، بەل، تىزلار سىرقاراپ ئۇغۇش، مۇچىلەر پالەچىلىنىش، تۇغماسلق، ئۇييقۇ قېچىش، تولا چۈش كۆرۈش، مەنلىك ئازلۇق، ئېھتىلام بولۇش، جىڭەر كېسىلى، سېرىقلق چوشۇش، گالىلىق، ئۇرۇقلالاش فاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى 【 3~5g
【 ساقلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرغاق جايدا ساقلىنىدۇ.

كېۋەز چىچىكى 棉花花 Mian hua hua FLOS GOSSYPII

بۇ لەيلىكىل ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك ئەرەب كېۋىزى Gossypium herbaceum L. ۋە ئامېرىكا كېۋىزى Gossypium hirsutum L. نىڭ قۇروقۇلغان چىچىكى بولۇپ، كۆز پەسىلى چىچىكى ئىچىلىپ تېخى توڭۇلمىشكەندە يىغىۋىلىپ، سايىدا قۇروقۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا كانايىسمان، كۆپىنچە پىۋارلەشكەن بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 2.5~4.5cm كېلىدۇ. گۆل بەرگى بەش يايپاقچە، سېرىق رەڭلىك، ئىچكى يۈزىنىڭ تۇۋى سۆسۈن رەڭلىك، ئۇزۇنلۇقى ئورىغۇچى بويۇرمىقىنىڭ ئىككى ھەسىسىگە باراۋەر كېلىدۇ. كىچىك ئورىغۇچى يوپۇرمىقى ئۇچ تال، بۆلۈنگەن، تۇۋى يۈرەك شەكىللەك، گۆل كاسىسى رۇمكىسىمان، بەش يېرىقچىغا بۆلۈنگەن بولىدۇ. ئائىلىقى كۆپ بولۇپ، ئائىلىق يىپلىرى بىرلىشىپ، كانايىسمان شەكىلىنى ھاسىل قىلىدۇ. جىسمى چۈرۈك كېلىدۇ، پۇرقى ئازراق خۇشبۇيى، تەمى سەل قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنىڭ تالقىنىدىن 2g ئېلىپ، ئۇنىڭغا مېتىل ئالكوهولدىن 10ml قوشۇپ، سۇ ۋانىسىنىڭ ئايلانىما ئىقىملىق سوۋوقۇقۇچىسىدا يېرىم سائەت تۇرغۇزۇپ، فىلتردىن ئۆتكۈزۈپ، فىلترلىق ئېرىتمىسىنى سۇ ۋانىسىدا 6ml قالغىچە قويۇلدۇرۇپ، ئۇنىڭدىن بىر تامىچە ئېلىپ فىلتر قەغىزىگە تېمىتىپ، ئۇلترا بىنەپشە نۇرلۇق چىrag (365nm) تا كۆزەتكەندە، جۈزە رەڭ سېرىق يالتراتق نۇر كۆرۈندىدۇ.

(2) يۇقىرىدىكى قويۇلدۇرۇلغان ئېرىتمىدىن 2ml ئېلىپ، ماگنىي پاراشوكىدىن ئازراق، تۇز كىسلاراتا سىدىن 5~4 تامىچە قوشۇپ قىزدۇرۇسا، قىزىل رەڭگە كىرىدۇ.

【تەبىئىتى】 ھۆل ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يۈرەككە مەنپەئەت قىلىپ، مېڭىنى قۇۋەتلىكىندۈرۈش، نېرۇنى ئۇزۇقلاندۇرۇش، تىنچلاندۇرۇش، ئىشىق ياندۇرۇپ، ياللۇغ قايتۇرۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىگە. مېڭە ئاجىزلاپ، نېرۇقى چارچاش، يۈرەكى سېلىپ، ئىچى تىتىلداش، بەدمىن ئىشىش ياللۇغلىنىش، تېرىق قىچىشىش، كۆپۈك يارسى ئاغرىش قاتار لىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 15g

【ساقلاش】 سايى، سالقىن، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

قەنبل

楸莢粉 Qiu jia fen

KAMALA

بۇ دورا سۈتلۈك ئوتلار ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك قەنبل *Mallotus philippinensis* M. Ar نىڭ مېۋسى يۈزىگە يىغىلغان تۈكىسمان تۈشت بولۇپ، مېۋسى پىشقاڭدا يىغۇپلىپ، سېۋەتكە سېلىپ، تاسقاپ چالغىتىپ، تۈشتىچىلىرىنى ئايىرۇپلىپ، مېۋسىنى ئىلغۇشىتىپ قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا يۇمىشاق دانىچىسىمان، لەيلگۈچى تالقان بولۇپ، رەڭگى قىزغۇچ قوڭۇر كېلىدۇ. يېنىك چالغىتىپ تاسقالسا، كۈل رەڭ قىسى (تۈشتىچىلىرى) ئۇستىگە يىغىلىپ، قىزىل رەڭلىك تالقىنى ئاستىغا چۆكىدۇ، پۇراقساز، تەمسىز بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) مەزكۇر دورىدىن ئازاراق ئېلىپ سۇغا سالسا، ئۇ سۇ ئۇستىگە لەيمەپ، سۇ ئازاراق قىزىل رەڭگە ئۆزگىرىدۇ.

(2) مەزكۇر دورا تالقىنى قىزغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، بەز تۈكىچىلىرى شار شەكىللەك، دىئامېتىرى 40~100 μm بولۇپ، ئۇ نۇرغۇن قىسقا تاياقسىمان ھۈجەيرىلەردىن تۈزۈلىدۇ ۋە چاچما نۇرسىمان تېزىلغان بولۇپ، ھۈجەيرە ئەتراپى ۋە ئارىلىقلىرىدا قىزىل رەڭلىك ئاجراتما ماددىلار بولىدۇ. بەزىزىز تۈكىلىرى يۇلتۇزسىمان، دىۋارى قېلىن، رەڭسز، ئۇزۇنلۇقى 150 μm ~50 كېلىدۇ.

(3) مەزكۇر دورىدىن ئازاراق ئېلىپ، ئېتىل ئالكوهول، ئېفر، خلوروفورم ۋە كالىي ھىdroكىسد ئېرتىمىلىرىدىن ئايىرم-ئايىرم مۇۋاپىق مىقداردا قوشقاڭدا قۇرۇتسىمە توق قىزىل رەڭگە كىرىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 ئومۇمىي كۈلى 6.0% دىن (قوشۇمچە K) ئېشىپ كەتمەسلىكى لازىم.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتلىرىنى تازىلاش، ئىچ ئۆتكۈزۈپ، تەرمەتى راۋانلاشتۇرۇش، مەددە ئۆلتۈرۈپ، جاراھەتلەرنى قورۇش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىنگە. بەمدەندىكى غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتلىرىنىڭ يىغىلىپ قېلىشى، قەۋزىيەت، ئۈچەيى مەددە قۇرتىلىرى قاتارلىقلارغا ئىشلىتلىدۇ، سىرتىدىن ئىشلەتسە، ئېغىزى پۇتىمگەن جاراھەتلەرنى ساقلىتىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 2~7g

【دېققەت】 مەزكۇر دورىنى ئۇزۇن مۇددەت ئىچسە، ئۇچەينى زەخىملەندۈرۈدۇ، ئاشقازان كېسىلى بارلار ئېھىيات بىلەن ئىشلىتىش لازىم.

【ساقلاش】 ئىدىشقا قاچىلىنىپ، سايىھە، سالقىن، قۇرۇق ئۇرۇندا ساقلىنىنىۋە.

قارا قىچا

黑芥子 Hei jie zi

SEmen BRASSICAE NIGRAE

بۇ دورا كېرىست گۈللۈكلىر ئائىسىدىكى ئۆسۈملۈك قارا قىچا Brassica nigra(L.) Koch. نىڭ پىشقانى قۇرۇق ئۇرۇقى بولۇپ، كەچ ياز، باش كۈز مېۋسى پىشقانىدا ئۇرۇقىلىپ، ئاپتايپا قۇرۇتۇلۇپ، ئۇرۇقى قېقىۋىلىنىپ، ئەخلىتلرى ئادالىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورىنىڭ شەكلى شارسىمان بولۇپ، دىئامېتىرى 5mm ~ 1.5mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى قارامتۇل قوڭۇر، قىزغۇچ قوڭۇر ياكى ئاچ قوڭۇر رەڭلىك بولۇپ، چوڭايىتىقۇچى ئىينىھەكتە يېرىك توسمان ئويمانجۇقلارنى ھەمde ئۇنىڭغا ئاڭ پەردىسىمان ماددىلارنىڭ يېپىشىپ تۇرغانلىقىـنى كۆرگىلى بولىدۇ. سۇغا چىلاپ ئۇرۇق پۇستى ئېلىۋېتلىسە، سېرىق رەڭلىك تۆرەلمە سۇتنى كۆرگىلى بولىدۇ. ئىچىدە سارغۇچ يېشىل رەڭلىك ئۇرۇق پەللىسىدىن ئىككىسى بولىدۇ. پۇرمىايدۇ. تەمى ئاچچىق، قېرىق بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 توغرا كەسمە يۈزى: سىرتقى پۇست ھۈجەيرىلىرى ئۇزۇن چاسا شەكىلىك بولۇپ، ئىچىدە يېپىشاق ماددىلار بولىدۇ، زور ھۈجەيرىلىرى يېرىم ئايسمان بولىدۇ. رىشاتكىسىمان ھۈجەيرىلىرىنىڭ ئۇزۇن-قسقىلىقى ھەر خىل، يان دىوارى ۋە ئىچىكى دىوارى قېلىنلىغان، رەڭگى سارغۇچ قوڭۇر كېلىدۇ. زەنپىلەشكەن قەۋىتى كۆپ قاتار نېپىز دىوارلىق ئۇششاق يارچىلىنىپ كەتكەن ھۈجەيرىلىر-دىن تۈزۈلدى. پىگەپت ھۈجەيرىلىرى ئىككى قاتار، ئۇزۇن چاسا شەكىلىك بولۇپ، تەركىبىدە قارا پىگەپتلىار بولىدۇ. سىرتقى تۆرەلمە سۇت ھۈجەيرىلىرى بىر قاتار بولۇپ، ئاقسىل دانىچىلىرىدىن تەركىب تاپقان، ئىچىكى تۆرەلمە سۇتى زەنپىلەشكەن ھالەتتە بولىدۇ. ئىچىدە ئۇرۇق پەللە ھۈجەيرىلىرى بولۇپ، تەركىبىدە ماي تامىچىلىرى ۋە ئاقسىل دانىچىلىرى بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 تۆتىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىسى داۋالايدىغىنى】 ھۆل سوغۇق خىلىتارنى تازىلاش، مېڭە ۋە ئاشقازانىدىكى ھۆللىكىنى قۇرۇتۇش، ھەزىمنى ياخشىلاش، توصالغۇلارنى ئېچىش خۇسۇسىيەتلىرىگە ئىكە. ھۆل سوغۇقتىن بولغان زۇكام، باش ئاغرىپ چىكىلىش، بەدەندىكى ھەر خىل چاقا-جاراھەت، غەلۋىرەك، ئىشىتەي تۈتۈلۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 3~5g

【ساقلاش】 سايىھ، سالقىن، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

قارا چۈمۈلە

黑蚂蚁 Hei ma yi

FORMICA FUSCA

بۇ چۈمۈلە ئائىلىسىدىكى ھاشارات قارا تىكەنسىمان چۈمۈلە Formica fusca Linnaus. قۇرۇتۇلغان تېنى بولۇپ، ياز ۋە كۆز پەسلىرىدە تۇتۇپ، قابىناق سۇغا بېسىپ ئۆلتۈرۈپ سۈزۈقىلىپ، سالقىندا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا ئۇزۇنچاڭ، كۆپ بوغۇملۇق بولۇپ، بۇتلۇنلىرىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 10~15mm كېلىدۇ، پۇتۇن تېنى قارا، سەل پارقىراق بولۇپ، باش، كۆكىرەك، قورساق ئۈچ قىسىمىدىن ئۇزۇلدى. بېشى يۈملاق ئۇچبۇرۇجەكسىمان بولۇپ، بىر جۇپ سەزگۇ مۇكۇزچىسى ۋە مۇرەككىپ كۆزى بولىدۇ، كۆكىرەك قىسىمدا ئۈچ جۇپ ئايىقى بار، ئۇنىڭ قورساق قىسىمى بىلەن تۇشاشقان يېرى ئىنچىكە، قورساق قىسىمى نىسبەتەن چوڭ بولۇپ، بېش دانە بوغۇمى بولىدۇ. پۇرېقى ئالاھىدە، تەمى چۈچۈمىل كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ تالقىنى قارامتۇل قوڭۇر بولۇپ، تەن دىۋار پارچىلىرى كۆپ ئۇچرايدۇ. رەڭگى قارامتۇل جىڭىر رەڭدىن قارامتۇل قوڭۇرغىچە بولىدۇ. ھۈجەيرىلىرى چاسراق ياكى تىك توت بۇلۇڭ شەكىلىنىڭ كېلىدۇ، ئۇزۇن كونۇسسىمان يېرىك تۈكچىلىرى بولىدۇ. سەزگۇ مۇكۇزچىسى پارچىلىرى بېغىر دەڭلىك كېلىدۇ. بەزىدە بوغۇملارنى كۆرگىلى بولىدۇ، شالاڭ تىكەنسىمان تۈكچىلىرى بولىدۇ. ئىلاغ بوغۇملۇرىنىڭ پارچىلىرىدا نۇرغۇن تىكەنسىمان تۈكچىلەر بولىدۇ.

【لايىقلاشتۇرۇش】 ئۇتقا قافلاپ قۇرۇتۇلغاندىن كېپىن تالقانلىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سوغۇق يەللەرنى ھەيدەش، سۇلۇق ئىشىشىقنى ياندۇرۇش، يۈرەك، مېڭىنى قۇۋۇقتىلەش، باھنى كۈچەيتىش خۇسۇسىيەتلەرىگە ئىگە. بوغۇم-ئۇستىخان ئاغرىقىلىرى، بەل-تىزلار ماغدۇرسىزلىنىش، مۇچىلەر ئۇيۇشۇپ تىترىش، بەدمەن ئاجىزلاپ كېتىش، باھ ئاجىزلىقى، گاسلىق، قۇلاق غۇڭۇلداش، بەرمىس قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3~6g

【ساقلالاش】 قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

ئۇچقۇن پاقا

湖蛙 Hu wa

RANA RIDIBUNDA

بۇ پاقلار ئائىلسىدىكى ھايۋان ئۇچقۇن پاقا Ranaridibunda Pollas. نىڭ قۇرۇتۇلغان پۇتون تېنى بولۇپ، نەسىللىنىش مەزگىلىدە تۇتۇۋېلىپ، يىپقا باغلاب ئاپتالىتا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 پۇتون بەدىنى قۇرۇپ قورۇلۇپ قالغان بولۇپ، ئۆمۈمىي ئۇزۇنلىقى (نۇمۇقىدىن ئارقا بۇت بارمۇقىغىچە) 15cm~10cm، تەن ئۇزۇنلىقى (تۇمۇقىدىن قۇبىرقىغىچە) 3cm~5cm كېلىدۇ. باش قىسىمى ئات تاقسىغا ئوخشاپراق كېتىدىغان بولۇپ، ئۇزۇنلىقى بىلەن كەڭلىكى ئاساسەن تەڭ كېلىدۇ. كۆكىرىكىدىن قورسىقىغا قاراپ تارىيىپ بارىدۇ، ئىككى يىنىدا ئۇزۇنىسىغا كەتكەن قىرى بولىدۇ. ئۆمۈر تېقىلىرى ۋە قوۋۇرغىلىرى ئېنىق كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. پۇتون تېنىنىڭ دۈبىه قىسىمى قارامتۇل قوڭۇر، باش قىسىنىڭ قورساق تەرىپى سۇس كۈل دەڭدىن توق كۈل رەڭگىچە، كۆكىرەك، قورساق، پۇتلېرىنىڭ قورساق يۈزى ۋە ئالدى پۇتنىڭ قولتۇق قىسىمى قىزغۇچ بېغىر دەڭدىن توق بېغىر رەڭگىچە بولىدۇ. تەمى قېرىق بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئۇچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئىسىق يەللەرنى تارقىتىش، زەھەر قايتۇرۇپ، ئاغرىق توختىش، قان توختىتىپ، جاراھەتلەرنى قورۇش خۇسۇسىيەتلەرىگە ئىگە. گال ئاغرىقىلىرى، ئېغىز يارىسى، چىش ئاغرىقى، قۇرت چېقىپ جاراھەتلەندۈرۈش، يىقىلىپ زەھىملىنىش، ھەيز توختىماسلق، بۇۋاسىر ۋە كۆز ئاغرىقىلىرىغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 1~3g

【سافلاش】 شامال ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان، قۇرۇق جايىدا قۇرتلىتىپ قويىماي ساقلىنىدۇ.

ئازغان مونىچقى

疏花蔷薇果 Shu hua Qiang wei guo
FRUCTUS ROSAE LAXAE

بۇ ئەتىرگۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك شالاڭ گۈللۈك ئازغان Rosa laxa Retz. نىڭ قۇرۇقۇلغان مېۋسى بولۇپ، كۈز پەسىلى مېۋسى پىشاندا ياكى پىشاي دەپ قالغاندا يىغۇپلىپ، سايىدا قۇرۇقۇلدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا دۈگىلەك ياكى تۇخۇمىسىن بولۇپ، ئۇزۇنلوقى 1~1.4cm، دىئامېتىرى 0.6~1.3cm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى قىزىل، پۇرۇلمىسى كۆپ، ئۇچى سەل ئۇچلۇق بولۇپ، بىش تال قورۇلۇپ قالغان گۈل كاسا يۈپۈرمەقچىسى بولىدۇ. ئائىلىقى بىر نەچچە، ئائىلىقى بىر، ئائىلىق تۇمشۇقى باشىسىمان، تۇقى سەل كۆپكەن، ئوتتۇرسى ئۈيیمان، مېۋە سېبىي قورۇلۇپ قالغان ياكى چوشۇپ كەتكەن بولىدۇ. مېۋە پوستى قىلىن، ئەتلىك بولۇپ، ئىچىدە 38~6 دانه ئۇرۇقى ۋە نۇرغۇن ئاق تۈكلىرى بولىدۇ. ئۇرۇقى سوقىچاقراق، سىرتقى يۈزى سىلىق، سارغۇچ بېغىر رەڭلىك، ئۇرۇق كىندىكى دۈگىلەك كېلىدۇ. تەمى چۈچۈمەل ئاتلىق بولىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورا تالقىنىنىڭ رەڭگى قىزىل، مېۋە شۆپۈكى سىرتقى پوست هۇجەيرە لىرى ئۇچبۇرۇچە كىسىمان ياكى كۆپ بۇرۇچە كىلىك بولۇپ، دىئامېتىرى 40μm~15 كېلىدۇ. ئىچىدە قىزىل رەڭلىك تاڭرالىلار بولىدۇ. ئۇتتۇرۇ مېۋە شۆپۈكى هۇجەيرىلىرى ئۇزۇن چاسراق، دىۋارى قىلىن بولۇپ، تەركىبىدە چاسا كىستالالار بولىدۇ. ئىچىكى مېۋە شۆپۈكى هۇجەيرىلىرى چوك، دۈگىلەك بولىدۇ. ئۇرۇق پوستى ياخاج تالالرى دەستىلەنگەن بولۇپ، دىئامېتىرى 40μm~18، دىۋارى قىلىن 4~7μm كېلىدۇ. هۇجەيرە كاۋىكى كىچىك بولىدۇ. قىلىن دىۋارلىق هۇجەيرىلىرى توپلاشقان بولۇپ، دىئامېتىرى 18~40μm، دىۋارى قىلىنلىرى تەخىمنەن 3μm كېلىدۇ. ئۇرۇق پوستىدىكى تاش هۇجەيرىلىر توب ياكى تارقاق، سوقىچاق، دۈگىلەك ياكى دۈگىلەك ئۇچبۇرۇچە كەكللىك، دىئامېتىرى 60μm~20، دىۋارى قىلىنلىرى تەخىمنەن 10μm كېلىدۇ. ئۇرۇق پوستى تالالرى دەستىلەنگەن، دىۋارى سەل قىلىنلىغان، هۇجەيرە كاۋىكى چوك بولۇپ، دىئامېتىرى تەخىمنەن 15μm، قىلىنلىقى 6μm كېلىدۇ. دىۋار توشۇكى دۈگىلەك بولىدۇ. ئۇنىڭدا ياخ تامچىلىرى كۆپ، دۈگىلەك، رەڭگى سېرىق؛ گۈل چېڭى دانىچىلىرى دۈگىلەك، سوقىچاق ياكى شاپتاۇل شەكىللىك بولۇپ، دىئامېتىرى تەخىمنەن 25μm كېلىدۇ. بەزىسىز تۈكچىلىرى كۆپ بولۇپ، دىئامېتىرى 10~40μm، هۇجەيرە كاۋاكلىرىنىڭ بەزىلىرىدە تاڭرالىلار بولىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى نېچىلىرى بۇرمىسىمان ياكى پەلەمەپىسىمان بولىدۇ. كالتىسى ئۆكسالات توب كىستاللىرىنىڭ دىئامېتىرى 12~16μm، چاسا كىستاللىرىنىڭ دىئامېتىرى 15μm~12 كېلىدۇ.

(2) مەزكۇر دورا تالقىنىدىن 10g ئېلىپ، 50ml سۇ قوشۇپ چالغىقاندىن كېيىن بىر سائەت ئۇرغۇزۇپ، فىلتردىن ئۆتكۈزۈپ، فىلترلىق ئېرىتىسى تۆۋەندىكى سىناققا ئىشلىتىلىدۇ. يەنى فىلترلاغان ئېرىتىمىسىدىن 5ml ئېلىپ، كۆمۈش نىرات سىناق ئېرىتىمىسىدىن مۇۋاپىق مىقداردا قوشۇپ، چالغىقاندا

قارا چۆکمه هاسل بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، يەنە فىلتىرلەنغان ئېرىتىمىسىدىن 5ml ئېلىپ، تۆمۈر (III) خلورىد تەجىرىبە ئېرىتىمىسىدىن قوشۇپ بىر كېچە تۇرغۇزۇلسا، قارامتۇل كۆك چۆکمه هاسل بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 بىرىنچى دەرىجىدە سوغۇق، ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق.

【تەسلىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 مەننىي تىزگىنلىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىش، بۆرەكىنى قۇۋۇھتلەش، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈش، ئىشىق ياندۇرۇش، جاراھەتنى ساقلىتىش، هەيزىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئاغرىق توختىش خۇسۇسىيەتلەرىگە ئىكە. ئىچ سۈرۈش، ئېھىتلام بولۇش، سۈبىدۇكىنىڭ كۆپلۈكى، هەيزى تۇتۇلۇپ، ئاڭ خۇن كۆپىيىش، بەل-پۇت سىرقىراب ئاغرىش، يۆتەل، زىققە، ئېغىز-تىلغا جاراھەت چىقىش، تېرىھ قىچىشش ۋە كۆزگە ئاڭ چۈشۈش كېسەلىلىكلىرىگە ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3~5g

【ساقلاش】 شامال ئۇتۇشۇپ تۇرمىغان، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ. مىتە چۈشۈشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ.

بېھى ئۇرۇقى 榅桲子 Wen po zi SENEN CYDONIAE

بۇ ئازغان ئائىلسىدىكى بۇسۇملۇك بېھى Cydonia oblonga Mill. نىڭ قۇرۇتۇلغان ئۇرۇقى بولۇپ، كۈز پەسىلى مېۋسى پىشقانىدا مېۋسىنى ئۇزۇۋىلىپ، ئۇرۇقى ئېلىنىپ، ئاپتايلا قۇرۇتۇلىدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا يايلاق يۈرهەك شەكىللىك بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 6.5~7.5mm، كەڭلىكى 4.5~5.5mm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى قىزغۇچ سوْسۇن ياكى قارامتۇل سوْسۇن رەڭلىك، سىلىقراق، سەل پارقراق كېلىدۇ. بىر ئۇچى ئۇچلۇق، يەنە بىر ئۇچى دىقماق بولۇپ، ئۇڭ سول تەرىپى سىممېتىرىك بولمايدۇ، تومۇر سىزىقلەرى بىنىق بولمايدۇ. ئۇرۇق پوستى قىلىنراق ۋە قاتىق، ئۇرۇق پەللىسى ئىككى تال، سوت رەڭلىك، مایلىق بولىدۇ. پۇرۇقى ئاجىز، تەمى سۇس كېلىدۇ.

【پەرقەندۇرۇش】 (1) بۇ دورا ئۇرۇقىدىن بىر نەچچە تال ئېلىپ سۇ قوشۇپ نەزە، بىنزالىبەمدەك خۇشبۇي پۇرايدۇ.

(2) بۇ دورىنىڭ توغرا كەسمە يۈزىدە: ئەڭ سىرتقى قەۋىتىدىكى رىشاتكىسىمان ھۈچەيرىلەر دەتلىك تىزىلغان، ھۈچەيرىلەرنىڭ سىزىقلەرى روشن، ئۇزۇن چاسا شەكىللىك، يان دىۋارى بىلەن ئىچكى دىۋارى قىلىنلىغان بولۇپ، ھۈچەيرە ئۇزۇنلىسىغا $60\sim80\mu\text{m}$ ، توغرىسىغا $25\mu\text{m}\sim20\mu\text{m}$ كېلىدۇ. رەڭسز بولىدۇ. قېلىن دىۋارلىق ھۈچەيرە قەۋىتى قارامتۇل قوڭۇر، ھۈچەيرىلەرى يايلاق ۋە زىج تىزىلغان بولۇپ، ئۇزۇنلىسىغا $12\sim20\mu\text{m}$ كېلىدۇ. ئىچكى تۆرەلمە سۇتى پىگىمېت قەۋىتى قارامتۇل قوڭۇر، سىرتقى تۆرەلمە سوتى ئۇرۇق پەللىسى ھۈچەيرىلەرى رەڭسز بولۇپ، ئىچىدە ياغ تامچىلىرى بولىدۇ.

بۇ دورا تالقىنىنىڭ رەڭگى قىزغۇچ قوڭۇر بولىدۇ. رىشاتكىسىمان ھۈچەيرىلەر ئۇزۇن چاسا شەكىللىك رەڭسز بولۇپ، روشن ياكى غۇۋا سىزىقچىلىرى بولىدۇ. دىئامېتىرى ئۇزۇنلىسىغا $60\sim80\mu\text{m}$ ، توغرىسىغا $20\sim25\mu\text{m}$ كېلىدۇ. قېلىن دىۋارلىق ھۈچەيرىلەر قىزغۇچ قوڭۇر، يايلاق، كۆپ قەۋەتلىك دەستىلەنگەن بولىدۇ. ئۇرۇق پەللىسى ھۈچەيرىلەرى رەتسىز، ئادەتتە كۆپى ئۆز-ئارا تۇتاشقا بولۇپ، دىئامېتىرى $12\sim20\mu\text{m}$ كېلىدۇ. ياغ تامچىلىرى كۆپ بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 بىرىنچى دەرىجىدە هوٌل سوغۇق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئاشقازان-ئۇچىيەتكەنلىكى قۇرۇق ئىسىسىنى ھەيدەش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، خىلىت كۆپەيتىش، يۆتەل توختىتىش خۇسۇسىيەتلەرىگە ئىگە. قەۋزىيەت، تىنچسزلىنىپ، بىئارام بولۇش، ئېغىز قۇرۇش، خىلىت ئازىيىش، يۆتەل، ئۆپكە سلى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3~5g

【ساقلالاش】 سايىه، سالقىن، قۇرۇق جايىدا ساقلىنىدۇ.

بېھى

榅桲果 Wen po guo FRUCTUS CYDONIAE

بۇ ئازغان ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بېھى Cydonia oblonga Mill. نىڭ پىشقانى مېۋسى بولۇپ، كۈز پىسىلى مېۋسى پىشقانىدا يېغىۋىلىنىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ ياكى ئىككىگە پارچىلاپ ياكى قىلىن يالپاقلاپ ئاپتاپتا قۇرۇتۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا نەشپۇتسىمان بولۇپ، ئادمته ئىككى پارچىگە بۆلۈنكەن ياكى قىلىن يالپاقلانغان ھالىتتە بولىدۇ. سرتقى پوستى سارغۇچ قوڭۇر ياكى قارامتۇل قىزىل رەڭىدە بولۇپ، پۇرلەشكەن، بېڭىز-پەس بولىدۇ. ئىتى قىلىن ھەم يېرىك كېلىدۇ. كىسمە يۈزى ئۇششاق دانىچىسىمان، گىرەھەكلىرى يۈكۈلمىگەن بولىدۇ. ئىتى سۇس سارغۇچ قوڭۇر، ئۇرۇقى قارامتۇل قوڭۇر رەڭلىك، چۈشۈپ كەتكەن ياكى ئۆزىدە ساقلىنىپ قالغان بولىدۇ. خۇش پۇراقلقى، تەمى چۈچۈمەل تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ تالقىنى قوڭۇر ياكى سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك كېلىدۇ. سرتقى مېۋە پوستى ھۈجەيرىسى سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، كۆپ بۇرچەكلىك، دىۋارى قىلىن بولىدۇ. تاش ھۈجەيرىسى كۆپىنچە يەككە ھالىتتە تۈرىدۇ، شەكلى تۇخۇمىسىمان، يۈمىلاقراق ياكى ئۇزۇن سوقچاڭ، كاۋاڭ ئېرىقچىلىرى ئىنىق، ھۈجەيرە بوشلۇقى تار بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 40~30 μm ، دىئامېتىرى تەخىمنەن 40 μm كېلىدۇ، يەككە ھۈجەيرەلىك تۈكچىلەر كۆپىنچە ئەگر بىلەشكەن بولۇپ، بەزىلىرىنىڭ ئىچىدە سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك ماددىلار بولىدۇ، دىئامېتىرى تەخىمنەن 10 μm كېلىدۇ. تورىسىمان سىزىقلقى ئۇتكۈزگۈچ نېيچىلەر ۋە مېۋە پوستىدىكى رىشاتكىسىمان ھۈجەيرەلىر ئاز ئۇچرايدۇ. كراخمال دانىچىلىرى بىر قەدەر كۆپ بولۇپ، يەككە ياكى 3~5 دانىسى بىرلىشىپ مۇرەككەپ دانىچىلارنى ھاسىل قىلىدۇ. كىچىك چاسا كرسىتلەنىڭ دىئامېتىرى 12.5~7.5 μm كېلىدۇ.

【تەبىئىتى】 مۆتىدىل.

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 مېڭىنى قۇۋۇتلىكىنى داۋالايدىغىنى، يۈرەككە مەنپەئەت بېرىش، روھى كۈچىنى ئاشۇرۇش، ئاشقازانغا ياردەم بېرىپ، سۇلارنى ھېيدىمەش، ئۆسۈزۈلۈقىنى قاندۇرۇش، يۆتەل پەسەيتىش، قان ۋە ئىچ ئۆتكۈنى توختىتىش تەسىرىكە ئىگە. بىش قېيىش، يۈرەك سېلىش، نېرۇسى چارچاپ ماغدۇرسىزلىق، ئىشتىهاسلىق، ئىچ ئۆتكۈلۈقى، زىققە، قان تۈكۈرۈش، قان قۇسۇش، ئېغىزى قۇرۇش، سۈپىدۇك تۇتۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 10~30g

【ساقلاش】 سايىه، سالقىن، شامال ئۆتۈشىدىغان جايغا قويۇلۇدۇ، قۇرت چۈشۈشنىڭ ئالدى بېلىنىدۇ.

WS₃—BW—0106—98

ئاڭ لەيلىكۈلى

蜀葵花 Shu kui hua

FLOS ALTHAEAE ROSEAE

بۇ دورا تۈگىمگۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئاڭ لەيلىك *Althaea rosea* (L.) Gavan نىڭ قۇرۇقۇلغان گۈلى بولۇپ، ياز پەسىلىدە يېغۇپلىنىپ، ئاپتاتا قۇرۇقۇلۇدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا تەرتىپسىز سىلىندرىسىمان ياكى ئۇزۇن تۇخۇملىمىان بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 3~5cm كېلىدۇ. ئاز ساندىكىلىرىدە گۈل كاسىسىنىڭ قالدقۇق پارچىلىرى ساقلانغان بولىدۇ. گۈل تاجىسى بەش يايپاراق ياكى قات-قات، كۆپلىرى يېپىشىپ، كالله كەلەشكەن بولۇپ، سۇدا نەمدەپ قېتىنى ئاچقاندىن كېپىن، تەتۈر تۇخۇم شەكىللەك كۆرۈندىدۇ، ئالدىنىقى ئۇچىنىڭ گىرۋەكلىرى رەتسىز ھەرە چىشلىق ياكى پۇتۇن گىرۋەكلىك بولۇپ، تۇۋىنىڭ ئىككى تەرىپىدە زىچ توپلانغان يۇماشقا تىۋىتىسىمان تۈكچىلەر بولىدۇ. ئائىلىقى كۆپ، ئائىلىق يېچىلىرى بىرلىشىپ نېيچە شەكىلىنى ھاسىل قىلغان، گۈل چاڭدىنى سېرىق، گۈل بەرگىسى ئاڭ، جىسىمى يۇماشىق، نەھرۇشىم، نېيىز كېلىدۇ، قۇرغۇندا سەل چۈرۈكلى-شىدۇ. پۇرېقى سەل خۇش پۇرالقىق، تەمى سۇس كېلىدۇ.

【پەرقىلەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ تالقىنى قوڭۇر رەڭلىك (سورتى ئۇخشاش بولمۇغانلىقتىن پەرقىلىق بولىدۇ) كېلىدۇ. گۈل چىكى دانىچىسى يۇملاق، رەڭگى سۇس سېرىق بولۇپ، دىئامېتىرى 100~120μm كېلىدۇ. سىرتقى دىوارىدا تىكىنسىمان ئۆسۈكچىلىرى بولىدۇ، بىخلەنىش تۆشۈكى ئېنىق بولمايدۇ. تاق ھۇچىرىلەنىڭ ئۇزۇنلۇقى 50~30μm، دىئامېتىرى 25μm~10 μm كېلىدۇ. دىوارى نېيىز بولىدۇ. گۈل بەرگىسىدىكى سىرتقى پوست ھۇچىرىسى دولقۇنسىمان بولۇپ، بەزىدە چاسا كىرسىتال ۋە دەستە كىرسىتالىنى كۆرۈشكە بولىدۇ. ئۆتكۈزگۈچ نېيىچىسىنىڭ كۆپىنچىسىدە بۇرمۇسىمان سىزىقلار بولۇپ، دىئامېتىرى تەممى-نەن 10μm كېلىدۇ. بەزىدە يۈلتۈزىسىمان تۈكچىلەر كۆرۈندىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئۆپكىنى سىلقلاش، يۆتەل پەسەيتىش، تەرلىتىش، زىققىنى بېشىش، ئىشىق ياندۇرۇش، قىزىل ئەسۋىسىنى چىقىرىش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، يۈرەكىنى قۇرۇۋەتلىمەش تەسىرىگە ئىگە. توختىمای يۆتىلىش، بەلەم چىقىرالماسىلىق، باللارغا قىزىل چىقىش، قەۋزىيەت، بۇۋاسر، ئۇيقوسلىق، ئۇنۇتفاقلىق، تەرىلىمەسىلىك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 6~10g

【ساقلاش】 سايىه، سالقىن قۇرغاغى جايغا قويۇلۇدۇ، نەملىكتىن ساقلىنىدۇ.

قوغۇن ئۇرۇقى

新疆甜瓜子 Xin jiang Tian gua zi
SEMEN MELO

بۇ دورا قاپاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك قوغۇن Cucumis meLoL. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشىشى ئۇرۇقى بولۇپ، ياز ۋە كۈزدە پىشقان قوغۇنىڭ ئۇرۇقىنى يىغۇبلىپ، يۈيۈپ، ئاپتاتا قۇرۇتۇلۇدۇ.
【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا يايلاق ئۇزۇن تۇخومىمان بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 6~9mm، كەڭلىكى 2~4mm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى ساراغۇچ ئاڭ، سىلىق، پارقرارق بولۇپ، چوڭايتىش نەينىكىدە كۆزەتكەندە ئىنچىكە، زىچ ئۇزۇنلىسىغا كەتكەن سىزىقچىلار كۆرۈنىدۇ. ئۇچى سەل ئۇچلۇق بولۇپ، ئانچە ئۇزۇنلۇق بولىغان ئۇرۇق كىندىكى بولىدۇ. تۇۋى ئۇچىسىز دىقماق، جىسى بىر قەدر قاتىق هەم چۈرۈك كېلىدۇ، تۆرەلمە سۈتى ئاڭ رەڭلىك ۋە پەردىلىك ئۇرۇق پەللىسى ئەققىچ بولىدۇ. يۈزىقى ئاچىز، تەمى سۇس كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ تالقىنى ساراغۇچ قوڭۇر رەڭلىك كېلىدۇ. تاش ھۈجەيرىلىرى توپلاشقان، سېرىق ئالتۇن رەڭلىك، ئۇزۇن چاسراق كېلىدۇ. دىۋارى چوڭۇر، دولقۇنىسمان ئەگرلەشكەن بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى تەخىنەن 164 μm ، دىئامېتىرى 27 μm كېلىدۇ. قەۋەت سىزىقلىرى بىر قەدر ئۇنىق، ھۈجەيرە پوست تۆشۈكى بېرىقىسىمان ياكى چىكتىسىمان بولىدۇ، كاۋاڭ ئۇرۇقچىسى غۇۋا كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. يۈلتۈزىسمان ھۈجەيرەلدە كۆپلىگەن قىسقا شاخسىمان ئۆسۈكچىلەر بولۇپ، دىئامېتىرى تەخىنەن 25 μm كېلىدۇ، دىۋارى ياخاچانغان بولىدۇ. ئۇرۇق پوستى تۆۋەنلىكى پوست ھۈجەيرىسىنىڭ سرتقى يۈزىنى كۆزەتكەندە ئۇزۇن چاسا، ئۇزۇن يۈمىلاقلارق ياكى تەرتىپسىز، يايلاق شەكىلە كېلىدۇ، ئۇزۇنلۇقى تەخىنەن 95 μm ، دىئامېتىرى 49 μm ~11 كېلىدۇ. تىك ئەتراب دىۋارى قېلىنراق بولىدۇ. ئۇرۇق پەللىسى ھۈجەيرىسىگە ئالېرون دانچىسى تولغان بولۇپ، دىئامېتىرى 13 μm ~3 كېلىدۇ، بەزىلىرىنىڭ تەركىبىدە چاسراق ياكى كۆپ بۇرجەكلىك كىرسىتالىسىمان جىسىم ھەممە شەكلى تۇرالقىزىز سېرىق رەڭلىك ماددىلار بولىدۇ. ئىچكى تۆرەلمە سۈت ھۈجەيرىسى رەڭسىزگە مايلارق بولۇپ، ئۇستىدە توغرا يوللۇق ھەممە بىر قەدر زېچراق گىرەلەشكەن سىزىقچىلار بولىدۇ.

【لايىقلاشتۇرۇش】 قوغۇن ئۇرۇقى قورۇلىدۇ.

【تەبىئىتى】 بىرىنچى دەرىجىدە ئىسىق، ئىنگىنچى دەرىجىدە ھۆل.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 جىڭىر ۋە ئۆتنىڭ توسالغۇلىرىنى ئېچىش، بۆرەكىنى، ئۇچەينى، دوۋساقلارنى تازىلاش، بەلغىم بوشىتىش، يۆتەل توختىتىش، مەننىي كۆپەيتىش، باھنى قۇۋۇمەتلەمش تەسىرىگە ئىگە. جىڭىر، ئۆت يۈللەرى توسوْلۇپ قېلىش، قەۋزىيەت، سۈيىدۇكىنىڭ دەممۇدمۇ كۆپىدۈرۈپ، ئېچىشتۇرۇپ كېلىشى، يۆتەل، كۆكەك ئاڭىرىش، باھ ئاچىلاش، مەننىي ئازىيىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 5~10g

【ساقلاش】 سايى، سالقىن، قۇرغانقى جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0108—98

شىنجاڭ ئارچا مېۋسى

新疆圆柏果 Xin jiang Yuan bai guo
FRUCTUS SABINAE VULGARE

بۇ دورا ئارچا ئائىلىسىدىكى تۇسۇملۇك شئارچىسى *Sabina vulgaris* Antoine. نىڭ مېۋسى بولۇپ، كۆزدە مېۋسى پىشقاندا يېغۇقىلىنىپ، ئاپتايتا قۇرۇتۇلدى.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيەتى】 بۇ دورا شىرنىلىك مېۋە ھالىتىدىكى غوزەكلىك مېۋە بولۇپ، شەكلى سوقىچاق ياكى يۇملاقلاراق كېلىدۇ. ئۇزۇن تۇقىنىڭ دىئامېتىرى 1.0cm ~ 1.6cm كېلىدۇ. قىسقا تۇقىنىڭ دىئامېتىرى 0.6cm ~ 1.0cm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى قارامتۇل قوڭۇر ياكى قوڭۇر رەڭلىك بولۇپ، ئادەتتە كۈل دەڭ ئاقۇش مومسىمان قىرولىرى بولىدۇ، بۇنى سۈرەتتۈشە مېۋسى پارقىرايدۇ. تۇستىدە نۇرغۇنلىغان ئىنچىكە پۇرۇم سىزىقلەرى بولىدۇ. چوققا قىسىمى سەل پۇلتىيپ چىققان، تۇشى سەل تەكشىرەك بولىدۇ. بىر تۇچىدا سۇس سېرىقىن سارغۇچ بىشىلغىچە بولغان مېۋە ساپىقىنىڭ قالدۇقى ۋە ساقلىنىپ قالغان تۆت تال گۈل كاسىسى بولىدۇ. مېۋە ئېتى سارغۇچ بىشىل بولۇپ، ئۇنىڭدا بىر تال سوقىچاق تۇرۇق بولىدۇ. تۇرۇقنىڭ ئۇزۇنلىقى 4~7mm كېلىدۇ، تۇرۇق پۇستى سارغۇچ قوڭۇر، تۇرۇق كىندىكى قوڭۇر، تۇرۇقنىڭ چوققا قىسىغا جايلاشقان، تۇرۇق پۇستى سۆگەكتەك قاتىق بولىدۇ. پۇرتىقى خۇشبۇي، تەمى سەل ئاچىچق، ئازاراق قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ توغرا كەسىسى: سىرتقى مېۋە پۇستى بولۇپمۇ تۇنىڭ سىرتقى دىۋارى كۆپ بۇرچەكلىك بولۇپ، ئىچىدە سارغۇچ قوڭۇر ماددىلار بولىدۇ، ئوتتۇرا مېۋە پۇستىدا چوڭ نېپىز دىۋارلىق ھۆجەيرىلەر بولۇپ، ئاپلىق بوشلۇقلەرى بىر قەدر كەڭ كېلىدۇ، مايخانىسى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. ئىچىكى مېۋە پۇستىدا ناھايىتى يوغان، تەرتىپىسىز، بۇرچەكىسىمان پۇلتىيپ توغان تاش ھۆجەيرىلەر بولىدۇ.

بۇ دورىنىڭ تالقىنى قوڭۇر رەڭدە بولىدۇ. مېۋە پۇستىدىكى تاش ھۆجەيرىلەر ناھايىتى يوغان ۋە تەرتىپىسىز بولۇپ، ئادەتتە بۇرچەكلىك بۇلمايمىلار بولىدۇ، ھۆجەيرە بوشلۇقىمۇ ئىنتايىن چوڭ، دىۋارىنىڭ قېلىنلىقى تەخمينەن 6μm كېلىدۇ، كاۋاڭ تېرىقىچىلىرى ئېنق بولمايدۇ، ئۇزۇنلىقى 400μm ~ 100μm، كەڭلىكى 200μm ~ 50μm كېلىدۇ. تۇرۇق پۇستىدىكى تاش ھۆجەيرىلەر توپلىشىپ ياكى تارقىلىپ جايلاشقان بولۇپ، دىۋار توشۇكلىرى ئېنق بولىدۇ، ئۇزۇنلىقى 300μm ~ 30μm، كەڭلىكى 80μm ~ 20μm، دىۋارىنىڭ قېلىنلىقى تەخمينەن 15μm كېلىدۇ. نېچىسىمان ھۆجەيرىدە تورسىمان سىزىقىچىلار ياكى گىرۋەكلىرىدە ھۆجەيرە پۇستى توشۇكى بولىدۇ. ھاوا توشۇكچىلىرى ئاز، شەكلى ھەر خل، مايخانىسى چوڭ بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 سُككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سوغۇقتىن بولغان يەلنى تارقىتىش، تۈپكىنى تازىلاش، ئاغرىق توختىتىش، سۈيىدۇك ماڭغۇزۇش، ھېيزىنى راۋانلاشتۇرۇش تەسىرىگە ئىكە. بوغۇملارنىڭ قېتىپ ئاغرىشى، قورساقا سۇ چۈشۈش، پۇت- قول ئىشىشلىرى، زىققە، ھېيز كەلمەسلىك، يارتا پالەچ، مېڭە كېسىلى، قۇلاق غوڭۇلداش، گاسلىق، سۈيىدۇك كەلمەسلىك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 4~6g

【ساقلالاش】 سايى، سالقىن جايغا قوبۇلدى، مىتە چۈشۈشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ.

قارئۇرۇك

新疆酸李 Xin jiang Suan li
FRUCTUS PRUNI SOGDIANAE

بۇ دورا ئازغان ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك نۇتتۇرا ئاسىيا قارئۇرۇكى
نىڭ پىشقان ياكى پىشاي دەپ قالغان قۇرۇق مېۋسى بولۇپ، 9~8- ئايىلاردا مېۋسى پىشقاندا يىغىزىلىنىپ،
قارامتۇل قوڭۇر رەڭگە كىرىڭچە سايىدا قۇرۇتۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا تۇخۇملىكىن ياكى ئۇزۇنچاق تۇخۇملىكىن بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى
1.5~2.5cm كېلىدۇ. سىرتقى يۈزى قارامتۇل سوٽسوٽ، پۇرلىشىپ، ئېگىز-پىس بولۇپ قالغان، ئەتلىك
كېلىدۇ، تۈۋىدە يۈمىلاق مېۋە ساپاچ ئىزى بولىدۇ. مېۋە ئېتى گۆشتىك بولىدۇ. ئۇچكىسى سوقىچاق،
سەل ياپلاق، سېرىق رەڭلىك، قاتىق كېلىدۇ، ئۇچكىسىنى چاققاندا ئىچىدىن بىر تال سۇس سېرىق
رەڭلىك ئۇرۇق چىقىدۇ. پۇرىقى ئاجىز، تەمى چۈچۈمىل، تاتلىق كېلىدۇ.

【لايقلاشتۇرۇش】 ئەخلىكتىلىرى ئادالىنىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سەۋادانى يوقىتىش، سەپرانى پەسەيتىش، قىزىتما قايتۇ-
رۇش، يۆتەل توختىش، ئىچ ئۆتكۈنى توختىش تەسىرىكە ئىكە. قىزىتما، يۆتەل، باش ئاغرىقى، زۇكام،
ئىچ ئۆتكۈ، ئېغىز قۇرۇش، چىش بوشىش، قۇسۇش، كۆكۈل ئېلىشىش، گال ئاغرىقى قاتارلقلارغا
ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 6~12g

【ساقاڭلاش】 سايىه، سالقىن، قۇرغانچى جايغا قويۇلىدۇ.

WS₃—BW—0110—98

كەسلەنچۈك

新疆蠍蜥 Xin jiang Lie xi
AGAMA STOLICZKANA

بۇ دورا ئىگۈنلار ئائىلىسىدىكى ھايۋانات، شىنجاڭ كەسلەنچۈكى Agama stolicziana Blanford. نىڭ قۇروتۇلغان تېنى بولۇپ، ئۇنى 9~5. ئىيلاردا تۇتۇپ، قارنىنى يېرىپ، ئىچكى ئەزىزىنى بىلەتتەكەن دىن كېسىن، پاكىزه يېرىپ، ئاپتا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 پۇتۇن تېنى قورۇلۇپ تۈگۈلۈپ قالغان بولۇپ، باش ۋە گەۋدىسىنىڭ ئۇزۇنلۇقى تەخىنەن 30cm كېلىدۇ. بېشى تۇخۇمىسىمان ئۈچۈرجهك شەكىلde، باش چوققىسى بوز ياكى كۈل رەڭ قوڭۇر رەڭلىك، بېڭكى ۋە گال قىسىمى كۈل رەڭ ئىقش كېلىدۇ، بەزىلىرىدە مەرمەر تاشتەك نەقش سزىقلەرى بولىدۇ، تۆمۈش قاسىرىقىنىڭ ئۇزۇنلۇقى كەڭلىكدىن چوڭ بولىدۇ. دۆمبىسى قوڭۇرغا مايىل كۈل رەڭ بولۇپ، قوڭۇر ياكى ئاڭ رەڭلىك تەڭكىچىلەر ئارىلىشپ كېلىدۇ. قورساق قىسىمى ئاڭ ياكى بوز رەڭ كېلىدۇ. دۆمبىسىدىكى قاسىرىقى ئالىتە بۇرجهك بولۇپ، كاھىشىمىان تىزىلغان، چوڭ-كىچىك-لىكى ھەر خل، قوۋۇرغۇغا قاسىرىقى ئىنتايىن كىچىك بولىدۇ، تېنىدىكى قاسىرىقى دۆمبىھ قاسىرىقىدىن كۆرۈنەرىك كىچىك بولىدۇ، دۆمبىھ ئومۇرتقىسىنىڭ ئىككى تەرىپىدە 10~6 قاتار ئاڭ رەڭلىك تەڭكىچىلەر- دىن شەكىللەنگەن توغرا سزىقچىلار بولىدۇ. قۇيرۇق قاسىراقلەرى ھالقىسىمان، ئۆتكۈر قىرلق كېلىدۇ، قۇيرۇق ئومۇرتقىسى تەخىنەن 40 تال بولۇپ، ھەر بىر تال ئومۇرتقىدا 4 ھالقا بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئۇچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 باھنى قۇۋۇھتلەمش، قاننى تەڭشەش، ھەيزىنى راۋانلاشتۇ- رۇش، ئىشىشىق ياندۇرۇش تەسىرىگە ئىگە. جنسىي ھەۋمىس تۆۋەنلەمش، زەكمەر قايىم بولماسىق، يېقىلىپ، سوقۇلۇپ زەخىملەنىش، سۈيدۈك راۋان بولماسىق، ھەيز قالايمقانلىشىش ۋە تېرىگە داغ چۈشۈش قاتار لقلارغا ئىشلىتىلدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 5~15g

【ساقلاش】 قۇرغاق، شامال ئۆتۈشىدىغان جايغا قويۇلدى، چىرىشنىڭ، مىتە چۈشۈشنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ.

نېلۇپەر

睡蓮花 Shui lian hua
FLOS NYMPHAEAE

بۇ نېلۇپەر ئائىلىسىدىكى تۇسۇملۇك ئاق نېلۇپەر *Nymphaea candida* PresL. نىڭ قۇرۇتۇلغان غۇنچىسى بولۇپ، ياز پەسلىدە يىغۇۋىلىنىپ، ئاپتا قۇرۇتۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا كونۇسسىمان ياكى تۇزۇن يۇملاق بولۇپ، غۇنچىسىنىڭ تۇزۇنلىقى 2.5~4cm، دىئامېتىرى 2cm كېلىدۇ، گۈل تەگلىكى سەل چاسراق، گۈل كاسىسى 4 دانه، تېرىدەك بولۇپ، ئايرىم تۆسىدۇ، شەكلى تۇزۇنچاق تۇخۇمىسىمان، تېمىنەسىمان، تۇنلىقى، سرتقى يۈزى بىشل ياكى ساراغۇچ قوڭۇر رەڭلىك بولىدۇ. گۈل كاسا يايراچىسىنى ئېلىۋەتكەندىن كېيىن، 25~15 دانه ئاق رەڭلىك تۇخۇمىسىمان گۈل بەرگىلىرى كۆرۈنىدۇ. ئاتىلىق 40~30 گىچە بولىدۇ. چاڭدىنى يىپ شەكلىدە بولۇپ، تۇزۇنلىقى تەخمىنەن 10mm كېلىدۇ، ئاتىلىق يىپچىسى يايلاق بولۇپ، كۆپىنچە چاڭدان بىلەن تۇخاشش تۇزۇنلىقتا بولىدۇ. تۇرۇقدان شارسىمان ياكى سوقىچاق شەكىلىك كېلىدۇ، ئاتىلىق بويىنى بولمايدۇ ياكى ئىنتايىن قىسقا بولىدۇ، ئاتىلىق تۇمۇشۇقى 15~5 كىچە بولۇپ، چاقسىمان حالاتە زىج تىزىلىدۇ. تۇتۇرسىدا بىر دانه ئۇيمان بولىدۇ. پۇرېقى ئاجىز، تەمى سۇس كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ تالقىنى ئاققۇچ سېرىق رەڭلىك بولۇپ، بەزىز تۈكچىلىرى دېڭىز يۈلتۈزۈسىمان ياكى يەككە ھۈچەرىلىك تۈكچىلەردىن ۋىارتىدۇ. بەز تۈكچىلىرى 3~2 دانه ھۈچەرىدىن ياكى يەككە ھۈچەرىلىك تۈزۈلەن بولۇپ، شەكلى يۇملاقراق ياكى سوقىچاق كېلىدۇ. تىرەك ھۈچەرىسى چوڭ بولۇپ، ئۇنىڭدا نۇرغۇنلىغان چاسا كرستاللار بولىدۇ. گۈل چىڭى دانىچىسى يۇملاقراق بولۇپ، دىئامېتىرى 32~54 μm كېلىدۇ، ھەمدە تىكەنسىمان تۇسۇكچىلىرى بولىدۇ. تاش ھۈچەرىلىك سوقىچاق، تۇتكۈزگۈچ نېيچىلەر بۇرمىسىمان سىزىقلىق كېلىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل سوغۇق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قىزىتىمنى چۈشۈرۈش، يۆتەل توختىتىش، يۈرەكىنى قۇۋۇچتىلەش، مېڭىنى ئاپاش، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇش، ئاغرىق توختىتىش، نەزلىنى يوقىتىش تەسىرىگە ئىگە. زۆكامدىن بولغان قىزىتىما، باش ئاغرىش، يۆتىلىش، يۈرېكى سېلىپ بىئارام بولۇش، يۇتقۇنچاق ئاغرىش، زەھەر قايتۇرۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش تۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3~9g

【ساقلالاش】 سايە، سالقىن، قۇرغاق جايىغا قويۇلدۇ.

ئۇستقۇددۇس

薰衣草 Xun yi cao

HERBA LAVANDULAE

بۇ دورا كالپۇكىسمان كۈللىكلىر ئائىلىسىدىكى ئۇسۇملۇك تار يوپۇرماقلىق ئۇستقۇددۇسنىڭ قۇروتۇلۇ.

غان يەر ئۇستى چۆپى بولۇپ، ياز پەسىلەدە يەغۇزىلىنىپ، سايىدا قۇروتۇلۇدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 15~40cm 15~40cm بولۇپ، گۈل شېخى پۇتۇن ئۇزۇنلۇقنىڭ تەخىمنەن $\frac{1}{3}$ نى ئىگىلەيدۇ. غولى چاسا، سىرتى ئاڭ تىۋىتىچىلار بىلەن زىج قاپلانغان بولىدۇ. سۇندۇرلۇغان يۈزى سۇس ئاققىچى سېرىق ياكى بوز رەڭ بولۇپ، بەزىدە ئۇتۇرسىدا ئۇششاق كاۋاڭ بوشلۇق كۆرۈندۇ. يوپۇرماقى كۆپىنچە چۈشۈپ كەتكەن، شەكلى يېپىسمان ياكى يېپىسمان تېمىنە شەكىللەك، كۈل رەڭ بېشىل، كۆپىنچىلىرىنىڭ چۆرسى قايرىلغان بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 3~4cm، كەڭلىكى 3~4mm كېلىدۇ. ئايلانىما كۈنلۈكىسمان كۈل تىزمىسى شېخىنىڭ ئۇستى قىسىمدا ئۇسۇدۇ، كۈل كاسىسى ئىككى كالپۇكلىق، نېيچىسىمان بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى تەخىمنەن 5mm كېلىدۇ، بەش چىشى بولىدۇ، بۇنىڭ ئىچىدىكى بىر چىشى بەكمۇ يوغان كېلىدۇ. كۈل ئىككى كالپۇكلىق، كۈل رەڭلىك بولۇپ، ئۇزۇنلۇقى 6~10mm كېلىدۇ. پۇرىقى خۇشبىيى، تەمى ئاچقىچى كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ يوپۇرماقنىڭ توغرا كەسمە يۈزى: سىرتقى پوست هۇچىھىرسى يۈقرى-تۆۋەندە بىر رەتنىن تىزىلغان، تىزىلىشى رەتلەك، سوقىچاڭ ياكى ئۇزۇن چاسا شەكىللەك، كەسمە يۇنىلىشى تەرمەپكە ئۇزارغان، دۈوارى كۆرۈنەرنىڭ قېلىن، سىرتقى دۈوارى مۇڭگۈزەشكەن، ئۇستىنىكى سىرتقى پوست هۇچىھىرسى ئاستىنىقى سىرتقى پوست هۇچىھىرسىگە قارىغاندا چوڭراق بولىدۇ، ئۇستىنىكى، ئاستىنىقى پوستلىرىدا نۇرۇغۇنلىغان شاخسىمان تۈكچىلەر ئۆسکەن، بەز تەڭگىچىسى ۋە ئاز ساندىكى بەز تۈكچىلىرى بولىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى نېيچىلەر سىرتقى ئەۋرىشىم بولۇپ، سىرتقى پوستى بىلەن ئۆتكۈزگۈچى نېيچىلەر ئارىسىدا 5~3 قاتار قېلىن بۇرچەكلىك توقۇلما هۇچىھىريلەر بولىدۇ. رىشاتكىسمان توقۇلما، هۇچىھىريلەر 3~2 قاتار بولىدۇ. بۇلۇتسىمان توقۇلما هۇچىھىريلەر كۆپ بۇرچەكلىك بولۇپ، ئۇنىڭدا ماي تامىچىلىرى ۋە دانىچىسىمان ماددىلار بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىدە ھۆل ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داؤالايدىغىنى】 سوغۇقتىن بولغان يەلنى تارقىتىدۇ، ئاشقازاننى قۇۋوھتىلىپ مېڭىنى تەڭشىدە، ھۆللىكىنى يوقتىپ، ئاغرىق توخىتىدۇ. كۆكەك چىكقىلىش، قورساق كۆپۈش، يۆتەل ۋە زۇڭلەم، باش ئاغرىش ۋە باش قېيش، يۈرىكى سېلىپ، نېپىسى بوغۇلۇش، بوغۇم ئاغرىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 3~9g

【ساقلاش】 سايى، سالقىن، قۇرغانى جايغا قويۇلۇدۇ.

مەستىكى رۇھى 薰 香 Xun lu xiang MASTICHE

بۇ دورا سر دەرىخى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بىپىشقاق مەستىكى رۇھى دەرىخى *pistacia lentiscus* L. نىڭ بىلەمى بولۇپ، دەرمەخ قۇۋۇنىسىنى ئۇزۇنىسىغا تىلىپ قويغاندا، مۇشۇ بېرىقىن بىلەمى ئېقىپ چىقىپ قاتىدۇ، ئاندىن ئۇنى يىغۇۋىلىپ، تازىلاپ ئادالىندۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورىنىڭ شەكلى ياش تامچىسىدەك ياكى تۇخۇمىسىمان بولۇپ، دىئامېتىرى 3~8mm كېلىدۇ، بېگىنىنىڭ سىرتقى يۈزى ئاساسىن رەكسىز، پارقرارق، بېرىم سۈزۈك، جىسىمى چۈرۈك كېلىدۇ، سۇنغان يۈزى سۈزۈك بولۇپ، ئەينەكە تۇخاشش بولىدۇ. كونىرۇغىنى سارغۇچ كۈل رەڭ بولۇپ، پارقرىمايدۇ. جىسىمى چۈرۈك كېلىدۇ، سۇنغان يۈزى سەدەپ قېپىسىمان بولۇپ، ئەينەكتەك پارقرايىدۇ. ئازراق خۇش پۇراقلقۇ، تەممى ئاچچىق كېلىدۇ. چاينسا دەسلەپ قۇمەدەك پارچىلىنىپ، كېيىن يۈمىشاپ، كەللەكلىشىپ بىلەمىدەك بولۇپ قالىدۇ، چىشقا چاپلاشمايدۇ، سۇ بىلەن ئەزگەندە، سوتىسىمان سوپۇرۇقلىق بولۇپ شەكلەنمەيدۇ.

【تەبىئىتى】 ئىككىنچى دەرىجىنىڭ ئاخىردا قۇرۇق ئىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئاشقازاندىكى سوغۇق يەللەرنى تارقىتىدۇ، بەدەندىكى ئىللەتلەرنى تازىلايدۇ، مېكىنى قۇۋۇقتىلمەپ، يۈرەكىنى كۈچەيتىدۇ، جىڭەر ۋە بۆرەكە مەنپەئەت قىلىدۇ. سوغۇقىن بولغان ئاشقازان ئاغرىقى، زۇكامدىن بولغان باش ئاغرىقى، ئېغىز-يۇتنۇنچاق ياللۇغى، خىالي چىچىلىپ، ۋەسۋەمىسگە چۈشۈش، يۈرىكى ئېغىش، قورساق كۆپۈش، بۆرەك ئاجىزلىشىش ۋە گىلسىق، سۈيىدۈك راۋان بولماسىق، قەۋزىيەت، هەيز قالايمقانلىشىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 1~2g

【ساقلاش】 ئېغىزى ھەم ئېتلىپ، سايىه، سالقىن جايىغا قويۇلدۇ.

WS₃—BW—0114—98

نوقۇت

鷹嘴豆 Ying zui dou
SEMEN CICERIS ARIETINI

بۇ دورا پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك نوقۇت Cicer arietinum L. نىڭ قۇرۇتۇلغان ئۇرۇقى بولۇپ، كۈرددە مېۋسى پىشقاڭدا يېر ئۆستىدىكى قىسىم ئۇرۇقىلىنىپ، ئاپتاتا قۇرۇتۇلۇپ، ئۇرۇقى قىقۇيىلىنىپ، ئەخلمەتلەرى ئادالىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورىنىڭ شەكلى قارچۇغۇنىڭ تۇمىشۇقىغا ئوخشايدىغان بولۇپ، ئۇزۇنلىقى 5~9mm، دىئامېتىرى 4~7mm كېلىدۇ، جىسمى قاتىقى، سرتقى بىزى ئاڭ، سەل قىزغۇچ ياكى سۇس بوز رەڭ كېلىدۇ. ھەرە كۆنکىسىمان قورۇق سىزىقچىلار بولۇپ، ئۆستىدە قىسقا تۈنچچىلار يىپپىپ تۇرىدۇ. ئۇرۇق كىندىكى قىسىمغا زىج جايلاشقان بولىدۇ. ئۇرۇق كىندىكى ئۇچلۇقراق، چىكتىسىمان ئۇرۇق كۆتكى تۆشكى تۇمىشۇقىنىڭ قورساق تەرىپىدە بولىدۇ. ئۇرۇق كىندىكىنىڭ ئاستىدىن دۈمبە قىسىم ئارقىلىق ئۇرۇق كۆتكى تۆش ئۆكىگىچە بولغان ئارقىلىقتا روشمن ھالدىكى ئۇرۇق قوۋۇرغان ئۆتكۈزگۈچ نېچىلەر دەستىسى بولىدۇ. جىسمى قاتىقى كېلىدۇ پۇراقسز، تەممى سۇس بولىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ توغرا كەمسە بىزى: سرتقى پۇستىدا رىشاتكىسىمان ھۈچەيرىلەر بىر قاتار، ئۇرۇق كىندىكى قىسىمدا ئىككى قاتار بولىدۇ، ئۇزۇنلىقى 105μm~52μm، كەڭلىـ كى 10μm~5، بۇرمىسىمان سىزىقلىق توشۇغۇچى نېچىنىڭ دىئامېتىرى 40~52μm كېلىدۇ. سرتقى پۇستىنىڭ ئاستىدا 3~1 قەۋەت قېلىن دۈوارلىق تىرىگۈچى ھۈچەيرىلەر بولۇپ، شەكلى گانتىلىسىمان، ئۇزۇنلىقى 31~63μm بولىدۇ. ئۇرۇق پۇستى ئاستىدا بىر نەچىچە قاتار نېپىز دۈوارلىق ھۈچەيرىلەر بولىدۇ. ئۇرۇق پەللەسى ھۈچەيرىسى كۆپ بۇرچەكلىك بولۇپ، تەركىبىدە كۆپلىكىن كراخمال دانچىلىرى، ئاز ساندىكىلىرىنىڭ تەركىبىدە چاسا كېرىستىل بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 بىرىنچى دەرىجىدە قۇرۇق تىسىق.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 بەدەندىكى غەبىرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تازىلايدۇ، توسۇل-غان خىلىتلارنى ئاچىدۇ. بەدەننى تەڭشەيدۇ. بەدەننى ئۇرۇقلالاش، جىنسىي ھەۋىسى تۆۋەنلىمش، ئىشتەهاىز-لىق، تېرى قىچىشىش ۋە. دىئابىت كېسەللىكى قاتارلىقلارغا ئىشلىتلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 10~30g

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 كۆپ مىقداردا ئىستېمال قىلىنسا، دوۋساتقا زىيان قىلىدۇ ھەممە ئۆكايى يەل پەيدا قىلىدۇ.

【ساقلالاش】 قۇرغاق، شامال ئۆتۈشىدىغان جايغا قويۇلۇدۇ.

سۇماق

鞣漆树果 Rou qi shu guo
FRUCTUS RHUS CORIARIAE

بۇ دورا سر دەرىخى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سۇماق Rhus coriaria L. نىڭ پىشاي دەپ قالغان قۇرۇتۇلغان مېۋسى بولۇپ، كۈزدە مېۋسى پىشاي دېگەندە يىغۇپلىنىپ، ئاپتاپتا قۇرۇتۇلدى.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا يايپلاق، يۈمىلاق شەكىللەك بولۇپ، دىئامېتىرى 3~5mm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى خورماڭ ياكى قارامتۇل قىزىل، مېۋسىنىڭ سرتقى پوستى يېرىك، جىسمى چۈرۈك كېلىدۇ. مېغزى يايپلاق، يۈمىلاق ياكى بۆرەك شەكىللەك بولۇپ، دىئامېتىرى 2~3mm كېلىدۇ. سرتقى يۈزى سىلىق، قاتىق سارغۇچ بېشىل ياكى توق بېشىل، كىممە يۈزى ئاققۇچ سېرىق، مالىق كېلىدۇ. پۇرنى ئاجىز، تەمى چۈچۈمەل بولىدۇ.

【پەرقەندەرۈش】 بۇ دورىنىڭ توغرا كىممە يۈزى: مېۋسىنىڭ سرتقى پوست ھۈجەيرىسى بىر قاتار بولۇپ، ئىچىدە قىزغۇچ قوڭۇر ماددىلار بولىدۇ، سرتىنى قىلىن مۇڭكۈز لەشكەن قەۋەت تۇردى. ھەمە نۇرغۇنلىغان سوقىچاڭ ياكى يۈمىلاقراق بەز تۈكچىلەر ۋە بەزسىز تۈكچىلەر ئۆشكەن بولىدۇ. ئىككىلىسىنىڭ تەركىبىدە سارغۇچ قوڭۇردىن قىزغۇچ قوڭۇرغىچە بولغان ماددىلار بولىدۇ. مېۋە پوستىدا 5~3 قەۋەت نېپىز دىۋارلىق ھۈجەيرىلەر بولۇپ، شەكلى سوقىچاڭ ياكى يۈمىلاقراق كېلىدۇ. مېۋە ئىچىكى پوست ھۈجەيرىسى تەرتىپىز، كۆپىنچىسى پارچىلىنىپ كەتكەن بولىدۇ. تۇرۇق پوستىدا 3 قەۋەت تار، ئۇزۇن رىشاتكىسىمان ھۈجەيرىلەر بولۇپ، سرتقى قەۋىتى تەخمىنەن 90μm، ئۇتۇرا قەۋىتى تەخمىنەن 30μm، ئىچىكى قەۋىتى تەخمىنەن 180μm 40~100μm كېلىدۇ. ئىچىكى قەۋىتىدىكى رىشاتكىسىمان ھۈجەيرىلەرنىڭ يۇقىرى ئۇچىغا يېقىنراق تۇرۇندا قىزغۇچ قوڭۇر ماددىلار بولىدۇ.

بۇ دورا تالقىنى قارامتۇل قوڭۇر دەڭلىك ياكى سارغۇچ قوڭۇر دەڭلىك بولۇپ، بەز تۈكچىلىرى ھەممىلا يەردە ئۇچرايدۇ، شەكلى سوقىچاڭ، ھۈجەيرە بېشى كۆپ يەككە ساپاقلق بولۇپ، ئۇزۇنلىقى 40~100μm كېلىدۇ. يەنە بىر خىل كىچىك بەز تۈكچىلىرىنىڭ ئۇزۇنلىقى تەخمىنەن 20μm بولۇپ، 1~4 دانە ھۈجەيرىدىن تۇرۇلدى. شەكلى ئۇزۇن، تار تۇخۇمىسىمان كېلىدۇ. بەزسىز تۈكچىلەرنىڭ كۆپىنچىسى 4~1 دانە ھۈجەيرىدىن تۇرۇلگەن، كۆپىنچىلىرى ئەگر بەشكەن بولۇپ، ئۇزۇنلىقى 100~200μm، دىئامېتىرى 10~20μm كېلىدۇ. ئۆتكۈزگۈچى نېيچىسى بۇرمىسىمان ياكى تورىمىان سىزىقچىلىق بولىدۇ. تۇرۇق پوستى ئىچىكى پوست ھۈجەيرىسى قوڭۇر دەڭلىك، سرتقى يۈزىدىن قارىغاندا ئۇزۇنچاچ چاسا، چاسراق ياكى كۆپ بۇرجه دەڭلىك كۆرۈنىدۇ. تىك دىۋارى تەسۋىسىمان قېلىنىلايدۇ. تەكشى دىۋارىدا زىچ تورىمىان سىزىقچىلار بولىدۇ.

【تەبىئىتى】 تېرىپ ئۆستۈرۈلگىنى ئىككىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق، ياخوا ئۆشكەن ئۆچىنچى دەرىجىدە قۇرۇق سوغۇق.

【تىسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سەپرانىڭ ئاشقازان، ئۇچميكە زىيادە ئېقىپ كىرىشىنى تىزگىنلەيدۇ، قىزىتىما ياندۇرۇپ، زەھەر قايىتۇرۇدۇ، نېرۋىنى تىنچلاندۇرۇپ، مېگىنى قۇۋۇتلىمىدۇ، قان توختىتىدۇ، ئىچ سۈرۈشنى توختىتىدۇ. ئىسسىقتىن بولغان باش ئاغرىش، باش قېيش، باش چىڭقىلىش، ئىچ سورۇش، ئېغىزى قۇرۇپ، كۆڭۈل ئېلىشىش، تولا سىيىش، سىيگەندە ئاغرىش، ئىشتىها سىزلىق، ئاشقازان ئاجزىلىشىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 5~15g

【دىقىقەت قىلىدىغان ئىشلار】 ئاشقارىنى سوۋۇپ كەتكەنلەرگە ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.
【ساقلاش】 قۇرغاق، سالقىن، سايىه جايغا قوبىللىدۇ.

ئارپىبەدىيان ئەرنقى

小茴香露剂 Xiao hui xiang Lu ji

بۇ دورا ئارپىبەدىياننى پىشىشقلاب تىشلىش ئارقىلىق ياسالغان ئەرقىتن ئىبارەت، 【ياساش ئۈسۈلى】 ئارپىبەدىيandin 200g ئېلىپ، ئۇنىڭغا سۇ قوشۇپ، سۇ ھورىدا دىستىللهپ، دىستىللهنگەن سۇيۇقلۇقتىن 100ml يىغۇزىلىنىپ، مىكروبىسىزلاندۇرۇلغان بوتۇلكلىلارغا بۆلۈپ قاچىلىنىپ، ئېغىزى ھىم ئېتلىدى.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا رەڭىزز، سۈزۈك سۇيۇقلۇق بولۇپ، خۇش پۇراقلقى، تەمى سۇس كېلىدۇ.

【پەرقلەندۇرۇش】 بۇ دورىدىن 10ml 1 ئېلىپ، ھەر قىتمىدا 5ml 5 دىن، 3 قىتمى ئېفر بىلەن چەككىلىپ، ئاندىن ئېفر سۇيۇقلۇقلرىنى بىرلەشتۈرۈپ، 1ml قالغىچە قوبۇلدۇرۇپ، ئاندىن ئۇنىڭغا 3~2 تامچە % 7 لىك ھىدروكسلامن ھىدروخlorid ئېتلىل ئالکوھول سىناق ئېرىتىسى، 4~3 تامچە 1% لىك كالىي ھىدروكسد ئېتلىل ئالکوھول ئېرىتىسى تېمىتىپ، ئۇنى سۇ ۋانىسىدا سەل قىزىرۇپ، سوۋۇغاندىن كېپىن، ئۇنىڭغا pH قىممىتى 4~3 ھالەتكە كەلگۈچە تۇز كىسلاقاتىنى تېمىتىپ، يەنە 2~1 تامچە % 1 لىك تۆمۈر (III) خlorid ئېتلىل ئالکوھول ئېرىتىسى تېمىتقاندا، ئېرىتىم سوْسۇن رەڭىگە كىرىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 pH قىممىتى 7.0~5.0 گىچە بولۇشى (قوشۇمچە G VII) كېرەك.

【باشقىلار】 ئەرمق ياسالىلىرىنى تەيىارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىمىلەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچىسى IS I).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سۈيدۈك ھەيدىمش، كۆزنى روشهنلەشتۈرۈش، يەل ھەيدىمش، ئاغرىق توختىش تەسىرىگە ئىگە. جىنگەر، بۆرەكىنىڭ ئاجزىلىقى، كۆزنىڭ كۆرۈش قۇۋۇقى ئاجزىلاش، سوت ئازىيىش، سوغۇقتىن بولغان ئىشىق قاتارلىقلارغا تىشلىتلىدى.

【تىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 2 قىتمى، ھەر قىتمىدا 30ml~20 دىن ئىچىلىدى.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بوتۇلكىغا 250ml 250 دىن قاچىلىنىدۇ.

【ساقاڭلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، سايى، سالقىن جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0117—98

قۇرسى جاۋارىش ئامىلە

开胃加瓦日西阿米勒片

Kai wei Jia wa ri xi a mi le Pian

【رېتسېپ】

24 g	قىزىلگۈل	16g	بۈمغاقسۇت تۈرۈقى
64 g	تۆمۈر پوقى	16g	ئۇغرىتىكەن
16 g	دارچىن	12g	پوستى تۇرۇنجى
120g	ئامىلە	20g	دېۋەرقايى
12 g	گاۋىربان	16g	فەرمۇنچىمىشكى
10 g	كۈنجۈت يېغى	16g	ھېلىلە پوستى

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 12 خىل دورىدىن كۈنجۈت يېغىدىن باشقا 11 خىل دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئارىلاشتۇرۇپ، ئەلكەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئۇنىڭغا مۇۋاپقىق مىقداردا كۈنجۈت يېغى، مونوسا- خارىد (ئاددىي شېكەر) قىيامى ۋە كراخمال قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، دانىچە قىلىپ قۇرۇقۇپ، ئاندىن ئۇنىڭغا يەنە مۇۋاپقىق مىقداردا قوشۇمچە ماتېرىيالالارنى قوشۇپ، بېسىپ 1000 تال قۇرسى قىلىپ تەيارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا جىڭەرەڭ قۇرستىن ئىبارەت بولۇپ، خۇش پۇرالقىق، تەمى تاتلىمقراق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 20 قۇرسى ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا 10ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، قايىنتىپ فىلترلەپ، فىلترلەنگەن ئېرىتمىدىن 1mlغا ئاز مىقداردا ماڭنىي تالقىنى ۋە 1ml تۇز كىسلاقاتى قوشقاندا، ئېرىتمە تەدرىجىي گىلاس رەڭكە ئۆزگەرىدى.

(2) بۇ دورىدىن 2 قۇرسى ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا 10ml سۇ قوشۇپ ئېرىتىپ، فىلترلەپ، فىلترلەنگەن ئېرىتمىدىن 2ml ئېلىپ، ئۇنىڭ 1ml سىغا 2 تامىچە تۆمۈر (III) خلورىد سىناق ئېرىتمىسى تېمىتىلسا، ئېرىتمە دۇغ قارا رەڭكە ئۆزگەرىدى. يەنە 1mlغا 3 تامىچە ناتىرىي خلور گىلاتىن سىناق ئېرىتمىسى تېمىتىلسا، ئاق رەڭلىك چۆككە ھاسىل بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 قۇرسى ياسالىلىرىنى تەيارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىمىلەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە ID I).

【تەسىرى ۋە ئاپاسىسى داۋالايدىغىنى】 ئىشتىينى ئېچىش، يەل ھەيدىمەش تىمسىرىگە ئىگە. جىڭەر، ئۇت كېسەللەكلىرى پەيدا قىلىدىغان ئاشقازان، قورساق كۆپۈش، ئىشتىها سىزلىق، ھەزم ناچارلىشىش، ئىچ سورۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۇنىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 10 قۇرستىن ئېچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرسىنىڭ ئېغىرلىقى 0.5g

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىدۇ.

قۇرسى كەھرىۋا

止血开日瓦片

Zhi xue Kai ri wa Pian

【رېتىسىپ】

30g	ئەرەب يېلىمى	30g	ئانار گۈلى
4 g	قىزىلگۈل	30g	كەھرىۋا
30g	ھېبى بىلسان	30g	ئىسىمغۇل
25g	خۇنسىيائشان	30g	گىل ئەرمىنى
		30g	كەترا

【ياساش ئۆسۈلى】 يۇقىرىدىكى 9 خىل دورىنى يۈمىشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا مۇۋاپىق مىقداردا مونوساخارىد (ئاددىي شېكەر) قىيامى قوشۇپ، دانىچە قىلىپ قۇرۇتۇپ، بېسىپ 1000 تال قۇرسى قىلىپ ياسىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ قىلغۇچۇج قوڭۇر دەڭلىك قۇرسى بولۇپ، خۇش پۇراقلق، تەمى چۈچۈمەلەك، قىرتاق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 3 قۇرسى ئېلىپ، يۈمىشاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا 5ml ىېفر قوشۇپ، 30 مىنۇت چالغىتىپ چەككىلىپ، ئاندىن فiltىرلىپ، فiltىرلەنگەن ئېرىتمىنى قۇرۇتۇپ، قالدوقلېلىغا 0.5ml ىېفر قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن خۇنسىيائشان سېلىشتۇرۇما دورىسىدىن 0.1g ئېلىپ، ئۇنىڭغا 10ml ىېفر قوشۇپ، 10 مىنۇت چالغىتىپ چەككىلىپ، فiltىرلىپ، فiltىرلەنگەن ئېرىتمىسى سېلىشتۇرۇلدىغان دورىلىق ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۆسۈلى (قوشۇمچە B VI) تەجريبىسى بويىچە، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە ۋە سېلىشتۇرۇلدىغان دورىلىق ئېرىتمە نىڭ ھەرقايىسىدىن 1ml 5 ئېلىپ، نېپىز قەۋەت سىلىتسىسى يېلىم G لىق تالختا ئۇستىگە ئاپىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، خلوروفورم-مېتىل ئىسپىرت (19:1)نى بېسىلدۈرگۈچى قىلىپ بېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، كۈن نۇرىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئۇخشاش دەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 قۇرسى ياسالىملەرنى تىيارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك ھەر قايىسى ئۆلچەمەرگە ئۈيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچىسى ID I).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قورۇش، قان توختىش ۋە ئىچ سۈرۈشنى توختىش تىسىرىگە ئىگە. غەيرىي تەبىئىي خىلىتلار پەيدا قىلغان ھەر خىل قاناش كېسەللىكلەرى (ئاشقازان، ئۇچەي قاناش، قانلىق تەرمەت كېلىش، قان سىيىش) ۋە سۈزۈلما ئىچ سۈرۈشلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈنىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 5~3 قۇرستان ئىچلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرستانىڭ ىېغىرلىقى 0.5g

【ساقلاش】 ئېغىزى ھەم ئېتلىدۇ.

WS₃-BW-0119-98

مہ جوںی نوجاہ

止痛努加蜜膏

Zhi tong Nu jia Mi gao

ریتسب

30g	بەلەلە پوستى	30g	بەلەلە پوستى
30g	قارا ھېلىلە	30g	ئامىلە
15g	بىستى پايىنچ	15g	تۈرۈبۈت
15g	ئۇستقۇددۇس	15g	سېرىق ئۆت تۈرۈقى
3 g	نارمىشكى	9 g	غاريقۇن
3 g	ھۇمامە	3 g	سۈمەمۈل رۇمى
3 g	دورىلىق گاۋىزبان	3 g	كۈندۈر
3 g	رەۋەن	3 g	پوستى تۈرۈنجى
15g	قىزىلگۈل	3 g	زېپەر
		15g	چۈچۈكبۈيا يېلتىز قىيامى

«ياساش ئۈسۈل» يۇقىرىدىكى 19 خل دуرا ئىچىدە زەپەردىن باشقا 18 خل دуرا يۇمشاق سوقۇلىدۇ؛ زەپەرمۇ ئاپىرمىن يۇمشاق سوقۇلۇپ، ئۇنىڭغا مۇۋاپىق مقداردا چەككىلەنگەن ھەسىل 1000g قىلىپ ياسلىدۇ، ئاندىن يۇقىرىدىكى 18 خل دورىنىڭ تالقىنى قوشۇپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ،

«شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» بۇ خۇرماڭلىك مەجۇن دورا بولۇپ، خۇش پۇرالقىق، تەمى تاتلىق كېلىدۇ.

پەرقلەندۈرۈش (1) بۇ دورىدىن 2g ئېلىپ، ئۇنىڭغا 10ml ئاتىپتۇن قوشۇپ، 2 مىنۇت ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، ئاتىپتۇن ئېرىتمىسىنى توڭوۋىلىپ سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن سېلىشتۇرۇلدىغان دورا گاللىك كىسلاقاتىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئاتىپتۇن قوشۇپ، هەر 1mlنىڭ تەركىبىدە 2mg دورا بولغان ئېرىتىھە تەبىيالاپ، سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچىسى B VI) بويىچە، يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر بىرىدىن 1ml شۇمۇرتۇپ ئېلىپ، سلىتىسي يېلىمى G لق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، بىنزاول-ئاتىپ-تون-ئېتىل ئىسپىرت-سەركە كىسلاقاتىسى (1:6:2:2)نى يېيىلدۈرگۈچى قىلىپ يېيىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇقۇپ، ئۇنىڭغا تۆممۇر (III) خلورىد ئېتىل ئىسپىرت ئېرىتمىسى پۇرکۈلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېپىكتەرىدىكى مۇناسىپ ٹۇرۇندا ئوخشاش دەڭلىك داغ نۇقتىسى يېيدا بولىدۇ.

(2) سېلىشتۈرۈش تۈچۈن غارىقۇندىن 0.5g ٹىلىپ، ئۇنىڭغا 10ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، بىر

كېچە چىلاب قويغاندىن كېيىن فiltرلەپ، فiltرلەنگەن ئېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ قۇروتۇپ، قالدوقلىرىغا 2ml مېتىل ئىسىپرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سېلىشتۈرۈلىدىغان دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلەك رەڭ سېبکىر ئۆسۈلى (قوشۇمچە B VII) تەجىرىسىگە ئاساسەن [پەرقەندۈرۈش]نىڭ (1) تۈرىدىكى سناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە ۋە يۇقىرىدا بايان قىلىنغان سېلىشتۈرۈلىدىغان ئېرىتمىنىڭ ھەر بىرىدىن 1μm شۇمۇرتوپ ئېلىپ، سىلىتسىي يېلىمى G لىق نېپىز قەۋەتلەك تاختىنىڭ ئايىرم-ئايىرم نۇقتىسغا تېمىتىپ، (C 60~30) لۇق نېفت ئېپرى-ئېتىل ئاتىپتەن (1:5) نىسبەتتە يېسىلدۈرغۇچى قىلىپ يېسىلدۈرۇپ، شامالدىتىپ قۇروتۇپ، ئۇلترا بىنپىشە نۇرلۇق چراغ (365nm) ئېستىغا قوبۇپ كۆزىتىلىدۇ. سناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېبکىردا، سېلىشتۈرۈلىدىغان دورا رەڭ سېبکىرنىڭ مۇناسىپ ئۇرىنىدا ئوخشاش رەڭلىك يالىرىاق نۇرلۇق داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 مەجۇن ياسالىلىرىنى تەييارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەت بەلكىلىملىرىگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (مەزكۇر ئۆلچەمدىكى 1-قوشۇمچە).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي سەۋدا ۋە سەپىرانى تازىلاش، توسالغۇلارنى ئېچىش، نېرۋىلارنى قۇۋۇقتىلەش تەسىرىكە ئىكە. باش ئاغرىش، قۇلاق غوڭۇلداش، تەشۋىشلىنىش، تۇتقاۋ-لىق، نېرۋا ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 10g~5 ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بوتۇلكىسىغا 100g قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، سايىھە، سالقىن جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0120—98

پىننە گۈلچەنتى

平纳糖膏

Ping na Tang gao

بۇ دورا ھۆل يالپۇز يوپۇرمىقىنى پىشىقلاب نىشىمەش ئارقىلىق ياسالغان مەجۇن دورىدۇر.

【ياساش ئۇسۇلى】 بىگى يالپۇز يوپۇرمىقىدىن 1000g نى بونقا ھالىتكە كەلتۈرۈپ، ئۇنىڭغا 3000g شېكەر قوشۇپ، تەكشى ئاربلاشتۇرۇپ فارفور قاچىغا قاچىلاپ، ئېغىزىنى ھىم ئېتىپ، 40 كۈن ئاپتاتا قويغاندىن كېپىن، ئايىرم قاچىلارغا قاچىلىنىدۇ (ئاپتاتا قويۇش مەزگىلىدە ھەر 10 كۈندە بىر قېتىم تولۇق ئاربلاشتۇرۇلدۇ).

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا ساراغۇچ يېشىل مەجۇن دورا بولۇپ، ئالاهىدە سالقىنلىتىدىغان خۇش يۇراقلقى، تەمى تاتلىق، قېرىقراق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 5g ئېلىپ، ئۇنىڭغا مۇۋاپىق مقداردا دىئاتوست قوشۇپ، تەكشى ئېزىپ، ئاندىن ئۇنىڭغا (60~90°C) لۇق نېفتى ئېغىرىدىن 20ml قوشۇپ، ئېغىزىنى ھىم ئېتىپ، بىر كېچە تۇرغۇرغاندىن كېپىن، فىلترلەپ، فىلترلەنگەن ئېرىتمە پارلاندۇرۇپ قۇروقۇلدۇ، قالدوقلېرىغا 1ml ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق قىلىنگۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ، ئاندىن مېنتول سېلىشتۇرما دورىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml نىڭ تەركىبىدە 2mg دورا تۇتقان ئېرىتمە تېيارلىنىپ، سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكىر ئۇسۇلى (قوشۇقچە VII B) تەجربىسىگە ئاساسەن، يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر بىرىدىن 1ml 10 ئېلىپ، سىلىتسىي بېلىمى 6 لق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىگە ئايىرم-ئايىرم ئېمىتىپ، -n-ھېكسان - ئېتىل ئاتىپاتا (3.17) نى يېسىلدۈرگۈچى قىلىپ يېسىلدۈرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇنىڭغا ئانزىالدېھىد سىناق ئېرىتمىسى يۇرکۈلدۈ ھەمەدە 105°C تا 10 منۇت قىزدۇرۇلدۇ. سىناق قىلىنگۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكىردا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورا رەڭ سېپىكىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا مەجۇن ياسالمىلىرىنى تېيارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىملىرىكە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (مەزكۇر ئۆلچەمدىكى 2- قوشۇمچە).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سوغۇق خىلىتلارنى پىشۇرۇش ۋە تازىلاش، ئاشقازاننى كۈچەيتىش، يۆتەل پەسەيتىش تەسىرىكە ئىگە. ئاشقازاننىڭ سوغۇقى ئېشىپ كېتىشىن بولغان قۇسۇش، كۆكۈل ئېلىشىش، ئاشقازان ۋە قورساق كۆپۈش، ھەزم ناچارلىشىش، زىققە قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 1 قېتىم، ھەر قېتىمدا 20g~10g دىن ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچەمى】 ھەر بىر بوتۇنكىغا 400g دىن قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتىلپ، سالقىن جايىدا ساقلىنىدۇ.

مەجۇنى جاۋارش مەرۋايت

平溃加瓦日西麦尔瓦依特密膏

Ping kui jia wa ri xi Mai er wa yi te Mi gao

【رىتىسىپ】

33. 3g	دارچىن	22. 2g	مەرۋايت
26. 6g	زەنجىۋىل	13. 2g	بەسپاسە
22. 2g	ئاق بەھەمن	11. 1g	ئاقىرقەرە
26. 6g	كۈندۈر	13. 3g	قاقىلە
13. 3g	زورمنباد	22. 2g	قىزىل بەھەمن
66. 6g	سېرىقماي	13. 3g	دۇرنەج ئەقرەبى
13. 3g	شاڭىرەنجى	13. 3g	كەرەپشە ئۇرۇقى
13. 3g	جوپۇز	13. 3g	مىخ دارچىن

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 16 خىل دورا ئىچىدىن زەنجىۋىل، شاتىرەنجى، كەرەپشە ئۇرۇقى، جوپۇز، بەسپاسە، مىخ دارچىن قاتارلىق 6 خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، ئايىرم-ئايىرم حالدا 3 قىتىم، بىرىنچى قىتىمدا 2 سائەت، ئىككىنچى قىتىمدا $\frac{1}{2}$ 1 سائەت، ئۆچىنچى قىتىمدا 1 سائەت قايىتىپ، قايىتىلغان سۇيىنى بىرلەشتۈرۈپ سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىڭ نىسپىي زېلىقى (C 60) 1.35~1.30 بولغانغا قەدەر قويۇلدۇرۇپ، مەلھەم ھالىتىگە كەلتۈرۈلدى. ئاندىن كېيىن سېرىقمايدىن باشقا، قالغان مەرۋايت قاتارلىق 9 خىل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ، ئۇنى يۇقىرىدىكى قويۇق مەلھەم ۋە سېرىقماي بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، ئەنلىكلىك مەجۇن بولۇپ، تەڭشى ئارىلاشتۇرۇپ 1000g قىلىپ تەبىيارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسسىسىتى】 بۇ دورا قارامتۇل قوڭۇر دەڭلىك مەجۇن بولۇپ، تەمى تاتلىق، سەل قېرىق ۋە قىرتاق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 5g ئېلىپ، ئۇنىڭغا 10ml ئېفر قوشۇپ، 5 مىنۇت چالغۇتىپ، چەككىلىپ، 4 سائەت تۇرغۇزغاندىن كېيىن فىلترلەپ، فىلترلەنگەن ئېرىتىمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلۇرىغا 1ml ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. سىنالىدېمىد سېلىشتۇرۇما دورىسىنى ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ھەر 1ml نىڭ تەركىبىدە 1mg دورا بولغان ئېرىتمە تەبىيارلىنىپ، سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى قوشۇمچە VI B لق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم 5m ىېلىپ، سىلىتسىي ئېلىمى G لق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، C 90~60 لۇق نېفتى

ئېغىرى-ئېتىل ئاتىپات (0.3:17)نى يېيىلدۇرۇچى قىلىپ يېيىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇقۇپ، ٹۇنىڭغا دىنسترو فىنلەمەدرازىن ئېتىل ئىسپىرت سىناق ئېرىتىمىسى پۇركۈلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورا رەڭ سېپىكتىرىدا سېلىشتۇرۇلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندادا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا مەجۇن ياسالىلىرىنى تەبىارلاش تۈرىدىكى ھەرقايىسى مۇناسىۋەتلەك بەلكىلىمەركە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (مەزكۇر ئۆلچەمدىكى 1-قوشۇمچە).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 تالنى قۇۋۇمەتمەش، ئاشقازاننى قىزىتىش تەسىرىگە ئىكەن سوغۇقتىن بولغان ئاشقازان ئەغىرىقى، ئىچ ئۆتكۈ، ئىشىهاسلىق، ئاشقازان ۋە 12 بارماق ئۇچەي يارسى، ئادەتلەنكەن بويىدىن ئاجراش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مەقدارى】 كۈنگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 5g~3 دن ئىچلىدى.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بوتۇلكىغا 100g دن قاچىلىنىدى.

【سافلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتىلىدۇ.

شىپائى هەزى بېزى ئىچىمىلىكى

西帕依麦孜彼子口服液

Xi pa yi Mai zi bi zi Kou fu ye

[رېتىپ]

90g	چىمنشى	90g	تۈجىمە
50g	جىنىڭىزى	60g	مېيەن بىشىھە
		40g	كاردىنېيىسا

【ياساش ئۆسۈلى】 يۇقىرىدىكى 5 خىل دورا تۇچىدە مېيەن بىشىدىن باشقا 4 خىل دورىنى ئايىرم-ئايىرم حالدا 3 قېتىم، بىرىنچى، ئىككىنچى قېتىمدا 2 سائەتنىن، تۇچىنچى قېتىمدا بىر سائەت سۇ قۇيۇپ قاينىتىپ، ئاندىن قاينىتلەغان سۈيىنى بىر لەشتۈرۈپ تۇرغۇزۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىمە ئەسلىدىكى دورا هەجمى بىلەن 1:1 بولغانغا قىدرى قوبۇلدۇرۇلدۇ. ئاندىن مېيەن بىشىنى سوقۇپ، يېرىك تالقان قىلىپ، تۇنىڭغا تېتىل تىسپىرت قوشۇپ، هەر قېتىمدا 1 سائەتنىن 3 قېتىم ئايلانما تېقىملق چەككىلەپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىمىنى بىر لەشتۈرۈپ، ئاندىن تۇنى يەنە يۇقىرىدا تەبىيەلەنگەن تۇرۇتىمگە ئارلاشتۇرۇپ، تېتىل تىسپىرتنىڭ مقدارى 70% كەلگۈچە قوشۇپ، 24 سائەت تۇرغۇزغاندە دىن كېيىن، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىدىكى تېتىل تىسپىرت يەغۇبىلىنىدۇ، ئاندىن تۇنىڭغا 0.1% لىك كالىي سوربىك كىسلاتا قوشۇپ، مقدارى 1000ml بولنۇچە سۇ قوشۇپ، تەكشى ئارلاشتۇرۇپ، بوتۇلخىدا بولۇپ قاچىلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قوڭۇر دەڭلىك سۈيۈقلۈق بولۇپ، پۇرىقى خۇشبۇي، تەمىنى تاتلىق، سەل قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 20ml 2 ئېلىپ، هەر قېتىمدا 10ml دىن، 2 قېتىم سۇدا توپۇنغان بۇتىل تىسپىرت بىلەن چالىتىپ تۇرۇپ چەككىلەپ، چەككىلەنگەن تېتىل تىسپىرت تېرىتىمىسىنى بىر لەشتۈرۈپ، سۇسز ناتىرىي سۇلغات بىلەن سۇسزلانىدۇرۇپ، بۇتىل تىسپىرت تېرىتىمىسى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇلدى، قالدوقلەرىغا 1ml مېتىل تىسپىرت قوشۇپ تېرىتىپ، سىناق قىلىنگۇچى تېرىتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن كېيىن سېلىشتۈرۈما قىلىنىدىغان دورا تۇجىدىن 5g ئېلىپ، تۇنىڭغا 60% لىك تېتىل تىسپىرت تېرىتىمىدىن 30ml قوشۇپ، 1 سائەت ئايلانما تېقىملق قىزىتىپ فiltىر لەپ، فiltىر لەنگەن تېرىتىمىنى 10ml غا كەلگۈچە قوبۇلدۇرۇپ، تۇخشاش ئۆسۈل بويىچە سېلىشتۈرۈلدىغان تېرىتىمە تەبىيەلەننىدۇ. ئاندىن جاسمىنويىدىن (Jasminoidin) سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن ئېلىپ، تۇنىڭغا مېتىل تىسپىرت قوشۇپ، هەر 1ml نىڭ تەركىبىدە 2mg دورا بولغان تېرىتىمە تەبىيەلەپ، سېلىشتۈرۈلدىغان تېرىتىمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۆسۈلى (قوشۇمچىسى B VI) تەجىرىبىسىگە ئاساسەن يۇقىرىدىكى 3 خىل تېرىتىمىنىڭ ھەر

بىرىدىن 1m² ئېلىپ، سىلىتىسى يېلىمى G لق نېيىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، ئېتىل ئاتسېتات-سېركە كىسلاتسى-سۇ (4:2:15) نىڭ ئۇستىنىكى قەۋەتىدىكى سۇبىو-قۇلۇقنى يېيلدۈرگۈچى قىلىپ يېيلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇقۇپ، ئۇلترا بىندىشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتىمىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا سېلىشتۈرۈلدىغان دورا رەڭ سېپىكتېرىنىڭ مۇناسىپ ئۇنىدا ئۇخشاشش كۆك رەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ. فوسفومولبىدىك كىسلاتسا ئېتىل ئۇسپىرت سىناق ئېرىتىمىسى پۇركۈلۈپ، داغ نۇقتىسى بىنق كۆرۈنگەنگە قەدر ئىسىق شامال بېرىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتىمىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا سېلىشتۈرۈلدىغان ئېرىتىمىنىڭ رەڭ سېپىكتېرىغا مۇناسىپ ئورۇنىدا ئۇخشاشش كۆك رەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 pH قىممىتى 4.0~6.0 (قوشۇمچە G VII) بولۇشى لازىم.

【نسىپىي زىچلىقى】 1.01 (قوشۇمچە A VII) دىن تۆۋەن بولماسلقى كېرەك.

【باشقىلار】 بۇ دورا مىكستۇرا ياسالىلىرىنى تەيارلاش تۈرمىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىملىرگە (قوشۇمچە J I) ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك.

【تىسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 بەمدىنىڭ ئۇزۇقلاندۇرگۈچى كۈچى، تۇتۇپ تۇرغۇچى كۈچى ۋە چىقىرىش كۈچىنى كۈچىتىش، ئىللەتلەرنى تازىلاش، سۈيدۈك ھېيدىش تەسىرىگە ئىگە. مەزى بېزى ياللۇغى ۋە مەزى بېزى يوغىناشتىن بولغان سۈيدۈكىنىڭ دەممۇدمۇم كېلىشى، سۈيدۈك تېمىپ توختىمالىق، بەل، تىز تېلىش، باش قېيش، كۆز قاراڭغۇلىشىش، ئۇيقۇسىزلىق، قۇلاق غوڭۇلداش، مەنى بالدار كېتىش، ئېھتىلام بولۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 3 قېتىم، ھەر قېتىدا 10ml 1 دىن ئىچلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر ئامپۇلغا 10ml 1 دىن قاچلىنىدۇ.

【سافلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتىلىدۇ.

غار-غار سُويي

西帕依固龈液

Xi pa yi Gu yin ye

بۇ دورا موزىنى پىشىقلاب ئىشلىش ئارقىلىق ياسالغان بىغىز چايقاتش سۇبۇقلۇقدىن ئىبارەت.
【ياساش ئۇسۇلى】 20g موزىنى سوقۇپ يېرىك تالقان قلىپ، سۇ قۇيۇپ، بىر سائەت چىلاپ قويغاندىن كېيىن، هەر قېتىمدا $\frac{1}{2}$ سائەتنىن 3 قېتىم قايىتىپ، قايىتىلغان سۇبۇقلۇقنى بىرلەشتۈرۈپ سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىگە رېتى بوبىچە چەككىلەنگەن ھەمسەلдин 20g، يالپۇز مۇئەتتەردىن 1ml ۋە ناتىرىي بېنزۇئاتىن 5g 0.5ml قوشۇپ، ئارىلاشتۇرۇپ ئېرىتىپ، 1000mlغا كەلگۈچە سۇ قوشۇپ، بوتۇلگىغا بولۇپ قاچىلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا سۇس قوڭۇر رەڭ سۇبۇقلۇق بولۇپ، پۇراقلقى، تەمى قېرىق، سەل تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 1ml ئېلىپ، ئۇنىڭغا 2~1 تامىچە تۆمۈر (III) خلورد سىناق ئېرىتمىسى تېمىتىلسا، ئېرىتمە دەرھال كۆكۈش بىنەپشە رەڭگە ئۆزگەرىدۇ.
(2) بۇ دورىدىن 20ml ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئېتىل ئاتىپتات قوشۇپ، هەر قېتىمدا 10ml 2 دىن 2 قېتىم چالغىتىپ تۇرۇپ چەككىلەنگەن ئېتىل ئاتىپتات ئېرىتمىسىنى بىرلەشتۈرۈپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلۇرىغا 0.5ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ.
ئاندىن گاللىك كىسلاطا سېلىشتۈرۈما دورىسىنى ئېلىپ، ئۇنىڭغا مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، هەر 1ml نىڭ تەركىبىدە 1mg دورا بولغان ئېرىتمە تەيارلاپ، سېلىشتۈرۈلدۈغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچىسى B VI) تەجىرىبىسىگە ئاساسەن، يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتمىنىڭ هەر قايسىسىدىن 1ml 3 ئېلىپ، سلىتىسى يېلىمى G لىق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئاييرىم-ئاييرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، ئېتىل ئاتىپتات-مېتىل ئىسپىرت-فۇرمات كىسلانانسى (0.5:3:0.5) نى بېسىلدۈرگۈچى قلىپ يېلىپ دۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇنىڭغا 1% لىك تۆمۈر (III) خلورد ئېتىل ئىسپىرت ئېرىتمىسى بۇرకۇلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورا رەڭ سېپىكتەرنىڭ مۇناسىپ ئۇرۇندا ئۇخشاش كۆكۈش بىنەپشە رەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 pH قىممىتى 3.5~5.0 (قوشۇمچە II V) بولۇشى كېرەك.

【باشقىلار】 (نسىپىي زىچىلىقتنى باشقا) بۇ دورا مىكსىتۇرا ياسالىلىرىنى تەيارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك هەر قايىسى بەلگىلىسلەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە J I).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 چىش مىلىكىنى چىڭىتىش، قان تازىلاش، ئاغرقىق توختىش تەسىرىگە ئىگە. چىش ئەتراپى كېسەلىلىكلىرىدىن بولغان چىش تاۋىي بوشاب قېلىش، چايىش

كۈچى ئابجىزلاش، چىش مىدىرلاب قېلىش، چىش مىلىكى قانلىش، شۇنداقلا تىل، ئېغىزلارغا جاراھىت چىقىش، گال-بوجۇز ئىشىشپ ئاغرىش، ئېغىز پۇراش، تاماكا سېسىقىنى يوقىتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ. 【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنىكە 3~5 قېتىم، ھەر قېتىمدا تەخمىنەن 3ml دىن غار-غار قىلىنىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بوتۇللىكىغا 30ml دىن قاچلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھەم ئېتلىپ، سالقىن جايىغا قويۇلنىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 غار-غار قىلىپ يۇنۇۋەتسە بولۇپېرىدى. ساقلاش جەريانىدا دورا ئاززاق چۆكىھ بولۇپ قالسا، داؤالاش ئۇنۇمىكە تىسىر يەتمەيدۇ.

قۇرسى شاھته‌رە

百癣夏塔热片

Bai xuan Xia ta re Pian

【رېتىپپ】

30g	ھېلىلە پوستى	180g	شاھته‌رە چىنى
15g	سوقمۇنبا	30 g	بەللىه پوستى
30g	قارا ھېلىلە	42 g	سەبرى

【ياساش ئۆسۈلى】 يۇقىرىدىكى 6 خىل دورىدىن شاھته‌رە چىنىنىڭ 4 ھەمسىسىگە باراۋەر كېلىدىغان 70% لىك ئېتىل ئىسپەرتقا 24 سائىت چىلاپ قويۇپ، قىزىتىپ، ھەر قېتىمدا 1 سائىتتن 3 قېتىم ئايلانمى ئېقىملق چەككىلىپ، چەككىلەنگەن ئېرىتىمىنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمە مۇۋاپىق مقدارغا كەلگۈچە قويۇلدۇرۇلدى. دورا قالدۇقىنى ھېلىلە پوستى، بەللىه پوستى، قارا ھېلىلە قاتارلىقلار بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، ھەر قېتىمدا 1 سائىتتن 3 قېتىم سۇدا قاينىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيىنى بىرلەشتۈرۈپ، مۇۋاپىق مقدارغا كەلگۈچە قويۇلدۇرۇلدى، ئاندىن قويۇلدۇرۇلغان 2 خىل ئېرىتىمىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئىسلەتكى دورىنىڭ مقدارى بىلەن 1:1 نىسبەتكە كەلگۈچە داۋاملىق قويۇلدۇرۇپ، قويۇق مەلھەم قىلىنىدۇ. ئاندىن سەبرى، سوقمۇنیيائى يۈمىشاق سوقۇپ تالقان قىلىپ، ئۇنى يۇقىرىدىكى تېيىارلىغان قويۇق مەلھەم بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، مۇۋاپىق مقداردا قوشۇمچە ماتېرىيال قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانىچە قىلىپ قۇرۇقتۇپ، بېسىپ 1000 قۇرسى قىلىپ، سىرتىغا شېكەر يالىتىپ تېيىارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ، شېكەر يالىتلغان قۇرسى بولۇپ، شېكەر يالىتلغان قىسىنى چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن، قارامتۇل قوڭۇر رەڭلىك كۆرۈفسىدۇ، تەمى قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 10 قۇرسى ئېلىپ، شېكەر يالىتلغان قىسىنى چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن ئېزىپ، ئۇنىڭغا 50ml سۇ قوشۇپ چالغىتىپ ئېرىتىپ، فىلترلەپ، فىلترلەنگەن 5ml ئېرىتىمكە 0.2g بوراكس قوشۇپ، قىزىتىپ ئېرىتىپ، بۇنىڭدىن بىر قانچە تامىچە ئېلىپ، ئۇنىڭغا 30ml سۇ قوشۇپ تەكشى ئارىلاشتۇرۇلسا، بېشىل يالىتراق نۇر كۆرۈنىدۇ. ئۇلترا بىنەپىشە نۇرلۇق چىrag (365nm) ئاستىدا كۆزەتكەندىدە، يورۇق سېرىق يالىتراق نۇر كۆرۈنىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، يەنە فىلترلەنگەن ئېرىتىمدىن 2ml ئېلىپ، ئۇنىڭغا تەڭ مقداردا توپۇنغان بروم سۈبى قوشۇلسا، ئېرىتىمدىن سېرىق رەڭلىك چۆكمە ھاسىل بولىدۇ. فىلترلەنگەن ئېرىتىمدىن يەنە 2ml ئېلىپ، ئۇنىڭغا 2ml نىترات كىسلاقاتىسى قوشۇپ، چالغىتىندا ئېرىتىمە سارغۇچ بېشىل رەڭگە ئۆزگەرىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 3 قۇرسى ئېلىپ، شېكەر يالىتلغان قىسىنى چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن، ئېزىپ ئۇنىڭغا 5ml تۆمۈر (III) خلورىد ئېرىتىمىسى، 1ml سۈبىق تۆز كىسلاقاتىسى قوشۇپ، چالغىتىپ، سۇ

ۋانىسىدا 5 مىنۇت قىزىقاندىن كېيىن سوۋۇتۇپ، ئۇنىڭغا يەنە 10ml كاربون تېترا خلوريد ئېرىتمىسى قوشۇپ، 1 مىنۇت ئاستا چالغىتىلىدۇ، ئاندىن كاربون تېتراوۇكىسىد ئېرىتمىسىدىن 6ml ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئاممىياك سىناق ئېرىتمىسىدىن 3ml قوشۇپ، چالغىقاندا سۈيۈقلۈقنىڭ ئاممىياكلق قەۋىتى قىزىل دەگە كىرىندۇ.

(3) بۇ دورىدىن 10 قۇرسى ئېلىپ، شېكمەر يالىتلغان قىسىمىنى چىقىرىۋەتكەندىن كېيىن ئېزىپ، ئۇنىڭغا 20ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ئۇنى سۇ ۋانىسىدا قايىنغاچە قىزىقاندىن كېيىن، بىر نەچچە مىنۇت چالغىتىپ، فiltرلەپ، فiltرلەنگەن ئېرىتمە سىناق قىلىنغاچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. سېبرى گلىكۆزىد 5mg (ئۇلوئىن) سېلىشتۈرۈما دورىسىنى ئېلىپ، ئۇنىڭغا مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، هەر 1mlنىڭ تەركىبىدە 5mg دورا بولغان ئېرىتمە تەبىارلىنىپ، سېلىشتۈرۈلىدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (V B) تەجربىسىگە ئاساسەن، يۇقرىدىكى 2 خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1m 5 شۇمۇرۇتۇپ ئېلىپ، سېلىتسىي يېلىمى G لىق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، ئېتىل ئاتىپتات-مېتىل ئىسپىرت-سۇ (1.3:1.7:10)نى يېسىلدۈرگۈچى قىلىپ يېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇنىڭغا 10 لىك كالىي ھىدرۆكىسىد ئېتىل ئىسپىرت ئېرىتمىسى پۇرکۈمەندىن كېيىن، ئۇلترا بىنەپىشە نۇرلۇق چىrag (365nm) ئاستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنغاچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىدا سېلىشتۈرۈلىدى-غان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەغا مۇناسىپ ئۇرنىدا ئۇخشاش رەڭلىك يالىتراق نۇرلۇق نۇقتا پەيدا بولىدۇ. 【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تەبىارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىملىرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە ID).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي بەلغىم خىلتى، سەپرا ۋە چىرىگەن قاننى تازىلاش، ئىشىق ياندۇرۇش، ئاغرىق توختىش تەمسىرگە ئىنگە. قول-پۇت تەمرەتكىسى، بەدەن تەمرەتكىسى، گۈللۈك تەمرەتكە، تەڭگە تەمرەتكە كېسىلى، زىيادە سەزگۈرلۈكتىن بولغان تېرە ياللۇغى، بەلۋاگىسمان قوقاق، دانخورەك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 5~3 قۇرستان ئىچىلىدۇ. 【سافلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتىلىدۇ.

قۇرسى ئىمساك

伊木萨克片

Yi mu sa ke Pian.

【رېتىسىپ】

14 g	ئىپار	40g	كۈندۈر
48 g	بۇقا چۈيىسى	24g	زېپەر
48 g	جوپۇز	4 g	ئەنبىر
160g	قەلمىپۇر	34g	خولىنجان
24 g	كۈچۈلە(پىشىقلانغان)	72g	سۆئلىپ
		60g	خەشخاش پوستى

【باساش ئۇسۇلى】 بیوقىرىدىكى 11 خل دуرا ئىچىدە خەشخاش پوستىغا سۇ قوشۇپ، ھەر قىتمىدا 1 سائەتتىن 2 قىتم قاينىتىپ، قاينىتىلغان سۈيىنى بىر لەشتۇرۇپ سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىمنى 200ml قالغۇچە قويۇلدۇرۇپ تېيارلىنىدۇ. ئاندىن ئىپار، زېپەر، ئەنبىر قاتار لەقلارنى ئايىرمى-ئايىرمى يۇمشاق سوقۇپ، كۈندۈر قاتار لەق قالغان 7 خل دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئاندىن بۇ دуرا تالقانلىرىنى تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، خەشخاش پوستىنىڭ قويۇلدۇرۇلغان تېرىتىمىسى بىلەن دانىچە قىلىپ، سايىدا قۇرۇتۇپ، بېسىپ 1000 قۇرسى قىلىپ ياسلىدى.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دуرا ساراغۇچ كۈل رەڭ بولۇپ، تەمى سەل تاتلىق كېلىدۇ.
 【پەرقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 2 قۇرسى ئېلىپ ئېزىپ، ئۇنىڭغا 0.5% لىك تۇز كىسلاتا ئېتىل ئىسپىرت تېرىتىمىدىن 15ml قوشۇپ، 30 منۇت ئىسىق سۇغا چىلغاندىن كېيىن فىلتەرلەپ، فىلتەرلەنگەن تېرىتىمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇلىدۇ، قالدوقلەرىغا 5% لىك تۇز كىسلاتا تېرىتىمىدىن 10ml قوشۇپ تېرىتىپ، ئۇنى 3 پىروپىركىغا بولۇپ، ئاندىن ئۇنىڭغا ئايىرمى-ئايىرمى بىسمۇت كالىي يودىد سىناق تېرىتىمىسى، يود-كالىي يودىد سىناق تېرىتىمىسى ۋە سىلىكوتۇنگىستىك كىسلاتا سىناق تېرىتىمىسى قوشۇلغاندا ئېرىتىمە ئايىرمى-ئايىرمى مالدا قىزغۇچ كاۋا چىچىكى رەڭ، قوڭۇر رەڭگە ئۆزگىرىدۇ ۋە ئاق رەڭلىك چۆكمە ھاسلىق قىلىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 2 قۇرسى ئېلىپ يۇمشاق ئېزىپ، ئۇنىڭغا خلوروفورم-ئېتىل ئىسپىرت (1:10) ئارىلاشما تېرىتىمىدىن 5ml ۋە قويۇق ئاممىياك سىناق تېرىتىمىدىن 0.5ml قوشۇپ چالغىتىپ، 2 سائەت تۇرغۇزغاندىن كېيىن فىلتەرلەپ، فىلتەرلەنگەن تېرىتىمە سىناق قىلىنぐۇچى تېرىتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن سىترىخىنىن سېلىشتۇرۇما دورىسىنى ئېلىپ، ئۇنىڭغا مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml نىڭ تەركىبىدە 2 دورا بولغان تېرىتىمە تېيارلىنىپ، سېلىشتۇرۇلغان ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتە

ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) تەجريبىسىگە ئاساسەن، سىناق قىلىنىدىغان ئېرىتمىدىن 1مىز 20، سېلىشتۈرۈلدى. خان ئېرىتمىدىن 1مىز 10 شۇمۇرتۇپ ئېلىپ، ئاندىن سىلتىسى بىلم G لق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، ئاممىياك هورىدا 30 مىنۇت توپۇندۇرغاندىن كېيىن، مېتىل بېنزوول-ئاتسبى-تون-ئېتىل ئىسپەرتى-قويۇق ئاممىياك سىناق ئېرىتمىسى (0.4: 0.6: 5: 0.4)نى بىيىلدۈرگۈچى قىلىپ، بىيىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، تۇنىڭغا سۇيۇق بىسمۇت كالىي يودىد سىناق ئېرىتمىسى پۇركۈلۈدۇ. سىناق قىلىنگۈچى ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېپېكتىرىدا سېلىشتۈرۈلدىغان ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېپېكتىرىدىكى ئۆزىگە مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

(3) سېلىشتۈرۈلدىغان دورا خەشخاش پوستىدىن 2g ئېلىپ، تۇنىڭغا 20ml مېتىل ئىسپەرت قوشۇپ، 30 مىنۇت ئايلانما ئېقىملق چەككىلەپ، فiltرلەپ، فiltرلەنگەن ئېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلەرىغا 1ml مېتىل ئىسپەرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سېلىشتۈرۈلدىغان دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپېكتىرى ئۆسۇلى (قوشۇمچە B VI) تەجرىبىسىگە ئاساسەن، [پەرقەندۈرۈش] نىڭ (2) دە كۆرسىتلەنگەن سىناق قىلىنگۈچى ئېرىتمىدىن 1مىز 20 ۋە يۇقىرىدىكى سېلىشتۈرۈلدىغان دورا ئېرىتمىدىن 10 ئېلىپ، سىلتىسى بىلەپ، لق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، ئاممىياك هورىدا 30 مىنۇت توپۇندۇرغاندىن كېيىن، بېنزوول-ئاتسبۇن-ئېتىل ئىسپەرت-ئاممىياك سۇيى (20: 3: 1)نى بىيىلدۈرگۈچى قىلىپ بىيىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، تۇنىڭغا سۇيۇق بىسمۇت كالىي يودىد سىناق ئېرىتمىسى پۇركۈلۈدۇ. سىناق قىلىنگۈچى ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېپېكتىرىدا سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپېكتىرىدىكى ئۆزىگە مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرس ياسالىلىرىنى تەبىارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە I D).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 بۆرەكىنى قۇۋۇمەتلىش، باھنى كۈچەيتىش، مەنىيىنى كۆپىي-تىش ۋە مەنىي تۇتۇش تەسىرىگە ئىگە. جىنسىي ئاجىزلىق، مەنىي بالدار كېتىش، مەنىي ئېقىپ كېتىش، سىيىپ بىتىش ۋە نېرۋا ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە بىر قىتىم، كەچتە 3~2 قۇرستان تاماقتنى كېيىن ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرستان ئېغىرلىقى 0.5g

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، سالقىن، قۇرغاق جايىدا ساقلىنىدۇ.

ئەنجىباھار شەربىتى

血宁安吉杷尔糖浆

Xue ning An ji ba er Tang jiang

【ربىتىپ】

320g

ئاڭ سەندەل

280g

ئەنجىباھار

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 2 خىل دورىنى ھەر قېتىمدا $\frac{1}{2}$ 1 سائەتنىن 2 قېتىم سۇدا قايىنتىپ،

چەككىلىپ، بىرلا ۋاقتى 300ml دىستىللەنگەن سۇيۇقلۇق يىغۇبلىنىدۇ، ئاندىن قايىنتىلغان سۇيۇقلۇقنى بىرلەشتۈرۈپ، سۇزۇپ، سۇزۇلگەن تېرىتىمىنى مۇۋاپىق مقدارغا كەلگۈچە قويۇلدۇرغاندىن كېپىن ئۇنىڭغا 600g ساخاروزا قوشۇپ ئارلاشتۇرۇپ، تېرىتىپ ھەمde 700ml قالغۇچە قويۇلدۇرۇپ، سوۋوچۇپ، ئاندىن ئۇنىڭغا يۇقىرىدىكى دىستىللەنگەن سۇيۇقلۇق ۋە 15% لىك بېنزوئىك كىسلاتا قوشۇپ، تەكشى ئارلاشتۇرۇپ، 1000ml قىلىپ تەبىارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قىزغۇچ قوڭۇر رەڭلىك بېشقاڭ سۇيۇقلۇقتىن ئىبارەت بولۇپ، پۇرېقى خۇشبۇي، تەمى تاتلىق، سەل قىرتاق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 1ml ئېلىپ، ئۇنىڭغا 1ml سۇ قوشۇپ، تەكشى ئارلاشتۇرۇپ، ئۇنىڭغا يەنە 3 ~ 2 تامىچە تۆمۈر (III) خلورىد سىناق تېرىتىمىسى تېمىتىلا، تېرىتىمە قېنىق يېشىل رەڭكە ئۆزگەرىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 20ml ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئېفر قوشۇپ، ھەر قېتىمدا 20ml 20 دىن، 2 قېتىم چالغىتىپ تۇرۇپ چەككىلىپ، چەككىلىنگەن ئېفر سۇيۇقلۇقنى بىرلەشتۈرۈپ، قۇرۇتۇپ، قالدۇقلۇرىغا يەنە 1ml ئېفر قوشۇپ تېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى تېرىتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن ئاڭ سەندەل مېسى سېلىشتۇرما دورىسىنى ئېلىپ ئۇنىڭغا ئېفر قوشۇپ، ھەر 1ml نىڭ تەركىبىدە 1ml 10 دورا بولغان ئېرىتىمە تەبىارلىنىپ سېلىشتۇرۇلدىغان تېرىتىمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپكىتەر ئۇسۇلى (قوشوچە B VI) تەجىرىبىسىكە ئاساسەن، يۇقىرىدىكى ئىككى خىل تېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml 5 شۇمۇرۇتۇپ ئېلىپ، سىلىتىسى يېلىمىي G لق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، C 90 ~ 60 لۇق نېفت ئېفرى-ئېتىل ئاتىپتات (3:17)نى يېلىلدۈرگۈچى قىلىپ يېلىلدۈرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇنىڭغا P -دى مېتىل ئامىنۇ بېنزاڈىھەن تېرىتىمىسى (P-D) مېتىل ئامىنۇ بېنزاڈىھەدىن 0.25g ئېلىپ، ئۇنى 50ml سرکە كىسلاتسىدا تېرىتىپ، ئۇنىڭغا 5ml فوسفات كىسلاتسى، 20ml سۇ قوشۇپ تەكشى ئارلاشتۇرۇلدۇ) پۇرکۈپ، C 90 ~ 80 تا تەخمىنەن 5 منۇت قاقلىنىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ

رهڭ سېپىكتىرىدا سېلىشتۈرۈلەتىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىب ئورۇندا ئوخشاش كۆكۈش بىنەپشە، دەگلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【نەكشۇرۇش】 pH قىممىتى 3.5~5.0 (قوشۇمچە G VII) بولۇشى كېرىدەك.

1.20 دن (قوشومچه A VII) دن تۆھن بولماسلقى لازىم. **【نسىپى زىچلىقى】**

【باشقىلار】 بۇ دورا شەربىت ياسالىلىرىنى تەييارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىملىرگە ئۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە H I).

«تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋلايدىغىنى» قان توختىش تەسىرىگە ئىكەن. هەر خل قان يوقىتىش (قان تۈكۈدۈش، قان سىيىش، چوڭ تەرمەتن قان كېلىش، قان قۇسۇش، بالياتقۇ فاناش، بۇرۇن قاناش قاتارلىق) لارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 3 قېتىم، 1 قېتىمدا 15ml ~ 10 دىن ئىچىلىدۇ.

ئۆلچەمى ھەر بىر بوتۇلكىغا 200ml 200 دن قاچىلىنىدۇ.

ساقلاش ئېغىزى هىم ئېتلىپ، سالقىن، قۇرغانق جايغا قويۇللىدۇ.

نانخا جەۋەھرى

行气那尼花颗粒

Xing qi Na ni hua Ke li

[رېتىپ]

60g	سيادان	60 g	جۇۋىنە (نانخا)
27g	جوپۇز	60 g	زىره
27g	زەنجۇقىل	27 g	ئارپىبەدىيان
60g	پىننە	60 g	زۇپا
60g	مەرزەنجۇش	27 g	ئىكىر
27g	كەرەپىشە تۈرۈقى	27 g	بەسپاسە
		120g	يالپۇز

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقرىدىكى 13 خىل دورا ئىچىدە زۇپا، پىننە، زىره، ئارپىبەدىيان، يالپۇز قاتارلىق 5 خىل دورىنى چەككىلەپ، ئۇنىڭ ئۇچۇچان مېسى يېلىنىدۇ. دىستىللەنگەندىن كېيىنكى تېرىتمىسى باشقا قاچىغا يېغىۋېلىنىدۇ، دورا قالدۇقنى قالغان جۇۋىنە (نانخا) قاتارلىق 8 خىل دورا بىلەن ئاربلاشتۇرۇپ، بىرىنچى قېتىمدا $\frac{1}{2}$ سائەت، ئىككىنچى قېتىمدا $\frac{1}{2}$ 1 سائەتنىن 2 قېتىم سۇدا قايىتىپ، قايىتىلغان سۈيىنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتمىنى يۇقرىدا تەبىيارلىغان سۈلۈق تېرىتمىسى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، ئۇنىڭ نىسپىي زىچلىقى 1.32~1.35 (C) كە كەلگۈچە قوبۇلدۇرۇپ مەلھەم قىلىنىدۇ. ئاندىن مەلھەمدىن بىر ئۇلۇش ئېلىپ، ئۇنىڭغا 4 ئۇلۇش ساخاروزا، بىر ئۇلۇش دېكىستىرن قوشۇپ دانىچە قىلىپ، قۇرۇقۇپ، ئۇنىڭغا يۇقرىدا تەبىيارلىغان ئۇچۇچان ماینى پۇركۈپ، تەكشى ئاربلاشتۇرۇپ، 1000g قىلىپ تەبىيارلانسا بولىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا سارغۇچ قوڭۇر ياكى قارامتۇل قوڭۇر رەڭلىك دانىچىدىن ئىبارەت بولۇپ، تەمى تاتلىق، سەل قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 5g ئېلىپ، ئۇنىڭغا 15ml 1% قوشۇپ، 20 منۇت ئايلانما ئېقىملق چەككىلەنگەندىن كېيىن فىلترلىپ، فىلترلىنگەن تېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، ئاندىن قالدۇقلەرىغا 1 لىك ۋانىلىن سۇلۇفات كىسلاتا تېرىتمىسىدىن 2ml قوشۇلسا، تېرىتمە تەدرىجىي قىزىلگۈل رەڭگىگە تۆزگۈرىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 2g ئېلىپ، ئۇنىڭغا 15ml سۇ قوشۇپ تېرىتىپ، ئۇنىڭغا يەنە 15ml بۇتلۇ ئىسپىرت قوشۇپ چالغىتىپ تۇرۇپ چەككىلەپ، چەككىلەنگەن بۇتلۇ ئىسپىرت تېرىتمىسى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇلىدۇ، قالدۇقلەرىغا 2ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ تېرىتىپ، ئۇنىڭغا 5% لىك ناترىي نىترات تېرىتمىسى ۋە

10% لىك ئالىيۇمن نىرات ئېرىتىمىسىنىڭ ھەر قايىسىدىن 3 تامىچە تېمىتىپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، ئۇنىڭغا يەنە 5 تامىچە ناتىرىي ھىدروكىسد سىناق ئېرىتىمىسى تېمىتىلسا، ئېرىتىمە قىزىل رەڭگە كىرىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا دانىچە (جەۋەھەر) ياسالىلەرنى تەبىارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىدە.

لىمەلەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە C I).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 جىڭەرنى ئاسراش، ئىشتەينى ئېچىش، يەل ماڭدۇرۇش، ئاغرقى توختىتىش، بالىياتقۇنى قىزىتىش تەسىرىنگە ئىگە، ئاشقازان، ئۆچھەي يووللىرى كېسەللىكلەرى، جىڭەر ياللۇغى، ئۆت خالتا ياللۇغى، ئاياللاردىكى تۇغماسلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 6g دىن قابىنالىق سۇغا چىلاب ئىچلىنىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر خالتسىغا 12g 12 دىن قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىنىدۇ.

تهنكار كاپسولى

行气坦尼卡尔胶囊

Xing qi Tan ni Ka er Jiao nang

رېتىپ

قارىمۇچ	230. 4g	سەبىرى
مىڭدىۋانه ئۇرۇقى	28. 8 g	تهنكار

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 4 خىل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكسى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، كاپسۇلغا قاچىلانسا بولىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ كاپسۇللىق دورا بولۇپ، ئىچىدە سېرىق پاراشوك بار، تەمى قېرىق ۋە ئاچىچىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) 5 تال كاپسۇلىك ئىچىدىكى پاراشوكىنى ئېلىپ، ئۇنىڭغا 20ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، سۇ ۋاننىسىدا قىزدۇرۇپ قايىتىپ، بىر نەچىچە منۇت چالغىقاندىن كېيىن، فىلتىرلەپ، فىلتىرلەنگەن ئېرىتمە سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. سەبرە گلىكوزىد- (ئالوئىن) سېلىشتۇرما دورىسىنى ئېلىپ، ئۇنىڭغا مېتىل ئىسپىرت ئېرىتمىسى قوشۇپ، هەر 1ml 1نىڭ تەركىبىدە 5mg دورا بولغان ئېرىتمە تەبىيارلىنىپ، سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلىك رەڭ سېپتەر ئۇسۇلى (قوشۇمۇچە VI) تەجربىسىكە ئاساسەن، يۇقىرىدا تەبىيارلانغان 2 خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml 5 ئېلىپ، سلىتسىي بېلىمى G لىق نېبىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، ئېتىل ئاتىستات-مېتىل ئىسپىرت-سۇ (1:1.3:1.7:10)نى بىسىلدۇرغۇچى قىلىپ بىسىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇنىڭغا 10 لىك كالىي ھيدروكىسد مېتىل ئىسپىرت ئېرىتمىسى پۈركۈپ، ئۇلترا بىنەپشە نۇرلۇق چىragۇ (365nm) ئاستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپتەردا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپتەرىدىكى مۇناسىپ ئۇرفۇندا ئوخشاش دەگلىك يالتراتق نۇر داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

(2) 1.5g دورا پاراشوكىغا 10ml سۇسز مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ئۇلترا ئۇۋازدا 20 منۇت بىر تەرىپ قىلىپ، فىلتىرلەپ، فىلتىرلەنگەن ئېرىتمە سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن قارىمۇچ ئىشقاىرى (پېپرىن) سېلىشتۇرما دورىسىنى قوڭۇر دەگلىك بوتۇلکىغا سېلىپ، ئۇنىڭغا سۇسز مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ھەر 1ml 1نىڭ تەركىبىدە 4mg دورا تۇتقان ئېرىتمە تەبىيارلىنىپ، سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلىك رەڭ سېپتەر ئۇسۇلى (قوشۇمۇچە VI) تەجربىسىكە ئاساسەن، يۇقىرىدىكى ئىككى خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml 2 شۇمۇرلۇپ ئېلىپ، سلىتسىي بېلىمى G لىق نېبىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، بېنزوول-مېتىل ئاتىستات-ئاتىستون (7:2:1)نى بىسىلدۇرغۇ-چى قىلىپ بىسىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇنىڭغا 10 لىك سۇلغاتات كىسلاشاتا مېتىل ئىسپىرت

پۈركۈپ، داغ نۇقتىلىرى ئېنىق كۆرۈنگەنگە قەدەر ئىسىق شامال بېرىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىب ئورۇندادا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا كاپسۇل دورىلىرىنى تەبىارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىملىك رەڭ ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە L I).

【ئەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يېل ھېيدىم، چوڭ تەرتىنى راۋانلاشتۇرۇش، ئاغرقى توختىش تەسىرىگە ئىگە. ئىشتىهاسى تۇتۇلۇش، قورساق كۆپۈش، قەۋزىيەت قاتارلقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 1 قېتىم، ھەر قېتىمدا 3 كاپسۇلدىن ئىچىلىدۇ.

【دىققەت】 ھامىلدارلار ۋە ئاشقازان يارىسى بار كېسەللەر ئىچىشكە بولمايدۇ.

【ئۇلچىمى】 ھەر بىر كاپسۇلغا 0.3g دىن قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىدى.

قۇرسى لوغانزىيا

行滞罗哈尼孜牙片

Xing zhi Luo ha Ni zi ya Pian

【رېتسىپ】

ئادراسىمان	ئۇرۇقى	سېرىق	ئوت	ئۇرۇقى
كۈدە	ئۇرۇقى	يالپۇز		
كەرمىشە	ئۇرۇقى	ئاچىققى	ئەمەن	
قارىمۇچ		پىلىپ		
زەپەر		دارچىن		
ئاچىقتاۋۇز		غارىقۇن		
خىربىق سىياه		ھەببۈلغار		
ئۇستقۇددۇس		ئۆشىنە		
مۇقەل		جىنتىياناچىنى		
سەبرى		ئاقمۇچ		
جاۋوشىر		جوئىدە		
سەكىنەج		بىسىتى	پايەنج	
قۇندۇز قەھرى		پەرپىيۇن		
سوقۇمنىبا		مۇرمەككى		
زەنجۇلىل		سۇمبۇل	تىب	

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 30 خىل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، ئۇنىڭغا مۇۋاپىق مىقداردا چەككىلەنگەن ھەسەل ۋە سۇ قوشۇپ، دانىچە قىلىپ فۇرۇتۇپ، بىسىپ 1000 قۇرسى قىلىپ ياسلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قارامتۇل قوڭۇر رەڭلىك قۇرسىدىن ئىبارەت بولۇپ، تەمى سەل قېرىق كېلىدۇ.

【پەقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 5g نى يۇمىشاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا 20ml ئېتىل ئاتىپات قوشۇپ، چالىقىناندىن كېيىن بىر كېچە چىلاب قويۇپ، فىلترلەپ، فىلترلەنگەن ئېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلۇرىغا 1ml ئېتىل ئاتىپات قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. غارىقۇنىنىڭ سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن 0.5g ئېلىپ، ئوخشاش ئۇسۇل بىلەن سېلىشتۈرۈلىدىغان دورىلىق ئېرىتمە تەبىارلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىتىر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) تەجرىبىسىگە ئاساسەن، يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتمىنىڭ ھەرقايىسىدىن 5μl شۇمۇرتۇپ ئېلىپ، سىلىتىسى يېلىمى G لىق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، C 60~30 لۇق نېفت ئېفرى-ئېتىل ئاتىپات

(1:5) نى يېيىلدۇرغۇچى قىلىپ يېيىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنەپشە نۇرلۇق چراغ (365nm) ئاستىدا كۆزتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندა ئوخشاش رەڭلىك يالىراق نۇر دىغى پەيدا بولىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 10g نى يۇمىشاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا 30ml خلوروفورم قوشۇپ، ئۇغىزىنى ھم ئېتىپ چالغىتىپ، بىر كېچە سوغۇق سوغۇغا چىلاپ، فىلتر لېپ، فىلتر لەنگەن ئېرتىمىنى قۇرۇتۇپ، قالدوقلېرىغا 1ml خلوروفورم قوشۇپ ئېرتىپ سىناق قىلىنぐۇچى ئېرتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن پېلىپ سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن 5g 0. ئېلىپ، ئۇنىڭغا 10ml خلوروفورم قوشۇپ، ئوخشاش ئۇسۇل بىلەن سېلىشتۈرۈلدىغان دورا ئېرتىمىسى تەبىارلىنىدۇ. ئېبىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتىر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VI) تەجربىسىكە ئاساسەن، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرتىمىدىن 1m²، سېلىشتۈرۈلدىغان دورىلىق ئېرتىمىدىن 1m² 10 شۇمۇر توب ئېلىپ، سېلىتسىي يېلىمى G لق نېبىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، n-ھېكسان-خلوروفورم-ئېتىل ئاتىپاتا (2:3:1) نى يېيىلدۇرغۇچى قىلىپ يېيىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، سۇيۇق بىسمۇت كالىي يودىد سىناق ئېرتىمىسى پۇركۈلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندა ئىككى دانه ئوخشايدىغان سېرىق داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تەبىارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە D).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يەل ھەيدىم، تۆگۈنلەرنى يېشىش، خىلىتلارنى تەڭشىپ، راۋانلاشتۇرۇش تەسىرىگە ئىكە. پۇت-قول ئۇيۇشۇش، بەرمس، ئاڭ داغ، لەقۋا، ئۇلتۇرغۇچۇ نېرۋا ئاغرىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 7~5 قۇرسى ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرسىنىڭ ئېغىرلىقى 0.5g

【ساقلاش】 ئۇغىزى ھم ئېتىلىپ، سايى، سالقىن قۇرغانق جايىغا قويۇلۇدۇ.

قۇرسى جاۋارىش زەرئۇنى

壮 益 加 瓦 日 西 再 尔 吾 尼 片

Zhuang yi Jia wa ri xi zai er wu ni Pian

【رېتىسىپ】

11. 25g	زەنجىمۇل	33. 75g	ئەرمۇدۇن ئۇرۇقى
33. 75g	سۇندى	11. 25g	ئاقمۇچ
33. 75g	قىزىل بەھمن	33. 75g	ئاق بەھمن
11. 25g	خولىنجان	33. 75g	تەرتىز
11. 25g	مېخ دارچىن	33. 75g	تىيەندەڭ
8. 75 g	سۇمبۇل تىب	30 g	سازاج ھىندى
		11. 25g	پىلىپ

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 13 خىل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، ئۇنىڭغا مۇۋاپىق مقداردا مونوساخارىد (ئاددىي شېكەر) قىيامى قوشۇپ، دانىچە قىلىپ، قۇرۇتۇپ، بىسىپ 1000 قۇرسى قىلىپ ياسىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك قۇرسى بولۇپ، پۇرىقى خۇشبۇي، تەمى سەل تاتلىق، ئاچىچق كېلىدۇ.

【پەرقەندەرۈش】 بۇ دورىدىن 5 قۇرسى ئېلىپ، يۇمىشاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا 10ml ىېغىر قوشۇپ، 30 مىنۇت چالغىتقاندىن كېيىن، فiltىرلەپ، فiltىرلەنكەن ئېرىتمىنى پارلاندەرۈپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلېلىغا 1ml ىېغىر قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن قارىمۇچ ىشقارى (پىپېرىن) سېلىشتۇرما دورىسىنى ئېلىپ، ئۇنىڭغا سۇسز ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml نىڭ تەركىبىدە 4mg دورا تۇتقان ئېرىتمە تەبىيارلىنىپ سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) تەجىرىبىسىگە ئاساسەن، يۇقىرىدىكى ئىككى خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 2ml شۇمۇرۇتۇپ ئېلىپ، سىلىتىسى يېلىمى G لق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئاييرىم-ئاييرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، بىنزوول-ئېتىل ئاتىپتۇن (1: 2: 7) نى يېلىلدۈرگۈچى قىلىپ يېلىلدۈرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇنىڭغا % 10 لىك سۇلغات كىسلاتا ئېتىل ئىسپىرت ئېرىتمىسى پۇرکۈپ، داغ نۇقتىلىرى ئېنىق كۆرۈنگەنگە قەدر ئىسىق شامال بېرىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىدا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئۇخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرس ياسالىلىرىنى تەبىيارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىملەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە I D).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 نۇرغۇن ئەزالارنى قۇۋۇھتلەش تەسىرىگە ئىگە. سوغۇق

يەلنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن بولغان بەل ئاغرىش، جنسىي تىقىدارى ئاچىزلاش، مەنىي ئېقىپ كېتىش، مەنىي بالدۇر كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 2 قىتىم، ھەر قىتىمدا 10 قۇرستىن ئىچىلىدۇ.
【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرسىنىڭ بېغىرلىقى 0.5g
【ساقلاش】 بېغىزى ھىم ئېتىلىدۇ.

قۇرسى جاۋارىش ئۇدىتۇرۇش

安胃加瓦日西吾地吐如西片

An wei jia wa ri xi wu di tu ru xi Pian

[رېتسېپ]

40 g	لاچىندانە	6 g	ئۇد ھىندى
20 g	پىننە	20g	زېرىق مېۋسى
20 g	سۇمبۇل تىب	20g	پوستى تۇرۇنچى
20 g	قەلمىپۇر	20g	مەستىكى رۇمى
20 g	دارچىن	20g	سۇنىدى
20 g	زەرنىب	20g	قاقلە
20 g	تاباشىر	20g	ئاق سەندەل
10 g	پىلىپىل	20g	ئاسارۇق چىنى
240g	تەمرى ھىندى	40g	لەمون كىسلاقاتىسى
20 g	تۈكۈلۈك رەبەن	10g	زەنجۇپىل

【ياساش ئۆسۈلى】 يۇقىرىدىكى 20 خىل دورىنىڭ ئىچىدە زېرىق مېۋسى، لەمون كىسلاقاتىسى، تەمرى ھىندىلەردىن باشقما، ئۇد ھىندى قاتارلىق 17 خىل دورىنى يۈمىشاق سوقۇپ، ئاندىن زېرىق مېۋسى، تەمرى ھىندى قاتارلىقلارنى 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 1 سائەتتنىن سۇدا قايىنتىپ، سۈپىنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىنى قويۇق مەلھەم ھالىتىگە كەلگۈچە قويۇلدۇرۇپ، ئۇنىڭغا يەنە شېكەر، لەمون كىسلاقاتىسى قوشۇپ، ئاندىن ئۇنى يۇقىرىدا تەبىيارلىغان دورا تالقىنى بىلەن تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانىچە قىلىپ قۇرۇتۇپ، بېسىپ 1000 قۇرسى قىلىپ تەبىيارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ سېرىق رەڭلىك قۇرۇستىن ئىبارەت بولۇپ، پۇرنىقى خۇشبۇي، تەمى سەل تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 20 قۇرسى ئېلىپ، ئۇنىڭغا 10ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، 40 مىنۇت قىزدۇرغاندىن كېيىن فiltىرلەپ، فiltىرلەنگەن ئېرىتىمىسىدىن 1ml غا ئاز مىقداردا ماڭىنى تالقىنى ۋە 1ml تۈز كىسلاقاتى قوشقاندا، ئېرىتىمە تەدرىجىي قىزىل رەڭگە ئۆزگىرىدۇ.

(2) يۇقىرىدىكى فiltىرلەنگەن ئېرىتىمە سىناق قىلىنغاچى ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن پوستى تۇرۇنچى-نىڭ سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن 0.5g ئېلىپ، ئۇنىڭغا 10ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، 40 مىنۇت ئايىلانما بېقىمدا قىزدۇرغاندىن كېيىن، فiltىرلەپ، فiltىرلەنگەن ئېرىتىمە سېلىشتۈرۈلدىغان ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) تەجىرىبىسىگە ئاساسەن، يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml شۇمۇرتۇپ ئېلىپ، سلىتىسى يېلىمى G لق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى

ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، خلوروفورم-مېتيل ىسىپرت-سو (32:17:5) نىڭ ئاستىنلىكى ئېرىتمىنى بىيىلدۈرگۈچى قىلىپ بىيىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇنىڭغا 1% لىك ئالىومىن (III) خلورىد ئېتىل ىسىپرت ئېرىتمىسى پۈركۈپ، ئۇلترا بىنەپىشە نۇرلۇق چىrag (365nm) ئاستىدا كۆزتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۈچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئۇرۇندادا ئوخشاش رەڭلىك يالىراق نۇرلۇق داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

(3) بۇ دورىدىن 15 قۇرسىنى يۇمىشاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا 20ml ئېتىل ئاستىنلىك قوشۇپ، 12 سايىت سوغۇق سۇغا چىلاپ، فiltرلەپ، فiltرلەنگەن ئېرىتمىنى قۇرۇتۇپ، قالدوقلەرىغا 2ml ئېتىل ئاستىنلىك قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۈچى ئېرىتمىھ قىلىنىدۇ. ئاندىن قەلمەپۇر سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن 0.5g ئېلىپ، ئوخشاش ئۇسۇل بىلەن سېلىشتۈرۈلدىغان ئېرىتمىھ تەبىارلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتىر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VI) تەجربىسىگە ئاساسەن، يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml شۇمۇرتۇپ ئېلىپ، سىلىتسىي بىلىمى 6 لق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، مېتيل بېنزاول-ئېتىل ئاستىنلىك-فورمات كىسلاتسى (1:8:1)نى بىيىلدۈرگۈچى قىلىپ بىيىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، 5% لىك ۋانلىن سۇلغات كىسلاتا ئېرىتمىسى پۈركۈپ، C 105 تا 5 منۇت قاقلىنىدۇ. سىناق قىلىنぐۈچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئۇرۇندادا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تەبىارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە ID).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئاشقازانىدىكى غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تارقىتىش، تاماقنى ھەزم قىلدۇرۇش، يەل ھەيدىم، ئاغرىق توختىش تەسىرىگە ئىگە. ھۆل سوغۇقنىڭ ئېشىپ كېتىشىدىن بولغان ئاشقازان ئافرىش، ئىچ سۈرۈش، قورساق كۆپۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 7~5 قۇرسى ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرسىنىڭ ئېغىرلىقى 0.5g

【ساقلاش】 ئېغىزى ھەم ئېتىلىدۇ.

ماهراں کاپسولی

玛木然止泻胶囊

Ma mu ran Zhi xie Jiao nang

【رېتىسىپ】

40g	خۇنسىياۋشان	40 g	ماهرانچىنى
40g	كۈندۈر	40 g	كەترا
4 g	ئىسبىغۇل	120g	موزا
40g	تاباشر	40 g	ھېليلە پوستى
40g	بەللىھ پوستى	120g	يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى
40g	زىرىق مېۋسى	40 g	ئانار گۈلى
40g	ئانار پوستى	40 g	قارا ھېليلە

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 14 خىل دуرا ئىچىدىن موزا، كۈندۈر، كەтра، تاباشر، يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى، خۇنسىياۋشان قاتارلىق 6 خىل دуرا يۇمىشاق سوقۇلدۇ، ماهرانچىنى قاتارلىق قالغان 8 خىل دورىنى 3 قېتىم، هەر قېتىمدا 1 سائەتنىن سۇدا قايىنتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمنى بىرلەشتۈرۈپ، نىسپىي زىچلىقى (C₈₀) 1.30~1.40 غا كەلگۈچە قويۇلدۇرۇپ، قويۇق مەلھەم قىلىپ، ئاندىن ئۇنى يۇقىرىدا تەبىارلىغان دуرا تالقىنغا تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانىچە قىلىپ قۇرۇتۇپ، 1000 دانە كاپسۇلغا قاچلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ كاپسۇللىق دуرا بولۇپ، ئىچىدە قىزغۇچ قوڭۇر رەڭلىك دانىچە بولىدۇ. تەمى قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىنىڭ دانىچىسىدىن 1.5g 1.5ml 20ml ٹېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، 10 منۇت ئايلانما ئېقىلىق قىزدۇرغاندىن كېيىن فiltىرلەپ، فiltىرلەنگەن ئېرىتىمنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، ئاندىن قالدۇقلۇرىغا 5% لىك تۇز كىسلاتا ئېرىتىمىسىدىن 5ml قوشۇپ ئېرىتىپ، فiltىرلەپ، فiltىرلەنگەن ئېرىتىمنى 3 پروبرىكىغا بولۇپ، ئۇنىڭغا ئاييرىم-ئاييرىم هالدا بىسۇت كالىي يودىد-يود-كالىي يودىد ۋە سلىكۆۋەلفرام كىسلاتسى سىناق ئېرىتىمىسى تېمىتىلسا، ئېرىتىمde ئاييرىم-ئاييرىم هالدا جۈزە رەڭ، قوڭۇر رەڭ ۋە ئاڭ چۆكمە ھاسىل بولىدۇ.

(2) بۇ دورىنىڭ دانىچىسىدىن 0.6g 0.6ml 5ml سۇ قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، فiltىرلەپ، فiltىرلەنگەن ئېرىتىمكە 3~2 تامىچە 5% لىك تۆمۈر (III) خلورىد ئېرىتىمىسى تېمىتىلسا، ئېرىتىمە سۆسۈن رەڭلىك چۆكمە ھاسىل قىلىدۇ.

(3) بۇ دورىنىڭ دانىچىسىدىن 3g 3ml 30ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، 30 منۇت ئايلانما

ئېقىملق قىزدۇرغاندىن كېيىن فiltىرلەپ، فiltىرلەنگەن ئېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلىرىغا 15ml سۇ قوشۇپ ئېرىتىپ، فiltىرلەپ، فiltىرلەنگەن ئېرىتمىگە ئېتىل ئاتىپتات قوشۇپ، هەر قىتىمدا 10ml دىن 2 قىتىم چەككىلەپ، چەككىلەنگەن ئېتىل ئاتىپتات قوشۇپ، هەر قىتىمدا 10ml ئايرىۋېلىپ، pH قىمىتىنى نېپتال ھالىتكە ئەكىلىپ، بۇتىل ئىسپىرت بىلەن ھەر قىتىمدا 20ml دىن 2 قىتىم چالغىتىپ تۇرۇپ چەككىلەپ، چەككىلەنگەن بۇتىل ئىسپىرت ئېرىتمىسىنى بىرلەشتۈرۈپ، ئاندىن پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلىرىغا 1ml ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن بېرىپرىن تۇز كىسلاطا سېلىشتۈرۈما دورىسىنى ئېلىپ، ئۇنىڭغا مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ھەر 1ml نىڭ تەركىبىدە 0.5mg 0.5 دورا تۇتقان ئېرىتمە تېيارلاپ، سېلىشتۈرۈلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېيىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) تەجربىسىگە ئاساسەن، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمىدىن 1ml، سېلىشتۈرۈلدىغان ئېرىتمىدىن 1ml 6 شۇمۇرتۇپ ئېلىپ، سلىتىسى يېلىمى G لق نېيىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقىغا تېمىتىپ، بۇتىل ئىسپىرت-سەركە كىسلاتسى-سۇ (2.5: 1: 7)نى بېيلدۇرغۇچى قىلىپ بېيلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنەپىشە نۇرلۇق چراغ (365nm) ئاستىدا كۆزتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) تەجربىسىگە ئاساسەن، سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ (365nm) ئاستىدا كۆزتىلىدۇ. رەڭ سېپىكتەرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئۇخشاش سېرىق رەڭلىك يالتراق داغ نۇقىسى پەيدا بولىدۇ.

(4) [پەقلەندۈرۈش] نىڭ (3) سىدىكى ئېتىل ئاتىپتات قوشۇمچە ئېرىتمىسى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇلۇپ، قالدوقلە-رىغا 1ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىلىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن خۇنسىياۋاشن سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن 1g 0.1 ئېلىپ، ئۇنىڭغا 10ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، 20 منۇت ئايلانما ئېقىملق قىزدۇرغاندىن كېيىن فiltىرلەپ، فiltىرلەنگەن ئېرىتمە سېلىشتۈرۈلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېيىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) تەجربىسىگە ئاساسەن، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە ۋە سېلىشتۈرۈلە-دىغان ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىسىدىن 1ml 5 شۇمۇرتۇپ ئېلىپ، سلىتىسى يېلىمى G لق نېيىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقىغا تېمىتىپ، بېنزوول-ئېتىل ئاتىپتات-مېتىل ئىسپىرت-ئىزۋىپ-روپانول-ئاممىياك سىناق ئېرىتمىسى (6: 3: 1.5: 1.5: 0.5)نى بېيلدۇرغۇچى قىلىپ بېيلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنەپىشە نۇرلۇق چراغ (365nm) ئاستىدا كۆزتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئۇخشاش جۈزە رەڭلىك يالتراق نۇر داغ نۇقىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا كاپسۇل ياسالىلىرىنى تېيارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە I).

【تەسلىقى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 چىرىگەن قانى تازىلاش، غەيرىي تېبئىي سەپىرا ئۇلغى-پەسىپەتىش، ئىچ سۈرۈشنى توختىش تەسىرىگە ئىگە. قورساق ئافرىش، تولغاق، قۇسۇش، ھەزم قىلىش ناچارلىشىش قاتارلقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنىگە 3 قىتىم، ھەر قىتىمدا 3 كاپسۇلدىن ئىچلىنىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر كاپسۇلغا 0.3g دىن قاچلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، قاراڭغۇ جايىدا ساقلىنىدۇ.

قۇرسى كېرىت

克比热提片

Ke bi re ti Pian

【رېتىپ】

44g	ئەرمب بىلىمى	178g	گۈڭگۈرت (كېرىت)
89g	ئاقىر قەرها	89 g	نۇشۇدۇر
		89 g	فولىڭ

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 5 خىل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ ئىلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى مارلاشتۇرۇپ، ئاندىن ئۇنىڭغا مۇۋاپق مىقداردا مونوساخارىد (ئاددىي شېكەر) قىيامى قوشۇپ، دانچە قىلىپ قۇرۇتۇپ، بېسىپ 1000 قۇرسى قىلىپ ياسىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ ئېقىش كۈل رەڭ قۇرستىن ئىبارەت بولۇپ، تەمى تۇزلىق، قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىنى مىكروسكوپتا كۆزەتكەنده: رەتسىز، شاخسىمان، رەڭسىز، مونەك بولۇپ كۆزەنىدۇ. خلورال هىدرات ئېرىتمىسى بىلەن ئۇچراشسا ئېرىپ كېلىدۇ. باكتېرىيە يېچىلىرى رەڭسىز ياكى سۇس قوڭۇر رەڭلىك بولۇپ، دىئامېتىرى $6\sim4\mu\text{m}$ كېلىدۇ، تىش ھۇجىبىرە توپلاشقان ياكى تارراقى حالىتتە بولۇپ، كاۋاڭ ئېرىقىچىسى ئېنىق، شەكلى چاسىراق، ئۆچبۇرجهك ياكى كۆپ تەرمېلىك بولىدۇ. ئۇزۇنلۇقى $30\sim110\mu\text{m}$ ، كەڭلىكى $20\sim50\mu\text{m}$ كېلىدۇ، ئۆتكۈزگۈچى نېچىسى تورسىمان بولۇپ، دىئامېتىرى $90\mu\text{m}$ كېلىدۇ. رەتسىز، ئۇشاق پارچىسىمان، ئاق رەڭلىك ياكى ئېقىش كۈل رەڭ كېلىدۇ، رەتسىز دانچىلىرى سېرىق، پارقراق، چۇرسى تۇتۇق قارا رەڭلىك كېلىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تەبىيارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرىك (قوشۇمچە ID I).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قانى تازىلاش تەسىرىگە ئىگە. چاقا-جاراھەت، لىمفا سلى، مەقىت ئاقىسى، ھەر خىل تېرىھ تەمرەتكىسى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 3~2 قۇرستىن ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرستىك ئېغىزلىقى 0.5g.

【ساقلالش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىدۇ.

WS₃-BW-0134-98

قۇرسى سۇزاب

苏孜阿甫片

Su zi a pu Pian

【رېتىپ】

500g	ئەڭلىكىوت	500g	سۇزاب
		500g	ئاچچىق ئەمەن

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 3 جىل دورىنى 2 قېتىم، 1-قېتىمدا $\frac{1}{2}$ سائىت، 2-قېتىمدا 2 سائىت سۇدا قايىتىلىغان سۈينى بىرلەشتۈرۈپ، سۇزاب، سۇزاب لەن ئېرىتىمە قويۇلدۇرۇلدۇ، ئاندىن ئۇنىڭغا مۇۋاپىق مىقداردا قوشۇمچە ماتېرىيال قوشۇپ، دانىچە قىلىپ قۇرۇتۇپ، بېسىپ 1000 قۇرسى قىلىپ، شېكىر يالىتىپ ياسىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا شېكىر يالىتىلغان قۇرسى دورا بولۇپ، ئۇستىدىكى يالىتىلغان شېكىرى چىقىرىۋېتىلسە، كۈل دەڭ ساراغۇچ رەڭلىك بولىدۇ. تەمى قېرىق ۋە قىرتاق كېلىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تەيىارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلەك بەلكىلىمەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرمەك (قوشۇمچە ID).

【ندىسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قاننى جانلاندۇرۇش، توسالغۇلارنى ئېچىش، يەل ھەيمى دەمش، تېرىدىكى پىگەپتىلارنى كۆپەيتىش تەسىرىگە ئىگە. ئارتابىيە قېتىشىش، تاجىسمان ئارتابىيەلىك يۈرەك كېسىلى، جىڭىر كېسەللەكلىرى، بەرمس، ئىشىق، ئاشقازان كېسەللەكى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۆنگە 3 قېتىم، هەر قېتىمدا 6~4 قۇرستان ئىچىلىدۇ.
【سافلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتىلىدۇ.

بۇزورى جەۋەرى

护肝布祖热颗粒

Hu gan Bu zu re Ke li

【رېتىپ】

كەرمىشە ئۇرۇقى 212g	كاسىنە ئۇرۇقى 212g	كەرمىشە يىلتىزى 106g	كەرمىشە ئۇرۇقى 53 g	سېرىق ئوت ئۇرۇقى 212g	ئارىپىدەيىان يىلتىز پۇستى 106g
					ئارىپىدەيىان

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 7 خىل دورىنى 3 قېتىم، 1-قېتىمدا 2 سائىت، 2-قېتىمدا $\frac{1}{2}$ سائىت، 3-قېتىمدا بىر سائىت سۇدا قاينىتىپ، ئاندىن قاينىتلغان ئېرىتىمىنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىنىڭ نىسپىي زېچلىقى (50°C) $1.32 \sim 1.35$ لق حالەتكە كەلگۈچە قوپۇلدۇرۇلدۇ. ئاندىن ئۇنىڭ بىر هەسىسىكى 4 ھەسىسە ساخاروزا، بىر ھەسىسە دېكىستىرىن قوشۇپ، دانىچە قىلىپ، قۇرۇتۇپ 1000g قىلىپ ياسىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا سارغۇچۇ قوڭۇر رەڭلىك دانىچە دورىدىن ئىبارەت بولۇپ، تەمى تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 2g ئىلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا 10ml سۇ قوشۇپ ئېرىتىپ سۈزۈلدى، ئاندىن سۈزۈلگەن ئېرىتىسىدىن 1mlغا 3 تامىچە % 1 لىك تۆمۈر (III) خلوريد تېمىتىسا، ئېرىتىمە قىنق كۆك رەڭگە ئۆزگىرىدۇ. 3 تامىچە ئاممىياكلىق سۇ تېمىتىسا، ئېرىتىمە قارامتول قىزىل چۆكىمە ھاسىل بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقما، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتىمىنى فىلتر قەغىزىگە تېمىتىپ، ئۇلترا بىنەپىشە نۇرلۇق چىراغ (365nm) ئاستىدا كۆزەتكەندە، كۆك يالىتراق نۇر پىيدا بولىدۇ. قويۇق ئاممىياك ئېرىتىمىسى تېمىتىسا، سېرىق رەڭلىك يالىتراق نۇرغا ئۆزگىرىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا دانىچە ياسالىملەرنى تەبىيەلەش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىملىك كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە IC).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 جىڭەر، ئاشقازاننى قۇۋۇملىمەش، يەل ھەيدىمەش، ئاغرىقى توختىش، ئۆتىنى راۋانلاشتۇرۇش، سۇنى ھەيدىمەش تەسىرىگە ئىكە. جىڭەرنىڭ سوغۇقلۇقى بېشىش، ئاشقازان ئاغرىش، تال توسوٽلۇش، بېقىن ئاغرىش، بوغۇم-تۇستخانلار ئاغرىش، رېماتىزم كېسىلى، سۈيدۈك ئاجرىتىش سىستېمىسى كېسەللەكلىرى قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنىگە 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 6g دىن قايناق سۇغا چىلاپ سېچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر خالتىغا 12g قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 بېغىزى ھىم ئېتلىلىدۇ.

مەلھى بۇۋاسىر

肛宁巴瓦斯尔软膏

Gang ning Ba wa si er Ruan gao

【رېتسىپ】

60g	موزا	60g	ئانار پوستى
60g	مامراңچىنى	60g	سۇسز زەمچە
30g	مەرۋايسىت	60g	چۆپچىن
10g	بىكىيەن	60g	ئەڭلىكىوت
		5 g	ئېپىون تابلېتى

【ياساش ئۇسۇلى】 يۈقرىدىكى 9 خىل دورا ئىچىدىن ئېپىون تابلېتى، سۇسز زەمچە، مەۋايت قاتارلىقلارنى ئىنتايىن يۇمىشاق سوقۇپ، ئانار پوستى، موزا، ئەڭلىكىوت، مامراڭچىنى، چۆپچىن قاتارلىقلارنى يېرىك سوقۇپ، 500g كۈنجۈت يېغىنى °C 130~120 غىچە قىزۇرۇپ، ئاندىن ئۇنىڭغا ئانار پوستى قاتارلىق دورا تالقىنى بىر تەھەپتىن ئارىلاشتۇرۇپ تۇرۇپ، بىر تەھەپتىن ئاستا قوشۇپ، °C 150 غىچە داۋاملىق قىزۇرۇپ، 30 مىنۇت تۇرغۇزۇپ، 3 قەۋەت داكىدىن ئوتکۈزۈلدى. ئاندىن سۈزۈلگەن سۈيىنى يۈقرىدىكى يۇمىشاق سوقۇپ تەيارلانغان ئېپىون تابلېتى قاتارلىقلار بىلەن تەكشى ئارىلاشتۇرۇلدى. ئاندىن تۆگە لوكا يېغىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، قىزىتىپ ئېرىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن قالدۇقنى چىقىرىۋېتىپ، يۈقرىدا تەيارلغان كۈنجۈت يېغىغا 1000ml بولغۇچە قوشۇلدى، ياغ سوۋۇغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا يەنە يۇمىشاق سوقۇلغان بىكىيەننى ئاستا قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ تەيارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 دورا قىزغۇچۇ قوڭۇر رەڭلىك مەلھەم بولۇپ، بىكىيەننىڭ پۇرۇقى بار.

【پەرقەلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن مۇۋاپىق مىقداردا ئېلىپ، مىكرو سۇبلىماتسىيلىگەندىن كېيىن، سۇبلىماتسىيلەنگەن ئاق رەڭلىك ماددىغا 2~1 تامىچە يېڭىدىن تەيارلانغان % 1 لىك ۋانلىن سۇلفات كىسلاڭتاسى تېمتىلسا، تېمتىلغان ئۇرۇنىنىڭ ئەتراپى تەدرىجىي قىزىلگۈل رەڭگىكە كىرىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 20 ئېلىپ، ئۇنىڭغا 10ml سۇسز ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ئېزىپ، ئۇستىگە سۈزۈلگەن ئېرىتمىسىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلەرىغا 2ml سۇسز ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن ئەڭلىكىوت سېلىشتۇرۇما دورىسىدىن 5g 0.5 ئېلىپ، ئۇنىڭغا 5ml ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، 1 سائەت چىلاب قويغاندىن كېيىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلەرىغا 1ml ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) تەجريبىسىگە ئاساسەن، يۈقرىدىكى 2 خىل ئېرىتمىنىڭ هەر قايىسىسىدىن 1ml شۇمۇرتۇپ ئېلىپ، سلىتىسى يېلىمى 5 لىق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرمى-ئايىرمى نۇقتىغا تېمىتىپ، مېتىل بېنزوول-ئېتىل ئاتىسىتات-فورمات كىسلاڭتاسى (1:5:4) نى يېسىلدۈرگۇ-

چى قىلىپ بىيىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرقۇقۇپ، ئۇنىڭغا 10% لىك كالىي هىدروكىسىد مېتىل ئىسپىرت ئېرىتمىسى پۇركۈلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورا رەڭ سېپىكتىرىدا سېلىشتۈرۈلىدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدۇ.

كى مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا مەلھەم ياسالىلىرىنى تەيارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىملىرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە R I).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قان تەڭشىش، قان توختىش، ئىشىشىق ياندۇرۇش، ئاغرىق توختىش تەسىرىكە ئىكە. يەرلىك ئورۇندىكى قاننىڭ چىرىشى، غەيرىي تەبىئىي ئىشقا لىق بەلۇم خىلىتىن بولغان ھەر خىل مەقەمت، ئۈچەي كېسەللەكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 كېسەللەنگەن ئورۇنغا سىرتىدىن چىپلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بوتۇلكىغا 10g دىن قاچىلىنىدۇ.

【سافلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، سالقىن جايىغا قويۇللىدۇ.

【دىقەت】 ئەپىيون تابلىتى بۇ ئەپىيون تالقىنىدىن بىسىپ ياسالغان دورا بولۇپ، تەركىبىدىكى مورفىن ($C_{17}H_{19}NO_3$) نىڭ مىقدارى ئۆلچەملىك مىقدارنىڭ 90.0 ~ 110.0% ئۆلچىمى: ھەر بىر تابلىتى 0.03g بولۇشى كېرەك. [چىخىملىك دورا ئۆلچىمى (1986) نىڭ 59-بېتىدە]

WS₃—BW—0137—98

قۇرسى مۇقەل

肛康穆库利片

Gang kang Mu ku li Pian

【رېتىسىپ】

60g	بەللىه	پوستى	60g	ھېلىله	پوستى
60g	ئامىلە		60g	قارا ھېلىله	
60g	مۇقەل		60g	كەھرىۋا	
60g	سەدەپ	قېپى	60g	بىخ	مارجان

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 8 خىل دورا ئىچىدە مۇقەلنى ئايىرمى يۇمشاق سوقۇپ، بىخ مارجان، سەدەپ قېپىنى سوقۇپ ئۇشاق پارچىلاپ، ئىسىز چوغۇ ئۇستىگە قويۇپ ياكى مۇۋاپىق قاچىغا سېلىپ تاۋاپ، بوشتىپ، سوۋوتقاندىن كېيىن ئۇنى قالغان ھېلىله پوستى قاتارلىق 5 خىل دورا بىلەن يۇمشاق سوقۇپ، ئاندىن يېڭى كۈدىدىن 500ml شەربەت سىقىپ چىرىپ، يۇقىرىدا تەبىيارلانغان دورا تالقىنى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، دانىچە قىلىپ قۇرۇتۇپ، ئۇنىڭغا مۇۋاپىق مىقداردا قوشۇمچە ماتېرىيال قوشۇپ، بېسىپ 1000 قۇرسى قىلىپ ياسلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ سۇس قوڭۇر رەڭلىك قۇرستان ئىبارەت بولۇپ، تەمى سەل قېرىق، چۈچۈمەل قىرتاق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنى مىكروسكۆپتا كۆزەتكەندە: تاش ھۈجەيرىسى ئۆزۈنچاڭ تۇخۇم-سیمان، رەتسىز بولۇپ، ئۆزۈنلۈقى 200~300 μm ، كەڭلىكى 20~100 μm ، كالتىسى ئۆكسالات دەستە كەرسىتالى بىر قەدمەر چوڭ بولۇپ، دئامېتىرى 120 μm ~15 μm كېلىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 5gنى يۇمشاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا 10ml ئاتىپتون قوشۇپ، 10 مىنۇت چالغىتىپ، بىر كېچە چىلاپ قويۇپ فىلترلەپ، فىلترلەنگەن ئېرىتىملىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلۇرۇغا 5ml ئاتىپتون قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتىملىقىلىنىدۇ. گاللات كىسلاتا سېلىشتۇرما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئاتىپتون قوشۇپ، ھەر 1mlنىڭ تەركىبىدە 1mg 1mg بولغان ئېرىتىمە تەبىارلىنىپ سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتىملىك قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) تەحرىبىسىكە ئاساسەن، يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتىملىك ھەر قايىسىدىن 10 μm 10 μm شۇمۇرۇتۇپ ئېلىپ، سلىتىسى يېلىمى G لىق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرمى ئۇقتىغا تېمىتىپ، بېنزوئل-ئاتىپتون-ئېتىل ئىس-پېرت-سېركە كىسلاقاتىسى (1:2:6) نى بېسىلەدۇرغۇچى قىلىپ بېسىلەدۇرۇپ، ئاندىن شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇنىڭغا 1% لىك تۆمۈر (III) خلورىد ئېتىل ئېپىرت ئېرىتىمىسى پۇركۈلدۈ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورا رەڭ سېپىكتەرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاش رەڭلىك داغ

نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تېبىارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلەك بەلگىلىملىك كەنگەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە ID I).

【تەسلىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي سەۋانى تازىلاش، ئىشىق ياندۇرۇش، ئۇغۇرقى توختىش، قان توختىش تەسلىرىگە ئىگە. بۇۋاسىر مەقىمەت يېرىلىش، چوڭ تەرتىن قان كېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 3 قېتىم، هەر قېتىمدا 7~5 قۇرسى ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 هەر بىر قۇرسىنىڭ ئېغىرلىقى 0.5g

【ساقاڭلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىدى.

WS₃—BW—0138—98

ھەبۈلئاس شەربىتى

肠安艾布力阿斯糖浆

Chang an Ai bu li a si Tang jiang

بۇ دورا ھەبۈلئاسنى پىشىقلاب تىشلىش ئارقىلىق ياسالغان شەربىت دورىدۇر.

【ياساش ئۆسۈلى】 ھەبۈلئاسنى سوقۇپ يېرىك تالقان قىلىپ، ئۇنىڭدىن 70g 7ىلىپ، 2 سائەت سۇدا قايىتىپ، فiltىرلەپ، فiltىرلەنگەن ئېرىتىمىنى 12 سائەت تۇرۇغۇزۇپ، يەنە فiltىرلەپ، فiltىرلەنگەن ئېرىتىمىسىگە ساخاروزىدىن 650g قوشۇپ، قايىتىپ، 0.15% لىك بىزۋىتكى كىسلاتا تېمىتىپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، ئۇمۇمىي مىقدارى 1000ml بولۇچە سۇ قوشۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قارامتۇل قوڭۇر رەڭلىك يېپىشقاق ئېرىتىمە بولۇپ، تەمى تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەندەرۇش】 (1) بۇ دورىدىن 10ml 7ىلىپ، ئۇنىڭغا 10ml بۇتللۇق ئىسپىرت قوشۇپ، چالغىتىپ تۈرۈپ چەككىلەپ، بۇتللۇق ئىسپىرت ئېرىتىمىسىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلۇرىغا 2ml 2 ئىتلى ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، ئۇنىڭغا ئاز مىقداردا ماڭىنى تالقنى قوشۇپ، ئۇنىڭغا يەنە 4~2 تامىچە تۈز كىسلاتاسى تېمىتىسا، ئېرىتىمە قىزىل رەڭگە ئۆزگەرىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 2ml 2 ئىتلىپ، ئۇنىڭغا 1 تامىچە 1% لىك تۆمۈر (III) خلورىد ئېرىتىمىسى تېمىتىسا، ئېرىتىمە قارا قىزىل رەڭگە ئۆزگەرىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 pH قىممىتى 4.5~3.5 گىچە بولۇشى كېرەك (قوشۇمچە G VII).

【نىپى زىچلىقى】 1.23 (قوشۇمچە A VII) تىن تۆۋەن بولماسلىقى كېرەك.

【باشقىلار】 بۇ دورا، شەربىت ياسالىملىرىنى تەبىيالاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىملىرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە H I).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئاشقازاننى قۇۋۇھتلەمش، ئۈچەينى ياخشىلاش، قۇسۇش ۋە ئىچ سۈرۈشنى توختىش، جاراھەت ئېغىزىنى قورۇش، قان توختىش تىسىرىگە ئىگە. غەبىرىي تېبىئىي بەلغىم خىلىتىدىن بولغان قۇسۇش، ئىچ سۈرۈش، چوڭ تەرمىتىن قان كېلىش، بالىياتقۇ قانلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە 3 قىتىم، هەر قىتىمدا 20ml~10 دىن ئىچلىنىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بوتۇلکىغا 100ml دىن قاچلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئىتلىپ، سالقىن، قۇرغاق جايىغا قويۇلىدۇ.

سۇفۇبى قەشىپ

疗癬卡西甫散

Liao xuan Ka xi pu San

【رېتىسىپ】

48g	تومۇر دورىسى	48 g	مامارانچىنى
48g	چۆپچىن	400g	ئاڭ كۈنجۈت

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 4 خىل دورىنى ئايرىم-ئايرىم يۇمشاق سوقۇپ، يەنە 400g ناۋاتى سوقۇپ، ھەممىسىنى تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ ياسىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا سارغۇچ كۈل رەڭ تالقان بولۇپ، تەمى قېرىق، سەل تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 5g گا 10ml مېتىل تىسپىرت قوشۇپ، 15 مىنۇت چالعىتىپ تۈرۈپ چەككىلىپ، ئاندىن فىلتىرلەپ، فىلتىرلەنگەن ئېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇلدى، قالدوقلېرىغا 1ml مېتىل تىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن بېرىرىن ھىدروخلورود سېلىشتۇرما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا مېتىل تىسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml نىڭ تەركىبىدە 0.5mg دورا بولغان ئېرىتمە تەبىارلىنىپ سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VI B) تەجريبىسىگە ئاساسەن، يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1μg ئېلىپ، سىلىتسىي تىلىمى G لق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، ئاممىياك پارىدا 30 مىنۇت توپۇندۇرغاندىن كېيىن، بېنزو-ئېتىل ئاتىپتات-مېتىل تىسپىرت-ئىزوبروپانول-سو (0.1:0.5:0.5:0.5) ئى بېسىلدۇرۇغۇچى قىلىپ بېسىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنەپشە نۇرلۇق چىراغ (365nm) ئۇستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردىكى مۇناسىپ ئۇرۇندا ئۇخشاش رەڭلىك يالتراق نۇرلۇق داغ نۇقتىسى پېيدا بولىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 2g گا 10ml خلوروفورم قوشۇپ، 2 سائىت چىلەپ قويغاندىن كېيىن، فىلتىرلەپ، فىلتىرلەنگەن ئېرىتمىنى قۇرۇتۇپ، قالدوقلېرىغا 1ml خلوروفورم قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن سېسامىن ۋە β-ستوستېرول سېلىشتۇرما دورىسىنى ئېلىپ، ئۇنىڭغا خلوروفورم قوشۇپ، ئايرىم-ئايرىم ھالدا ھەر 1ml نىڭ تەركىبىدە 2mg دورا بولغان ئېرىتمە تەبىارلىنىدۇ، بۇ سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VI B) تەجريبىسىگە ئاساسەن، يۇقىرىدىكى 3 خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1μg شۇمۇرتۇپ ئېلىپ، سىلىتسىي تىلىمى G لق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، سكلو ھېكسل-ئېفر-ئېتىل ئاتىپتات (0.5:1.1:4) ئى بېسىلدۇرۇغۇچى قىلىپ بېسىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇنىڭغا 10% لىك

سۇلغات كىسلاقا ئېتىل ئىسىرت ئېرىتىمىسى پۈركۈپ، داغ نۇقتىلىرى ئېنىق كۆرۈنگەنگە قەدەر ئىسىق شامال بېرىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا سېلىشتۈرۈلىدىغان ئېرىتىمنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدە كى ئايىرم-ئايىرم مۇناسىپ ئورۇندادا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىسى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا سۇفۇپ ياسالىلىرىنى تەبىارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىملىك رەگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك (قوشۇمچە I B).

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 ئۇشقارلىق غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتنى تازىلاش، ھۆللۈكى قۇرۇتۇش، قىچىشىنى توختىش تەسىرىگە ئىگە. تېرە قىچىشىش، بەدەن تەمرەتكىسى، تەڭگە تەمرەتكە قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنىگە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 10g 10 دن ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر خالىتغا 10g 10 دن قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئۇغۇزى ھەم ئېتلىپ، قۇرغاق جايغا قويۇنىلىدۇ.

قۇرسى كاكنەج

尿通卡克乃其片

Niao tong Ka ke nai qi Pian

【رېتسېپ】

تەرخەمەك ئۇرۇقى	ئەرەب يېلىمى	40g
كاكنەج	كۈندۈر	40g
چۈچۈكبۇيا يېلتىز قىيامى	كەتىرا	40g
ئەپپىون	تاتلىق بادام	4 g
خۇنسىباۋشان	كەرمەپىش ئۇرۇقى	40g

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى ئۇن خىل دورىدىن كاكنەجتنى باشقا تەرخەمەك ئۇرۇقى قاتارلىق 9 خىل دورىنى يۇمشاق سوقۇپ تالقانلىنىدۇ. كاكنەج ھەر قېتىمدا بىر سائەتنىن 3 قېتىم سۇدا قايىنتىلىدۇ. ئاندىن كېپىن قايىنتىلغان تېرىتىمىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىمىسىنى قويۇلدۇرۇپ، مەلھەم ھالىتىگە كەلتۈرۈلدى. ئاندىن يۇقىرىدىكى يۇمشاق تالقان ۋە مونوساخارىد (شېكەر) قىيامى، مۇۋاپىق مقداردا كراخمال ئارىلاشتۇرۇلۇپ دانىچە تەيارلاپ، قۇرۇتۇپ، بېسىپ 1000 قۇرسى ياسلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قىزغۇچۇڭ قوڭۇر رەڭلىك قۇرسى بولۇپ، پۇرۇقى سەل خۇشبوۇي، تەممى تاتلىق، سەل قېرىقراق بولىدۇ.

رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) بويىچە يۇقىرىدىكى ئىككى خىل تېرىتىمنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سىلىتسىبىه يېلىمى 6 لىق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقىغا تېمىتلىپ خلورفورۇم، مېتىل ئىسپىرت (9:1)نى بىيىلدۈرگۈچى قىلىپ بىيىلدۈرۈپ، شامالىدە تىپ قۇرۇتۇلدى. سىناق قىلىنگۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۇرما دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئۇرۇندا تۇخشاش رەڭلىك داغ توچكىلىرى كۆرۈندۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى تۈرىگە ئالاقدار ھەر تۈرلۈك بەلگىلىملەر (قوشۇمچە D I) گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئاغرىق توختىتىپ، سۈيىدۈك راۋانلاشتۇرۇدۇ. سىيگەندە ئاغرىش، تولۇق سىيەلمەسىلىك، قان سىيىش، سۈيىدۈك يۈلىدىن يېرىنڭ كېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ. 【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنگە ئىككى قېتىم، ھەر قېتىمدا 5~3 قۇرسى ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرسى 0.5g.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىدۇ.

WS₃-BW-0141-98

ئانار يۈستى تازىلىق سۇيۇقلۇقى

阿娜尔妇洁液

A na er Fu jie Ye

			رېتسېپ【
90 g	بىخ مارجان	150g	ئانار پوستى
200g	شېچۇڭىزى	150g	موزا
50 g	كاؤۋىچىن	10 g	بىگىيەن
		350g	بۇيا ئۇرۇقى

【یاساش تؤسولى】 يۇقىرىقى يەتتە خل دورىدىن ئانار پوستى، موزا، بىخ مارجان قاتارلىقلارنى يېرىك سوقۇپ، بۇنىڭغا سۇ قوشۇپ، 1- قېتىم 2 سائەت، 2- 3- قېتىم بىر سائەتتىن 3 قېتىم قاينىتىلدى. قاينىتىلغان سۈيۈقلۈقلارنى قوشۇپ، سۈزۈپ سۈزۈلگەن تېرىتىمىسى نېسىلى دورىنىڭ 1:1 كە كەلگۈچە قاينىتىپ قويۇلدۇرۇلدۇ، pH قىممىتىنى 4-6 كىچە تەڭشىپ تەيارلاپ قويۇلدۇ. بۇيا تۇرۇقىنى سوقۇپ، يېرىك تالقان قىلىپ، سۈيۈق تېكستراكت بىلەن تېكستراكتلارنى تەيارلاشتىكى تەپچىتىش تۈسۈلى (قوشۇمچە O I) بويىچە 0.3% لىك تۇز كىسلاتسىنى تېرىتكۈچى قىلىپ، تەپچىپ چىققان سۈيۈقلۈقتا ئاكولولۇد رېئاكسىسى بولمىغانغا قەدەر تەپچىتىلدى. ئاندىن تەپچىپ چىققان سۈيۈقلۈق نېسىلى دورا ماتېرىيالى بىلەن 1:1 نسبىتىكىچە بولغىچىلىك قويۇلدۇرۇپ، pH قىممىتىنى 6 ~ 4 كىچە تەڭشىپ تەيارلىنىدۇ. شېچۋاڭىزى ۋە كاۋاۋىچىندىن ئىلىپ، سۈيۈق تېكستراكت ۋە تېكستراكتلارنى تەيارلاشتىكى تەپچىتىش تۈسۈلى (قوشۇمچە O I) بويىچە 70% لىك تېسپىرتىنى تېرىتكۈچى قىلىپ، تەپچىپ چىققان سۈيۈقلۈق رەڭسىز ھالتىكە كەلگۈچە تەپچىتىلدى. تەپچىتلەكەن سۈيۈقلۈقتىن بېسىم تۆۋەنلىش تۈسۈلى ئارقىلىق تىسپىرتىنى يىغۇزىلىپ ھەمدە نېسىلى دورا ماتېرىيالى بىلەن 1:1 نسبىتىگە كەلگۈچە قويۇلدۇرۇپ تەيارلىنىدۇ. ئاندىن يۇقىرىدىكى تۈچ خىل قويۇلدۇرۇلغان سۈيۈقلۈقنى بىر لاشتۇرۇپ ۋە بىڭىيەننى مۇۋاپىق مقداردىكى تىسپىرتتا تېرىتىپ، تۇنى قويۇلدۇرۇلغان تېرىتىمكە قوشۇپ، تەكشى ئارلاشتۇرۇپ، pH قىممىتىنى 6 ~ 4 كىچە تەڭشىپ، تىنج تۇرغۇرغاندىن كېيىن فىلترلاپ، فىلتىلانغان تېرىتىمكە تۇمۇمىي مقدارى 1000ml بولغۇچە سۇ قوشۇپ، مىكروبىسىزلەندۈرۈپ، بولۇپ قاچىلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قوڭۇر رەڭلىك سۈيۈقلۈق بولۇپ، بىڭىيەنداك خۇشبىيە بۇ اىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 5ml ئېلىپ، بۇنىڭغا ٹاممىيەك سىناق سۈيۈقلۈقىدىن 3ml ، سۇدىن 15ml قوشۇپ، تەكشى ٹارملاشتۇرۇپ يىنه خلوروفورم قوشۇپ، ھەر قىتىمدا 15ml ئۈچ قىتىم چالغىتىپ چەككىلىپ ئېلىپ، خلوروفورم سۈيۈقلۈقىنى ئاييرىۋىلىپ، بىرلەشتۈرۈپ پارلاندۇرۇپ

قۇرۇتۇلدۇ. قالدۇقلېرغا 1ml ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. سوفورىدىن (تۇخۇمەك ئىشارى) سېلىشتۈرما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئىسپىرت قوشۇپ، هەر بىر ml دا 0.5g دوا تۇقان ئېرىتمە تېيارلىنىپ، بۇ سېلىشتۈرما ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلەك رەڭ سېپكىر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VII B) سىنلى بويىچە، يۇقىرىدىكى ئىككى خل ئېرىتمىنىڭ هەر قايىسىدىن 1ml 5 شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېبىز قەۋەتلەك سىلىتىسيه يېلىمى 6 لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىلىدۇ. ئاندىن خلوروفورم-مېتىل ئىسپىرت ۋە ئېتاندىمائىن (11:7:0.1) يېيلدۇرغۇچى قىلىپ يېيلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، سۇيۇق بىسمۇت كالىي سىناق سۇيۇقلۇقى پۇركۈلدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپكىرىدا، سېلىشتۈرۈلغۇچى دوا رەڭ سېپكىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئۇخشاش جۈزە رەڭلىك داغ توچكىلىرى كۆرۈلدۇ.

(2) شىچۋاڭىزى سېلىشتۈرما دورىسىدىن 1g ئېلىپ، ئۇنىڭغا 10ml خلوروفورم قوشۇپ، بىر كېچە چىلاپ، سوزۇپ، سوزۇلگەن سۇيۇقلۇقىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلېرغا 1ml ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سېلىشتۈرما دوا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلەك رەڭ سېپكىر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VII B) بويىچە يۇقىرىدىكى (1) تۈرىدىكى سىناق قىلىنぐۇچى دوا ئېرىتمىسى ۋە سېلىشتۈرما دوا ئېرىتمىنىڭ هەر قايىسىدىن 1ml 5 شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېبىز قەۋەتلەك سىلىتىسيه يېلىمى 6 لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، نېفت ئېتىرى (C₆₀~30)， ئېتىل ئاتىپتات ۋە فورميك كىسلاطا (15:5:2) نسبەتتە يېيلدۇرغۇچى قىلىنىپ يېيلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنەپە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دوا رەڭ سېپكىرىدا سېلىشتۈرما دوا رەڭ سېپكىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئۇخشاش كۆڭ رەڭلىك جۈلەلىق نۇرلۇق داغ توچكىلىرى كۆرۈسىدۇ.

تەكشۈرۈش pH قىممىتى 4.0~6.0 (قوشۇمچە VII G) بولۇشى لازىم.

«نىپىي زىچلىقى» 1.04 (قوشۇمچە VII A) دىن تۆۋەن بولماسىلىقى لازىم.

«باشقىلار» مىكستۇرا تېيارلاش تۈرىدىكى مۇناسىۋەتلەك بەلكىلىملىرگە ئۇيغۇن كېلىشى لازىم.

«تەركىبىنى ئېنقلاش» سېلىشتۈرما دوا ئېرىتمىسىنىڭ تېيارلىنىشى: C₁₀₅ تا ئىككى سائىت قۇرۇتۇغان سوفورىدىن سېلىشتۈرما دورىسىدىن نازۇك ئۆلچەم بىلەن 5mg ئېلىپ، بۇنى 100ml لق مېنزۇركىغا سېلىپ، ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، شكارىسىغا كەلگۈچە سۇيۇلدۇرۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرسا بولىدۇ.

سىناق قىلىنぐۇچى دوا ئېرىتمىنىڭ تېيارلىنىشى: مەزكۇر دورىدىن نازۇك ئۆلچەم بىلەن 5ml ئېلىپ، سۇيۇقلۇق ئايىرىدىغان ۋارونكىغا قويۇپ، بۇنىڭغا 15ml سۇ ۋە 3ml ئاممىياك سىناق سۇيۇقلۇقىنى قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، خلوروفورم ئارقىلىق (15, 15, 10, 10, 10ml) دىن جەھەئى بىش قىتسى چەككە-لمپ، ئاندىن خلوروفورم قەۋىتىنى قوشۇپ، بۇنىڭغا 5g سۇسز ناترى سۇلەفات قوشۇپ، سوزۇپ، سوزۇلگەن سۇيۇقلۇقىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلېرنى يەندە ئىسپىرت بىلەن ئېرىتىپ، 200ml لق مېنزۇركىغا يۆتكىپ، شكارىسى تولغىچە سۇيۇلدۇرۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇلدۇ.

«ئۆلچەش ئۇسۇلى» سېلىشتۈرما دوا ئېرىتمىسى ۋە سىناق قىلىنぐۇچى دوا ئېرىتمىسىنىڭ هەر قايىسىدىن ئىنچىكلىك بىلەن 1ml ئۆلچەپ ئېلىپ، ئايىرم-ئايىرم حالدا پۇرۇپكىلىق كونۇس شەكىللەك

بوتۇلكىغا قۇيۇپ، قىزدۇرۇپ، ئىسپىرتى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، بۇنىڭغا برومومىتىمۇل كۆكى تېرىتىمىسىدىن 10ml، خلوروفورمىدىن 10ml توغراب ئۆلچەپ ئېلىپ قوشۇپ، ئېغىزىنى ھىم ئېتىپ، بىر منۇت چالغىتىپ سىنج تۇرغا ئۇغاندىن كېيىن سىنترىفۇگىدا چۆكتۇرۇپ، تۆۋەنلىكى قۇۋىتىدىكى خلوروفورم سۇيۇقلۇقنى ئېلىپ، نۇنىڭغا 5g سۇسز ناتىرىي سۇلغات قوشۇپ سۈزۈلدۈرۈلەدۇ. سېپىكتەرەفوتومىتىر ئۇسۇلدا (قوشۇمچە ٧) 415±2nm دولقۇن ئۆزۈنلۈقتىكى جايىدىكى شۇمۇرلۇش دەرىجىسىنى ئۆلچەپ ھېسابلانسا بولىدۇ. مەزكۇر دورىنىڭ ھەر 1ml تەركىبىدە تۇقان ئومۇمىي ئالاكولۇنىدى سوفورىدىن بىلەن ھېسابلىنىدىغان بولۇپ، 1.3mg 1 دن تۆۋەن بولۇشقا بولمايدۇ.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قىزىتىپ، ھۆللۈكىنى قۇرۇتىدۇ. قىچىشىنى توختىتىدۇ. ھەر خىل باكتېرىيلىك، زەمبۇرۇغلىق ۋە تامچە قۇرتلۇق سىرتقى جىنسىي ئەزا ياللۇغى، جىنسىي يول ياللۇغلىرى كەلتۈرۈپ چىقارغان ئایاللارنىڭ جىنسىي ئەزالرى قىچىشىش، قىزىرىپ ئىشىش، ئاق خۇن كۆپىيىشلەرگە ئىشلىتىلەدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 سىرتىدىن ئىشلىتىلەدۇ. %10 لىك قىلىپ سۇيۇلدۇرۇلغان ئېرىتىمىسى بىلەن بۇيۇلدۇ. كېسىلى ئېغىرراق بولغانلارغا كونسىنتراتىسىسى ئاشۇرۇلەدۇ. دېزىنېپكىسيه قىلىنغان تالا قۇبىرۇقسمان شەكىلىدىكى شارچە پاختىنى مۇۋاپىق قويۇقلۇقتىكى تېرىتىمكە تەگكۈزۈپ، جىنسىي يولغا كىرگۈزۈپ قويۇلسا، جىنسىي يول ياللۇغىنى داۋالىغلى بولىدۇ. بۇ چارە كۈنكىه 2 قېتىم ئېلىپ بېرىلەدۇ.

【ئۆلچەمى】 ھەر بىر بوتۇلكىغا 100ml قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزىنى ھىم ئېتىپ، سايە، سالقىن ئۇرۇندا ساقلىنىدۇ.

هەبى مارى بەرەس

驱白马日白热斯丸

Qu bai Ma ri bai re si Wan

【رېتىسىپ】

10 g	ئېڭىز		
6 g	كۈچۈلا	60 g	چار يىلان
0.4g	زەپەر	3 g	كېلەر
6 g	ئاقىر قەرها	9 g	كۈندۈر
6 g	چايان	1.5g	سەبرى
1.5g	سوقۇمنىيا	60 g	ئۇچقۇن پاقا

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 11 خىل دورىدىن سوقۇمنىيا، سەبرى، زەپەرلەرنى ئايرىم-ئايرىم سوچۇپ، يۇمىشاق تالقانلاپ، قالغان چار يىلان قاتارلىق 8 خىل دورىنى سوچۇپ يۇمىشاق تالقانلاپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، يۇقىرىدىكى تالقان بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، جۇۋىنە شىرىنسى يېپىشتۇرۇغۇچى قىلىنىپ، هەب ياسلىپ قۇرۇتلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇس-خۇسىتى】 بۇ دورا سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك ئۇشاق ھەب بولۇپ، تەمى قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 5g ئېلىپ، يۇمىشاق سوچۇپ، بۇنىڭغا 30ml خلوروفور م قوشۇپ، بۇرۇپىكىنى ھەم ئېتىپ، 5 منۇت چالغىتىپ، 2 سائەت تۇرغۇزۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلەرىنى 1ml خلوروفورم بىلەن ئېتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. ئىستەرىخىنن سېلىشتۇرۇما دورىسى ۋە بروتىسىن سېلىشتۇرۇما دورىسىدىن ئېلىپ، خلوروفورم قوشۇپ، بۇنىڭ ھەر قايسىسىنىڭ 1ml دا 2mg دورا بولغان ئارىلاشما ئېرىتمە تەبىيارلىنىپ، بۇ سېلىشتۇرۇما دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. نېيز قۇۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VII) سىنقاى بويىچە، يۇقىرىقى ئىككى خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايسىسىدىن 10 μm شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېيز قەۋەتلىك سىلتىسيه يېلىمى G لق تاختا ئۇستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، مېتىل بېنزاول، پروپانون، ئېتىل ئىسپىرت، قويۇق ئاممىيەك تەجىرىبە سۇيۇقلۇقى (0.4: 0.6: 4: 5) نى يېپىلدۈرۇغۇچى قىلىپ يېپىلدۈرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ سۇيۇق بىسمۇت كالىي يودىد تەجىرىبە سۇيۇقلۇقى پۈركۈلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىدا، سېلىشتۇرۇلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىدىكى مۇناسىپ ئۇرۇندادا ئۇشاشش رەڭلىك داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا ھەب ياسالىلىرىغا ئالاقدىدار ھەر خىل بەلگىلىمىلەر (قوشۇمچە I) گە

ئۇيغۇن بولۇشى لازم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قاننى تازىلاب، يەلنى تەڭشىپ، ئاغرىق توختىسىدۇ. بەرسىن (ئاقىكىسلە)، سىل (تۈبىرکۈلىز)، تېرىھ كېسىلى ۋە هەر خىل ئىشىق يارىلارغا ئىشلىلىدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 دىسلەپكى كۈنى 5 دانىدىن، كېيىن كۈنىگە 1 دانىدىن قوشۇپ، كۈنىدە 1 قېتىم كەچتە ئىچىلىدۇ. 15 كۈن ئىچىكەندىن كېيىن دىسلەپكى مىقدارغا كەلگۈچە كۈنىگە 1 دانىدىن ئازايىتىلىدۇ، بۇ بىر كۇرس داۋالاش بولىدۇ.

【دىقىقتە قىلىدىغان ئىشلار】 باللارغا ئىشلەتكەندە، دورا مىقدارى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئازايىتىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر ھەب 0.2g.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، نەملىكتىن ساقلىنىدۇ.

ئىسکەرتىش: جۇۋىنە شىرىنسىنىڭ تەبىيارلىنىشى: جۇۋىنىدىن 1000g 1000ml دىستىللەنگەن سۈبۈقلۈقى يىغىۋىلىنىدۇ. پارلاندۇرۇپ، 1500ml دىستىللەنگەن سۈبۈقلۈقى يىغىۋىلىنىدۇ. كۈچۈلىنىڭ لايىقلاشتۇرۇلۇشى: 1000g كۈچۈلىنى 72 سائىت سۇغا چىلاب قويۇپ، پوسىتى ۋە بىخلىرىنى ئېلىۋېتىپ، مېغىزىنى 2 سائىت كالا سوتىدە قاينىتىپ، ئاندىن كۈچۈلىنى ئايرىپ ئېلىپ، ئاپتاتا قۇرۇقۇپ، سوقۇپ يۇمشاق تالقانلىنىدۇ.

قۇرسى باپۇچى

驱白巴布期片

Qu bai Ba bu qi Pian

【رېتىپ】

40g	شاتىرنىجى	120g	جىنكىۋىزى
60g	خولىنجان	60 g	تۈرپۇت
		120g	كالىزىرە

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 5 خىل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ تالقانلاپ، ئۇنىڭغا مونوساخارىد قىيامى ۋە كراخمالنى مۇۋاپىق مىقداردا قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانىچە تەبىارلاپ قۇرۇقتۇپ، بېسىپ 1000 قۇرسى ياسىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىسىتى】 بۇ دورا سارغۇچ كۈل رەڭ قۇرس بولۇپ، ئۆزگىچە پۇرایدۇ، تەمى قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 10 قۇرسى تېلىپ يۇمىشاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا تېتىل ئاتىپتاتىن 20ml قوشۇپ، قىزىدۇرۇپ، ئىللانما تېقىمدا بىر سائىت چەككىلىپ، سوۋوختۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇقتۇپ، قالدوقلەرىنى 1ml تېتىل ئاتىپتاتا تېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى دورا تېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. جىنكىۋىزى ماددىسى (پىسورالىن) بىلەن غەيرىي جىنكىۋىزى ماددىسى (ئىزوپىسورالىن) سېلىشتۇرما دورىسىدىن تېلىپ، ئۇنىڭغا تېتىل ئاتىپتات قوشۇپ، ھەر قايىسىنىڭ ھەر 1ml دا 2mg دىن دورا تۇتقان ئارىلاشما تېرىتەمە تەبىارلىنىپ، سېلىشتۇرما دورا تېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. نېپىز قەمۇتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VII) سىنىقى بويىچە سىناق قىلىنぐۇچى دورا تېرىتىمىسىدىن 1ml ، سېلىشتۇرما دورا تېرىتىمىسىدىن 1ml شۇمۇرۇپ تېلىپ، نېپىز قەمۇتلىك سىلىتىسيي بىلىمى G لىق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقىتخا تېمىتىپ، n - ھېكسان، تېتىل ئاتىپتات (1:4)نى يېيلدۈرغۇچى قىلىپ يېيلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇقتۇپ، ئۇلترا بىنېپىشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۇرۇلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردىكى مۇناسىپ ئورۇندادا تۇخشاش رەڭلىك جۇلالق نۇرلۇق داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرس ياسالىلىرىغا ئالاقدىار ھەر خىل بەلكىلمىلەرگە (قوشۇمچە ID) ئۇيىغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 قان تومۇرلارنى داۋانلاشتۇرۇپ، قاننى تەڭشىيدۇ. بەرسىن (ئاقىكىسلە) گە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 5~3 قۇرستان، كۈنىگە 3 قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرسى 0.5g.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم تېتىلىدۇ.

WS₃—BW—0144—98

سۇفۇبى ھېليلە سىياھ

驱白艾力勒思亚散

Qu bai Ai li le si ya San

【رېتىسىپ】

قارا ھېليلە	80g	تاتلىق بادام	80g
سېيادان	80g	ھېليلە پوستى	80g

ئامىلە 80g

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 5 خىل دورىنى يۈمىشاق سوقۇپ تالقانلاب، ئەلكەكتىن ئۆتكۈزۈپ، ئۇنىڭغا 600g ساكساروزا تالقىنى قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، قۇرۇقتۇپ، 1000g تېبىارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قارامتۇل كۈل دەڭ سۇفۇپ (تالقان) بولۇپ، تەمى تاتلىق، سەل قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن تەخمىنەن 10g ىېلىپ، بۇنىڭغا ئېتىل ئىسپىرتىن 20ml قوشۇپ، ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنىدا 20 مىنۇت بىر تەرمەپ قىلىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقتنى 1ml ىېلىپ، بۇنىڭغا 10% لىك ناتىرىي ھىdroكىسىدىن 5 تامىچە تېمىتىپ، چالغىتقاندا تېرىتىمە سارغۇچ قوڭۇر رەڭىھە كىرىدۇ. سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقنى يەنە 2ml ىېلىپ، بۇنىڭغا تۆمۈر تېخلۈرۈد تېجىرىبە سۈيۈقلۈقنى دىن 2 تامىچە تېمىتىقاندا قېنىق كۆك رەڭلىك چۆكمە ھاسىل بولىدۇ. سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقنى يەنە 2ml ىېلىپ، بۇنىڭغا بىر تامىچە ناتىرىي خلور گېلاتىن تېجىرىبە سۈيۈقلۈقنى تېمىتىقاندا، ئائق رەڭلىك چۆكمە ھاسىل بولىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 10g ىېلىپ، بۇنىڭغا سۇسۇز 10ml قوشۇپ، چالغىتىپ، بىر سائىت چىلاپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇقتۇپ، قالدۇقلۇرىنى 1ml ىېتىل ئىسپىرتتا تېرىتىپ، سىناق قىلىنگۇچى دورا قىلىنىدۇ. ئاندىن قارا ھېليلە سېلىشتۇرۇما دورىسىدىن 1g ىېلىپ، ئوخشاش ئۇسۇلدا سېلىشتۇرۇما دورا تېرىتىمىسى تېبىارلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VI B) سىنىقى بويىچە يۇقىرىقى ئىككى خىل تېرىتىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1m 10 شۇمۇرۇپ ىېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سىلىتىسيي بېلىمى G لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقىتىغا تېمىتىپ، بېنزوول، مېتىل ئىسپىرت، فورميك كىسلاطا (18:3:1)نى بېسىلدۈرۈغۇچى قىلىپ بېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇقتۇپ، 5% لىك ۋانلىن سۇلغات تېرىتىمىسى پۇركولىدۇ ھەم داغ توچكىلىرىنىڭ رەڭگى روشنلەشكىچە قىزدۇرۇلۇدۇ. سىناق قىلىنگۇ-چى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۇرۇلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاش رەڭلىك داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا سۇفۇپ ياسالىلىرىغا ئالاقيدار ھەر خىل بەلگىلىملەر (قوشۇمچە I) گە

ئۈيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي بەلغۇم خىلىتىنى پىشۇرۇپ، تېرىنى ئىللىتىپ، رەڭ پەيدا قىلىدۇ. بەرسىن (ئەقكىسەل)، چاچ-ساقال بالدىر ئەقربىپ كېتىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 10g ~ 5 دن، كۈنىگە بىر قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر خالىتغا 150g قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزىنى ھىم ئېتىپ، نەملىكتىن ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0145—98

زىماتى بەرەس 驱白热斯酌 Qu bai Bai re si Ding

		[رېتىپ]
40 g	قارئۇرۇك ئەنجۇر يوپۇرمىقى	300g 40 g 40 g
		جىنكىۋىزى ئاق قىچا داڭكۇي

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 5 خىل دورىنى ئايرىم سوقۇپ يېرىك تالقانلاب، قاچغا سېلىپ، بۇنىڭغا 75% لىك ئېتىل ىسپىرتىن 1000ml قوشۇپ، ئېغىزىنى ھىم ئېتىپ 15 كۈن چىلاپ، ئاندىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈبۈقلىققا 75% لىك ئېتىل ىسپىرتى قوشۇپ، 1000ml بولۇچە سۈبۈلدۈرۈلدى.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قوڭۇر رەڭلىك سۈبۈقلىق بولۇپ، ئالاھىدە خۇشبۇي پۇرايدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 2ml ئېلىپ، سۇ قاچلانغان قاچىدا پارلاندۇرۇپ قۇرۇقۇپ، قالدۇقلىرىنى 1ml مېتىل ىسپىرت بىلەن ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن جىنكىۋىزى ماددىسى (پىسورالىن)، غەيرىي جىنكىۋىزى ماددىسى (ئىزۈپىسورالىن) سېلىشتۈرۈما دورىلىرىدىن ئېلىپ، بۇنىڭغا ئېتىل ئاتىستىن قوشۇپ، ھەر قايىسىنىڭ 1ml 2mg سىدا 2mg دورا تۇتقان ئارىلاشما ئېرىتمە سېيارلىنىپ، سېلىشتۈرۈما دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VII B) سىنقى بويىچە يۇقىرقى ئىككى خىل ئېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1m 5 شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېبىز قەۋەتلىك سلىتىسيي يېلىمى G لىق تاختا ئۇستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، n – ھېكسان، ئېتىل ئاتىستىن (4:1) نى يېسىلدۈرگۈچى قىلىپ يېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇقۇپ، ئۇلترا بىنەپىشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكترىدا، سېلىشتۈرۈلگۈچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكترىدا دىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئۇخشىش رەڭلىك جۇلالق نۇرلۇق داغ توجىكلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا زىمات ياسالىلىرىغا ئالاقدىار ھەر خىل بەلگىلىملەر (قوشۇمچە N I) گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 پىشىغان بەلغىم خىلىتىنى ھەيدەپ، قان تومۇرلاردىكى توسالغۇلارنى ئاچىدۇ. بەرسىن (ئاقكىسمەل) گە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 سىرتىدىن ئىشلىتىلىدۇ، كېسەللەنگەن ئورۇنغا مۇۋاپقىق مىقداردا سۈرکىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بوتۇلكىغا 50ml قاچلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېلىپ، سالقىن ھەم سايە جايىدا ساقلىنىدۇ.

ەجۇنى ئىترەفلى ئامان

驱白依提尔菲力阿曼密膏

Qu bai Yi ti er fei li A man Mi gao

بۇ دورا ھېليلە پوستى، بەليلە پوستى، ئامىلە، بەرنگى كابىلە قاتارلىق دورىلاردىن تېبىارلانغان مەجۇندىن تىبارەت.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قوڭۇر رەڭلىك قويۇق مەجۇن بولۇپ، تۇزگىچە پۇرايدۇ، تەمى ئاچىچق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 10g ٹېلىپ، بۇنىڭغا 20ml پروپانون قوشۇپ، سوقۇپ ئېزىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇبۇقلۇقنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلۇرىنى 5ml پروپانون بىلەن تېرىتىپ، بۇ سناق قىلىنぐۇچى دورا تېرىتمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن موزا (گاللىك) كىسلاطا سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا پروپانون قوشۇپ، ھەر 1ml دا 2mg دىن دورا تۇتقان تېرىتمە تېبىارلىنىپ، سېلىشتۈرۈما دورا تېرىتمىسى قىلىنىدۇ. نېيىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر تۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) سىنىقى بويىچە، يۇقىرىقى ئىككى خىل تېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېيىز قەۋەتلىك سىلىتىسيه يېلىمى G لق تاختا تۇستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، بېنزوول، پروپانون، ئېتىل ئىسپىرت قاتىق سىركە كىسلاقاتىسى (1:2:6:1)نى يېسىلدۈرۈغۇچى قىلىپ يېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، % 2 لىك تۆمۈر ترى خلورىد تېرىتمىسى پۇرکۈلىدۇ. سناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۈرۈلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئۇرۇندا ئۇخشاش كۆك رەڭلىك داغ تۆچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا مەجۇن ياسالىملەرىغا ئالاقدىار ھەر خىل بەلگىلىمىلەر (مۇشۇ ئۆلچەمنىڭ 1-قوشۇمچىسىكە قاراڭ) گە تۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى تازىلاب، بەدەن قۇۋۇتنىنى كۈچەتىپ، چاچ تۇستۇرىدۇ، قارايتىدۇ. بەرسىن، ئاڭ داغ، چاچ مەزگىلسىز ئاقىرىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش تۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 30g دىن، كۈنگە 3 قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچەمى】 ھەر بوتۇلكغا 100g قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتىلىپ، سايىھەم سالقىن جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0147-98

قۇرسى پەرفېيون

驱白派甫云片

Qu bai Pai pu yun Pian

ریتیسپ【		
75 g	نُجْچِقْتاۋۇز	50g
75 g	مۇقەل	50g
150g	سېبرە	75g

«یاساش ئۇسۇلى» يۈقرىدىكى 6 خىل دورىدىن غارقۇندىن باشقا، پەرفېيون قاتارلىق بىش خىل دورىنى سوقۇپ يۇمساق تالقانلاب، ئەلگەكتىن ئوتتىكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇلدۇ. غارقۇنغا 500ml قابىناق سۇ قوشۇپ، 4 سائەت دۈملەپ، سۈزۈۋېلىنىغان سۈرۈقلىقنى مۇۋاپىق مىقداردا قويۇلدۇرۇپ، يۈقرىدىكى تالقان بىلەن تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانچە تەبىيارلاب، قۇرۇتۇپ، بېسىپ 1000 قۇرس ياسلىدۇ، سىرتىغا شىكەر يالتسىلىدۇ.

«شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» بۇ دووا شېڭىر يالىتلغان قۇرسى بولۇپ، شېڭىرلىك قېلى چىقىرىۋەت تىلسە، قارامتۇل، قوڭۇر رەڭلىك بولىدۇ، پۇرنىقى غەلتە، تەمى ناتىلق ھەم قېرىق كېلىدۇ.

په رکلهندورهش بؤ دورىدىن 5 قۇرس ئېلىپ، يالتىلغان شىكەرنى چىقىرۇتىپ، يۇمىشاق سوقۇپ، بۇنىڭغا 10ml مېتىل ئىسپىرتى قوشۇپ، سۇ قاچىلانغان قاچىدىكى ئايلانما ئېقىمدا 10 مىنۇت تۇرغۇزۇپ سۈرۈپ، سۈزۈلگەن سۈبۈقلەقنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ قالدوقلەرىنى 1ml مېتىل ئىسپىرتتا ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. باربالوئىن سېلىشتۇرۇما دورىسىدىن ئېلىپ، تۇنىڭغا مېتىل ئىسپىرتى قوشۇپ، هەر 1ml دا 1mg دورا بولغان ئېرىتمە تەبىيارلىنىپ، بۇ سېلىشتۇرۇما ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېيىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۆسۈلى (قوشۇمچە B VI) سىنتىقى بويىچە، يۇقىرىدىكى ئىككى خىل ئېرىتىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېيىز قەۋەتلىك سىلىتىسيه يېلىمى G لق تاختا ئۆستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، ئېتىل ئائىتىات، مېتىل ئىسپىرت، سۇ (1:1.3:7:10:1) ئىسىلدۇرغۇچى قىلىپ يېلىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنپەشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزتىلىنىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىردىدا، سېلىشتۇرۇلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىردىكى مۇناسىپ نۇرۇندادا ئوخشاش دەڭلىك جۇلالق نۇرلۇق داغ توچىكلىرى كۆرۈنىدۇ.

بۈلۈشى لازىم. قۇرس ياسالىلىرىغا ئالاقدار ھەر خىل بەلگىلىملەر (قوشۇمچە D I) گە ئۇيغۇن «تەكشۈرۈش»

تاسیسی داواهای دینی غیری ته بیئی به لغتم خلیستنی تازیلاب، تبریزی تللتسپ، ناغرق توختندو. به رسم (ناکیسل)، پالچی، یوز پالچی، بوگوم سوکه ک ناغرقی قاتار لقلارغا ٹشلتسلیدو.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى وە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 9 ~ 7 قۇرستان كۈنىگە 2 قېتىم ئىچىلندۇ.
【ساقلاش】 تېغزى ھىم ئېتلىپ ساقلىنىدۇ.

كالزبره ئوكولى

驱虫斑鸠菊注射液

Qu chong ban jiu ju ZHu she ye

بۇ دورا مۇرەككىپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك Vernonia anthelmintica كالزبره Willd نىڭ قۇرۇقلىغان مېۋىسىدىن چەككىلەپ تەبىيەلەنگان، مىكروبىسىز لاندۇرۇلغان سۈيۈق تېرىتىمىسى. 【ياساش ئۆسۈلى】 كالزبرىدىن 250g ىپلىپ، سوقۇپ يىرىك تالقانلاب، سۈيۈق تېكستراكت بىلەن ئېكستراكتلارنى تەپچىتىش ئۆسۈلى (قوشۇمچە O I) بويىچە % 80 لىك ئېتىل ئىسپىرتىنى تېرىتكۈچى قىلىپ تەپچىتىپ، يىغۇپلىنىغان تېچىگەن سۈيۈقلۈقتىن ئېتىل ئىسپىرت پۇرىقى يوقالىچە ئېتىل ئىسپىرت قايىتا يىغۇپلىنىدۇ، قالغىنغا ئوكۇلغا ئىشلىتىدىغان سۇنى قوشۇپ، 1000ml 1000ml بولغۇچە سۈيۈلدۈرۈپ، 24 سائەت سوغۇق ساقلاپ، ئۇستىدىكى لهىلەپ قالغان ماينى ئىلىۋىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقنىڭ pH قىممىتىنى 9 ~ 8 بولغۇچە % 40 لىك ناترى هيدروكىسىدى بىلەن تەڭشىپ، ناترىي خلورىدىن 8g قوشۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقنى 500ml لىق سۈيۈقلۈق بېرىش بوتۇل كىسىغا قاچلاپ، ھارارت بىسىمى (C 105 °C تا 40 منۇت) ئارقىلىق مىكروبىسىز لاندۇرۇپ، 5 ~ 10 °C لۇق تۆۋەن تېمىپراتۇردا بىر ھېپتە تۇرغۇزغاندىن كېيىن، تەكشى ئاربلاشتۇرۇپ، % 40 ناترىي هيدروكىسىدى بىلەن pH قىممىتىنى 9 ~ 8 غىچە تەڭشىپ، ئاندىن ئوكۇلغا ئىشلىتىلىدىغان سۇنى 1000ml بولغۇچە قوشۇپ، ئىنچىكلىك بىلەن سۈزۈپ، ئامپولغا قاچلاپ مىكروبىسىز لاندۇرۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قوڭۇر رەڭلىك سۈزۈك سۈيۈقلۈق.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 10ml ىپلىپ، بۇنىڭغا بۇتىل ئالكوهولدىن 10ml قوشۇپ، چالغىتىپ چەككىلەپ، بۇتىل ئالكوهول سۈيۈقلۈقنى ئاييرۋىلىپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلەرنى 2ml مېتىل ئىسپىرتتا تېرىتىپ، بۇنىڭدىن 1ml ىپلىپ، بۇنىڭغا ماڭنىي تالقىنىدىن ئازراق قوشۇپ، تۇز كىسلاتسىدىن بىر نەچچە تېمىم تېمىتىپ، سۇ ئارقىلىق ئىسسىق ئۆتكۈزگەننە تېرىتىمە تەرىجىي قىزىل رەڭگە تۆزگەرىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن ئازراق ئىپلىپ، فىلتەر قەغەزگە تامچىلىتىپ، ئۇتقا قاقلاب قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنەپشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزەتكەننە، سۇس سارغۇچ يېشىل رەڭلىك جۇلالق نۇر كۆرۈنىدۇ. ئاندىن % 1 لىك ئالىيۇمن ترى خلورىدى سناق سۈيۈقلۈقىدىن يەنى ئازراق تېمىتىسا، جۇلالق نۇر كۈچىپ، پارقراق سارغۇچ يېشىل دەڭ كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 pH قىممىتى 6.0 ~ 8.0 (قوشۇمچە G VII) بولۇشى كېرەك.

【ئاقسىل】 بۇ دورىدىن 1ml ىپلىپ، بۇنىڭغا قاننىڭ كىسلاتا سناق سۈيۈقلۈقىدىن 3 ~ 2 تېمىم تېمىتىقاندا دۇغلانماسلىقى كېرەك.

【تانىن ماددىسى】 بۇ دورىدىن 1ml ىپلىپ، بۇنىڭغا گېلاتن ناترىي خلور تېرىتىمىسىدىن 3 ~ 2 تېمىم تېمىتىقاندا دۇغلانماسلىقى كېرەك.

【باشقىلار】 ئوكۇل ياسالىلىرىغا ئالاقدىار ھەر خىل بەلكىلىمىلەر (قوشۇمچە I) گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەركىبىنى ئۆلچەش】 سېلىشتۇرما ئېرىتمىنىڭ تەبىارلىنىشى: °C 105 دا ئېغىرلىقى تۇراقلاشقىچە قۇرۇتۇلغان سېلىشتۇرما دورا رۇتنىنىن نازۇكلىق بىلەن 20mg 2 ئۆلچەپ ئېلىپ، 100ml لق مېنزاۋەكغا سېلىپ، بۇنىڭغا 60% لىك ئېتىل ئىسپەرتىن مۇۋاپىق مقداردا قوشۇپ، سۇغا سېلىپ، ئازاراق ئىسىق ئۆتكۈزۈپ، ئۇنى پۇتلۇلەي ئېرىتىپ، سوۋوٽۇپ، 60% لىك ئېتىل ئىسپەرت بىلەن شكارالغا كەلگۈچە سۇيۇلدۇرۇپ، تەكشى چالغىتىپ، بۇنىڭدىن 25ml نى توغرا ئۆلچەپ ئېلىپ، 50ml لق مېنزاۋەكغا قۇيۇپ، سۇ قوشۇپ شكارالغا كەلگۈچە سۇيۇلدۇرۇپ، تەكشى چالغىتىلەدۇ (ھەر بىر ml دۇتن ئۆتقان 0.1mg بولىدۇ).

ئۆلچەملەك ئەگرى سىزىقنىڭ تەبىارلىنىشى: سېلىشتۇرما دورا ئېرىتمىسىدىن ئىنچىكلىك بىلەن 0.0، 1.0، 2.0، 3.0، 4.0 وە 5.0 مىللەتلىرى شۇمۇرۇپ ئېلىپ، ئاييرىم-ئاييرىم 10ml لق مېنزاۋەكغا قۇيۇپ، ھەر بىرسىگە ئاييرىم-ئاييرىم ھالدا 30% لىك ئېتىل ئىسپەرتىن 5.0ml بولغۇچە قوشۇپ، 5% لىك ناتىرىي نىترىت ئېرىتمىسىدىن ئىنچىكلىك بىلەن 0.3ml قوشۇپ، تەكشى چالغىتىپ، 6 مىنۇت تۇرغۇزۇپ، 10% لىك ئالىيۇمن نىترات ئېرىتمىسىدىن 0.3ml قوشۇپ، تەكشى چالغىتىپ، 6 مىنۇت تۇرغۇزۇپ، 4% لىك ناتىرىي ھىدروكسىدىدىن 4ml قوشۇپ، 30% لىك ئېتىل ئىسپەرت بىلەن شكارالغا كەلگۈچە سۇيۇلدۇرۇپ تەكشى چالغىتىپ، 15 مىنۇت تۇرغۇزۇلەدۇ. ئاندىن سېپكىتروفوتوومېتىر ئۇسۇلى (قوشۇمچە V B) بويىچە 510nm لق دولقۇن ئۇزۇنلۇقتىكى جايىدىن ئۇنىڭ شۇمۇرلۇش دەرىجىسى ئۆلچەنىدۇ. شۇمۇرلۇش دەرىجىسى ئۇردىناتات، قويۇقلۇق دەرىجىسى ئابىسىسا قىلىنىپ، ئۆلچەملەك ئەگرى سىزىق سىزىلىدۇ.

【ئۆلچەش ئۇسۇلى】 بۇ دورىدىن ئىنچىكلىك بىلەن 10ml شۇمۇرۇپ ئېلىپ، 100ml لق مېنزاۋەكغا قۇيۇپ، 30% لىك ئېتىل ئىسپەرت بىلەن شكارالغا كەلگۈچە سۇيۇلدۇرۇپ، تەكشى چالغىتىپ، بۇنىڭدىن ئىنچىكلىك بىلەن 2ml ئۆلچەپ ئېلىپ، 10ml لق مېنزاۋەكغا قۇيۇپ، ئۆلچەملەك ئەگرى سىزىقنى تەبىارلاش ئۇسۇلى بويىچە «30% لىك ئېتىل ئىسپەرتىن 5.0ml بولغۇچە قوشۇش» تەرىپىدىن باشلاپ شۇمۇرلۇش دەرىجىسى ئۆلچەنىدۇ، ئۆلچەملەك ئەگرى سىزىقنى سناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتمىسى- دىكى رۇقىنىڭ مقدارىنى (μg) ئۇقۇپ چىقىپ ھېسابلىسا بولىدۇ.

بۇ دورىنىڭ 1ml دىكى ئۇمۇمىي فلاۋون مقدارى رۇتن ($\text{C}_{27}\text{H}_{30}\text{O}_{16}$) بويىچە ھېسابلىغاندا 3.0mg دىن ئاز بولماسىلىقى كېرەك.

【تەسىرى وە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىنى تازىلايدۇ ھەم پىشۇردىدۇ، تېرىنى ئىللەتىپ، رەڭ پەيدا قىلىدۇ. بەرمىس (ئاڭىكسىل) گە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى وە مقدارى】 مۇسکۇلغا كۈندە ئەتىگەندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 2~4ml ئوكۇل قىلىنىدۇ، ئوكۇل قىلىپ بىر سائەتتىن كېيىن ئاپتاپقا ياكى ئۇزۇن دولقۇنلۇق ئۇلترا بىنەپشە نۇر چىرىغىغا قاللىنىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر ئامى يولى 2ml.

【ساقلاش】 ئېغىزنى ھەم ئېتىپ، قاراڭغۇ جايىدا ساقلىنىدۇ.

قىزىلگۈل ئىچىمىلىكى

玫瑰花口服液

Mei gui hua Kou fu ye

بۇ دورا يېڭى (ھۆل) قىزىلگۈلنى پىشىقلاب ئىشلەشتىن تەبىيەلەنغان ئىچىمىلىك.

【ياساش ئۇسۇلى】 ھۆل قىزىلگۈلدىن 500g ئېلىپ، سۇ پارىدا پارلاندۇرۇپ، دىستىللەنگەن سۇيۇقلۇقىدىن 250ml يىغۇئىلىپ، ئېرىتىمىسىنى سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقىنى بىر كېچە تۇرغۇزۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇققا ساكساخاروزىدىن 250g قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، قىزدۇرۇپ 750ml قالغىچە قوبۇلدۇرۇپ، سوۋۇنۇپ، دىستىللەنگەن سۇيۇقلۇقىنى قوشۇپ، ئومۇمىي مقدارى 1000ml بولغۇچە سۇ قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، بوتۇلكلارغا قاچىلاپ، مىكروبىسىزلاندۇرۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا سۇس قوڭۇر رەڭلىك سۇيۇقلۇق بولۇپ، ئۆتكۈر قىزىلگۈل پۇرېقىغا ئىگە. تەممى تاتلىق.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 1ml 0.1mL ئېلىپ، 50ml لىق مېنزرۇركىغا قۇيۇپ، سۇسسىز ئېتىل تىسپىرتىنى شكارىغا كەلگۈچە قوشۇپ، تەكشى چالغىتىپ، سېپىكتەرفۇتومېتىر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VII) بويىچە ئۆلچىگەنده، 355nm ۋە 267nm دوقۇن ئۇزۇنلۇقىدىكى ئورۇندا ئىككى ئەڭ چوڭ شۇمۇرۇش چوققىسى بولىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 1ml ئېلىپ، بۇنىڭغا 1ml سۇ قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، 1% لىك تۆمۈر تربىخلورىد ئاكىوهول ئېرىتىمىسىدىن 2 تامىچە تېمىتقاندا، ئېرىتىمە كۆكۈش سۆسۈن رەڭىھە كىرىدۇ.

【تەكشۈرۈش pH قىممىتى】 4.0 ~ 6.0 (قوشۇمچە G VII) بولۇشى كېرەك.

【نىسپىي زىچلىقى】 1.08 دىن (قوشۇمچە A VII) تۆمەن بولماسىلىقى كېرەك.

【باشقىلار】 مىكستۇرا ياسالىلىرىغا ئالاقىدار ھەر خىل بەلكىلىملىر (قوشۇمچە J I) گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 رەئىس ئەزالار (بۈرەك، مېڭە، جىڭە)نى قۇۋۇقتىلىدۇ. يۈرەك ئېغىپ، نەپىس قىستاش، ئاشقازان ئاغرىپ قەي قىلىش، مۇچىلەر پالماچلىنىش ۋە ئاغرىش، روھىي جەھەتتە چارچاپ ماغدۇرسىزلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مقدارى】 ھەر قېتىمدا 10ml 10 دىن كۈنىگە 3 قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر ئامپۇلى 10ml لىق.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، سايىھ، سالقىن، قورغاقى جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0150-98

گولقهنت
玫瑰花糖膏

Mei gui hua tang gao

بۇ دوا يېڭى (ھۆل) قىزىگۈلىنى پىشىقلاپ ئىشلەشتىن تەيىارلانغان شېكمىللەك قىيامدىن ئىبارەت. **【ياساش ئۆسۈلى】** ھۆل قىزىكىلۇ بەرگىسىدىن 1000g ئېلىپ، بۇنىڭغا ساڭخاروزىدىن 3000g قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ سىرلىق قاچقا ياكى ساپال قاچىغا قاچىلاپ، ئېغىزىنى ھم ئېتىپ، ئاپتاتىپا 40 كۈن تۇرغۇزۇپ (بۇ مەزىگىلەدە ھەر 10 كۈندە بىر قىتسە تولۇق ئارىلاشتۇرۇپ قويۇلدۇ)، بوتۇلكلارغا قاچىلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ قارامتۇل قىزىل رەڭلىك شېڭەرلىك قىيام بولۇپ، ئۆتكۈر قىزىلگۈل پۇرقىغۇ نىڭ، تەممى تاتلىق.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 10g ٹېلىپ، بۇنىڭغا 40ml سۇ قوشۇپ، ئارلاشتۇرۇپ، سۈزۈلدى. سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقىن 1ml ٹېلىپ، بۇنىڭغا 1% لىك تۆمۈر ترباخورىد سىناق ئېرىتىمىسىدىن 1~2 تامىچە تېمىقاندا، ئېرىتىمە كۆكۈش قارامتۇل دەگە كىرىدى. سۈزۈلگەن ئېرىتىمىدىن يەنە 1ml ٹېلىپ، بۇنىڭغا ماڭنىي تالقىنىدىن ئازاراق ۋە تۆز كىسلاتسىدىن 1ml قوشقاندا، ئېرىتىمە قىزىل دەگە كىرىدى.

(2) **【پەرقەندۈرۈش】** نىڭ (1) تۈرىدىن ئېشىپ قالغان سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقىن ٹېلىپ، بۇنىڭغا ئېفر قوشۇپ، هەر قېتىمدا 40ml دىن 2 قېتىم چەككىلىپ، ئېفر سۈيۈقلۈقلۈرىنى بىرلەشتۈرۇپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلۇرىنى 0.5ml ئېفردا ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. قىزىلگۈل سېلىشتۇرما دورىسىدىن 2g ٹېلىپ، بۇنىڭغا 5ml ئېفر قوشۇپ، 30 مىنۇت چالغىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقىنی پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلۇرىنى 0.5ml ئېفردا ئېرىتىپ، بۇ سېلىشتۇرما دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) سىنىقى بويىچە، يۈقرىدىكى ئىككى خىل ئېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml 10 شۇمۇرۇپ ٹېلىپ، نېبىز قەۋەتلىك سىلىتىسيه بىلىمى G لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقىقىغا تېمىتىپ، سىكلۇھېكىسان، ئېتىل ئاتىپتات (3:17) نى يېسىلدۈرگۈچى قلىپ يېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، 5% لىك ۋانلىن سۇلغات ئېرىتىمىسىنى پۇرکۈپ، داغ توچكىلىرىنىڭ رەڭگى ئېنىق كۆرۈنگىچە C 105 لق ھارادەتە قاقلىنىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەرىدا، سېلىشتۇرما دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئۇخشاش ھەڭلىك داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا شېكەرلىك قىيام ياسالىلىرىغا ئالاقىدار ھەر خىل بەلگىلىملىر (مەزكۇر تۈلچەمدىكى 2-قوشۇمچە) گە تۈيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 كۆڭۈلى تېچىپ، روھلاندۇردى، ئاشقازاننى ساغلاملاشتۇرۇپ، ئاغرىق توختىسىدۇ. جىگەردىكى توسالغۇلار كەلتۈرۈپ چىقارغان تىچى سىقلىش، قورساق كۆپۈش، ئاشقازان ئاغرىش، تىچى تىتلداش، تۇنۇتقاقيقق، قەۋزىيەت، ئىشتىها ئازلاش ۋە تۇبىر كۈلىيۈز قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 هەر قېتىمدا 20g دىن كۈنگە 3 قېتىم، ئۇدا 7 كۈندىن كۆپىرەك ۋاقت ئىچىلىدۇ. بىللارغا مىقدارى ئازايىتلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 هەر بىر بوتۇلكغا 400g قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 تېغزى ھىم تېتلىپ، سالقىن، سايىھ ئورۇندا ساقلىنىنىدۇ.

WS₃-BW-0151-98

سۇمبۇل ئىچىمىلىكى 松补力口服液

Song bu li Kou fu ye

بۇ دورا سۇمبۇل چىنى ېشىشقاپ ئىشلەشتىن تەيارلانغان ئىچىمىلىكتىن ئىبارەت.

【ياساش ئۇسۇلى】 سۇمبۇل چىندىن 100g ئېلىپ، بۇنىڭغا 1000ml سۇ قوشۇپ، 24 سائەت چىلاپ پارلاندۇرۇپ، دىستىللەپ، 300ml دىستىللەنگەن سۇيۇقلۇق يىغۇزىلىنىپ تەيارلاپ قويۇلدۇ، دورا سۇيىنى سۈزۈپ، دورا تىرىپىغا مۇۋاپىق مقداردا سۇ قوشۇپ، 30 مىنۇت قابىنتىپ، سۈزۈپ، ئىككى قېتىمى سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنى بىرلەشتۈرۈپ، بۇنىڭغا مۇۋاپىق مقداردا ساڭخاروزا قوشۇپ، تەخىمنەن 700ml قالغىچە قويۇلدۇرۇپ، 0.15% لىك بېنزوئىك كىسلاتا قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، سوۋۇتۇپ، يۇقىرىدى. كى دىستىللەنگەن سۇيۇقلۇقنى بىر تەرمىتىن قوشۇپ بىر تەرمىتىن ئارىلاشتۇرۇپ، ئۆمۈمىي مقدارى 1000ml بولغۇچە سۇ قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، ئامپۇللارغا قاچىلاپ مىكروبسىزلاندۇرۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك سۇيۇقلۇق بولۇپ، خۇشبۇي پۇرادىدۇ، تەمى تاتلىق قېرىقراق كېلىدۇ.

【پەرقەندۇرۇش】 بۇ دورىدىن 10ml 10ml ئېلىپ، سۇيۇقلۇقلارنى ئايىيدىغان ۋارۇنكىغا قۇبۇپ، 20ml ئېغىر قوشۇپ، 5 مىنۇت چالغىتىپ، ئېغىر سۇيۇقلۇقنى ئايىۋېلىپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلىرىغا 1% لىك ۋانىللىن سۇلغات ئېرىتمىسىدىن 3 ~ 2 تامىچە تېمىتقاندا، ئېرىتمە قېنىق سۆسۈن رەڭگە ئۆزگەرىدى.

【تەكشۈرۈش】 نىسپىي زېچلىقى 1.12 دىن تۆۋەن بولماسلقى (قوشۇمچە A VII) كېرەك.

【pH قىممىتى】 3.5~5.5 (قوشۇمچە G VII) بولۇشى كېرەك.

【باشقىلار】 مىكستۇرا ياسالىلىرىغا ئالاقدىار ھەر خل بەلگىلىملەر (قوشۇمچە J I) گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يۈرەكى قۇۋۇقتىلەپ، نېرۇنى تىنچلاندۇرۇپ، ئاشقازان خىزمىتىنى كۈچەيتىدۇ. يۈرەك سېلىش، نېرۋا ئاجىزلىقى، قورساق ئاغرىش، ئاشقازان كېسىلى قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 20ml~10 دىن كۈنگە 3 قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر ئامپۇلغا 10ml قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، سالقىن، سايىه، قۇرغاق جايىدا ساقلىنىدۇ.

هەبى لوبۇبى كەبر

罗补甫克比日丸

luo bu pu ke bi ri Wan

[رېتىپپ]

10g	نارمىشكى	24g	بۇقا چۈيىسى
10g	دارچىن	10g	خولىنجان
12g	پىياز ئۇرۇقى	12g	چامغۇر ئۇرۇقى
10g	كاشۇچىن	42g	كۈنچۈت
12g	قووغۇن ئۇرۇقى	12g	تەرخەمەك ئۇرۇقى
10g	ئاسارۇن	18g	قىزىل بەھمن
12g	قارا كۆز بەدىيان	40g	نارچىل
10g	ناماڭشامىكۇل يىلىتىزى	12g	قۇستە كەلىخ
12g	زەنجىشىل	50g	چىلغۇزا
12g	كۈدە ئۇرۇقى	12g	زاغۇن ئۇرۇقى
15g	ئۇغرىتىكىن	10g	پىلىپىل
20g	چىگىت	12g	بېدە ئۇرۇقى
10g	بەسباسە	10g	قەلمىپۇر
5 g	زەپەر	14g	سەۋزە ئۇرۇقى
20g	جوپۇز	60g	تاتلىق بادام

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 30 خىل دورىدىن زەپەردىن باشقى، قالغان بۇقا چۈيىسى قاتارلىق 29 خىل دورىنى سوقۇپ يۇمشاق تالقانلاپ، زەپەرنىمۇ يۇمشاق سوقۇپ، ھەممىسىنى تەكشى ئارلاشتۇرۇپ، چەككىلەنگەن ھىسىلدىن 650g ~ 550g قوشۇپ، تەكشى ئارلاشتۇرۇپ، ئۇششاق ھەب تېيارلىنىپ قۇرۇتۇلدى.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا قارا رەڭلىك ئۇششاق ھەب بولۇپ، خۇشبۇي پۇرايدۇ، تەمى سەل قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 2g ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، بۇنىڭغا پېتىرلەئوم ئېفرىدىن 5ml قوشۇپ، بىر كېچە تۇرغۇزۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنى پارلانىدۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلىرىغا 5% لىك ۋانلىلىن سۇلۇفات ئېرىتمىسىدىن 2 ~ 1 تامىچە تېمىتىسا، ئېرىتمە قىزغۇچ سۆسۈن رەڭگە كىرىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 ھەب ياسالىلىرىغا ئالاقدار ھەر خىل بەلگىلىملەر (قوشۇمچە A) گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 مېڭە ۋە بۇرەكىي كۈچەيتىپ، يۈرەكىي قۇۋەتلەپ، مەننىيىنى كۆپىيتىدۇ. باه ئاجىزلىقى، خامۇشلۇق، مەننىيىنى تۇتالماسلق، بالدۇر مەننىي كېتىش، بەدمەن ئاجىزلاش، تۇرۇقلالاش، نېرۋا ئاجىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 15~10 ھەبىن، كۈنىگە 2 قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر ھەب 0.3g

【ساقلالاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، نەملىكتىن ساقلىنىدۇ.

فۇرسى مەسها

固精麦斯哈片

Gu jing Mai si ha pian

[رېتىسىپ]

40g	قەلمەپۇر	40g	ئاقىر قەرە
40g	زورمنباد	40g	قىزىلگۈل
40g	مىستىكى رۇمى	40g	لاچىندانە
40g	سۇمبىل چىنى	40g	سۇئىدى
40g	قاقلە	40g	جوپۇز
		40g	زەپەر

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 11 خىل دورىدىن زەپەر سوقۇلۇپ ئىنتايىن يۇمشاق تالقانلىنىدۇ، ئاقىر قەرە، قەلمەپۇر، مىستىكى رۇمى، قاقلە ۋە لاجىندانە قاتارلىق بىش خىل دورىنى سوقۇپ يۇمشاق تالقان قىلىپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇلدى. قىزىلگۈل قاتارلىق قالغان بىش خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، 1-2.5 سائىم، 2-3.0-قېتىم 1.5 سائىم ئىچىن جەمئىي 3 قېتىم قايىتىپ، قايىتىلىملىرىنى قوشۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلىقنىڭ نىسپىي زىچلىقى (C₅₀) 1.28~1.26، بولغۇچە قوبۇلدۇرۇپ، مەلھەم قىلىنىپ، بۇنىڭغا يۇقىرىدىكى ئىككى خىل تالقاننى تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانچە تەبىيارلاپ، بېسىپ 1000 دانه قۇرس ياسىلىدۇ ۋە سىرتىغا شېكەر ياللىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا شېكەر ياللىغان قۇرس بولۇپ، شېكەر ياللىغىناندىكى ئىسىلى رەڭگى قوڭۇر بولىدۇ. ئالاھىدە خۇش پۇراقلقى، تەمى قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنى مىكروسكوب ئاستىدا كۆزەتكەندە: تاش ھۈچىرىسى توپ-توپ حالىتتە ياكى تارقاق حالىتتە، تۆشۈك تېرىقچىسى روشن، شەكلى چاسىسمان، ئۇچبۇرۇجەك ياكى كۆپ تەرمەپىلەك بولۇپ، ئۇزۇنلىقى 30~110 μm ، كەڭلىكى 20~50 μm كېلىدۇ. ئۆتكۈزۈگۈچ تۈرلىرىنىڭ دىمائىپتىرى 90~20 μm كېلىدۇ. ئىنۇلۇن ھەممە يەردە ئۇچرايدىغان بولۇپ، شەكلى تەرتىپىز كېلىدۇ. (2) بۇ دورىدىن 2g ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، بۇنىڭغا 10ml ىېفر قوشۇپ، بىر نەچىچە منۇت چالغىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلىق سىناق قىلىنぐۇچى دورا تېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن ئېۋگىنول سېلىشتۈرما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئېفر قوشۇپ، ھەر 1ml دا 16mg دورا بولغان تېرىتىمە تەبىيارلىنىپ، سېلىشتۈرما دورا تېرىتىمىسى قىلىنىدۇ، نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىتىر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VII) سىنىقى بويىچە، سىناق قىلىنぐۇچى تېرىتىمىدىن 1mg، سېلىشتۈرۈلغۇچى تېرىتىمىدىن 1mg شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سېلىتسىبە يېلىمى G لىق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، بېتىرولېپۇم ئېفرى (C 60~90)-ئېتل ئاتېتات (1:9)نى يېسىلىدۇرغۇچى قىلىپ يېسىلىدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتسۇپ،

5% لىك ۋانىللەن سۇلغات ئېرىتىمىسىنى پۇركۈپ، ئىسىق شامالدا داغلىق تۈچكىلار روشەنلەشكىچە شامالدىتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۇرما دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ۇخشاشىش رەڭلىك داغ تۈچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

(3) بۇ دورىدىن 5g ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، بۇنىڭغا 20ml ئېفر قوشۇپ، پات-پات چالغىتىپ، بىر سائەت تۇرغۇزۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇقۇپ، قالدوقلەرنى 0.5ml ئاتىپتاتا ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن سۇئىدى سېلىشتۇرما دورىسىدىن 0.5g ئېلىپ، ئېفردىن 2ml قوشۇپ، بىر نەچچە منۇت چالغىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇق سېلىشتۇرما دورا ئېرىتىمى قىلىنىدۇ. ئاندىن يەنە Cyperone —ه سېلىشتۇرما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئېلىپ ئاتىپتات قوشۇپ، هەر بىر ml 1mg دا دورا تۇتقان سۇيۇقلۇق تەبىارلاپ، سېلىشتۇرۇلدىغان دورا ئېرىتىمى قىلىنىدۇ. نېپىز فەۋەتلەك رەڭ سېپىكتىر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) سىنقى بويىچە، يۇقىرىدىكى 3 خىل ئېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 2μl شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېپىز فەۋەتلەك سىلىتىسيي بىلىمى GF₂₅₄ لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ بېنىزول، ئېتىل ئاتىپتات، قاتىق ئاتىپتات كىسلاطا (5:92:5) نى يېسىلدۇرۇغۇچى قىلىپ يېسىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇقۇپ، ئۇلترا بىنەپشە نۇر چىرىغى (254nm) ئاستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۇرما دورىلارنىڭ ئايىرم-ئايىرم ھەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ۇخشاشىش رەڭلىك داغ تۈچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرس ياسالىلىرىغا ئالاقدىار ھەر خىل بەلگىلىملەر (قوشۇمچە ID) گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 بەدمىنىڭ تۇتۇۋېلىش كۈچىنى كۈچەيتىپ، مېڭىنى قۇۋۇچەندۇرۇپ، مەننىنى توتۇپ، سۈيدۈكىنى ئازايىتىدۇ، چاچنى قارايتىدۇ. مەننى تۇتالماسلق، سۈيدۈك تۇتالماسلق، بەدمىن ئاجىزلاپ، بالدۇر مەننى كېتىش، چاچ بالدۇر ئاقىرىش، روھىي جەھەتتە چارچاپ ماغدۇرسىزلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 6~4 قۇرسىن، كۈنگە 2 قېتىم ئىچىلىدۇ.
【ساقلاش】 ئېغىزى ھەم ئېتلىپ ساقلىنىدۇ.

ھەجۇنى ئىترىفلى كەبر 和胃依提爾菲力开比尔蜜膏

He wei yi ti er fei li kai bi er Mi gao

【رېتىپپ】

8 g	ئاق بەھەمەن	22g	قارا ھېليلە
8 g	كۈنجۈت	22g	ئامىلە
22g	بەليلە پوستى	8 g	زەنجىۋىل
22g	پىلىپ	8 g	ئەرمۇدۇن ئۇرۇقى
8 g	تەرتىز	8 g	خەشخاش ئۇرۇقى
8 g	قىزىل بەھەمەن	22g	ھېليلە پوستى
49g	تاتلىق بادام	22g	قارىمۇچ
		8 g	شاقاڭۇل مىسىرى

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 15 خىل دورىنى سوقۇپ، يۇمىشاق تالقانلاپ، مۇۋاپىق مىقداردا چەككىلەنگەن ھەسەل قوشۇپ، تەكشى تارىلاشتۇرۇپ، 1000g قىلىپ تەبىيارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا قوڭۇر رەڭلىك قويۇق مەجون بولۇپ، سەل خۇشبۇي پۇرايدۇ، تەمى تاتلىق، قىرتاق، ئاچچىرقاڭ كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 1g ئېلىپ، 30ml سۇ قوشۇپ، 2 سائەت چىلاپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقتىن 2ml ئېلىپ، بۇنىڭغا تۆمۈر تېرىخلورىد تەجربىي سۇيۇقلۇقتىدىن بىر تامىچە قوشقاندا، قېنىق كۆڭ چۆكمە ھاسىل بولىدۇ. سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقتىنى يەنە 2ml ئېلىپ، بۇنىڭغا ناتىرىي خلور گېلاتىن تەجربىي سۇيۇقلۇقتىدىن بىر تامىچە قوشقاندا، ئاق رەڭلىك چۆكمە ھاسىل بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا مەجون ياسالىلىرىغا ئالاقدار ھەر خىل بەلگىلىمىلەر [مەزكۇر ئۆلچەمدىكى 1. قوشۇمچە] كە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئاشقازاننى مۆتىدىللەشتۈرۈپ، توسابغۇلارنى راۋانلاشتۇرۇش، ئۆچەيگە مەنپەئەت قىلىپ، قانىنى تازىلاش رولى بار. غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلىتىدىن كېلىپ چىققان ئاشقازان كۆپۈش، تاماقتىن كېيىن ئاشقازان ئاغرىش، ھەزم قىلىش ناچارلىشىش، روھىي جەھەتنىن چارچاپ، ئۇنۇتقاڭ بولۇپ قىلىش، ئاشقازان تۆۋەنلىش ۋە سۈيدۈك يوللىرى كېسەللىكلىرى فاتارلىقلارغا ئىشلىتلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قىتىدا 10g~5 دىن كۈنىگە 1 قىتم ئىچىلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 باللار ۋە قۇرۇق ئىسسىق مىجەزلىك كىشىلەرگە ئىشلىتىش مەنئى قىلىنىدۇ.

【ئۆلچەمى】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، قۇرغانق، سالقىن ھەم سايىه ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0155-98

قۇرسى كۈندۈر

金锁昆都尔片

jin suo Kun du er Pian

			رہنسپ
20 g	زنجبول	50 g	کونڈوں
50 g	قوسٹہ تملخ	50 g	بھللوں
20 g	قارموج	105g	سوئندی

«یاساش ئۇسۇلى» يۇقىرىدىكى 6 خىل دورىنى سوقۇپ، يۇمىشاق تالقانلاپ، ئەلگەكتىن نۇتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، مونوساخارىد قىيامى ۋە مۇۋاپىق مىقداردا كراھمال قوشۇپ دانىچە تېبىارلاپ، فۇروتۇپ، بىسىپ 1000 دانە فۇرسى ياسىلىدۇ.

«شکلی ۋە خۇسۇسىيىتى» بۇ دورا قوئۇر رەڭلىك قۇرس بولۇپ، خۇشبۇي پۇرايدۇ، تەمى ناچىق هەم قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندىرۇش】 (1) مەزكۇر دورىنى مىكروسكوبىتا كۆزەتكەننە، تاش ھۈچىرىلىرى سۇس سېرىق رەڭلىك، دىۋارى سەل قېلىتىراق، تالا تۇتامى ساراغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، دىۋارى ئىنتايىن قېلىن كۆرۈنىدۇ. (2) بۇ دورىدىن 5 قۇرس ئېلىپ، يۈمىشاق سوقۇپ ئۇنىڭغا 20ml ئېفر قوشۇپ، بىر كېچە تۇرغۇزۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلەرنى 5ml 0.5ml ئېتىل ئاتىپاتتا ئېرىتىپ، سىناق قىلىنغاچى دولا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن ھەر سېپىرون سېلىشتۈرما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئېتىل ئاتىپات قوشۇپ، ھەر 1mg دا 1ml دولا تۇتقان ئېرىتمە تەبىيارلىنىپ، بۇ سېلىشتۈرما دولا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) سىنىقى بويىچە، يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1m 10 شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سلىتسىيە يېلىمى GF₂₅₄ لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقىتىغا تېمىتىپ، بېنىزول-ئېتىل ئاتىپات-قاتىق سرکە كىسلاتاسى (5:5:92)نى يېيىلدۈرگۈچى قىلىپ يېيىلدۈرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنەپىشە نۇر چىرىغى (254nm) ئاستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنغاچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا سېلىشتۈرۈلغۈچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئۇخشاش رەڭلىك داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ. بۇنىڭغا 2، 4-دىنلىرىفېنىلەيدىرازىن ئېتىانول تەجىرىبە سۈيۈقلۈقىنى پۇركۈگەننە، بىر دەمدىلا داغ توچكىلىرى تەدرىجىي قىرغۇچ ئاپىلسىن رەڭگە ئۆزگىرىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرس ياسالىلىرىغا ئالاقىدار ھەر خل بەلگىلىملىر (قوشۇمچە ID) كە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ھۆلۈكىنى يوقتىپ، بەدەنى قورۇيدۇ. مەنبىنى تۇتسىدۇ.

مەنبى تۇتالماسلىق، سۈبۈك تۇتالماسلىق، تۈچىي ياللۇغى، تىچى سۈرۈش، تۇق خۇن كېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 6~3 قۇرسىن، كۈنگە 2 قېتىم ئىچىلدى.

【تۈلچىمى】 ھەر بىر قۇرس 0.5g

【ساڭلاش】 ئېغىزى هىم ئېتلىدى.

WS₃-BW-0156-98

دینار شہریتی

炎消迪娜儿糖浆

Yan xiao Di na er Tang jiang

ریتسب

30 g	گاۋىزبان	120g	كالسنه ييلتىزى
30 g	نېلۇپەر	40 g	رەۋەن
60 g	قىزىلكۈل	9 g	سېرىق ئۆت ئۇرۇقى

«یاساش ئۆسۈل» يۇقىرىدىكى 7 خىل دورغا سۇ قوشۇپ، ھەر قېتىمدا 2 سائەتىن 3 قېتىم قاينىتىپ، قايناتمىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈبۈقلۈقىنى مۇۋاپىق مىقداردا قوبىلدۇرۇپ، بۇنىڭغا 600g ساڭخاروا قوشۇپ، ئېرىگىچە قاينىتىپ، سۈزۈپ، ئومۇمۇي مىقدارى 1000ml بولغۇچە سۇ قوشۇپ ئابلاشتۇرۇلدى.

«شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» بۇ دورا قوڭۇر رەڭلىك سۇيۇقلۇق بولۇپ، تەمى تاتلىق، سەل قېرىق كىلىدۇ.

«پەرقلەندۈرۈش» (1) بۇ دورىدىن 50ml 5 ئېلىپ، بۇنىڭغا 50ml خلوروفورم قوشۇپ، چالغىتىپ چەككىلەپ، خلوروفورم قەۋىتىنى ئايىرىۋېلىپ، 100ml سۇ قوشۇپ يۈيۈپ، يۇغان سۇنى ئېلىۋىتىپ، خلوروفورم سۈيىقۇلۇقنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلىرىنى 2ml مېتىل ئىسپىرتتا ئېرىتىپ، پروبرىكغا قويۇپ، بۇنىڭغا ماڭنىي تالقىنىدىن ئازراق ۋە تۇز كىسلا تاسىدىن بىر نەچچە تامىچە تېمىتقاندا، ئېرىتىمە قىرغۇچ سوْسۇن رەڭگە كىرىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 50ml ئىلىپ، بۇنىڭغا ئىتىل ئاتىپتات قوشۇپ، هەر قېتىمدا 20ml 3 دىن قېتىم چەككىلەپ، چەككىلەنگەن سۇيۇقلۇقلۇقلارنى بىرلاشتۇرۇپ، 20ml سۇ بىلەن يۈيۈپ، يۇغان سۇنى ئايىپ ئىلىۋىتىپ، ئىتىل ئاتىپتات سۇيۇقلۇقىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇقتۇپ، قالدوقلۇرىنى 2ml مېتىل ئىسپىرتتا ئېرىتىپ، بۇ سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن رەھەن سېلىشتۇرۇما دورىسىدىن 0.5g ئىلىپ، بۇنىڭغا 5ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، سوغوق جايىدا 24 سائەت تۇرغۇزۇپ، سۇزۇپ، سۇزۇلگەن سۇيۇقلۇقىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇقتۇپ، قالدوقلۇرىنى 1ml مېتىل ئىسپىرتتا ئېرىتىپ، سېلىشتۇرۇما دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۆسۈلى (قوشۇمچە B VI) سىنىقى بويىچە سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمىدىن 10μm، سېلىشتۇرۇلغۇچى ئېرىتمىدىن 1μm شومۇرۇپ ئىلىپ، نېبىز قەۋەتلىك سىلىتىسيه بىللەمى لىق تاختا ئۆستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقىتغا تېمىتىپ، پىترولېئوم ئېتىر (60~30°C)، ئىتىل فورمات، فورمىك ئاتىسىد (15:5:15)نى بىسىلدۈرۈچى قىلىپ بىسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، كۇن نۇرى ئاستىدا

كۆزتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۈرۈلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاش رەڭلىك 5 دانه داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ. ئۇلترا بىنەپشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزمەتكەندە، 5 دانه سارغۇچ ئاپپىلسىن رەڭلىك جۇلالىق نۇرلۇق داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ، ئاممىياك گازىدا ئىسلەغاندىن كېيىن، كۈن نۇرى ئاستىدا كۆزمەتكەندە، داغ توچكىلىرى قىزىل رەڭگە ئۆزگەرىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 نىسپىي زىچلىقى 1.10 دىن (قوشۇمچە A VII) تۆۋەن بولماسىلىقى كېرەك.

【pH قىممىتى】 4.5~5.5 (قوشۇمچە G VII) بولۇشى كېرەك.

【باشقىلار】 شەربەت ياسالىلىرىغا ئالاقدار ھەر خل بەلكىلىملىر (قوشۇمچە H I) گە ئۇبىغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سۈبىدۇك ھەيدەپ، ئىشىق ياندۇرۇنىدۇ، قىزىتىنى چوشۇ-رۇپ، ئاغرىق توختىنىدۇ. ھەر خل جىڭەر ياللۇغى، ئۆت خالتا ياللۇغى، سۈبىدۇك يولى يوقۇملىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 30ml 3 دىن كۈنگە 3 قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بوتۇلكىغا 200ml قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 تېغىزى ھىم ئېتلىپ، سالقىن، سايە جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0157—98

ئەۋرىشىم ئىچىمىلىكى

宝心艾维西木口服液

Bao xin Ai wei xi mu Kou fu ye

【ربىسېپ】

10 g	تۇد هىندى	400g	پىله غوزسى
200g	بادرنجى بۇياچىنى	20 g	ئاق سەندەل
200g	ئۈستەتۈددۈس	10 g	سازەج ھىندى
10 g	پوستى تۇرۇنچى	1 g	زەپەر
40 g	فەرنىجىمىشىكى	200g	گاۋىزبان

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقرىدىكى 10 خىل دورىدىن زەپەردىن باشقا، پىله غوزسى قاتارلىق 9 خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، 1-قېتىم بىر سائەت، 2-قېتىم بىر سائەت جەمئىي ئىككى قېتىم قايىتىلىدۇ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە دىستىللەنگەن سۇيىدىن 400ml 4 يىغىپ تەيارلىنىدۇ. قايىتامىلارنى بىر لەشتۈرۈپ، سۇزۇپ، سۇزۇلگەن سۇيۇقلۇقلارنى نىسپىي زېچلىقى (C°) 50~1.15~1.10 بولغۇچە قويۇلدۇرۇپ، تەركىبىدە ئىسپەت مقدارى 75% بولغۇچە ئېتىل ئىسپەرتىنى قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، 24 سائەت تىنج تۇرۇغۇزۇپ، سۇزۇپ، سۇزۇلگەن سۇيۇقلۇقتىن بىسسىم تۆۋەنلىتىش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئىسپەرت يىغۇزىلىنىدۇ ھەممە مۇۋاپىق مقداردا قويۇلدۇرۇلدى. زەپەرگە 60% لىك ئېتىل ئىسپەرتىنى قوشۇپ، ئايلانما ئېتىل 3 سائەت چەككىلەپ، سۇزۇپ، سۇزۇلگەن سۇيۇقلۇقتىن بىسسىم تۆۋەنلىتىش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئېتىل ئىسپەرت يىغۇزىلىنىدۇ ھەممە مۇۋاپىق مقداردا قويۇلدۇرۇلدى. ئاندىن يۇقرىقى ئىككى خىل قويۇلدۇرۇلغان سۇيۇقلۇقلارنى ۋە دىستىللەنگەن سۇيۇقلۇققى بىر لەشتۈرۈپ، مۇۋاپىق مقداردا ھەمسەل قوشۇپ، ئۇمۇمىي مقدارى 1000ml بولغۇچە سۇ قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، ئامپۇللارغا قاچىلىنىپ، مىكروبىسىزلانىدۇ. رۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قوڭۇر رەڭلىك سۇيۇقلۇق بولۇپ، تەمى ئاچىقىق ھەم سەل قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 2ml 1% ئۆنىڭغا لىك تۆمۈر تېخلۈرىد تەجىرىبە دورىسىدىن 3~2 تامىچە قوشقاندا، ئېرىتىمە دەرھال كۆكۈش سۆسۈن رەڭگە كىرىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 10ml 1% n-بۇتانول بىلەن ھەر قېتىمدا 10ml دىن 3 قېتىم چەككىلەپ، n-بۇتانول سۇيۇقلۇقلارنى بىر لەشتۈرۈپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلارنى 1ml ئېتىل ئىسپەرتتا ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. سېرىن سېلىشتۈرۈمە دورىسىدىن ئازراق ئېلىپ، ئۆنىڭغا 50% لىك ئېتىل ئىسپەرت قوشۇپ، ھەر 1ml دا 1mg دورا تۇتقان ئېرىتىمە تەيارلىنىپ، بۇ سېلىشتۈرمە دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) سىنلىقى بويىچە،

يۇقىرقى ئىككى خىل ئېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن $5\text{ }\mu\text{l}$ شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېبىز قەۋەتلىك سلىتىسىيە بېلىمى G لىق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، n - پروپانول، سۇ (3:7)نى يېسىلدۈرگۈ-چى قىلىپ يېسىلدۈرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇقۇپ، نىنھىدرىن تەجىرىبە سۇيۇقلۇقىنى پۇركۇپ، ئىسىق شامال بىلەن توچكىلىرىنىڭ رەڭگى روشنەلەشكىچە شامالدىتىدۇ، سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپكىرىدا، سېلىشتۇرۇلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپكىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندادا ئۇخشاش قىزغۇچ سۆسۈن رەڭلىك داغ توچكىلىرى كۆرۈندۇ.

【تەكشۈرۈش】 نىسپىي زېچلىقى 1.05 دىن (قوشۇمچە A VII) تۆۋەن بولماسلىقى كېرەك.

pH قىممىتى 4.0:6.0 (قوشۇمچە G VII) بولۇشى كېرەك.

【باشقىلار】 بۇ دورا مىكستۇرا ياسالىلىرىغا ئالاقدار ھەر خىل بەلگىلىمىلەر (قوشۇمچە J I) گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يۈرەكىنى كۈچەيتىپ، جىڭىرگە مەنپىمەن ئىلىدۇ. روھىيىhalt، نېرۋىلارنى تىنچلاندۇردى. يۈرەك سېلىش، نېپس تېزلىشىش، باش قېبىپ كۆز قاراڭخۇلىشىش، كۆڭۈل ئېلىشىپ قۇسۇش، ئىشتىها ناچارلىشىش، ئۇزۇقلۇنىش ناچارلىق، نېرۋا ئاجزىلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 10ml دىن كۈنىگە 2 قېتىم ئېچلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر ئامپۇلى 10ml قاچلىنىدۇ.

【ساقاڭلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، سالقىن، سايىھ جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0158—98

بىنەپشە شەربىتى

降热比那甫西糖浆

Jiang re Bi na pu xi Tang jiang

【رېنسېپ】

12g	خەشخاش ئۇرۇقى	12g	بىنەپشە
60g	سەرىستان	12g	لەيلىكۈل ئۇرۇقى
12g	چۈچۈكبۈيا	12g	چىلان
12g	خەشخاش پوستى	12g	نېلۇپەر

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 8 خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، ھەر قېتىمدا بىر سائەتتن ئىككى قېتىم قايىنتىپ، قايىناتىملارنى بىر لەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقلارنى مۇۋاپىق مىقداردا قوييۇلدۇ. رۇپ، 650g ساكخاروزا قوشۇپ، تۇمۇمىي مىقدارى 1000ml بولغۇچە سۇ قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قوڭۇر رەڭلىك سۇيۇقلۇق بولۇپ، تەمى تاتلىق.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 30ml 3ىلىپ، بۇنىڭغا سۇدىن 30ml، ئاممىيەك سۇيىدىن 20ml قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، خلوروفورم بىلەن ھەر قېتىمدا 20ml دىن 3 قېتىم چەككىلىپ، خلوروفورم سۇيۇقلۇقلارنى بىر لەشتۈرۈپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلارنى 1ml مېتىل ئىسپىرتتا ئېرىتىپ، سىناق قىلىنگۇچى دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن كېيىن مورفن ھىدروخلورىد، كودبىئىن فوسفات، پاپاۋىرىن ھىدروخلورىد سېلىشتۈرۈما دورىلاردىن مۇۋاپىق مىقداردا 3ىلىپ، مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml دا ھەر قايىسى دورىلاردىن 1mg 1 دىن دورا تۇتقان ئارىلاشما ئېرىتمە تەيارلىتىپ، بۇ سېلىشتۈرۈما دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VI) سىنىقى بويىچە، يۇقىرىدىكى ئىككى خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1μl شۇمۇرۇپ 3ىلىپ، 2% لىك ناتىرى ھىدروكسىدى ئېرىتمىسى بىلەن تەيارلانغان سىلىتسىيە يېلىمى G لىق نېپىز قەۋەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، مېتىل ئىسپىرت، پروپانون، مېتىل ئىسپىرت، قويۇق ئاممىيەك تەجربى سۇيۇقلۇقى (0.1: 2: 3: 0.1) نى يېلىلدۈرگۈچى قىلىپ يېلىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇنۇپ، سۇيۇق بىسمۇت كالىي يودىد تەجربى سۇيۇقلۇقى پۇركۈلىدۇ. سىناق قىلىنگۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۈرۈلغۈچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردىكى مۇناسىپ ئۇرۇندا ئۇخشاش رەڭلىك داغ توچكىلىرى كۆرۈندۇ.

【تەكشۈرۈش】 نىسپىي زىچلىقى 1.25 (قوشۇمچە A VII) دىن تۆۋەن بولماسلقى كېرەك.

【pH قىممىتى】 3.5~5.5 (قوشۇمچە G VII) بولۇشى كېرەك.

【باشقىلار】 بۇ دورا شەربىت ياسالىلىرىغا ئالاقدىار ھەر خىل بەلگىلىملەر (قوشۇمچە H I)

گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قىزىتما چوشۇرۇپ، ئاغرىق پەسەيتىپ، يۆتەل توختىسىدۇ.
غەيرىي تەبىئىي سەپرادىن بولغان يۇقىرى قىزىتما، زۇكامداپ يۆتىلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.
【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 30ml ~ 15 دىن، كۈنگە 3 ~ 2 قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بوتۇلكغا 100ml قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 بۇغىزى ھىم بېتلىپ، سالقىن، سايىه جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0159—98

قۇرسى زىيابىت

降糖孜亚比提片

Jiang tang Zi ya bi ti Pian

【رېتسىپ】

28. 8g	مېھرىكىياه	72 g	شاقاڭۇل مىسىرى
72 g	ئۇزخىرچىنى	18 g	سېمىز ئوت ئۇرۇقى
45 g	بۇغا يۈمران مۇڭگۈزى	28. 8g	تاباشر
36 g	ئانار پوستى	1. 8 g	كەترا
126 g	قاياق ئۇرۇقى	18 g	چىلاپا

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 10 خىل دورىدىن ئۇزخىرچىنى بىلەن ئانار پوستىنى ئېلىپ، سۇ قوشۇپ ھەر قېتىمدا بىر سائەتتىن 2 قېتىم قايىتىپ، قايىتىملارنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقى نىسپىي زىچلىقى (C° 38~1.35) بولغۇچە قويۇلدۇرۇپ، سۈپۈق مەلھەم قىلىنىدۇ. يۈمران بۇغا مۇڭگۈزىنى 70% لىك ئېتىل ئىسپىرت بىلەن ئايلانما ئېقىمدا ھەر قېتىمدا بىر سائەتتىن 3 قېتىم چەككىلىپ، دورا تىرىپىغا يەنە سۇ قوشۇپ، ھەر قېتىمدا بىر سائەتتىن 2 قېتىم قايىتىپ، چەككىلمەنگەن سۈيۈقلۈق بىلەن قايىتىملارنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈقىنىڭ نىسپىي زىچلىقى (C° 50~60) 1.40~1.35 بولغۇچە قويۇلدۇرۇپ، سۈپۈق مەلھەم قىلىنىدۇ. قالغان شاقاقۇل مىسىرى قاتارلىق 7 خىل دورىنى سوقۇپ يۈمىشاق تالقانلاپ، يۇقىرىدىكى ئىككى خىل سۈپۈق مەلھەم بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، مۇۋاپىق مقداردا قوشۇمچە ماپېرىيالارنى قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانىچە تەبىيارلىنىپ، قۇرۇقتۇپ، بېسىپ 1000 قۇرسى ياسىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قوڭۇر رەڭلىك قۇرسى بولۇپ، خۇشبۇي پۇرايدۇ، تەمى تۈزۈق ھەم قىرتاق.

【پەرقلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 8 قۇرسى ئېلىپ، يۈمىشاق سوقۇپ، 70% ئېتىل ئىسپىرتتىن 5ml قوشۇپ، ئۇلترا ئاۋاز دولقۇنىدا 15 منۇت بىر تەرمەپ قىلىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈق سناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. يۈمران بۇغا مۇڭگۈزى سېلىشتۇرما دورىسىدىن 4g 0.4g ئېلىپ، بۇخشاش ئۇسۇلدا سېلىشتۇرما دورا ئېرىتمىسى تەبىيارلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VIB) سنقى بوبىچە، يۇقىرىدىكى ئىككى خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىسىدىن 1ml 5 شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سېلىتسىيە يېلىمى G لق تاخىتا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، n-بۇنانول، قاتىق ئاتىسىنىڭ ئاتىسىد، سۇ (1:3:1) نى يېسىلدۈرگۈچى قىلىپ يېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇقتۇپ، 20% لىك نىنھەدىن بۇنانول ئېرىتمىسىنى پۇركۈپ، C° 105 ھارارەتكە تەخمىنەن بىر نەچە منۇت قاقلىنىدۇ. سناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۇرۇلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردىكى مۇناسىپ ئۇرۇفدا

ئۇخشاش رەڭلىك غول داغ تۆچكىلىرى كۆرۈندىدۇ.
【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرس ياسالىلىرىغا ئالاقدار هەر خل بەلكىلىمىلەر (قوشۇمچە ID I)
گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.
【تەسىرى ۋە ئاساسىي داؤالايدىغىنى】 بۆرەكە مەنپەئىت قىلىپ، بەدەننى ساغلاملاشتۇرىدۇ،
ھۆللىۈكىنى قۇرۇتۇپ، ئەزىزلىرىنى چىكتىدۇ. تەبىئىي كۈچى، تۇتۇپ تۇرۇش كۈچى تۆۋەنلەشتىن كېلىپ
چققان سۈيىدۇك كۆپىيىش، ئۇسساش، چارچاش ۋە ئۇرۇقلاش فاتارلىق شېكەر كېسلىكە ئىشلىلىدىدۇ.
【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 7~5 قۇرۇستىن، كۈنىگە 2 قېتىم ئىچىلىدىدۇ.
【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرس 0.5g.
【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىلىدۇ.

WS₃—BW—0160—98

سەندەل شەربىتى 参德力糖浆 Shen de li Tang jiang

【رېتسېپ】

160g	قىزىلگۈل	80g
------	----------	-----

ئاق سەندەل

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى ئىككى خل دورىغا سۇ قوشۇپ، ھەر قېتىمدا 2 سائەتتىن 2 قېتىم قايىنتىپ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە دىستىللەنگەن سۇيۇقلۇقىدىن 400ml يىغۇشىلىپ، چەككىلىگەن سۇيۇقلۇقلارنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنى مۇۋاپق مقداردا قويۇلدۇرۇپ، ساكساروزىدە دىن 500mg قوشۇپ، ئېرىگىچە قىزىلدۇرۇپ، سوۋوچۇپ، يۇقىرىدىكى دىستىللەنگەن سۇيۇقلۇقنى قوشۇپ، ئۇمۇمىي مقدارى 1000ml بولغۇچە سۇ قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا سۇس قوڭۇر رەڭلىك سۇيۇقلۇق بولۇپ، خۇشبۇي پۇراقلقى، تەمى تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 30ml 3 ئىلىپ، بۇنىڭغا ئېفر قوشۇپ، ھەر قېتىمدا 15ml 15 دىن 3 قېتىم چەككىلەپ، ئېفر سۇيۇقلۇقلارنى بىرلەشتۈرۈپ، 15ml سۇ بىلەن چايقاب، سۈيىنى توڭۇۋىتىپ، ئېفرىنى شامالدىتىپ قۇرۇقتۇپ، قالدۇقلارنى 2ml مېتىل ئىسپىرتتا ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن ئاق سەندەل سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن 0.5g 1 ئىلىپ، 20ml ئېفر قوشۇپ، سوغۇق جايىدا 6 سائەت تۇرغۇزۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنى شامالدىتىپ قۇرۇقتۇپ، قالدۇقلارنى 1ml مېتىل ئىسپىرتتا ئېرىتىپ، سېلىشتۈرۈما دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپكىتىر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VII B) سىنلىق بويىچە، سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتمىسىدىن 1ml، سېلىشتۈرۈما دورا ئېرىتمىسىدىن 1ml 2 ئىلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سىلىتىسيه يېلىمى G لق تاختا ئۆستىدىكى ئاييرىم ئوقۇنغا تېمىتىپ، خلوروفورم، پىروپانون، مېتىل ئىسپىرت، ئاتىستىك كىسلاطا (0.5: 1.5: 2: 7) نى يېپىلدۈرگۇ-چى قىلىپ يېپىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇقتۇپ، ئۇلترا بىنەپشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپكىتىدا، سېلىشتۈرۈلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپكىتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇنىدا ئۇخشاش رەڭلىك ئىككى دانە داغ تۆچكىسى كۆرۈنىدۇ. بۇنىڭغا 1% لىك ۋانلىك سۈلافات ئېرىتمىسىنى پۇرکۈپ، داغ تۆچكىلىنىڭ رەڭى روشنلەشكىچە ئىسىق شامال بىلەن شامالدىتىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپكىتىدا، سېلىشتۈرۈلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپكىتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇفnda بىر دانە ئۇخشاش رەڭلىك داغ تۆچكىسى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 نىسپىي زىچلىقى 1:15 (قوشۇمچە A VII) دىن تۆۋەن بولماسلقى كېرەك.

pH قىممىتى 【 6.0~7.0 (قوشۇمچە G VII) بولۇشى كېرەك.】

【باشقىلار】 بۇ دورا شەربىت ياسالىلىرىغا ئالاقىدار ھەر خىل بەكلىمىلەر (قوشۇمچە H¹) گە تۈبىغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يۈرەكىنى كۈچەيتىپ، نېرۋىنى تىنچلانىدۇرۇپ، ئاغرىق ۋە ئىچ نۇتكۈنى توختىتىدۇ. غەيرىي تەبىئىي سەپرالاردىن بولغان يۈرەك سېلىش، يۈرەك ساھىسى ئاغرىش، بىش ئاغرىش ۋە قېيش، ئاشقازان ئاغرىپ، تىچى سۈرۈش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 30ml دىن، كۈنگە 3 قېتىم تىچىلىدۇ.
【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بوتۇلغا 200ml قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، سالقىن، سايىه جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0161-98

مۇنزاچ جەۋەرى 复方木尼孜其颗粒

Fu fang Mu ni zi qi Ke li

【رېتىسىپ】

60 g	كاسىنه يىلتىزى	120g	ئارپىبەدىيان يىلتىزى
60 g	چۈچۈكبۇيا	120g	ئادراسمان ئۇرۇقى
60 g	كەرمىشە يىلتىزى	60 g	سييادان
60 g	كاسىنه ئۇرۇقى	60 g	بادەنچى بۇيا چىنى ئۇرۇقى
60 g	ئىزخىرچىنى	60 g	لەيلىكۈل ئۇرۇقى
60 g	رەبەن ئۇرۇقى	60 g	بابۇنە
		120g	دۇم بەدىيان

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 13 خل دورىغا سۇ قوشۇپ، 1-قېتىم 2 سائىت، 2-قېتىم 1.5 سائىت، 3-قېتىم 1 سائىت جەممىي 3 قېتىم قايىنتىپ، قايىناتىلارنى بىر لاشتۇرۇپ، سۈزۈپ سۈزۈلگەن سۈبۈقلۈقىنىڭ نىسپىي زىچلىقى (50°C) $1.32 \sim 1.35$ بولغۇچە قوبىلدۇرۇپ، سۈبۈق مەلھەم قىلىنىدۇ. سۈبۈق مەلھەمدىن بىر ئۇلۇش ئېلىپ، بۇنىڭغا 4 ئۇلۇش ساڭخاروزا، بىر ئۇلۇش دېكىستىن قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانچە تەبىيارلاپ، قۇرۇقتۇپ، 1000g 1قىلىپ تەبىيارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا سارغۇچۇ قوڭۇر رەڭلىك جەۋەر بولۇپ، تەمى تاتلىق، سەل قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 10g ئېلىپ، يۇمىشاق سوقۇپ، ئاممىياك تەجربىه سۈبۈقلۈقىنى قوشۇپ نەمدەپ، 20ml خلوروفوروم بىلەن ئایلانما ئېقىمدا 30 منۇت چەككىلىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈبۈقلۈقى پارلاندۇرۇپ قۇرۇقتۇپ، قالدوقلۇرىنى 1ml سۇسزى ئىسپىرتتا ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن ئادراسمان ئۇرۇقى سېلىشتۇرما دورىسىدىن 1g ئېلىپ، ئوخشاش ئۇسۇلدا سېلىشتۇرما دورا ئېرىتمىسى تەبىيارلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VI) سىنىقى بويىچە، يۇقىرىدىكى ئىككى خل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml 5 شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سىلىتسىيە بىلەمى G لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقىغا تېمىتىپ، ئېتىل ئاتىپتات، مېتىل ئۇسپىرت، قويىق ئاممىياك تەجربىه سۈبۈقلۈقى (0.4:10)نى يېسىلدۈرگۈچى قىلىپ يېسىلدۈرۇپ، شامالدە ئېرىتىپ قۇرۇقتۇپ، ئۇلترا بىنەپىشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۇرۇلۇغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندادا ئوخشاش رەڭلىك جۇلالق نۇرلۇق داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا جەۋەھەر ياسالىلىرىغا ئالاقىدار ھەر خىل بەلكىلىمەر (قوشۇمچە IC) گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 خلىت ۋە مىزاجىنى تەڭشەپ، تۆت خىل غېرىي تېبىئىي خلىتنى پىشۇرىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 6g دىن كۈنگە 3 قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ئۇلچىمى】 ھەر بىر خالتىغا 12g قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ھىم ئوراپ ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0162-98

بادام جەۋەرى

复方巴旦仁颗粒

Fu fang Ba dan ren Ke li

【رېتسېپ】

20 g	كەترا	120g	تاتلىق بادام
208g	لەيلىكۈل تۇرۇقى	20 g	ئەرمىپ يېلىمى
160g	چۈچۈكبۈيا يېلىز قييامي	130g	قاپاق تۇرۇقى مېغىزى

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرقى 6 خىل دورىدىن ئەرمىپ يېلىمى، كەтра، چۈچۈكبۈيا يېلىز قىيامي قاتارلىقلار سوقۇپ يۇمۇقى تالقانلىنىدۇ، تاتلىق بادام قاتارلىق قالغان 3 خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، ھەر قېتىمدا بىر سائەتتىن 3 قېتىم قايىنتىپ، قايىناتمilarنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقلارنى مۇۋاپىق مقداردا قويۇلدۇرۇپ، يۇقىرقى تالقاننى ۋە مۇۋاپىق مقداردا ساكساروزا، كراخمال قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانىچە تەميارلاب، قۇرۇتۇپ 1000g قىلىپ تەميارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا ئاچ سېرىق دەڭلىك ھەب بولۇپ، پۇرۇقى خۇشبۇي، تەمى تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەندەرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 1g ئېلىپ، بۇنىڭغا 50% لىك ئېتلىل تىسپىرتتن 1ml قوشۇپ، مەلۇم ۋاقت ئارىلاشتۇرۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقىنى 2ml ئېلىپ، بۇنىڭغا نىنھەدىن تەجربىه سۇيۇقلۇقىدىن 1ml قوشۇپ، قايىاق سۇغا چىلاپ بىر نەچچە منۇت تىسسىق ئۆتكۈزگەندە، ئېرىتمە كۆكۈش سۆسۈن دەڭگە كەرىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 10g ئېلىپ، 50ml سۇ قوشۇپ، ئېرىتىپ سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقىنى سۇيۇقلۇق ئايىرىدىغان ۋارونكىغا قويۇپ، بۇنىڭغا ئېتلىل ئاتىپتات قوشۇپ، ھەر قېتىمدا 30ml دىن ئىككى قېتىم چەككىلەپ، ئېتلىل ئاتىپتات سۇيۇقلۇقلۇرىنى بىرلەشتۈرۈپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلۇرىنى 1ml مېتلىل تىسپىرتتا ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن چۈچۈكبۈيا سېلىشتۇرما دورىسىدىن 5g ئېلىپ، بۇنىڭغا 20mл مېتلىل تىسپىرت قوشۇپ، سوغۇق سۇغا 4 سائەت چىلاپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلۇرىنى 1ml مېتلىل تىسپىرتتا ئېرىتىپ، سېلىشتۇرما دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VII) سىنىقى بويىچە، سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتمىسىدىن 1ml، سېلىشتۇرما دورا ئېرىتمىسىدىن 1ml شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سىلىتسىبە يېلىمى G لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقىتىغا تېمىتىپ خلوروفورم، فورمىك كىسلاطا، قاتىق ئاتىپتىك كىسلاطا، قويۇق ئاممىيەك تەجربىه سۇيۇقلۇقى (2:15:1)نى يېلىدۇرغۇچى قىلىپ

بىيىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇروقۇپ، 10% لىك سۇلغات ئېتانول ھېرىتمىسىنى پۈركۈپ، داغ تۆچكىلىرىنىڭ رەڭگى روشنلەشكىچە ئىسىق شامال بىلەن شامالدىتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپكىرىدا، سېلىشتۈرۈلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپكىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندادا ئوخشاش رەڭلىك داغ تۆچكىلىرى كۆرۈنىدۇ. ئۇلترا بىنەپشە نۇر چىرغى (365nm) ئاستىدا كۆزىتىلىپ، سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپكىرىدا سېلىشتۈرۈلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپكىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندادا ئوخشاش رەڭلىك جۈلالق نۇرلۇق داغ تۆچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا جەۋەھەر ياسالىلىرىغا ئالاقدار ھەر خىل بەلگىلىملەر (قوشۇمچە C I) گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يىۋەل توختىتىپ، بەلغىم بوشىتىدۇ، ئۇيقۇنى ياخشىلايدۇ. سوغۇقتىن بولغان يىۋەل، زۇكام، بەلغىم كۆپىش، دېمى سقىلىش، ئۇخلىمالىلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 12g~6 دىن، كۈنگە 3 قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر خالىغا 12g قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ھىم ئوراپ ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0163-98

زہماتی کالزیرہ

Fu fang Ka li zi ran Ding

رېتىپپ		
150g	كەمۇركەك	300g
150g	ئەپنۈلە	150g
100g	خېشۈرۈ	200g
200g	شىچۇڭاڭىزى	150g
100g	ئاق قىچا	300g

『یاساش ئۇسۇلى』 يۇقىرىدىكى 10 خىل دورىنى سوقۇپ يېرىك تالقانلاب، سۇيۇق ئېكىستراكت بىلەن ئېكىستراكتلارنى تەبىئىلاشتىكى تېپچىتىش ئۇسۇلى (قوشۇمچە 10) بويىچە 60% لىك ئېتىل ئىسپىرتى ئېرىتكۈچى قىلىپ، 48 سائىت چىلاب قويفاندىن كېيىن تېپچىتىپ، 400ml تېپچىتلىكمن سۇيۇقلۇق يىغۇزىلىنىدۇ. دورا تىرىپىغا 60% لىك ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ئايلانما ئېقىمدا 4 سائىت چەككىلىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇق بىلەن يۇقىرىدىكى تېپچىتلىكمن سۇيۇقلۇقنى بىرلەشتۈرۈپ، 2% لىك لاۋروكالپام قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، 24 سائىت تىنج تۇرغۇزۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنىڭ ئومۇمىي مىقدارى 1000ml بولغۇچە 60% لىك ئېتىل ئىسپىرتى قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇلۇدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قىنىق قوڭۇر رەڭلىك سۈپۈقلۈق بولۇپ، خۇشبۇي پۇرايدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورا سىناق قىلىنگۇچى دورا تېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن جىنكىبۇنىزى جەۋەھىرى (پىسۇرالپىن) سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن بېلىپ، ئۆنگىغا سۈزىز بېتىل تىسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml دا 1mg دورا تۇتقان تېرىتىمە تېبىارلاپ، سېلىشتۈرۈما دورا تېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلىك رەڭ سېپتىر ئۈسۈلى (قوشۇمچە B VI) سىنلىق بويىچە يۇقىرقى 2 خىل تېرىتىمنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml 5 شۇمۇرۇپ بېلىپ، نېبىز قەۋەتلىك سىلىتسىيە بېلىمى G لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، ھېكسان، بېتىل ئاتىسىتات (1:4) نى بېسىلدۈرگۈچى قىلىپ بېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇقۇنۇپ، ئۇلترا بىنەپشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنگۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپتىرىدا، سېلىشتۈرۈلگۈچى دورىنىڭ رەڭ سېپتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇنىدا ئۇخشاش دەڭلىك جۇلالق داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

(2) بۇ دورا سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن ئېۋگىنۇل سېلىشتۈرما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا سۇسز ئېتىل ئىسپەرت قوشۇپ، ھەر 1ml دا $20\mu\text{l}$ دورا تۇنغان ئېرىتىمە تىبىارلاپ، سېلىشتۈرما دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. نىزىز قەۋەتلىك دەڭ سېيكتەر ئۆسۈلى (قوشۇمچە VI) سىنقى

بويچە، يۇقىرىدىكى 2 خل تېرىتىمىنىڭ هەر قايىسىسىدىن $1\mu\text{m}$ شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېپىز قۇھەتلىك سىلىتىسيي بېلىمى G لىق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، بېتىرولېئۇم ئېتىپ ($60\sim90^\circ\text{C}$)، ئېتىل ئاتسېتات (1:9) نى بېسىلدۈرگۈچى قىلىپ بېسىلدۈرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، 5% لىك ۋانىلىن سۇلغات ئېرىتىمىسىنى پۇركۈپ، داغ توچكىلىرىنىڭ رەڭگى روشنەلمىشكىچە 105°C لۇق ھارارتىكە قاقلىنىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۇرۇلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندى ئۇخشاشش رەڭلىك داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

(3) بۇ دورا سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن شېچۇڭىزى سېلىشتۇرما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، هەر 1ml دا 1mg دورا تۇتقان ئېرىتىمە تەبىارلاپ، سېلىشتۇرما دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. نېپىز قۇھەتلىك رەڭ سېپىكتىر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VI) سىنقى بويچە، يۇقىرىدىكى 2 خل تېرىتىمىنىڭ هەر قايىسىسىدىن $1\mu\text{m}$ شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېپىز قۇھەتلىك سىلىتىسيي بېلىمى G لىق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، بېنىزول، ئېتىل ئاتسېتات (30:1) نى بېسىلدۈرگۈچى قىلىپ بېسىلدۈرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنەپىشە نۇر چىرغى (365nm) ئاستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۇرۇلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندى ئۇخشاشش رەڭلىك جۇلالق داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 ئېتىل ئىسپىرت مىقدارى $50\sim60\%$ لىك (قوشۇمچە M IX) بولۇشى كېرەك.

【باشقىلار】 تىنىكتۇرا ياسالىملىرىغا ئالاقدار ھەر خل بەلگىلىمىلەر (قوشۇمچە N I) گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تىسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قاننى جانلاندۇرۇپ، تېرىنى ئىللەتىدۇ. مەھەللەۋى ئورۇنغا چۆكمە بولۇپ قالغان پىشىغان غەيرىي تەبىئىي بەلغەمنى تازىلايدۇ، بەرمىسکە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كېسەللەنگەن ئورۇنغا كۈنىگە 4~3 قېتىم مۇۋاپىق مىقداردا سۈركىلىدۇ. دورا سۈركىلىپ 30 منۇتتن كېيىن كۈن نۇرى ياكى ئۇلترا بىنەپىشە نۇرغا 30~15 منۇت قاقلىنىدۇ.

【ئۇلچىمى】 ھەر بىر بوتۇلغا 50ml قاچلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتىلىدۇ، كۈن نۇرىدىن ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0164—98

زەپەر ئىچىملىكى

复方西红花口服液

Fu fang Xi hong hua Kou fu ye

【رېتىسىپ】

225g	سۇمبۇل تىب	2 g	زەپەر
225g	ئاڭ سەندەل	225g	قىزىلگۈل
0.5g	قۇندۇز قەھرى	225g	لاچىنداھە
225g	گاۋىزبان	225g	ئارپىبەدیان
225g	بادىەنجى بۇيا چىنى	225g	ئالما
225g	پىله غۇزىسى	3 g	ئىپار
		225g	ئۇستقۇددۇس

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 13 خىل دورىدىن ئىپار، زەپەر، قۇندۇز قەھرىلەرنى باشقا قىزىلگۈل قاتارلىق قالغان 10 خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، ئىككى سائەت چىلاپ قويۇپ، ھەر قېتىمدا 1.5 سائەتتن 2 قېتىم قايىتىپ، شۇنىڭ بىلەن بىرگە 400ml دىستىللەنگەن سۇيۇقلۇق يىغۇشىپ تەبىارلىنىدۇ. قايىتىملارنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقلارنى نىسپىي زىچلىقى (50°C) 1.05~1.10 بولغۇچە قويۇلدۇرۇپ، سوۋوٽتۇپ، تەركىبىدە تىسپىرت مىقدارى 70% بولغۇچە ئېتىل تىسپىرت قوشۇپ، 24 سائەت تۈرگۈزۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقتىن بىسم تۆۋەنلىتىش ئۇسۇلىدا تىسپىرتىنى يىغۇشىلىپ ھەمde مۇۋاپىق مىقداردا قويۇلدۇرۇپ، ئاندىن ئىپار، زەپەر، ۋە قۇندۇز قەھرىلەرنى 60% ئېتىل تىسپىرتقا 12 سائەت چىلاپ قويۇپ، ئايىلانما ئېقىمدا 1.5 سائەتتن، 2-قېتىمدا 1 سائەتتن، 3-قېتىمدا 0.5 سائەتتن جەھىئى 3 قېتىم چەككىلەپ، چەككىلەنگەن سۇيۇقلۇقلارنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقلاردىن بىسم تۆۋەنلىتىش ئۇسۇلىدا تىسپىرت يىغۇشىلىنىدۇ ھەمde مۇۋاپىق مىقداردا قويۇلدۇرۇلۇدۇ. يۇقىرىدىكى خىل قويۇلدۇرۇلغان سۇيۇقلۇقلار ۋە دىستىللەنگەن سۇيۇقلۇقلارنى بىرلەشتۈرۈپ، بۇنىڭغا مۇۋاپىق مىقداردا ساكساروازا قوشۇپ، ئارىلاشتۇرۇپ ئېرىتىپ، ئومۇمىي مىقدارى 1000ml بولغۇچە سۇ قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، ئامپۇللارغا قاچىلاپ مىكروبىسزلانىدۇرۇلۇدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قىزغۇچ قوڭۇر رەڭلىك سۇيۇقلۇق بولۇپ، تەممى تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 10ml 1 ئېلىپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلىرىنى 1ml مېتىل ئىسپىرتتا ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن بادىەنجى بۇيا چىنى سېلىشتۈرما دورىسىدىن 0.5g 1 ئېلىپ، بۇنىڭغا 10ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، بىر سائەت چىلاپ قويۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلىرىنى 1ml مېتىل ئىسپىرتتا ئېرىتىپ، بۇ سېلىشتۈرما

دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلەك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VII B) سىنىقى بويىچە، يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml 10 شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېپىز قەۋەتلەك سىلىتىسىيە بىلىمى G لىق تاختا ئۇستىدىكى ئابىرىم-ئابىرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، بېنزاول، ئېتىل ئاتىسىبات، فورمىك كىسلاطا (0.1:4:2:2)نى يېيىلدۈرگۈچى قىلىپ يېيىلدۈرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇقۇپ، ئۇلترا بىنەپىشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزتىلىنىدۇ. سىناق قىلىنگۈچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۈرۈلغۈچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ نۇرۇندا ئۇخشاش رەڭلىك جۇلالىق نۇرلۇق داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 نىسپىي زېچلىقى 1.08 (قوشۇمچە A VII) دىن تۆۋەن بولماسلىقى كېرەك.

pH قىممىتى 4.0~5.5 (قوشۇمچە G VII) بولۇشى كېرەك.

【باشقىلار】 بۇ دورا مىكستۇرا ياسالىلىرىغا ئالاقدىار ھەر خىل بەلگىلىملەر (قوشۇمچە J I) كە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 تومۇرلارنى راۋانلاشتۇرۇپ، قانىنى تەڭشەيدۇ. بۆرەكە مەنپىئىت قىلىپ، بۆرەكىنى كۈچھىتىدۇ. مەيۇسلاۇكىنى يوقتىپ، مېڭىنى سەگەكلىشتۈرىدۇ. بۆرەك رىتىمسىز-لىقى، بۆرەك ۋە كۆكىرەك ئاغرىش، بۆرەك سېلىپ، نېپىس تېزلىشىش، تىنچسەزلىنىپ ئۇخلىيالماسلىق، بەدمىن ئاجىزلاپ، ماغدۇرسىزلىنىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 10ml 10ml كۈنىگە 2 قېتىم، ئەتىگەن-كەچلىكى ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر ئامپۇلغا 10ml قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتىلىپ، سالقىن، سايىھ جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0165—98

قۇرسى غارىقۇن

复方阿里红片

Fu fang A li hong Pian

【ربىتىپ】

28g	قۇرسى ئايارمنجى	44g	غارىقۇن
28g	ئەنزۈرۈپ	16g	چۈچۈكبۈيا يىلتىز قىيامى
28g	تۇرۇبۇت	27g	تۇرۇبۇت

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 6 خىل دورىدىن غارىقۇن، چۈچۈكبۈيا يىلتىز قىياملىرىدىن باشقان تۇرۇبۇت قاتارلىق 4 خىل دورىنى سوقۇپ، يۇمشاق تالقانلاب، غارىقۇنغا سۇ قوشۇپ، هەر قېتىمدا بىر سائەتتىن 3 قېتىم قايىنتىپ، قايىناتىملارنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇققا چۈچۈكبۈيا يىلتىز قىيامىنى قوشۇپ، قويۇلدۇرۇپ مەلھەم قىلىپ، يۇقىرىدىكى تالقانلارنى ۋە مۇۋاپىق مقداردا ساڭخاروزا قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانىچە تەبىيارلاپ، قۇرۇتۇپ، بېسىپ 1000 قۇرس ياسىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قىزغۇچۇ قوڭۇرمىلىك قۇرس بولۇپ، تەمى قېرىق، قىرتاق، ھەم ئاچقىق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن مۇۋاپىق مقداردا تېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، بۇنىڭدىن 10g نۇلچىپ ئېلىپ، 20ml خلوروفورم قوشۇپ، ئايلانما ئىقىمدا 30 منۇت چەككىلىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلەرنى 2ml خلوروفورمدا ئېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن غارىقۇن سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن 1g تېلىپ ئوخشاش ئۇسۇلدا سېلىشتۈرۈما دورا ئېرىتىمىسى تەبىيارلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) سىنلىقى بوبىچە، يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml شومۇرۇپ تېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سېلىتسىيە يىلىمى G لق تاختا ئۇستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، پېتەپلىئۇم ئېپتىپ (C 90~60)، ئېتىل ئاتېتىت (1:5)نى يېلىدۇرغۇچى قىلىپ بېسىلىدۇ. رۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنپىشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىدا، سېلىشتۈرۈلەنۈچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئۇرۇندا ئوخشاش رەڭلىك داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرس ياسالىمىلىغا ئالاقدار ھەر خىل بەلكىلىمىلىر (قوشۇمچە I) گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 بەلغىمنى بوشىتىپ، توسالغاننى ئاچىدۇ. سوغۇق يەلىنى ھەيدىپ، دېمى سقىلىشنى پەسىتىدۇ. يۆتەل، دېمى سقىلىش، بەلغىم كۆپىيىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتىمدا 9~7 قۇرستان، كۈنگە 2 قېتىم ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرس 0.5g.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھەم ئېتلىپ ساقلىنىدۇ.

هەبىي كالزىرە

复方驱虫斑鸠菊丸

Fu fang Qu chong ban jiu ju Wan

بۇ دورا كالزىرە، ئاقىر قەرها قاتارلىقلارنى پىشىقلاب ئىشلەشتىن تەبىارلانغان ئوششاق ھەبتىن ئىبارەت. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قارا رەڭلىك ئوششاق ھېب بولۇپ، ئۆزگىچە خۇشبوى يۈرایدۇ، تەمى قېرىق ھەم ئاچچىق كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنى مىكروسكوب ئاستىدا كۆزتەكەندە: غەيرىي بەز تۈكچىلىرى ئاچىماق حالاتتە، ئۇزۇنلۇقى 1m 160، ئۇرۇق پوستى ھوجەيرىسى سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، ھوجەيرە دۈوارنىڭ شەكلى ئۆزگىچە، تورىمىان سىزىقلۇق، تاش ھوجەيرىسى توپلاشقان ياكى تارفاق حالاتتە، سېرىق تۈپراق رەڭلىك، تىك تۆت بۇلۇشىمان، ئۇچبۇرجەك ياكى كۆپ تەرمەپلىكەك، تۆشكۈك تۈرەقچىلىرى روشەن، ئىنولىپىن شەكلى تەرتىپىزز حالاتتە كۆرۈنىدۇ. ئۆتكۈزگۈچ نەيچە تۇنامى ياكى تالالار يېنىدا پىكمىت ھوجەيرىلىرى كۆرۈنىدۇ، ئۇنىڭ رەڭگى قوڭۇر، ئىنچىكى نەيچىسىمان بولۇپ، دىئامېتىرى 23~11 كېلىدۇ. ھوجەيرە ئىچىكە قوڭۇر ياكى قارامتۇل قىزغۇچ قوڭۇر رەڭلىك ماددىلار تولغان بولىدۇ. (2) بۇ دورىدىن 2g ئېلىپ، سوقۇپ يۇمشاق تالقانلاب، بۇنىڭغا پېتەرولېئوم ئېتىرىدىن 5ml قوشۇپ، 30 مىنۇت چالقىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈپۈقلۈقىنى شامالدىتىپ قۇرۇقۇپ، قالدۇقلۇرىنى 0.5ml پېتەرولېئوم ئېتىرىدا ئېلىپ، سىناق قىلىنگۇچى دورا ئېرىتىمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن كالزىرە سېلىشتۈرما دورىسىدىن 0.5g ئېلىپ، ئوخشاش ئۇسۇلدا سېلىشتۇرما دورا ئېرىتىمىسى تەبىارلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VI) سىنىقى بويىچە، يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 5ml شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېبىز قەۋەتلىك سىلىتىسيه يېلىمى G لىق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، پېتەرولېئوم ئېتىرى (90~60°C)، ئېتىلىل ئاتىسىتات (1:9)نى يېلىلدۈرگۈچى قىلىپ يېلىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇقۇپ، 5% لىك ۋانلىن سۇلغات ئېرىتىمىسىنى پۇركۇپ، داغ تۈچكىلىرىنىڭ رەڭگى روشەنلەشكىچە 105 لۇق ھارامتكە قاقلىنىدۇ. سىناق قىلىنگۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۈرۈلە خۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاش رەڭلىك داغ تۈچكىلىرى كۆرۈنىدۇ. 【تەكشۈرۈش】 ھېب ياسالىمىلىغاتا لاقدار ھەر خىل بەلكىلىملىر (قوشۇمچە IA) كە ئۇينۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تېبىيى بەلغىم خىلىتلىرىنى پىشۇرۇپ ھەم تازىلاب، تېرىنى ئىلىتلىپ، تېرىگە رەڭ پىيدا قىلىدۇ. بەرسىن (ئاڭىكسىل) كە ئىشلىتلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مقدارى】 ھەر قېتىمدا 6~4g دىن، كۇنىڭ 3 قېتىم ئىچلىنىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر ھېب 0.3g.

【ساقاڭلاش】 بۇتۇلما ئېغىزى ھەم ئېتىلىدۇ.

WS₃-BW-0167-98

ئادراسمان ئۇرۇقى مەلھى

复方骆驼篷子软膏

Fu fang Luo tuo peng zi Ruan gao

ریتسبی

80g	سۆرۈچان	200g	ئىڭدىۋانە ئۇرۇقى
		120g	ئىڭدراسمان ئۇرۇقى

【یاساش ئۆسۈلى】 بۇقىرىدىكى 3 خىل دورىنى سوقۇپ يۇمشاق تالقانلارپ، بۇنىڭغا 5 ھىمسە مىقداردا ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، pH قىممىتى 4 بولغۇچە تۇز كىسلاقاتىسىنى قوشۇپ، قىزدۇرۇپ، ئايلانما ئېقىمدا ھەر قىتىمدا 3 سائەتتىن 2 قېتىم چەككىلەپ، چەككىلەنگەن سۇيۇقلۇقلارنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنى 24 سائەت تىنج تۇرغۇزۇپ، ئۆستىگە سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقتىن ئېتىل ئىسپىرنى يېغۇپلىپ، نىسپىي زىچلىقى (20°C) 1.25 ~ 1.30 بولغۇچە قوبىلدۇرۇپ، قوبۇق مەلەمەن قىلىنىپ، بۇنىڭغا لانولىندىن 60g، پارافينىدىن 100g، لاۋروكابرامدىن 20g، هىدرۆبىنزوپ ئېستېرىدىن 0.2g، مۇۋاپىق مىقداردا ۋازىلىن قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، 1000g قىلىپ تەبىيەللىنىدۇ.

شەكلى ۋە خۇسۇسىتى (1) بۇ دورىدىن 2g ىېلىپ، 10ml خلوروفورم قوشۇپ، چالغىتىپ سۈزۈپ، خلوروفورم سۇيۇقلۇقىغا سۈلغات كىسلاطا (50→1) تۈرىتمىسىدىن 10ml قوشۇپ، چالغىتىپ چەككىلەپ، كىسلاڭالق سۇ قەۋىتنى ئايىرىپ ىېلىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنى 2ml لق تۈچ پىروپىرىكىغا بۆلۈپ قۇيۇپ، ئاندىن ئايىرىم-ئايىرىم بىسمۇت كالىي يودىد، مېركۇرىك كالىي يودىد، سىلىكى-كۇنگىستىك تائىسىد تەجربىه سۇيۇقلۇقلۇقلۇرىنى 4 تامچىدىن تېمىتقاندا، ھەممىسىدە چۆكمە ھاسىل بولىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 10g ىېلىپ، 30ml خلوروفورم قوشۇپ تۈرىتىپ، 2% لىك تۇز كىسلاتانى قوشۇپ، چالغىتىپ ھەر قېتىمدا 20ml دىن 2 قېتىم چەككىلەپ، كىسلاتا سۇيۇقلۇقلۇقلۇرىنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇققا قويۇق ئاممىيەك تەجربىه سۇيۇقلۇقنى قوشۇپ pH قىممىتىنى تەخمىنەن 9 غا تەڭشىپ، خلوروفورمدىن قوشۇپ، چالغىتىپ ھەر قېتىمدا 30ml دىن 3 قېتىم چەككىلەپ، خلوروفورم سۇيۇقلۇقلۇقلۇرىنى بىرلەشتۈرۈپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلۇرىنى 1ml سۇسىز ئېتىل ئىسپىرتتا تۈرىتىپ، سىناق قىلىنگۇچى دуرا تۈرىتىمىسى قىلىنىدۇ. ئاندىن ئادراسىمان ئۇرۇقى سېلىشتۈرما دورىسىدىن 1g ىېلىپ، قويۇق ئاممىيەك تەجربىه سۇيۇقلۇقنى قوشۇپ نەمدەپ، 20ml خلوروفورم بىلەن ئىليلانما بۇقىمدا 30 مىنۇت چەككىلەپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلۇرىنى 1ml ئېتىل ئىسپىرتتا تۈرىتىپ، سېلىشتۈرما دуرا تۈرىتىمىسى قىلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VI) سىننىقى بويىچە، يۇقىرىدىكى ئىككى خىل تۈرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىسىدىن 1m ۋەمۈرۈپ ىېلىپ، نېبىز قەۋەتلىك سىلىتىسيھ يېلىمى 6 لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرىم-ئايىرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، ئېتىل تائىستات،

مېتىل تىسپىرت، قويۇق ئاممىياك تەجربىي سۇيۇقلۇقى (0.4:1:0.4) نى يېيىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، بىسمۇت كالىي يودىد تەجربىي سۇيۇقلۇقى پۇركۈلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۈرۈلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا قىزغۇچ ئاپىلسىن رەڭلىك ئۇخشاش ئىككى دانه داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

(3) ئاتروپين سۇلغات سېلىشتۈرما دورىسىدىن ئېلىپ، سۇسز ئېتىل تىسپىرت قوشۇپ، 1ml دا 1mg دورا بولغان ئېرىتىمە تەبىارلاپ، سېلىشتۈرما دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. نېيز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتىر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) سىنلىق بويىچە، سېلىشتۈرما دورا ئېرىتمىسىدىن 1ml 5 ۋە [پەرقەمندۈرۈش] نىڭ (2) سىدىكى سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمىدىن 1ml 10 شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېيز قەۋەتلىك سىلىتسىيە يېلىمى G لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، ئېتىل ئاتىپتات، مېتىل تىسپىرت، قويۇق ئاممىياك تەجربىي سۇيۇقلۇقى (2:20) نى يېيىلدۈرۈغۇچى قىلىپ يېيىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، بىسمۇت كالىي يودىد تەجربىي سۇيۇقلۇقى ۋە ناتىرىي نىتارتىلۇ تەجربىي سۇيۇقلۇقى رەت بويىچە پۇركۈلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۈرۈلغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئۇخشاش رەڭلىك داغ توچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا مەلھەم ياسالىلىرىغا ئالاقدار ھەر خىل بەلكىلىملىر (قوشۇمچە R I) كە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يەرلىك ئورۇنىدىكى غەيرىي تەبىئىي بەلغەم خىلتى ۋە سەۋدا خىلتىنى سۈرۈپ، ئىشىق قايتۇرۇپ، قىچىشىنى توختىنىدۇ، يەل ھېيدەپ، ئاغرىق توختىنىدۇ. ھۆل سوغۇقتىن بولغان بوغۇم سرقراب ئاغرىش، رېماتزىملق بوغۇم ياللۇغى، ئۆلتۈرۈغۈچ نېرۋا ئاغرىش، ھۆل تەمرەتكە، قوتۇر، چاقا-جاراھەت قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 سىرتىدىن ئىشلىتىلىدۇ، كېسەللەنگەن ئورۇنغا كۈنگە 1-2 قىتىم سۈرکىلىدۇ.

【ئۆلچەمى】 ھەر بىر بوتۇلگىغا 50g قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، سالقىن، سايىھە ھەم قۇرغاق جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0168—98

قۇرسى گاۋىزبان

复方高滋斑片

Fu fang Gao zi ban Pian

【رېتسىپ】

50 g	گۈلى گاۋىزبان	112.5g	گاۋىزبان
50 g	بۈمغاقسۇت تۇرۇقى	50 g	قىزىل بەھمن
50 g	ئاق سەندەل	75 g	زىسۇ تۇرۇقى
100 g	تەرتىز	25 g	تۇستقۇددۇس
50 g	پىلە غۇزىسى	50 g	ئاق بەھمن
		50 g	بادىەنجى بۇياچىنى

【ياساش تۇسۇلى】 يۇقرىدىكى 11 خىل دورىدىن گاۋىزبان، گۈلى گاۋىزبان، ئاق سەندەل، ئاق بەھمن، قىزىل بەھمن قاتارلىق 5 خىل دورا سوقۇپ بۈمشاق تالقانلىنىدۇ. بۈمغاقسۇت تۇرۇقى، بادىەنجى بۇيا چىنى، تۇستقۇددۇس قاتارلىق 3 خىل دورىدىن سۇ پارى بىلەن پارلاندۇرۇپ، دىستىلاش تۇسۇلى ئارقىلىق تۈچۈچان ماي يىغۇبىلىنىدۇ، دورىنىڭ سۇدىكى ئېرىتمىسى باشقا قاچىدا ساقلىنىدۇ. دورا تېرىپى بىلەن باشقا قېپقالغان پىلە غۇزىسى قاتارلىق 3 خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، ھەر قېتىمدا 2 سائەتتن 2 قېتىم قايىتىپ، قايىناتىملارنى بىر لەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈيۈقلۈققى يۇقرىدىكى سۇ ئېرىتمىسىنى قوشۇپ ھەمde نىسپىي زىچلىقى (50°C) 1.32 ~ 1.34 بولغۇچە قويۇلدۇرۇپ، يۇقرىدىكى تالقاننى ئارىلاشتۇرۇپ، مۇۋاپق مىقداردا قوشۇمچە ماتېرىيال قوشۇپ، دانىچە تېيارلاپ، قورۇتۇپ، يۇقرىدىكى تۈچۈچان ماینى پۇركۇپ، تەكشى تەكسۈرۈپ، بېسىپ 1000 قۇرسى ياسىلىدۇ، سىرتىغا شېكىر ياللىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا سىرتىغا شېكىر ياللىلغان قۇرسى بولۇپ، ياللىلغان شېكەرنى ئېلىۋەتكەندە ئاقۇش كۈل رەڭدە بولىندۇ. سەل خۇش پۇراقلقى، تەمى چۈچۈملەن قىرتاق كېلىندۇ.

【پەرقەندەنۈرۈش】 (1) بۇ دورىنى مىكروسكوب ئاستىدا كۆزەتكەندە: كۈل چىڭى دانىچىلىرى سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك، بۈمىلاق شار شەكىللەك، غەيرىي بەز تۈكچىلىرىنىڭ مۇتلەق كۆپچىلىكى ئۆزۈلۈپ ھەم ئۆزۈلپ يەكە ھۈجەيرلىك بولۇپ قالغان. تەركىبىدە كرسىتال بولغان ھۈجەيرە تالا يىننغا جايلاشقان، بۇلار ئادەتتە بىر نەچچە دانە ياكى ئۇن نەچچىسى تىك يېنىلىشىتە ئۆزئارا ئۇلىنىپ، كرسىتال تالالىرىنى شەكىللەندۈرۈدۇ. هاۋا توشۇكىنىڭ مۇقۇم شەكلى بولمايدۇ، قوشۇمچە قوغدىنىش ھۈجەيرىسى 4 ~ 3 دانە بولىندۇ.

(2) بۇ دورىدىن 5 قۇرسى ئېلىپ، ياللىلغان شېكەرنى چىقىرىۋىتىپ، بۈمشاق سوقۇپ، 5ml ئېفر قوشۇپ، 10 مىنۇت چالغىتىپ، سۈزۈپ، پارلاندۇرۇپ قورۇتۇپ، 1% لىك ۋانلىن سۇلغات ئېرىتمىسىدىن

~ 2 تامچە تېمىتقاندا، تەرىجىي قىزىلگۈل رەڭكىگە ئۆزگەرىدۇ.
【تەكسۈرۈش】 بۇ دورا قۇرس ياسالىلىرىغا ئالاقدار ھەر خىل بەلگىلىملىر (قوشۇمچە ID)
كە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.
【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يۈرەكى كۈچەيتىپ، مېڭىنى ساغلاملاشتۇرىدۇ. نېرۋىنى
تىنچلاندىرۇپ، تومۇرىنى راۋانلاشتۇرىدۇ. غەيرىي تەبىئىي سەۋادىن بولغان يۈرەك سېلىش، ئۇخلىيالماسلق،
بىش قېيش، باش ئافرش، نېرۋا ئاجىزلىقى، يۇقىرى قان بېسم قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.
【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 ھەر قېتمىدا 6 ~ 4 قۇرستىن كۈنىگە 2 قېتمىم ئىچىلىدۇ.
【ساقلاش】 بېغىزى ھەم بېتلىپ ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0169-98

سیادان پیغمبر

复方斯亚旦生发油

Fu fang Si ya dan Sheng fa you

رہنمی

1000g

شایپرل مبغزی

2000g

200 g

سیاداون

ئانار ئۈرۈقى

【یاساش ئۆسۈلى】 بىۇقىرىدىكى 3 خىل دورىدىن سىيادان بىلەن شاپتاڭ مېغىزىنى سۇس ئۇتتا قورۇپ، دەرھال ئانار ئۇرۇقى بىلەن ئارىلاشتۇرۇپ، سىقىپ چىقىرىش ئۆسۈلى بىلەن ماي چىقىرىپ، سۇزۇپ، تىنچ تۇرغۇزۇپ، تىندۇرۇلغان سۇزۇك سۇيۇقلىقىدىن 1000ml ٹېلىپ، مۇۋاپىق مىقداردا چىرىتىشىن ساقلاش دورسى قوشۇپ، بىلەپ بوتۇلكلىلارغا قاچىلىنىدۇ.

«شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» بۇ دورا سۇس قوڭۇر رەڭلىك مايسىمان سۇيۇقلۇق بولۇپ، سەل خۇش يۈرۈقلەق، سوغۇقتا دائىم دۇغلىشىپ قالىدۇ، تىسىستقاندا يەنە سۈزۈلدى.

【پەرقلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 4ml ىېلىپ، سۈيۈقلۈق ئايىرىدىغان ۋارۇنكىغا قۇيۇپ، 10ml ىېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، چالغىتىپ تۇرغۇزۇپ، 1ml ىېتىل ئىسپىرتنى ئايىپ ىېلىپ، 10% لىك ناتىرىي هىدرۆكسىدى تەجريبە سۈيۈقلۈقىدىن بىر نەچە تامىچە تېمىستقاندا ئېرىتىمە قىزىرىدۇ.

نیسی زیچلیقى 0.90 (قوشومچە A VII) دىن تۆۋەن بولماسلقى كېرەك.

نور سوندو، وش نیستی ۱.۴۶۰ ~ ۱.۴۹۰ (قوشوْمچه F VII) بولوشی کبره‌ک.

«تسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» تېرىنلىكلىك، چاچنى تۇستۇرىدۇ، قىچىشىنى توختىتىپ، كېپەكنى يوقتىدۇ. چاچ چۈشۈش، تەڭگىسىمان چاچ چۈشۈش، باش قىچىش قاتارلۇقلارغا مۇشلىكتىلدۇ.

ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 مۇۋاپىق مىقداردا سىرتىغا ئىشلىتىلدى. كىچىك چوتىكىنى مايغا چىلاپ، باشنىڭ چاچ چۈشكەن ۋە قىچىشقان قىسىمغا كۈنىگە 3 ~ 4 قېتىم سوركىلدى.

[لچمی] هر بیر بوتولکغا 32ml قاچلىنىد.

ساقلاش [بُغزى ھم ئىتلىي، سالقىن ھەم سايھە جايدا قويۇپ، كۈن نۇردىن ساقلىنىدۇ.

سيادان چاچ ئۆستۈرۈش سۇيۇقلۇقى

复方斯亚旦生发酊

Fu fang Si ya dan Sheng fa ding

[رېتىپ]

75g	شاتپۇل مېغىزى	150g	سيادان
		15 g	ئانار ئۇرۇقى

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 3 خىل دورىنى ئايىرم-ئايىرم تالقانلاپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، 70% لىك ئېتىل ئىسىپرتىن 1000ml قوشۇپ، ئىيلانما ئېقىمدا 5 سائىت چەككىلىپ، سوۋۇتۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇقنىڭ ئومۇمىي مقدارى 1000ml بولغۇچە سۇ قوشۇلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قارامتۇل قوڭۇر رەڭلىك سۈزۈك سۇيۇقلۇق بولۇپ، غەلتە پۇرىقى بار ۋە بۇرۇنى سەل-پەل غىدىقلايدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورا سىناق قىلىنぐۇچى دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. سىadian سېلىشتۇرما دورىسىدىن 5g ئېلىپ، بۇنىڭغا 70% لىك ئېتىل ئىسىپرتىن 20ml قوشۇپ، ئىيلانما ئېقىمدا 2 سائىت چەككىلىپ، سوۋۇتۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۇيۇقلۇق سېلىشتۇرما دورا ئېرىتمىسى قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇچە VI B) سىنقى بوبىچە يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايسىسىدىن 1ml 2 شۇمۇرۇپ ئېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سىلىتسىيە يېلىمى 6 لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇققىغا تېمىتىپ، بىنزول، مېتىل ئىسىپرت، فورمىك كىسلاتا (1:17:5:5)نى بېسىلدۈرگۈچى قىلىپ يېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنەپشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزتىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۇرما دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردىكى مۇناسىپ ئۇرۇندا ئۇخشاش رەڭلىك داغ تۆچكىلىرى كۆرۈنىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 2ml ئېلىپ، پروبرىكىغا قۇيۇپ، ئاندىن بىر تال 10% لىك ناترىي كاربونات ئېرىتمىسىگە چىلانغان ترىننەتەۋەنلۇق لاكموس قەغىزىنى پروبرىكىغا ساڭكىلىتىپ، ئېغىزىنى كاۋچۇك پۇرۇپكا بىلەن ھىم ئېتىپ، 40~50°C لۇق ئىسىق سۇدا 15 منۇت ئىسىق ئۆتكۈزگەندە، لاكموس قەغىزى قىزىل خىش رەڭگىگە كىرىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 ئېتىل ئىسىپرت مقدارى 55%~65% (قوشۇچە M) بولۇشى كېرەك.

【باشقىلار】 تىنلىك ياسالىلىرىغا ئالاقدىار ھەر خىل بەلگىلىملەر (قوشۇچە N I) گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 چاچ تۆستۈرۈپ، چاچنى سىلقلاشتۇرىدۇ ھەم چۈشۈرمەيدۇ. چاچ چۈشۈش، تەڭكىسمان چاچ چۈشۈش، ماي تەپچىش خاراكتېرلىق چاچ چۈشۈش ۋە سەۋەبى ئېنىق بولىغان چاچ چۈشۈشلەرگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 سىرتىدىن ئىشلىتىلىدۇ. كېسەللەنگەن ئورۇنى پاكز تازىلاب، 3~2 مىنۇت ئۇۋۇلاب، كۈنىكە 3 قىتسىم مۇۋاپىق مىقداردا سۈرکىلىدۇ.

【ئۆلچەمى】 ھەر بىر بوتۇلكىغا 75ml قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھەم ئېتلىپ، سالقىن، سايى، قۇرغاق جايىدا ساقلىنىدۇ.

مەجۇنى داۋا ئىمېشكى

养心达瓦依米西克密膏

Yang xin Da wa yi mi xi ke Mi gao

[رېتىپپ]					
12	g	ئاق سەندەل	2	g	ئىپار
8	g	دارچىن	4	g	مىستىكى رۇمى
8	g	ئۇدھىندى	8	g	پىله غوزىسى
12	g	تاباشىر	8	g	تۈرۈبۈت
12	g	يۈمەغافسۇت تۇرۇقى	12	g	قىزىل سەندەل
16	g	زېرىق مېۋسى	4	g	ھۇمامە
10	mg	ئالىتۇن ۋاراق	12	g	سېمىز تۇت تۇرۇقى
4	g	تۇشىنە	8	g	كەھرۇوا
8	g	بادىمنجى بۇيا چىنى	12	g	ئامىلە
8	g	قىزىلگۈل	8	g	مەرۋايت
8	g	قىزىل بەھەمن	12	g	گۈلى گاۋىزبان
260	mg	كۆمۈش ۋاراق	6	g	زېپەر
8	g	ئاق بەھەمن	400	g	ئالما

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى 26 خىل دورىدىن ئىپار، كۆمۈش ۋاراق، ئالىتۇن ۋاراقتىن باشقان، قىزىلگۈل، پىله غوزىسى، بادىمنجى بۇيا چىنى، تۇشىنە، زېرىق مېۋسى قاتارلىق 5 خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، 1-قىتىم 2.5 سائىت، 2-قىتىم 2 سائىت جەمئىي تىككى قىتىم قايىتىپ، قايىناتىملارنى بىر لاشتۇرۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈبۈقلۇق نىسپىي زىچلىقى ((C⁵⁰) 1.38 ~ 1.35) بولغۇچە قويۇلدۇرۇپ، سۈبۈق مەلھەم قىلىنىدۇ. ئاندىن ئالىتىڭىچى پوستى ۋە تۇرۇقىنى تېلىۋىتىپ، سۇدا بىر سائىت قايىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈبۈقلۇققا 400g ساكسارۇزا قوشۇپ قىيام تەبىيارلىنىدۇ. قالغان مەرۋايت قاتارلىق 17 خىل دورىنى سوقۇپ يۇمىشاق تالقانلاب، ئەلكەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇلدى. ئاندىن ئىپار، ئالىتۇن ۋاراق، كۆمۈش ۋاراقلارنى يۇقىرىدىكى تالقانغا تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، بۇنىڭغا يۇقىرىدىكى قىيام ۋە سۈبۈق مەلھەملەرنى قوشۇپ، يەنە چەككىلەنگەن ھەسەلدىن مۇۋاپىق مقداردا قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، 1000g قىلىپ تەبىيارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قوڭۇر رەڭلىك بىپىشقاڭ مەجۇن بولۇپ، ئالاھىدە پۇرايدۇ، تەمى تاتلىق، سەل قېرقراق كېلىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا مەجۇن ياسالىلىرىغا ئالاقدىار ھەر خىل بەلگىلىملىر [مەزكۇر ئۆلچەمدىكى 1-قوشۇمچە] گە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم.

«تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» رەئىس نەزەارەنلەك خىزمەتنى كۈچەميتىپ، ئاشقازاننى ساغلاملاشتۇرۇپ، نېرۋەنى ياشارتىدۇ. يۈرمەك ۋە كۆكەرەك تائغىش، يۈرەك سېلىش، ئاشقازان تاڭىزلاش، كۆرۈش قۇقۇقى ئاچىزلاش ۋە نېرۋا ئاچىزلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 ھر قېتمىدا 3g دىن، كۇنىڭە 2 قېتمى ئىچلىدۇ.

ئۆلچىمى ھەر بىر بوتۇلكىغا 100g فاچىلىنىدۇ.

ئېغىزى هم ئېتلىپ، سالقىن، سايىھ جايىدا ساقلىنىدۇ. **【ساقلاش】**

شىپاىي زۇكام جەۋەھرى

祖卡木颗粒

Zu ka mu Ke li

【ربىتىپ】

176g	نېلىپەر	83 g	ئاقچەمشكا
176g	چىلان	333g	يالپۇز
83 g	سەرپىستان	83 g	بابۇنه
83 g	لەيلگۈل ئۇرۇقى	33 g	چۈچۈكبۇيا يىلتىزى
83 g	خەشىخاش پۇستى	50 g	دەۋەن

【باساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى ئۇن خىل دورىدىن يالپۇز، ئاقچەمشكا، بابۇندىن ئىبارەت ئۆچۈجىنىڭ ئۇن خىل دورىنىڭ ئۇچۇچان مېسىنى ئايىرىپ ئېلىپ، پارلاندۇرۇلغان سۇلۇق ئېرىتمىسى سۈزۈپ تىيىارلىنىدۇ. دورا تىرىپى ۋە چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قاتارلىق قالغان يەمته خىل دورىغا سۇ قوشۇپ ئۆچ قېتىم، ھەر قېتىمدا بىر سائەتتىن قايىنتىلىدۇ. ئاندىن قايىنتىلغان ئېرىتمىلەرنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمە بىلەن يۇقىرىدىكى ئېرىتمىنى بىرلەشتۈرۈپ، مۇۋاپىق مقدارغا كەلگۈچە قويۇلدۇرغاندىن كېيىن، تەڭ مقداردا مېتىل ئېلىپ قوشۇپ تىندۇرۇپ، ئۇستىدىكى سۈزۈك ئېرىتمىنى ئېلىپ قويۇلدۇرۇپ، قويۇق مەلھەم تىيىارلىنىدۇ. بۇنىڭغا مۇۋاپىق مقداردا قۇم شېكەر قوشۇپ، دانىچە ياساپ قۇرقۇتۇپ، سوۋووتۇپ، ئاندىن يۇقىرىدىكى ئۇچۇچان ماينى پۇركۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، 1000g لق دورا تىيىارلىنىدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك دانىچە بولۇپ، پۇرۇقى سەل خۇشبۇيى، تەمى تاتلىق، سەل قىرتاق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۇرۇش】 (1) بۇ دورىدىن 5g ئېلىپ، 10ml ئېفر قوشۇپ، بىر نەچە منۇت چالغىتقاندىن كېيىن، ئېپرلىق ئېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ، قالدوقيغا ناترىي ھىدرۆكىسىد سىناق ئېرىتمىسىدىن بىر نەچە تامىچە تېمىتقاندا، دەرھال قىزىل رەڭگە ياكى سارغۇچ قىزىل رەڭگە ئۆزگەرىدى. (2) بۇ دورىدىن 5g ئېلىپ، 10ml ئېفر قوشۇپ چالغىتىپ، بىر سائەت تۈرگۈزغاندىن كېيىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ، قالدوقيغا 5% لىك ۋانلىن سۈلفات كىسلاقا ئېرىتمىسىدىن 2 تامىچە تېمىتقاندا، بىنەپشە قىزىل رەڭگە ئۆزگەرىدى.

(3) بۇ دورىدىن 12g ئېلىپ، 5ml قويۇق ئاممىيەك سىناق ئېرىتمىسى قوشۇپ نەمدەپ، ئۇنىڭغا يەنە 15ml خلوروفورم قوشۇپ، بىر كېچە چىلاب قويغاندىن كېيىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ، قالدوقلېرىغا 0.5ml مېتىل ئېلىپ قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن خەشىخاش پۇستى سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن 2g ئېلىپ، 10ml مېتىل ئېلىپ قوشۇپ، بىر كېچە چىلاب، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ، قالدوقيغا 1ml مېتىل ئېلىپ قوشۇپ ئېرىتىپ، سېلىشتۈرۈلە.

دىغان دورىلق تېرىتمە قىلىنىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا يەنە مورفن ھىدروخلىورىد، سېلىشتۈرما دورىسى ۋە كودىئىن ۋە فوسفات سېلىشتۈرما دورىسىدىن ئازراق ئېلىپ، ئۇنىڭغا مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ئاييرىم-ئاييرىم هالدا تەركىبىدە 1mg 1ml دورا تۇتقان 1ml لق تېرىتمە تەبىارلاپ، سېلىشتۈرۈلىدىغان تېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VI B) تەجربىسى بويىچە سناق تېرىتمە بىلەن سېلىشتۈرۈلىدىغان دورىلق تېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1μm، سېلىشتۈرۈلىدىغان تېرىتمىنىڭ ھەرقايىسە سىدىن 3μl ئېلىپ، 2% لىك ناترىي ھىدروكىسىد ئېرىتمىسىدە تەبىارلانغان سىلىتسىي بىلىمى G لق نېپىز تاختا ئۇستىدىكى ئاييرىم-ئاييرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، مېتىل بېنزاول-ئاتىپتۇن-مېتىل ئىسپىرت-قوبۇق ئاممىيەك تېرىتمىلىرىنى (3:1:20:20) نىسبەت بويىچە بىيىلدۈرگۈچى قىلىپ بىيىلدۈرگاندىن كېيىن، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، سوبۇق بىسمۇت كالىي يودىد سناق تېرىتمىسى ۋە ناترىي نىتىرت مېتىل ئىسپىرت سناق تېرىتمىسى پۈركۈلىدۇ. سناق قىلىنىدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا سېلىشتۈرۈلىدىغان دورىلق ماتېرىال ۋە سېلىشتۈرۈلىدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى ئاييرىم-ئاييرىم ئۆزىگە مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىسى پەيدا بولىدۇ.

【تەكسۈرۈش】 بۇ دورا دانىچە (جەۋەھەر) ياسالىمىلىرىنى تەبىللاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىملىرىگە ئۇيغۇن كېلىشى لازم.

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داؤالايدىغىنى】 غەبىرىي نورمال مىزاجنى تەڭشەيدۇ، قىزىتىمنى ياندۇنىدۇ، تەرلىتىدۇ، توسالغۇلارنى ئاچىدۇ. زۇكام، يۆتەل، قىزىتىما، تەرلىسەسلىك، يۈنقۇنچاق-بوغۇز ئىشىشپ ئاغرىش، بۇرنى پۈتۈش، پوتلىسى ئېقىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنده 3 قىتىم، ھەر قىتىمدا 12g ئۇچىلىدۇ.

【ئۆلچەمى】 ھەر بىر خالتىغا 12g قاچىلىنىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزىنى ھەم ئېتىپ ساقلىنىدۇ.

قۇرسى زەھەب

除障则海甫片

Chu zhang Ze hai pu Pian

【رېتسىپ】

116. 6g	تۈرىپۇت	167 g	سەبرى
83. 3 g	ھېلىھ	41. 6g	قىزىلگۈل
8. 3 g	زەپەر	41. 6g	كۈندۈر
		58. 3g	سۆقۇمنىيا

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى يەته خىل دورنى سوقۇپ ئۇششاق تالقالىپ، مۇۋاپقىق مقداردا ئادىي شېكەر قىيامى ۋە كراخمال قوشۇپ، دانىچە شەكلىگە كەلتۈرۈپ، قۇرۇتۇپ، 1000 دانه قۇرسى ياسلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ دورا سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك قۇرسى بولۇپ، ئالاھىدە خۇش پۇرالقىق، تەمى ئاچچىق بولىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 5g ئېلىپ، يۇمىشاق سوقۇپ، 20ml سۇ قوشۇپ ئازىلاشتۇرغاندۇ. دىن كېيىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىدىن ئىككى پروبرىكىغا 1ml دىن ئېلىپ، 1-پروبرىكىغا 1% لىك فېرى تېرىخلورىد ئېرىتمىسىدىن 2 تامىچە تېمىقاندا، ئېرىتمىھ قارا كۆك رەڭگە ئۆزگەرىدى؛ 2-پروبرىكىغا ئازراق ماڭنىي تالقىنى قوشۇپ، ئاندىن بىر نەھچە تامىچە تۆز كىسلاتاسى تېمىقاندا، ئېرىتمىھ قىزىل رەڭگە ئۆزگەرىدى.

(2) بۇ دورىدىن 5g ئېلىپ، يۇمىشاق سوقۇپ، 20ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، قايىناۋاتقان سۇ ئۇستىدە قايىنۇچە قىزىتىپ، بىر نەھچە منۇت چالغىقاندىن كېيىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىنى 5ml قالغىچە قوبۇلدۇرۇپ، سىناق ئېرىتمىھ قىلىنىدۇ. سېلىشتۇرۇلدىغان دورا باربالوئىنغا مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، 1ml تەركىبىدە 5mg دورا بولغان ئېرىتمىھ تەيارلاپ سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمىھ قىلىنىدۇ. نېيىز قەۋەتلىك دەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VII) تەجرىبىسى بويىچە يۇقىرىقى ئىككى خىل ئېرىتمىدىن 1m دىن ئېلىپ، G سىلىتىسى بىلىملىق نېيىز تاختا ئۇستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىلارغا تېمىتىلىدۇ. مېتىل ئاسېتىات-مېتىل ئىسپىرت، سۇ (1:2:10)نى يېسىلدۈرگۈچى قىلىپ يېسىلدۈرغاندىن كېيىن يېغۇنىلىپ، قۇرۇقۇپ، ئۇستىگە 10% لىك كالىي هىدروكىسىدىق مېتىل ئىسپىرت ئېرىتمىسى پۇر كۆپ، 365nm لق ئۇلترا بىنەپشە نۇرلۇق لامپا نۇردا كۆزىتىلىدۇ. سىناق قىلىنىدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىدا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورا سېپىكتەرنىڭ مۇناسىپ ئۇرۇندا ئۇخشاش رەڭلىك يالتراق نۇقتا كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تەيارلاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمىدۇ.

لەرگە ئۇيغۇن كېلىش كېرەك (قوشۇمچە I D).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي نورمال سەيرى ۋە سەۋادالارنى تازىلاپ، توسالغۇلار-نى بۇچىپ، كۆزنى روشەنلەشتۈرۈدۇ. كۆزگە ئاق چۈشۈشنى داۋالايدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 7~5 تال ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇدرىسى 0.5g .

【ساقلاش】 ئېغىزنى ھىم ئېتىپ، سالقىن جايىدا ساقلاش لازىم.

سەرپستان جەۋھىرى

热感赛比斯坦颗粒

Re gan Sai bi si tan Ke li

[رېتىپىپ]

140g	چىلان	350g	سەرپستان
84 g	چۈچۈكبۇيا	168g	خەشخاش پوستى
28 g	تەرخەمەك تۇرۇقى	28 g	لەيلىكۈل تۇرۇقى
84 g	تاتلىق بادام	21 g	بېھى تۇرۇقى
21 g	كەتسرا	48 g	خەشخاش تۇرۇقى
21 g	ئەرب بىلىمى	21 g	چۈچۈكبۇيا يىلتىزى قىيامى

【ياساش تۇسۇلى】 يۇقىرىدىكى ئۇن ئىككى خل دورىنى چالراق سوقۇپ تالقانلاپ، سۇ قوشۇپ، هەر قىتمىدا بىر سائەتنىن تۈچ قېتىم قاينىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىلىرىنى قوشۇپ، قويۇلدۇرۇپ مەلھەم قىلىپ، ئۇنىڭغا 900g شېكەر قوشۇپ دانىچە حالىتكە كەلتۈرۈپ، قۇرۇتۇپ، 1000g لىق دورا يالسىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 ئاج سارغۇچ رەڭلىك دانىچە دورا بولۇپ، خۇش پۇرماق، تەمى تاتلىق.

【پەرقەندەرۇش】 بۇ دورىدىن 30g ئېلىپ، 6g كىرىمنىلىق يۇسۇن تۆپىسى قوشۇپ، تۇششاق ئېزىپ، ئاندىن ئاممىيەك سىناق سۇيۇقلۇقى بىلەن نەمدەپ، ئۇنىڭغا 50ml 50% خلوروفورم قوشۇپ، 30 مىنۇت ئايلاڭما ئېقىملەق چەككىلىگەندىن كېيىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىمنى پارلاندۇرۇپ، قالدۇقلەرىغا 0.5ml مېتىل تۇسپىرت قوشۇپ تېرىتىپ سىناق تېرىتىمە قىلىنىدۇ. مورفن ھيدروخلورىد سېلىشتۇرما دورىسى، كودىئىن فوسفات سېلىشتۇرما دورىسى ۋە پاپاۋىرىن ھيدروخلورىد سېلىشتۇرما دورىلىرىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا مېتىل تۇسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml تەركىبىدە 1mg دورا بار بولغان ئارىلاش تېرىتىمە تەبىيارلاپ، سېلىشتۇرما تېرىتىمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر تۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) تەجىرىبىسى بويىچە يۇقىرىقى ئىككى خل تېرىتىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml 10 دىن ئېلىپ، 2% لىك ناترىي ھيدروكسىد تېرىتىمىسى بىلەن تەبىيارلانغان سىلىتىسى يېلىمى G لىق نېپىز تاختا تۇستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، مېتىل بىنزوول-ئاتىپتون-سۇسۇز تېتىل تۇسپىرت-قويۇق ئاممىيەك سىناق تېرىتىلىرىنى (1:3:20:20) نى يېپىل-دۇرغۇچى قىلىپ يېپىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، تۇستىگە بىسمۇت كالىي يودىد ۋە ناترىي نىتەتلىق دۇرغۇچى قىلىپ يېپىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، سىناق دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىدا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئۇرۇندا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا دانىچە ياسالىلىرىنى تەبىيارلاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمەر-گە ئۇيغۇن كېلىش لازىم. (قوشۇمچە C I).

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي نورمال سەپارانى چىقىرىپ تاشلاپ، يۈتەلنى توختىسىدۇ. بەلغىم بوشىتىدۇ. ئىسسىقتىن بولغان زۇكام ۋە يۈتەل، نەپىس بولى يۈقۇملىنىشنى داۋالايدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 ھەر كۈنى ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا بىر بولاق ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بولقى 12g.

【ساقلالش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ ساقلىنىدۇ.

قۇرسى خېمىرى گاۋىزبىان ئەمبىرى

健心合米尔高孜斑安比热片

Jian xin He mi er gao zi ban An bi re Pian

【رېتىپپ】

12	g	كەھرىۋا	80	g	كاۋىزبىان
12	g	مەرۋايت	80	g	بادىمنجى بۇيا چىنى
80	g	پىلە غوزىسى	80	g	بىدىمۇشكى
12	g	بىخ مارجان	12	g	قىزىل ياقۇت
80	g	سەندەملەر	80	g	قىزىلگۈل
20	mg	ئالىتۇن ۋاراق	12	g	ئەنبىر
450	mg	كۈمۈش ۋاراق	160	g	كۈلى كاۋىزبىان

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىقى 14 خىل دورىدىن ئالىتۇن ۋاراق ۋە كۈمۈش ۋاراق ئايىرم-ئايىرم يۇمشاق پاراشوک قىلىنىدۇ. كاۋىزبىان، بادىمنجى بۇيا چىنى، پىلە غوزىسى، بىدىمۇشكى قاتارلىق تۆت خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، ھەر قىتىمدا بىر سائەتىن، ئۈچ قىتىم قايىنقاڭاندىن كېيىن، قايىناتىملارنى قوشۇپ، سۈزۈپ سۈزۈلگەن تېرىتىمىنى قويىلدۈرۈپ، مەلھەم تېيارلىنىدۇ. كەھرىۋا قاتارلىق قېقاڭالغان 8 خىل دورىنى يۇمشاق سوقۇپ، پاراشوک قىلىپ، ئاندىن يۇقىرىقى سوقۇلغان پاراشوک ۋە مەلھەمەرنى قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، يەنە مۇۋاپىق مقداردا قوشۇمچىلارنى قوشۇپ، دانىچە ياساپ قۇرۇتۇپ، ئاندىن 1000 قۇرىسى بېسىپ چىقىرىپ، شېكەر ياللىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ شېكەر ياللىلغان دوا بولۇپ، شېكەرلىك قېيى ئېلىۋېتىلگەندىن كېيىن ئىچى كۈل رەڭ ئاقۇش، خۇش پۇرالقىق، تەمى چۈچۈمەل ھەم تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 2 قۇرسى ئېلىپ، يۇمشاق سوقۇپ، 5ml 5 ئېفر قوشۇپ، 15 منۇت چالغىقاندىن كېيىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىمىنى پارلاندۇرۇپ، قالدوغىغا 1% لىك ۋانلىنىلىق سۇلوفات كىسلاتا تېرىتىمىسىدىن 3 تامىچە تېمىتقاندا، تېرىتىمە تەدرىجىي قىزىلگۈل رەڭىگە ئۆزگەرىدى. (2) بۇ دورىدىن 5 قۇرسى ئېلىپ، ئۇششاق سوقۇپ، ئۇنىڭغا 5ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، 15 منۇت چالغىقاندىن كېيىن سۈزۈپ، 1ml تېرىتىمگە ئازاراق ماڭنىي تالقىنى قوشقاندىن كېيىن، 3~2 تامىچە تۇز كىسلاتاسى تېمىتسا، قىزىل رەڭىگە كىرىدى.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دوا قۇرسى ياسالىلىرىنى تېيارلاشتىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىملىرگە ئۆيغۇن كېلىش لازىم (قوشۇمچە ID).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 رەئىس ئەزالارغا مەنپەئەت قىلىدۇ. يۈرەك سېلىش،

ئۇيقۇسزىلق ۋە كۆپ چۈش كۆرۈشكە ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 ھەر كۈنى 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 2 قۇرسىن ئەتىگەن ۋە كەچتە ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرسىنىڭ ئېغىرلىقى 0.5g .

【ساقلاش】 ئېغىزى ھەم ئېتىپ ساقلىنىدۇ.

ئەۋرىشىم ئىچىملىكى

爱维心口服液

Ai wei xin Kou fu ye

[رېتىسىپ]

15 g	لاچىندانه	50 g	پىلە غوزىسى
10 g	گۈلى گاۋىبان	10 g	گاۋىبان
15 g	قەلمىپۇر	10 g	بىدىمۇشكى
15 g	ئۇستقۇددۇس	10 g	سۇمبىل چىنى
15 g	بەسباسە	3 g	ئۆشىنە
15 g	بادرنىجى بۇيا چىنى	15 g	قىزىلگۈل
0.6g	زەپەر	0.2g	ئىپار
		10 g	سازماج ھىندى

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىقى 15 خىل دورىدىن زەپەر ۋە ئىپاردىن باشقا، پىلە غوزىسى قاتارلىق 13 خىل دورىنى يېرىك سوقۇپ، سۇ قوشۇپ، ھەر قېتىمدا بىر يېرىم سائەتنىن جەھىئى 3 قېتىم قايىتىپ، 300ml دىستىللەنگەن ئېرىتمە تېيارلىنىدۇ. قايىتىلغان ئېرىتمىلەرنى قوشۇپ، سۇزۇپ، سۇزۇلگەن ئېرىتمەنى مۇۋاپىق مقداردا قويۇلدۇرۇپ، ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ئىسپىرت مقدارىنى 70% كە يەتكۈزۈپ، 24 سائەت تۇرغۇزۇپ، ئاندىن سۇزۇپ، سۇزۇلگەن ئېرىتمىدىن ئېتىل ئىسپىرتىنى يىغۇپلىپ ئىشلىتىشكە تېيارلىنىدۇ. ئىپار ۋە زەپەرگە 60% لىك ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ھەر قېتىمدا 2 سائەتنىن جەھىئى 2 قېتىم ئايىلانما ئېقىلىق چەككىلىپ، سۇزۇپ، سۇزۇلگەن ئېرىتمىلەرنى بىرلەشتۈرۈپ، تەركىبىدىكى ئېتىل ئىسپىرتىنى يىغۇپلىپ، مۇۋاپىق مقداردا قويۇلدۇرۇلدى. تاڭرىدا يۇقىرىقى 2 خىل قويۇلدۇرۇلغان ئېرىتمە بىلەن دىستىللەنگەن ئېرىتمىنى ئارىلاشتۇرۇپ، مۇۋاپىق مقداردا شېكىر قوشۇپ، ئاندىن 1000ml بولغۇچە سۇ قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، سۇزۇپ، ئامپۇللارغا قاچىلاب مىكروبىسىلانىدۇرۇلدى.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 قىزغۇچ قوڭۇر رەڭلىك سۇبۇق دورا بولۇپ، خۇش پۇراقلقى، تەمى تاتلىق.

- 【پەرقەلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 1ml ئېلىپ، ئىككى تامچە نىنھىدرىن سناق ئېرىتمىسى تېمىتىپ، قايىناآتقان سۇدا 10 منۇت قىزىقاندا، كۆكۈش بىنەپىشە رەڭگە ئۆزگەرىدى.
- (2) بۇ دورىدىن 1ml ئېلىپ، بىر تامچە تۆمۈر ترڅلورىد سناق ئېرىتمىسى تېمىتىقاندا، قېنىق بېشل رەڭگە ئۆزگەرىدى.
- (3) بۇ دورىدىن 1ml ئېلىپ، ئاز مقداردا ماڭنىي تالقىنى ۋە 1ml تۆز كىسلاراتىسى قوشۇپ قىزىقاندا، ئۆچۈق قىزىل رەڭگە ئۆزگەرىدى.

- 【تەكشۈرۈش】 نىسپىي زىچلىقى 1.08 دىن تۆۋەن بولماسىلىق كېرەك (قوشۇمچە A VII).
- 【pH قىممىتى】 5.0 ~ 6.0 بولۇش كېرەك (قوشۇمچە G VII).
- 【باشقىلار】 بۇ دورا مىكستۇرا تەبىyarلاشتىكى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىملىرىگە ئۇيغۇن كېلىش لازىم (قوشۇمچە J I).
- 【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 توسالغۇلارنى ئېچىپ، قاننى راۋانلاشتۇردىو. يۈرەكىنى كۈچلەندۈرۈپ، مېڭىنى سەگەكلىمشتۇردىو. دەئىس ئەزىزلىنى ساغلاملاشتۇردىو. يۈرمەك، كۆكەك ئاغرىش، يۈرەك سېلىش، ئۇييقۇسلىق ۋە ئۇنۇنقاقلقى، يۈرەك دىتىمى تەرتىپسىزلىنىش ۋە نېرۋا ئاجىزلىقنى داۋالايدىو.
- 【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنده ئىككى قىتىم، هەر قىتىمدا 10ml ئېچىلىدۇ.
- 【مىقدارى】 هەر بىر ئامپۇلى 10ml.
- 【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ، سالقىن جايىدا ساقلىنىدۇ.

ئاميله نوش جەۋەرى

消食阿米勒努西颗粒

Xiao shi A mi le nu xi Ke li

[رېتىپپ]

9 g	سۇمبۇل چىنى	360g	ئاميله
6 g	قاقىلە	9 g	مهستىكى رۇمى
6 g	بىسباسە	6 g	لاچىندانە
6 g	زەرنىپ	0.6g	زەپەر
15g	سۇنۇدى	6 g	قەلمەپۇر
18g	قىزىلگۈل	6 g	دارچىن
9 g	ئاسارۇن چىنى	6 g	جوپۇز

【ياساش ئۆسۈلى】 يۇقىرقى 14 خىل دورىدىن زەپەر وە مەستىكى رۇمىنى يۇماشق سوقۇپ تالقانلىغاندىن سىرت، ئاميله قاتارلىق قالغان 12 خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، 1-قېتىمدا 2 سائىمت، 2-3-قېتىمدا بىر بىرمى سائىھەتنىن جەھىئى ئۈچ قېتىم قايىتىپ، قايىتىلغان ئېرىتىملىرنى قوشۇپ، سۈزۈپ، سۈرۈلگەن ئېرىتىمىنى نىسپىي زىچلىقى (C₆₀) 1.32 ~ 1.35 1.35 ~ 1.32 بولغانغا قەدەر قويۇلدۇرۇپ، سۇيۇق مەلەمەم تەبىارلىنىدۇ. سۇيۇق مەلەمەدىن بىر ئۇلۇش ئېلىپ، 4 ئۇلۇش شېكەر، 1 ئۇلۇش دېكىستىرىن قوشۇپ، ئاندىن يۇقىرقى سوقۇپ تەبىارلانغان تالقاننى قوشۇپ، تەكشى ئازلاشتۇرۇپ، دانىچە ياساپ، قۇرۇتۇپ، 1000g دورا ياساپ چىقلىدۇ.

【شەكلى وە خۇسۇسىتى】 بۇ قوڭۇر دەڭلىك دانىچە دورا بولۇپ، خۇش پۇراقلقى، تەممى تاتلىق وە چۈچۈملەل كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 1g ئېلىپ، يۇماشق سوقۇپ، 5ml ىېپىر قوشۇپ، 5 منۇت چالغىقاندىن كېيىن سۈزۈپ، 1ml ئېپىرنى پارلاندۇرۇپ، قالدۇقىغا 1% لىك ۋانلىلىق سۇلغات كىسلاتا ئېرىتمەسىدىن 2 تامىچە تېمىقاندا، ئېرىتمە تەدرىجىي قىزىلگۈل دەڭگە كىرىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 2g ئېلىپ، يۇماشق سوقۇپ، 5ml ىېپىر قوشۇپ، 15 منۇت چالغىقاندىن كېيىن سۈزۈپ، 1ml غىچە قويۇلدۇرۇپ سىناق ئېرىتمە قىلىنىدۇ. موزا كىسلاتا سېلىشتۇرۇغۇچى دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، هەر 1ml تەركىبىدە 1mg دورا تۇتقان ئېرىتمە تەبىارلاپ، سېلىشتۇرۇغۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكىر ئۆسۈلى (قوشۇمچە B VI) تەحرىبىسى بويىچە سىناق ئېرىتمىدىن 1ml 10، سېلىشتۇرۇغۇچى ئېرىتمىدىن 1ml 3 ئېلىپ، سىلىتسىي يېلىمى 6 لىق نېپىز تاختا ئۇستىدە كى ئابىرم-ئابىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، مېتىل بېنزاول-ئېتىل فورمات كىسلاتا (1:4:5) نى بېسىلدۇرۇغۇچى قىلىپ بېسىلدۇرۇپ، يىغۇچىلىپ، سالقىندا قۇرۇتۇلىدۇ. ئاندىن 1% لىك تۆمۈر ئۈچ خلورىد ئېرىتمىسى

پۇرکۈلۈدۇ. سىناق قىلىنە بېچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتىرۇغۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىب ئۇرنىدا ئوخشات، رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا دانىچە ياسالىملارنى تەبىyarلاشتىكى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىمىلەرگە ئۇيغۇن كېلىش كېرەك (قوشۇمچا IC) .

【تەسىرى ۋە ئاساس يى داۋالايدىغىنى】 جىگەر ۋە ئۆتى قۇۋۇملىپ، ئىشتىهانى ئاچىدۇ. ئىشتىها - سىزلىق، ئاشقازان ئاغرىش، ھەزم ناچارلىشىش، نېرۋا ئاجزىلىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈرى ۋە مىقدارى】 كۈندە ئىككى قىتم، ھەر قىتمدا 6g ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بولىقى 12g .

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ ساقلىنىدۇ.

بادرەنچى بۇيا جەۋەرى

益心巴迪然吉布亚颗粒

Yi xin Ba di ran ji bu ya Ke li

بۇ دورا بادرەنچى بۇيا چىنى پىشىقلاب ياسالغان دانىچە دورىدۇ.

【ياساش ئۆسۈلى】 بادرەنچى بۇيا چىندىن 1000g ىېلىپ، سۇ پارىدا دىستىللەش ئۆسۈلى ئارقىلىق ئۈچۈچان مېسىنى ئايىرېتلىپ، دىستىللەنگەندىن كېيىنكى سۈلۈق تېرىتمە ئايىرم قاچىدا ساقلىنىدۇ؛ دورا قالدوقلۇرىغا يەنە سۇ قوشۇپ، ئىككى سائەت قايىنقا نەدىن كېيىن، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتمىنى يۈقرىقى سۈلۈق تېرىتمە بىلەن ئاربلاشتۇرۇپ، نىسپىي زىچلىقى (C₅₀) 1.35~1.32 1.32 بولغانغا قەدەر قويۇلدۇرۇپ، سۈبۈق مەلھەم تەيارلىنىدۇ. سۈبۈق مەلھەمدىن 1 ئۇلۇش ىېلىپ، 4 ئۇلۇش شېڭىر، 1 ئۇلۇش دېكىسترىن قوشۇپ، دانىچە ياسالقۇرۇقاندىن كېيىن يۈقرىقى ئۈچۈچان ماينى پۇركۈپ، تەكشى ئاربلاشتۇرۇپ، 1000g دورا ياسلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 قوڭۇر رەڭلىك دانىچە دورا بولۇپ، تەمى تاتلىق، سەل قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 20g ىېلىپ، 50ml ئېتىل ئاتىپاتا قوشۇپ، 1 سائەت ئىللانما ئېقىملق چەككىلمىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ، قۇرۇتۇپ، قالدوقتۇپ، 0.5ml 0.5ml ئاتىپاتا تېرىتىپ، سىناق قىلىنぐۇچى تېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن بادرەنچى بۇيا چىنى سېلىشتۇرما دورىسىدىن 2g ىېلىپ، 30ml 30ml ئاتىپاتا قوشۇپ، يۈقرىدىكىگە ئوخشاش ئۆسۈل بويىچە سېلىشتۇرما دورا تېرىتمىسى تەيارلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۆسۈلى (قوشۇمچە VI) تەجرىبىسى بويىچە سىناق تېرىتمىدىن 1μm، سېلىشتۇرما دورا تېرىتمىسىدىن 1μm ىېلىپ، سلىتىسى يىلىمى G لىق نېپىز تاختا ئۇستىگە ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىلىدۇ. بېنزوول-ئېتىل ئاتىپاتا فورميك كىسلاتا (4:2:0.1) نى يېسىلدۈرگۈچى قىلىپ يېسىلدۈرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، 5% لىك ۋانلىنىلىق سۈلەفات كىسلاتا تېرىتمىسى پۇركۈپ، داغ نۇقتىلىرى ئېنلىك كۆرۈنگەنگە قەدەر ئىسىق شامال بېرىپ قۇرۇتۇلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورا رەڭ سېپىكتەرىدىكى مۇناسىپ ئورنىدا ئوخشاش رەڭلىك ئىككى دانە داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا دانىچە ياسالىلىرىنى تەيارلاشتىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمەرگە ئۇيغۇن كېلىش لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يۈرەك ۋە مېڭىنى قۇۋۇتلهندۈرۈپ، سۈيىدۈكىنى ھەيدەپ، زىققىنى پەسىيىتىدۇ. نېرۋىسى چارچاشتىن بولغان ئۇيقوسلىق، ئىچى تىتىلداپ، دېمى سىقلىش ۋە نېرۋا ئاجىزلىقىغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 هەر كۈنى 3 قىتىم، هەر قىتىمدا 6g دىن قايىنات سۇدا دەملەپ ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 هەر بىر بولقى 12g.

【سافلاش】 ئېغىزى ھىم ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0179-98

ئۇستقۇددۇس شەربىتى

益脑吾斯提库都斯糖浆

Yi nao Wu si ti ku du si Tang jiang

رېتسېپ【		
2 g	پىرسىياۋشان	20g
12g	گاۋىزبان	2 g
12g	كەرمىشە ئۇرۇقى	12g
12g	بىنەپىشە	12g
12g	قىزىلگۈل	12g
40g	سەرپستان	4 g
		ئۇستقۇددۇس
		ئۇدسىلىب
		چۈچۈكبۇيا يىلتىزى
		ئارپىبهدىيان
		لىيلىكىلۇل ئۇرۇقى
		قۇرۇق ئۇرۇم

【ياساش ئۆسۈلى】 يۇقىرقى 12 خىل دورىدىن قىزىلگۈلدىن باشقا، ئۇستقۇددۇس قاتارلىق 11 خىل دورىنى يېرىك سوقۇپ، 2500ml سۇ قوشۇپ، 24 سايىم چىلاپ قويۇپ، ئاندىن 1000ml قالغىچە قاينىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن سۈبۈقلۈققَا ئىسىسىق ۋاقتىدا قىزىلگۈل قوشۇپ، 30 منۇت چىلغاندىن كېپىن قايتا سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىمىنى تىندۇرۇپ، ئۇستىدىكى سۈزۈك قىسىمىنى ئېلىپ، 650g شېكەر قوپۇپ، قوجۇپ تېرىتىپ، 1000ml بولغۇچە سۇ قوشۇپ تېرىتىمە تېيارلىنىدۇ.

«شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» قوڭۇر دەلىك بېشقاق سۇيۇقلۇق بولۇپ، تەمى تاتىق، سەل ئاچقىن كېلىدۇ.

«پەرقلەندۈرۈش» بۇ دورىدىن 20ml ئېلىپ، 10ml ئېفەر قوشۇپ، چالغىتىپ چەككىلەپ، ئېپسىرىنى ئايىرۋېلىپ، پارلاندۇرۇپ، قالدىقىغا 5% لىك ۋانىلىنلىق سۇلغات كىسلاata ئېرىتىمىسىدىن 2~1 تامىچە تىمىستىقىدا، ئېرىتىمە فېزىلىگۈل، ھېڭىگە كىرىدۇ.

²⁹ [تەكشۈرۈش] نىسپى زىچلىقى 1.29 دىن تۆۋەن بولماسلقى كېرەك (قوشۇمچە A VII).

4.0~5.5 pH قیمتی (G VII) بولوشه لازم.

【باشقىلار】 بۇ دورا شېكەر قىيامى ياسالىلىرىنى تەبىئەتلىك مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىملىرگە ئۇنگۇن كىلىشى لازىم (قوشۇمچە II).

«تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى» بەدەندىكى ئارتۇقچە بەلغەم خىلىتلارنى چىقىرىپ تاشلاپ، مېڭىنى قۇۋۇتلىپ، نېرۇشنى تىنچلاندۇرىدۇ. باش ئافرش، جىمഗۇرلۇق، تۇتقىقلقىق ۋە نېرۋا ئاجىزلىقىغا مُشلىتىلدۇ.

ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈندە ئىككى قىتمى، ھەر قىتمىدا 30ml نىچىلىدۇ.

• 200ml بوتولکسی هر برس چمچویی ۲۰۰ml بوتولکسی هر برس چمچویی

ساقلاش】 تۈغزىنى هم ئىتپ، سالقىن جايىدا ساقلاش كېرەك.

قۇرسى خىيار شەنېھر

通阻合牙日仙拜尔片

Tong zu He ya ri xian bai er Pian

【رېتىسىپ】

40g	چۈچۈكبۇيا يىلتىزى	160g	خىيار شەنېھر
48g	تۇربۇت	96 g	بىنەپىشە
12g	ئارپىبەدىيان	16 g	شور قەلىمى
20g	مەستىكى دۇمى	12 g	دۇم بەدىيان
24g	ھىلىلە	140g	تاتلىق بادام
12g	ئاچىچىتقاۋۇز	16 g	سەبرى

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقرىقى 12 خىل دورىدىن خىيار شەنېھر ۋە چۈچۈكبۇيا يىلتىزىدىن باشقان بىنەپىشە قاتارلىق 10 خىل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ، ئەلكەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكسى ئارىلاشتۇرۇلدۇ، خىيار شەنېھر ۋە چۈچۈكبۇيا يىلتىزىغا سۇ قوشۇپ، ھەر قىتمىدا بىر سائەتتنىن جەمئىي 3 قېتىم قاينىتىپ، سۈيىنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، مۇۋاپىق مقداردا قويۇلدۇرغاندىن كېيىن، يۇقرىقى دورا تالقىنى ۋە شېكىر قىيامى قوشۇپ، دانىچە ياساپ، قۇرۇقۇپ، 1000 قۇرسىلىق دورا بېسىپ چىقىرىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ قوڭۇر رەڭلىك قۇرسى دورا بولۇپ، تەمى سەل تاتلىق ھەم قېرىق كېلىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تەبىيارلاشتىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمىلەرگە ئۇيغۇن كېلىشى لازىم (قوشۇمچە ID I).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي سەپرانى تازىلاب، ئۇچەينى سىلىقلاشتۇردى، ھەيزىنى تەڭشەيدۇ. غەيرىي تەبىئىي سەپرا كەلتۈرۈپ چقارغان قەۋزىيەت ۋە ھەيز كېسىلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈندە 2 قېتىم، ھەر قىتمىدا 5~3 قۇرسى ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرسى ئېغىرلىقى 0.5g.

【ساقاڭلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ ساقلىنىدۇ.

قۇرسى ئايارەج پەيقرىا 通窍阿亚然及派克日片

Tong qiao A ya ran ji Pai ke ri Pian

【رېتىسىپ】

50g	ئاسارۇن چىنى	100g	سەبرى
50g	ھەبىي بىلسان	50 g	مەستىكى رۇمى
2 g	زەپەر	50 g	دارچىن
		50 g	سۇمبۇل چىنى

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرقى 7 خىل دورىدىن زەپەر يۇمشاق سوقۇلىدۇ؛ سەبرى وە مەستىكى رۇمىنى ئارىلاشتۇرۇپ، يۇمشاق سوقۇپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، زەپەر تالقىنى بىلەن تەكشى ئارىلاشتۇرۇلۇدۇ. ئاسارۇن چىنى قاتارلىق قالغان 4 خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، 1-قىتىمدا 2.5 سائەت، 2-، 3-قىتىمدا 1.5 سائەتىن 3 قىتىم قايىنقاندىن كېيىن، سۈپىنى برلىشتۇرۇپ، سۈزۈپ، نىسپىي زىچلىقى (C₅₀) 1.30~1.32 بولغۇچە قوبىۇلدۇرۇپ، يېپىشقاق مەلھەم تەييارلىنىدۇ. ئاندىن يۇقىرقى تالقان بىلەن تەكشى ئارىلاشتۇرۇلۇپ، مۇۋاپىق مقداردا قوشۇمچە ماڭرىيال قوشۇپ، دانىچە شەكلىگە كەلتۈرۈپ، قۇرۇتۇپ، 1000 قۇرسى دورا بېسىپ چىقىرىپ، سرتىغا شبکەر ياللىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ شبکەر ياللىلغان دورا بولۇپ، شبکەرلىك قېمى ئىلىشىتىلگەندىن كېيىن ئىچى قوڭۇر رەڭلىك، پۇرىقى مەززىلىك، تەمى قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 3 قۇرسى ئېلىپ، ياللىلغان شبکەرنى چىقىرىۋېتىپ، يۇمشاق ئېزىپ، 20ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، قايىناتقان سۇدا ۋاستىلىك قايىنلىپ، بىر نەچچە منۇت چالغىقاندان كېيىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىنى پارلاندۇرۇپ، قېقالغان قالدوقيغا 1ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. سېلىشتۈرۈما دورا باربالوئىنغا مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml تەركىبىدە 5mg دورا بولغان سېلىشتۈرۈما ئېرىتمە تەييارلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر (قوشۇمچە VI B) ئۇسۇلى بويىچە، يۇقىرقى 2 خىل ئېرىتىمىنىڭ ھەر قايسىسىدىن 1ml 2 دىن ئېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سىلىتسىي يېلىمى G لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىلارغا تېمىتىپ، بىتىل ئاتىپتات-مېتىل ئىسپىرت-سۇ (10:2)نى يېلىلدۈرگۈچى قىلىپ يېلىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتقاندان كېيىن، 10% لىك كالىي هىدرۆكىسد مېتىل ئىسپىرت ئېرىتىمىسى پۇركۈپ، ئۇلترا بىنەپىشە نۇرلۇق چراغ (365nm) ئاستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۈرۈما دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورنىدا ئۇخشاش رەڭلىك يالترىاق نۇر دېغى كۆزىنلىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 6 قۇرسى ئېلىپ، ياللىلغان شبکەرنى چىقىرىۋېتىپ، يۇمشاق ئېزىپ، 10ml بىتىل

ئىسپيرت قوشۇپ، ئېغىزىنى ھىم ئېتىپ، سوغۇق سۇغا 20 مىنۇت چىلىنىدۇ. ئاندىن پات-پات چالغىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقىغا 1ml ئېتىل ئىسپيرت قوشۇپ، ئېرىتىپ سىناق ئېرىتمە قىلىنىدۇ. سېلىشتۇرغۇچى دورا سىننالبېھىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئېتىل ئىسپيرت قوشۇپ، ھەر 1ml تەركىبىدە 1ml دورا تۇتقان ئېرىتمە تەيارلاپ، سېلىشتۇرغۇچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېيىز قۇھەتلىك رەڭ سېپىكتىرىدە (قوشۇمچە B VI) ئۆسۈلى بوبىچە، سىناق قىلىنぐۇچى ئېرىتمىدىن 1μm، سېلىشتۇرغۇچى ئېرىتمىدىن 1μm ئېلىپ، سىلىتسىي يېلىمى G لق نېيىز قەھەتلىك تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم نۇقتىلارغا تېمىستىلىدۇ. ئاندىن نېفت ئېتىرى (C 90~60)-ئېتىل ئاتىپتىك (3:17)نى يېسىلدەرۇغۇچى قىلىپ يېسىلدەرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇنىڭغا دىنىتروفنىلەيدازىنىڭ ئېتىل ئىسپيرتلىق سىناق ئېرىتمىسى پۇرکۈلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئۇرۇندادا ئۇخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قورسى ياسالىلىرىنى تەيارلاشقا مۇناسىۋەتلىك بەلگىلمىلەرگە ئۆيغۇن كېلىشى لازىم (قوشۇمچە I D).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داؤالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي خىلىتلارنى تازىلاپ، بەدەننى كۈچەيتىپ، مېڭىنى ساغلاملاشتۇرىدى. بىش ئاغرىش، نېرۋا ئاجىزلىق ۋە تۇتقاقلقى كېسەللىكىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مقدارى】 كۈنده بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 4~6 قورسى ئىچىلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ھامىلىدار ئاياللار ۋە بالا ئېمىسۋاتقان ئاياللار، ھەيز مەزگىلىدىكى ئاياللار، ئۆتكۈر ئۈچەي ياللۇغىغا گىرىپتار بولغانلار ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0182-98

سۆرۈنجان كاپسۇلى

通滞苏润江胶囊

Tong zhi Su run jiang Jiao nang

【رېتىپ】

60g	سۆرۈنجان	42. 5g	سانا
60g	تۈرۈپت	18 g	ھېلىله
3 g	زەپەر	57. 5g	تاتلىق بادام
		7. 5 g	سۈقۈمنىيما

【ياساش ئۈسۈلى】 يۇقىرقى 7 خىل دورىنى يۈمىشاق سوقۇپ تالقانلاپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، مۇۋاپىق مىقداردا شېكىر قىيامى ۋە كراخمال قوشۇپ، دانچە قىلىپ قۇرۇقۇپ، 1000 دانه كاپسۇل تېيىارلىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ كاپسۇللىق دورا بولۇپ، ئۇچىمde سېرىق رەڭلىك دانچە دورا بولىدۇ. تەممى ئاچقىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنى مىكروسكوپتا كۆزمەتكىننە كرسىتال تالالار كۆپ بولۇپ، كالتىسى ئۇكسالات چاسا كرسىتالنىڭ دىئامېتىرى $15\text{ }\mu\text{m}$ ~ 12 ، غەيرىي بەز تۈكچە تاق ھۈچەيرىسىنىڭ ئۇزۇنلىقى 100 ~ $350\text{ }\mu\text{m}$ ، دىئامېتىرى $25\text{ }\mu\text{m}$ ~ 12 كېلىدۇ، دىوارى قىلىن بولۇپ، سۆگەلسىمان ئۆسۈكچىلىرى بولىدۇ. سىرتقى تېرە ھۈچەيرىلىرىنىڭ ھافا توشۇكچىسى تۇز تۇق شەكىلدە بولىدۇ.

(2) دورا دانچىسىدىن 1. 5g 10ml سۇ قۇيۇپ، ئارىلاشتۇرۇپ سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىدىن 2ml 1. 5g 2 پروبرىكىغا بولۇپ قۇيۇپ، 1-پروبرىكىغا 2~1 تامچە ناتىرىي خلور گېلاتىن سىناق ئېرىتمىسى تېمىتقاندا، ساراغۇچ ئاڭ چۆكىمە هاسىل بولىدۇ؛ يەنە بىر پروبرىكىغا 2~1 تامچە تۆمۈر ئۈچ خلورىد سىناق ئېرىتمىسى تېمىتقاندا، قارا داغلىق چۆكىمە هاسىل بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا كاپسۇل ياسالىلىرىنى تېيىارلاشتىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىملىرگە ئۇيغۇن بولۇشى كېرەك (قوشۇمچە 1 L).

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 توسالغۇلارنى ئېچىپ، شىشىقنى ياندۇرۇپ، ئاغرىقىنى توختىتىدۇ. سۆگەك-بوغۇم ئاڭرىش، رېماتزىم، رېماتوئىدىلىق بوغۇم ياللۇغى، ئولتۇرغۇچ سۆگەك نېرۋىسى ئاڭرىش قاتارلىقلارنى داۋالايدى.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈنده 2 قېتىم، هەر قېتىمدا 7~5 كاپسۇل ىچىلىدۇ.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 بۇۋاسىر كېسەللىكى بارلار ئىشلىتىشكە بولمايدۇ.

【ئۆلچىمى】 هەر بىر كاپسۇلى 0. 3g.

【ساقلالاش】 ئېغىزى ھىم بىتىلىپ ساقلىنىدۇ.

قۇرسى ئىترەفلى سانا

通滯依提爾菲力沙那片

Tong zhi Yi ti er fei li Sha na Pian

【رېتىپپ】

100g	ئامىلە	200g	سانا
100g	ھېلىلە	100g	قارا ھېلىلە
		100g	بەللىلە

【ياساش ئۈسۈلى】 يۈقىرىقى 5 خىل دورىدىن سانا يۇمىشاق سوقۇپ تالقانلىنىدۇ. ھېلىلە قاتارلىق تۆت خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، ھەر قېتىمدا بىر يېرىم سائەتتىن جەمئىي تۈچ قېتىم قايىتلىنىدۇ. ئاندىن قايىتلىغان ئېرىتىملىرنى قوشۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىنى قويۇلدۇرۇپ مەلھەم تەبىارلاپ، يۈقىرىقى تالقان بىلەن ئارىلاشتۇرغاندىن كېپىن، مۇۋاپىق قوشۇمچىلارنى قوشۇپ، دانىچە ياساپ قۇرۇتۇپ، 1000 دانە قۇرسى ياساپ، سىرتىغا شېكەر ياللىنىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ سىرتىغا شېكەر ياللىغان قۇرسى دورا بولۇپ، ئىچى قوڭۇر دەڭلىك، تىمى ئاچىچىق ھەم قىرتاق كېلىنىدۇ.

【پەرقەلەندۇرۇش】 (1) بۇ دورىنى مىكروسكوبتا كۆزمەتكەندە كەرسىتال تالالار كۆپ كۆرۈللىدۇ. كالتسىي ئۆكسالات چالسا كەرسىتالنىڭ دىئامېتىرى 15~15 μm ، غەيرىي بەز تۈكچە يەككە ھۇجمەيرىسىنىڭ ئۆزۈنلۈقى 350 μm ~100، دىئامېتىرى 15 μm ~12 كېلىنىدۇ. دىۋارى قېلىن بولۇپ، سۆگەلسىمان ئۆزۈكچىلىرى بولىنىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 2 قۇرسى ئېلىپ، ياللىغان شېكەرنى چىقىرىۋېتىپ، يۇمىشاق ئەزگەندىن كېپىن، 10ml سۇ قوشۇپ، ئېرىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىنى 2 پەروبىركىغا بولۇپ قۇيۇپ، 1-پەروبىركىغا 3~2 تامىچە تۆمۈر تۈچ خلورىد سىناق ئېرىتىمىسى تېمىتقاندا، كۆكۈش كۈل دەڭ چۆكمە ھاسىل بولىنىدۇ. 2-پەروبىركىغا 3~2 تامىچە ناترىي خلورىد گېلاتىن سىناق ئېرىتىمىسى تېمىتقاندا، ئاڭ رەڭلىك چۆكمە ھاسىل بولىنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تەبىارلاشقا مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىمىلەرگە ئۇيغۇن بولۇشى لازىم (قوشۇمچە ID I).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 توسالغۇلارنى ئاچىدۇ، تەرمەتنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئاغرىقىنى توختىنىدۇ. قىزىتىملىق باش ئاغرىقى، قەۋزىيەت، قىچىشىش، ۋە بوغۇم ئاغرىقى قاتارلىقلارغا ئىشلىتلىنىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈندە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 6~4 قۇرسى ئىچىلىدۇ.

【ساقلاش】 بېغزى ھىم ئېتلىپ ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0184—98

چىلان شەربىتى

理血奇朗糖漿

Li xue Qi lang Tang jiang

【رېتسىپ】

28g	بنەپىشە	60g	چىلان
28g	قىزىلگۈل	28g	نېلۈپەر
		28g	دورلىق گاۋىزبان

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرقى 5 خىل دورىدىن قىزىلگۈلدىن باشقما، چىلان قاتارلىق 4 خىل دورىنى 24 سائىت سۇغا چىلغاندىن كېيىن، 1-قىتمىدا 1 سائىت، 2-قىتمىدا يېرىم سائىت، جەھىئى 2 قىتمى قاينىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىملەرنى بىر لاشتۇرۇپ، مۇۋاپىق مىقداردا قوبىلۇرۇغاندىن كېيىن، قىزىق ۋاقتىدا قىزىلگۈلنى قوشۇپ، 30 منۇت چىلاپ، سۈزۈكەندىن كېيىن سۈزۈلگەن تېرىتىمىگە 650g قۇمۇش شېكىرى قوشۇپ، ئارىلاشتۇرۇپ تېرىتكەندىن كېيىن ئۇمۇمىي مىقدارى 1000ml بولغۇچە سۇ قوشۇلۇدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ قوڭۇرەتلىك سۈيۈقلىق بولۇپ، خوش پۇراقلق، تەمى تائلىق كېلىدۇ.

【پەرقەندەرۇش】 (1) بۇ دورىدىن 10ml 1ىلىپ، 10ml 1ىتىل تائىپتەت قوشۇپ، چالغىتىپ، چەككىلىپ، 1ىتىل تائىپتەت تېرىتىمىسىدىن 1ml 1ىلىپ، هيدروكسىلامن ھيدروخلورىد سىناق تېرىتىمىسى ۋە 10% لىك كالىي ھيدروكسىد مېتىل تىسپىرت سىناق تېرىتىمىسىدىن 2 تامچىدىن تېمىتىپ، ئىشقاڭلىق ھالاتكە كەلتۈرۈپ، توپۇق، دېئاكسيلىشىكىچە قايىناڭاتقان سۇدا ۋاستىلىك قىزىتىپ، سوۋوغاندىن كېيىن، تۆز كىسلاتاسى قوشۇپ كىسلاتالاشتۇرۇپ، ئاندىن 1% لىك تۆمۈر ئۆچ خلورىد سىناق تېرىتىمىسىدىن بىر نەچىچە تامچە تېمىتقاندا، تېرىتىمە گلاس رەڭكىگە كىرىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 1ml 1ىلىپ، 2 پروبرىكىغا بۆلۈپ قوبىپ، 1-پروبرىكىغا 1% لىك تۆمۈر ئۆچ خلورىد سىناق تېرىتىمىسىدىن 2 تامچە تېمىتقاندا، تېرىتىمە قارا كۆك رەڭكە كىرىدۇ؛ 2-پروبرىكىغا ئازاراق ماڭنىي تالقىنى سېلىپ، ئۇنىڭغا تۆز كىسلاتاسىدىن بىر نەچىچە تامچە تېمىتقاندا، قىزىل رەڭكە كىرىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 نىسپىي زىچىلىق 1.25 دىن تۆۋىن بولمالىق كېرەك (قوشۇمچە VII A).

【pH قىممىتى】 3.5~5.5 (قوشۇمچە G VII) بولۇشى لازىم.

【باشىلار】 بۇ دورا شەربىت ياسالىملىرىنى تېيارلاشتىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىملىرگە ئۇيغۇن كېلىشى لازىم (قوشۇمچە H I).

【تەسىرى ۋە ئىساسىي داۋالايدىغىنى】 قاننى تەڭشىپ، جىڭەرنى قۇۋۇچەتلىمەيدۇ. قىزىتىمنى پەسەيدىتىپ، بەلغەمنى بوشىتىدۇ. قىزىتىما، باش ئاغرىش، قىزىتىملەق يۆتەل ۋە يۇقىرى قان بېسىمغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنده ئىككى قىتمى، ھەر قىتمىدا 30ml 1ىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بوتۇللىكى 200ml لق.

【ساڭلاش】 ئېغىزىنى ھىم ئىتىپ، سالقىن جايىدا ساقلىنىدۇ.

قۇرسى چۆپچىن ئەلا

清浊曲比亲艾拉片

Qing zhuo Qu bi qin ai la Pian

【رېتىپپ】

10 g	زەرچۈھ	215 g	چۆپچىن
10 g	قىزىلگۈل	3.7 g	قاقله
3.7 g	سۆرۈنجان	17.5g	پىلىپ
3.7 g	دارچىن	17.5g	زەنجۇشىل
2.5 g	زەپەر	10 g	بىسباسە
10 g	سۇئىدى	3.7 g	سانا
10 g	جوپۇز	3.7 g	مىستىكى رۇمى
3.7 g	ئەرمۇدۇن ئۇرۇقى	17.5g	پارپا
3.7 g	قارىمۇچ	10 g	خولىنجان
17.5g	ئاقىر قەرها	10 g	قەلمەپۇر
		3.7 g	تىيەندەڭ

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرىقى 21 خىل دورىدىن 65g چۆپچىنى ۋە قەلمەپۇر، ئاقىر قەرها، زەپەر، مىستىكى رۇمى، سۆرۈنجان قاتارلىق 6 خىل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ، ئەلكەكتىن تۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇلدۇ. قىزىلگۈل، خولىنجان، دارچىن، قاقله، قەلمەپۇر قاتارلىق 5 خىل دورىنىڭ ئۇچۇچان مېيىنى ئېلىپ، دىستىللەپ ئېلىنغان سۇلۇق تېرىتىمىسى ئايىرم قاچىدا ساقلىنىدۇ. دورا قالدۇقى ۋە چۆپچىن قاتارلىق قالغان 10 خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، 1-3-قىتىمدا 2.5 سائىمت، 2-3-قىتىمدا 1.5 سائىتتىن جەمئى 3 قېتىم قالىناتقاندىن كېيىن، تېرىتىملىرىنى بىر لاشتۇرۇپ سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىم بىلەن يۇقىرىقى سۇلۇق يېلىسىلىدۇ. ئاندىن ئۇنىڭغا يۇقىرىدا سوقۇلغان تالقانى قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانچە قىلىپ قۇرۇتۇپ، يۇقىرىقى ئۇچۇچان مايىنى پۇركۈگەندىن كېيىن تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، 1000 قۇرسى ياساپ، سىرتىغا شېكىر ياللىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ شېكىر ياللىلغان دورا بولۇپ، ياللىلغان شېكەرنى ئېلىۋەتكەندىن كېيىن رەڭگى سارغۇچ قوڭۇر، پۇراقلىق، تەمى ئاچىچىق كېلىدۇ.

【پەرقەندەرۇش】 (1) بۇ دورىنى مىكروسkopita كۆزەتكەندە: شەكلى تەرتىپىز بولغان ئىنۇلىنىنى كەڭلىكى سارغۇچ قوڭۇر، تەرىتىپلىقلىق، تەمى ئاچىچىق كېلىدۇ. هەممىلا يەردە ئۇچراتقىلى بولىدۇ. تاش ھۇجەپىلىرى توب ياكى تارقاق ھالەتتە جايىلىشىدۇ. كاۋاڭ تېرىقچىلىرى ئېنىق، شەكللى چاسراق، ئۇچبۇرجهك ياكى كۆپ تەرمەپىلىك بولۇپ، ئۇزۇنىلىقى 30~50 μm ، كەڭلىكى 20~110 μm كېلىدۇ. تۆتكۈزۈگۈچ كاناللار تورسىمان بولۇپ، دىئامېتىرى

20~90 μm گۈل چېڭى دانچىلىرى چوققىسىدىن قارىغاندا ئۈچۈرجهك كۆرفىندۇ.

تۇغرا ئۇقىنىڭ ئۇزۇنلىقى 20 μm ~12، سىرتقى يۈزى كۆپۈنگۈ لىنزا شەكىللەك بولۇپ، ئۇج تال بىرىكىمە ئېرىقچىسى بولىدۇ. كالتىسى ئۆكسالات دىستە كرستالنىڭ چوڭ-كىچىكلىكى ھەر خىل بولۇپ، دىئامېتىرى 3.5~26 μm كېلىدۇ. قىرى كۆپىنچە ئۆتكۈر بولۇپ، نېبىز پوستلىق ھوجەيرىلەر ئارسىغا تارقالغان، ئادمته كۆپىلگەن دىستلىك كرستاللار تۈپلاشقان بولىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 5 قۇرسى ئېلىپ، يالىتلغان شېكىرنى چىقىرىۋېتىپ، يۇمىشاق سوقۇپ، ئاندىن ئۇنىڭغا 20ml بېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، 40 مىنۇت ئايلانما ئېقىملق چەككىلىپ، سۇزگەندىن كېيىن سۇزۇلگەن ئېرىتمىگە 1ml تۇز كىسلاتا قوشۇپ، 1 سائەت ئايلانما ئېقىملق چەككىلىكەندىن كېيىن 5ml غىچە قويۇلدۇرۇلدى. ئاندىن يەنە 10ml سۇ قوشۇپ، 20ml بۇتىل ئالكوهول بىلەن چەككىلىپ، بۇتىل ئالكوهول ئېرىتمىسىنى پارلاندۇرغاندىن كېيىن، قېپقالغان قالدۇقىغا 1ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن سىلاڭىن سېلىشتۈرۈغۈچى دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml تەركىبىدە 5mg دورا بولغان ئېرىتمە تەبىارلاپ، سېلىشتۈرۈغۈچى ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلىك رەڭ سېپكىتر تەجريبە ئۇسۇلى بويىچە (قوشۇمچە B VII)، يۇقىرقىقى 2 خىل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml 10 ئېلىپ، نېبىز قەۋەتلىك سىلىتسىي يېلىمى G لىق تاختىدىكى نۇقتىغا ئايىرم-ئايىرم تېمىتىلىدۇ. ئاندىن n-ھېكسان-ئاتسېتون (1:4)نى بېسىلدۈرۈغۈچى قىلىپ بېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، فوسფومolibik كىسلاتا سىناق ئېرىتمىسىنى پۇركۈپ، داغ نۇقتىلىرى ئېنىق كۆرفىگەنگە قەدەر ئۇسىق شامال بېرىلىدۇ. سىناق دورىنىڭ رەڭ سېپكىترىدا، سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپكىتىدىكى مۇناسىپ ئورنىدا ئوخشىش رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 قۇرسى ياسالىلىرىنى تەبىارلاشتىكى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىمىلەرگە ئۇيغۇن كېلىش لازىم (قوشۇمچە D I).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 دۇغلاشقان قانىنى تازىلاپ، سۈيدۈكىنى ھېيدەپ، ئىشىشىنى ياندۇردى. سىيگەندە ئاغرىش، سۈيدۈك ئازىيىش، سۈيدۈكتىن قان كېلىش، بەل ئاغرىش، خۇن توختىما-لىق، بوغۇم ئاغرىش قاتارلىقلارنى داۋالايدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈندە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 4~6 قۇرسى ئىچىلىدۇ.

【ساقلالاش】 ئېغىزى ھىم بېتىلىپ ساقلىنىدۇ.

کاسنه جەۋەرى

清热卡森颗粒

Qing re Ka sen Ke li

بۇ کاسنەنى پىشىقلاب ئىشلىش ئارقىلىق ياسالغان دانىچە دورا.

【ياساش ئۆسۈلى】 کاسنەدىن 1000g 1 ئىلىپ، سۇ قۇيۇپ ھەر قىتمىدا بىر يېرىم سائەتىن ئۆج قېتىم قايىتىپ، قايىتلىغان ئېرىتىملىرنى قوشۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىنى نىسىپى زىچىلىقى (C 50~60) 1.35~1.38 بولغانغا قەدەر قويىلدۈرۈپ، سۇيۇق مەلھەم تەبىارلىنىدۇ. سۇيۇق مەلھەمدىن 1 ئۇلۇش ئىلىپ، ئۇنىڭغا قومۇش شېكىرىدىن 4 ئۇلۇش، دېكسىترىندىن 1 ئۇلۇش قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، قۇرۇتۇپ، 1000g 1 دانىچە قىلىپ ياسلىدۇ.

【شەكللى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك دانىچە دورا بولۇپ، تەمى تاتلىق، سەل قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 2g ئىلىپ، يۇماشاق سوقۇپ، 10ml سۇ قوشۇپ ئېرىتىپ، سۈزۈكىنەن كېيىن، سۈزۈگەن ئېرىتىمدىن 1ml ئىلىپ، 1% لىك تۆمۈر ئۆج خلورىد سىناق ئېرىتىمىسىدىن 2 تامىچە تېمىتقاندا، ئېرىتىمە كۆكۈش بېشل رەڭگە كىرىدۇ، 3~2 تامىچە ئاممىياك سۇيىي قوشقاندا، ئېرىتىمە قارامتۇل قىزىل رەڭگە كىرىدۇ. بۇلاردىن باشقا، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىنى فىلتەر قەغىزىگە تېمىتىپ، ئۇلترا بىنەپشە نۇرلۇق چىrag (365nm) تا كۆزەتكەننە، روشنەن كۆك رەڭلىك يالتساق نۇر كۆرۈنىدۇ، ئاممىياك سۇيىي قوشقاندا سېرىق رەڭلىك يالتساق نۇر كۆرۈنىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 2g ئىلىپ، يۇماشاق سوقۇپ، 20ml سۇدا ئېرىتىپ، ھەر قىتمىدا 20ml ئېفرى بىلەن جەمئىي 3 قېتىم چەككىلىپ، چەككىلەنگەن ئېفرىلىق ئېرىتىملىرنى بىرلاشتۇرۇپ، 20ml سۇدا چايقىلىدۇ. ئاندىن ئېفرىلىق ئېرىتىمىنى پارلاندۇرۇپ، قۇرۇتۇپ، قېقالغان قالدۇقغا 1ml ئېفرى، سىناق ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن کاسنە سېلىشتۇرۇما دورا ماتېرىيالدىن 2g ئىلىپ، 20ml ئېفرىغا 30 مىنۇت چىلغاندىن كېيىن، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قېقالغان قالدۇقغا 0.5ml ئېفرى قوشۇپ ئېرىتىپ، سېلىشتۇرۇلدىغان دورىلىق ئېرىتىمە قىلىنىدۇ، نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر 0.5ml تەجريبە ئۆسۈلى (قوشۇمچە B VI) بويىچە، يۈقرىقى 2 خىل ئېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 0.5ml ئىلىپ، سىلىتىسى يېلىمى G لىق نېپىز تاختا ئۇستىگە ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىلىدۇ. بېنزو-ئېتىل ئاتىپتەن-فورميك كىسلاقاتا (1:0.1:4)نى يېلىلدۈرۈغۈچى قىلىپ يېلىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنەپشە نۇرلۇق چىrag (365nm) تا كۆزىتىلىدۇ. سىناق دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىدا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئۇرۇنىدا ئۇخشاش رەڭلىك يالتساق نۇر كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا دانىچە ياسالىلىرىنى تەبىارلاشتىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىملىرگە ئۇيغۇن كېلىش لازىم (قوشۇمچە C I).

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 جىگەرنى تازىلاپ، ئۆتنى راۋانلاشتۇرىدۇ. ئاشقازاننى كۈچھەيتىپ، ھەزىمنى ياخشىلايدۇ. سۈيدۈكىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئىشىشىنى ياندۇرىدۇ. ھۆل ئىسسىقتىن بولغان سېرىقلىق چوشۇش، ئاشقازان ئاغرىپ، ئىشتىهاسىزلىنىش، ئىشىشىق ۋە سۈيدۈك ئازىيىشقا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنده 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 6g ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بولقى 12g.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ئېتلىپ ساقلىنىدۇ.

ئىترنېلى كەشىز جەۋەھرى

清凉依提尔菲力开西尼孜颗粒

Qing liang Yi ti er fei li Kai xi ni zi Ke li

100g	بەللىھ پوستى	200g	يۇمۇقاسۇت ئۈزۈقى
100g	ھېلىلە	4 g	سېرىنگىماي
100g	قارا ھېلىلە	100g	ئامىلە

«یاساش ئۆسۈل» يۇقىرىقى 6 خل دورىدىن سېرىقمايدىن باشقا يۇمۇغايىسىوت نۇرۇقى قاتارلىق قالغان 5 خل دورىغا سۇ قوشۇپ، 1-قىتىمدا 2.5 ساھىت، 2-قىتىمدا 1.5 ساھىت، جەمئىي 2 قىتىم قايناتقانىدىن كېيىن، قاينىتىلغان ئېرىتىمىلەرنى قوشۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمنى نىسپىي زىچىلىقى (C⁰ ~ 60 ~ 1.35) بولغانغا قەدەر قويۇلدۇرۇپ، سۈيۈق مەلھەم تېبىارلىنىسىدۇ. ئاندىن سېرىقمايدىنى ئېرىتىپ، يۇقىرىقى سۈيۈق مەلھەم بىلەن تەكشى ئارلاشتۇرغانىدىن كېيىن، بىر ھەمسىه سۈيۈق مەلھەمگە 4.75 ھەمسىه قومۇش شېكىرى، 1.25 ھەمسىه دېكسترىن قوشۇپ، ئارلاشتۇرۇپ، دانىچە قىلىپ قۇرۇتۇپ، 1000g دانىچە دورا ياسىلىنىسىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇمۇسىتى】 بۇ قىنق قوڭۇر رەڭلىك دانىچە دورا بولۇپ، تەمى چۈچۈمەل، تاتلىق
ھەم قېرىق كېلىدۇ.

پەرقلەندۈرۈش (1) بۇ دورىدىن 1gنى يۈمىشاق سوقۇپ، 10ml سۇ قوشۇپ، قوچۇپ تېرىتكەندىن كېيىن، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتمىدىن 2ml ئېلىپ، توْمۇر ئۆچ خلورىد سىناق تېرىتمىسىدىن 1 تامچە تېمىتقاندا، قېنىق كۈڭ رەڭلىك چۆكمە ھاسىل بولىدۇ. سۈزۈلگەن تېرىتمىدىن يەنە 2ml ئېلىپ، ناتىرىي خلورلۇق گلاتىن سىناق تېرىتمىسىدىن 1 تامچە تېمىتقاندا، ئاڭ رەڭلىك چۆكمە ھاسىل بولىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 2gنى يۈمىشاق سوقۇپ، 5ml ئاتىپتون قوشۇپ، 10 مىنۇت چالغىقاندىن كېيىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ، قېيقالغان قالدۇقىغا 1ml ئاتىپتون قوشۇپ تېرىتىپ، سىناق تېرىتمە قىلىنىدۇ. گالالات كىسلاطا سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن ئېلىپ، تۇنىڭغا ئاتىپتون قوشۇپ، ھەر 1ml تەركىبىدە 1mg دуرا تۇقان تېرىتمە تەبىارلاپ، سېلىشتۈرۈلدىغان تېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر تەجربىي ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) بويىچە يۈقرىقى 2 خىل تېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 3ml ئېلىپ، سىلىتىسى يېلىمى G لق نېپىز تاختا ئۇستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىلدە. مېتىل بېنزوil-ئېتىل فورمات-فورمالك كىسلاطا (4:1:5)نى يېلىدۇرغۇچى قىلىپ يېلىدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇ-تۇپ، 1% لىك توْمۇر ئۆچ خلورىد تېرىتمىسى يۇرۇكۈلىدۇ. سىناق دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۈرۈلدى-غان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورنىدا ئۇخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى كۆرۈلىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا دانىچە ياسالىمىسىنى تەبىئارلاشتىكى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىمەرگە ئۇيغۇن كېلىشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 قاندىكى قىزىقلقىنى سوۋوٽىدۇ، ئۇغۇرقى توختىسىدۇ، نېرۋەنى تىنچلاندۇرىدۇ. ھەر خل غىيرىي تەبىئىي سەپرادرىن بولغان باش ئاغرىش، قىزىتمىدىن بولغان يۈرەك سېلىش، كۆڭلى ئېلىشىش، كۆز تورلىشىش ۋە قۇلاق غوڭۇلداشقا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈندە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 6g دىن قايىناق سۇغا چىلاپ ئىچىلىدۇ.

【مۇلچىمى】 ھەر بىر بولقى 12g.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھەم ساقلىنىدۇ.

سۇقۇپى بىخ مارجان

清涩比黑马尔江散

Qing se Bi hei ma er jiang San

[رېتسېپ]

موزا	200g	تومۇر دورىسى
يۇمغاقسۇت ئۇرۇقى	100g	كۈچۈلا (پىشىقلانغان)
كۆپىكى دەريا	100g	سييادان
بىخ مارجان	100g	كات ھىندى

【ياساش ئۇرسۇلى】 يۇقىرقى 8 خىل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ ياسىلىدۇ.
 【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ قوڭۇر رەڭلىك نالقان دورا بولۇپ، سەل غىدىقلەغۇچى پۇراققا
 ئىگە.

【پەرقلەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىنى ميكروسكوبتا كۆزتكەندە: غەيرىي بەز تۈكچىلىرى ئاق ھۈجەي-
 ىرىلىك، تۇۋى يوغان، دىۋارى ئىنتايىن قېلىن، ياغاچلاشقان. تۆشۈكلىك ھۈجەيرىلەر سوقىچاق شەكىللەك
 ياكى رەتسىز تىزىلغان. مېۋە ئىچكى پوست ھۈجەيرىلەر ئۇيىما نەقىشىمىان تىزىلغان بولۇپ، ھەممىشە
 6 بۇرۇچەكىسىمان قېلىن دىۋارلىق ھۈجەيرىلەر بىرگە كۆرۈنىدۇ. سىرتقى ئۇرۇق پوست ھۈجەيرىلەر چاسا
 شەكىللەك، رەڭكى قارامتۇل قوڭۇر، شۇرغۇغۇچىسىمان تۈكچىلىرى بولىدۇ. سىرتقى تېرە ھۈجەيرىسى
 چاسىراق، سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك كېلىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 5g ئىلىپ، % 50 لىك بىتلل ئىسپىرتىن 20ml قوشۇپ، چالغىتىپ، 1 سائەت
 تۈرگۈزۈپ سۈزۈلىدۇ. سۈزۈلگەن ئېرىتمىدىن 1ml ئىلىپ، تۆمۈر خلورىد سىناق ئېرىتمىسىدىن 1 تامىچە
 تېمىتقاندا، ئېرىتمە كۈل رەڭ ئېشىل رەڭكە ئۆزگۈرىدۇ. سۈزۈلگەن ئېرىتمىدىن يەنە 1ml ئىلىپ، ناتىرى
 خلور كلاتن سىناق ئېرىتمىسىدىن 4~3 تامىچە تېمىتقاندا، ئاق رەڭلىك چۆكمە ھاسىل بولىدۇ.

(3) بۇ دورىدىن 5g ئىلىپ، خلوروفورم-بىتلل ئىسپىرت (1:10) ئارىلاشما ئېرىتمىسىدىن 50ml
 قوشۇپ، ئۇنىڭغا يەنە 5ml ئامېياك سۈيى قوشۇپ، 15 منۇت چالغىتىپ، 1 سائەت تۈرگۈغاندىن كېيىن
 سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمە پارلاندۇرۇلىدۇ. قېقاڭلار قالدۇقىغا 5ml مېتلل ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ،
 سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمە پارلاندۇرۇلىدۇ. قېقاڭلار قالدۇقىغا 2ml مېتلل ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ،
 سىناق ئېرىتمە قىلىنىدۇ. بىرۇتسىن سېلىشتۇرما دورىسى ۋە سىرىخىنىن سېلىشتۇرما دورىسىدىن ئىلىپ،
 ئۇنىڭغا مېتلل ئىسپىرت قوشۇپ، هەر 1ml دا 2mg دورا تۇتقان ئارىلاشما ئېرىتمە تەبىارلاپ، سېلىشتۇرۇلە...
 دىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇرسۇلى (قوشۇمچە B VI) بويىچە سىناق ئېرىتمە
 ۋە سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 10μl 10 ئىلىپ سلىتىسى يېلىمى G لق نېپىز تاختا

ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، مېتىل بېنزول-ئاتسېتون-ئېتىل ئىسىپرت-قويوق ئاممىيەك سىنالىق ئېرىتمىسى (0.4: 0.6: 5: 4)نى بېسىلدۈرگۈچى قىلىپ بېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، بىسمۇت كالىي يودىد سىنالىق ئېرىتمىسى پۇركۈلىدۇ. سىنالىق دورىنىڭ رەڭ سېپكىتىدا سېلىشتۈرۈلىدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپكىتىدىكى مۇناسىپ ئورۇنىدا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تكشۈرۈش】 بۇ دورا سۇفۇپ ياسالىملىرىنى تەبىارلاشتىكى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىملىرىگە (قو-شۇمچە I B) ئۇيغۇن كېلىشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 يەرلىك ئورۇنىدىكى غەيرىي تەبىئىي سەپرا ۋە چىرىگەن قانلارنى تازىبلايدۇ. بەدەننى قورۇپ چىكتىدۇ. قىچىشىنى بېسىپ، ئاغرۇق توختىتىدۇ. قىچىشقاق، قان توختىماسلىق، يۇتقۇنچاق، بوغۇز ئىشىش قىزىرىش، بۇرنى پۇتۇش، پوتلىسى ئېقىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتتە-لىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 سىرتتنن ئىشلىتىلىدۇ: بۇ دورىدىن 10g ئېلىپ 1000ml سۇدا 10 مىنۇت قايىتىپ، كۈنده 2 قېتىم كېسەللەنگەن ئورۇنى ئاۋوال ھوردىتىپ يۈپۈلدى. غار-غار قىلىش: يۇقرىق قايىتىلغان دورىنى سوۋوٽۇپ، كۈنده 5~3 قېتىم غار-غار قىلىنىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بولقى 100g.

【ساقلالاش】 ئېغىزى هىم ساقلىنىدۇ.

چای دورىسى

散寒药茶

San han Yao cha

[رېتىپ]

105g	پىلىپ	105g	خولىنجان
105g	قەلمەپۇر	105g	مىخ دارچىن
105g	لاچىندانە	105g	قاقيله
70 g	ئارىپىبەدەيىان	70 g	دارچىن
70 g	كەرمەپەشە ئۇرۇقى	70 g	رۇم بەدىييان
70 g	گاردنىبىيا	17 g	سۇمبۇل رۇمى

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرقى 12 خىل دورىنى يېرىك سوقۇپ تالقان قىلىپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزگەندىن كېپىن تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ مىكروپىسىز لاندۇرۇلدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ قوڭۇر رەڭلىك تالقان دورا بولۇپ، خۇش پۇراقلق، تەمى ئاچچىق كېلىدۇ.

【پەرقلەندۇرۇش】 (1) بۇ دورىدىن 5g غا 20ml ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، بىر كېچە چىلغاندىن كېپىن سۈزۈلدى. سۈزۈلگەن ئېرىتمىدىن 1ml 1% ئېلىپ، 1% لىك تۆمۈر (III) خلورىد ئېرىتمىسىدىن 2~1 تامچە تېمىتقاندا، ئېرىتمە سۆسۈن دەگە كىرىدۇ. سۈزۈلگەن ئېرىتمىدىن يەنە 1ml 1% ئېلىپ، ئازاراق ماڭنىي تالقىنى ۋە تۇز كىسلاطاسىدىن 1ml قوشقاندا، ئېرىتمە قىزىل دەگە كىرىدۇ.

(2) مەزكۇر دورىدىن 0.5g ئېلىپ، ئېفرىدىن 5ml قوشۇپ، 10 مىنۇت چالغىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىسىنى سۇ ۋاننسىدا پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقىغا 5% لىك ۋانلىن سۇلغات ئېرىتمىسىدىن 2 تامچە تېمىتقاندا، ئېرىتمە قىنىق قىزغۇچ سۆسۈن دەگە كىرىدۇ.

(3) بۇ دورىدىن 5g 0.1% ئېفر قوشۇپ، 30 مىنۇت چالغىتىپ سۈزگەندىن كېپىن، سۈزۈلگەن ئېرىتمىسىنى پارلاندۇرۇپ، قالدوقىغا 1ml ئېفر قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئۆچگىنول سېلىشتۇرۇلدىغان ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئېفر قوشۇپ، ھەر 1ml تەركىبىدە 16 μg دورا تۇقان ئېرىتمە تەبىيارلاپ، سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېيىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VII B) تەجربىسى بويىچە سىناق ئېرىتمە ۋە سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1m 2 شۇمۇرۇپ ئېلىپ، سىلىتسىي بېلىمى G لق نېيىز تاختا ئۇستىدىكى ئاييرىم-ئاييرىم نۇقىغا تېمىتىلىدۇ. نېفت ئېرىرى (C 90~60)-ئېتىل تائىپات (3:17) نى يېسىلدەرۇغۇچى قىلىپ يېسىلدەرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، 5% لىك ۋانلىلىق سۇلغات كىسلاتا ئېرىتمىسى پۇرکۈپ، C 105 تا 10 مىنۇت قافلىنىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەرىدا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا

【تەسلىتىش ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 سوغۇقتىن بولغان مىزاجنى تەڭشەيدۇ. ئاشقازاننى قۇۋۇمدە-
لمىدۇ. ھەزمىنى ياخشىلايدۇ. نېرۋىنى ياشارتىدۇ. ھۆل سوغۇقتىن بولغان ھەزم ناچارلىق، بوغۇم ئاغرىش،
بەل-پۇت ئاغرىش، باش ئاغرىش، نېرۋىسى چارچىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈننە 5~3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 5g ئىچىلدى. چاي بىلەن
ئارىلاشتۇرۇپ، قابىناق سۇدا دەملەپ ياكى پىس ئوتتا سەل قابىنستىپ، ئۇدا 30 كۈن ئىچىلدى.
【دېققەت قىلىدىغان ئىشلار】 ياشانغانلار، باللار ۋە تېنى ئاچىزلار مىقدارىنى ئازايتىپ ئىچىشى
لازم.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بولىقى 100g
【ساقلاش】 ئېغىزىنى ھىم ئېتىپ، سالقىن، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ.

قۇرسى بايادەيدۇس

舒肢巴亚待都司片

Shu zhi Ba ya dai du si Pian

[رېتىسىپ]

20g	غارىقۇن	20g	سەبرى
20g	دارچىن	20g	زەپەر
20g	ئېڭىر	20g	كۈندۈر
12g	پىلىپل	12g	پەرفېيون
12g	ئاقمۇج	12g	قارىمۇج
6 g	كالىزىرە	6 g	سۇمبۇل چىنى
12g	ئىزىخىر	12g	جىنتىياناچىنى
12g	ئۇد بىلسان	24g	قۇستە تەلىخ
12g	ئاسارۇن چىنى	24g	سېرىق تۇت
20g	بىلسان مېبى	24g	سۇمبۇل تىب
40g	سوقۇمنىبا	12g	بىلسان ئۇردۇقى
		24g	كامازىرىيۇس

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرقى 23 خىل دورىدىن بىلسان مېبىدىن باشقا، سەبرى قاتارلىق قالغان 22 خىل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ تالقان قىلىپ، ئەلكەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، ئۇنىڭغا بىلسان مېبى ۋە ئادىدىي شېكەر قىيامى كراخمالدىن مۇۋاپىق مقداردا قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانىچە قىلىپ قۇرۇتۇپ، 1000 قۇرسى بېسىپ چىقىرىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا كۈل رەڭ سارغۇچ رەڭلىك قۇرسى بولۇپ، خۇش پۇراقلقى، تەمى قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 5 قۇرسىنى يۇمىشاق سوقۇپ، 5ml سۇسز ئېتىل ئىسىپرت قوشۇپ، بىر ئاز چالغىقاندىن كېپىن تىنچ تۇرغۇزۇپ، ئۇستىدىكى سۈزۈك ئېرىتمىدىن 1ml ئېلىپ، ئۇنىڭغا 2 تامىچە سولفات كىسلاطا تېمىقاندا ئېرىتمە ئاۋۇال قىزىل رەڭگە، ئاندىن تەدرىجىي قىزغۇچ قوڭۇر رەڭگە، ئاخىردا بېغىرەڭگە كىرىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 30 قۇرسىنى يۇمىشاق سوقۇپ، 15ml سۇسز ئېتىل ئىسىپرت قوشۇپ، ئۈلترا ئاۋاز دولقۇندا 30 مىنۇت بىر تەرەپ قىلغاندىن كېپىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمە سىناق ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن پېپىرىن سېلىشتۇرما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا سۇسز ئېتىل ئىسىپرت قوشۇپ، ھەر 1ml 1تەركىبىدە 4mg دورا تۇتقان ئېرىتمە تەيارلاپ، سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلەك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) بويىچە سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمىدىن 1ml²، سىناق ئېرىتمىدىن

10m شۇمۇر تۇپ ئېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سىلىتىسى يېلىمى G لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، بىنزوول-تېتىل ئاتسېتات-ئاتسېتون (1:2:7) نى يېتىلدۈرگۈچى قىلىپ يېتىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇق تۇپ، 10% لىك تېتىل ئىپپەر تىلق سۇلغات كىسلاطا ئېرىتمىسى پۇركۈپ، داغ نۇقتىلىرى ئېنىق كۆرۈنگەنگە قەدەر ئىسىق شامال بېرىلىدۇ. سىناق ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا سېلىشتۈرۈلىدىغان ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاشلا سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ. 【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تەبىيەرلاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلىك تۆلچەملەرگە (قوشۇمچە ID) ئۇيغۇن كېلىشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 جىگەرنى قۇۋۇتىلەيدۇ. كۆڭۈلنى شادلاندۇرۇنى، سوغۇق يەل تارقىتىدۇ. مۇچىلەر ئۇيۇشۇش، لەقۋا ۋە مۇچىلەر ئاغرىشقا ئىشلىلىدۇ. 【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈندە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 7 قۇرستان تاماقتنى كېيىن ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرسىنىڭ ئېغىرلىقى 0.5g.
【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم تېتىلىدۇ.

قۇرسى سۆئلەپ

温肾苏拉甫片

Wen shen Su la fu Pian

【رېتىپپ】

200g	جوپۇز	200g	سۆئلەپ مىسرى
100g	پارپا	200g	خولنجان
100g	دارچىن	100g	بەسباسە
10 g	زەپەر	100g	خەشىخاش پوستى

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرقى 8 خىل دورىدىن زەپەر وە سۆئلەپ مىسرى يۇمىشاق سوقۇپ تالقانلىنىدۇ. جوپۇز قاتارلىق قالغان 6 خىل دورىغا سۇ قوشۇپ، ھەر قېتىمدا 1 سائەتنىن جەھىئى 3 قېتىم قايىتىپ، قايىتىلغان تېرىتىمىلەرنى قوشۇپ، سۈزۈپ، قويۇلدۇرۇپ قويۇق مەلھەم تەبىيارلىنىدۇ. ئاندىن ئۇنىڭغا يۇقىرقى تالقاننى قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانىچە قىلىپ قۇرۇتۇپ، 1000 قۇرسى قىلىپ بېسىپ، سىرتىغا شېكىر ياللىلىدۇ.

【شەكلى وە خۇسۇسىيىتى】 بۇ شېكىر ياللىلغان قۇرسى بولۇپ، ئىچى قوڭۇر رەڭلىك، خۇش پۇراقلقى، تەممى سەل قېرىق.

【پەرقەندەرۈش】 بۇ دورىدىن 10 قۇرسى ئېلىپ، ياللىلغان شېكەرنى چىقىرىۋېتىپ، يۇمىشاق سوقۇپ، 50ml 5تىل تىسپىرت قوشۇپ، ئايلانما ئېقىمدا بىر سائەت قىزىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىمە قۇرۇي دېگۈچە قويۇلدۇرۇلدۇ. ئاندىن 10ml سۇ قويۇپ تېرىتىپ، سۇبۇقولقۇ ئايىش ۋارونكىسىغا قويۇپ، 10ml ئېفرى بىلەن چەككىلىپ، ئېفرىنى ئايرىۋېلىپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقىغا 1ml ئېفر قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق تېرىتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن مورفن ھىدرۆخلۇرىد سېلىشتۇرۇما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا مېتىل تىسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml تەركىبىدە 1mg دورا تۇقان تېرىتىمە تەبىيارلاپ، سېلىشتۇرۇلدىغان تېرىتىمە قىلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلىك رەڭ سېپكىتىر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VIB) بويىچە سىناق تېرىتىمە وە سېلىشتۇرۇلدىغان تېرىتىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1mg شۇمۇرۇتۇپ ئېلىپ، نېبىز قەۋەتلىك سىلىتىسى يېلىمى سېلىشتۇرۇلدىغان ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقىغا تېمىتىپ، مېتىل ئاستىلات-تەرىتىتىت-ئاممىيەك GF₂₅₄ لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقىغا تېمىتىپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنەپىشە نۇرلۇق چىragى سۈپى (1:5) ئى بىيىلدۇرغۇچى قىلىپ بىيىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئۇلترا بىنەپىشە نۇرلۇق چىragى (254nm) تا كۆزەتكەنде، سىناق تېرىتىنىڭ رەڭ سېپكىتىرىدا سېلىشتۇرۇلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپكىتىرىدە- كى مۇناسىپ ئورۇندا ئۇخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تەبىارلاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلەك ٹۆلچەملەركە (قوشۇمچە I D) تۇغىغۇن كېلىش لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 بۆرەكتى قىزىتىپ، ھۆللۈكنى ھەمىدەيدۇ، مەننىي بالدۇر كېتىش، تېھتىلام بولۇش، سىيگەكلىك قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش تۈسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈندە 1 قېتىم، ھەر قېتىمدا 2~1 قۇرسى ئىچىلىدۇ.

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ساقلىنىدۇ.

قۇرسى ئايارەج

温胃阿亚然及片

Wen wei A ya ran ji Pian

【رېتسېپ】

40g	سېرىق ٹوت	200g	سەبرى
50g	مۇقەل	57 g	ئاچقىقتاۋۇز
		97 g	تۈرۈت

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرقى 5 خىل دورىدىن مۇقەلدىن باشقا سەبرى قاتارلىق قالغان 4 خىل دوا يۇمىشاق سوقۇپ تالقانلىنىدۇ. مۇقەلگە سۇ قوشۇپ، ھەر قېتىمدا 1 سائەتنىن 3 قېتىم قايىتلىلىدۇ. ئاندىن قايىتلىغان تېرىتىملىرنى قوشۇپ سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىمنى قوبۇلدۇرۇپ، مەلھەم قىلىپ، يۇقىرقىقى تالقان، ئادىسى شېكەر قىيامى ۋە كراخمالدىن مۇۋاپىق مىقداردا قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، دانىچە قىلىپ 1000 قۇرسى بېسىپ چىقىرىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دوا سۇس قوڭۇر رەڭلىك قۇرسى بولۇپ، خۇش پۇرالىق، تەمى قېرىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 5 قۇرسىنى يۇمىشاق سوقۇپ، 10ml مېتىل تىسېرىت قوشۇپ، سۇ ۋاننسىدا قايىنەغىچە قىزىتىپ، ئاندىن بىر نەھچە منۇت چالقىقاندىن كېيىن سۈزۈلىدۇ. ئاندىن سۈزۈلگەن تېرىتىمدىن 1ml ئېلىپ، يېڭىدىن تەيارلانغان بىرمۇ سۈيدىن 1ml قوشقاندا، تېرىتىمde سېرىق رەڭلىك چۆكمە هاسىل بولىدۇ. سۈزۈلگەن تېرىتىمدىن يەنە 1ml ئېلىپ، ئۇنىڭغا 1ml نىترات كىسلاتا قوشقاندا، تېرىتىم قىزغۇچۇ قوڭۇر رەڭگە كەرىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 1 قۇرسىنى يۇمىشاق سوقۇپ، 10ml ئېتىل تىسېرىت قوشۇپ، ئايلانمما ئېقىمدا 30 منۇت قىزىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىمدىن 3ml 3 ئېلىپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقىغا 1ml سىركە كىسلاتا ئانھىدرىدى قوشۇپ تېرىتىپ، بىر تامىچە سۇلغات كىسلاتا تېمىقاندا، تېرىتىم قىزغۇچ بىنەپشە رەڭگە كەرىدۇ ھەمde تېرىتىمنىڭ ئۇستۇنىكى قەۋىتى تەدرجىي بېشىل رەڭگە ئۆزگەردى.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تەيارلاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلىك ئۇلچەملەرگە (قوشۇمچە I D) ئۇبىغۇن كېلىشى لازمى.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئاشقازاندىكى غىيرىي تەبىئىي سەۋدانى تازىلايدۇ، ئىشىشىقىنى يوقىتىدۇ، ئىشتىهانى ئاچىدۇ. ئاشقازان كۆپ كۆپ ئاغرىش، ئىشتىهاسى تۇتۇلۇش قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنده 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 5~3 قۇرسى ئىچىلىدۇ.

【ئولچىمى】 ھەر بىر قۇرسى 0.5g

【ساقلالاش】 بېغزى ھەم ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0193-98

قۇرسى جاۋارش جالىنۇس

温散加瓦日西加里奴司片

Wen san Jia wa ri xi jia li nu si Pian

رېتسېپ		سۇمبۇل تىپ	
18g	قاقلە	18g	دارچىن
18g	خولنباڭان	18g	قەلهەمپۇر
18g	سوئىدى	18g	پىلىپل
18g	قارىمۇچ	20g	زەنجىشۇل
18g	قۇستە تەلىخ	18g	ئاسارۇن چىنى
18g	داڭگۇيى	18g	زەپەر
88g	مهستىكى رۇمى	18g	ھەبۈلەتىس
18g	ئۇد بىلسان	18g	

«یاساش ئۇسۇلى» يۇقىرقى 16 خىل دورنىيى يۇمىشاق سوقۇپ، ئُلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، مۇۋاپىق مىقداردا ئاددىي شېكىر قىيامى ۋە كراخمال قوشۇپ، دانىچە قىلىپ قۇرۇقتۇپ، 1000 قۇرسى بېسىپ چىقىرىلىدۇ.

«شەكلى وە خۇسۇسىتى» بۇ سارغۇچ كۈل دەڭ قۇرسى دورا بولۇپ، خۇش پۇراقلقى، تەمى سەل قىرىق كېلىدۇ.

پەرقەلەندۇرۇش (1) بۇ دورىدىن 30 قۇرسىنى يۇمىشاق سوقۇپ، 15ml ئېققۇچقۇپ، ئۇلترا ئاۋازلىق دولقۇندا 30 مىنۇت بىر تەھەپ قىلغاندىن كېيىن، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇقۇپ، قالدۇقلەرىغا 2ml ئېققۇچقۇپ ئېرىتىپ، سىناق ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. دارچىن سېلىشتۈرما دورىسىدىن 2g ئېلىپ، يۇقىرىدىكى ئوخشاش ئۆسۈل بويىچە سېلىشتۈرۈلدىغان دورىلىق ئېرىتىمە تەبىيارلىنى دۇر. نېبىز قەۋەتلىك رەڭ سېپكىتىر ئۆسۈلى (قوشۇمچە B VI) بويىچە يۇقىرىقى 2 خىل ئېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىسىدىن 1ml ئېلىپ، نېبىز قەۋەتلىك سىلىتسىي بىلىمى G لىق تاختا ئۆستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، نېفت ئېفرى ($90\sim60^{\circ}\text{C}$)-تېتىل ئاتىپتات (9:1) نى يېيىلدۇرۇغۇچى قىلىپ يېيىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇقۇپ، 5% لىك ۋانىللىنىق سوْلەفات كىسلاطا ئېرىتىمىسى پۇركۈپ، داغ نۇقتىلىرى ئېنىق كورۇنگەنگە قەدەر ئىسىق شامال بېرىلىدۇ. سىناق ئېرىتىمىنىڭ رەڭ سېپكىتىدا، سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ دەڭ سېپكىتىرىدىكى مۇناسىب ئورۇندا ئوخشاش دەڭلىك داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 5 قۇرۇنى يۈمىشاق سوقۇپ، 20ml ئېتىل ئاتىسىتات قوشۇپ، سوغۇق سۇغا سائەت چىلىغاندىن كېيىن، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇقۇپ، قالدۇقىغا 2ml ئېتىل ئاتىسىتات قوشۇپ ئېرىتىمە سىناق ئېرىتىنىدۇ. ئالىزىلما ئەمپۇر سىلىشىتۇرما دورىسىدىن 5g 0.5 ئىلىپ،

يۇقىرىدىكى ئوخشىش ئۇسۇل بويىچە سېلىشتۈرۈلدىغان دورىلىق تېرىتىمە تەبىارلىنىدۇ. نېيىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) بويىچە يۇقىرىقى 2 خىل تېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1m 10μم ئىلىپ، نېيىز قەۋەتلىك سىلىتسىي بىلىمى G لق نېيىز تاختا ئۇستىدىكى ئايرىم-ئايرىم نۇقتىغا تېمىتىپ مېتىل بېنزاول-ئېتىل ئاتسېتات-فورميك كىسلاطا (1:8)نى بېسىلدۈرگۈچى قىلىپ بېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇقۇپ، 5% لىك ۋانلىلىق سۇلغات كىسلاتا تېرىتىمىسى پۇركۈپ، داغ نۇقتىلىرى ئىنىق كۆرۈنگەنگە قەدەر ئىسىق شامال بېرىلىدۇ. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىدا، سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندادا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى كۆرۈنىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تەبىارلاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىم-لمىركە ئۇيغۇن كېلىشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ھەر قايىسى ئەزادىنى ئىللەتىدۇ، يەلنى ھەيدەپ، ئاغرىق توختىتىدۇ، ھۆل سوغۇق مىزاجدىن بولغان ئاشقازان-ئۇچەي ئاغرىقى، جىگەر ۋە بېقىن ئاغرىش، بوغۇم ئاغرىش، باش ئاغرىش، سۈيدۈك كۆپىيىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈنده 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 7~5 قۇرسى ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرسىنىڭ ئېغىرلىقى 0.5g.

【ساقلالاش】 ئېغىزى ھىم ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0194-98

ھہ بی پولونیا

普鲁尼亚丸

Pu lu ni ya Wan

رہنمی

23 g	پلپل	23 g	ئاڭمۇچ
1.25 g	زەپەر	23 g	مىڭدىۋانە ئۇرۇقى
3.75 g	كەرمەپەشە ئۇرۇقى	3.75g	سومبۇل چىنى
12.25g	سازەچ ھىندى	1.25g	دارچىن
1.25 g	ئاڭر قەرەھا	1.25g	ھەبىي بىلسان
10 g	خەشخاش پۇستى مەلھىمى	1.25g	پەرفېيون

«یاساش ئۆسۈل» يۇقىرىقى 12 خىل دورىدىن خەشىخاش پۇستى مەلھىمدىن باشقا، قارىمۇچ قاتارلىق قالغان 11 خىل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ، نەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، مۇۋاپىق مىقداردا چەككىلەنگەن ھەمسەل قوشقاندىن كېيىن، ئۇۋەتلەغان خەشىخاش پۇستى مەلھىمى وە مۇۋاپىق مىقداردا سەق قوشۇپ، ھېب ياساب قۇرقۇلدى.

«شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» بۇ دورا قارا رەڭلىك ھەمسەللىك ھېب بولۇپ، خۇش پۇراغىلق، تەممى سەل قېرىق كېلىدۇ.

پەرقلەندۈرۈش بۇ دورىدىن 20 دانە ئېلىپ، يۈمىشاق ئېزىپ، 10ml سۈسۈز ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ئۇلۇترا ئاۋاردا 30 مىنۇت بىر تەرىپ قىلغاندىن كېيىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمە سىناق ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن پىپىرىن سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا سۈسۈز ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml تەركىبىدە 4mg دورا تۇتقان ئېرىتمە ياساپ، سېلىشتۈرۈلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۆسۈلى (قوشۇمچە B VII) بوبىچە، يۈقرىقى 2 خل ئېرىتمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml 2 ئېلىپ، نېپىز قەۋەتلىك سىلىتسىي يېلىمى G لق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، بېنزوول-ئېتىل ئاتىپاتا-ئاتىپتون (1:2:7:7) نى بېيلدۈرۈچى قىلىپ بېيلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇنۇپ، ئۇلۇtra بىنھېپە نۇرلۇق چىrag (365nm) ئاستىدا كۆزتىلىدۇ. سىناق ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېپىكتىدا، سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاش رەڭلىك ياللىراق نۇر دېغى پەيدا بولىدۇ. ئاندىن 10 لىك سۇلۇقات كىسلاتالىق ئېتىل ئىسپىرت ئېرىتمىسى پۇرکۈپ، داغ نۇقتىلىرى ئېنىق كۆرۈنگەنگە قەدەر ئىسىق شامال بېرىلىدۇ. سىناق ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېپىكتىدا سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاشلا سارغۇچ قوڭۇر داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا ھېب ياسالىلىرىنى تەبىارلاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلەك بەلكىلىملىئەركە (قوشۇمچە IA) تۈيگۈن كېلىشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 مېڭىنى قۇۋۇقتىلەيدۇ. يەلىنى تارقىتىدۇ، تۇنۇتقاقلقى، مەنىي بالدار كېتىش، مەنىي يېقىپ كېتىش ۋە ئایاللاردىكى ھەيز قالايمىقانلىشىقا ئىشلىتىلەيدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈندە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 7 ~ 5 ھېب ئىچىلەيدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر ھەبنىڭ ئېغىرلىقى 0.1g .

【ساقلاش】 ئېغىزى ھىم ساقلىنىدۇ.

دېققەت قىلىدىغان ئىشلار: خەشخاش پوستى مەلھەمنىڭ تەبىارلىنىشى: 1000g 1000g خەشخاش پوستى ئۆرۈقى بىلەن)غا سۇ قوشۇپ، 1-قېتىمدا 1.5 سائەت، 2-قېتىمدا 1 سائەت، 3-قېتىمدا يېرمى سائەت، جەمئىي 3 قېتىم قايىتىپ، قايىتىلغان ئېرىتىملىئەرنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىملى قويۇلدۇ- رۇپ، 300g لق مەلھەم تەبىارلىنىپ قۇرۇتۇلىدۇ.

WS₃-BW-0195-98

زُوپا جهڙهري

寒喘祖帕颗粒

Han chuan Zu pa Ke li

رِسْتِیں

125g	کهرباپشہ ٹوروقی	125g	ئارپیبەدیان
75 g	قىزىلگۈل	75 g	زۇپا
70 g	چاققاقۇت	75 g	سوپا
75 g	ھۆلبە	75 g	پرسىيائوشان
		70 g	چۈچۈكبۈيا يىلتىز قىيامى

【یاساش ئۆسۈل】 يۇقىرقى 9 خىل دورىدىن چۈچۈكبۇيا يىلتىز قىيامىنى ئۇۋاتقاندىن سىرت، تارپىبەدیان فاتارلىق قالغان 8 خىل دورىغا سۇ قوشۇپ 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا بىر يېرىم سائەت قاينىتىپ، قاينىتىلغان ئېرىتمىلەرنى بىرلەشتۈرۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىنى نىسپى زىچلىقى (C₆₀) 1.32 ~ 1.35 دىكىستەن قوشۇپ، دانىچە قىلىپ، قۇرۇقتۇپ، 1000g قىلىپ ياسىلىدۇ.

«شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» بۇ دورا سۇس قوڭۇر رەڭلىك دانىچە بولۇپ، تەمى تاتلىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 5g گا 10ml یېفىر قوشۇپ، چالقىتىپ، 4 سائەت تۇرغۇزغاندىن كېپىن، يېفىرنى ئايروثىلىپ، پارلاندۇرۇپ، قۇرۇتۇپ، قالدۇقىغا 5% لىك ۋانىلىلىنىق سۇلقات كىسلاطا نېرىتىمىسىدىن بىر نامچە تېمىستقاندا، ئېرىتىمە قىزغۇچى بىنەپىشە دەڭگە كىرىدۇ.

بۇ دورىدىن 15g نى 50ml سۇدا ئېرىتىپ، سۈيىقلىق ئايىش ۋارونكىسىغا قۇبۇپ، ئېتىل ئاتىپتات قوشۇپ، هەر قېتىمدا 20ml دىن 3 قېتىم چەككىلەپ، ئېتىل ئاتىپتاتنى بىرلەشتۈرۈپ، ئۇنى ھەر قېتىم 20ml دىن 2 قېتىم سۇدا چايقاب، سۇ قەۋىتىنى چىقىرۇپتىپ، ئېتىل ئاتىپتات ئېرىتىمىسىنى پارلاندۇرغاندىن كېيىن 1ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن سېلىشتۈرۈلدىغان دورا چۈچۈككوبۇيدىن 5g 0.5ml ئېلىپ، 5ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، چالغىقاندىن كېيىن 4 سائەت تۈرگۈزۈپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىنى پارلاندۇرۇپ، قالدوقلېرىنى 1ml مېتىل ئىسپىرتتا ئېرىتىپ، سېلىشتۈرۈلدىغان دورىلىق ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. نېيز قەھەتلىك رەڭ سېپتەر ئۆسۈلى بويىچە (قوشۇمچە B VI) سىناق ئېرىتىمىدىن 1mL، سېلىشتۈرۈلدىغان دورىلىق ئېرىتىمىدىن 1mL ئېلىپ، نېيز قەھەتلىك سلىتىسى يېلىمى لىق تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، ئېتىل ئاتىپتات-فورمىك كىسلارات-قاتقى سىركە

كسلا-تسو (2:15) نى يېيىلدۇرۇچى قىلىپ يېيىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، 10 لىك سۇلغات كىسلا-تالق ئېتىل ئىسپىرت ئېرىتىمىسى پۇركۈپ، ئاندىن داغ نۇقتىلىرى ئېنىق كۆرۈنگەنگە قەدەر ئىسىق شامال بېرىلىدۇ. سىناق ئېرىتىمىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۈرۈلىدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇنزا-سىپ ئورۇندادا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ.

ئۇلۇترا بىنەپىشە نۇر چىرىغى (365nm) ئاستىدا كۆزەتكەندە، سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۈرۈلۈچى دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندادا ئوخشاش رەڭلىك يالتساق ئۇرۇلۇق داغ نۇققىسى كۆرۈنىدۇ.

گه (قوشومچه C I) ئۇيغۇن كېلىشى لازم.

«تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» يۈتەل تۇختىسىدۇ، بەلغەمنى يىۇمىشىتىدۇ، تۈپكىنى ئىللە تىپ، زەقىنى باسىدۇ. ئۆتكۈر زۇكام، سوغۇقتىن بولغان نەزەلە كەلتۈرۈپ چىقارغان يۈتەل ۋە غەيرىي تەبىئى بەلەمدەن بولغان زەقىقىغا ئىشلىتىلىدۇ.

ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈنده 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 12g ئىچىلىدۇ.

• 12g بولقى بىر هەر چىمىلۇقى 】

«ساقلاش» بېغىزى هىم ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0196—98

مەجۇنى ماددە تۇلھايات

强力玛得土力阿亚特蜜膏

Qiang li Ma de tu li A ya te Mi gao

【رېتىپپ】

30g	قارمۇچ	30g	زەنجىۋىل
30g	دارچىن	30g	پىلىپ
30g	بەللىه	30g	ئامىلە
30g	يۈمىلاق زىراۋەندە	30g	شاتىرەنچى
30g	نارجل	30g	سۆئىلەپ
30g	بابۇنە	30g	چىلغۇزا مېغىزى
90g	قىزىل ئۆزۈم ئۇسارتىسى	15g	بابۇنە ئۇرۇقى

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرقى 14 خىل دورىدىن قىزىل ئۆزۈم ئۇسارتىسىنى باشقان، زەنجىۋىل قاتارلىق قالغان 13 خىل دورىنى يۈمىشاق سوقۇپ، ئەلكەكتىن ئۇتكۈزۈپ تەبىارلىنىدۇ. مۇۋاپىق مىقداردىكى چەككىلەنگەن ھەسەلگە قىزىل ئۆزۈم ئۇسارتىسى ۋە 0.15% لىك بېنزوئىك كىسلاطا قوشۇپ ئارىلاشتۇرۇپ، سوۋۇغاندىن كېيىن يۇقىرقى تالقانلanguan دورا بىلەن تەكسى ئارىلاشتۇرۇپ، 1000g لق مەجۇن ياسىلىدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ قوڭۇر رەڭلىك مەجۇن دورا بولۇپ، ئالاھىدە يېرىقى بار، تەمى تاتلىق، قېرقى، سەل ئاچچىق كېلىدۇ.

【پەرقەمندۇرۇش】 بۇ دورىدىن 10g غا مۇۋاپىق مىقداردا كىرىمنىيلىق يۈسۈن توپسى قوشۇپ، سوقۇپ تالقانلاب، 30ml سۇسۇز ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ئۇلترا ئاۋاردا 30 منۇت بىر تەرمەپ قىلىپ، سۇزۇپ، سۇزۇلەن ئېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقىغا 2ml سۇسۇز ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق ئېرىتمە قىلىنىدۇ. ئاندىن پېپىرىن سېلىشتۇرما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا سۇسۇز ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، 1ml تەركىبىدە 4mg دورا تۇتقان ئېرىتمە تەبىارلاب، سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمە قىلىنىدۇ. نېيىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە VI) بويىچە سىناق ئېرىتمىدىن 1ml، سېلىشتۇرۇلدىغان ئېرىتمىدىن 1ml شۇمۇرۇپ ئېلىپ، سلىتىسىي يېلىمى G لق نېيىز تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، بېنزوپ-ئېتىل ئاتىپ-ئاتىپتۇن (7:2:1)نى بېبىلدۇرغۇچى قىلىپ، بېبىلدۇرۇپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، 10% لىك سۇلغات كىسلاتالىق ئېتىل ئىسپىرت ئېرىتمىسى پۇرکۈپ، داغ نۇقتىلىرى ئېنىق كۆرۈنگەنگە قەدەر ئىسىق شامال بېرىلىدۇ. سىناق ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېپىكتەدا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەدىكى مۇناسىپ ئۇرۇندا ئۇخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا مەجۇن ياسالىلىرىنى تەبىارلاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلىك

بەلگىلىملىك كەزكىرەتكەن ئۆزۈمىنىڭ ئۇيغۇن كېلىشى لازىم. «تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى» بەدەننى كۈچلەندۈرۈدۇ، ئاغرىق توختىسىدۇ. بۆرەك ۋە مېكىنى قۇقۇقەتلەيدۇ. يارتا پالىچ، بوغۇم-ئۇستىخان ئاغرىش، دۆتلۈك، تىلى ئېغىرىشىش، بېلى تېلىپ ئاغرىش، ئەرلىك جىنسى ئاجزىلۇق، چىشى بوشىپ قېلىش قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

«ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈندە بىر قېتىم، هەر قېتىمدا 10g ~ 5 ئىچىلىدۇ. «ئۆلچىمى】 هەر بىر بوتۇللىكىغا 400g قاچىلىنىدۇ.

«ساڭلاش】 ئېغىزىنى ھىم ئېتىپ، سالقىن، قۇرغاق ئورۇندا ساقلىنىدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلار: قىزىل ئۆزۈم ئۇسارىسىنىڭ تەيىارلىنىشى: قىزىل قۇرۇق ئۆزۈمدىن 1000g ئېلىپ، سۇ قۇيۇپ 2 قېتىم، هەر قېتىمدا بىر سائەتتن قايىنىتىپ، قايىنىتىلغان ئېرىتىملىرنى ئارىلاشتۇرۇپ، سۈرۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىنى نىسپىي زىچلىقى 1.20 بولغۇچە قويىلدۈرۈپ، سۇيۇق ئۇسارە تەيىارلىنىدۇ.

WS₃-BW-0197-98

مەجۇنى لوبوبى سەغىرى

强身夢波甫赛河里蜜膏

Qiang shen Luo bo pu Sai he li Mi gao

【رېتىسىپ】

45g	كۈنچۈت	15g	تىيەندۈڭ
15g	خولىنجان	45g	تاتلىق بادام
45g	پىستە	45g	قوغۇن تۇرۇقى
15g	قىزىل بەھەمن	15g	دارچىن
15g	تەرخەمەك تۇرۇقى	45g	چىلغۇزا
45g	خەشخاش تۇرۇقى	15g	ئاڭ بەھەمن
15g	ئەرمۇدۇن تۇرۇقى	45g	پىندىق

【ياساش تۇسۇلى】 يۇقىرىقى 14 خىل دورىدىن تىيەندۈڭ، ئاڭ بەھەمن، قىزىل بەھەمن، خولىنجان، دارچىن قاتارلىق 5 خىل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ تالقانلاپ، نەلگەكتىن تۇتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇلدى. كۈنچۈت قاتارلىق قالغان 9 خىل دورىنىڭ يېغىنى چىقىرىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ماي بىلەن يۇقىرىقى تالقاننى ئارىلاشتۇرۇپ، مۇۋاپىق مقداردا چەككىلەنگەن ھەسىل قوشۇپ، 1000g لق مەجۇن ياسىلىدۇ. 【شەكلى ۋە خۇسۇسىيىتى】 بۇ قوڭۇر دەڭلىك مەجۇن دورا بولۇپ، تەمى تاتلىق، سەل قېرىقى كېلىدۇ.

【پەرقەلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 5g غا 10ml 1بىفر قوشۇپ، 5 منۇت قوجۇغاندىن كېيىن 2 سائىت تۇرخۇزۇلدى. ئاندىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ٹېرىتىمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇقۇپ، قالدۇقغا 2ml 1بىفر قوشۇپ ٹېرىتىپ، سىناق ٹېرىتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن سىنالىبەيد سېلىشتۇرما دورىسىدىن 1بىلپ، تۇنىڭغا ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، هەر 1ml تەركىبىدە 1mg دورا تۇتقان ٹېرىتىمە تەيارلاپ، سېلىشتۇرۇلدىغان ٹېرىتىمە قىلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر تۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) بويىچە، يۇقىرىقى ئىككى خىل ٹېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml 5 1بىلپ، سلىتسىي يىلىمى G لق نېپىز تاختا تۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىلدۇ. نېفت 1بىفرى (C 90~60)-ئېتىل ئاتىپات (3:17)نى يېيىلدۈرگۈچى قىلىپ يېيىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، دىنترو فىنلىمەدرازىن ئېتىل سىناق ٹېرىتىمىسى پۇركۈلدى. سىناق ٹېرىتىمىنىڭ رەڭ سېپىكتىدا، سېلىشتۇرۇلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ تۇرۇندادا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا مەجۇن ياسالىلىرىنى تەيارلاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمە. لەرگە (مەزكۇر تۆلچەم 1-قوشۇمچە) تۇيغۇن كېلىشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 مېگە ۋە بۆرەكىنى قۇۋۇھتلەپ، مەنىنى كۆپىيتىدۇ.
جىنسىي ھەۋسى سۇسلىشىش، مەنلىي تازىبىش، مۇچىلەر ماغدۇرسىزلىنىش، بەل تېلىپ تۇغىش، تۇرۇقلاش،
نېرۋا ئاجىزلىق قاتارلىقلارغا ئىشلىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈندە 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 6g ئىچىلىدۇ.
【ئۆلچىمى】 ھەر بىر بوتۇلكىغا 100g قاچىلىنىدۇ.
【ساقلاش】 تۇغىزى ھىم ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0198-98

سُوفُوپی سہرتان کا پسولی

解毒苏甫皮塞尔塔尼胶囊

Jie du Su pu pi sai er ta ni Jiao nang

رېتىپپ【	ئەرمب بېلىمى
كەتسرا 21g	بېھى ئۇرۇقى 21g
سېمىز ئوت ئۇرۇقى 15g	خەشخاش ئۇرۇقى 21g
تەرخەمەك ئۇرۇقى 21g	ئۇسۇڭ ئۇرۇقى 21g
قاپاچ ئۇرۇقى مېغىزى 21g	لەيلكۈل ئۇرۇقى 21g
كىل ئەرمىنى 2 g	ئاڭ سەندەل 21g
پاقىيپۇرماق ئۇرۇقى 21g	تاباشر 10g
گىل مەختۇم 21g	سەرتان 15g
كالسنه ئۇرۇقى 15g	زەپەر 3 g
قىزىلگۈل 15g	

『یاساش ئۆسۈل』 يۇقىرقى 18 خىل دورىنى يۈمىشاق سوقۇپ، تالقانلاپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئاربلاشتۇرۇپ، مۇۋاپىق مىقداردا ئاددىي شېكەر قىيامى ۋە كراخمال قوشۇپ، دانچە قىلىپ قۇرۇقتۇپ، 1000 دانه كاپسۇغا قاچىلىنىدۇ.

«شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» بۇ كاپسۇللىق دورا بولۇپ، ئىچىدە قوڭۇر دەڭلىك دانىچىلار بار. تەممى ئاجىققى، سەمل تاتلىق كىلىدۇ.

【پەرقلەندۈرۈش】 بۇ دورا دانىچىسىدىن 5g ئېلىپ، ئۇنى قويۇق ئاممىيەك سىناق ئېرىتىمىسى بىلەن نەمدەپ، 20ml خلوروفورم قوشۇپ، سۇ ۋاننسىدا 1 سائىت ئايلانما ئۇقۇم بېرىپ، ئاندىن ئۆي تېمىپپەراتۇرسىغا كەلگۈچە تۇرغۇزۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمگە 5% لىك تۇز كىسلاتا ئېرىتىمىسى قوشۇپ چالغىتىپ، ھەر قىتىمدا 15ml 15 دن 3 قىتمىن چەككىلىنىدۇ. ئاندىن كىسلاتالق ئېرىتىملىرىنى بىرلەشتۈرۈپ، 20ml خلوروفورم قوشۇپ، بىر قىتىم چايقىلىنىدۇ. كىسلاتالق سۇ قەۋۇتىگە قويۇق ئاممىيەك سىناق ئېرىتىمىسى قوشۇپ، pH قىممىتى 11 غا كەلتۈرۈللىدۇ. ئاندىن يەنە 15ml خلوروفورم قوشۇپ، ھەر قىتىمدا 15ml 15 دن 3 قىتمىن چەككىلىنىدۇ. خلوروفورم ئېرىتىملىرىنى بىرلەشتۈرۈپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدوقلەرنى 0.5ml ئېتىل ئىسپىرتتا ئېرىتىپ، سىناق ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن كودبىئىن فوسفات سېلىشتۈرما دورىسىدىن ئېلىپ، ئۇنىڭغا ئېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml تەركىبىدە 2mg دورا تۇتقان ئېرىتىمە تەيارلاپ سېلىشتۈرۈلدىغان ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. نېيىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) بويىچە سىناق ئېرىتىمىدىن 1μm، سېلىشتۈرۈلدىغان ئېرىتىمىدىن 1μm ئېلىپ، 2% لىك ناتىرىسى ھىدرۆكسىد ئېرىتىمىسى ياللىغان سلىتسىيە يىلىمى G لىق نېيىز تاختا ئۇستىدىكى

ئاييرىم-ئاييرىم نۇقتىغا تېمىتىپ، مېتل بېنزوول-ئاتسېتون-ئېتل ئىسىرت-ئاممىياك سۈرى (0.05: 0.17: 1: 1) نى بېسىلدۈرگۈچى قىلىپ بېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، ئىسلاھ قىلىنغان بىسمۇت كالىي يودىد سىناق ئېرىتمىسى پۈركۈلدى. سىناق ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېپكىتىدا، سېلىشتۈرۈلىدىغان ئېرىتمىنىڭ رەڭ سېپكىتىدە. كى مۇناسىپ ئورۇندَا ئۇخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا كاپسۇل ياسالىلىرىنى تەبىارلاشتىكى هەر قايىسى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىم-

لەركە (قوشۇمچە I L) نۇيغۇن كېلىشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 بەلغىم خىلىتى ۋە سەپارانى تەڭشەيدۇ، زەھەرنى قايتۇردى، جراهەت بېغىزىنى قورۇيدۇ. غەيرىي تەبىئىي بەلغىم خىلىتى ۋە سەپارادىن بولغان سل كېسىلى، ئاشقازان، ئۇچەي كېسىلى، باليانقۇ بويىنى شەلۋەرمىش كېسىلى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلدى.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈنده 3 قېتىم، هەر قېتىمدا 10~5 كاپسۇل ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىم】 هەر بىر كاپسۇلى 0.3g

【ساقلاش】 بېغىزى ھىم ساقلىنىدۇ.

WS₃-BW-0199-98

ھے بی شپا 镇痛艾比西帕丸

Zhen tong Ai bi xi pa Wan

رېتىپپ		ئىتىكىقى تۇرۇقى	
32g	رمۇن	48g	ئىتىكىقى تۇرۇقى
16g	ئەرەب يېلىمى	16g	زەنجىۋەل
20g	خەشخاش تۇرۇقى	20g	خەشخاش پوستى

«ياساش ئۇسۇلى» يۇقىرقى 6 خىل دورىنى يۈمىشاق سوقۇپ تالقانلار، ئەلكەكتىن ئۆتكۈزۈپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، قىزىلگۈل شەربىتى قوشۇپ، كۈملاچ ياساپ، تۆۋەن تېمىپراتۇردا قۇرۇتىلىدۇ. «شەكلى ۋە خۇسۇسىتى» بۇ دورا سۇدا تەبىئىلانغان سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك ھېب بولۇپ، سەل خۇشبىۇي، تەمى قىرىق ئايچىقراق كېلىدۇ.

«پەرقلەندۈرۈش» بۇ دورىدىن 20g تۈلىپ، يۈمىشاق سوقۇپ، 40ml مېتىل ٹسپىرت قوشۇپ، قىزىتىپ، ئايلانما بىقىمدا بىر سائىت قىزىدۇرۇپ، ئىسىسىق چاغىدىلا سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇقتۇپ، قالدوقلېلىرىنى 30ml 1 لىك تۇز كىسلانى ئېرىتىمىسىدە ئېرىتىپ، تىنچ تۇرغۇرۇپ، سۈزۈلگەن ئېرىتىمگە قوييۇق نامىياك سىناق ئېرىتىمىسى قوشۇپ، pH قىممىتىنى 10 غا كەلتۈرۈپ، خلوروفورم قوشۇپ، ھەر قىتىمدا 20ml 2 دىن قېتىم چەككىلىپ، خلوروفورم ئېرىتىمىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇقتۇپ، قالدوقىغا 1ml مېتىل ٹسپىرتتا قوشۇپ ئېرىتىپ، سىناق ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن ئاتروپين سۇلغات ۋە سکوپىولا من ھيدروبروميد سېلىشتۈرۈما دورىلىرىدىن تۈلىپ، ئۇنىڭغا مېتىل ٹسپىرت قوشۇپ، ھەر 1ml تەركىبىدە 1mg دورا تۇتقان ئېرىتىمە تەيارلاب، سېلىشتۈرۈلىدىغان ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. نېبىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) بوبىچە سىناق ئېرىتىمىدىن 1ml، سېلىشتۈرۈلىدى-خان ئېرىتىمىدىن 5ml تۈلىپ، سلىتسىي يېلىمى G لىق نېبىز قەۋەتلىك تالختا ئۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقىتىغا تېمىتىپ، بېنزوول-بېتىل ئاتىپتات. دىبېتىل ئامان (1:2:7) نى يېلىلدۈرگۈچى قىلىپ يېلىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ، قۇرۇقتۇپ، سۈييۇق بىسمۇت كالىي يودىد سىناق ئېرىتىمىسى يۈرۈلۈدۇ. سىناق دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدا، سېلىشتۈرۈلىدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئۇخشاش رەڭلىك داغ نۇقىتلەرى يەيدا بولىدۇ.

(2) بُو دورىدىن 2g نى يۇمىشاق سوقۇپ، 25ml مېتىل ٗسپيرت قوشۇپ، 1 سائەت چىلاب قويۇپ، سوزۇپ، سوزۇلگەن ئېرىتمىنى پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ، قالدۇقلېلىرىنى 20ml سۇدا ئېرىتىپ، يەنە 2ml تۈز كىسلاقا قوشۇپ، سۇ ۋاننسىدا 30 منۇت قىزىدۇرغاندىن كېيىن دەرھال سوۋۇتۇپ، ئېفر قوشۇپ، چالغىتىپ، هەر قىتىمدا 20ml 2 دىن 2 قېتىم چەككىلىنىدۇ. ئېفر ئېرىتمىلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ، پارلاندۇرۇپ قۇرۇتۇپ،

قالدوقلسرىنى 1ml ئېتىل ئاتىپاتاتا ئېرىتىپ، سىناق ئېرىتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن رەۋەن سېلىشتۈرۈما دورىسىدىن 0.1g ئېلىپ، يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش ئۆسۈل بويىچە سېلىشتۈرۈلدىغان دورىلۇق ئېرىتىمە تەبىyarلىنىدۇ. نېپىز قەۋەتلىك رەڭ سېپىكتەر ئۆسۈلى (قوشۇمچە B VI) بويىچە يۇقىرىدىكى 2 خىل ئېرىتىمىنىڭ ھەر قايىسىدىن 1ml 5 ئېلىپ، سىلىتسىي يېلىمى G لق نېپىز تاختا ئۇستىدىكى ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، نېفت ئېفرى (C° 60~30)-ئېتىل فورمات-فورمات كىسلاطا (15:5:1)نى يېسىلدۈرۈغۈچى قىلىپ يېسىلدۈرۈپ، شامالدىتىپ قۇرۇنۇپ، ئۇلترا بىنەپشە نۇرلۇق چىراغ (365nm) ئاستىدا كۆزىتىلىدۇ. سىناق دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەردا، سېلىشتۈرۈلدىغان دورىنىڭ رەڭ سېپىكتەرىدىكى مۇناسىپ ئۇرۇندادا ئاپىلسىن رەڭلىك يالترىاق نۇر پەيدا بولىدۇ. ئاممىياك گازى بىلەن ئىسلاپ، كۈن نۇردا كۆزەتكەندە داغ نۇقتىلىرى قىزىل رەڭگە ئۆزگەرىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا ھەب ياسالىمىلىرىنى تەبىyarلاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىملىرگە (قوشۇمچە I A) ئۇبغۇن كېلىشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 ئاغرقى توختىسىدۇ، تىنچلاندۇرۇدۇ، جىڭەر خزمىتىنى كۈچەيتىسىدۇ. تەرمەتنى راۋانلاشتۇرۇدۇ. بىش ئاغرىش، قىزىتما، زۇكام، ئاشقازان، ئۇچەي كېسەللەكلىرىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۆسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈنده 3 قېتىم، ھەر قېتىمدا 2~1 تال ئىچىلىدۇ. بىر كۈنده رەڭ كۆپ بولغاندا 5 تال ئىچىش كېرەك.

【دىققەت قىلىدىغان ئىشلار】 5 ياشتن يۇقىرى باللار دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئاز مىقداردا ئىچىسە بولىدۇ. 5 ياشتن تۆۋەن باللارنىڭ ئىچىشى چەكللىنىدۇ.

【ئۆلچەمى】 ھەر بىر كۆمىلىچى 0.2g.

【ساقلاش】 ئېغىزىنى ھىم ئېتىپ ساقلاش، نەملىشىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. دىققەت: قىزىلگۈل شەرىتى ياساش: 1000g قىزىلگۈلگە سۇ قۇيۇپ، سۇ پارىدا پارلاندۇرۇپ، پارلاندۇرۇلغان 1500ml ئېرىتىمە يېغۇزىلىنىدۇ.

WS₃-BW-0200-98

هەبى جەدۋار
镇静艾比洁德瓦尔丸

Zhen jing Ai bi jie de wa er Wan

رېتسېپ		
4 g	مهۋايت	پارپا
4 g	كەھرىۋا	پىلىپل
8 g	زەنجۇيل	قارىمۇچ
8 g	قوۋۇقادارچىن	خولىنجان
8 g	ئاڭ بەھمن	قىزىل بەھمن
8 g	قەلمىپۇر	ئۇد ھىندى
12g	سوئىلەپ	كاشۇچىن
12g	بادىمنجى بۇيا چىنى	شاقاقۇل چىنى زەپەر

«یاساش ئۆسۈلى» يۇقىرقى 17 خل دورىدىن مەرۋايت ۋە زېپەردىن باشقا، پارپا قاتارلىق قالغان 15 خل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ تالقانلاپ، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈللىدۇ. زېپەر بىلەن مەرۋايتىنى ئايىرمۇ ئايىرمۇ سوقۇپ، مەرۋايت بىلەن 1.5g زېپەر ۋە قالغان تالقان دويمىلارنى قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، سۇ قوشۇپ كۇملاج ياساپ قۇرۇتۇلدى. ئىشىپ قالغان 0.5g زېپەرگە 300ml سۇ قوشۇپ، سەل قىزىتىپ، سەنەنلىپ، سەنەنلىكىن، ئىسىقىمىن، ھېب سېتىغا بالىتىسى، قەقەنلىدۇ.

سەرەپ، سۈرۈپسىن بېرىسىنى نەب سەرىنى يەنلىپ سۈرۈپ-مۇ
[شەكلى وە خۇسۇسىيىتى] بۇ سارغۇچ جىڭىر رەڭلىك سۇلۇق ھەب بولۇپ، تەمى ئاچقىق،
سەل قىرقىز كېلىدۇ.

«په رقلهندورهش» بُو دورىدىن 5g نى سوقۇپ، خلوروفورم قوشۇپ، هەر قىتىمدا 15ml 15 دىن 3 قىتىم چەككىلەپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن تېرىتىمىنى پارلاندۇرەپ، قۇرۇتۇپ، تۇنسىغا 2ml 2 خلوروفورم قوشۇپ تېرىتىپ، سىناق تېرىتىمە قىلىنىدۇ. ئاندىن تېڭىنۈل سېلىشتۈرما دورىسىدىن ئېلىپ، تۇنسىغا خلوروفورم قوشۇپ، هەر 1ml تەركىبىدە 1m 16 دوا توتقان تېرىتىمە تەييارلاپ، سېلىشتۈرۈلدۈغان تېرىتىمە قىلىنىدۇ. نېيز قەۋەتلىك رەڭ سېپتىر تۇسۇلى (قوشۇمچە B VI) بويىچە يۇقىرقى 2 خىل تېرىتىمىنىڭ هەر قايسىسىدىن 1m 4 ئېلىپ، سىلتىسى يېلىمى G لق نېيز تاختا تۇستىدىكى ئايىرم-ئايىرم نۇقتىغا تېمىتىپ، نېفت تېفرى ($C^{90 \sim 60}$)-تېتىل ئاتىستىتات (9:1)نى يېيلدۈرگۈچى قىلىپ يېيلدۇرەپ، شامالدىتىپ قۇرۇتۇپ، 5% لىك ۋانلىلىق سۇلغات كىسلاتا تېرىتىمىسى پۇرکۈپ، داغ نۇقتىلىرى ئېنىق كۆرۈنگەنگە قەدر ئىسىق شامال بېرىلىدى. سىناق قىلىنぐۇچى دورىنىڭ رەڭ سېپتىرىدا، سېلىشتۈرۈلدۈغان دورىنىڭ سېپتىرىدىكى مۇناسىپ ئورۇندا ئوخشاش رەڭلىك داغ نۇقتىلىرى پەيدا بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا ھېب ياسالىلىرىنى تەپىارلاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلەك بەلگىلە- مىلەرگە (قوشۇمچە I A) ئۇيغۇن كېلىشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 تىنچلاندۇرۇپ، نېرۇغا ئارام بېرىدۇ. يۈرەككە مەنپىئەت قىلىپ، بەدەننى كۈچلەندۈرۈدۇ. چىرىگەن قانلارنى تازىلایدۇ. ئېلىشىپ قېلىش، ساراڭ بولۇپ، ئالجوقا سۆزلەشكە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈندە 1 قېتىم، ھەر قېتىمدا 7 ~ 4 ھېب ئىچىلىدۇ. بالىلارغا مىقدارىنى ئازايىتىپ بېرىش لازىم.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر ھېب 0.2g

【ساقلاش】 ئېغىزىنى ھىم ئېتىپ، قۇرغاق جايىدا ساقلىنىدۇ.

WS₃—BW—0201—98

قۇرسى زىيابىتۇس

糖宁孜牙比土斯片

Tang ning Zi ya bi tu si Pian

【رېتىپپ】

60g	كۈندۈر	60g	بەللۇت
30g	شادىنەج	30g	ئەرمب بىلىمى
30g	شاققۇل چىنى	30g	ئانار گۈلى
30g	سەدەپ قېپى	30g	خولىنجان
30g	تاباشىر	30g	سوئىلەپ
		30g	بۇغا مۇڭگۈزى

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرقى 11 خىل دورىنى يۇمىشاق سوقۇپ تالقانلاب، ئەلگەكتىن ئۆتكۈزۈپ، مۇۋاپىق مىقداردا قىزىلگۈل شەربىتى، ئادىدى قەنت قىيامى ۋە كراخمال قوشۇپ، دانىجە ياساپ، تۆۋەن تېمىپراتۇردا قۇرۇتۇپ، 1000 دانه قۇرسى قىلىپ بېسىپ چىقىرىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا 1 سارغۇچ قوڭۇر رەڭلىك قۇرسى دورا بولۇپ، ئالاهىدە خۇش پۇراقلقى، تەمى قېرىق كېلىدى.

【پەرقەلەندۈرۈش】 بۇ دورىدىن 3g نى يۇمىشاق سوقۇپ، 10ml 1 ئېتىل ئىسپىرتتا ئېرىتىپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىدىن 2ml ئېلىپ، ئاممونى ئۇكسالات سىناق ئېرىتمىسىدىن 5~3 تامىچە تېمىتقاندا ئاق رەڭلىك چۆكمە حاصل بولىدۇ. ئايىرپ ئالغان چۆكمە ئاتىپتات كىسلاnatada ئېرىمەيدۇ، ئەمما تۇز كىسلاnatada ئېرىدۇ. سۈزۈلگەن ئېرىتمىدىن يەنە 1ml ئېلىپ، 5% لىك-a -نافقىل ئېتىل ئىسپىرت ئېرىتمىسىدىن 3~2 تامىچە تېمىتىپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، پروبرىكا دىۋارىنى بويلىتىپ، ئاستا-ئاستا 0.5ml سۇلغات كىسلااتا ئېرىتمىسى قوشقاندا، ئىككى خىل ئېرىتمىنىڭ تېگىشكەن جايىدا قىزغۇچ بىنەپشە رەڭلىك ھالقا شەكلىنىلىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىرىنى تەبىارلاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلىك بەلكىلىمە لەرگە (قوشۇمچە ID I) تۇيغۇن كېلىشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 جىڭىر ۋە بۆرەكتى تەڭشىمەيدۇ، قۇۋۇقتەيدۇ، سۈيدۈكىنى قويۇلدۇرۇپ، بەدەنىي ساغلاملاشتۇرۇدۇ. دىئاپىت كېسەللىكىگە ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۇسۇلى ۋە مىقدارى】 كۈندە بىر قېتىم، ھەر قېتىمدا 8~4 قۇرسى ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرسىنىڭ بېغىرلىقى 0.5g.

【ساقلاش】 بېغىزىنى ھەم ئېتىپ، سالقىن، قۇرغاق جايىدا ساقلىنىلىدۇ.

دەققەت: قىزىلگۈل شەربىتى ياساش: 1000g قىزىلگۈلگە سۇ قوشۇپ پارلاندۇرۇپ، پارلانغان ئېرىتمىدىن 1500ml يەغۇپلىنسا بولىدۇ.

قۇرسى قوقىيا

醒脑库克亚片

Xing nao Ku ke ya Pian

【رېتىپ】

135g	ئاچچىق ئەمن	135g	سەبرى
50 g	سوڭمونىيا	135g	مەستىكى رۇمى

50 g ئاچچىقتاۋۇر

【ياساش ئۇسۇلى】 يۇقىرقى 5 خىل دورىدىن ئاچچىق ئەمنىگە سۇ قوشۇپ، ھەر قېتىمدا بىر سائەتتىن 3 قېتىم قايىتىپ، قايىتىلغان ئېرىتمىلەرنى قوشۇپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىنى قوبىلەندۈرۈپ، قوبىق مەلھەم ياسىلىدۇ. سەبرى قاتارلىق قالغان 4 خىل دورىنى يۇمشاق سوقۇپ تالقان قىلىپ، يۇقىرقى مەلھەم بىلەن تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ، مۇۋاپىق مىقداردا قوشۇمچىلارنى قوشۇپ، دانىچە ياساب، قۇرۇتۇپ، 1000 قۇرسى قىلىپ بېسىپ چىقىرىلىدۇ.

【شەكلى ۋە خۇسۇسىتى】 بۇ دورا قارا رەڭلىك قۇرسى بولۇپ، خۇش پۇراقلقى، تەمى ئاچچىق كېلىدۇ.

【پەرقەندۈرۈش】 (1) بۇ دورىدىن 4 قۇرسىنى يۇمشاق سوقۇپ، 20ml مېتىل ئىسپىرت قوشۇپ، قايىنخىچە قىزىتىپ، بىر نەچىچە منۇت چالغىتىپ، سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىدىن 2ml ئېلىپ، 2ml نىترات كىسلاتا قوشۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرغاندا قارامتۇل قىزىل رەڭگە ئۆزگەرىدۇ. سۈزۈلگەن ئېرىتمىدىن يەنە 2ml ئېلىپ، تەڭ مىقداردىكى تويۇنغان بروم ئېرىتمىسى قوشقاندا، سېرىق رەڭلىك چۆكمە ھاسىل بولىدۇ.

(2) بۇ دورىدىن 10 قۇرسىنى يۇمشاق سوقۇپ، 1ml قوبىق ئاممىيەك ئېرىتمىسى بىلەن نەمدەپ، 10ml ئېفر قوشۇپ، 2 سائەت قوچۇپ، ئاندىن سۈزۈپ، سۈزۈلگەن ئېرىتمىنى سۇيۇقلۇق ئايىش ۋارونكىسىغا قۇيۇپ، 5ml سۇيۇق تۇز كىسلاتا قوشۇپ، ئارىلاشتۇرۇپ، چەككىلمەپ، تىنج تۈرگۈزۈپ، قەۋەتلەرگە ئايىپ، ئاندىن كىسلاتالىق سۇ قەۋىتىنى ئېلىپ، ئايىرم-ئايىرم 3 پروبرىكىغا قۇيۇپ، 1-پروبرىكى-غا كالىي سىماپ يودىد سىناق ئېرىتمىسىدىن 2 تامىچە تېمىتقاندا، سېرىق رەڭلىك چۆكمە ھاسىل بولىدۇ؛ 2-پروبرىكىغا كالىي بىسمۇت يودىد سىناق ئېرىتمىسىدىن 2 تامىچە تېمىتقاندا جۈزە رەڭ چۆكمە ھاسىل بولىدۇ، 3-پروبرىكىغا سىلىكۈۋەلfram كىسلاتا سىناق ئېرىتمىسى تېمىتقاندا، ئاقۇچ رەڭلىك چۆكمە ھاسىل بولىدۇ.

【تەكشۈرۈش】 بۇ دورا قۇرسى ياسالىلىرىنى تەبىئىلاشتىكى ھەر قايىسى مۇناسىۋەتلىك

بەلكىلىملىرىگە (قوشۇمچە ID) ئۇيغۇن كېلىشى لازىم.

【تەسىرى ۋە ئاساسىي داۋالايدىغىنى】 غەيرىي تەبىئىي بەلغىم خىلىتىنى تازىلایدۇ، ئاغرىقى توختىتىدۇ، كۆزنى روشەنلەشتۈردى. غەيرىي تەبىئىي بەلغىم خىلىتى كەلتۈرۈپ چىقارغان باش ئاغرىش، كۆز كېسىلى قاتارلىقلارغا ئىشلىتىلىدۇ.

【ئىشلىتىش ئۈسۈلى ۋە مىقدارى】 كۈنده 2 قېتىم، ھەر قېتىمدا 9~7 قۇرسى ئىچىلىدۇ.

【ئۆلچىمى】 ھەر بىر قۇرسىنىڭ ئېغىرلىقى 0.5g .

【ساقلالاش】 ئېغىزى ھىم ساقلىنىدۇ.

مەجۇن (ئۇيغۇر تېبابەت ئەنئەنۋى دورىسى)

مەجۇن دورىلار دېگىنىمىز، دورا ماتېرىاللىرىنىڭ ئۇششاق سوقۇلغان تالقىنغا ياكى دورا ماتېرىاللىرىدىن ئايىرىپ ئېلىنغان ماددىلارغا چەككىلەنگەن ھەسەل ياكى شېكەر قوشۇپ ياسالغان سۇبۇرقاچ (بېرىم ئىقشىچان) دورىدىن ئىبارەت.

مەجۇن دورىلار ئىشلەپچىقىرىلىش ۋە ساقلىنىش مەزگىللەرىدە تۆۋەندىكى ئالاقدار بەلگىلىملىرگە مۇۋاپىق كېلىشى كېرەك:

1. ئايىرم بەلگىلىم بولغانلىرىدىن باشقا، مەجۇن ئىشلەشكە ئىشلىتلىدىغان دورا تالقانلىرى 6-ياكى 5-نومۇرلۇق ئۈلگەكتىن ئۇتكۇزۇلگەن بولۇشى كېرەك.

2. ھەسەل چەككىلەنگەندىن كېيىن ئىشلىلىشى كېرەك. ئايىرم بەلگىلىم بولغانلىرىدىن باشقا، چەككىلەنگەن ھەسەل ئىسىق چېخىدىلا دورا تالقىنغا قوشۇلۇشى، تەكشى ئارىلاشنىۋۇلۇشى كېرەك؛ رېتىپ تەركىبىدە دېۋرىقاي، بىلىم، ئۇچۇچان تەركىبلىك دورىلار بولغان چاغدا چەككىلەنگەن ھەسەل 60 °C قىزىقلۇقتا فوشۇلۇشى كېرەك.

3. دورا پاکىز ھەم باكتېرىيىدىن خالىي مۇھىتا تەيارلىنىشى ھەممە ئۆز ۋاقتىدا باكتېرىيىسىز، پاکىز ھەم قۇرغاق قاچىغا قاچىلىنىشى كېرەك.

4. مەجۇن دورىلارغا مۇۋاپىق مىقداردا چىرىشنىڭ ئالدىنى ئالغۇچى دورىلارنى قوشۇشقا بولىدۇ، ئۇنىڭ تۈرى ۋە ئىشلىش مىقدارى دۆلەتنىڭ ياكى سەھىيە منىسٹرلىقىنىڭ مۇناسىۋەتلەك بەلگىلىمىسىگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك.

5. تاشقى كۆرۈنۈشىدە رەڭگى بىر خىل بولۇشى، ئېچىپ قىلىش، سېسىق پۇراش ياكى باشقا بۇزۇلغان ئەھۋاللىرى بولماسلقى كېرەك.

6. ئېغىزى ھىم بېكتىلىشى، سايىھ، ساقلىن جايىدا ساقلىنىشى كېرەك.

【قاچىلاش مىقدارى】 ئەڭ تۆۋەن قاچىلىنىش مىقدارىنى تەكشۈرۈش ئۆسۈلى (قوشۇمچە II) بويىچە تەكشۈرگەندە، بەلگىلىمكە ئۇيغۇن بولۇشى كېرەك.

قوشۇمچە ॥

گۈلقەنت (ئۇيغۇر تېباھەت ئەزىزىتىسى دورسى)

گۈلقەنت دېگىنىمىز، يېڭى دورا ماتېرىياللىرى يەنى گۈل (چىچەك) ياكى يوپۇرماقلارغا بەلگىلىك مقداردا شېكەر قوشۇپ، كوزىغا قاچىلاپ، ئاغزىنى ھىم ئىتىپ، بەلگىلىك ۋاقت ئېتىپقا قويۇپ، تەكشى ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىنىدىغان سۇيۇقراق (بېرىم ئېقشىچان) ياسالىدىن ئىبارەت.

گۈلقەنت ئىشلىنىش ۋە ساقلىنىش جەريانىدا تۆۋەندىكى بەلگىلىمىلەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك:

1. يېڭى گۈل (چىچەك) ياكى يوپۇرماق ئىشلىنىش، ئۆسۈملۈكىنىڭ باشقا بۆلەكلەرى ياكى لاي-شې-خىللارغا ئوخشاش يات نەرسىلەر ئارىلاشماسىلىقى كېرەك.

2. پاكسىز ھەم باكتېرىيىدىن خالىي مۇھىتتا ئىشلىنىشى، ئۆز ۋاقتىدا باكتېرىيىسىز، پاكسىز ھەم قۇرغاق تاچىغا قاچىلىنىشى كېرەك.

3. گۈلقەنتىكە مۇۋاپىق مقداردا چىرىشنىڭ ئالدىنى ئالغۇچى دورىلارنى قوشۇشقا بولىدۇ، ئۇنىڭ تۈرى ۋە ئىشلىنىش مقدارى دۆلەتنىڭ ياكى سەھىيە منىسلىقىنىڭ مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمىلەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك.

4. تاشقى كۆرۈنۈشىدە رەڭگى بىر خىل بولۇشى، قەۋەتلەرگە بۆلۈنۈپ قالماسىلىقى، ئېچىش، سېسىش ياكى باشقا بۇزۇلۇش ئەھۋاللىرى بولماسىلىقى كېرەك.

5. ئېغىزى ھەم بېكىتىلىشى، سايىھە، سالقىن جايىدا ساقلىنىشى كېرەك.

【قاچىلاش مقدارى】 ئەڭ تۆۋەن قاچىلىنىش مقدارىنى تەكشۈرۈش ئۇسۇلى (قوشۇمچە ॥XII॥) بويىچە تەكشۈرگەندە، بەلگىلىمگە ئۇيغۇن بولۇشى كېرەك.

قوشۇمچە Ⅲ

تەبىyar دورا ياسالىلىرىدىكى «جۇڭگو دورا قامۇسى» (1995-يىل نەشri)
بىرىنچى قىسىمغا كىرگۈزۈلگەن ئاساسلىق دورىلار ۋە لايقلاشتۇرۇلغان
ياسالىلار

1. قەلمپۇر (丁香) مىرتاس ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك قەلمپۇر Eugenia caryophyllata Thunb نىڭ قۇرۇقۇلغان غۇنچىسى.
2. مېھرىگىياب (參) ئارالىيە ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك مېھرىگىياب Panax ginseng C. A. Mey نىڭ قۇرۇقۇلغان يىلتىزى.
3. كات هىندى (茶) بۇرچاق ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك كات هىندى Acacia catechu (L. F.) Willd نىڭ پوستى ئېلىۋېتىلگەن شبىخى، غولىنىڭ قۇرۇقۇلغان ئېكسىتراكتى.
4. زەنجىۋىل (干姜) زەنجىۋىل ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك زەنجىۋىل Zingiber officinale Rosc نىڭ قۇرۇقۇلغان يىلتىزى غولى.
5. رەۋەن (大黃) قامىچا ئوت ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك ئالقانىسمان يىويۇرماقلىق رەۋەن Rheum palmatum L رەۋەن Rheum officinale Baill نىڭ قۇرۇقۇلغان غولى.
6. ئاقچەشكە (山柰) زەنجىۋىل ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك ئاقچەشكە Kaempferia galanga L نىڭ قۇرۇقۇلغان يىلتىزى غولى.
7. ئارپىبەدىيان (小茴香) كۈنلۈكىسمان گۈللۈكلەر ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك ئارپىبەدىيان Foeniculum vulgare Mill.
8. سېمىز ئوت (马齿苋) سېمىز ئوت ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك سېمىز ئوت Portulaca oleracea L نىڭ قۇرۇقۇلغان يەر ئۆستىدىكى قىسىمى.
9. كۈچۈلا (马钱子) كۈچۈلا ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك كۈچۈلا Strychnos nux-vomica L ياكى يۈننەن كۈچۈلسى Strychnos pierriana W. Hill نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقاڭ ئۇرۇقى.
10. مىڭدىۋانه ئۇرۇقى (天仙子) پىدىگەن ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك مىڭدىۋانه Hyoscyamus niger L نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقاڭ ئۇرۇقى.
11. تىيەندۈڭ (天冬) گۈلسامساق ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك تىيەندۈڭ Asparagus cochininchinensis (Lour.) Merr. ياكى خۇاسلاۋ بامبۇكى Rendle ياكى خۇاسلاۋ بامبۇكى shizostachyum chinense McClure ئاجارمالىرنىڭ قۇرۇغاندىن كېيىنكى تۈگۈنەك ماددىسى.
12. تاباشر (天竺黄) باشقىلىقلار ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك كۆك بامبۇك Bambusa textilis ياكى قۇرۇقۇلغان قاتارلىقلارنىڭ غولى ئىچىدىكى.
13. قۇستە تەلخ (木香) مۇرەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك قۇستە تەلخ Aucklandia lappa Decne.
14. پاقىيوبۇرماق ئۇرۇقى (车前子) پاقىيوبۇرماق ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك پاقىيوبۇرماق Plantago Plantago

15. بەلله (毛诃子) چاھار بۇرجهك ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك بەلله Terminalia chebula var. tomentella kurt Retz. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقانى مېۋسى.
16. شاقاقۇل چىنى (玉竹) گۈلساماساق ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك شاقاقۇل چىنى Poligonatum chinensis DC. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقانى مېۋسى.
17. سۇمبۇل چىنى (甘松) سۇمبۇل ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك سۇمبۇل چىنى Nardostachys chinensis Batal. ياكى قوشۇقىمىن يوپۇرماقلىق سۇمبۇل چىنى Nardostachys jataansi DC. قۇرۇتۇلغان يىلتىزى ياكى يىلتىز غولى.
18. چۈچۈكبۈيا (甘草) چۈچۈكبۈيا Glycyrrhiza uralensis Fisch. ، چوك مېۋىلىك چۈچۈكبۈيا Glycyrrhiza inflata Bat. ياكى تۈكسىز مېۋىلىك چۈچۈكبۈيا L. لارنىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزى ياكى يىلتىز غولى.
19. چۈچۈكبۈيا يىلتىزى قىيامى (甘草浸膏) چۈچۈكبۈينى پىشىقلاب ئىشىمچىقلىق ئايىرىۋېلىنىغان قىيام.
20. ئانار پوستى (石榴皮) ئانار ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك ئانار Punica granatum L. نىڭ قۇرۇتۇلغان مېۋه پوستى.
21. جىنتىيانا چىنى (龙胆) جىنتىيانا ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك پىچانىمىن يوپۇرماقلىق جىنتىيانا Gentiana manshurica Kitag. ياكى قاتىقى پوستلىق جىنتىيانا Gentiana triflora Pall. ياكى قاتىقى پوستلىق جىنتىيانا Gentiana rigescens Franch. نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزى ياكى يىلتىز غولى.
22. ئاق قىچا (白芥子) كېرىست گۈللۈكلەر ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك ئاق قىچا Sinapis alba L. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقانى مۇرۇقى.
23. نۇد سەلب (白芍) ئېيقتىپان ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك چۈغلۈق Paeonia lactiflora Pall. نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزى.
24. بېيشىنپى (白鲜皮) سۇزآپ ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك بېيشىن Dictamnus dasycarpus Turcz. نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىز پوستى.
25. شاھتەرە چىنى (地锦草) سۇتلۇك ئوتلار ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك شاھتەرە Euphorbia humifusa Willd. ياكى چىپار شاھتەرە L. Euphorbia maculata Willd. نىڭ قۇرۇتۇلغان پۇتون چۆپى.
26. جىنكىۋىزى (补骨脂) پۇرچاق ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك جىنكىۋىزى Psoralea corylifolia L. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقانى مېۋسى.
27. زەپەر (西红花) چغىرتماق ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك زەپەر Crocus sativus L. نىڭ قۇرۇتۇلغان ئانلىق تۇمشۇقى.
28. داڭگۇي (当归) كۈنلۈكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلسىدىكى ئۆسۈملۈك داڭگۇي Angelica sinensis (Oliv.) Diels

29. جویوز (肉豆蔻) مۇسکات ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك جویوز *Myristica fragrans* Houtt نىڭ قۇرۇقۇلغان ئۇرۇق مېغىزى.
30. توشقانزەدىكى (肉苁蓉) شۇمبۇيا ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك توشقانزەدىكى *Cistanche deserticola* Y. C. Ma نىڭ قۇرۇقۇلغان تەڭگە يوپۇرماقلىق ئەتلىك ئاساسى.
31. دارچىن (肉桂) كامفورا ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك دارچىن *Cinnamomum cassia* Presl نىڭ قۇرۇقۇلغان دەرىخ قۇۋىزىقى.
32. شىڭىرپ (朱砂) گۇڭگۈرلۈك بىرىكمىلەر تۈرىدىكى كان ماددىسى گىنۋار بولۇپ، ئاساسلىق تەركىبى سىماپ سۇلۇند (HgS).
33. چایان (全蝎) چايان ئائىلىسىدىكى ھايۋان شەرقىي ئاسىيا چايىنى *Buthus martensii* Karshch نىڭ قۇرۇقۇلغان تېنى.
34. بىڭىپەن (冰片) ئەمبەر دەرىخى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئەمبەر دەرىخى *Dryobalanops aromatica* Gaertn. F رەڭسىز، سۈزۈك ياكى ئاڭ رەڭلىك، نۇرنى يېرىم ئۆتكۈزىدىغان يايپلاق چۈرۈك كىرسىتال.
35. ھۇمامە (豆蔻) زەنجىۋىل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك چوڭ لاچىندانە *Amomum kravanh* *Amomum compactum* Soland ex Maton Pirre ex Gagnep نىڭ قۇرۇقۇلغان، پىشقانى مېۋسى.
36. كاۋاۋىچىن (花椒) سۇزاب ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كۈك كاۋاۋىچىن *Zanthoxylum schinifolium* Sieb, et Zucc نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقانىڭ پۇستى.
37. سەبرى (芦荟) گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كېۋراساۋ سەبرى *Aloe barbadensis* Miller، گۇد خوب تۇمۇشۇقى سەبرى *Aloe ferox* Miller ياكى باشقا ئوخشاش ئۇرۇقداشلىق يېقىن ئۆسۈملۈكلەر يوپۇرمىقىنىڭ شىرىسىنىڭ قويۇلدۇرۇلغان قۇرغاق ماددىسى.
38. ئامىلە (余甘子) سۇتلۇك ئوت ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئامىلە *Phyllanthus emblica* L نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقانى ئۇرۇقى.
39. ئۇد ھىنди (沉香) مازارىيون ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئۇد (*Aquilaria sinensis* (Lour.) Gilg بولۇپ، تەركىبىدە دېۋرىقاي بولغان ياغاج.
40. ھېليلە (诃子) چاھار بۇرجهك ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ھېليلە *Terminalia chebula* Retz نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقانى مېۋسى.
41. پۇستى تۇرۇتجى (陈皮) سۇزاب ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ماندارىن *Citrus reticulata* Blanco ھەمەدە ئۇنىڭ پەرۋىش قىلىپ ئۆزگەرتىلگەن تۈرلىرىنىڭ قۇرۇقۇلغان مېۋە پۇستى.
42. پاربا (附子) بىيىقتاپان ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بۇۋانە *Aconitum carmichaeli* Debx نىڭ بالا يىلتىزىدىن پىشىقلانغان مەھسۇلات.
43. قىزىلگۈل (玫瑰花) ئازغان ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك قىزىلگۈل *Rosa rugosa* Thunb

پىشقاڭ مېۋسى.

56. كىبابه چىنى (草澄茄) كامفورا ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك توخۇر قارىمۇچى Litsea cubeba (Lour.) ياكى قارىمۇخ ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك Piper cubeba L. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقاڭ مېۋسى.

57. قاقلە (草果) زەنجىۋىل ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك قاقلە Amomum tsao—ko Crevost et Lemaire نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقاڭ مېۋسى.

58. فۇلڭ (苓) كۆپ تۆشۈكلىك زەمبۇرۇغ ئائىلىسىدىكى زەمبۇرۇغ فولڭ Poria cocos (Schw.) نىڭ قۇرۇتۇلغان زەمبۇرۇغ تۈگۈنىكى.

59. كۈدە تۇرۇقى (韭菜子) گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك كۈدە Allium tuberosum Rottl. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقاڭ تۇرۇقى.

60. سۇندى (香附) پىزەك ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك پىزەك Cyperus rotundus L. نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىز غولى.

61. خېنىڭىل تۇرۇقى (急性子) خېنىڭىل ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك خېنىڭىل Impatiens balsamina L. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقاڭ تۇرۇقى.

62. زەرقىچە (姜) زەنجىۋىل ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك زەرقىچە Curcuma langa L. نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىز غولى.

63. شاپتۇل مېغزى (桃仁) ئازغان ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك شاپتۇل (L.) Prunus persica Carr. Batsch ياكى تاغ شاپتۇلى ئۆزۈمىن ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك Prunus davidiana تۈرۈپ قۇرۇتۇلغان پىشقاڭ تۇرۇقى.

64. ياكاڭ مېغزى (核桃仁) ياكاڭ ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك ياكاڭ Juglans regia L. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقاڭ مېغزى.

65. تۈرۈپ تۇرۇقى (莱菔子) كېپىت گۈللۈكلىر ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك تۈرۈپ Raphanus sativus L. نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقاڭ تۇرۇقى.

66. خولىنجان (高良姜) زەنجىۋىل ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك خولىنجان Alpinia officinarum Hance نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىز غولى.

67. كۆپىكى دەريا (海螵蛸) سىيابىلىق ئائىلىسىدىكى هاييان نەشتەرسىز سىيابىلىق Sepiella maindroni de Rochebrune ياكى زەرتەن سىيابىلىق Sepia esculenta Hoyle نىڭ قۇرۇتۇلغان ئېچكى قېبى.

68. قارا ئۈچمە (桑椹) ئۈچمە ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك ئۈچمە Morus alba L. نىڭ قۇرۇتۇلغان غۇزىمەك باشقى، غۇزىمەك باشقى ئاڭ ۋە قارامتۇل سۆسۈن ئىككى خىل بولىدۇ.

69. سېرىق ئوت تۇرۇقى (菟丝子) يۆگىمەچ گۈل ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك سېرىق ئوت Cuscuta chinensis ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئۇرۇقداش ئۆسۈملۈكلىر نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقاڭ مېۋسى.

70. كاسىنه (菊苣) مۇرەككىپ گۈللۈكلىر ئائىلىسىدىكى تۈسۈملۈك تۈكۈلۈك كاسىنه Cichorium intybus L. كاسىنه ۋە كاسىنه Cichorium glandulosum Boisis. et Hout قىسىمى.

71. مامراڭىنى (黄连) ئېيقتاپان ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك مامراڭىنى Coptis chinensis Franch ، ئۇچبۇرجهك يوپۇرماقلىق مامراڭىنى Coptis deltoidea C. X Cheng et Hsiao ياكى بۇنەن مامراڭىنى Coptis teeta Wall نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىز غولى.
72. شېچۋاڭىزى (蛇床子) كۈللۈكىسمان كۈللۈكىلەر ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك شېچۋاڭىزى Cnidium monnieri (L.) Cuss نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقانى مېۋسى.
73. بۇغا مۇڭگۈزى (鹿茸) بۇغا ئائىلىسىدىكى ھايۋان تايغان بۇغا Cervus elaphus Linnaeus نىڭ ئەركىكىنىڭ سۆگەكە ئايلانمىغان يۇمۇران مۇڭگۈزى.
74. چاكاندا (麻黄) چاكاندا ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك چۆپ چاكاندا Ephedra sinica Ephedra intermedia Schrenk et C. A. Mey ياكى قىرقىق بوغۇملىق ئەركىكىندا Ephedra equisetina Bge نىڭ قۇرۇتۇلغان چۆپ غولى.
75. يىنياڭخو (淫羊藿) زىرىق ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك يىنياڭخو Epimedium brevicornum ، ئۇچلۇق يوپۇرماقلىق يىنياڭخو Epimedium sagittatum (sieb. et Zncc) Maxim ئوشىنىق يىنياڭخو Epimedium pubes cene Maxim ، ۋوشەن يىنياڭخوسى Epimedium wushan ياكى كورىيە يىنياڭخوسى Epimedium koreanum Nakai ense T. S. Ying ئۇستىدىكى قىسىمى.
76. خاڭىشى (葶苈子) كېرىت كۈللۈكىلەر ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك تۇدەرى Lepidium apetalum Willd ياكى چۈغۇندەك Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقانى تۇرۇقى.
77. گۈڭگۈرت (硫黄) تەبىئىي ئېلىپېنتلار تۈرىدىكى كان ماددىسى گۈڭگۈرت گورۇپىسىدىكى گۈڭگۈرت بولۇپ، قېزىۋىلىغىناندىن كېىن قىزىتىپ ئېرىتىلىدۇ، ئارىلاشما ماددىلار چىقىرىپ تاشلىنىدۇ ياكى گۈڭگۈرتلىق كان ماددىلرىنى پىشىقلالاپ تىشلىش ئارقىلىق ئېلىنىدۇ.
78. زىسو ئۇرۇقى (紫苏子) كالپۇكىسمان كۈللۈكىلەر ئائىلىسىدىكى زىسو Perilla frutescens (L.) Britt نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقانى مېۋسى.
79. ئەڭلىكىوت (紫草) ئەڭلىكىوت ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك شىنجاڭ ئەڭلىكىوتى Arnebia euchroma (Royle) Johnst نىڭ قۇرۇتۇلغان يىلتىزى.
80. قارا كۈنջۈت (黑芝麻) كۈنջۈت ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك كۈنջۈت Sesamum, indicum L نىڭ قۇرۇتۇلغان پىشقانى تۇرۇقى. ساراغۇچ ئاڭ رەڭلىكى ئاڭ كۈنջۈت دېلىلىدۇ.
81. سىيادان (黑种草子) ئېيقتاپان ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك ھۈرەك مېۋلىك سىيادان Nigella glandulifera Freyn يەر مەدىكى (锁阳) يەر مەدىكى ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك يەر مەدىكى Cynomorium songaricum Rupr نىڭ قۇرۇتۇلغان گۆشلۈك غولى.
82. سانا (番泻叶) پۇرچاق ئائىلىسىدىكى تۆسۈملۈك تار يوپۇرماقلىق سانا Cassia angustifolia Vahl ياكى ئۇچلۇق يوپۇرماقلىق سانا Cassia acutifolia Delile نىڭ قۇرۇتۇلغان كېچىك يوپۇرمىقى.

84. ئۇغۇرىتىكەن (蒺藜) *Tribulus terrestris* ئۇغۇرىتىكەن L نىڭ قۇرۇقۇلغان، پىشقانى مېۋىسى.
85. تۈزىغاق (蒲黃) *Typha angustifolia* يېكىن ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك شامىمىان يېكىن *Typha orientalis* Presl L، شەرق يېكىنى ياكى ئۇخشاش ئۇرۇقدا شىلق ئۆسۈملۈك لەرنىڭ قۇرۇقۇلغان گۈل چېڭى.
86. تەنكار (硼砂) $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ دىن ئىبارەت.
87. هەسمەل (蜂蜜) هەسمەل ھەرە ئائىلىسىدىكى ھاشارات جۇڭخۇا ھەسمەل ھەرسى *Apis cerana* Fabricius ياكى ئىتالىيە ھەسمەل ھەرسى *Apis mellifera* Linnaeus چىقارغان ھەسمەل.
88. فۇقل (槟榔) پالما ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك فۇقل *Areca catechu* L نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقانى ئۇرۇقى.
89. خەشخاش (罂粟壳) نېپىئونگۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك خەشخاش *Papaver somniferum* L نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقانى مېۋە پوستى.
90. يالپۇز (薄荷) كالپۇكىسىمان كۈللۈكلىم ئائىلىسىدىكى يالپۇز *Mentha haplocalyx* Briq نىڭ قۇرۇقۇلغان يەر ئۇستىدىكى قىسىمى.
91. ئاق سەندەل (檀香) سەندەل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئاق سەندەل *Santalum album* L دەرىخى غولىنىڭ ئۆزەك ياغىچى.
92. ئىپار (麝香) بۇغا ئائىلىسىدىكى ھايۋان ئورمان ئىپار كېيىكى *Moschus berezovskii* Flerov، ئاق ئىپار كېيىكى *Moschus sifanicus* Przewalski ياكى دالا كېيىكى *Moschus moschiferus* Linnnaeus نىڭ يېتلەگەن ئەركىكىنىڭ كىندىك خالتسىسىدىن بېلىنغان قۇرۇقۇلغان ئاجرا الما ماددا.

قوشۇمچە IV

تەيیار دورا ياسالىلىرىدىن «جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى سەھىيە ھىنىستىرلىقنىڭ دورا ماتېرىياللىرى ئۆلچەمى. جۇڭىي دورا ئەشىالرى» نىڭ برنىچى قىسىمغا كىرگۈزۈلگەن ئاساسلىق دورا ماتېرىياللار

1. يىزىخو ئەمنى (—) مۇھەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك يىزىخو ئەمنى Artemisia rupestris L.
2. ئەنچۈر (无花果) ئۇجمە ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئەنچۈر Ficus carica L. نىڭ پىشقان ياكى پىشاي دىگەن ئىچكى گۈلى ۋە ئورۇق مېۋسىنىڭ گۈل دېتى تەڭلىكى.
3. قار لهىلىسى (天山雪莲花) مۇھەككەپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك قار لهىلىسى Saussurca involucrata Kar. et kin.
4. مىخ دارچىن (肉桂子) كامفورا ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك مىخ دارچىن Cinnamomum cassia Presl نىڭ قالدۇق گۈل كاسىسى بار قۇرۇتۇلغان پىشىغان مېۋسى.
5. يۇمغاقسۇت ئورۇقى (芫荽子) كۈنلۈكسمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك يۇمغاقسۇت Coriandrum sativum L. دېپىرقاي (松香) قارىغاي ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئات قۇيرۇق قارىغاي Pinus massoniana Lamb ۋە ئۇنىڭ بىلەن ئورۇقداش بىر قانچە خىل ئۆسۈملۈكلىرى غولىدىن ئېلىنىدىغان مايلق سېغىز بولۇپ، دىستىللەش ئارقىلىق ئۇچۇچان مېسى چىقىرىلغاندىن كېىنلىكى قالدۇق ماددا.
7. رەبىهانگۈل (罗勒) كالپۇكسمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك Ocimum basilicum L. نىڭ قۇرۇتۇلغان يەر ئۇستىدىكى قىسىم.
8. چەشمىخۇرۇس (相思子) پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك چەشمىخۇرۇس Abrus precatorius L.
9. مەدەستان (密佗僧) بۇ قوغۇشۇن رۇدىسىنى تاڭلاپ كۈمۈش، قوغۇشۇن ئايىرغاندا ھاسىل بولغان پىچ تېگىدىكى چۆكۈندە ياكى قوغۇشۇنى ئېرىتىپ، ئۇزۇن تۆمۈر كالىتكە بىلەن پىچنى بىر قانچە قېتىم قوچۇپ چىقىرىۋالغاندا ئېرىگەن قىسىمن قوغۇشۇن تۆمۈر كالىتكە چاپلىشىپ قالىدۇ، ئاندىن ئۇنى سوغۇق سۇغا چىلاپ مۇشۇنداق كۆپ قېتىم تەكارلىغاندا ئېرىگەن قوغۇشۇنى قاتمۇ-قات كالىتكە بىپېشتۈرۈپ، سوۋۇتۇش ئارقىلىق ھاسىل بولىدۇ. ئۇنىڭ ئاساسلىق تەركىبى قوغۇشۇن ئوكسىد (PbO).

تەبىار دورا ياسالىلىرى تەركىبىدىكى مەزكۇر ئۆلچەمگە

كرگۈزۈلمىگەن ئاساسلىق دورا ماٗپرىياللىرى ۋە لايىلاشتۇرۇلغان دورىلار

1. فەرنجىمىشكى ئۇرۇقى (丁香罗勒子) كالپوكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك فەرنجىمىشكى Var. Suave willd. *Ocimum gratissimum* L.
2. سازمەج ھىندى (三条筋) كامفورا ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك قوقاقدارچىن Cinnamomum zeylanicum BL
3. قىزىل بەھەمن (大叶补血草) بەھەمن ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك قىزىل بەھەمن Limonium gmelinii (Willd.) O. ktze
4. ئەنجۇر يوپۇرمىقى (无花果叶) ئۆزىمە ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئەنجۇر Ficus carica L. نىڭ قۇرۇتۇلغان يوپۇرمىقى.
5. سۇمبىول تىپ (毛甘松) سۇمبىول ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سۇمبىول تىپ Nardostachys chinensis Batl.
6. تۈكۈلۈك رەبىان (毛罗勒) كالپوكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك تۈكۈلۈك رەبىان
7. گۈلى كاۋىزبىان (牛舌草花) ھەڭلىكىت ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك تىتالىيە كاۋىزبىان Anchusa italica Retz
8. ھەببۈلغار (月桂子) كامفورا ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ھەببۈلغار *Laurus nobilis* L. نىڭ قۇرۇتۇلغان ئۇرۇقى.
9. بادام يېغى (巴旦油) ئازغان ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بادام *Amygdalus communis* L. نىڭ مېغىزىدىن چىقىرىلىدىغان ياغ.
10. كلامازىرىپىس (卡麻孜日尤司) مۇرەككىپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كەكىھ
11. دۇرنهج ئەمرىبى (印度多榔菊根) مۇرەككىپ گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك دۇرنهج ئەمرىبى *Acroptilon repens* (L.) DC
12. چىلغۇزا (白皮松子) قارىغاي ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك شىشەن چىلغۇزىسى *Pinus gerardiana* Wall. نىڭ ئۇرۇقى.
13. زاغۇن ئۇرۇقى (芝麻菜子) كېپىت گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك زاغۇن *Eurca sativa* Mill. نىڭ ئۇرۇقى.
14. كەتترا (西黄蓍胶) پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كەتترا دەرىخى *Astragalus gummifer* Labillardiere غولىدىن ئېلىنىدىغان قۇرۇتۇلغان دەرىخ يېلىمى.
15. گىل ئەرمىنى (亚美尼亚红土) سىلىكات تۆزلىرى تۆزىدىكى كان مەھسۇلاتى كۆپ سۇ

- تەركىبلىك كاۋالىن Halloysite نىڭ بىر خىل قىزىل پارچىسىمان جىنسى.
16. قىمىپۇز زەرە (当药) جىنتىيانا ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سۆگەل تۈكۈلۈك سۈپېرسىيا Swertia pseudochinensis Hara نىڭ قۇرۇقۇلغان پۇتۇن ئۆسۈملۈكى.
17. ئەنزۇرۇت (肉根黄芪胶) پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئەنزۇرۇت Astragalus saucocolla Dun نىڭ دەرمەخ يېلىمى.
18. ناۋات (冰糖) ئاق شېكەرنى پىشىقلاب ئىشلىش ئارقىلىق ھاسىل بولىدىغان تەرتىپسىز يوغان كاللهك كىرسىتال.
19. چامغۇر ئۇرۇقى (芜菁子) كېپىت گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك چامغۇر Brassica rapa L نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقانى ئۇرۇقى.
20. سۇزاب (芸香) سۇزاب ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سۇزاب Ruta graveolens L نىڭ قۇرۇقۇلغان يەر ئۇستىدىكى قىسى.
21. كەرمەپە يېلىتىزى (芹菜根) كۈنلۈكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كەرمەپەه ئەپەپشە يېلىتىزى Apium graveolens L نىڭ قۇرۇقۇلغان يېلىتىزى.
22. مۇرمەككى (没药) زېيتۇن ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك مۇرمەككى Commiphora myrrhae Engl نىڭ مايلق دەرمەخ يېلىمى.
23. موزا (没食子) دوب چىنسى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك موزا دەرمىخ Quercus infectoria Oliv نىڭ ياش نوتىسىدا موزا ھەرسى ئائىلىسىدىكى ھاشارات موزا ھەرسى Cynips gallae—tinctorice Oliv نىڭ لېچىنكىسى پارازىتلەنىشىدىن ھاسىل بولغان قۇرغاق ھۈررەك.
24. ئۇغۇز سوت (初乳) تۆگە ئائىلىسىدىكى ھايۋان قوش لوکىلىق تۆگە Camelus bactrianus L نىڭ چىسىنىڭ ئۇغۇز سوتى.
25. پىستە (阿月浑子) سىر دەرمىخ ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك پىستە Pistacia Vera L نىڭ قۇرۇقۇلغان ئۇرۇقى.
26. زىرە (孜然) كۈنلۈكىسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك زىرە Cuminum cyminum L نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقانى مېۋسى.
27. ئۇزخىر (青香矛) باشاقلىقلار ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئۇزخىر Cymbopogon goeringii (steud) A. Camus نىڭ قۇرۇقۇلغان پۇتۇن ئۆسۈملۈكى.
28. شور قەلىمى (青盐) كالوگېنلىق بىرىكىملىر تۈرىدىكى ئارىلاشىملار ئاز بولغان سۈزۈك تاش تۇز Halite نىڭ كىرسىتالى.
29. بۇيا ئۇرۇقى (苦豆子) پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بۇيا Sophora alopecuroides L نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقانى ئۇرۇقى.
30. ئالما (苹果) ئازغان ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئالما Crassia pumila Mill نىڭ يېڭى پىشقانى مېۋسى.
31. شاققۇل مىسىرى (欧玉竹) گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك شاققۇل مىسىرى

32. ئاق بهمن (欧矢车菊根) مۇرەكىپ كۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئاق بهمن
Centaurea behen L. نىڭ قۇرۇقۇلغان يېلتىز غولى.
33. بىستى پايىنچ (欧亚水龙骨) چىلىپايدى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بىستى پايىنچ Polypodium vulgare L. نىڭ قۇرۇقۇلغان يېلتىز غولى.
34. سۇمبىل رۇمى (欧缬草) سۇمبىل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سۇمبىل رۇمى Valeriana officinalis L. نىڭ قۇرۇقۇلغان يېلتىز ۋە يېلتىز غولى.
35. كۈندۈر (乳香) زەيتۇن ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كۈندۈر دەرىخى Boswellia carterii Birdw. نىڭ قوقۇزىقىنى يارغاندا سررغىپ چىقىدىغان مايلق يېلىمى.
36. جوئىدە (金石蚕) كالپۇكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك خۇيىمەشاكىپى Teucrium polium L. نىڭ پۇتون ئۆسۈملۈكى.
37. سەكىبەنەج (波斯阿魏) كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سەكىبەنەج Ferula persica Willd. نىڭ دەرمەخ يېلىمى.
38. تۆگە لوكا بېغى (驼峰油) تۆگە ئائىلىسىدىكى ھايدان قوش لوکىلىق تۆگە Camelus bactrianus L. نىڭ بېغىنى كۆپىدۈرۈپ تاۋلانغان ياغ.
39. بىخ مارجان (珊瑚) مارجان قۇرت ئاجىرىتىپ چقارغان كالتسىي كاربوناتلارنىڭ توپلىنىشىدىن ھاسىل بولغان سۇ ئاستى خادا تېشى.
40. سەۋۆزه ئۇرۇقى (胡萝卜子) كىرىپست گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سەۋۆزه Daucus carota L. var. sativa Dc. چاققاقيوت ئۆرۈقى.
41. چاققاقيوت (莖麻) چاققاقيوت ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كەندىر بىپۇرماقلقى چاققاقيوت Vrtica cannabina L. نىڭ قۇرۇقۇلغان پۇتون ئۆسۈملۈكى.
42. چاققاقيوت ئۇرۇقى (莖麻子) چاققاقيوت ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كەندىر بىپۇرماقلقى چاققاقيوت Vrtica cannabina L. نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقاڭ ئۇرۇقى.
43. ھەبى بىلسان (香没药树子) زەيتۇن ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بىلسان Commiphora opobalsamum Eng. بىلسان مېسى (香没药树子油) زەيتۇن ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بىلسان Commiphora opobalsamum Eng. بىلسان مېسى (香没药树子油) زەيتۇن ئۆرۈقىدىن تارتىپ چىقىرىلغان ياغ.
45. بادرەنجى بۇيا چىنى ئۇرۇقى (香青兰子) كالپۇكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك بادرەنجى بۇيا چىنى L. Dracocephalum moldavica نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقاڭ ئۇرۇقى.
46. پىياز ئۇرۇقى (洋葱子) گۈلسامساق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك پىياز Allium cepa L. نىڭ قۇرۇقۇلغان پىشقاڭ ئۇرۇقى.
47. جاڭۇشىر (格蓬脂) كۈنلۈكسىمان گۈللۈكلەر ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك گالبانۇم Ferula galbaniflua Boissier et Buhse. بىلسان مېسى.

48. دورىللىق گاۋىزبان (倒壺) ئەڭلىكىت ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك دورىللىق گاۋىزبان
Cynoglossum officinale L.

49. نارمىشكى (铁力木) كامفورا ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك نارمىشكى Machilus velutina
Aspleniaceae

50. پىرسىيابشان (铁线蕨) غول چىچى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك پىرسىيابشان capillus-veneris L.

51. كاسىنە ئۇرۇقى (菊苣子) مۇرەككىپ گۈللۈكلىرى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك تۈكۈلۈك كاسىنە Cichorium intybus L. ۋە كاسىنە Cichorium glandulosum Boiss. et Hout

52. كاسىنە يىلتىزى (菊苣根) مۇرەككىپ گۈللۈكلىرى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك تۈكۈلۈك كاسىنە Cichorium intybus L. ۋە كاسىنە Cichorium glandulosum Boiss. et Hout

53. بىدىمۇشكى (黃花柳花) تال تېرىك ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئوشكە تال Sslix capera L.

54. كۆك كەپتەر گۆشى (鸽子肉) كەپتەر ئائىلىسىدىكى هايۋان دالا كەپتىرى Colomba livia Gmelin، تاغ كەپتىرى C. rupestris Pallas ، ئۆي كەپتىرى C. livia domestica Gmelin قاتارلىقلار سېسىدىكى كۆك كەپتەر لەرنىڭ يېڭى گۆشى.

55. تۇربۇت (盒果膝) ئۇپېركۈلنى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك تۇربۇت Operculina turpethum (L.) Manso

56. خىيار شەنبەر (清泻山扁豆) پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك سانا دەرىخى Cassia fistula L.

57. چىگىت (棉子) لېلىككۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك كېۋەز Gossypium berbaceum L.

58. سېرەقماي (酥油) كالا ئائىلىسىدىكى هايۋان كالا Bos taurus domesticus Gmelin ياكى كالا ئائىلىسىدىكى هايۋان ئۆچكە Capra hircus Linnaeus ياكى قوي Ovis aries Linnaeus نىڭ سۈتىدىن تاۋلۇپلىنىغان ماي.

59. ئۇرۇم تېلى (葡萄藤) ئۇزۇم ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك ئۇزۇم Vitis vinifera L.

60. نامازشامكۈل يىلتىزى (紫茉莉根) نامازشام گۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك نامازشامكۈل Mirabilis jalapa L.

61. قىزىل سەندەل (紫檀香) پۇرچاق ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك قىزىل سەندەل Pterocarpus santalinus L.

62. قارا تۇۋ (黑盐) گالۇگىنىلىق بىرىكىملىر، تۇرىدىكى ئارىلاشمىلىرى بار بولغان قارا رەڭلىك

- تاشتۇز Halite نىڭ كىرسىتالى.
63. لەيلگۈل ئۇرۇقى (蜀葵子) لەيلگۈل ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك لەيلگۈل *Althaea rosea* (L.) Gavan.
64. چۈغلۈق (新疆芍药) ئىيىقتىپان ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك چۈغلۈق *Paeonia anomala* L. ۋە تار يوپۇرماقلىق چۈغلۈق *P. hybrida* Pall. ئىڭ تۈگۈنچەك يىلىزى.
65. بەللۇت (橡子) بۇك دەرىخى ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك دۇب دەرىخى *Quercus robur* L. نىڭ قۇرۇتۇلغان مېۋسى.
66. سەرتان (螃蟹壳) قىسىقچىقا ئائىلىسىدىكى ھايۋان جۇڭخوا تۇتىلىق پەنجىلىك قىسىقچىقا *Eriocheir sinensis* H. Milne—Edwards.
67. مۇقەل (穆库没药) زەيتۇن ئائىلىسىدىكى ئۆسۈملۈك مۇقەل دەرىخى *Commiphora mukul* Engl. نىڭ يىلىمى.

قوشۇمچە VI

ئۇيغۇر تېباشتىدە كۆپ ئىشلىلىدىغان ئاتالغۇلارغا ئىزاهات

1. **مزاچ** جانلىق ۋە جانسىز ماددىلارنىڭ ئۇت، هاۋا، سۇ، تۇپراقتىن ئىبارەت تۆت چوڭ ماددىنىڭ ئۆزئىارا تەمسىر كۆرسىتىشى ئارقىسىدا پەيدا قىلغان تېبىشتىدىكى خاسلىقى بولۇپ، ئىسىق، قۇرۇق، ھۆل، سوغۇق دەپ، تۆت خىلغا ئايىرىلىدۇ.
2. **خلىت** ئۇرگانىزمنىڭ جىڭىر تەرىپىدىن پىشىقلاب ئىشلەپچىقارغان ئۆزۈقلۈق ماددىسىنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، خلىت ئادەتتە تۆت خىل بولىدۇ، يەنى سەپرا خلىتى (تېبىشتى قۇرۇق ئىسىق) ، قان خلىتى (تېبىشتى ھۆل ئىسىق)، بەلغەم خلىتى (تېبىشتى ھۆل سوغۇق) ۋە سەۋدا خلىتى (تېبىشتى قۇرۇق سوغۇق).
3. **غەيرىي تەبىئىي خلىت** ئۇرگانىزمىدىكى خلىتلارنىڭ سان ۋە سۈپىتىدە ئۆزگىرىش يۈز بەرگەندە ئۇرگانىزما هاسىل بولىدىغان غەيرىي تەبىئىي خلىت بولۇپ، غەيرىي تەبىئىي سەۋدا خلىتى، غەيرىي تېبىئىي قان خلىتى، غەيرىي تېبىئىي بەلغەم خلىتى ۋە غەيرىي تېبىئىي سەپرا خلىتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
4. **نەزلە** مېڭىدە هاسىل بولىدىغان، يۆتكىلىشچان، كېسەل پەيدا قىلغۇچى سۈيۈقلۈقىنى كۆرسىتى دىغان بولۇپ، سوغۇق تەبىئەتلىك ۋە ئىسىق تەبىئەتلىك دەپ ئىككى خىل بولىدۇ. ئۇ نەپىسلىنىش كىرسە، ئاشقازان-ئۇچمەيلەردە زېدىلىنىشنى پەيدا قىلىدۇ.
5. **ئۆزۈقلانىدۇرغۇچى كۈچلەر** پۇتۇن بەدىنىڭ ھەرقايىسى ئۇششاق بۆلەكلەرىدىكى ئۆزۈقلانىدۇرغۇچى كۈچلەرنى كۆرسىتىدۇ.
6. **تۆتۈپ تۇرغۇچى كۈچ** ئۆزۈقلانىدۇرغۇچى ماددىلار رولىنى جارى قىلدۇرۇشتىن ئاۋال، ئۆزۈقلانىدۇرغۇچى ماددىلارنى تۆتۈپ تۇرىدىغان كۈچنى كۆرسىتىدۇ.
7. **چىرىش كۈچى** كېرەكسىز ماددىلارنى بەدمەن سىرتىغا چىقىرىدىغان كۈچنى كۆرسىتىدۇ.
8. **تەبىئىي كۈچلەر** ئادىم بەدىنىدىكى ھەر خىل جىسمانىي ھەرىكەتلىرنى تەممنى ئېتىدىغان كۈچلەرنى كۆرسىتىدۇ.
9. **روھىي كۈچلەر** ئادىم بەدىنىدىكى بارلىق زېھنىي ھەرىكەتلىرنى تەممنى ئېتىدىغان كۈچلەرنى كۆرسىتىدۇ.
10. **ھاياتىي كۈچ** يۈرمەك ھەرىكىتىنى تەممنى ئېتىدىغان كۈچنى كۆرسىتىدۇ.
11. **رەئىسى ئۇزا مېڭە**، يۈرهەك، جىڭىر قاتارلىق مۇھىم ئەزالارنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، ئۇلار قالغان ئەزالارنى باشقۇرۇپلا قالماي، بەلكى روھىي كۈچلەرنى، ھاياتىي كۈچلەرنى ۋە تەبىئىي كۈچلەردىن ئىبارەت تۈچ چوڭ كۈچنى پەيدا قىلايىدۇ ۋە ساقلىيالايدۇ.
12. **دورا تەبىئەت دەرىجىسى** دورىلارنىڭ ئىسىق، ھۆل، سوغۇق، قۇرۇق قاتارلىق خاس تەبىئىنىڭ كۈچلۈكلىك، ئاچىزلىق دەرىجىسىنى كۆرسىتىدىغان بولۇپ، ئادەتتە تۆت دەرىجىگە بۆللىنىدۇ، بىرىنچى دەرىجە ئەڭ ئاچىز، تۆتنىچى دەرىجە ئەڭ كۈچلۈك.

药名笔画索引

二画

丁香油 (1)

三画

大麦 (2)

小茴香露剂 (129)

大戟脂 (3)

小豆蔻 (4)

小檗果 (5)

马奶子葡萄干 (6)

马齿苋子 (7)

四画

天山堇菜 (8)

天山堇菜花 (9)

中介蝮蛇 (10)

中亚白及 (11)

水龙骨 (12)

牛至 (13)

牛舌草 (14)

牛胆汁 (15)

牛鞭 (16)

巴旦仁 (17)

开胃加瓦日西阿米勒片 (130)

止血开日瓦片 (131)

止痛努加蜜膏 (132)

五画

石榴 (18)

石榴花 (19)

龙涎香 (20)

龙葵果 (21)

白石脂 (22)

白花丹 (23)

白花酸藤果 (24)

白蜡树子 (25)

对叶大戟果 (26)

奶桃 (27)

司卡摩尼亞脂 (28)

平纳糖膏 (134)

平溃加瓦日西麦尔瓦依特蜜膏 (135)

六画

西瓜子 (30)

西帕依麦孜彼子口服液 (137)

西帕依固龈液 (139)

肉豆蔻衣 (31)

肉桂叶 (32)

红豆杉 (33)

红花子 (35)

红花子油 (36)

红宝石 (37)

百癣夏塔热片 (141)

伊木萨克片 (143)

血宁安吉杷尔糖浆 (145)

行气那尼花颗粒 (147)

行气坦尼卡尔胶囊 (149)

行滞罗哈尼孜牙片 (151)

壮益加瓦日西再尔吾尼片 (153)

安胃加瓦日西吾地吐如西片 (155)

七画

芫菁子 (38)

芹菜子 (39)

沙龙子 (41)

沙枣 (42)

沙虎 (43)

没药枝 (44)

阿里红 (45)

阿纳其根 (46)

阿拉伯胶 (47)

阿育魏果 (48)

阿娜尔妇洁液 (170)

阿莫尼亞脂 (50)

驱白马日白热斯丸 (173)

驱白巴布期片 (175)

驱白艾力勒思亚散 (176)

驱白白热斯酌	(178)
驱白依提尔菲力阿曼蜜膏	(179)
驱白派甫云片	(180)
驱虫斑鸠菊	(51)
驱虫斑鸠菊注射液	(181)
玛木然止泻胶囊	(157)
克比热提片	(159)
苏孜阿甫片	(160)
护肝布祖热颗粒	(161)
肛宁巴瓦斯尔软膏	(162)
肛康穆库利片	(164)
肠安艾布力阿斯糖浆	(166)
疗癣卡西甫散	(167)
尿通卡克乃其片	(169)

八画

青金石	(53)
松萝	(54)
刺山柑根皮	(55)
刺糖	(56)
苦巴旦仁	(57)
苦艾	(58)
苦蒿子	(60)
苜蓿子	(61)
欧龙胆	(63)
欧李	(64)
欧葵葵根	(65)
欧绵马	(66)
欧榛	(67)
鸢尾根	(68)
罗勒子	(69)
玫瑰花口服液	(183)
玫瑰花糖膏	(184)
松补力口服液	(186)
罗补甫克比日丸	(187)
固精麦斯哈片	(189)
和胃依提尔菲力开比尔蜜膏	(191)
金锁昆都尔片	(192)

炎消迪娜儿糖浆	(194)
宝心艾维西木口服液	(196)
降热比那甫西糖浆	(198)
降糖孜亚比提片	(200)
参德力糖浆	(202)

九画

南瓜子	(71)
革菱根	(72)
茴芹果	(73)
茴香根皮	(74)
荨麻子	(75)
药西瓜	(76)
药喇叭根	(77)
指甲花叶	(78)
贯叶金丝桃	(79)
秋水仙	(81)
香青兰	(82)
香茅	(84)
香桃木果	(85)
洋甘菊	(86)
洋橄榄油	(87)
神香草	(88)
蚤状车前子	(89)
骆驼蓬子	(90)
骆驼蓬草	(91)
复方木尼孜其颗粒	(204)
复方巴旦仁颗粒	(206)
复方卡力孜然酊	(208)
复方西红花口服液	(210)
复方阿里红片	(212)
复方驱虫斑鸠菊丸	(213)
复方骆驼蓬子软膏	(214)
复方高滋斑片	(216)
复方斯亚旦生发油	(218)
复方斯亚旦生发酊	(219)
养心达瓦依米西克蜜膏	(221)
祖卡木颗粒	(223)

除障则海甫片	(225)
十画	
蚕茧	(92)
格蓬脂	(93)
莳萝子	(94)
破布木果	(95)
海狸香	(96)
家独行菜子	(98)
热感赛比斯坦颗粒	(227)
健心合米尔高孜斑安比热片	(229)
爱维心口服液	(231)
消食阿米勒努西颗粒	(233)
益心巴迪然吉布亚颗粒	(235)
益脑吾斯提库都斯糖浆	(236)
通阻合牙日仙拜尔片	(237)
通窍阿亚然及派克日片	(238)
通滞苏润江胶囊	(240)
通滞依提尔菲力沙那片	(241)
十一画	
琐琐葡萄	(99)
菝葜	(100)
菜豆	(101)
菟丝草	(102)
菠菜子	(103)
黄瓜子	(104)
野葱	(105)
曼陀罗子	(106)
曼陀罗叶	(107)
麻雀脑	(108)
理血奇朗糖浆	(242)
清浊曲比亲艾拉片	(243)
清热卡森颗粒	(245)
清凉依提尔菲力开西尼孜颗粒	(247)
清涩比黑马尔江散	(249)
十二画	
棉花花	(109)
黑芥子	(111)
黑蚂蚁	(112)
湖蛙	(113)
散寒药茶	(251)
舒肢巴亚待都司片	(253)
温肾苏拉甫片	(255)
温胃阿亚然及片	(257)
温散加瓦日西加里奴司片	(258)
普鲁尼亞丸	(260)
寒喘祖帕颗粒	(262)
强力玛得土力阿亚特蜜膏	(264)
强身萝波甫赛河里蜜膏	(266)
十三画	
楸英粉	(110)
疏花蔷薇果	(114)
榅桲子	(116)
榅桲果	(117)
蜀葵花	(118)
新疆甜瓜子	(119)
新疆圆柏果	(120)
新疆酸李	(121)
新疆蠶晰	(122)
睡莲花	(123)
解毒苏甫皮塞尔塔尼胶囊	(268)
十五画	
镇痛艾比西帕丸	(270)
镇静艾比洁德瓦尔丸	(272)
十六画	
糖宁孜亚比土斯片	(274)
醒脑库克亚片	(275)
十七画	
薰衣草	(124)
薰鲁香	(125)
十八画	
鹰嘴豆	(126)
鞣漆树果	(127)

汉语拼音索引

A

- 阿拉伯胶 (47)
- 阿里红 (45)
- 阿纳其根 (46)
- 阿娜尔妇洁液 (170)
- 阿莫尼亞脂 (50)
- 阿育魏果 (48)
- 爱维心口服液 (231)
- 安胃加瓦日西吾地吐如西片 (155)

B

- 巴旦仁 (17)
- 白花丹 (23)
- 白石脂 (22)
- 白花酸藤果 (24)
- 白蜡树子 (25)
- 菝葜 (100)
- 荜茇根 (72)
- 百癣夏塔热片 (141)
- 宝心艾维西木口服液 (196)
- 菠菜子 (103)

C

- 菜豆 (101)
- 蚕茧 (92)
- 肠安艾布力阿斯糖浆 (166)
- 刺山柑根皮 (55)
- 刺糖 (56)
- 除障则海甫片 (225)

D

- 大戟脂 (3)
- 大麦 (2)
- 丁香油 (1)
- 对叶大戟果 (26)

F

- 复方阿里红片 (212)

- 复方巴旦仁颗粒 (206)
- 复方高滋斑片 (216)
- 复方卡力孜然酊 (208)
- 复方骆驼蓬子软膏 (214)
- 复方木尼孜其颗粒 (204)
- 复方驱虫斑鸠菊丸 (213)
- 复方斯亚旦生发酊 (219)
- 复方斯亚旦生发油 (218)
- 复方西红花口服液 (210)

G

- 肛康穆库利片 (164)
- 肛宁巴瓦斯尔软膏 (162)
- 格蓬脂 (93)
- 固精麦斯哈片 (189)
- 贯叶金丝桃 (79)

H

- 海狸香 (96)
- 寒喘祖帕颗粒 (262)
- 和胃依提尔菲力开比尔蜜膏 (191)
- 黑芥子 (111)
- 黑蚂蚁 (112)
- 红宝石 (37)
- 红豆杉 (33)
- 红花子 (35)
- 红花子油 (36)
- 湖蛙 (113)
- 护肝布祖热颗粒 (161)
- 黄瓜子 (104)
- 茴芹果 (73)
- 茴香根皮 (74)

J

- 家独行菜子 (98)
- 健心合米尔高孜斑安比热片 (229)
- 降热比那甫西糖浆 (198)
- 降糖孜亚比提片 (200)
- 解毒苏甫皮塞尔塔尼胶囊 (268)

金锁昆都尔片 (192)

K

开胃加瓦日西阿米勒片 (130)

克比热提片 (159)

苦艾 (58)

苦蒿子 (60)

苦巴旦仁 (57)

L

理血奇朗糖浆 (242)

疗癣卡西甫散 (167)

龙葵果 (21)

龙涎香 (20)

罗补甫克比日丸 (187)

罗勒子 (69)

骆驼蓬草 (91)

骆驼蓬子 (90)

M

马齿苋子 (7)

马奶子葡萄干 (6)

玛木然止泻胶囊 (157)

麻雀脑 (108)

曼陀罗叶 (107)

曼陀罗子 (106)

棉花花 (109)

玫瑰花口服液 (183)

玫瑰花糖膏 (184)

没药枝 (44)

苜蓿子 (61)

N

南瓜子 (71)

奶桃 (27)

尿通卡克乃其片 (169)

牛鞭 (16)

牛胆汁 (15)

牛舌草 (14)

牛至 (13)

O

欧榛 (67)

欧菝葜根 (65)

欧李 (64)

欧龙胆 (63)

欧绵马 (66)

P

平溃加瓦日西麦尔瓦依特蜜膏 (135)

平纳糖膏 (134)

破布木果 (95)

普鲁尼亞丸 (260)

Q

尊麻子 (75)

强力玛得土力阿亚特蜜膏 (264)

强身萝菠甫赛河里蜜膏 (266)

清凉依提尔菲力开西尼孜颗粒 (247)

清热卡森颗粒 (245)

清涩比黑马尔江散 (249)

清浊曲比亲艾拉片 (243)

秋水仙 (81)

楸萸粉 (110)

芹菜子 (39)

青金石 (53)

驱白艾力勒思亚散 (176)

驱白巴布期片 (175)

驱白白热斯酊 (178)

驱白马日白热斯丸 (173)

驱白派甫云片 (180)

驱白依提尔菲力阿曼蜜膏 (179)

驱虫斑鳩菊 (51)

驱虫斑鳩菊注射液 (181)

R

热感赛比斯坦颗粒 (227)

肉豆蔻衣 (31)

肉桂叶 (32)

鞣漆树果 (127)

S

- 沙虎 (43)
- 沙龙子 (41)
- 沙枣 (42)
- 散寒药茶 (251)
- 参德力糖浆 (202)
- 神香草 (88)
- 司卡摩尼亞脂 (28)
- 石榴 (18)
- 石榴花 (19)
- 莳萝子 (94)
- 松萝 (54)
- 松补力口服液 (186)
- 疏花蔷薇果 (114)
- 舒肢巴亚待都司片 (253)
- 蜀葵花 (118)
- 睡莲花 (123)
- 水龙骨 (12)
- 琐琐葡萄 (99)
- 苏孜阿甫片 (160)

T

- 糖宁孜亚比土斯片 (274)
- 天山堇菜 (8)
- 天山堇菜花 (9)
- 通窍阿亚然及派克日片 (238)
- 通滞苏润江胶囊 (240)
- 通滞依提尔菲力沙那片 (241)
- 通阻合牙日仙拜尔片 (237)
- 菟丝草 (102)

W

- 榅桲果 (117)
- 榅桲子 (116)
- 温胃阿亚然及片 (257)
- 温散加瓦日西加里奴司片 (258)
- 温肾苏拉甫片 (255)

芫菁子 (38)

X

- 西瓜子 (30)
- 西帕依固龈液 (139)
- 西帕依麦孜彼子口服液 (137)
- 新疆蠶晰 (122)
- 新疆酸李 (121)
- 新疆甜瓜子 (119)
- 新疆圆柏果 (120)
- 醒脑库克亚片 (275)
- 行气那尼花颗粒 (147)
- 行气坦尼卡尔胶囊 (149)
- 行滞罗哈尼孜牙片 (151)
- 香青兰 (82)
- 香茅 (84)
- 香桃木果 (85)
- 小檗果 (5)
- 小豆蔻 (4)
- 小茴香露剂 (129)
- 消食阿米勒努西颗粒 (233)
- 血宁安吉杷尔糖浆 (145)
- 薰鲁香 (125)
- 薰衣草 (124)

Y

- 炎消迪娜儿糖浆 (194)
- 洋橄榄油 (87)
- 洋甘菊 (86)
- 养心达瓦依米西克蜜膏 (221)
- 药喇叭根 (77)
- 药西瓜 (76)
- 野葱 (105)
- 伊木萨克片 (143)
- 益脑吾斯提库都斯糖浆 (236)
- 益心巴迪然吉布亚颗粒 (235)
- 鹰嘴豆 (126)
- 鸢尾根 (68)

Z

蚤状车前子 (89)
镇静艾比洁德瓦尔丸 (272)
镇痛艾比西帕丸 (270)
止痛努加蜜膏 (132)
止血开日瓦片 (131)

指甲花叶 (78)
中介蝮蛇 (10)
中亚白及 (11)
壮益加瓦日西再尔吾尼片 (153)
祖卡木颗粒 (223)

دورا ناملىرىنىڭ ئۇيغۇرچە ئاچقۇچى

ئ

58	ئاپىچىق ئەمەن
57	ئاچچىق بادام
76	ئاچچىقتاۋۇز
91	ئادراسمان
90	ئادراسمان ئۇرۇقى
214	ئادراسمان ئۇرۇقى مەلمى
2	ئارپا
129	ئارپىبەدىيان ئەرىقى
74	ئارپىبەدىيان يىلتىزى پوستى
114	ئازغان مونىچىقى
118	ئاق لەيلگۈل
46	ئاقرقەرها
233	ئامىلەنۇش جەۋەھىرى
18	ئانار
170	ئانار پوستى تازىللىق سۇيۇقلۇقى
19	ئانارگۈلى

ئە

47	ئەرمەب يېلىمى
25	ئەرمۇدۇن ئۇرۇقى
20	ئەنبەر
145	ئەنجىباھار شەرىسى
196	ئەۋرىشىم ئىچىملىكى
231	ئەۋرىشىم ئىچىملىكى
64	ئەينۇلا

ب

86	بابۇنە
206	بادام جەۋەھىرى
235	بادىمنجى بۇيا جەۋەھىرى
82	بادىمنجى بۇيا چىنى

24	بەرمىڭى كابىلە
31	بەسىلسە
161	بۇزۇرى جەۋھەرى
16	بۇقا چۈيىسى
61	بىدە ئۇرۇقى
117	بېھى
116	بېھى ئۇرۇقى
12	بىستى پايىنچ
8	بىنەپىشە
198	بىنەپىشە شەربىتى
9	بىنەپىشكۈل

پ

103	پالەك ئۇرۇقى
26	پەربۇن
3	پەرفىيون
92	پىلە غوزسى
72	پىلىپ يىلتىزى
67	پىندىق
134	پىننە گۈلقەنتى

ت

17	تاتلىق بادام
30	تاۋۇز ئۇرۇقى
98	تەرتىز
104	تەرخەمەك ئۇرۇقى
149	تەنكار كاپسۇلى
65	تومۇر دورىسى

ج

93	جاۋۇشىر
48	جوۇشىنە
42	جىڭىدە
63	جىنتىيانا

ڭ

75	چاققاڭىت ئۇرۇقى
----	-----------------

38	چامغۇر ئۇرۇقى
251	چاي دورسى
100	چۆپچىن
77	چىلاپا
242	چىلان شەربىتى

خ

78	خېنە يىپۇرمىقى
	د
194	دىنار شەربىتى

ر

69	رەبەن ئۇرۇقى
73	رۇم بەدىيان

ز

35	زاراڭزا ئۇرۇقى
36	زاراڭزا يېغى
210	زەپەر ئىچىمىلىكى
33	زەرنەپ
87	زەيتۇن يېغى
88	زۇپا
262	زۇپا جەۋھەرى
5	زېرىق مېۋسى
178	زىماتى بەرەس
208	زىماتى كالزىزە

س

32	سازەج
95	سەرپىستان
227	سەرپىستان جەۋھەرى
66	سەرخس
41	سەقەنقۇر
202	سەندەل شەربىتى
68	سەۋسەن يىلتىزى
28	سۈقۈمنىبا
249	سۇفۇپى بىخ مارجان

268	سوْفُوپى سەرتان كاپسۇلى
167	سوْفُوپى قەشىپ
176	سوْفُوپى ھېليلە سىياب
127	سوْماق
186	سوْمبۇل تىچىمىلىكى
81	سوْرۇنچان
240	سوْرۇنچان كاپسۇلى
11	سوْتەلەپ مىسىرى
102	سېرىق ئۇت
7	سېمىز ئۇت ئۇرۇقى
219	سيادان چاچ ئۆستۈرۈش سۇيۇقلۇقى
218	سيادان يېغى

ش

23	شاتىرەنجى
223	شىپايى زۇكام جەۋەھرى
137	شىپايى مەزى بېزى تىچىمىلىكى
120	شىنچاك ئارچا مەۋسى

غ

139	غار-غار سۈبى
45	غارتىقۇن
99	غۇنچىسىزۈزم

ق

112	قارا چۈمۈلە
111	قارا قىچا
94	قا拉 كۆز بەدىيان
121	قارىئۇرۇڭ
1	قەلمەپۇر يېغى
110	قەنبىل
119	قوغۇن ئۇرۇقى
43	قول يىلىنى
257	قۇرسى ئايارەج
238	قۇرسى ئايارەج پېقىرا
175	قۇرسى بابۇچى

253	قۇرسى بايدىدىمۇس
180	قۇرسى پەرفېيون
130	قۇرسى جاۋارىش ئامىلە
258	قۇرسى جاۋارىش جالىنۇس
153	قۇرسى جاۋارىش زەرتۈنلى
155	قۇرسى جاۋارىش ئۇدۇنۇرۇش
243	قۇرسى چۆپچىن نەلا
229	قۇرسى خېمىرى گاۋىزبان ئەمبىرى
237	قۇرسى خىيار شەنبەر
225	قۇرسى زەھەب
200	قۇرسى زىبابىت
160	قۇرسى سۇزاپ
255	قۇرسى سۆئىلەپ
212	قۇرسى غارىقۇن
274	قۇرسى زىبابىتىس
275	قۇرسى قوقىيا
169	قۇرسى كاكىنەج
131	قۇرسى كەھرىۋا
192	قۇرسى كۈندۈر
159	قۇرسى كېرىت
141	قۇرسى شاھىتەر
216	قۇرسى گاۋىزبان
151	قۇرسى لوغانزىبيا
189	قۇرسى مەسە
164	قۇرسى مۇقەل
241	قۇرسى ئىترىفلى سانا
143	قۇرسى ئىمساك
6	قۇرۇق سايىۋا ئۈزۈم
108	قۇشقاچ مېڭىسى
96	قۇندۇز قەھرى
183	قىزىلگۈل ئىچىملىكى
	ك
245	كاسىنە جەۋەھىرى

15	كالا ئۆتى
51	كالىزىرە
181	كالىزىرە ئۆكۈلى
71	كائۇ ئۇرۇقى
55	كەپە يىلتىزى پوستى
39	كەرەپەشە ئۇرۇقى
122	كەسلەنچۈك
60	كەكىرە ئۇرۇقى
109	كېۋەز چىچىكى

گ

14	گاۋىزبان
184	گۈلقەنت
22	گىل مەختۇم

ل

53	لاجۇھەرد
4	لاچىندانە
101	لوبىيا

م

157	مامىران كاپسۇلى
135	مەجۇنى جاۋارىش مەرۋايات
221	مەجۇنى داۋانىمىشكى
266	مەجۇنى لوبىپى سەغىرى
264	مەجۇنى مادىمتوڭلaiيات
132	مەجۇنى نۇجاھ
179	مەجۇنى تىرىنلى ئامان
191	مەجۇنى تىرىنلى كەبر
13	مەرزەنچۈش
125	مەستىكى رۇمى
162	مەلھىمى بواسىر
204	مۇنچىچ جەۋەھىرى

ن

27	نارجىل
147	نانخا جەۋەھىرى

126	نوقۇت
123	نېلۇپەر

ھ

85	ھېببۇئىلس
166	ھېببۇئىلس شەربىتى
260	ھېببى پۇلونيا
272	ھېببى جەدۋار
270	ھېببى شىپا
213	ھېببى كالزىزىرە
187	ھېببى لوبۇبى كەبىر
173	ھېببى مارى بەرمىس
79	ھۇپارىقۇن

ئو

10	ئۇق يىلان
----------	-----------

ئۇ

113	ئۇچقۇن پاقا
44	ئۇدبىلىسان
50	ئۇشەق

ئۇ

54	ئۇشىنە
----------	--------

ئۇ

124	ئۇستقۇددۇس
236	ئۇستقۇددۇس شەربىتى

ئى

21	ئىتىياڭقى ئۇرۇقى
106	ئىتىياڭقى يوپۇرمىقى
107	ئىتىياڭقى يوپۇرمىقى
247	ئىترىفلى كەشنىز جەۋەھرى
84	ئىزخىر
89	ئىسبەغۇل

ي

37	ياقۇت
56	يانتاقشىكىرى
105	يَاۋا پېياز